


BIBLIOT. UNIV
EST. 1a
TABLA "
Nº 1315
CIENCIAS
NATURALES



19-6^a-BH

COLLECTION
D'OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES
SUR DIFFÉRENTES SCIENCES,

ET

D'AUTRES ÉCRITS RELATIFS A L'INSTRUCTION.

SYNOPSIS PLANTARUM,
HUCUSQUE COGNITARUM;
SECOND OUVRAGE, PREMIÈRE PARTIE.

Éditeur,

C. F. CRAMER.

CETTE Collection est destinée aux Professeurs et Élèves des Écoles secondaires et des Lycées, aux Maîtres en général, ainsi qu'à tous ceux qui, privés des ressources de l'instruction publique, veulent y suppléer par des Manuels clairs et méthodiques, qui leur offrent les notions les plus nécessaires de Bibliographie et les élémens des principales sciences.

UNE grande partie de ces Manuels manque en France à l'instruction. A la vérité, il existe des Abrégés sur différentes matières qui en feront l'objet; mais ces Abrégés ne sont ni exacts, ni complets, ni méthodiques, et ils sont moins combinés pour l'avantage de ceux qui apprennent, que de ceux qui savent: au lieu que l'utilité de plusieurs de ceux qui composeront cette Collection est reconnue par l'expérience et leur usage habituel dans la plupart des écoles des nations éclairées qui avoisinent la France.



SYNOPSIS

PLANTARUM,

SEU

ENCHIRIDIUM BOTANICUM.

UNIVERSIDAD DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS
Sección de BIOLÓGICAS
CATEDRA DE BOTANICA
Registro de Libros
Biblioteca

N.º Registro 400-1 A

Devuelto por la biblioteca
del Jardin Botánico 24-5-60

75-6-32
SYNOPSIS

A58

PLANTARUM, PER

syn

SEU

ENCHIRIDIUM BOTANICUM,


COMPLECTENS

ENUMERATIONEM SYSTEMATICAM SPECIERUM
HUCUSQUE COGNITARUM.

CURANTE

DR. C. H. PERSOON,

DIVERSARUM SOCIETATUM MEMBRUM



PARS PRIMA.

PARISIIS LUTETIORUM,

Apud CAROL. FRID. CRAMERUM,

ET TUBINGÆ,

Apud J. G. GOTTAM.

1805.

R. 137532492



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

532500515X



P R A E F A T I O

QUUM duo abhinc et quod excurrit annos, suasu cl. Cramerī, amici conjunctissimi itidemque Botanices amantissimi, hocce quaecumque opusculum ~~exarandum~~ susciperem, rei herbariæ studiosis non melius posse consuli arbitrati sumus, quam si quæ hucusque in variis aut nimis voluminosis operibus descriptæ extant plantæ, in *επεξήριον* colligerentur, quod excursionibus et visitandis hortis botanicis inservire possit; et luculentissima plantarum messis, Botanicorum solertia in dies crescens, angusto quasi horreo comprehenderetur. Quam ob rem non solum eligenda erat typographo minutissima, eoque elegantissima, libelli et characterum typographicorum forma, verum etiam auctori elaborandum, ut, omissis supervacaneis synonymis, amplisque vegetabilium descriptionibus, quibus in ingentem molem evadere solent spissa illa volumina, essentielles solum, quos vocant, exhiberentur characteres tum generici, tum specifici, atque paucatantummodo laudarentur opera, in quibus icones inveniantur, aut majores præsto sint plantarum adumbrationes.

✱

Quum vero haud raro solis ex plâsibus, ob earum brevitate, non rite dignosci queant plantæ; non ex re fore putavi, si characteribus specificis aliquando subjicerentur observationes breviusculæ, aut, qui novissimis præsertim temporibus innotuere, stirpium virtutes tam medicæ quam physicæ, nec non usus œconomicus commemoraretur. Quod vero nec ubique, nec amplis verbis factum; quippe vetabat instituti nostri ratio.

Quantum vero fieri potuit, et per temporis huic operi perficiendo præscripti angustias licuit, definitum mihi fuit et propositum, in eo imprimis studere, ut, si non omnes, pleræque tamen cognitæ species, brevissimo coercerentur spatio. Quocirca non pauca consultanda erant opera, ex quibus summi LINNÆI *Species Plantarum*, ex curatione celeberrimi WILDENOWII (cui plures observationes inde depromptas me debere, grata agnosco mente,) eo lubentius secutus sum, illudque opus, utpote locuples præ ceteris, allegavi, quo majorem ibi quisque synonymorum et descriptionum copiam pervolvere potest. Sed recentiora etiam bene multa scripta, quæ, si, vel novarum specierum, vel observationum quas continent

gazam, aut iconum elegantiam et fidem spectes, ditissima sunt, in usum meum converti.

Quanto stirpium, tum plane novarum, tum ex laudatis operibus haustarum numero, Synopsis nostram augere et ornare contigerit, quisque facile intelliget, qui ejus comparisonem ad alia vel maximi voluminis opera instituere velit. Monendum tamen est, nonnulla recentiora Botanorum scripta, quæ sub libelli confectionem in lucem prodire, nimis sero, quod doleo, aut nondum in manus mihi pervenisse: quæcunque igitur vel novæ ibi extant species, aut quæ ex industria nonnunquam hic sunt omissæ, accuratius adhuc requirentes examen, eas *Man-tissa* exhibebit, ad finem operis proditura.

In ingenti e contrario vegetabilium numero, quo scientia botanica nunc superbit, nullus judex æquus gravi mihi, opinor, vertet vitio, si forsitan aliquæ species sub diverso aut eodem genere bis enumerentur, quarum nonnullæ inter *Emendanda* jam sunt adnotatæ. Etenim non unius hominis est, omnes examinare aut ex autopsia cognoscere plantas; sed plurimas fide auctorum adoptare necesse est, quarum descriptiones aut disse-

rentiæ aliquando nimis breves sunt , aut , forte pro speciminum conditione ad quæ sunt compositæ , inter se differunt. A Botanicorum humanitate hinc in scientiæ emolumentum petimus , ut tales nobis indicent operis defectus et hallucinationes , communicatis simul , si fieri possit , plantis , ut novis ab iis descriptis.

A systemate sexuali , omnium arteficialium ceteroquin optimo , in eo recedere coactus fui , ut classem *Polyadelphiam* et *Polygamiam* , cum Botanicorum ut credo consensu , supprimerem , quo plura genera vinculo naturali inter se connexa invicem magis approximarentur : ex. gr. ut unum exemplar omnium adducam , genera *Metrodiseros* e classe Polyandria , et *Melaleuca* ad Polyadelphiam relata , quæ tantummodo inter se filamentis simplicibus aut ramosis differunt. Classis *Polygamia* partium abortu nec ratione solida innixa , plura talia offert specimina.

Characteres genericos et específicos , ubi hoc necessarium videbatur , ex meis aliorumque observationibus emendavi et auxi. Nomina , sic dicta trivialia , rarissime mutavi , nisi hoc aut error postularet , ubi nempe planta

quædam a patria plane diversa est denominata, (ex. gr. *Cruzita hispanica* L., quæ in America crescit; *Bergia capensis*, planta indica; *Rumex Britannicus* (nomen videtur pharmacopæum) in Anglia nondum detectus, sed Americæ indigena; *Erica caffra*, ex Europa australi,) aut si nomen nimis sesquipedale et minus sonorum videretur. E contrario in parenthesi nomen quasi secundarium passim addidi, quo idea plantæ forte distinctior concipi possit.

Ex stirpibus jam cognitis necessarium aliquando esset ut sum peculiaria constituere genera, præsertim si natura fructuum aliarumque florum partium hoc requireret. Melius autem judicavi, eas species (nonnullis forte tamen excipiendis) ab aliis leviter in caractere generico aberrantes, imprimis si genus minus amplum sit, sub divisione peculiari aut subgenere, quo etiam nonnulla Botanicorum recentiorum genera relata sunt, comprehendere, ne ultra necessitatem genera multiplicentur; ad quod ceteroquin ætas nostra nimis proclivis videtur. Quo etiam spectat nimia facilitas aut abusus, quod plantæ sæpe induantur nomine hominum obscu-

rorum, aut aliis in artibus vel litteris, in re vero botanica non aut vix versatorum; unde nuncupationis ratio nec amplius incitamentum, nec merces laboris æstumari poterit.

Ad finem cujusve classis species illae anomalae enumeratae sunt, quæ si solummodo partium frutificantium numeri rationem habeas, ibi quærendæ sunt. Hæc a LINNÆO aliisque auctoribus, in clavi ita dicta generum, etiam inveniuntur adnotatæ.

Varietates præcipuæ et subspecies non omittæ sunt. Speciebus obscuris, aut quoad sedem dubiis, vel accuratiori indagacioni subjiciendis, signa crucis seu asteriscum apposui.

Virorum meritissimorum conatus ac studium semper in eo collocatum fuit, ut methodus inveniatur, qua plantarum genera serie naturali in diversas disponantur tribus, quas facilius ob eorum multitudinem mente complecti et illorum diversitatem observare possimus. In systemate contra mere artificiali, a particulari plantarum parte, nec toto habitu simul considerato, composito, non raro genera immo et species in variis classibus, nec non ordi-

nibus, relationi, quæ inter ea obtinet, plane contrario, existunt dispersa.

Attamen negari non potest, in ipso systemate Linnæano, characteribus pluribus minusque variabilibus innitente, non solum plura genera, habitu naturali convenientia, juxta se invicem collocata, sed et integras classes, pauca genera intermixta si excipias, naturales esse, ex gr. *Didynamia*, *Tetradynamia*, *Monadelphica*, *Diadelphica*, *Syngenesia*, *Gynandriæ prior ordo* et *Cryptogamia*. Ubi nunc in prioribus classibus talium generum cohors occurrit, nomen familiæ s. ordinis naturalis plantarum cum suis characteribus succinctis in eorum gratiam anteposui, quibus methodus naturalis minus familiaris est. Hoc vero in *Hexandria* haud necessarium autumavi, cum plurima genera satis inter se congruant, et de eorum distributione aut potius limitibus auctores methodi naturalis adhuc dissentiant.

Ad hunc finem ill. A. L. DE JUSSIEU *Genera Plantarum*, opus vicissitudines in scientia sæpe obvias non facile subiturum, ut optimum secutus sum. Meum etiam est, celeberrimo ac humanissimo hujus libri auctori de

ejus in me beneficentia gratias reddere sincerimas, quod herbarium suum, ut inter omnes constat, ditissimum, non raro perscrutari mihi permiserit.

Grata quoque mente laudanda est eorum virorum in me benevolentia, qui mecum aut observationes communicarunt aut novas plantas describendas concesserunt, vel rarioribus collectionem meam augere voluerunt; hi nomina sua singulis symbolis, mihi ab illis concessis, adscripta inventuri sunt.

C. H. PERSOON.

Dabam Parisiis, die 12 Martii, 1805.

SYNOPSIS SPECIERUM PLANTARUM.

CLASSIS PRIMA.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Scitamineæ (Gen. 1-16.) forte melius ad *Gynandriam* referendæ, caule sunt herbaceo, petiolis vaginantibus tecto, foliis nervosis: junioribus convolutis, floribus spathaceis, filam. ad styli basin inserto. Stam. duo in Globba.

1. *CANNA*. Cor. 6-partita, erecta. Nect. bipartitum, revolutum. Styl. lanceolatus, corollae adnatus. Cal. 3-phyl. Caps. muricata.

1. *paniculata*, fol. ovatis, subtus laevibus argenteis; petalis interioribus brevioribus. Ruiz et Pavon. Flora Peruv. et Chilensis. vol. 1. p. 1. t. 1. f. 1. Hab. in Peruvia. Caps. obovata, echinata. $\overline{\text{T}}$

2. *Iridiflora*, fol. ovatis acuminatis, laciniiis tribus corollae interioribus majoribus. Flor. peruv. l. c. Hab. in Peruvia. Cor. laciniae 3 exteriores purpurasc. Caps. oblonga, maxima. Fol. subtus lanata. $\overline{\text{T}}$

3. *indica*, foliis ovatis utrinque acuminatis costatis. C. fol. ovatis utrinque acuminatis nervosis. Willd. spec. plant. Lin. 1. p. 3. Knorr. del. hort. 2 t. C. 2. Rumph. amb. 5 p. 177. t. 71. t. 2. laciniiis corol. subaequalibus. Fl. Peruv. $\overline{\text{T}}$

4. *lutea*, petalis interioribus erectis luteis, nectarii lacinia revoluta. *Heritiera* Willd. spec. plant. Lin. 1. p. 1. t. 1. f. 1. Hab. inter tropicos Asiae, Africae, Americae. $\overline{\text{T}}$

4. *coccinea*, fol. ovatis nervosis, bracteis ovatis pulverulentis. Mill. dict. Ait. l. c. Omanino species distincta videtur, cum humilior sit et jam primo vere floreat. Fol. breviora et latiora. $\overline{\text{T}}$

5. *angustifolia*, foliis lanceolatis petiolatis costatis. Willd. loc. cit. Pis. bras. 213. Hab. inter tropicos Americae, in umbrosis spongiosis. C. indica humilior et angustior. $\overline{\text{T}}$

6. *glauca*, fol. lanceolatis glaucis subtus enerviis. Willd. Dill. elth. 69. t. 59. f. 69. Hab. in Carolinae aquis. $\overline{\text{T}}$


7. *junceæ*, foliis linearibus nervosis. Retz. obs. fasc. 1. p. 9. n. 1. Hab. in China. Corolla parva obscure rufa. $\overline{\text{T}}$

2. *HELLENIA*. Cor. limbus duplex, exterior subtrifidus. Nectar. diphyllum vel bifidum. Capsula trilocularis, coriacea, inflata, subglobosa. Calyx spathiformis, campanulatus bifidus.

1. *Allughas*, nectariis diphyllis, capsulis subspongiosis, foliis integerrimis. Willd. spec. pl. 1. p. 4. *Heritiera* Allughas Retz. obs. fasc. 6. p. 17. tab. 1. Rheed. mal. 11. p. 29. t. 14. Hab. in Zeylona. Inflorescentia totius generis paniculata. $\overline{\text{T}}$

2. *alba*, nectariis diphyllis, capsulis atratis, foliis integerrimis. W. *Heritiera* alba. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. fasc. 3. p. 64. Hab. in China. $\overline{\text{T}}$

A



3. *chinensis*, nectaris diphyllis, foliis ciliatis. W. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. Colitur in hortis Sinensium. $\overline{\text{T}}$

4. *aquatica*, nectaris monophyllis bifidis, foliis margine denticulatis. W. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. Habitat in Indiae uliginosis inter frutices. $\overline{\text{T}}$

3. **RENEALMIA.** *Cor.* trifida. *Nectar.* oblongum. *Cal.* monophyllus in 2 s. 3 dentes irregulares rumpens. *Anth.* sessilis, nectario opposita. *Bacca* carnosa.

1. *exaltata*. Willd. Sp. pl. 1. p. 6. Hab. in Surinamo. Arbor 20-pedalis. $\overline{\text{T}}$

4. **AMOMUM.** *Cal.* 3-fidus, inaequalis, cylindricus. *Cor.* 3-partita, inaequalis, patens. *Nect.* 2-labiatum, erectiusculum.

1. *racemosum*, scapo spathis oblongis tecto, racemo composito Fl. peruv. 1. p. 2. t. 1. f. b. Copiose in Peruviae sylvis. Cannum refract. Caps. nigra leviter striata. Sem. acria oleosa. $\overline{\text{T}}$

2. *thyrsioides*, scapo spathis oblongo-ovatis vestito, spica conico-thyrsioides. Fl. peruv. 1. c. t. 2. Cum priore crescit. Capsula magna ventricosa. Rad. tuberosa fasciculata. $\overline{\text{T}}$

3. *Zingiber*, scapo mediocri, spica ovata, foliis lineari-lanceolatis. Swartz obs. p. 2. Rumph. amb. 5. p. 156. t. 66 f. 1. Willd. S. P. 1. p. 6. $\overline{\text{T}}$

4. *Zerumbet*, scapo nudo, spica oblonga obtusa, squamis subrotundis, foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 3. Ehret. pict. t. 14. f. 1. Mill. dict. n. 2. ic. 17. t. 25. Blackw. Herb. t. 402. Hab. in India. $\overline{\text{T}}$

5. *Zedoaria*, scapo nudo, spica laxa truncata. Berg. mat. med. p. 4. Amomum latifolium. Lamarck encyclop. 1. p. 133. Petiv. Gazoph. t. 23. f. 1. Rheed mal. 11. p. 13. t. 7. Hab. in India. $\overline{\text{T}}$

6. *sylvestre*, scapo nudo, spica elongata, bracteis oblongis ventricosis, foliis lato-lanceolatis. Swartz prod. 11. Sloan. jam. 61. hist. 1. p. 165. t. 105. f. 2. Hab. in sylvis Jamaicae. $\overline{\text{T}}$

7. *Mioga*, scapo brevissimo, capsula ovata, foliis ensiformibus acutis. Thunb. Jap. 14. Kaempf. am. exot. 5. p. 826. Hab. juxta Nagasaki in Japonia. Proxime ad Amomum Cardamomum. $\overline{\text{T}}$

8. *angustifolium*, scapo nudo brevissimo, spica capitata, fol. lineari-lanceolatis. W. l. c. p. s. Sonnerat it. tab. 137. Lamarck encyclop. 1. p. 132. Habitat in paludibus Insulae Madagascariae. Caulis 8-vel 10-pedalis. $\overline{\text{T}}$

9. *Cardamomum*, spica radicali sessili obovata, foliis obovato-ellipticis cuspidatis. A. scapo simplicissimo brevissimo, bracteis alternis laxis. L. Blackw. tab. 584. et 585. Rumph. amb. 5. p. 152. t. 65. f. 1. $\overline{\text{T}}$

10. *villosum*, scapo vaginato brevissimo, spica subrotunda, bracteis lanceolatis flore longioribus. Willd. l. c. A. villosum, scapo brevi reclinato; bracteis linearibus, fructu villosu. Loureiro coch. A. p. 4. Rumph. amb. 6. p. 137. t. 61. f. 2. Hab. in montosis udibus Indiae. $\overline{\text{T}}$

11. *repens*, scapo ramoso decumbente, foliis lanceolatis. Sonnerat it. ed. germ. 2. p. 188. t. 136. Rheed. mal. 11. p. 9. t. 4-5. Hab. in montibus Gate Malabaricae. $\overline{\text{T}}$

12. *Granum Paradisi*, scapo ramoso laxo, foliis ovatis. Blackw. t. 385. Rheed. mal. 11. t. 6. Hab. in Madagascar, Guinea, Zeylona. $\overline{\text{T}}$

5. **HORNSTEDTIA.** *Cal.* bifidus. *Cor.* tubus longus filiformis, limbus duplex: exterior 3-partitus *Nect.* tubulosum. *Capsula* triangularis oblonga.

1. *Scyphus*, foliis subtus tomentosis. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. Willd. S. P. p. 9. Hab. in nemorosis prope Malaccam. $\overline{\text{T}}$

2. *Leonurus*, foliis glabris ciliatis. Retz l. c. Hab. in sylvis Malaccae. $\overline{\text{T}}$

6. **HEDYCHHIUM.** *Cal.* 1-phyllus duplex, 5-partitus. *Styl.* longissimus. *Nect.* 2-phyllum.

1. *coronarium*. Willd. l. c. p. 10. Retz. fasc. 3. p. 73. n. 20. Rumph. amb. 5. p. 175. t. 60. f. 3. Lam. ill. gener. p. 7. n. 16. t. 1. f. 3. In India, Java. $\overline{\text{T}}$

7. **COSTUS.** *Cal.* 3-fidus gibbus. *Cor.* 3-partita, ringens. *Nectar.* 2-labiatum: labio inferiori maximo 3-lobo. *Bacca*?

1. *arabicus*, foliis utrinque glabris, spica pauciflora, squamis apice foliaceis, summis fastigiatis. Willd. l. c. Blackw. t. 394. Merian. surin. 36. t. 36. In America calidiore. $\overline{\text{T}}$

2. *spicatus*, foliis utrinque glabris, spica multiflora subovata arcte imbricata: squa-

mis ovatis simplicibus. Swartz prod. 11. *Alpinia (spicata)* floribus spicatis. Murr. S. V. p. 51. Jacq. amer. p. 1. tab. 1. Moris. hist. 3. p. 251. s. 8. t. 14. f. 8. Hab. ad ripas inque montosis insularum Caribaeorum et in Brasilia. ¶

3. *speciosus*, foliis subtus sericeo-villosis. Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 1. p. 249. *Costus arabicus*. Jacq. Icon. rar. vol. 1. tab. 1. *Amomum hirsutum*. Lamarck encyclop. 1. p. 134. tab. 3. Hab. in India orientali. ¶

4. *echinatus*, spica radicali, capsulis echinatis globosis. *Amomum echinatum*. Willd. spec. pl. L. 1. p. 3. Globba uviformis Rumph. 6. p. 134. t. 61. f. 1. In Indiae sylvis. Planta obscura, forte distincti generis, cujus capsulam Rumphius l. c. ut baccam describit, quare eam hoc ad genus retuli. ¶

5. *scaber*, thyrso conico, bracteis ovatis adpressis, corol. semiclausis. Fl. peruv. 1. p. 2. t. 3. In sylvis Peruvianis. Fol. subtus pubescentia, vaginae post eorum delapsum scabrae. Cor. alba. ¶

6. *laevis*, thyrso conico bracteis lanceolatis apice incurvis, cor. patentibus. Fl. peruv. p. 3. Cor. luteo-carnea. ¶

7. *argenteus*, thyrso oblongo, bracteis reflexis, cor. patentibus. Fl. peruv. p. 3. t. 4. Hab. cum priore in Peruviae nemoribus umbrosis humidis. Fol. pendula subtus argenteo-pubescentia. Cor. lutescens. ¶

8. *Zerumbet*, spica (racemo simplici) recurva lata. *Zerumbet speciosum* Wendl. sert. hannov. fasc. 4. p. 3. t. 19. Flor. albedo-rosei. Carina (Nect. lin.) maxima, margine undulata flava. In China. ¶

8. *ALPINIA*. Cal. 3-dentatus aequalis tubulosus. Cor. 3-partitae qualis. Nect. 2-labiatum: labio inferiore patente.

1. *racemosa*, racemo terminali spicato, floribus alternis, nectaris labio trifido: foliis oblongis acuminatis Swartz obs. p. 5. Plum. ic. 10. t. 20. Sloan. jam. 61. hist. 1. p. 165. t. 105. f. 1. In sylvis depressis submontanis Americae calidioris. ¶

2. *Galanga*, racemo terminali laxo, floribus alternis, nectaris labio emarginato, foliis lanceolatis. Willd. Sp. p. 12. Rumph. amb. 5. p. 143. t. 63. In India orientali. ¶

3. *comosa*, spica terminali comosa, bracteis flore longioribus coloratis, foliis oblongo-ovatis pubescentibus. W. Jacq.

Icon. rar. vol. 3. Ad Caracas in America. ¶

4. *occidentalis*, racemo radicali composito erecto, nectario apice emarginato, capsulis trilocularibus, foliis lanceolato-ovatis glaberrimis. Swartz prod. 11. Hab. in sylvis Jamaicae et Domingo. ¶

9. *MYROSMA*. Cor. 5-partita irregularis. Cal. duplex: exterior 3-phyllus, interior 3-partit. Caps. 3-gona 3-locul. polysperma.

1. *cannaeformis*. L. Willd. 1. p. 13. Hab. in Surinamo. ¶ (Phrynio affinis.)

10. *MARANTA*. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-fida. Nect. 3-partitum, lacinia tertia superiori latere antherifera. Caps. 1 locul. 1-sperma.

1. *arundinacea*, culmo ramoso herbaceo, foliis ovato-lanceolatis subtus pilosiusculis. W. Sloan. jam. 22. h. 1. p. 253. 149. f. 2. Hab. in America calidior. ¶

2. *Tonchat*, culmo ramoso fruticoso, foliis ovatis glabris. W. Rumph. amb. 4. p. 2. t. 7. Hab. in sylvis Indiae, Cochinchinae. ¶

3. *malaccensis*, culmo simplici, foliis oblongis petiolatis subtus sericeo pubescentibus. W. Rumph. amb. 5 p. 177. t. 71. f. 1. Hab. in Malacca. ¶

4. *capitata*, caule simplici apice florifero, capitulo globoso depresso, Flor. peruv. 1. p. 3. t. 8. In Peruviae umbrosis humidis. Caps. 3-valv. 3-lombaris. Cor. lac. interne nectarium proprie repraesentant. l. c. ¶

5. *lateralis*, caule simplici ad medium florifero, capitulo globoso. Flor. peruv. 1. p. 4. Cum priore. An satis distincta?

6. *comosa*, acaulis, scapo nudo spicato comoso, comae foliolis reflexis. W. Hab. in Surinamo. ¶

11. *GLOBBA*. Cal. superus, 3-fidus. Cor. aequalis, 3-fida, Caps. 3-locularis. Sem. plurima. Siam. 2.

1. *Marantina*, spica terminali erecta Mant. p. 170. Willd. Spec. Pl. L. 1. p. 153. In India orientali. Spica terminali, fl. remotis. ¶

2. *nutans*, spica terminali pendula, fol. elliptico-lanceolatis Willd. l. c. Rumph. amb. 6. p. 140. t. 62-63. Cum priori.

A 2

3. *Japanica*, spica terminali cernua, fol. ensiformibus, Thunb. Flor. Jap. p. 23. In Japonia. \mathcal{T}

4. *uviformis*, spica laterali. Mart. p. 171. Rumph. amb. 6. p. 138. t. 69. f. 2 In India. \mathcal{T}

12. *CURCUMA*. *Cal.* bifidus. *Cor.* 4-partita. *Nect.* 3-lobum. *Anth.* basi bicalcarata.

1. *rotunda*, foliis lanceolato-ovatis: nervis lateralibus rarissimis. Willd. S. P. p. 14. Rheed. mal. 11. p. 19. t. 10. Hab. in India. \mathcal{T}

2. *longa*, foliis lanceolatis: nervis lateralibus numerosissimis. L. Mat. med. p. 35. Blackw. t. 396. Swartz. obs. p. 8. Amomum (*Curcuma*) scapo spathis laxis ex centro foliorum. Murr. S. V. p. 50. Jacq. hist. v. 3. t. 4. Rheed. mal. 2. p. 21. t. 10. In India. \mathcal{T}

13. *KAEMPFERIA*. *Cal.* obsoletus. *Cor.* 6-partita: laciniis tribus majoribus patulis, unica bipartita. *Stigma* bilamellatum.

1. *Galanga*, foliis ovatis sessilibus. Hort. cliff. 2. t. 3. Rumph. amb. 5. p. 173. t. 69. f. 2. Kacmpf. amoen. gor. t. 502. Lam. ill. p. 7. Hab. in India. \mathcal{T}

2. *rotunda*, foliis lanceolatis petiolatis. Blackw. t. 599. Rheed. mal. 11. p. 17. t. 9. Hab. in India. \mathcal{T}

14. *THALIA*. *Cor.* 5-petala: duo interiora minora. *Nectar.* lanceolatum concavum. *Drupa* nucem uniloculari. *Cal.* triphyllus.

1. *geniculata*, corollis pentapetalis: nectario lanceolato. Plum. gen. 26. ic. 103. f. 1. Mart. Bras. 53. Hab. in America meridionali. Caulis humanam staturam superans, levissimus, simplicissimus. Rachis geniculato-flexuosus. \mathcal{T}

2. *cannaeformis*, corollis hexapetalis: nectario bifido erecto. Hort. prod. n. 3. Hab. in Mallicollo inter novas Helrides.

15. *PHRYNIUM*. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3, aequalia, tubo nectarii adnata. *Nectarium* 1-phyllum, tubo filiformi, limbo 4-partito. *Caps.* 3-locul. *Nuces* 3.

1. *capitatum*. Willd. sp. 1. p. 17. Pontederia (ovata) foliis ovatis, floribus capitatis. Spec. pl. 412. Rheed. mal. 11.

p. 67. t. 34. Hab. in Malabaricae, Cochinchinae, Chinae locis umbrosis humidis. \mathcal{T}

16. *PHYIDRUM*. *Spatha* 1-flora. *Cal.* o. *Cor.* 4-petala irregularis. *Capsula* 3-locul. polysperma.

1. *lanuginosum*. Gaertn. sem. 1. p. 62. tab. 16. fig. 10. Lam. ill. gener. n. 32. t. 4. Hab. in locis humidis Cochinchinae et Chinae. Folia subulata crassa lanuginosa.

17. *CUCULLARIA*. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala inaequalis calcarata. *Filamentum* petaliforme. *Anthera* loculis discretis!

1. *excelsa*. Willd. sp. 1. p. 17. Vochisia. Lam. ill. p. 35. Aubl. gujan. 1. p. 18. ab. 6. In sylvis Gujanae. Arbor. \mathcal{T}

18. *QUALEA*. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* dipetala. *Bacca*?

1. *rosea*, petalo inferiore obtuso, foliis acuminatis. W. Aublet. guj. 1. p. 5. tab. 1.

2. *caerulea*, petalis emarginatis, foliis acutis. W. Aubl. guj. 1. p. 7. tab. 2. Hab. uti prior, in sylvis Gujanae. \mathcal{T}

19. *LOPEZIA*. *Cal.* 4-phyll. *Cor.* 5-petala inaequalis. *Capsula* 4-locul. 4-valvis polysperma.

1. *racemosa*, caule herbaceo ramoso, foliis alternis ovato-lanceolatis serratis, floribus racemosis. Cavan. icon. 1. n. 16. t. 18. L. *mexicana*. Jacq. ic. v. 2. Willd. p. 5. Habitus Circaeae. \odot

β *hirsuta*, tenerior hirsuta. Jacq. coll. austr. suppl. p. 5. t. 15. f. 4. Crescit cum priore, qua multo minor et fragilior, prope Mexico. An mera varietas?

20. *USTERIA*. *Cal.* 4-dentatus: lacinia unica reliquis multo majore. *Cor.* infundibuliformis 4-dentata. *Caps.* 1-locul. 2-sperma. *Semina* aristata.

1. *guinensis*. Willd. in Act. Societ. Berol. 10. p. 52. tab. 2. Monodynamia Iserti. Cmel. syst. veg. p. 10. Hab. in Guinea. \mathcal{T}

Obs. Non est Usteria Cavanillesii, quae ad classem Didynamiam pertinet; ac ab Jacquinio in ejus Horto Schoenbrunnensi *Naurandia* denominata est.

21. *POLLICHIA*. *Cal.* 1-phyllus 5-dentatus. *Cor.* o. *Sem.* 1. *Recept.*

squamae baccatae, fructus includentes.

1. *campestris*. Aiton. Kewens. 1. p. 5. Hab. ad Cap. b. sp. Folia verticillata, lineari-lanceolata. Flores congesti in capitulum, axillas trium vel quatuor foliorum occupans. Ait.

22. **SALICORNIA**. *Calyx* ventricosus, integer. *Petala* 6. *Sem.* 1.

1. *herbacea*, herbacea patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis, spicis axillaribus oppositis pedunculatis, squamis obtusis. W. Sp. P. 1. p. 23. Oed. Flor. dan. t. 303. Blackw. t. 598. Hab. in Europae littoribus maritimis, in Virginia. Diantra. ☉

2. *indica*, articulis clavatis, truncatis bifidentatis, spicis cylindricis terminalibus solitariis obtusis Willd. in Nov. act. soc. Berol. 2. t. 4. f. 2. Ad littera maris prope *Tranquebar*. Antecedenti affinis, a qua squamis truncatis, colore glauco vidente differt.

3. *perennans*, herbacea patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis, spicis axillaribus ternis pedunculatis, squamis acutis, radice perenni. W. Salicor. herbacea Pall. it. 1. app. n. 89. t. D. fig. 1. Hab. in Sibiria ad Jaikum in paludibus siccioribus. ☿

4. *fruticosa*, caule erecto fruticoso, articulis ramulorum ancipitibus, squamis floralibus truncatis membranaceis. Willd. Gmel. sib. 3. p. 8. t. 1. f. 1? In Europae maritimis. ☿

5. *strobilacea*, caule prostrato fruticoso, articulis truncatis alternatim spiciferis, spicis nudis brevissimis oppositis. W. Pall. it. 1. app. n. 91. t. E. Buxb. cent. 1. p. 6. t. 10. f. 2. Hab. in praeruptis salsis Maris caspici. ☿

6. *virginica*, herbacea erecta, ramis simplicissimis. Lin. Hab. in Virginia.

7. *arabica*, foliis alternis vaginantibus obtusis dehiscentibus. Lin. Pall. it. 1. app. n. 92. t. D. f. 3. Moris. hist. 2. p. 610. f. 5 t. 33. f. 7. Hab. in Arabia. ☿

8. *foliata*, foliis linearibus alternis amplexicauli-decurrentibus. Lin. suppl. 81. Pall. it. 1. app. n. 93. t. F. In Sibiria. Frutex lignosus. ☿

9. *amplexicaulis*, foliis cordatis amplexicanthibus. Vahl. Symbol. 2. p. 1. Hab. ad littora lacus prope Bardo Tuneti. ☿

10. *caspica*, articulis cylindricis, spicis filiformibus. Lepech. it. 1. p. 254. Pall. it. 1.

app. n. 90. t. D. fig. 2. Hab. in squalidis maris Caspici et Mediac. ☿

23. **HIPPURIS**. *Calyx* (o. l.) obsoletus. *Petala* nulla. *Stigma* simplex. *Sem.* 1. inferum.

1. *vulgaris*; foliis octonis subulatis. Vaill. act. par. 1719. t. 1. f. 3. Hab. in Europae fontibus, fossis aquosis, lacubus. ☿

2. *maritima*, foliis stellatis subtenis: submersis spathulatis; emersis ovatis obtusis. Hellen. Diss. in Usteri Delect. opusc. 1. p. 11. tab. 1. Retz. obs. fasc. 3. p. 7. tab. 1. Hab. ad littora maris in Suecia, Finlandia circa Aboam. Fol. superiora 5-8. Hipp. *tetraphylla*. L. Suppl. ☿

24. **LACISTEMA**. Ament. *Anth.* remote 2-locularis. *Stigm.* 3 setacea. *Caps.* 1-locular. *Sem.* evalvis stipendula.

1. *myricoides*. Swartz prod. p. 12. Ejusd. Icon. fasc. 1. t. 1. Naematospermum laevigatum. Richard in Act. Soc. hist. natur. p. 105. Piper aggregatum Berg. Act. belv. 7. p. 131. tab. 10. Hab. in fruticetis montium Jamaicae, inque Surinamo.

D I G Y N I A.

25. **CORISPERMUM**. *Cal.* o. *Petala* 2. *Sem.* 1, ovale, nudum.

1. *hyssopifolium*, spicis terminalibus, foliis linearibus enerviis mucosis. Pall. ross. 2. p. 112. tab. 98. Buxb. cent. 3. p. 30. t. 55. Hab. in Europae locis arenosis. ☉

2. *squarrosum*, spicis axillaribus squarrosis, foliis lanceolato-acuminatis pungentibus nervosis. Pall. ross. 2. p. 113. t. 99. Buxb. cent. 3. p. 30. t. 56. Hab. ad Wolgam Tartariae, inque desertis Cosacorum. ☉

3. *orientale*, fol. linearibus angustis, summitatibus floriferis subpaniculatis pubescentibus. Lam. ill. n. 44. Hab. in Oriente.

26. **CALLITRICHE**. *Cal.* inferus, diphyllus. *Caps.* membranacea marginata. (*Flor.* nonnulli monicoica.)

1. *verna*, foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. Oed. dan. t. 129. Hab. in Europae fossis aquosis. Vere florens.

2. *aestivalis*, fol. petiolatis subrotundis fructu tetragono. Thuill. Fl. par. p. 2. Vaill. botan. p. 190. t. 32. f. 10. In aquis frigidis. Floret Julio, Augusto.

3. *intermedia*, foliis superioribus ovalibus, caulinis linearibus apice bifidis. Schkuhr bot. Handb. t. 1. f. c. Hoffm. germ. 2. Cum priore.

4. *autumnalis*, foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis. Loescl. pruss. 140. t. 38. In fossis aquosis autumnno.

5. *tennifolia*, fol. omnibus linearibus apice integris acutis, fructu 4-gono. Autumnno prope Fontainebleau observata a Thuill., secundum quem fructus *C. vernalis* et *autumnalis* compressi sunt.

27. BLITUM. *Cal.* 3-fidus. *Pet.* 0. *Sem.* 1, calyce baccato.

1. *capitatum*, capitellis spicatis terminalibus. Knorr. del. hort. 1. t. E. 3. B. fol. triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis nudis. Hort. cliff. 1. Hab. in Europa. (Tyrolia, Helvetia.) ☉

2. *virgatum*, capitellis sparsis lateralibus. B. fol. triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis foliosis. Hort. cliff. 405. Moris. hist. 3. p. 606. s. 5. t. 32. f. 2. Hab. in Tartaria, Hispania, Gallia Narbonensi. ☉

28. MNJARUM. *Involucr.* 4-phyl-lum. *Cal.* 4-partitus, superus. *Cor.* 0. *Sem.* 1.

1. *biflorum*, Lin. Suppl. p. 81. Forst. Com. Götting. 9. p. 19. t. 1. Ditoca Gaertn. Hab. in Nov. Zeeland. et in Terra del Fuego. Minuartiae simile. ☿

29. CINNA. *Cal.* Gluma 2-valvis, uniflora. *Cor.* Gluma 2-valvis. *Sem.* 1.

1. *arundinacea*, glabra, panicula magna, multiflora capillari, valvula altera florali infra apicem subaristata. Michaux Flor. Carol. p. 38. Hab. in sinu Hudsonis ad Canadam. Ab Agrost. Mexicana omnino distincta!

30. JARAVA. *Cal.* Gluma 2-valvis, 1-flora. *Cor.* Gluma 1-valvis, papposa aristata.

1. *usitata*. J. Ichu, foliis convolutis subulatis, spica paniculata. Fl. peruv. 1. p. 5. t. 6. f. b. Hab. in alpihus regni peruviani. Varius et frequens hujus graminis usus est, qui l. c. perlegi potest. An *Alopecuri* species?

Ob minorem staminum numerum hanc ad classem adhuc pertinerent nonnullae ex aliis generibus species.

M O N O G Y N I A.

Mangifera indica. *Tradescantia monandra*. *Valeriana rubra*, *angustifolia*, *Cal-citrappa*. *Aphanes arvensis*. *Polycnemum monandrum*, *Boerhaavia diffusa*. -- *Scirpi* et *Cyper*i nonnullae species.

D I G Y N I A.

Leersia monandra. *Rotboella 1-andra* Cav. *Uniola latifolia* et *gracilis* Michx.

C L A S S I S I I.

D I A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

31. SCHREBERA. *Cal.* 2-labiatus. *Cor.* 5-7-fida. *Caps.* pyriformis, 2-locularis; 2-valvis. *Sem.* 8-10, alata.

1. *Swietenicoides*, Roxb. Plants of the coast of Coromand. t. 101. Arbor excelsa. *Sorbera Schionoides* L. *Cuscutae* species est in *Myrica athiopica* parasitica.

32. NYCTANTHES. *Cor.* hypocrateriformis: *Laciniae* emarginatae. *Caps.* bilocularis, marginata, bipartibilis.

1. *Arbor tristis*, caule tetragono, fol. ovatis acuminatis, pericarpis membranaceis compressis. Lam. illustr. p. 20. t. 6. Scabritia scabra. Syst. nat. ed. 12. p. 115. Rheed. mal. 1. p. 35. t. 21. Hab. in India. \mathcal{T} .

33. JASMINVM. *Cor.* hypocrateriformis, 5-8-fida. *Bacca* dicocca. *Semina* solitaria arillata.

* *Folii simplicibus*. (Mogorium Juss. ob octonarium laciniarum numerum.)

1. *Sambac*, foliis oppositis simplicibus ellipticis ovatis subcordatisque membranaceis opacis, ramulis petiolisque pubescentibus, lacinii calycinis subulatis. Aiton. Kew. 1. p. 8. Willd. Sp. pl. 1. p. 35. Lam. ill. t. 6. f. 1. Rumph. amb. 5. p. 52. t. 30. Hab. in India. Odor gratus. \mathcal{H}

2. *undulatum*, foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus. Nyctanthes undulata. Sp. plant. p. 8. Rheed. 6. p. 97. 55. Hab. in Malabar. \mathcal{T}

3. *hirsutum*, petiolis pedunculisque villosis. Willd. l. c. 1. p. 36. N. hirsuta. Sp. plant. 2. p. 8. Hab. in India. \mathcal{T}

4. *triflorum*, fol. (parvis) ovatis: inferioribus obtusis; superioribus acutis, cymis trifloris. Lam. illustr. p. 23. t. 6. f. 2. sub Mogorio. Nyct. angustifolia. L. Rheed. 6. t. 53. In Malabar. \mathcal{H}

5. *acuminatum*, fol. ovatis acuminatis trinariis, petiolis cirrhosis, dentibus calycinis setaceis. Lam. l. c. sub Mogorio. In insula Java. \mathcal{H}

6. *trifoliatum*, fol. ternatis: foliolis ovatis, minoribus, calyce brevissimo. Lam. l. c. p. 27. cresc. In insula Mauritiana. \mathcal{T}

7. *pubescens*, foliis oppositis ovatis cordatis utrinque pubescentibus. Willd. l. c. p. 37. Retz. Obs. bot. 5. p. 9. Hab. in Calcutta. \mathcal{H}

8. *scandens*, foliis oppositis simplicibus ovato-oblongis attenuatis, paniculis brachiatis, lacinii calycinis setaceis reflexis. Vahl. symbol. 3. p. 2. Hab. in Bengalia. \mathcal{T}

9. *elongatum*, foliis cordatis lanceolatis acutis elongatis minoribusque, ramis teretibus. Willd. Nyct. elongata. Lin. suppl. 28. Berg. Act. angl. 1772. p. 290. t. 11. Hab. in India orientali. \mathcal{H}

10. *glaucum*, foliis oppositis simplicibus lanceolatis nitidis, lacinii calycinis subulatis. Aiton. Kew. 1. p. 9. Jasm. ligustrifolium, foliis oppositis simplicibus lanceolatis crassiusculis. Lam. rec. encyclop. 3. p. 209. Nyctanthes glauca. Lin. suppl. 82. Hab. ad Cap. b. spei. \mathcal{H}

11. *trinerve*, foliis oppositis simplicibus ovatis attenuatis trinerviis, pedunculis axillaribus subunifloris. Vahl. symbol. 3. p. 2. Hab. in Java. \mathcal{H}

12. *lanceolatum*, fol. oppositis lanceolatis, pedunculis axillaribus terminalibusque unifloris. Fl. peruv. 1. p. b. Hab. in Peru, locis umbrosis. Cor. alba subpurpurea.

13. *australe*, fol. oppositis ovato-lanceolatis simplicibus. Forst. prod. n. 7. (simplicifolium.) Hab. in insulis Amicorum. h

*** *Foliis ternatis.*

14. *angulare*, foliis oppositis ternatis: foliolis ovatis obtusis, ramulis angulatis petiolisque villosis, pedunculis axillaribus trifloris. Vahl. symbol. 3. p. 1. Hab. ad Cap. b. speci. h

15. *auriculatum*, foliis oppositis ternatis, ramulorum floriferorum simplicibus, calycibus angulatis ramisque teretibus pubescentibus. Vahl. symbol. 3. p. 1. Hab. in hortis idolatrorum Malabaricae. h

16. *flexile*, glabrum, foliis oppositis ternatis, racemis axillaribus brachiatis, caule scandente, ramis teretibus. Vahl. symbol. 5. p. 1. Hab. in India orientali. h

17. *didymum*, glabrum, foliis oppositis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis, racemis axillaribus. Vahl. symbol. 3. p. 2. Hab. in Societatis insulis. h

18. *azoricum*, foliis oppositis ternatis: foliolis ovatis subcordatisque undulatis, ramis glabris teretibus, corollae laciniis tubo aequalibus. Aiton Kew. 1. p. 9. Pluk. almag. 185. t. 303. f. 1. Hab. in insulis azoricis. Flor. albi, odorati. Fol. magna. h

19. *fruticans*, foliis alternis ternatis simplicibusque: foliolis obovatis cuneiformibusque obtusis, ramis angulatis, laciniis calycinis subulatis. Aiton. Kewens. 1. p. 9. Jasm. luteum, vulgo dictum bacciferum. Bauh. pin. 238. Lam. illustr. n. 63. t. 7. f. 2. In Europa australi et toto Oriente. h

20. *humile*, foliis alternis acutis ternatis pinnatisque, ramis angulatis, laciniis calycinis brevissimis. Aiton. Kew. 1. p. 9. Knorr. del. hort. 1. tab. 1. Besl. cyst. aestiv. 1. 40. f. 2. Fl. lutei. h

21. *odoratissimum*, foliis alternis obtusiusculis ternatis pinnatisque, ramis teretibus, laciniis calycinis brevissimis. Ait. Kew. 1. p. 10. Hab. in Madera. Flor. flavi. h

*** *Foliis pinnatis.*

22. *officinale*, foliis oppositis pinnatis: foliolis acuminatis, gemmulis erectiusculis. Aiton. Kew. 1. p. 10. J. foliis oppositis: foliolis distinctis. Syst. Veg. p. 54. Blackw. t. 13. Hab. in India, inque Helvetia. Flor. albi, odorati. h

23. *grandiflorum*, foliis oppositis pinnatis: foliolis obtusiusculis, gemmis horizontalibus. Ait. Kew. 1. p. 10. J. fol. oppositis pinnatis: foliolis extimis confluentibus. Sp. pl. 2. p. 9. Mill. dict. n. 4 Merian.

surin. t. 46. Rheed. mal. 6. p. 91. t. 52. Hab. in India. Cor. alba, subtus rubra. h

34. *GALIPEA*. Cal. 4-5-gonum, 4-5-dentatus. Cor. hypocraterif. profunde 4-5-partita. Stam. 4: duo sterilia.

1. *trifoliata*. Aubl. gujan. n. 2. p. 662. t. 265. Hab. ad fluviorum ripas Gujanac. h

35. *LIGUSTRUM*. Cor. 4-fida. Bacca 4-sperma.

1. *vulgare*, foliis lanceolatis acutiusculis, panicula coarctata. Willd. arb. berol. p. 169. Hab. in collibus glareosis, ad sepes. h

2. *japonicum*, fol. ovatis acuminatis, panicula divaricata. Willd. S. P. 1. p. 42. L. fol. ovatis acuminatis, panicula decomposita trichotoma. Thunb. jap. p. 17. t. 1. Hab. in Japonia. h

36. *PHILLYREA*. Cor. 4-fida: tubo brevissimo. Bacca 2-locularis: loculis 1-sperma: uno saepe abortivo.

1. *media*, foliis oblongo-lanceolatis integris serratisque. Ait. Kew. 1. p. 11. Willd. Sp. pl. 1. p. 42. Gaertn. de Fr. et Sem. 2. p. 71. t. 92. f. 5. Camer. epit. 50. 1c. Hab. in Europae australioris collibus. h

2. *angustifolia*, foliis lineari-lanceolatis integerrimis. Hort. cliff. 4. Lam. illustr. t. 8. f. 3. Cam. l. c. Hab. in Italia, Hispania et in Atlante. h

3. *latifolia*, foliis ovato-cordatis serratis. Hort. cliff. 4. Lam. illustr. t. 8. f. 2. Clas. hist. 51. 1c. Hab. in Europa australi. Sempervirens. h

37. *OLEA*. Cor. 4-fida: laciniis subovatis. Drupa. 2-sperma: uno abortante.

1. *europaea*, foliis lanceolatis integerrimis, racemis axillaribus coarctatis. Ait. Ait. Kew. 1. p. 12. Lam. l. c. t. 8. f. 1. Gaertn. 2. p. 75. t. 93. f. 4. Willd. l. 1. p. 44-46. Hab. in Europa australi, inque Africa boreali. h

2. *verrucosa*, fol. lanceolatis planis subtus albidis, ramis verrucosis. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 44. O. europaea. Thunb. prodr. 2. Ad Cap. bon. speci. h

3. *capensis*, foliis ovatis integerrimis, racemis paniculaeformibus divaricatis. Aiton. Kew. 1. p. 13. Burm. afr. 233. t. 87. f. 1. Hab. ad Cap. b. Speci. h

5. *americana*, foliis lanceolato-ellipticis integerrimis, racemis angustatis, bracteis omnibus persistentibus connatis parvis. Ait. Kew. 1. p. 14. Ligustrum lauri folio, fructu violaceo, baccis purpureis. Catesb. 1. p. 61. t. 61. Seeligm. Voegel. 3. t. 33. Hab. in Carolina. h

4. *cernua*, foliis oblongis lanceolatis obtusissimis, racemis axillaribus simplicibus, floribus cernuis. Vahl. symbol. 3. p. 3. Hab. in Madagascar. h

5. *apetala*, foliis ellipticis, floribus racemosis apetalis. Vahl. symbol. 3. p. 3. Hab. in Nova Zeelandia. h

6. *excelsa*, foliis ellipticis acutis, bracteis perfoliatis: infimis cyathiformibus, superioribus foliaceis magnis deciduis. Vahl. symbol. 3. p. 3. Hab. in Madera. h

7. *fragens*, foliis lanceolatis serratis, pedunculis lateralibus aggregatis unifloris. Thunb. jap. 18. t. 2. Hab. in Cochinchina, China, Japonia. Flores ob odorem gratum ad potum Theae adhibentur ab incolis. h

8. *emarginata*, fol. obovatis retusis emarginatis, panicula pauciflora terminali. Lam. illustr. p. 29. t. 8. f. 2. Hab. in insula Madagascariae. Arbor 40-pedalis.

9. *chrysophylla*, fol. angusto-lanceolatis utrinque acutis subtus aureo-nitidis, paniculis lateralibus. Lam. ill. p. 27. In insula Maritima. h

10. *lancea*, fol. lineari-lanceolatis utrinque acutis, panicula terminali, drupis oblongis acutis. Lam. l. c. In insula Franciae. h

38. ORNUS. *Cal.* 4-partitus. *Corol.* 4-partita: petalis longis ligulatis. *Filam.* longa. *Nux.* alata.

1. *europaea*. Fraxinus Ornus L. Mill. illustr. ic. arbor. Hab. in Italia et Hispania. (Cavan.) Floribus, sequenti generi fere similibus, plane differt a *Fraxinis*.

29. CHIONANTHUS. *Cor.* 4-fida: laciniis longissimis. *Drupae* Nucleus striato-fibrillosus.

1. *virginica*, panicula terminali trifida, pedunculis trifloris, foliis acutis. Willd. Sp. pl. 1. p. 46. Lam. illustr. p. 30. t. 9. Hab. in America septentrionali. Variat corolla 4. 5. 6-fida et staminibus quatuor. h

2. *cotinifolia*, panicula terminali trichotoma, pedunculis trifloris, foliis obtusis. Willd. l. c. p. 47. Arbustula zeylanica, totius foliis subtus lanugine villosis, floribus

albis cuculli modo lacinatis. Pluk. alm. 44. t. 241. f. 4. Hab. in Zeylona. h

3. *compacta*, paniculis trichotomis, ultimis floribus subcapitatis, calycibus villosis, foliis lanceolato-oblongis, antheris acuminatis. Swartz prod. 13. Vahl. symbol. 2. p. 1. Jacq. Collect. 2. p. 110. t. 6. f. 1. *Ceranthus* Schreb. gen. Hab. in insulis Caribaeis. h

4. *zeylanica*, ramis paniculae axillaris oppositis, floribus subsessilibus. Thoninia nutans. Lin. suppl. 82. Hab. in Zeylona. h

5. *guianensis*, flor. corymbosis axillaribus, fol. alternis oppositisque ovato-oblongis. Mayepa guianensis. Aubl. guaj. p. 8. t. 31. Flor. 4-andr. Schwarz. l. c. a. Hab. in Gujana. Cort. albicans. a. h

6. *incrassata*, paniculis decussatis fastigiatisque, cor. laciniis incrassatis, fol. oblongis. Swartz prod. p. 13. In Jamaica. Flor. 2-andri S. in Schrad. Journ. 2. p. 21.

7. *ligustrina*, fol. lanceolatis, paniculis terminalibus, floribus erectis subtrapezatis. Richard. Thoninia Swartz prod. p. 15. Linociera Schreb. gen. pl. L. n. 1709. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 154. Hab. in Jamaica. h

40. SYRINGA. *Cor.* 4-fida. *Capsula* bilocularis.

1. *vulgaris*, fol. cordatis. L. Willd. p. 48. Lilac vulgaris. Lam. ill. p. 26. t. 1. Du Hamel. arb. 2. t. 138. Ad sepes et in sylvaticis. h

2. *dubia*, fol. ovato-attenuatis. S. chinensis Willd. Sp. pl. L. 1. p. 45. Etiam in Gallia, ex gr. prope Rouen et circa Parisios sponte quasi crescit. An e China ad Europam prius apportata? h

3. *persica*, foliis lanceolatis integris pinnatifidisque. Lin. Hort. cliff. 6. Mill. dict. t. 164. f. 2. Hab. in Persia. Nunc frequens in hortis colitur. h

4. *suspensa*, foliis ovatis serratis ternatisque. Thunb. jap. 19. t. 3. Hab. in Japonia. Calyx profundius divisus et corolla campanulata. Thunb. h

41. BIALIUM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* nullus. *Stamina* ad latus superius receptaculi.

1. *indum*, panicula simplici nutante. Hab. in India. h

2. *guinense*, panicula supradecomposita erecta. Willd. apud Roemer Archiv. 1. p. 31. t. 6. Hab. in Guinea. h

42. **PIMELEA.** *Cal.* nullus. *Cor.* 4-fida. *Stam.* fauci inserta. *Nux* corticata unilocularis.

1. *linifolia*, foliis lineari-lanceolatis latis, capitulis terminalibus involucreatis, corolla extus villosa. Smith. Nov. Holl. 1. p. 31. tab. 11. Hab. in Nova Hollandia. \mathcal{H}

2. *Gnidia*, foliis oblongo-lanceolatis acutis glaberrimis, corolla extus villosa Willd. l. c. p. 58. Passerina Gnidia. Lin. suppl. 226. Hab. in Nova Zeelandia. \mathcal{H}

3. *pilosa*, pilosa, foliis linearibus obtusis. W. Passerina pilosa. Lin. suppl. 226. Hab. in Nova Zeelandia. \mathcal{H}

4. *prostrata*, pilosa, fol. ovatis sessilibus carnosius. Willd. p. 51. Lam. ill. p. 31. t. c. f. 1. Passerina prostrata. Lin. suppl. 227. Hab. in Novae Zeelandia montibus aridis. \mathcal{H}

43. **ERANTHEMUM.** *Cor.* 5-fida: tubo filiformi. *Antherae* extra tubum. *Stigma* simplex.

1. *capense*, foliis lanceolato-ovatis petiolatis. Willd. Sp. pl. l. 1. p. 51-52. Herm. parad. 153. Hab. in Aethiopia. Habitat Chironiae.

2. *angustifolium*, foliis linearibus remotis patulis. Syst. Veg. p. 55. Lam. ill. 1. p. 60. t. 17. f. 1. Selago dubia. Spec. plant. 2. p. 877. Burm. afr. 130. t. 47. f. 3. Plukn. 180. t. 445. f. 6. Hab. in Aethiopia. \mathcal{H}

3. *parvifolium*, foliis ovato-linearibus imbricatis. Mant. p. 171. Berg. cap. 2. Lam. l. c. f. 2. Comm. amst. 2. 119. t. 60. Hab. ad Cap. b. spei. \mathcal{H}

4. *salsoloides*, fruticosum, foliis carnosius teretiusculis linearibus glaberrimis, racemis axillaribus calycibusque pubescentibus, tubo recurvo. Lin. suppl. 82. Hab. in Teneriffa prope St. Crux. \mathcal{H}

44. **FONTANESIA.** *Cor.* dipetala. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Caps.* membranacea non dehiscens, 2-locularis: loculis monospermis.

1. *phillyreoides*. Billard. Icon. pl. Syr. Dec. 1. p. 9. t. 1. DuRoi arb. ed. nova. t. 5. Hab. in Syria inter Laodiceam ad mare et montem Caspium. \mathcal{H}

45. **CIRCAEA.** *Cor.* dipetala. *Cal.* 2-phyllus, superus. *Caps.* hispida bilocularis non dehiscens; loculis monospermis.

1. *lutetiana*, caule erecto, racemis plu-

ribus, foliis ovatis. Oed. dan. 256. Lam. ill. 16. f. 1. Fol. pubescentia, etiam glabra. Kniph. orig. cent. 10. t. 22. Hab. in Europae et Americae borealis nemoribus. \mathcal{H}

* *intermedia*, major, fol. cordatis, repando-denticulatis acuminatis cauleque simplici glabro, capsulis ovato-globosis. Schumacher Flor. Saelland. 1. p. 5. Circaea lutetiana Curt. Flor. Londini. In umbrosis humidis et in palustribus.

2. *alpina*, caule ramosissimo depresso, foliis cordatis dentatis nitidis glabris. Roth. germ. l. p. 13. Hab. ad montium radices in Europa. \mathcal{H}

46. **VERONICA.** *Cor.* limbo 4-partito: lacinia infima angustiore. *Caps.* bilocularis.

* *Spicatae.*

1. *sibirica*, spicis terminalibus, foliis septenis verticillatis, caule subbirtio. Gmel. sib. 3. p. 217. Amm. Fl. ruthen. t. 4. Willd. Sp. 1. p. 54. Hab. in Dauria. Stamina et pistillum corolla duplo longiora. \mathcal{H}

2. *virginica*, spicis terminalibus, foliis quaternis quinisque. Pluk. alm. 393. t. 70. f. 2. Hab. in Virginia et Japonia. Flor. albi.

3. *spuria*, spicis terminalibus, foliis lanceolatis aequaliter serratis. Roth. germ. l. p. 2. ll. p. 5. Gmel. it. 1. p. 169. t. 39. Barr. ic. 801. Hab. in Europa australiore, Sibiria, Thuringia. \mathcal{H}

4. *maritima*, spicis terminalibus, foliis subcordato-lanceolatis, inaequaliter serratis. Roth. germ. l. p. 5. Oed. dan. 374. Knorr. del. hort. 2. tab. V. 2. Hab. in maritimis Europae maris apicis. Fol. ovata. Var. ut antecedens et sequens species, fol. oppositis ternis quaternisve, flore coeruleo, coerulescente, incarnato, alboque. Willd. \mathcal{H}

5. *longifolia*, spicis terminalibus, foliis lanceolatis acuminatis serratis in petiolum desinentibus. Roth. germ. l. p. 5. Sabbat. hort. rom. 2. t. 48. Hab. in Tartaria, Austria, Suecia. \mathcal{H}

6. *incana*, spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis obtusis cauleque erecto tomentoso. V. spicata lanuginosa et incana, floribus coeruleis. Amm. ruth. 30. Hab. in Ucraina, Samara. Cinerascens. \mathcal{H}

7. *spicata*, spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis apice integerrimis caule ascendente simplicissimo. Oed. dan. t. 52. Hab. in sylvaticis. Variat spicis pluribus. \mathcal{H}

8. *hybrida*, spicis terminalibus, foliis

ellipticis obtusis inaequaliter crenato-ser-ratis, caule erectiusculo. Smith. Flor. brit. 1. p. 16. Willd. apud Schrad. Journ. de Bot. 1799. p. 288. t. 3. Antecedente major, spicis plurimis. In montosis Euro-pae. $\overline{\text{T}}$

9. *pinnata*, spica terminali, foliis linearibus pinnatifidis subfasciculatis: laciniis filiformibus divaricatis. Aiton Kew. 1. p. 19. Laxmann in Act. Petrop. 1770. p. 553. t. 29. f. 1. Hab. in Siberia. $\overline{\text{T}}$

10. *laciniata*, racemo subspicato terminali, foliis pinnatifidis laciniatis. Ait. Kew. 1. p. 19. Jughans. icon. rar. cent. 1. 85. 2. Hab. in Siberia. $\overline{\text{T}}$

11. *incisa*, spicis terminalibus, foliis lanceolatis inciso-pinnatifidis glabris. Ait. Kew. 1. p. 19. Hab. in Siberia. Differt a praecedenti spicis nunquam solitariis semper aggregatis. $\overline{\text{T}}$

12. *Catarractae*, racemis terminalibus flexuosis, caule suffruticoso, foliis lanceo-latis serratis. Forst. prodr. n. 7. Hab. in Nova Zeelandia. $\overline{\text{T}}$

13. *elliptica*, racemis lateralibus, caule fruticoso, foliis ellipticis integerrimis. Forst. prod. n. 10. Hab. in Nova Zeelandia. $\overline{\text{T}}$

14. *macrocarpa*, racemis subterminalibus erectis, foliis lanceolatis integerrimis glabris planis, caule fruticoso. Vahl symb. 3. p. 4. Hab. in Nova Zeelandia. $\overline{\text{T}}$

15. *salicifolia*, racemis lateralibus num-erantibus, foliis lanceolatis integerrimis, caule fruticoso. Vahl. symbol. 3. p. 4. Hab. in Nova Zeelandia. $\overline{\text{T}}$

16. *parviflora*, racemis subterminalibus, foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris mucronatis, caule fruticoso. Vahl. symbol. 3. p. 4. Hab. in Nova Zeelandia. $\overline{\text{T}}$

17. *officinalis*, spicis lateralibus pedun-culatis, foliis oppositis obovato-subrotundis pilosis annuis, caule procumbente hirsuto. Willd. p. 59. Flor. succ. 2. n. 12. Oed. dan. t. 248. Hab. in Europae sylvestribus sterilibus. $\overline{\text{T}}$

18. *Allionii*, spicis lateralibus pedun-culatis, foliis oppositis subrotundis niidis rigidis, caule glabro repente. Smith Act. Soc. Lin. Lond. 1. p. 190. Allion. pedem 1. n. 265. t. 46. f. 3. Pluk. phyt. 233. f. 1. Hab. in alpihus Galliae australioris Italiae, Helvetiae. $\overline{\text{T}}$

19. *Michauxii*, pilosa, racemis laterali-bus. flor. subglomeratis, fol. ovatis den-tatis sessilibus. Lam. ill. p. 44. In Oriente. Pili albi glutinosi.

20. *decussata*, racemis axillaribus pau-cifloris, foliis ellipticis perennantibus in-tegerrimis, caule fruticoso. Willd. arb. berol. p. 400. Moench. Weissenst. p. 137. Hebe magellanica. Jussieu. gen. Hab. in in-sulis Falklandiae inque freto Magellanico. $\overline{\text{T}}$

* * *Corymboso-racemosae.*

21. *aphylla*, corymbo terminali, scapo nudo, caps. obcordatis. Bocc. musc. 2. p. 17. t. 1. et 9. Plukn. alm. 384. t. 114. f. 3. Segui. Ver. 241. t. 3. f. 2. Hab. in Alpibus Europae australioris inque Asia boreali. Singularis pilis articulis ut Conservae. V. Kamtschatica. L. suppl. hujus tantum varietas. Willd. p. 60. V. subacaulis. Lam. ill. p. 49. n. 171. $\overline{\text{T}}$

22. *nudicaulis*, corymbo terminali, scapo nudo, caps. ovatis integris. Lam. ill. p. 46. Hab. in Europae alpibus.

23. *bellidioides*, corymbo terminali, caule ascendente diphylo, foliis obtusis crenatis, calycibus hirsutis. V. caule sim-plici, foliis scabris serratis ovatis, spica pauciflora. Hall. helu. n. 543. t. 15. f. 1. Hab. in Pyrenaeis, alpibus Helvetiae im-primis Aquilegensibus. $\overline{\text{T}}$

24. *gentianoides*, corymbo terminali, caule adscendente, foliis lanceolatis mar-gine cartilagineis: inferioribus connatis vaginantibus. Vahl. symbol. 1. p. 1. Buxb. Cent. 1. p. 23. t. 35. Hab. in Cappadocia, Armenia. $\overline{\text{T}}$

25. *Ponae*, racemo terminali, caule simplicissimo, foliis cordato-ovatis dentatis sessilibus. Willd. p. 51. V. *Ponae*, spica ter-minali, foliis cordato-ovatis sessilibus sum-mis alternis. Gouan. illust. p. 1. t. 1. f. 1. Pluk. phytog. t. 233. f. 3. Hab. in montosis Pyrenaeorum inque monte Baldo. $\overline{\text{T}}$

26. *fruticulosa*, corymbo terminali, foliis lanceolatis obtusiusculis subdentica-latis, calycinis foliolis acutis, caulibus fruticulosus. W. Hall. helu. n. 545. t. 16. Jacq. collect. 4. p. 229. tab. 5. Hab. in alpi-bus. Facies Ver. serpillifoliae. $\overline{\text{T}}$

27. *saxatilis*, corymbo terminali, fol. ellipticis obtusis integerrimis ciliatis, caly-cinis foliolis obtusis, caulibus fruticosis. Willd. V. saxatilis, corymbo terminali, fol. oppositis glabrisculis, pedunculis folia floralia superantibus. Lin. suppl. 83. Oed. dan. t. 342. Hab. in alpibus. Caules ramosi diffusi. Fl. magni, fauce rubra. $\overline{\text{T}}$

28. *alpina*, corymbo terminali, foliis oppositis oblongo-lanceolatis acutis dentatis, calycibus hispidis. Oed. dan. t. 16. Fl. lapp. 7. t. 9. f. 4. Hab. in alpibus Europae. $\overline{\text{T}}$

29. *integrifolia*, corymbo terminali, foliis oppositis ellipticis obtusis integerrimis, calycibus pilosis. Willd. p. 61. V. alpina. Krockers ailes. n. 28 tab. 3. Hab. in alpihus Salisburgensibus inque Sudetis. \mathcal{T}

30. *tenella*, foliis oblongis crenatis, caulibus repentibus, calycibusque villosis. Vahl. symbol. 3. p. 5. Allion. pedem. n. 272. t. 22. f. 1. Pluk. alm. 384. t. 233. f. 4. Hab. in Pyrenacis et alpihus Pedemontanis. \mathcal{T}

31. *Beccabunga*, racemis lateralibus, obliis ovatis planis, caule repente. Oed. dan. 511. Curt. Fl. Lond. Hab. ad scaturigines vix congelandas. \mathcal{T}

32. *Anagallis*, racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. Fl. Dan. 503. Hab. in Europa ad fossas et in Oriente. \mathcal{T}

33. *scutellata*, racemis lateralibus alternis: pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. Oed. dan. 509. Hab. in Europae inundatis. Racemi capillares, laxi, divaricati. \mathcal{T}

34. *Tenerium*, racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis dentatis obtusiusculis, caulibus ascendentibus. Rivin. t. 95. Hab. in Germ. Helvetia. (Specimen hujus et sequentis Veroniæ ac in herbario Linnæano non invenit Smith.) \mathcal{T}

35. *pilosa*, racemis axillaribus, foliis ovatis obtusis plicatis protunde dentatis, caule prostrato bifariam piloso. V. racemis subspicatis, foliis ovatis obtusis, plicatis, caule prostrato piloso. Sp. plant. 2. app. 1663? Hab. in Austria. Calyces sessiles, laciniis 2 exterioribus majoribus. Corollae albidæ-coerulescentes. W. \mathcal{T}

36. *prostrata*, racemis lateralibus, foliis lineari-lanceolatis serratis, caulibus prostratis. Pölich. pal. n. 15. Riv. t. 95. Hab. in collibus. \mathcal{T}

37. *pectinata*, racemis lateralibus, foliis oblongis pectinato-serratis, caulibus prostratis. Mant. p. 24. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 39. Hab. Constantinopoli. Tomentosa. \mathcal{T}

38. *montana*, racemis lateralibus elongatis filiformibus, foliis ovatis petiolatis obtusis grosse serratis, caule petiolisque hirtis. Lin. suppl. 81. Jacq. austr. t. 109. Flor. dan. t. 1201. In umbrosis humidis. Caulis repens. Calyces 4-fidi. Fructus orbiculati.

39. *Chamaedrys*, racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus rugosis dentatis, caule bifariam piloso. Oed. dan. 448. Hab. in Europae pratis, ad sepes. \mathcal{T}

40. *pedunculata*, racemis lateralibus oppositis, fol. ovatis inciso-serratis, incisuris basi subdentatis, pedicellis filiformibus, calyc. 4-fidis subaequalibus. De Bieberstein Tableau des provinces occident. de la mer Caspienne. Petersbourg, 1798. Buxb. cent. 1. t. 41. fig. 1. In sylvis umbrosis circa *Kurt-Butak*. \mathcal{T}

41. *orientalis*, racemis lateralibus, foliis pinnatifidis glabris acutis basi attenuatis, calycibus inaequalibus, pedicellis capillaribus bractea longioribus. Ait. Kew. 1. p. 23. Salisb. icon. 1. p. 7. tab. 4. Hab. in Armeniae, Iberiae graminosis. Fol. latiuscula.

42. *multifida*, racemis lateralibus, foliis multipartitis, laciniis pinnatifidis, lobis decurrentibus, pedunculis brevibus, calyce glaberrimo, caule villosa. Willd. Sp. pl. 69. V. multifida, racemis lateralibus, fol. multipartitis laciniatis, caulibus erectis. Sp. plant. 17. Hab. in Sibiria. Fol. elongata. \mathcal{T}

43. *austriaca*, racemis lateralibus, foliis pilosiusculis linearibus pinnatifidis, laciniis infimis longioribus divaricatis, calycibus pilosiusculis, pedunculis bractea brevioribus. Willd. p. 70. Jacq. austr. cent. 4. t. 329. Moris. hist. 2. s. 3, t. 23. f. 17. Hab. in Austria, Silesia, Carniolia. Caulis et folia pilis minutissimis adpressis tecta. \mathcal{T}

44. *atlantica*, caule ascendente fruticoso, fol. pinnatifidis, racemis terminalibus. Def. Fl. atlant. 1. p. 13. V. rosea. Hab. in Atlante. Caul. filiformis. Corolla rosea.

45. *taurica*, racemis lateralibus, foliis pilosiusculis linearibus indivisis et pinnatifido-denticulatis, pedunculis bractea longioribus, calyce quadridido glabro Willd. Sp. p. 70. Hab. in Tauria. Corolla rosea. \mathcal{T}

46. *urticaefolia*, racemis lateralibus, foliis cordatis sessilibus argute serratis acuminatis, caule stricto, foliolis calycinis quaternis. Ait. Kew. 1. p. 24. Lin. suppl. 83. Jacq. austr. 1. p. 37. t. 59. Hab. in Helvetia, Bithynia, Austria, Bavaria. \mathcal{T}

47. *latifolia*, racemis lateralibus, foliis cordatis sessilibus rugosis obtuse serratis, caule stricto, foliolis calycinis quinis. Ait. Kew. 1. p. 24. Jacq. austr. 1. p. 37. t. 60. Hab. in Austria, Germania. Fol. incisa. \mathcal{T}

48. *paniculata*, racemis lateralibus longissimis, foliis lanceolatis ternis serratis, caule ascendente. Pall. it. 1. p. 196. Hab. in Tartaria, Bohemia. Calyces 4-fidi. \mathcal{T}

*** *Pedunculis unifloris.*

49. *biloba*, floribus solitariis, foliis cor-

delto-lanceolatis dentatis, calycinis aequalibus ovatis acuminatis trinerviis. Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 1. p. 193. V. floribus solitariis, foliis ovatis acutis serratis glabris, calycibus fructu bipartito majoribus Vahl. symbol. 1. p. 1. Buxb. cent. 1. p. 24. 1. 16. Hab. inter Cappadociae segetes. ⑤
Affinis V. arvensi. Capsulae bipartitae.

50. *agrestis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisus pedunculo reflexo brevioribus. Fl. suec. 17. 20. Oed. dan. t. 440. Hab. in Europae agris et arvis. Caul. procumbens, diffusus. ⑤

51. *arvensis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisus pedunculo longioribus, caps. compressis subsessilibus. Oed. dan. 515. In arvis cultis. Var. caule ramoso diffuso: V. *polyanthos*. Thuill. In graminosis, ad ripes, in agris. ⑤

52. *serpillifolia*, floribus solitariis subspicata, fol. ovatis inferioribus crenatis, caule basi repente. L. Flor. dan. t. 492. In sylvaticis, pratis, locis subhumidis. Habitus fere *Lysim. nummulariae*.

53. *hederifolia*, floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis pedunculo brevioribus, calycinis ovatis. Willd. Hab. in ruderalis, hortis, agris. ⑤

54. *rotundifolia*, floribus solitariis, fol. orbiculato-reniformibus crenatis, caule filiformi repente. Flor. Peruv. 1. p. 6. In Peruviae uliginosis. Flores interdum 5-fidi, et Stam. 4. vid. l. c. ⑤

55. *Chamaecitys*, caule basi tenui ascendente, fol. sessilibus trifido-linearibus, flor. sessilibus minutis solitariis. V. *Chamaecityoides*. Hort. Par. Dumont Courset, Bot. cultivateur. 4. p. 39. In Europa. ⑤

56. *filiformis*, floribus solitariis, foliis cordatis crenatis pedunculo brevioribus, calycinis lanceolatis, pedunculo filiformi longissimo. Smith Soc. Lin. Lond. 1. p. 165. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 40. f. 1. Hab. in Oriente. ⑤

57. *triphyllos*, floribus solitariis pedunculatis, foliis digitato-partitis, caule patulo. Oed. dan. t. 627. V. flor. solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. Fl. suec. 19. 20. *Veronica folio rutae*. Riv. t. 96. Hab. in Europae agris. Ramosa. ⑤

58. *verna*, floribus solitariis subsessilibus, foliis digitato-partitis summis indivisis, caule stricto. Willd. Oed. dan. t. 252. Hab. in Europae aridis apricis. Parvula, simplex. ⑤

59. *digitata*, floribus solitariis sessilibus, foliis obovatis digitato-partitis, caule

stricto. Vahl. symbol. 1. p. 2. Hab. in agris Bohemiae, Monspelii, Hispaniae. ⑤

60. *acinifolia*, floribus pedunculatis solitariis, foliis ovatis glabris crenatis, caule erecto subpiloso, caps. compressis. Vaill. paris. 201. t. 33. f. 3. ⑤

61. *praecox*, foliis cordatis sessilibus, profunde dentatis, caule erecto hirsuto ramoso, pedunculis folia adaequantibus, calycibus quadrifidis aequalibus. Schmidt bohem. 1. n. 44. V. *Ocimisfolia*, flor. solitariis pedunculatis, caule erecto, foliis subtus rubris, flore caeruleo. Thuill. Flor. paris. p. 10. Bocc. Mus. t. 102. Hab. in agris cultis. Foliis incisus et hirsutus a priore et floribus pedunculatis a V. *arvensi* differt. ⑤

62. *peregrina*, floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis, caule erecto. Flor. dan. t. 407. Moris. hist. 2. p. 322. s. 3. t. 34. f. 19. n. 56. V. *Marilandica*. Murr. Comm. Goett. 1782. p. 11. tab. 3. In Europae et Amer. septentr. arvis. ⑤

63. *Bellardi*, floribus solitariis pedunculatis, foliis linearibus integerrimis hirtis flore longioribus, caule simplicissimo erecto. Willd. V. *Bellardi* hirsuta, caule erecto simplici toto florifero, Allion. pedem. 1. n. 282. t. 85. f. 1. n. 57. V. polygonoides Lam. ill. n. 165. Hab. in pascuis Pedemontanis, et in Gallia. ⑤

47. COLUMELLIA. Cal. 5-partitus. Cor. rotata. Caps. didyma: valvulis duplicatis.

1. *arborescens*, foliis oblongis, floribus corymbosis. C. oblonga. Flora Peruv. 1. p. 28. t. 12 f. 2. Hab. in sylvis peruvianis.

2. *frutescens*, fol. obovatis serrato-dentatis integrisque, pedunculis subunifloris. C. obovata Fl. peruv. t. 12. f. b. In collibus aridis in Peru. Amarissima. Cor. laciniae patulae.

48. SARMIENTA. Cor. urceolata. Filam. 3 sterilia. Caps. 1-locularis, circumscissa.

1. *scandens*. Fewill. peruv. 3. p. 69. t. 43. sub Urceolaria. Sarmienta repens, fol. ovatis carnosius utrinque punctatis. Flor. Peruv. 1. p. 3. t. 7. f. b. In nemoribus peruvianis. Planta parasitica scandens.

49. PAEDEROTA. Cor. ringens 4-fida: fauce nuda. Cal. 5-partitus. Caps. bilocularis.

1. *Ageria*, foliis ovato-acuminatis,

corollarum galea bifida. Willd. Sp. pl. 1. p. 77. *Paederota lutea*. Lin. suppl. 84. Scop. Jacq. hort. 2. t. 121. Hab. in Carniolia, Italia. ☉

2. *Bonarota*, foliis subrotundo-ovatis, corollarum galea integra. W. Jacq. austr. 5. spp. t. 39. *Paederota caerulea* Lin. suppl. 84. Mich. gen. 19. n. 1. t. 15. f. 1. (Var.) Hab. in alpinis Austriae, Carnioliae, Italiae. ☉

3. *minima*, foliis oblongis integris oppositis, floribus axillaribus oppositis, calycum dentibus intus hirsutis. Retz. obs. fasc. 5. p. 10. Hab. in India. Facies *Elatines Hydropiperis*. Retz. ☉

50. *WULFENIA*. *Cor.* ringens: labio superiore brevi integro; inferiore 3-partito, fauce barbata. *Cal.* 5-partitus. *Caps.* 2-locul.

1. *carinthiaca*. Jacq. miscell. 2 p. 62. tab. 8. fig. 1. Icon. rar. 1. t. 2. *Paederota Wulfenia*. Lamarck. encyclop. tab. 13. fig. 2. Hab. in summis alpinis Carinthiae solo pinguisimo. Folia radicalia obovata obtusa. Flores pedunculati, secundi, caerulei. ☉

51. *GLOBIFERA*. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-partita subbilabiata: lacinia superiore minore. *Filam.* incurva basi appendiculata. *Caps.* subglobosa polysperma.

1. *umbrosa*. Gmel. Syst. nat. Linn. 2. p. 32. *Micranthemum orbiculatum* Michaux Flor. Bor. Amer. 1. p. 10 t. 2. Caul. filiform. repentes. In udis opacisque sylvarum Carolinae et Georgiae. Aug. floret.

52. *GRATIOLA*. *Cal.* 7-phyllus: exterior patulus. *Cor.* resupinata. *Filam.* 2. sterilia. *Caps.* 2-locular.

1. *officinalis*, fol. lanceolatis serratis, floribus pedunculatis. Oed. Flor. dan. 1. 363. Willd. Spec. pl. 1. p. 102-106. Hab. in Europae humidiusculis. Erecta. ☉

β. *carolinensis*, caule ut plurimum simplice, filamentis sterilibus nullis, capsula calyci subaequali. Michaux Flor. boreali-americana 1. p. 6. *G. officinalis*. Hab. in Virginia et Carolina. Distincta?

2. *quadridentata*, fol. lanceolatis acutis, 4-dentatis: dentibus binis ad apicem longioribus, caps. calyce triplo brevior. Michaux 1. c. Hab. in Carol. inferiore.

3. *Anagallidea*, erecta glaberrima, caule 4-gono, fol. oblongo-ovalibus sub-

denticulatis flore brevioribus, calyce ebracteato. Mich. 1. c. p. 7. Fol. obtusa. *Corol.* pallido-caerulescens. In humidis Carolinae.

4. *pilosa*, erecta ramosa pilosissima, fol. ovalibus subdentatis flore subsessili longioribus. Mich. 1. c. C. peruviana tralthes. Hab. cum priore. Caul. utrinque linea prominula, pilis articulatis hirsutus. M.

5. *aromatica*, fol. lanceolatis serratis sessilibus, pedunculis unifloris, caulibus fistulosus suberectis. Lam. Encycl. Hab. in Malabar. *Tetrandra* L.

6. *Monnieria*, fol. oblongis integris, pedunculis unifloris fol. longioribus, caule declinato. Swartz. obs. p. 15 Jacq. obs. 1. p. 4. t. 1. Ehr. pict. 14. f. 2. Sloan. jam. t. 129. f. 1. In agrostis Antillarum et insulae Marchionis. Distincti generis? ☉

7. *repens*, fol. ovatis, caule repente calyce pentaphyllo, stylo bifido. Swartz prod. 14. Swartz Icon. p. 6. t. 3. Hab. in Jamaica, locis humidis. Differt a praecedente foliis tenuissime nervosis. W.

8. *rotundifolia*, fol. ovatis trinerviis. Mont. 174. Rheed. mal. g. p. 111. t. 57. Hab. in Malabar. arenosis.

9. *lucida*, caule ramoso diffuso radicante, fol. cordato-ovatis dentatis, pedunculis axillaribus fol. longioribus. Willd.

10. *veronicifolia*, caule repente, fol. ovato-lanceolatis acutis serratis, floribus terminalibus oppositis. Retz. obs. fasc. 4. p. 8. Pluk. mant. 167. t. 186. f. 2. Rumph. amb. 5. p. 160. t. 150. f. 2. Rheed. mal. g. p. 115. t. 57. Hab. in Indiae humidis. ☉

11. *hyssopioides*, fol. lanceolatis subseratis, articulo caulino brevioribus. Mant. 174. Pluk. a'm. 180. t. 193. f. 1. Roxb. 2. t. 128. Hab. in Tranquebariae, et Coromandelae agris oryzaceis. Caulis filiformis erectus, articulis fol. pluries longioribus.

12. *lobelioides*, caule subnudo stipulato, fol. oblongis integerrimis, panicula dichotoma, capsulis subglobosis. Retz. obs. bot. fasc. 4. p. 7. Prope Tranquebar. ☉

13. *trifida*, procumbens, fol. lineari-lanceolatis quaternis, apice dentatis, trifidisque, capsulis pilosis. Gratiola chamaedrifolia. Lamarck. encyclop. 3. p. 26. Rheed. mal. g. p. 165. t. 85. Hab. in Malabar. arenosis. ☉

14. *virginica*, fol. lanceolatis obtusis subdentatis. Gron. virg. 6. Willd. sp. pl. Lin. p. 105. Hab. in Virginiae humidis.

15. *peruviana*, fol. ovato-lanceolatis serratis, floribus subsessilibus. Mill. dict. n. 3. Fewill. peruv. 3. t. 7. Flor. peruv. p. 7. In Peru. Fol. subamara.

16. *grandiflora*, caulibus decumbentibus, fol. ovatis serratis, pedunculis oppositis, capsulis subulatis. Retz. obs. fasc. 4. p. 8. Hab. in India. Flor. magni.

17. *oppositifolia*, caule adscendente, fol. lanceolatis serratis, pedunculis oppositifoliis. Retz. obs. fasc. 5. p. 8. Hab. ad Tranquebar.

18. *pusilla*, caule simplicissimo, fol. ovatis crenatis acutis, pedunculis axillaribus unifloris fol. longioribus. Willd. l. c. p. 105. In India ad scaturigines. Minutissima. ☉

53. *BAEA*. Cal. 4-5-partitus, (subtus in medio floris.) Cor. subringens. ant. cymbiformis (labiis non inflatis.) Stam. incurva in medio corollae.

* *BATA*. Juss. gen. pl. Caps. longo corniculata contorta, 2-locularis, 4-valvis.

1. *magellanica*, acaulis, fol. ovatis petiolatis integerrimis, scapo bifloro. Lam. encyclop. 1. p. 366. ill. t. 15. In rupibus humidis freti Magellanici. Cor. caeruleae lab. super. 3-dentatum; infer. planum 2-lobum. ☞

* *JOVELLANAE*. Flor. Peruv. Caps. ovato-conica, 2-sulca, 2-locularis, apice 2-valvis, valvulis bifidis.

2. *plantaginea*, acaulis, fol. ovatis serratis hirsutis, scapis unifloris. J. scapiflora Flor. peruv. 1. p. 13. t. 18. f. 6. Calceolaria plantaginea. Smith ic. ined. 1. p. 2. t. 2. Lam. encycl. 1. p. 550. In alpinis peruvianis, in America meridionali et ad fretum magellanicum. Cor. lutea. ☉

3. *punctata*, caulescens, pedunculis multifloris cymosis, fol. ovato oblongis duplicato-serratis. Flor. peruv. l. c. f. 1. In Peru, praesertim provinciae Concept. Chili et Puchacay. Gaudet virt. depuratorio, in morbis veneris hinc utilissima. ☞

4. *alata*, caulescens, fol. oppositis ovato-acutis in petiolum alatum attenuatis, floribus paniculatis. Calceolaria petiolaris. Cav. hisp. 5. p. 30. t. 445. Hab. prope Guayaquil. Cor. bilabiata. Caul. herbaceus.

5. *violacea*, caule fruticoso, fol. oppositis ovatis dentatis, flor. terminalibus cymosis. Cav. l. c. p. 31. t. 452. Cor.

campanulato-patens. In littore maris Talcahuani prope insulam Quiriquina. C.

6. *triandra*, fol. inciso-pinnatifidis, flor. triandris. Cav. hisp. 5. p. 32. t. 453. Hab. in Talcahuano. Caul. fruticosus. Conf. Flor. peruv. vol. 3. p. 11.

54. *CALCEOLARIA*. Cal. 4-partitus. Cor. 2 labiata: labium inferius maximum inflatum. Caps. ovata, 2-locularis, 2-valvis.

1. *pinnata*, fol. pinnatis pinnatifidisque. Willd. Sp. pl. 106. Flor. peruv. 1. p. 14. t. 19. f. p. 14. Crescit, uti pleraeque species, quarum flores plerumque colore sunt luteo, Hab. in regno peruviano. ☉

2. *tripartita*, fol. tripartitis, pedunculis multifloris. Flor. peruv. 1. p. 14. t. 22. f. a. Herbacea. In nemoribus.

3. *lobata*, caule erecto dichotomo, fol. cordatis 5-lobis. Cav. hisp. v. 5. p. 26. t. 443. f. 1. Hab. in siccis. Fol. tomentosa.

4. *tomentosa*, fol. cordato-triangularibus duplicato-serratis, subtus tomentosis, petiolis connatis. Flor. peruv. p. 15. t. 22. f. 6. Sequenti affinis. Crescit in umbrosis. ☉

5. *perfoliata*, fol. sagittatis, petiolis alatis perfoliatis. Flor. peruv. p. 15. t. 21. f. a. Smith ic. ined. p. 4. t. 4. In lapidosis. Viscosa. ☉

6. *corymbosa*, fol. radicalibus ovatis cordatisque petiolatis crenatis: caulinis semiamplexicaulibus. Fl. peruv. p. 14. t. 20. f. b. In umbrosis urbis Conceptionis Chile et in montibus Cordillera. Hirsuta. Cor. lutea, lineis et punctis sanguineis variegata. Caul. simplex. ☉

7. *paralia*, fol. oblongo-ovatis tomentosis dentatis superioribus, connatis, radicalibus petiolatis, capsulis tomentosis. Cav. hisp. 5. p. 29. t. 447. Hab. prope oppidum chilense Paral.

8. *verticillata*, fol. verticillato-ternatis cordatis acutis serratis, pedunculis quadrifloris. Flor. peruv. 2. p. 17. Hab. in Cantae praeruptis. ☞

9. *bicolor*, hirsuta, fol. ternis oppositisque petiolatis venoso-rugosis biserratis, pedunculis multifloris dichotomo-umbellatis. Flor. peruv. p. 16. t. 25. f. b. In praeruptis. Cor. ad basin alba. ☞

10. *multiflora*, fol. verticillatis ternis subsessilibus serratis, flor. paniculatis. Cav. l. c. t. 449. In siccis. Affinis antecedenti. Cor. prope calicem angustissima est in hac et in tribus sequentibus, speciebus.

532500515X

11. *gemelliflora*, fol. petiolatis verticillatis ternis ovatis serratis, pedunculis ternis bifloris. Cav. hisp. 5. p. 30. t. 450. f. 1. Fol. glauca. Hab. in saxosis.

12. *terniflora*, fol. verticillatis ternis sublanceolatis serratis, pedunculis ternis trifloris. Cav. l. c. t. 450. f. 2. Caul. fusco-violaceus. Cum priore. An a *glauca* satis diversa?

13. *angustiflora*, fol. ovato-lanceolatis oppositis ternatisque venosis, pedunculis quadrifloris. Flor. peruv. p. 17. t. 28. f. a. Fol. utrinque pubescentia. Cor. uti in 3 antecedentibus basi angustissima. Per totum fere annum floret in Cantae verisuris. ¶

14. *trifida*, fol. oppositis ternatisque cordatis et ovatis crenato-serratis, pedunculis trifidis umbellatis. Fl. peruv. p. 17. t. 26. f. b. Petioli connati. Feltrifuga et antiseptica species. Hab. in Cheuchin locis umbris prope aquas. ¶

15. *virgata*, fol. oppositis ternatisque ovatis obtuse serratis, ramis flexuosis virgatis, pedunculis multifloris. Flor. peruv. p. 20. t. 31. f. a. *Melissae Calaminthae* habitu. Cor. parva punctis purpureis maculata. ¶

16. *glauca*, fol. ternis lanceolatis serratis, pedunculis umbellatis 3-4-floris, corollis maculatis. Flor. peruv. p. 17. t. 27. f. c. Suffruticosa. Filam. basi lata. Hab. in Cantae circuitu.

17. *uniflora*, fol. (saepè ternis) ovatis, pedunculis longis filiformibus unifloris. Flor. peruv. l. c. p. 16. t. 20. f. c. In umbrosis *Tarmæ* ad *Curis*. Flor. parvi. ¶

18. *biflora*, fol. ovatis serratis crenatisque petiolatis, pedunculis geminis filiformibus unifloris. Flor. peruv. l. c. f. a. C. *ovata*. Smith fasc. 1. p. 3. t. 3. Copiose in arenosis altis Limac. Caul. herbac. Fol. subtus venosa.

19. *polyrhiza*, fol. ovatis in petiolum alatum attenuatis, flor. umbellatis. Cav. p. 25. t. 441. Cor. punctis rubris variegata. In America meridionali.

20. *cava*, caule decumbente, fol. oppositis ovatis confertis crassis albo-lanatis, inferne attenuatis. Cav. hisp. 5. p. 27. t. 443. f. a. Rad. crassa. Caul. elongatus, nudus.

21. *racemosa*, fol. ovatis dentatis rugosis tomentosis, flor. terminalibus racemosis. Cav. p. 29. t. 448. Inter arbuta in Peru. Fol. opposita, prope basin numerosa.

22. *heterophylla*, fol. petiolatis ovatis

ellipticis subcordatisque serratis, pedunculis longissimis dichotomis. Flor. peruv. p. 16. t. 21. f. b. Hab. in Muna nemoribus. Hirsutissima, villis ferrugineis bifloribus. ☉

23. *cuneiformis*, fol. cuneiformibus ovatisque inciso-serratis. Flor. peruv. p. 19. t. 27. f. 6. Rami bracteati scabri ferruginei. Fol. masticata tincturam luteam praebent. In Cantae et Tarmæ Alpibus. ¶

24. *montana*, fol. radicalibus spathulatis. Cav. l. c. p. 27. t. 445. f. 1. Hab. in Cordillera chilensis.

25. *Fothergilli*, fol. spathulatis integerrimis, pedunculis scapiformibus unifloris. Ait. hort. Kew. 1. p. 30. t. 1. Willd. Spec. pl. Linn 1. p. 108, β *Cavanillesii*, - fol. crenatis. Cav. p. 25. t. 442. f. 1. Hab. in insulis Falklandiae, β in Peru.

26. *flexuosa*, fol. cordatis crenatis pedunculis multifloris umbellatis. Flo. peruv. p. 19. t. 26. f. a. In praeruptis et aridis regni chilensis. Fol. superne, uti caulis, aspera, subtus venosa. ¶

27. *inflexa*, caule laevi scandente, fol. ovatis acutis crenulatis, pedunculis inflexis 3-4-floris. Flor. peruv. p. 17. t. 25. f. a. Rami brachiati. Petioli connati. Hab. cum priore. ¶

28. *involuta*, fol. ovatis acutis serratis, corollis involutis calycem semitagentibus. Fl. peruv. p. 15. t. 23. f. a. In Panathuas nemoribus. ¶

29. *bicrenata*, fol. ovatis bicrenatis subtus tomentosis, corollis sulcatis. Fl. peruv. l. c. f. b. In Cuchero nemoribus. Cor. magna, quoad iconem, sulcata, subinvoluta, apice crenata.

30. *anomala*, cor. labio inferiore explanato apice crenato. C. *crenata*, fol. ovatis, parce tomentosis, cor. 3-crenata. Cav. hisp. 5. p. 28. t. 446. Secundum figuram ab omnibus differt speciebus labio infero non inflato s. calceiformi. In humidis St. *Caroli de Chiloe* inter montium radices et mare. An hujus generis?

31. *oblonga*, caule erecto simplicissimo, fol. latis serratis, pedunculis trifidis, cor. intus punctatis. Fl. peruv. p. 15. t. 24. f. b. Rad. fasciculata. ☉

32. *punicea*, caule repente, fol. ovalibus serratis, cor. puniceis. Fl. peruv. l. c. f. a. Rad. fasciculata fibrosa. Fol. superne glabra.

33. *viscosa*, fol. ovatis serratis viscosis. Fl. peruv. p. 18. t. 30. f. a. Planta suffruticosa, viscoso-resinosa, amara et, fol. tritis,

trinis, *Teucrium Marum* redolent. (loc. cit.) Hab. in Peruvia alpinis.

34. *dentata*, viscosa, fol. ovatis argute bidentatis. Fl. peruv. p. 18. t. 29. f. b. Fol. sapore amarissimo uti in *cortice peruviano* fere. Crescit in Conceptionis Chiensis, et in Paral vicinis. $\bar{\tau}$

35. *deflexa*, fol. ovato-lanceolatis serrulatis, flor. terminalibus corymbosis, pedicellis 4-5-floris nutantibus. Flor. peruv. p. 18. t. 20. f. 6. Fol. deflexa. Cor. luteo-crocea. In humidis et inundatis. $\bar{\tau}$

36. *salviaefolia*, fol. lanceolatis bidentatis, petiolis connatis alatis, pedunculis dichotomis multifloris. C. *rugosa*. Fl. per. p. 19. t. 28. f. 1. Calceolaria *salviaefolia* Fenzl. peruv. 3. p. 13. t. 7. C. *integrisolia* Lin. Willd. spec. pl. p. 107. Cor. luteo-rosea. Fol. varia pro soli natura et plantae aetate. Car. Hab. in *Conceptionis Chile* aridis et praeruptis. $\bar{\tau}$

37. *salicifolia*, fol. lanceolatis serratis, pedunculis geminis terminalibus umbellatis dichotomisque. Flor. peruv. p. 18. t. 19. f. b. Caul. duplici cortice lectus; Rami subtrianguli: teneri viscoso-resinosi. Flor. magni. Hab. in Peruviae praeruptis et uliginosis. $\bar{\tau}$

38. *sessilis*, fol. lanceolatis serratis semplexicaulibus rugosis canescentibus. Flor. peruv. p. 18. pedunc. umbellati, longi. In locis aridis prope *Conceptionem Chile*.

39. *lanceolata*, parva, fol. lanceolatis integerrimis, pedunculis terminalibus unifloris solitariis. Cav. hisp. 5. p. 27. t. 444. f. 2. Lab. superius breve. Cresc. in America meridione, in insulis *Maclovianis*.

40. *pulverulenta*, fol. oblongo-lanceolatis dentato-serratis albidis, ramis canescente-pulverulentis. Fl. peruv. p. 18. Pedunc. axillares subquadrif. In *Cantae* praeruptis. $\bar{\tau}$

41. *scabra*, fol. brevibus subovatis venoso-linearis, caule aspero. Fl. peruv. p. 18. t. 29. f. a. Caul. 3-pedal.; rami breves. Fol. margine revoluta. In praeruptis. $\bar{\tau}$

42. *ferruginea*, fol. linearibus, margine revolutis subtus rufo-tomentosis, umbellis terminalibus binis. Cav. p. 27. t. 445. f. 1. Fol. longa. Caul. durus, tomentosus. Hab. in inundatis in *Cordillera* montis radicibus. Sequens affinis.

43. *rosmarinifolia*, fol. linearib. integerrimis, margine revolutis, subtus tomentosis, caul. glabro Lam. encycl. meth. bot. 1. p. 326. Folia praesertim juniora viscosa, subtus albo-tomentosa. L. In Peru. An a praecedente satis diversa?

44. *alternifolia*, caule tomentoso, fol. linearibus alternis margine revolutis, sparsis, flor. pedunculatis, axillaribus trifloris. Cav. l. c. p. 28. t. 445. f. 2. Fol. angustissima, cum floribus alternatim sparsa, subtus tomentosa. Cresc. in Regni peruviani siccis.

45. *pinifolia*, fol. confertis linearibus integris, margine revolutis subteretibus. Cav. l. c. p. 26. t. 442. f. 2. Rad. crassa. Flor. terminales; pedunc. elongati, dichotomi. In monte *Cordillera*.

46. *alba*, fol. linearibus denticulatis, flor. racemoso-paniculatis. Flor. peruv. 1. p. 20. t. 27. f. 6. Planta suffruticosa, viscoso-resinosa, odore rosmarini. Fol. amara, ex axillis fasticulata habitu Pini. Flor. subthyrsoides. Frequens dicitur in collibus aridis *Rese* provinc. regn. *Chil.* $\bar{\tau}$

Obs Botanicorum praesertim hispanicorum studio hujus generis species, quarum Linnaeo tantummodo 3 innoverunt, ad ingentem accreverunt numerum. Nonnullae tantummodo varietates videntur. Quamvis secundum icones, quae in opere *Cavanillesii* et in *Flora peruviana et chilensi* occurrunt, inter se collatas differant, posterioris operis (vid. vol. 3. p. xij) auctores de speciebus *Cavanillesii*, argumentis vero desiderandis, tamen pronunciant, plures easdem esse ab iis jam antea descriptas plantas.

55. *PINGUICULA*. Cor. ringens, calcarata. Cal. bilabiatus, 5-fidus. Caps. 1-locularis.

lusitanica, scapo nutante pubescente, nectario conico-subulato, foliis reticulato-venosis, caps. globosa. Willd. spec. pl. p. 109. Sowerby engl. bot. Ic. t. 145. Smith Fl. angl. l. p. 26. *Pinguicula villosa*. Lightf. scot. 1. p. 77. t. 6. f. 1. In Anglia, Lusitania et in Scotia. $\bar{\tau}$

2. *vulgaris*, nectario conico recto longitudine petali, labio superiore bilobo, caps. ovata. Willd. l. c. p. 110. Oed. dan. t. 93. In Europae uliginosis praesertim montosis. $\bar{\tau}$

3. *grandiflora*, nectario subulato recto longitudine floris, labio superiore patente emarginato. Willd. Lamarck encyclop. 3. p. 21. tab. 14. fig. 2. In alpinibus Galliae australior. Labium superius dilatatum emarginatum; inferius amplum trilobum. $\bar{\tau}$

4. *elatior*, scapo pubescente, calyce glanduloso pubere, coroll. majusculae tubo inflato. Mich. Flor. p. 11. In palud. apricis Georg. et Carol. cor. anethysteo rubens. Fol. ut in P. vulgari.

5. *campanulata*, scapo subvillosa, co-

rolla campanulata dentata, calcare recurvo. Lamark in Journ. d'Hist. nat. N^o. IX. p. 336. t. 18. f. 1. Hab. in Carolina. Fl. flavus erectus. Cal. villosus-pulverulentus. l.

6. *lutea*, scapo glabriusculo, cor. majuscula: laciniis crenatis, calcare subfiliformi tubum subaequante. Mich. l. c. In pinetis Carol. infer. cor. lutea. Folia obovalia.

7. *alpestris*, nectario conico coroll. breviori, labro superiore bilobo, interioris laciniis lateralibus obtusis: intermedia emarginata. Willd in Nov. act. soc. Nat. 2. t. 5. f. 1. (P. *purpurea*.) P. *alpina*. Schrank primit. Salisb. n. 257. albidus salisburgensis. Flos recenti in statu *ochroleucus*. Flörke in Hoppe Taschenb. 1800, purpureus. Willd. l. c.

8. *alpina*, nectario conico gibbo adscendente, labio superiori emarginato, inferiore laciniis truncatis. Willd. l. c. t. 5. f. 3. Hab. in Europae alpinis. Flos albus, capsula rostrata. Sowerby engl. Bot. p. 145.

9. *involuta*, nectario conico longitudine petali, scapo unifloro villosus, fol. ovatis margine involutis. Flor. peruv. 1. p. 20. t. 31. f. c. In altis frigidis et humidis regni peruviani. Flos cernuus viol.

10. *villosa*, scapo stricto pubescente, nectario subulato recto brevissimo, foliis nervosis. Willd. spec. pl. l. p. 111. Lin. Fl. lappon. p. 13. t. 12. f. 2. In Lapponia et Siberia. P. *vulgari* sextuplo minor, caps. compressa.

11. *acutifolia*, pusilla glabra, fol. erecto-rosulacis sessilibus ovalibus acutissimis. Mich. Flor. 1. p. 11. Circa lacus Mistassins.

12. *pumila*, scapo brevi glabello, corolla oblongiuscula tubulata, calcare tubo breviori. Mich. l. c. In humidis Georgiae. Cx. parva, dilute violacea.

56. UTRICULARIA. Cal. 2-phyl-lus aequalis. Cor. ringens calcarata. Caps. 1-locularis.

1. *grandiflora*, nectario subulato, fol. ovatis integerrimis. U. *montana* Jacq. Amer. pict. t. 8. U. *alpina* Lin. Willd. spec. pl. 1. p. 111. Hab. in Martinicae alpinis. Flos albus, maximus.

2. *unifolia*, scapo squamato unifloro, calyce (maximo) cordato, fol. radicali unico lanceolato. Fl. peruv. 1. p. 20. t. 31. f. b. In Panao montib. aliis.

3. *furcata*, aphylla, scapo 2-4-floro squamis totidem apice furcato. U. *aphylla*. Fl. peruv. l. c. f. d. β. U. *tenuis*, scapo

sesquipollicem alto unifloro. Cav. icon. 5. p. 24. t. 440. f. 2. vid. Ruiz in Flor. peruv. vol. 4. p. xi. Hab. in regni peruviani inundatis.

4. *cornuta*, aphylla, scapo rigido summitate bifloro, cor. labio inferiore am- plissimo, calcare porrecto acuto. Michaux Flor. amer. 1. p. 12. Hab. in Canada.

5. *setacea*, aphylla minuta, caule tenui setaceo 2-3 floro: floribus pedicellatis, calcare longiusculo. Michaux. In udibus Carolinae inferioris.

6. *hispida*, scapo filiformi paucifloro inferne hispido, fol. lineari-subulatis. Lam. illustr. 1. p. 50. Hab. in Cayenna. Rich.

7. *foliosa*, nectario conico, fructibus cernuis, radiculis utriculis destitutis. Lin. Loess. iter. p. 281. Plum spec. 6. ic. 165. f. 2. In America australi. Rad. repens.

8. *vulgaris*, nect. conico, labio superiore integro palato aequali, fol. pinnato-multifidis, laciniis capillaribus. Heyne in Schrad. Journ. bot. 1800. p. 17. t. 6. f. A. Hab. in aquis stagn. Utricoli foliis adhaerent. T.

9. *intermedia*, nect. conico, labio superiore integro palato duplo longiore, fol. 3-partitis: lacin. capillaribus dichotomis. Heyne l. c. p. 18. t. 5. U. *minor*. Flor. dan. t. 128. Rarius in inundatis Iunio. Germen subrotundo-ovatum.

10. *minor*, nect. carinato, labio superiore emarginato, palato aequali, fol. tripartitis, laciniis capillaribus dichotomis. Heyne l. c. p. 22. t. 6. f. B. Cum antecedentibus.

11. *obtusata*, nectario inflexo obtuso subemarginato. Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 41. Hab. in rivulis Jamaicae. Flor. parvi. Palat. fulvum: striis purpurasc. capsula subrotunda.

12. *ceratophylla*, fol. ad superficiem aquae seno-verticillatis pinnatifidis: laciniis capillaceo-multipartitis, flör. subcorimbosis. Michaux l. c. p. 12. In stagnis Carolinae inferioris.

13. *subulata*, nectario subulato. In Virginia. Flores albi.

14. *gibba*, nectario gibboso, scapo nunc unifloro, nunc bifloro. Gron. virg. 129. Cum priore.

15. *bifida*, scapo nudo bifido. Osb. it. 243. t. 3. f. 2. In China.

16. *capillacea*, scapo nudo capillari subtrifloro, floribus nutantibus, capsula

subulata. Willd. l. c. p. 113. In Indiae locis scaturiginosis. Planta vix uncialis, radice nervia subramosa. \bar{E}

17. *caerulea*, scapo nudo, squamis alternis vagis subulatis. Fl. zeyl. 23. Rhed. mal. g. p. 137. t. 70. In Zeylona.

18. *stellaris*, verticillo utriculario bractearum ciliari. Linn. suppl. 86. In Indiae agris oryzaceis, in aquosis profundioribus. Corol. destitutae nectario: labio inferiori saecato.

57. **JUSTICIA.** *Cal.* simplex duplexve. *Cor.* 1-petala ringens aut subaequalis. *Caps.* ungue elastico dissiliens: *dissepimentum* contrarium adnatum. (Flor. bracteati.)

* *Calyce duplici.* *Monantherae.*

1. *fastuosa*, thyrsis terminalibus, floribus secundis, foliis lanceolato-ellipticis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Willd. Sp. p. 79. Hab. in Tranquebaria. \bar{h}

2. *Forskælei*, thyrsis axillaribus terminalibusque, fol. ovatis acuminatis. Vahl. l. c. 2. p. 13. In Arabia felici et India. \bar{h}

3. *purpurea*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis lanceolatis glabris, ramis pubescentibus. Vahl. symbol. 2. p. 13. Rumph. aumb. 6. p. 52. t. 22. f. 2. Hab. in China.

4. *verticillaris*, villosa, floribus axillaribus verticillatis, calycibus exterioribus mucosis, foliis ovatis. Vahl. 3. p. 13. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *aristata*, villosa, floribus axillaribus verticillatis, calycibus exterioribus aristatis, fol. ovatis. V. 2. p. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *chinensis*, pedunculis axillaribus verticillatis trifidis, bracteis ovatis mucronatis basi coloratis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Burm. ind. 8. t. 4. f. 1. Hab. in China et Arabia felici, locis aquosis.

7. *triflora*, pedunculis axillaribus elongatis trifloris, bracteis lineari-lanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Hab. in montibus Arabiae felici.

8. *serpens*, floribus axillaribus solitariis, caule repente. Vahl. 2. p. 2. In insula St. Mauritii. Variat foliis rotundioribus.

** *Calyce duplici.* *Diantherae.*

9. *sulcata*, spicis terminalibus, floribus verticillatis, foliis ovato-cordatis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Hab. in Arabia felici. Perianthium exterius quadripartitum.

10. *malabarica*, paniculis axillaribus dichotomis. Vahl. symbol. 2. p. 13. *Justicia* (ligulata) foliis ovatis acutis: floribus paniculatis bicalyculatis, lacinia dorsali majore. Cavan. icon. 1. p. 52. t. 71. *Dianthera malabarica*. Lin. suppl. 85. In graminosis Malabaricae, et Arabiae.

11. *bivalvis*, pedunculis axillaribus trifidis, pedicellis lateralibus bifloris, bracteis ovatis aristatis nervosis. Vahl. 2. p. 13. Sp. pl. 23. Rumph. aumb. 6. p. 51. t. 22. f. 1. Hab. in Arabia et India. \bar{h}

12. *falcata*, floribus axillaribus subsessilibus, fol. ovato-lanceolatis. Willd. Sp. 83. *J. falcata*, dianthera fruticosa, fol. ovato-lanceolatis petiolatis, floribus bicalyculatis, labio superiore corollae longissimo. Lam. encyclop. 1. p. 622. Hab. in insula Mauritii. \bar{h}

*** *Calyce simplici, corollis bilabiatis: labiis indivisis.*

13. *sexangularis*, pedunculis trifloris, bracteis cuneiformibus, foliis ovatis Vahl. symbol 1. p. 13. *J. annua* sexangulari caule, foliis Circaeae conjugatis, flore miniato. Amm. herb. 274. Hab. in Vera cruce, Jamaica. \odot

14. *scorpioides*, fruticosa, fol. lanceolato-ovatis hirsutis sessilibus, spicis recurvatis. Lin. Sp. plant. 21. Banks Reliq. Houst. p. 3. t. 4. Hab. in Vera cruce. \bar{h}

15. *gangetica*, foliis ovatis, racemis simplicibus longis, floribus alternis secundis, bracteis obsoletis. Willd. 1. p. 83. Burm. ind. g. tab. 4. fig. 2. Hab. in India.

16. *assurgens*, spicis axillaribus terminalibusque ramosis, floribus alternis, bracteis linearibus. Vahl. 2. p. 13. *Justicia* assurgens, fol. ovatis integerrimis, bract. subulatis, ramis hexagonis. Amoen. acad. 5. p. 391. Brown. Jam. 110. t. 2. f. 1. Hab. in Jamaica et in insula St.-Crucis.

17. *humilis*, herbacea assurgens, fol. ovali-lanceolatis, bract. minutissimis, flor. subbinis, capsula compressa pedunculata. Mich. Flor. 1. p. 8. In sylvar. paludib., a Carolina ad Floridam. Basi repens.

18. *lineata*, herbacea, fol. ovatis acutis lineolis pellucidis, pedunculis terminalibus paniculatis, flor. spicatis. Flor. Per. 1. p. 9. t. 13. f. a. In nemoros. ad Cuchero vicum.

*** *Calyce simplici, corollis bilabiatis: labiis divisis.* *Monantherae.*

19. *hispida*, pedunculis terminalibus multifloris, calycinis foetidis et bracteis

linearis-subulatis ciliatis, foliis oblongo-lanceolatis, ramis hispido-pubescentibus. Willd. p. 84. In Sierra Leone. Flores albi in corymbo brevi terminali.

20. *Ecbolium*, spicis terminalibus tetragonis, bracteis ovatis imbricatis ciliatis mucronatis, corollarum galea linearis reflexa Vahl. symbol. 2. p. 14. Burm. zeyl. 7. t. 4. f. In Arabia, Malabar, Zeylona. Anthera ad refracturam latius superioris. L. h

21. *tetragona*, spicis terminalibus tetragonis, bracteis ovatis quadrifariam imbricatis carinatis ciliatis, foliis crenatis glabris. Vahl. symbol. 3. p. 5. Hab. in Cajenna. h

22. *coccinea*, spicis terminalibus, foliis bracteisque ellipticis margine nudis, corollarum galea lanceolata apice reflexa. Vahl. symbol. 3. p. 6. J. *coccinea*, fruticosa, corollis bilabiatis; labio superiore indiviso, foliis bracteisque spicarum ellipticis acuminatis, antheris parallelis. Aiton Kew. 1. p. 26. Smith. icon. p. 8. In Cajenna ad ripas. h

23. *pulcherrima*, spicis terminalibus axillaribusque, bracteis ovatis imbricatis ciliatis mucicis, corollarum galea lanceolata bifida erecta. Vahl. 2. p. 14. Jacq. amer. p. 6. t. 2. f. 4. Icon. rar. In America calidiore. h

24. *carthagenensis*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis oblongis imbricatis ciliatis. Vahl. 2. p. 14. Jacq. amer. 11. t. 5. In Carthage, Martinica. h

25. *hirsuta*, spicis axillaribus terminalibusque tetragonis, bracteis ovatis imbricatis hirsutis, foliis dentatis. Vahl. symbol. 2. p. 3. Hab. in Java.

26. *sphaerosperma*, spicis axillaribus oppositis utrinque geminis, bracteis linearibus elongatis, seminibus globosis nitidis. Vahl. symbol. 2. p. 3. Hab. in Caribaeis.

27. *Gendarussa*, spicis terminalibus foliosis, floribus verticillatis, foliis lanceolatis elongatis. Vahl. symb. 2. p. 14. Lin. suppl. 85. Gendarussa sosa. Rumph. amb. 4. p. 70. t. 28. et p. 72. t. 29. In Zeylona, Java, Malabar. h

28. *procumbens*, spicis axillaribus terminalibusque, calycibus tetraphyllis ciliatis, bracteis longitudine calycis, foliis lanceolatis. Pluk. alm. 142. t. 56. f. 2. Hab. in Zeylona. h

29. *diffusa*, spicis axillaribus terminalibusque, calycibus tetraphyllis glabris, bracteis calyce brevioribus, foliis ellipticis. Willd. p. 87. Euphrasia sinica Parietariae

foliis rubiae modo spicatis. Pluk. alm. 83. t. 392. f. 4. Hab. in India. h

30. *echinoides*, spicis axillaribus oppositis secundis adscendentibus linearibus hirtis. Vahl. 2. p. 14. Euphrasiae affinis indica echinoides. Herm. luglb. 668. t. 666. In Malabar, Zeylona subhumidis. h

31. *longifolia*, spicis axillaribus geminis oppositis secundis, foliis lanceolatis elongatis. Vahl. symbol. 2. p. 4. Hab. in insula Mahé.

32. *latifolia*, spicis terminalibus subramosis, floribus inferioribus verticillatis, foliis ovatis acuminatis. Vahl. symbol. 2. p. 4. Hab. in India orientali. h

33. *picta*, racemis axillaribus terminalibusque, floribus verticillatis, foliis ovatis pictis. Vahl. symbol. 2. p. 14. Justicia *picta* fruticosa, foliis lanceolato-ovatis pictis, corollis fauce inflatis. Sp. pl. 21. Rumph. amb. 4. p. 73. t. 30. Hab. in Asia. Foliorum discus macula lucida. h

34. *nitida*, racemis terminalibus subramosis, floribus subverticillatis, foliis lanceolato-ellipticis utrinque attenuatis. Vahl. symbol. 2. p. 5. Swarz. prod. 13. Hab. ad ripas torrentium insularum Martinicae, St. Crucis, Guadeloupac. h

35. *rubra*, racemis terminalibus solitariis, bract. setaceis, fol. lanceolatis. Vahl. Eclog. amer. Fasc. 2. Hab. ad St. Martham. Fol. angustiora quam in J. *bracteolata* Jacq. h

36. *variegata*, spicis terminalibus axillaribusque simplicibus, floribus oppositis, calycibus hispitis, foliis ovatis sessilibus. Aubl. guj. 1. p. 12. t. 4. Hab. in Gujanae sylvis. h

37. *stricta*, racemis axillaribus bipartitis, floribus secundis, foliis lanceolato-ellipticis, filamentis glabris. Vahl. symbol. 2. p. 6. Hab. in Malabar.

38. *paniculata*, paniculis axillaribus terminalibusque dichotomis, floribus secundis, filamentis hirsutis, capsulis compressis, foliis lanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 5. Rheed. mal. 9. p. 106. tab. 56. Hab. in India orientali Differt ab omnibus mihi notis, capsulis plano-compressis undique ejusdem latitudinis nec basi angustatis. V.

39. *nutans*, racemis terminalibus, apice nutantibus, floribus resupinatis, foliis dentatis. Vahl. symbol. 2. p. 6. Burm. ind. 10. tab. 5. fig. 1. Hab. in Java.

40. *masuta*, foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pedunculis dichotomis, cor.

galea linearis erecta. Sp. pl. 23. Rheed. mal. p. p. 135. t. 69. Hab. in India. h

41. *scandens*, pedunc. axillaribus trichotomis divaricatis, foliis ovatis acuminatis subrepandis, ramis villosis. Vahl. symb. 2. p. 7. In Malabar. Affinis *J. nasutae*. h

42. *ciliaris*, herbacea hirta, fol. lanceolatis, flor. oppositis sessilibus, bracteis calycibusque setaceis hispidis flore longioribus. Lin. suppl. 84. Jacq. hort. 2. p. 7. t. 104. ☉

**** *Calyce simplici, cor. bilabiatis, labiis divis. Diantherae.*

43. *secunda*, racem. terminalibus compositis: racemulis secundis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis. Vahl. symbol. 2. p. 7. In insula Trinitatis.

44. *debilis*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis ovatis imbricatis ciliatis. Vahl. symbol. 2. p. 15. In Arabia felici. h

45. *violacea*, spicis terminalibus, bracteis lanceolatis imbricatis ciliatis, foliis lanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 15. Cum priore. h

46. *bracteolata*, racemo terminali, pedunculis trifloris, foliis utrinque attenuatis oblongis, caule tetragono, margine scabro. Willd. p. 91. Jacq. coll. 3. p. 253. Icon. rar. Ad Caracas in America. h

47. *Rohrii*, spicis terminalibus compositis imbricatis pubescentibus, bracteis ovatis, fol. ellipticis integerrimis. Vahl. symb. 3. p. 6. In Cayenna.

48. *polystachia*, spicis axillaribus oppositis secundis, bracteis ovatis hirsutis, fol. lanceolato-ovatis. Vahl. 2. p. 7. t. 26. In Cayenna.

49. *retusa*, spicis terminalibus, bracteis obovatis subrepentibus imbricatis, fol. ovatis acuminatis. Vahl. symb. 2. p. 8. In insula St. Crucis.

50. *flava*, spicis terminalibus, flor. geminis, bracteis lanceolatis obtusis, foliis lanceolato-oblongis. Vahl. symb. 2. p. 15. In Arabia felici. h

51. *pedunculata*, glabra, caul. herbaceis erectis, fol. erectis lineari-lanceolatis utrinque angustatis, spicis alternis longioribus pedunculatis paucifloris. Mich. Flor. 1. p. 7. Dianth. americana. L. In littoribus inundatis fluminum Ohio, Mississipi. etc.

52. *punctata*, spicis terminalibus, flor. remotis subverticillatis, bracteis lanceolatis

acuminatis, fol. lanceolato-ovatis. Vahl. 2. p. 15. Hab. in Arabia felice.

53. *eustachiana*, spicis axillaribus terminalibusque, floribus inferne geminis, superne solitariis, bracteis cuneatis. Vahl. 2. p. 15. Jacq. amer. p. 4. t. 4. In insula St. Eustachii. Flor. saepe geminae, vel 3 intra involucrem 6-phyllum. V. h

54. *caracasica*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis acuminatis calyce brevioribus, foliis ovatis acuminatis undulatis pubescentibus. Willd. p. 93. Jacq. Collect. 4. p. 116. Icon. rar. Hab. ad Caracas in America. h

55. *pectoralis*, panicula terminali dichotoma. Vahl. symbol. 2. p. 15. J. caule herbaceo ascendente, fol. lanceolato-linearibus subpaniculatis. Swartz. prod. 13. Jacq. amer. 3. t. 3. In Domingo, Martinica. h

56. *comata*, spicis terminalibus filiformibus, spiculis verticillatis. Vahl. symb. 2. p. 15. Antirrhinum minus angustifolium, flore dilute coerulesco. Sloan. jam. 49. hist. 1. p. 160. t. 103. f. 2. In aquosis et humidis Jamaicae. h

57. *undulata*, pedunc. terminalibus umbellatis simplicibus trifidisque, fol. lanceolatis undulatis. Vahl. 2. p. 8. Burm. ind. 11. tab. 5. f. 1. In Java, Malabar. h

58. *frondosa*, umb. axillaribus compositis pedunculatis, pedunculis elongatis, bracteis obovatis rhombeis obtusis glabris. Vahl. 2. p. 8. In insula Otaheite.

59. *pubescens*, pedunc. axillaribus oppositis quadrifloris pedicellatis, bracteis ovato-subrotundis mucronatis pubescentibus. Vahl. symb. 2. p. 9. In Botanice insula australi. h

60. *cuspidata*, pedunc. axillaribus verticillatis subtrifloris pedicellatis, bracteis cuneatis aristatis, antheris geminis. Vahl. 2. p. 9. Forst. descr. 9. 22. In Arabia felici. Similis *chinensi* ut fere mera varietas: differt modo figura bractearum et numero ant. erarum. Vahl.

61. *lithospermifolia*, pedunc. axillaribus verticillatis unifloris, bracteis linearilanceolatis, foliis oblongis scabris. Willd. p. 95. Jacq. hort. Schoenbrun. Hab. h

62. *biflora*, pedunc. axillaribus bifloris foliis ovatis aequantibus, bracteis subulatis. Vahl. 2. p. 9. In India orientali. h

63. *pauciflora*, flor. axillaribus sessilibus solitariis, fol. ovatis, caule erecto. Vahl. eclog. p. 1. In ins. St. Crucis.

64. *sessilis*, flor. axillaribus solitariis sessilibus, foliis ovatis crenatis. W. Sp. 93. Sp. plant. 1663. J. *sessilis*. Jacq. amer. 3. tab. 2. fig. 2. In insulae St. Eustachii sepius et fruticetis. h

***** *Calyce simplici; cor. riugentibus. Monantherae.*

65. *Adhatoda*, arborea, fol. lanceolato-ovatis, bracteis ovatis nervosis persistentibus, coroll. galea concava. Flor. zeyl. 16. Herm. lugtb. 642. t. 643. Pluk. alm. 9. t. 173. f. 3. In Zeylona. h

66. *Betonica*, spicis terminalibus, bract. ovatis acuminat. venoso-reticulatis coloratis. Rheed. mal. 2. p. 126. t. 21. In India. h

67. *repens*, spic. axillaribus terminalibusque glabris, bract. dorsalibus bifariis margine membranaceis. Vahl. 2. p. 16. *Adhatoda* spicata, flosculos ex foliolis membranaceis. Burm. Zeyl. 7. t. 3. f. 2. In Zeylona. T

68. *sanguinolenta*, pedunc. axillaribus solitariis unifloris alternis, fol. oblongis, caule repente. Vahl. 2. p. 10. In umbrosis Zeylonae. Tota colore sanguineo. V.

***** *Calyce simplici, cor. ringentibus. Diantherae.*

69. *peruviana*, fol. ovatis acutis, spicis brevibus axillaribus et termin. libus, flor. tribracteatis. Cavan. Icon. 1. p. 17. t. 29. Lamarck. encyclop. 1. p. 626. In Lima. T

70. *Ryani*, pedunc. axillaribus terminalibusque oppositis trifloris, bracteis linearibus, fol. ovato-lanceolatis attenuatis. Vahl. Eclog. amer. Fasc. 1. p. 1. In Montverrat legit Nyan. J. *peruvianae* affinis. V.

71. *crinita*, pedunc. axillaribus alternis subquadrifloris pedicellatis, bracteis lanceolatis, ciliatis. Vahl. 2. p. 16. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 338. Jap. 21. t. 4. In Japonia. O

72. *trisulca*, pedunc. axillaribus subtrifloris, flor. sessilibus, foliis oblongis obtusis. Vahl. symbol. 2. p. 10. In Arabia felici. h

73. *hyssopifolia*, pedunc. axillaribus subunifloris, fol. lineari-lanceolatis obtusis. Vahl. symb. 2. p. 16. Just. fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculus trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus. Spec. plant. 21. Mill. dict. t. 13. Pluk. alm. 132. t. 280. f. 1. Habitat in Canariis. h

74. *periplocifolia*, florib. axillaribus

solitariis subsessilibus, fol. ovatis acuminatis. Willd. sp. 1. p. 98. Jacq. collect. supp. p. 5. t. 7. f. 2. Ad Carracas in America torrida. J. *peruvianae* varietas.

75. *orchtoides*, pedunculis unifloris axillaribus, foliis lanceolatis rigidis utrinque acutis. Vahl. symbol. 2. p. 10. Lin. suppl. 85. Ad Cap. b. spei. h

76. *madurensis*, pedunculis axillaribus unifl., fol. oblongis dentatis. Vahl. 2. p. 17. Burm. ind. 9. t. 4. f. 3. Petiv. gazoph. t. 2. f. 8. In Madura. h

77. *cuneata*, flor. axillaribus solitariis sessilibus, fol. obovatis emarginatis. Vahl. symb. 2. p. 10. Ad Cap. b. spei. h

78. *tranquebariensis*, flor. axillaribus solitariis sessilibus, fol. obovatis, ramis incanis. Vahl. symb. 2. p. 17. Lin. suppl. 85. J. *parvifolia*. Lam. encyclop. 1. p. 620. In Tranquebaria. h

79. *odora*, flor. axillaribus sessilibus oppositis, foliis subrotundis, ramis glabris. Vahl. symb. 2. p. 11. Hab. in Arabia felici. Frutex cortice cinereo, ramosus.

***** *Calyce simplici, cor. subaequalibus.*

80. *infundibuliformis*, spicis terminalibus, foliis lanceolato-ovatis quaternis. Vahl. 2. p. 17. Rheed. mal. 9. t. 121. tab. 62. In India. Corolla speciosa alba. h

81. *sinuata*, pedunc. axillaribus trifidis, fol. linearib. sinuato-pinnatifidis. Vahl. 3. p. 11. Forst. prod. n. 13. In insula Tanna. Folia triplicaria vel ultra. h

82. *vincoides*, pedunculis axillaribus subunifloris, foliis ovatis, caule ineremi. Willd. p. 100. Lam. encyclop. 1. p. 621. In Madagascar. Planta ramis parum verrucosis. h

83. *spinosa*, pedunc. subunifloris, foliis (fasciculatis) oblongis, spicis axillaribus. Vahl. symb. 2. p. 17. Swartz obs. 12. Jacq. amer. 2. tab. 2. f. 1. In America meridionalis locis calcareis maritimis. h

84. *microphylla*, foliis aggregatis oblongis subcuneatisque, pedunc. unifloris longitudine foliorum, spinis axillaribus brevissimis rigidis. Vahl. eclog. amer. 2. Lam. encyclop. p. 37. Hab. in insula St. Crucis. T

85. *armata*, fruticosa aculeata, foliis oblongis emarginatis coriaceis nitidis. Swartz prod. t. p. 13. Ej. Flor. p. 28. In rupibus montium Jamaicae. septent. Fl. coccinei. Acul. gemini. An var. prioris? h

86. *acicularis*, fruticosa diffusa spi-

nosa : spinis setaceis , flor. pedunculatis axillaribus solitariis. Swartz. l. c. p. 13. Fl. p. 29. Hab. in calcar. fruticetis Jamaic. austral. Flor. parvi albi.

Obs. Willdenovium, praeunte *Vahl.* secutus sequentes species scorsim enumerare melius duxi, quam male collocare, cum auctores affinitatem cum jam cognitis speciebus haud adnotaverint.

* *Justicia.*

87. *spicata*, herbacea, fol. lanceolato-oblongis, apicis oblongo-ovatis, bracteis inflexis. Flor. peruv. l. p. 8. t. 9. f. a. In *Poguzo* nemoribus. Cor. longissima punicea. h

88. *mucronata*, fol. oblongo-ovatis dentato-spinosis. Fl. P. t. 10. f. b. In *Peruviae* nemoribus. Spica terminal. fere pedalis.

89. *longistaminea*, herbacea, fol. sessilibus oblongis utrinque acutis subrepandis, pedunculis dichotomis. Flor. p. 1. p. 8. t. 10. f. a. In *Pilluo* nemoribus. Fl. purpurei.

90. *sericea*, fruticosa, fol. lanceolatis sericis, margine reflexis, pedunc. axillaribus solitariis. Flor. P. t. p. 9. t. 9. f. 8. Hab. in arvis et agrorum versuris peruvianis. Cor. magn. extus hirsuta coccinea. Ad pleuritidem usurpatur.

91. *racemosa*, herbacea, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. dichotomis, flor. racemosis. Fl. p. l. c. t. 11. f. b. In *Peruviae* nemoribus. Cor. punicea, 2-labiata. T

92. *tenuiflora*, herbacea, foliis lanceolatis, panicula terminali brachiata dichotomaque, flor. sessilibus. Fl. p. p. 9. t. 12. f. a. Ad *Cuchero* vicum in nemorosis. Cor. longis. angusta 2-labiata. T

** *Dianthera.*

93. *multiflora*, herbacea, fol. oblongis, ped. ternis, 2-4-fidis, flor. 2-3 in singulis binis bracteis. Fl. p. 1. p. 10. t. 14. f. b. sub genere *dianthera* uti sequentes hujus operis species. In umbrosis *Peruviae*. Cor. ringens. Fol. edulia sunt. Rad. ad mundificandos dentes inservit. ☉

94. *repens*, suffruticosa, foliis ovatis acutis, pedunculis solitariis geminisque 4-6-fidis, flor. 2-3 in singulis binis bracteis. Flor. peruv. t. 15. f. b. In rupium fissuris *Lima*e, etc. Bractee glandulosae. Flores rubri, passim lutei.

95. *acuminata*, herbacea hirsuta, fol. oblongo-lanceolatis acuminatis, verticillis subsessilibus multifloris, bracteis ciliatis.

Flor. p. t. f. 166. In *Huannuci* et *Huaruae* circuitu ad margines segetum per totum annum floret. Incolae mucilaginem plantae ad conliendum cibi (*locro* nominati) genus extrahunt.

96. *cuspidata*, herbacea, hirsuta, fol. ovatis mucronatis, flor. verticillatis, bracteis ovatis ciliatis mucronatis. Fl. P. p. 11. t. 16. f. a. Crescit cum priore, cui similis. Faux dilatata.

97. *hirsuta*, herbacea, hirsutissima, fol. ovatis acutis, pedunculis geminis, flor. duobus in singulis binis bracteis. Fl. p. 1. p. 11. t. 13. f. b. In *Peruviae* nemoribus. Folia tincturam caeruleam, uti *Indigofera Anil*, praestant. l. c.

98. *secundiflora*, herbacea, fol. lanceolato-oblongis obsolete crenatis, pedunculis solitariis polystachiis, flor. secundis. Fl. p. p. 11. t. 15. f. a. Hab. in *Poguzo* nemoribus. Planta colorans.

Obs. Antherae in hac et a sequentibus speciebus caudatae sunt.

99. *ciliata*, herbacea, fol. lanceolatis, flor. spicatis confertis, bracteis calycibusque ciliatis. Fl. p. p. 12. t. 14. f. a. Crescit cum priore. Cor. purpureo-violacea.

100. *appendiculata*, herbacea, foliis lanceolatis undulatis, basi appendiculatis, pedunculis solitariis ternisque 3-5-fidis parallelis. Flor. peruv. p. 12. t. 11. f. a. Hab. in iisdem cum a antecedentibus locis. Cor. purpurea, calyce duplo longior.

58. **ELYTRARIA.** Cal. coriaceus, 4-partitus : lac. antica fissa. Cor. 5-fida : laciniis subaequalibus. Filam. 2-castrata. Stigmata lignata. Caps. oblonga, 2-locularis, 2-valvis : valvis semiseptiferis. (*Scapus radicalis bracteatus.*)

1. *caroliniensis*, fol. superne integris, nervis subtus glabris. El. *virgata*. Michx. Flor. 1. p. 9. t. 1. *Tubiflora* caroliniensis. Gmel. S. N. L. 2. p. 27. Crescit in humidis Carolinae inferioris. Scapi longissimi.

2. *indica*, fol. crenatis, nervis subtus villosis. *Justicia* acaulis. Lin. Vahl. symb. 2. p. 3. Pluck. Amalth. t. 458. f. 1. In Tranquebaria.

3. *imbricata*, acaulis fol. lanceolatis integerrimis, squamis floriferis 3-dentatis. Vahl. Eclog. amer. t. p. 1. et Icon. t. 1. Antecedentis facie. Rad. in summis non lanata. V.

59. *SANCHFZIA*. *Cal.* 5-partitus : laciniae obtusae. *Cor.* tubulosa, lacin. aequales. *Filam.* 2 castrata. *Anth.* calcarata. *Stigm.* 2-fidum. *Caps.* oblonga, 2-locular., 2-valvis. (*Flor. involucrati.*)

1. *hirsuta*, foliis ovatis utrinque acuminatis, corol. hirsuta. *S. oblonga*. *Flor.* peruv. 1. p. 7. t. 8. f. b. In Peruviae stagnantibus et umbrosis. *Flor.* ut in sequente flavi.

2. *glabra*, fol. ovatis, coroll. glabra. *S. ovata*. *Flor.* per. l. c. f. c. Cum priore. *Pl.* herbacea uti prior.

60. *IYCOPUS*. *Cal.* tubulosus. *Cor.* tubulosa subaequalis : lacin. unica emarginata. *Stam.* distantia.

1. *exaltatus*, foliis basi pinnatifido-serratis. *Lin. suppl.* p. 87. In Italia et Hungaria. *Caule* altissimus. *Cor.* 4-fida, rubro-punctata. \mathcal{T}

2. *vulgaris* (*europaeus* L.), foliis sinuato-serratis appendiculatis. *Hall. helv.* n. 220. *Curt. Flor. Lond. fasc.* 3. t. 2. *Fol.* subtus resinoso-punctata, menthis affinis. In lacubus, ad ripas; etiam in America. β . *Fol.* tenuis lacinialis. *Pluckn. alm.* 1. 45. f. 1. \mathcal{T}

3. *virginicus*, fol. lato-lanceolatis serratis basi integra angustatis, calycibus brevissimis muticis. *Michaux Flor. carol.* p. 14. In Nova Anglia ad Carolinam. \mathcal{T}

4. *uniflorus*, pusillus, radice tuberosa, fol. ovalibus simplicib. obtusis subdentatis. *Michaux. loc. cit.* Ad lacus St. Johan. et Mistassins. Axillae uniflorae.

61. *AMETHYSTEA*. *Cal.* campanulatus. *Cor.* tubulosa sublobata : lacin. infima patentiore concava. *Stam.* approximata.

1. *corymbosa* (*caerulea* Lin.). *Aemethystina montana*, fol. exiguis digitatis 3-fidis serratis, flosc. cum coma e caeruleo janthinis. *Amman Flor. ruthen.* p. 70. *Hall. act. ups.* 1742. p. 51. f. 1. In Sibiriae montosis. \odot

Obs. Nomine generico jam colorem exprimente, illud specificum mutandum putavi.

62. *MONARDA*. *Cal.* cylindricus, striatus. *Cor.* ringens. lab. supe-

riore lineari, filam. simplicia involvente.

1. *fistulosa*, flor. capitatis, fol. cordato-lanceolatis villosis, caule obtusangulo. *Hort. ups.* p. 12. *Mill. dict.* 1. 122. f. 2. In Canada. \mathcal{T}

2. *oblongata*, foliis ovato-lanceolatis villosis planis. *Ait. Hort. Kew.* 1. p. 36. In Amer. boreali. Flores minores quam in N^o. 1.

3. *didyma*, (*coccinea*), fol. ovatis glabris, capitulis verticillatis, florib. subdidynamis, caule acutangulo. *Willd. S. pl.* 1. p. 125. *Mill. dict.* n. 2 et ic. 122. f. 1. *Trew. chret.* 32. t. 66. In Pennsylvania, Noveboraco, et in rivulis montium Carol. \mathcal{T}

4. *rugosa*, fol. ovato-lanceolatis cordatis glabris rugosis. *Aiton. Kew.* 1. p. 36. In America boreali. Flores albi. \mathcal{T}

5. *clinopodia*, flor. capitatis, foliis ovato-lanceolatis, basi rotundatis inaequalibus glabris. *Willd. l. c.* In Virginia. Flores in capitulum bracteis radiatum, pallidi. \mathcal{T}

6. *punctata*, floribus verticillatis, coroll. punctatis, bracteis coloratis. *Hort. ups.* 12. In Virginia, Florida. Corollae luteae punctis purpureis. *Cal.* apice barbatus. σ

7. *allophylla*, fol. variis oblongis acute serratis, calycibus ad limbum barbatis, cor. elongatis gracilibus. *Michaux*, 1. p. 16. In America septentr. *Cor.* carnea.

8. *ciliata*, canescens, bracteis ciliatis, floribus verticillatis, corollis involu. ro longioribus. *Pluk. alm.* 10. t. 164. f. 3. *Moris. hist.* 3. p. 371. t. 8. f. 6. In Virginiae montosis. *Cor.* parva alba.

63. *ROSMARINUS*. *Cor.* ringens, labio superiore bipartito. *Filam.* longa, curva, simplicia cum dente.

1. *officinalis*. *Var.* fol. utrinque virentib. et subtus canis. *Miller.*

64. *SALVIA*. *Cor.* ringens. *Filam.* transverse pedicello affixa.

1. *aegyptiaca*, foliis lanceolatis denticulatis, basi ciliatis, floribus pedunculatis. *Jacq. hort.* t. 108. *Willd. spec. pl.* p. 127. In Aegypto et insulis Canariensibus. *Flor.* parvi. Corolla alba. \odot

2. *dentata*, fol. lineari-oblongis dentatopinnatifidis, verticillis bifloris, lacinis calycinis obtusis. *Aiton. Kew.* 1. p. 37. Ad Cap. b. spec. \mathcal{h}

3. *cretica*, fol. lineari-lanceolatis, flor. digynis, calycibus diphyllis. Willd. arb. berol. p. 352. *S. tenuifolia*. Riv. monop. t. 128. In Creta. h

4. *leucantha*, foliis lineari-lanceolatis crenulatis rugosis, flor. verticillato-spicatis, calycibus tomentosis. Willd. l. c. p. 129. Cavan. Icon. 1. p. 26. t. 24. In Mexico. Cal. violaceus. T

5. *revoluta*, fol. lineari-lanceolatis crenatis venosis, margine revolutis, floribus spicatis, verticillis secundis. Flor. peruv. 1. p. 28. t. 41. f. h. In praeceptis Cantac. Fl. Jan. et Febr. h

6. *angustifolia*, fol. lanceol.-oblongis, inferioribus parce serratis, superioribus subintegris, verticillis 6-floris. Cavan. ic. 4. p. 9. t. 317. In Nova Hisp. T

7. *acuminata*, fol. radicalibus cuneatis, caulibus lineari-lanceolatis utrinque attenuatis, flor. paniculatis, caule altissimo. Venten. descr. p. 50. t. 50. In Carolina meridionali. Flor. cyanci. Styl. apice barbatum, ut in priore. T

8. *nivea*, fol. lanceolatis integris albotomentosis, ramis divaricatis. Thunb. prodr. p. 96. Ad Cap. b. spei. h

9. *rigida*, fol. lanceolat. dentatis tomentosis, ramis erectis virgatis. Thunb. prodr. p. 96. Cum priore. h

10. *punctata*, caule stricto fragili, fol. ovato-lanceolatis serratis, cal. punctato. Fl. peruv. 1. p. 27. t. 39. f. b. In collib. altis Huanc. Foetida, ferruginea. h

11. *officinalis*, foliis lanceolato-ovatis crenulatis, verticillis paucifloris, calycibus mucronatis. Eling. Salv. n. 1. Blackw. t. 10. In Europa australi. Var. fol. auriculatis, angustis et eleganter purpurascens. h

12. *Clusii*, foliis ovato-lanceolatis integris crenulatis, superioribus ramulorum verticillatis ternatisque. Cav. descr. p. 16. Jacq. hort. Schoenbr. 2. p. 37. t. 195. *S. pomifera*. Clus. hist. p. 343. In ins. Archipel.

13. *typhalea*, tomentosa, foliis petiol. lanceolatis auriculatis rugosissimis, calyc. plicato-striatis obtusiusculis. Lam. ill. gen. p. 68. In Oriente. A sequente diversa h

14. *triloba*, tomentosa, fol. petiolatis rugosissimis trilobis: lobo intermedio producto oblongo; lateralibus ovatis obtusis. Lam. suppl. 88. *S. baccifera*. Eling. Salvia. t. 4. *S. quinquefolia*. Riv. monop. t. 131. In Creta, Syria. h

15. *pomifera*, fol. lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus obtusis. Tournesf. cor. 10. itin. 1. p. 92. t. 92. Rivin monop. t. 125. Hab. in Græcia, Syria. Fol. gallas ab insectis ortas profert, unde nomen.

16. *urticifolia*, foliis ovato-oblongis, duplicato serratis, calycibus tridentatis: lacin. summa tridentata. Gron. virg. 8. Moris. hist. 3. p. 395. S. 11. t. 13. f. 31. In Virginia, Fl. rida. Fol. rhomboideo-ovalia, subtus punctata. Michaux. Corollae minutae. T

17. *occidentalis*, fol. ovatis serratis, spicis laxis, bracteis cordatis subtrifloris. Swartz prodr. n. 14; et Ej. Fl. 1. p. 43. In campestr. Ind. occident. ©

18. *polystachia*, caule 4-gono, liis ovato-acutis serratis, subtus glaucis, spicis numerosis terminalibus. Cavan. ic. 1. p. 17. t. 27. In imper. Mexicano. Coroll. parva Coroll. caerule. T

19. *tiliaefolia*, foliis cordatis rugosis acutis, crenato-serratis, floribus spicatis. Cavan. description etc. p. 14. Vahl. symb. 3. p. 7. Hab. in Mexico. Differt a sequente lineis calycinis tantum pilosis, nec viscosis. Vahl.

20. *serotina*, fol. cordatis serratis mollioribus, floribus racemoso-spicatis: corollis vix calycem excedentibus. Mant. 25. Jacq. Collect. 1. p. 130. Icon. rar. 1. t. 3. Ard. spec. 1. p. 10. t. 1. Hab. in Chio. ©

21. *chamaedryoides*, caule decumbente, fol. ovatis crenatis, subtus tomentosis. Cav. Icon. 2. p. 77. t. 197. In nova Hispania caerule.

22. *procumbens*, fol. ovatis aut ellipticis, caule ramosissimo radicante, spicis gracilibus assurgentibus. Fl. P. p. 27. t. 39. f. a. In versuris et ruderalis Limae, etc. Cal. villis glanduliferis. Cor. albo-caerule. Ad obstructions usurpatur. T

23. *tenella*, fol. cordatis, caule filiformi repente, spicis ascendens. Swartz prodr. 14. Icon. tab. 2. et Flora p. 45. In montibus graminosis Jamaicae austral. ©

24. *rhombifolia*, fol. rhombeis cordatis serratis, spicis terminalibus ternis, verticillis 4-8-floris. Flor. peruv. p. 26. t. 36. f. h. In Peruviae collibus arenosis. Cal. viscos. Cor. fauce plica a.

25. *papilionacea*, fol. ovato-lanceolatis serratis, utrinque acutis, coroll. limbo 4-fido. Cav. icon. 4. p. 9. t. 319. In nov. Hip. Laciniae lineares corollae in crucem ut plurimum expansae desiderantur in aliquo flore. C. T

26. *viridis*, fol. oblongis crenatis, corollarum calca semiorbiculata, calycibus fructiferis reflexis. Jacq. misc. 2. p. 366. Icon. rar. 1. tab. 4. β . Desf. atlant. p. 93 t. 1. In Italia et circa Tunetum. An Var. sequentis? ☉

27. *Horminum*, foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis. Horminum corno purpureo-violacea Tournef. inst. 178. Barr. obs. 226. ic. 1233. Lob. ic. 555. In Graecia, Apulia. Bract. rubrae et violac. ☉

28. *virgata*, fol. oblongis cordatis rugosis crenatis, pilis caulis calycisque apice glandulosis. Aiton. Kewens. 1. p. 39. Jacq. hort. 1. p. 14. t. 37. In Armenia. ☿

29. *sylvestris*, fol. cordato-lanceolatis undulatis biserratis maculatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus. Scop. carn. ed. 2. n. 32. Jacq. aust. 3. p. 7. t. 212. In Austriae, Bohemiae agrorum marginibus, vineis. ☿

30. *nemorosa*, foliis cordato-lanceolatis planis subsinuatis, bracteis coloratis, corollae labio infimo reflexo. L. In Austria, Tartaria. Spicae ante florescentiam tetragonae. ☿

31. *syriaca*, fol. cordatis dentatis: inferioribus repandis, bracteis cordatis brevibus acutis, calycibus tomentosis. Sp. pl. 36. Bauh. prodr. 114. t. 114. Statura S. pratensis. Corollae albae, parvae.

32. *viscosa*, fol. oblongis obtusis eroso-crenatis viscidis, florib. verticillatis, bracteis cordatis acutis. Jacq. ic. rar. 1. t. 5. misc. 2. p. 328. In Italia. ☿

33. *haematores*, fol. cordato-ovatis rugosis tomentosis, calycibus hispulis, radice tuberosa. Horminum sylvestre maculatum tuberosum. Moris. hist. 3. p. 394. s. 11. t. 14. f. 15. In Italia, Istria. Caulis viscidus. Folia longissima obtusa. ☿

34. *pratensis*, foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis cala subviscosa. Bull. herb. 235. β . foliis in profundas lacinias incis. Tournef. inst. 179. Ad margines viarum, ad sepes in pratis, per totam aestatem florens.

Y. praecox, minor, fol. radical. profunde sinuatis obtuse dentatis. S. pratensis minor. Savi Flor. pisan. 1. p. 22. In Palazzetto et Migliarino crescit. Febr. et Mart. foret, 5 poll. modo alta, et cor. lab. super. glandul. destituta. Distincta spec. videtur.

35. *indica*, fol. cordatis lateralib. sublobatis: summis sessilibus, verticillis sub-

nudis remotissimis. Mant. 318. Jacq. hort. 1. 78. Moris. hist. 3. s. 11. t. 13. f. 16. In India. Corolla magna, caerulea; Lab. sup. falcato compresso emarginato: L. inferiore trifido, intermedia magna saecata biloba; fundo albido: lobis maculis violaceis, margine albo, mox luteo: laciniae lateralibus horizontalib. lanceolatis perrect. replicatis; adeoque labium inferius repraesentat Fucum s. Apem. Linn. ☿

36. *dominica*, fol. cordatis obtusis cren. subamentosis, corollis calyce angustiorib. Mill. Swartz. obs. 18. t. 1. f. 1. In camp. et fruticetis Indiae occidentalis. Cal. uno latere viridi-rubens. ☿

37. *lyrata*, hirsuta, fol. variis: radical. lyrato-sinuosis, caul. simplicibus subdiphyllis, spica interrupta, cal. 5-spinescentibus. Mich. Flor. amer. In Canada. Vere flor.

38. *Verbenaca*, fol. serratis sinuatis laciniisculis, coroll. calyce angustioribus. Virid. cl. Horminum, Verbenacae laciniis, angustifolium. Triumfetti obs. 63. t. 66. In Europae et Orientis pascuis. Quoad folia variat. Desf. atlant. p. ☿

39. *runcinata*, scabra, foliis runcinato-pinnatifidis dentatis, floribus spicatis verticillatis. Lin. suppl. 89. Ad Cap. b. spei.

S. *clandestina*, fol. serratis pinnatifidis rugosissimis, spica obtusa, corollis calyce angustioribus. Sp. plant. 36. Barr. rar. 24. t. 220. In Italia, Africa. Calyces pilis glutinosis, labio superiore plicato. ♂

40. *austriaca*, foliis ovatis cordatisque eroso-sinuatis, radicalib. (terrae adpressis) petiolatis, caule subaphyllo, staminibus corolla duplo longioribus. Jacq. aust. 2. p. 8. t. 112. In Austria, Hungaria, Moldavia. ☿

41. *pyrenaica*, fol. obtusis erosis, staminibus corolla duplo longioribus. Roy. Hormin. pyrenaicum glutinosum Anguria folio. Herin. parad. 187. t. 187. In Pyrenaeis. Fol. lata, sinuata.

42. *disermas*, foliis cordato-oblongis erosis, staminibus corollam aequantibus. Sp. plant. Arduin spec. 1. p. 9. t. 1. Barr. ic. 187. In Syria. Odor gratus. ☿

* *rugosa*, foliis oblongo-lanceolatis eroso-crenatis rugosis pilosiusculis, stamin. corolla brevioribus. Aiton. Kewens. 1. p. 42. Ad Cap. b. spei. ♀

43. *nubia*, foliis oblongis subcordatis inaequilateralibus rugosis crenatis basi subauritis. Aiton. Murr. comm. goett. 1778. p. 90. t. 3. In Africa. ☿

44. *nilotica*, foliis sinuatis angulatis crenato-dentatis, calycum densib. spinosis, angulis margineque faucis ciliatis. Murr. comment. goett. 1748. p. 88. t. 2. Jacq. hort. 3. t. 92. In Aegypto. \mathcal{T}

45. *mexicana*, fol. ovatis utrinque acumatis erratis. Cavan. icon. 1. p. 16. t. 26. Dil. elth. 39. t. 254. f. 330. In Mexici humentibus. Cor. caerulea. \mathcal{H}

46. *amethystina*, fol. cordatis acutis serratis cultus lanatis, verticillis nudis, calycibus trifidis, corollis pubescentibus Smith. icon. inel. fasc. 2. p. 27. t. 27. In Nova Granada. \mathcal{H}

47. *fulgens*, fol. cordatis acutis crenatis rugosis cubus tomentosis, verticillis nudis, calycibus trifidis, corollarum-galea villosa. Willd. spec. pl. 1. p. 150. Cavan. icon. 1. p. 15. t. 23. In Mexico. \mathcal{T}

48. *acuminata*, fol. latis cordatis serratis acuminatis, flor. verticillatis, cor. longis glabris, bracteis rhomboideis coloratis deciduis. Fl. per. 1. p. 24. t. 37. b. In praeruptis Cantae. Cor. incarnata. Viscosa, hirsuta. \mathcal{T}

49. *notosa*, fol. cordatis, superioribus ovatis serratis, pedunculis axillaribus apice notosis. Flor. peruv. 1. p. 25 t. 42 f. a. S. *formosa*, L'Héritier; *leonuroides*, Glavin. In Peru. Cor. coccinea, galea hirsuta. \mathcal{H}

50. *longiflora*, fol. cordatis acutissimis hierensis, spicis longis nutantibus, cor. longissimis, cal. inflato bracteisq. coloratis. Fl. peruv. p. 23. t. 40. f. a. In praeruptis profundis Tarmae. Cor. color. laccae. \mathcal{H}

51. *tubiflora*, fol. cordatis crenatis subpilosis, calycibus trifidis, cor. longissimis tubulosis, staminibus exsertis. Smith. icon. inel. fasc. 2. p. 26. t. 26. Habit. Huanae in agro Limensi. Cor. coccinea. \mathcal{H}

52. *tubifera*, fol. ovatis acutis serratis mollibus, floribus spicatis erectis, tubo longissimo. Cavan. icon. 1. p. 16. t. 25. S. *longiflora*. Willd. s. pl. p. 141. In Mexico. Cor. coccinea pubesc., lab. inf. reflexum. \mathcal{T}

53. *oppositiflora*, fol. ovatis crenatis rugosis, spicis terminalibus, flor. oppositis. Flor. per. p. 26. t. 43. f. a. Hab. in locis altis Tarmae. Cor. turgida, coccinea, cal. 4-plo longior. \mathcal{T}

54. *excisa*, foliis cordatis obtusis basi inequalibus serratis, spicis nutantibus, flor. oppositis binis verticillatisque, cor. hirsutae lab. infer. concavo recto. Flor. per. p. 25. t. 36. f. a. In Peruviae montibus arenosis. Cor. coccinea.

55. *coccinea*, fol. cordatis acutis tomentosis serratis, corollis calyce duplo longioribus angustiorib. Ait. Kew. 1. p. 43. Murr. comment. goett. 1748. p. 86. t. 1. Hab. in Florida juxta fluvios. \mathcal{H}

56. *pseudococcinea*, fol. ovatis acutis serratis basi inequalibus, caule piloso, corollis calyce duplo longioribus. Willd. l. c. foliis ovatis acutis serratis, utrinque villosis, racemo terminali verticillato, caul. piloso. Jacq. ic. rar. 2. tab. 200. Collect. 2. p. 302. In America calidior. \mathcal{H}

57. *plumosa*, fol. cordato-ovatis venosissimis, pedunc. 4-5-axillaribus, cor. tubulosa hirsuta, stylo plumoso. Flor. peruv. p. 26. t. 37. f. a. In Tarmae praeruptis. Cal. tubul. venosus. \mathcal{H}

58. *integrisfolia*, fol. ovatis integerrimis avenis subrepandis, spicis brevibus, cor. longis, staminibus exsertis. Fl. per. 1. p. 26. t. 35. f. b. In Peruv. juxta aquas thermal. Chocchu et ad rupes. Cor. croceo-lucea. \mathcal{H}

59. *racemosa*, fol. cordatis acutis sublanceolatis serratis, racemis terminalibus compositis. Flor. per. p. 25. In versuris et ruderalis Huanae. Primo vere floret. Cor. obscure caerulea. Fol. saepius purpureo aut livido maculata. \mathcal{H}

60. *violacea*, hirsuta, foliis ovatis crenatis, flor. spicatis, verticillis 6-floris, cor. inferiore lato dependente. Fl. per. 26. t. 43. b. Cum priore. \odot

61. *hispanica*, foliis ovatis, petiolis utrinque mucronatis, spicis imbricatis 4-gonis, calycibus trifidis. Kniph. orig. t. 2. n. 78. Sahb. hort. rom. 3. t. 22. Ard. spec. 10. t. 2. In Italia et in Hispania. Spica tetragona, bracteis ovatis, longitudine calycum, ciliatis. Cor. parva caerulea.

62. *prismatica*, fol. ovato-acutis serratis, spicis primo prismaticis, inferne nudis, terminalibus. Cav. descrip. p. 14. In Mexico. Cor. caerulea.

63. *circinata*, pilosa, fol. longe petiolatis cordatis crenatis, bract. ovato-acutis ciliatis, cal. lobis obtusis, cor. galea emarginata. Cav. icon. 4. p. 9. t. 318. In Mexico. Cor. caerulea. \mathcal{T}

64. *abyssinica*, fol. inferiorib. lyratis, summis cordatis, floribus verticillatis, calycibus mucronatis ciliatis. Jacq. ic. rar. 1. tab. 6. In Africa. \mathcal{T}

65. *mitis*, fol. ovatis acutis serratis tomentosis, spicis terminalibus: intermedia longiori asphylla, verticillis multifloris. Fl. peruv. p. 27. In Cantae praeruptis calidis Vere. Styl. villosus. Sem. fulva, venosa. \mathcal{T}

66. *verticillata*, fol. cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollae labio inferiori incumbente. In Germania, Austria, Helvetia.

67. *napifolia*, foliis cordatis crenato-dentatis, inferioribus hastatis lyratisque, verticillis subnudis, labio superiore brevior. Aiton. Kewens. p. 44. Jacq. hort. 2. p. 71. t. 152. In Italia, Gallia. $\overline{\text{T}}$

68. *glutinosa*, fol. cordato-sagittatis, serratis acutis, florum flore luteo. Riv. t. 57. Moris. hist. 3. p. 304. s. 11. t. 13. f. 18. In Europae lutosi. Cor. falcata. $\overline{\text{T}}$

69. *triangularis*, herbacea, villosa-hispida, fol. triangularibus dentatis, r. mic patulis. Thunb. prod. p. 96. Ad Caput bonae spei.

70. *deltoidea*, fol. deltoideis crenatis, cal. tubulosus venosus, coroll. ventricosa. S. Negla. Cav. ic. 5. p. 33. t. 455. Habit. in fundo de Negla, in regno Mexic. Cor. coccinea. $\overline{\text{T}}$

71. *sagittata*, viscosa, hirsuta, foliis sagittatis crenatis acutis. Flor. per. t. p. 23. t. 35. f. a. In ruderatis Tarmae regni Per. Cor. obscure violacea. Semen corpori glandul. insidet. $\overline{\text{T}}$

72. *cuspidata*, fol. cordato-sagittatis inaequaliter serratis, spicis longis, verticillis multifloris remotis, calyc. cuspidatis. Flor. peruv. l. c. t. 40. f. b. In collibus prope Cheuchin. Apr. Maj.

73. *patens*, villosa, foliis subhastatis crenato serratis, flor. oppositis, cor. laciniat. latissima. Cav. ic. 5. p. 33. t. 454. In Novae Hisp. umbrosis.

74. *Barrelieri*, foliis inaequaliter dentatis acuminatis cordatis, basi angulato-hastatis, verticillis subnudis. Willd. l. c. p. 143-144. Elling. Salv. n. 46. Barr. rar. p. 236. t. 186. In Hispania. $\overline{\text{T}}$

75. *canariensis*, fol. hastato-triangularibus oblongis crenatis obtusis. Kniph. orig. cent. 6. t. 77. Pluk. alm. 185. t. 307. f. 2. In Canariis. Petioli longi. Calyx 5-fidus, hispidus. $\overline{\text{h}}$

76. *aurita*, villosa herbacea, foliis ovatis dentatis auriculatis, flor. verticillato-spicatis. Lin. suppl. Ad Cap. b. spei.

77. *africana*, fol. subrotundis serratis: basi truncatis dentatis. Hort. cliff. 13. Mill. dict. n. 11. ic. 150. t. 225. f. 1. S. fol. cuneiformib. serratis subtus tomentosis. Thunb. prod. p. 96. Comm. hort. 2. p. 181. t. 51. In Cap. b. spei locis argillosis. $\overline{\text{h}}$

78. *aurea*, frutescens, fol. subrotundi integerrimis: basi truncatis dentatis, cal. campanulato 3-lobo. Elling. Salvia n. 9. Comm. hort. 2. p. 183. t. 92. Ad Cap. b. Spei juxta rivulos.

79. *colorata*, fol. ellipticis subintegerrimis tomentosis, calycis limbo membranaceo colorato. Mill. ic. 150. t. 225. f. 2. Moris. hist. 3. s. 11. t. 16. f. ult. Ad Cap. bonae spei arenosa, maris litora. Cal. campanulati laciniis rotundatis, sanguinei. $\overline{\text{h}}$

80. *acetabulosa*, fol. obovatis dentatis, calycibus campanulatis patentibus pilosis, caule fruticoso. Mant. 25. S. syriaca, cissi feminae foliis, acetabulis (calycibus) Moluccae. Moris. hist. 3. p. 399. In Oriente. $\overline{\text{h}}$

81. *paniculata*, fol. obovato-cuneiformibus denticulatis nudis, caule frutescente. Mant. 25 et 511. Thunb. prod. p. 96. S. minor aethiopica, fol. chamaeleagni asperis. Breyn. cent. 169. t. 5. Moris. hist. 3. s. 11. t. 16. f. 1. Mill. ic. 150. t. 225. f. 1. Ad Cap. b. spei. $\overline{\text{h}}$

82. *spinosa*, fol. oblongis repandis, cal. spinosis, bracteis cordatis mucronatis concavis. Mant. 511. Jacq. ic. rar. 1. tab. 7. Moris. hist. 3. p. 392. s. 11. t. 16. f. 2. In Aegypto. Calyx fructus aridus, compressus, striatus, dentibus subulatis, ut in Hyosciamo pungentis. $\overline{\text{h}}$

83. *tingitana*, foliis cordatis eroso-dentatis, calycibus spinosis, bracteis integerrimis cordatis mucronatis concavis ciliatis. Willd. l. c. p. 147. Roth. Abh. p. 25. Riv. t. 62. In Africa boreali. Planta foetidissima. $\overline{\text{h}}$

84. *Sclarea*, fol. rugosis cordatis oblongis villosis serratis, bracteis floralibus calyce longioribus concavis acuminatis. Sclarea vulgaris. Blackw. t. 122. Lobel. ic. 556. In Syria, Italia. $\overline{\text{h}}$

85. *involuta*, foliis ovato-lanceolatis serratis, florib. spicatis terminalibus, bract. maximis coloratis. Cav. ic. 2. P. 3. t. 105. In Mexico. Plan. a pulcherrima numero atque florum magnitudine, quarum spica terminatur bracteis in strobilum dilute roseum complicatis. Cav. $\overline{\text{h}}$

86. *Aethiopia*, fol. oblongis erosis lanatis, bracteis recurvatis subspinosis. Jacq. austr. t. 211. In Africa, Gallia, Austria. Labium inferius antice cohaeret et saccum format. $\overline{\text{h}}$

87. *foetida*, fol. cordato-ovatis rugosis villosis, flor. verticillato-spicatis, cal. fructiferis compressis. Desf. atl. p. 24. In agro tunetano. $\overline{\text{h}}$

17. *compressa*, fol. ovali-oblongis crenatis rugosis, flor. verticillato-paniculatis: summis sterilibus, cal. fructiferis compressis. Venten. descr. p. 59. t. 50. Hab. prope Mossoul in Bagdad. Stam. 4: duo ster. Panic. contracta. ♂

88. *atlantica*, viscosa, fol. radicalibus cordatis lanatis sinuato-erosis, bracteis concavis mucronatis, flor. summis evanidis. S. *patula*. Desf. l. c. 25. Tota villosa, caul., rami et cal. glutin. ♂

89. *bicolor*, fol. cordato-oblongis multifidis hirsutis, verticillis omnibus fertilibus, bracteis reflexis calyce brevioribus, cor. lobo intermedio saccato. Desf. atl. 1. p. 22. t. 2. Schousboe observ. ed. germ. Lips. p. 5. Jacq. Schönbr. 1. p. 4. t. 7. Inter segetes circa Flemisn. D. In rudertatis urbis Tingidis. S. ♂

90. *algeriensis*, fol. integris, inferioribus ovatis in petiolum decurrentibus, cal. dentato-spinosis nutantibus, bracteis reflexis. Desf. loc. cit. p. 23. t. 3. Prope Macane Algeriae. ☉

91. *crassifolia*, caule erecto, fol. crassis cordatis lobatis acutis, cor. lab. inferiore brevior. Cavan. descr. p. 15. Habitat? Cor. caerulea.

92. *phlomoïdes*, foliis lanceolatis subintegris, cauleque simplici lanato-viscosis. Vahl. symbol. 1. p. 7. Introd. in Oryct. arrag. 158. t. 4. Roemer script. pl. hisp. lusit. 10. t. 1. f. 1. Hab. in montibus circa Siguenzam Hispaniae.

93. *argentea*, fol. dentato-angulatis magnis eros lanatis, vertic. summis sterilibus, bracteis concavis. Boerh. lugdb. 1. p. 163. Molis inter S. *Sclaream* et *Aethiopis*.

94. *pinnata*, fol. pinnatis: pinnis villosis crenatis, extrema majore ovata. Etling. Salv. n. 14. Boerh. lugdb. 1. p. 167. t. 167. Cal. ovatus inflatus, corolla non falcata.

95. *japonica*, fol. bipinnatis glabris. Thunb. jap. p. 22. t. 3. Kaempf. amoen. fasc. 5. p. 887. In Japonia. S. *pinnatae* affinis. ☉

96. *incarnata*, foliis pinnatis serratis, calicibus procumbentibus hirsutis, bracteis lanceolatis longis. Moris. hist. 3. p. 394. t. 11. t. 13. f. 19. Pluk. alm. 196. t. 194. f. 6. W. In Oriente. Caulis procumbentes. Flores verticillati magni carni. Etl. ♀

97. *rosaeifolia*, foliis pinnatis incanis, foliolis serratis, calycib. ringentibus. Smith. icon. ined. fasc. 1. p. 5, t. 5. In Armenia. ♀

98. *Scabiosae*, villosa, foliis subbipinnatis: pinnulis 2-3-partitis integris dentatisque. Lam. Journ. d'hist. nat. p. 44. t. 27. In Peru. ♀

99. *hablitziana*, villosa, fol. pinnatis integerrimis: foliolis lanceolatis subaequalibus, superioribus geminatis. Willd. in Schrad. bot. Journ. 1. p. 289. t. 2. In Tauria. Fol. subtus incana. Cor. magna. Cal. campanul. W. ♀

100. *interrupta*, fol. interrupte pinnatis, caule erecto. Schousb. p. 6. t. 1. Cor. magna, caeruleo-alba, odorata. In Barbaria. h

101. *ceratophylla*, foliis rugosis pinnatifidisque lanatis: verticillis summis sterilibus. Lin. Kniph. cent. 6. t. 78. In Persia. ♂

102. *ceratophylloides*, fol. pinnatifidis rugosis villosis, caule paniculato ramosisimo. Arduin. spec. 2. p. 12. t. 12. f. 2. *S. exasperata*. Cav. ic. 6. p. 38-39. t. 558. In Sicilia, Aegypto. ♂

103. *Forskælei*, fol. lyrato-auriculatis, caule subaphyllo, corolla galea semibifida. S. *bifida*. Forsk. descr. p. 202. Habit. in Oriente. Facies S. *nutantis*. ♀

104. *nutans*, foliis cordatis inaequaliter basi excisis, caule subnudo, spicis ante florentiam cernuis. Sp. pl. 39. Kniph. cent. 7. t. 79. Hall. Comment. goett. 1. p. 210. t. 11. In imperio Rutheno et in Hungaria. f. S. *nutans*, fol. oblongo-cordatis, caule simplicissimo subaphyllo, racem. florentibus pendulis. Plant. rarior. Hung. Dec. 7. p. 63. t. 62. Flor. majore. An f. diversa? ♀

65. *COLLINSONIA*. Cor. inaequalis: labio inferiore margine multifido-capillari. Sem. 1, perfectum.

1. *canadensis*, foliis cordato-ovalibus calycis dentibus brevibus subulatis tubo subaequalibus. Michaux Flora 1. p. 17. Willd. Sp. pl. 1. p. 152. In Americae sylvis umbrosis. ♀

2. *tuberosa*, radice tuberosa, foliis ovalibus utrinque angustato-acutis, calycis dentibus setaceis tubo longioribus. Mich. 1. p. 17. In Carolinae umbrosis. Sept. fl. ♀

3. *scabra*, fol. ovatis subcordatis pilosisculis, caule pilosiusculo scabrido. Ait. Kew. L. c. Habit. in Florida. ♀

66. *MORINA*. *Cor.* inaequalis. *Cal.* fructus 1-phyllus, dentatus; *Cal.* floris bifidus. *Sem.* 1, sub calyce floris.

1. *persica*. Linn. *M. orientalis*, carlinae folio. Tourn. *cor.* 48. it. 3. p. 132. t. 132. In Persia ad Hispaham. \bar{h}

67. *SCIURIS*. *Cal.* 5-fid. *Cor.* inaequalis : labio superiore trifido; inferiore bifido brevior. *Stam.* 5 : 3 castrata, villosa. *Caps.* 5, coalitae.

1. *aromatica*. Willd. sp. pl. 1. p. 153. *Raputia aromatica*. Aubl. gujan. 2. p. 6-o. t. 272. Lam. illustr. 1. p. 32. t. 10. Habit. in sylvis Gujanae. Frutex bipedalis, ramis oppositis divaricatis. Folia ternata. Spicae axillares nutantes. Willd. \bar{h}

68. *LITHOPHILA*. *Cal.* infer., tri-phyllus. *Cor.* tripetala. *Nectar.* diphyllum. *Pericarp.* biloculare?

1. *muscoides*. Swartz Fl. Ind. occid. 1. p. 48. Hab. in Navazae rupibus. Pl. minutissima.

69. *MARGYROCARPUS*. *Cal.* 4-5-partitus. *Cor.* o. *Stigm.* petatum. *Drupa* 1-sperma.

1. *setosus*. Flor. per. 1. p. 28. t. 8. f. 1. Hab. in Regni chilensis collibus aridis. Aest. Caul. procumb. ramosiss. Fol. pinnata. \bar{h}
- *Obs.* Huc etiam retulit *Empetrum* pinnatum. Lam. 3. *Ancistrum barbatum*. Fj. ill. gen. p. 77. Cl. Willdenow in Nov. act. Nat. curios. Berol. v. 2.

70. *ANCISTRUM*. *Cal.* 4-phyllus : aristis hamatis. *Cor.* o. *Stigma* multipartitum; *Drupa* exsucca, hispida, 1-locularis.

1. *Sanguisorbae*, caulib. decumbentibus, foliis obovatis aequaliter dentatis, subtus sericeo-pubescentibus, spicis globosis. Willd. spec. pl. 1. p. 153. *A. anserinaefol.* Lam. ill. p. 44. t. 12. f. 1. In Nov. Zeelandia. Pet. ovata. *Stigm.* penicill.

2. *repens*, caulibus repentibus, foliol. ovato-oblongis argute serratis lineatis, capillis globosis. Venten. hort. cels. p. 6. t. 6. Habitat in Peru. Suffrutex. Pet. oblonga. *Stigma* cristatum.

3. *magellanicum*, foliol. ovato-incisopinnatifidis, spica capitato-globosa. Lam. l. c. f. 2. Hab. in freto Magell. β . *hu-*

mile, foliol. latioribus serratis. *Poterium* H. P. Lam. l. c.

4. *lucidum*, caul. subdemersis, pedunc. scapiformibus, spicis ovatis, foliol. oblongis integerrimis acutis subfasciculatis. Aiton. Kew. 1. p. 15. Hab. in insulis Falklandiae. *Stigma* fasciculata, atrosanguinea. \bar{h}

5. *latebrosus*, caul. demersis, pedunc. scapiformibus, spicis elongatis, foliol. oblongis incis. villosis, fructibus undique armatis. Aiton. Kew. 1. p. 16. *Agrimonia decumbens*. Lin. suppl. 251. Ad Cap. b. spei. Folia radicalia Potentill. *Anserinae*. \bar{h}

71. *ARUNA*. *Cal.* 5-partitus : laciniis reflexis. *Cor.* nulla. *Bacca* unilocularis, 1-vel 2-sperma.

1. *gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 16. t. 5. Habit. in sylvis desertis remotis Gujanae. Arbor ramis divaricatis.

D I G Y N I A.

72. *ANTHOXANTHUM*. *Cal.* Gluma bivalvis, uniflora. *Cor.* Gluma bivalvis, acuminata, aristata. *Sem.* 1.

1. *oloratum*, spica oblonga ovata, flosculis subpedunculatis arista longioribus. Fl. dan. t. 666. Schreb. gram. t. 5. Hab. in pratis, sylvis. \bar{h}

2. *indicum*, spica lineari, flosculis sessilibus arista longioribus. Flor. zeyl. 25. Pluk. alm. 177. t. 119. f. 1. In India.

3. *crinitum*, panicula coarctata, aristis longissimis. Forst. prodr. n. 18. Lin. suppl. 90. In Nova Zeelandia. Gramen altum.

4. *avenaceum*, spica secunda, calycib. pilosis, flosculis arista longa torta geniculata. Retz. obs. 3. p. 8. Hab. in Malabar. Facies Avenae. Gramen semipedale. Retz.

73. *GUNNERA*. *Ament.* thyrsoidum. *Cal.* superus, bidentatus. *Cor.* o. *Styl.* 2-partitus. *Drupa* 1-sperma, coronata.

1. *perpensa*, foliis cordatis laevibus. Lin. Syst. pl. ed. Reich. 4. p. 42. Pluk. alm. p. 68. t. 18. f. 12. *Perpennum bispennum*. Burm. prodr. p. 26. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. radical. dentato-crenata. Scap. nudus. \bar{h}

2. *scalra*, foliis palmatis scabris. Fl. per. 1. p. 29. t. 44. f. 2. *G. chilensis*. Lam. encycl. bot. 3. p. 61. Panke tinctoria. Molin. Cüll. p. 150. t. 1. In palustrib. Chili.

3. *magellanica*, dioica, fol. reniformib. Lam. l. c. Hab. in freto Magellanico. Fol. radical. venosa crenata Tussil. *alpinae* fere. — Lamarckius putat hocce genus potius ad Classem dioeciam pertinere.

TRIGYNIA.

74. *PIPER*. *Spadix* amentiformis. Cal. o. Cor. o. Styl. brevissimus. Stigm. 3. manifesta; aut (in *Peperomiis*) punctum vel maculam 1-2 tantum sistentia. *Bacca* 1-sperma. (*Stamina* 2, 4, 5 et 6.)

1. *nigrum*, foliis ovatis subseptemnerviis glabris, petiolis simplicibus. Flor. zeyl. 26. Willd. sp. pl. Lin. p. 159. *P. aromaticum*. fol. ovatis acutis 5-nerviis glabris, petiol. simplicissimis, spicis inferne substerilibus. Lam. illustr. p. 79. t. 23. Blackw. t. 348. Hab. in India. h

2. *sylvestre*, fol. subcordatis obliquatis 3-nerviis, spic. fructiferis laxiusculis. Lam. l. c. In insul. Franciae, Malabar. Flor. dioici. L.

3. *Betle*, fol. ovatis oblongiusculis acuminatis septemnerviis, petiolis bidentatis. Burm. zeyl. 193. t. 82. f. o. *Betela-codi*. Reed. msl. 7. p. 29. t. 15. Habitat in India. h

4. *Cubeba*, foliis oblique ovatis a. oblongis venosis acutis, spica solitaria pedunculata oppositifolia, fructib. pedicellatis. Lie. suppl. 50. Hab. in Jayae et Guineae sylvis. Flor. dioici. Lam.

5. *capense*, fol. ovatis nervosis acuminatis nervis villosis. Lin. suppl. 50. Ad Cap. h. spei. Distinguitur venis pagina inferiori villosis. L.

6. *Malamiris*, fol. ovatis acutiusculis subtus scabris: nervis quinque subtus elevatis. Rumph. amb. 5. p. 336. t. 116. f. 2. In India utraque.

7. *discolor*, foliis lato-ovatis quinque-nerviis glaberrimis, postice discoloribus, spicis laxioribus, flosculis remotioribus. Swartz prod. 15. et Flor. t. p. 52. Gu el. In N. Comm. Petrop. v. 12. t. 10. Hab. in Jamaica, montib. aliis.

8. *medium*, fol. ovatis acuminatis obliquis, basi subcordatis, quinquenerviis, spicis axillaribus nutantibus. Will. loc. cit. p. 160. Jacq. Icon. rar. t. 8. Collect. t. p. 141. Affine sequenti.

9. *Amalago*, fol. lanceolato-ovatis quinquenerviis rugosis. Mill. dict. n. 3. Swartz

obs. p. 19. Sloan. Hist. t. p. 134. t. 87. f. 1. Pluk. alm. 297. t. 215. f. 2. In fruticibus montosis Jamaicae et Hispaniolae. h

10. *Siriboa*, foliis cordatis subseptemnerviis venosis. Rumph. amb. 5. p. 340. t. 117. f. 2. In India. h

11. *excelsum*, foliis orbiculato-cordatis subseptemnerviis, pedunculis terminilibus solitariis bifidis, caule arboreo. Forst prodr. In Nova Zeelandia. h

12. *longum*, fol. cordatis petiolatis sessilibusque. Blackw. t. 356. Rumph. amb. 5. p. 335. t. 116. f. 2. In India. h

13. *methysticum*, fol. cordatis acuminatis multinerviis, spicis axillarib. solitariis brevissimis pedunculatis patentissimis. Forst. plant. escul. aust. p. 76. n. 50. In insulis Societatis, Americorum, et Sandwichiae. h

14. *latifolium*, fol. orbiculato-cordatis novemnerviis, spicis axillaribus aggregatis pedunculatis. Forst. prod. n. 22. Lin. suppl. 91. Folia magna profunde cordata.

15. *decumanum*, fol. cordatis novemnerviis reticulatis. Jacq. Collect. 4. p. 128. Icon. rar. Plum. amer. 59. t. 76. Habitat in Martinica et ad Caracas. Affine nimis *P. reticulato*. h

16. *ovatum*, fol. ovatis venosis multinerviis basi aequalibus, baccis pedicellatis distantibus, ramis laevibus. Vahl. Eclog. 1. t. 1. In insul. Trinit. h

17. *Nhamli*, foliis cordatis novemnerviis venosis glabris attenuatis basi sinu profundo. Vahl. l. c. (*P. caudatum*). Act. Soc. hist. nat. 1. p. 105. Ind. occid.

18. *reticulatum*, fol. cordatis septemnerviis reticulatis. Swartz. obs. p. 19. Plum. amer. 57. t. 75. Hab. in Martinicae Brasiliae et Hispaniolae fruticetis. h

19. *mite*, fol. cordatis-acutis 13-19-nerviis reticulatis, spicis longiorib. subulatis erectis. Flor. peruv. l. p. 37. t. 48. f. a. In sylvis Cuchero. Rami mites. h

20. *Carpurija*, foliis cordatis acutis acuminatisque coriaceis, margine revolutis, spicis erectis. Fl. peruv. t. 63. f. b. Hab. cum priore. Arbor 3-orgyalis. Fol. fragrantissima, ad indigestiones ab incolis adhibentur, et laudati auctores iis ad animalia dissecta a blattis praeservanda usi sunt.

21. *obliquum*, fol. oblique cordatis obtusis, spicis longissimis dependentibus. Fl. peruv. l. c. f. a. Hab. in Cuchero sylvis ad Caryumba terminum. Fol. subtus 11-15-nerviis.

22. *acutifolium*, fol. cordatis acutissimis, spicis erectis cylindricis brevibus. Fl. per. p. 38. t. 6. f. a. In Cuchero et Pozuzo sylvis. Fol. alternatum 13-17-nervia, subtus pubescentia. h

23. *angustifolium*, foliis cordato-lanceolatis acutis rugosis, spicis recurvis foliorum longitudine. Fl. peruv. t. 57. f. a. In Peruvianis sylvis et ripis. Signata hispida. Decoctum contra morbos venereos adhibetur. h

24. *granulosum*, fol. cordato-lanceolatis obliquis rugosis, supra scabris, nervis alternis, spicis uncinatis. Fl. peruv. t. 64. f. b. Hab. in Pillao nemoribus. Fol. bipalmaria, 13-15-nervia. Filam. articulata. Fol. odore grato.

25. *aduncum*, fol. oblongo-ovatis acuminatis basi inaequalibus venosis, spicis solitariis axillaribus uncinatis. Willd. l. c. p. 162. Jacq. Collect. 5. p. 6. Icon. rar. Hab. in Jamaica. h

26. *scabrum*, fol. lato-ovatis acuminatis obliq. rugosis scabris, spicis erectis. Swartz Flor. Ind. occid. 1. p. 59. In montosis Jamaicae temperatis. Fol. fusco-viridia. h

27. *macrophyllum*, fol. elliptico-ovatis acuminatis glabris, basi inaequalibus venosis, petiolis appendiculatis, spicis axillaribus solitariis. Willd. p. 163. Swartz prod. p. 15. et Flor. 1. p. 54. In Jamaicae montib. petrosis. Spec. minus fragilis. S.

28. *microstachyum*, fol. oblongis laevib. acuminatis, basi aequalibus, subtus venosis, spicis brevissimis mucronatis. Vahl Eclog. amer. 2. Hab. in Cayenna. h

29. *rugosum*, fol. ovato-oblongis venosis glabris, basi subaequalibus subtus reticulatis (rugosis), ramis laevibus, petiolis simplicibus. Vahl Eclog. 1. t. 2. Hab. cum priore. h

30. *aequale*, fol. elliptico-lanceolatis venosis attenuatis, basi aequalibus glabris, ramis laevibus geniculatis. Vahl. l. c. t. 3. Crescit in Montserrat. h

31. *Churumaya*, arboreascens, fol. ovatis acutis, spicis erectis. Flor. peruv. p. 35. t. 38. f. b. Hab. in Huassahuassi nemoribus. Vernacule *churumaya* i. e. fluvii flagellum.

32. *gracile*, fol. ovato-lanceolatis acutis rugosis, spicis gracilibus erectis. Fl. per. t. 59. f. b. Hab. in Cuchero sylvis. Rami teneri hispiduli. h

33. *dichotomum*, foliis oblongo-lanceolatis, venis alternis, spicis cylindricis

fol. brevioribus. Flor. peruv. p. 35. t. 6. f. b. In sylv. peruv. Fol. ejusdem usu acin⁹. 20. h

34. *lineatum*, fol. ovato-oblongis acutis lineatis subplicatis spicis recurvatis. Fl. p. l. c. f. a. In Peru ad margines fluviorum

35. *crocatum*, fol. ovato-oblongis acutis utrinque rugosis supra asperis, spicis erectis foliorum tere longitudine. Fl. per. t. 55. f. a. In Pillao nemorib. Stam. 4. h

36. *lanceolatum*, fol. lanceolatis acutis utrinque fusco-punctatis, spicis brevibus erectis. Fl. per. p. 36. t. 61. f. b. h

37. *bullatum*, hirsutum, foliis ovato-lanceolatis bullato-rugosis supra nitidis, nervis vagis. Lam. ill. p. 81. *P. rugosum*. Hab. in Cayenna. h

38. *angustifolium*, fol. linearib. utrinque acutis subsessilibus, nervis vagis, spicis minimis ovatis lateralibus. Lam. l. c. In Guiana. Spicae magnitud. grani tritici. h

39. *geniculatum*, fol. oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, caule ramisque geniculatis. Swartz prod. 15. et Ej. Flor. 1. p. 57. Hab. in Jamaica, sylvis lapidosis. Caul. debilis. S. h

40. *praemorsum*, fol. lanceolato-ellipticis attenuatis glabris, basi altero latere brevioribus, spicis superne recurvatis. Vahl. l. c. Roth. Surin. p. 16. In Surinamo. h

41. *verrucosum*, arborescens, fol. oblongis acuminatis obliquis multinerviis venosis, glabris coriaceis maximis, caule ramisque verrucosis. Swartz. prod. 15. Sloan. cat. 25. list. 1. p. 135. t. 89. f. 1. In Jamaica, Gujana etc. Flor. spirales. h

42. *hirsutum*, fol. ovatis acuminatis obliquis rugosis geniculisque hirsutis, spicis erectis. Swartz. Flor. In occid. 1. p. 60. *P. hispidum*. Sw. Prod. p. 15. Pedunc. hispidi. h

43. *nitidum*, foliis lanceolato-ovatis, basi obliquis glabris nitidis. Swartz prod. 15. Flor. 1. p. 58. In Jamaicae umbros. montosis. h

44. *pelliculum*, fol. cordatis petiolatis, caule herbaceo. Jacq. obs. 1. p. 16. Hort. cliff. 6. t. 4. Plum. amer. 54. t. 72. In America calidiore. ☉

45. *alpinum*, herbaceum, caule erecto simpliciusculo, foliis ovato-subrotundis acutis, subtus aveniis, spicis axillaribus. Swartz prod. 15. Sw. Flor. 1. 62. Hab. in Jamaica, summis alpib. ☿

46. *hispidulum*, herbaceum, fol. subrotund. petiolat. tenuissimis, superne hirsutis, caule

caule erectiusculo. Swartz Flor. 63. Icon. tab. 4. Hab. in nemorosis humidis montium Jamaicae. Fl. caerulei. Pl. pusilla. ☉

47. *tenellum*, herbaceum, fol. distichis ovatis aveniis, margine ciliatis, spica ascendente, caul. simplici decumbente. Sw. Flora p. 65. In Jamaicae montib. supra truncos putridos.

48. *blandum*, foliis ternis lanceolatis acuminatis trinerviis ciliatis subtus punctatis. Willd. p. 164. Jacq. collect. 3. p. 211. Icon rar.

49. *curvatum*, fol. oblongis acuminatis laevibus subtus punctatis nitidis, spicis brevibus curvatis. Flor. Per. p. 36. t. 64.

50. *obovatum*, fol. obovatis acuminatis utrinque attenuatis, spicis erectis, inferioribus incrassatis, superioribus tenuibus. Flor. Per. p. 36. t. 53. b. ¶

51. *punctatum*, fol. oblongis acuminatis venosis utrinque punctatis, spic. foliis brevioribus. Flor. Per. t. 62. a. In Peruviae nemoribus. Stylus crassus.

52. *heteromallum*, foliis oblongis acuminatis glabris laevibus, spic. filiformibus secundis. *P. secundum*. Flor. Per. l. c. f. b. Spic. oppositifoliae.

53. *asperifolium*, fol. ovatis oblongisque acuminatis asperis, spic. junioribus curvatis, adultioribus erectis. Flor. Per. p. 37. t. 56. b. Hab. cum priore. Anth. cordato-reniformes.

54. *longifolium*, fol. oblongo-ovatis acuminatis utrinque nitidis venosis, spicis recurvatis. Flor. Per. l. c. t. 61. a. Stylus longus, stigm. erectiuscula. Hab. in nem. Pillao ad Icutanam. Fl. autumn. h

55. *heterophyllum*, fol. ovalibus acuminatis venosis utrinque punctatis, spicis curvatis. Fl. Per. 34. t. 56. a. In Peruv. nemorib. Stigm. 3. h

56. *callosum*, fol. ovalib. acuminatis basi callis d. obus, spicis brevib. subechinatis. Flor. Per. p. 34. t. 53. a. Hab. in nemorib. Pillao Styl. 1, longus, stigm. 2. Stam. 4. h

57. *excavatum*, fol. ovatis acuminatis subrepandis, spic. cylindricis foliis duplo longiorib. Flor. Per. l. c. t. 54. f. b. In Cuchero nemorib. Fol. nervis supra excavatis. h

58. *asperum*, fol. ovatis acutis rugosis, subtus pubescentib., supra asperis, spicis erectis. *P. scabrum*. Flor. Peruv. p. 34. t. 55. b. In nemorib. Spatha villosa. Stigm. 3, reflexa. h

59. *unguiculatum*, fol. subcordatis 5-nerviis, acumine unguiculato basi utrinque revolutis, spic. erectis. Fl. Per. 34. t. 57. b. Crescit in Poguzo sylvis. Stom. 4, 5 et 6. Drupa 3-4-5-gona. Stigm. totidem.

60. *amplexicaule*, subherbaceum, fol. lanceolato-ovatis amplexicaulibus nervosis carosis, caule erecto simplici. Swartz prod. 16. et Flor. p. 67. In India occidentali, Jamaica, in arborib. moribundis.

61. *pallidum*, foliis alternis obovatis, spicis solitariis. Forst. prod. n. 24. Hab. in insulis Societatis.

62. *obtusifolium*, fol. obovatis enerviis subcarnosis. Lam. ill. p. 81. Plum. amer. 53. t. 70. β. *P. clusinaefolium*. Jacq. coll. 3. p. 209. ic. rar. v. 2. In America calidiore.

63. *retusum*, fol. obovatis retusis. Lin. suppl. 91. Hab. ad Cap. bonae spei.

64. *glabellum*, herbaceum, fol. ovatis acuminatis, caule declinato radicante ramosissimo. Swartz prod. 16. et Fl. p. 68. Hujus varietas simplex est: *P. scandens*. Swartz prod. p. 16.

65. *serpens*, herbaceum, fol. subrotundo-acutis planis discoloribus, caule repente. Swartz prod. 16. et Flora 69. Hab. in Jamaicae frigidior. sylvat. petrosis.

66. *cordifolium*, herbaceum, foliis obverse cordatis petiolatis plano-convexis carosis, caule repente. Swartz prod. 16. In Jam. sylvis antiquis super arbores. Acre.


67. *obovatum*, foliis ternis petiolatis obovatis emarginatis glabris, caule repente. Vahl. Eclog. Fasc. 1. Hab. in Montserrat.

68. *nummularifolium*, herbaceum, fol. orbiculatis convexo-concavis, caule filiformi repente radicante. Swartz prod. 16. Hab. in Jamaica, in ramis arborum.

69. *rotundifolium*, herbac. fol. subrotund. plan. carosis, caule filiformi repente. Sw. obs. 20. Jacq. obs. 1. p. 17. Plum. Am. 52. t. 69. Sloan. jam. 45. hist. t. p. 137. In Americae calidioris montosis muscosis.

70. *peltatum*, fol. peltatis orbiculato-cordatis obtusis repandis, spicis umbellatis. L. Plum. amer. 56. t. 74. Hab. in Jamaica, Domingo. β ? *P. reniforme*, fol. cordato-reniformib. acuminatis 17-13-nerviis, pedunc. polystachiiis, spic. fasciculatis inaequalibus. *P. peltatum*. Flor. Peruv. 1. p. 38. a. In Peruv. nemorib. ad Cuchero nemorib. Spicae ad 20 usque expeducuntur. A peltato l. diversum videtur.

71. *distachyon*, fol. ovatis acuminatis,



spicis conjugatis, caule radicante. Swartz obs. 21. Plum. amer. 51. t. 67. Habit. in Americae calidioris montibus. $\overline{\text{T}}$

72. *umbellatum*, fol. orbiculato acuminatis venosis, spicis umbellatis, caule erecto sulcato. Willd. l. c. p. 167. Swartz obs. 21. Jacq. collect. 2. p. 315. Plum. amer. 53. t. 73. In Indiae occidentalis ruderalis. $\overline{\text{h}}$

73. *trifolium*, fol. ternis subrotundis. Plum. amer. 52. 68. Hab. in America.

74. *pereskiaefolium*, fol. verticillatis ternis quaternisve ellipticis glabris, spica terminali solitaria, caule maculato. Willd. l. c. Jacq. collect. 4. p. 126. Icon. rar. Hab. in insula Venezuela. $\overline{\text{h}}$

75. *polystachyon*, fol. verticillatis rhombico-ovatis integerr. trinerviis pubescentib. Ait. Kew. In Jamaica. $\overline{\text{T}}$

76. *quadrifolium*, fol. quat. cuneiformibus obovatis emarginatis subsessilibus, caule erecto. Swartz obs. 22. Plum. amer. t. 242. f. 3. In Americae meridionalis montibus nemorosis altissimis.

77. *verticillatum*, fol. verticillatis quaternis ellipticis obtusis trinerviis. Willd. l. c. p. 168. Amoen. acad. 5. p. 391. Syst. 3. p. 60. Hab. in Jamaica. \odot

78. *stellatum*, herbaceum, fol. verticillatis oblongis acuminatis trinerviis glabris, caule erecto. Swartz Flor. p. 74. Jacq. collect. 2. p. 212. Icon. rar. conf. Willd. l. c. Hab. in Jamaica, sylv. alpinum. $\overline{\text{T}}$

79. *reflexum*, fol. quaternis rhombeis carnosius reflexis patulisque, caule repente. Swartz obs. 23. Lin. suppl. gr. Habitat in India occidentali, ad Cap. bonae spei, et in insulis maris pacifici ad arborum truncos muscosos.

80. *pulchellum*, fol. quaternis subsessilibus oblongis enerviis integerrimis, spicis terminalibus. Ait. Kew. t. p. 50. Hab. in Jamaica. $\overline{\text{T}}$

81. *filiforme*, herbaceum, fol. linearib. oblongis obtusis : summis verticillatis, caule filiformi repente. Swartz prod. 16. Icon. t. 5. et Flor. p. 73. In Jamaicae montibus, in muscosis. Bacc. oblonga. stigm. villos. Sw.

PEPEROMIA. *Cal. o. Cor. o.*
Stigma : punct. 1-2, in apice geminis ; vid. Prodr. Flor. peruv. p. 8.

Obs. Auctores operis laudati differentiam à *Piperibus* Lin. sequenti modo exhibent : differt stigmatibus ovatis minimis, staminibus

germine longioribus, et stigmatibus. Porro omnes sunt herbaceae, carnosae. Caules aut scapi enodes erecti, scandentes aut repentes. Color ut plurimum ruber. — Forte nonnullae jam enumeratae species, praesertim herbaceae, huc quoque pertinent. Summam ob affinitatem, praesertim quoad habitum, Peperonias cum Piperibus adhuc conjungere melius duxi, usque dum ambarum divisionum species rite examinatae sint.

82. *scutellatum*, radice tuberosa, fol. peltatis scutellaeformibus. Peperom. *scutellaeifolia*. Flor. Peruv. 1. p. 29. t. 44. f. b. Hab. in Peruviae collib. ad Atiquipa.

83. *umbilicatum*, rad. tuberosa, fol. peltatis orbiculato-umbilicatis aveniis, scapo laxo. Fl. Per. p. 30. t. 45. b. In Limae collib. supra saxa.

84. *secundum*, fol. cordato-subrotundis, flor. paniculatis secundis. Fl. Per. l. c. f. a. In montib. Pillao.

85. *foliiflorum*, fol. umbellatis cordatis. basi floriferis, spicis aggregatis flexuosis. Fl. Per. l. c. f. c. In Chincho montib. nemorosis, supra saxa et arbores.

86. *crystallinum*, fol. oblongis subtus punctato-erxavatis, spicis oppositifolis compressis. Flor. Per. p. 31. Habitat in collib. Limae. Odor Anisi.

87. *inaequalifolium*, fol. verticillatis obovatis : floralib. majoribus, spicis terminalibus inaequalibus subquaternis. Flor. Per. 1. p. 30. t. 46. a. In Peruviae locis saxosis et supra arbores, frequens.

88. *rhombum*, fol. quaternis oblongo-rhombicis, spicis terminalib. solitariis. Loc. cit. p. 31. f. b. Cresc. in sylvis prope Pillao.

89. *filiforme*, foliis verticillatis subrotundo-obovatis, spic. terminalib. oblongis. Flor. Per. 31. t. 47. b. In Chincho nemoribus supra saxa et arb. Fl. aest.

90. *concaum*, fol. oppositis verticillatisque ovalibus subtus convexis 5-nerviis, spic. terminalib. solitariis. Flor. Per. 31. t. 46. c. Cum priore.

91. *tetragonum*, fol. oblongis 5-nerviis acutis, spic. terminalib. longissimis geminis. Flor. Per. l. c. t. 47. Caul. basi ramosus, punctatus.

92. *septemnerve*, fol. lanceolat. 7-nerviis coriaceis, spic. subulatis fol. longiorib. l. c. f. c. Ad Poguzo.

93. *pubescens*, fol. ovatis 3-nerviis, subtus pubescentib. spic. ternis : intermedia longissima. Flor. Per. p. 31. In Peruviae montib. umbrosis.

94. *alatum*, fol. acutatis 5-nerviis, caule alato, spic. glatis. Fl. Per. 31. t. 48. b. In Poguzomorib.

95. *purpureum*, ovatis acuminatis venosis, spic. laxis glatis. l. c. p. 32. t. 49. b. Hab. in um. prope Chinchao. Caul. apice divisus.

96. *pilosum*, fol. longo-lanceolatis acutis, basi inaequalipilosis, spic. solitariis axillarib. Flor. Per. 31. t. 50. a. In Poguzo sylvis, umbra.

97. *trinerve*, fol. alib. acutis trinerviis, spic. axillarib. itariis, binis terminalib. erectis. Flor. Peruv. l. c. f. b. Cum priore crescit.

98. *obliquum*, fol. ovato-oblongis obliquis nervosis, spic. fuitis filiformib. Fl. Per. t. 51. e. Piper acunatum. Lin. Plum. Amer. p. 54. t. 71. In xu.

99. *acuminatum*, fol. obovatis acuminatis, spica filiformi acu. Flor. Per. 32. t. 51. a. Petioli alati.

100. *striatum*, fol. ova-oblongis acutis atrinque pubescentib. peti. subtus striatis,

spic. compositis terminalib. Fl. Per. 32. t. 52. b. In Cuchero et Chinchao umbros.

101. *scandens*, fol. cordato-subrotundis, caule scandente, spicis axillarib. solitariis. Hab. cum anteced. Fol. avenia.

102. *dependens*, fol. cordatis 13-nerv. dependentib., spic. terminalib. subulatis. Flor. Per. p. 33. t. 48. a. In Poguzo umbrosis. Inodorum. Caul. radicans.

103. *emarginatum*, fol. obovatis emarginatis aveniis, peduncul. furcatis bispicatis. Flor. Per. l. c. t. 49. a. Supra saxa cum priore. Fol. basi carinata. Spic. longae, crassiusculae. Caul. teres, repens.

104. *variegatum*, fol. cordato-ovatis petiatis, spic. geminatis. Flor. Per. t. 52. f. a. *P. maculosum*. L. Plum. Amer. p. 60. t. 66. In montib. Pillao. Fol. subtus albida. Petioli macul. purpur. variegati.

105. *monostachyum*, fol. obovatis ovatisque, caule simplicissimo, spica 1, terminali. Flor. Per. p. 33. Hab. in montib. Chinchao, supra arbor. vetustarum truncos. Longitudine bipalpati.

MONOGYNIA.

Hemimeris *salulosa*, *diffusa*, *montana*. Bignonia *Catalpa*, *longissima*. Poleleum *sclerospermum*. Valeriana *Cornucop.* Boerhaavia *erecta*, *hirsuta*, *scandens*. L. Commelina *polyama*. Roth *Callisia umbellul.* Schoenus *Mariscus* L. Sc. Cladium Sw. *setaceus*. Sv. Kyllinga *pumila*, et *Scirpa* adhuc nonnullae.

DIGYNIA.

Cyperis *aculeata*, Holcus *odoratus*, Festuca *diandra*, Saccharum *cylindricum*, Thunbergii. Agrostis *diandra*, Bromus *rigidus*, *diandrus Rothii*, etc.

C L A S S I S I I.

T R I A N D R A.

M O N O G Y N I A.

75. **BOERHAAVIA.** *Cal.* margo tubuloso-obconicus, integerrimus. *Cor.* 1-petala, campanulata, plicata. *Fruct.* tuberculatus. (*Stam.* 1, 2, 3, 4 et 10.)

1. *erecta*, caule tetragono glabro: internodiis viscosis, floribus corymboso-paniculatis. Willd. phytog. 1. n. 1. Jacq. hort. t. 5 et 6. Pluk. alm. 149. t. 226. f. 7. Hab. in Vera Cruce, Jamaica, etc. $\overline{\text{T}}$

2. *adscendens*, fol. oblongo-ovatis subcarnosis, floribus paniculatis, pedunculis bifloris, caule adscendente. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 19. Hab. in Guinea.

3. *laxa*, fol. suborbiculato-cordatis obtusis, panícula laxa, assurgente, aphylla. *B. paniculata* Richard in Act. Soc. Nat. Paris. p. 105. Hab. in Cayenna. Basi decumbens.

4. *diffusa*, caule procumbente diffuso, fol. ovatis repandis, umbellulis pedunculatis lateralibus. Lam. ill. gen. p. 10.

5. *hirsuta* L. pubescens, fructibus ciliatis. cfr. Swartz obs. bot. p. 11. et Lamarck l. c. secund. quem et *B. repens*. Lin. *B. diffusae* tantum varietas est. Hab. in Amer. austral., Jamaica, Peru. $\overline{\text{T}}$

6. *polymorpha*, diffusa prostrata, fol. plerisque acutis, capitulis sparsis fasciculatisque. Richard l. c. Hab. in Cayenna.

7. *plumbaginea*, fol. subcordatis, orbiculato-acutis subtus pubescentibus, floribus umbellatis. Willd. Cavan. ic. 2. n. 121. tab. 112. Hab. in Hispania ad radices Orcellitani montis. $\overline{\text{T}}$

8. *scandens*, caule erecto, floribus umbellatis dianthis, fol. cordatis. Willd. phytog. 1. n. 4. Jacq. hort. t. 4. Pluk.

alm. 381. t. 113. f. 7. Hab. in saxosis maritimis Jamaicae in Peru? cfr. Flor. peruv. p. 4. ubi *flor-andrus* legitur. $\overline{\text{h}}$

9. *excelsa*, ca. erecto, fol. inferioribus cordato-ovatis, summis ovatis, floribus umbellatis dianthis. Willd. phytog. 1. p. 5. *Cor.* duplona major anteced. purpurea. W. $\overline{\text{h}}$

10. *repanda*, ca. erecto, fol. cordatis repando-sinuatis floribus umbellatis triandris. Willd. Sp. pl. p. 22. *Valeriana chinensis* Lin. Buh. ind. 15. tab. 6. fig. 3. In India, China

11. *arborescens*, caule arborescente, fol. ovatis integerrimis villosis, flor. umbellatis subdecandris. Cav. description. etc. p. 6. Hab. in N. Hisp. in vicinit. Salvates. $\overline{\text{h}}$

12. *tetrandra*, caule repente, floribus tetrandris. Forst. prod. 2. Hab. in insulis Societatis.

76. **CALYMENIA.** *Cor.* infundibuliformis, plicata. *Nux* 1-sperma, calyce persistente ampliato membranaceo circumdata.

1. *viscosa*, floribus paniculatis fol. cordatis, staminib. corollae duplo longioribus. Flor. Peruv. 1. p. 46. Mirabilis viscosa Cav. ic. 1. p. 83. t. 10. *Oxybaphus* L'Herit. Monog. ic. Willd. Spec. 1. p. 185. Hab. in Peru. Orgyalis.

2. *ovata*, flor. dichotomo-corymbosis, fol. ovatis viscosis hirsutis, stam. corollae fere longitudine. Fl. p. r. 1. p. 45. t. 75. f. b. Cum priore 3-petalis. $\overline{\text{T}}$

3. *expansa*, flor. dichotomo-corymbosis, fol. ovatis subrepandis glabris, staminibus corollae longitudine. Fl. Per. l. c. f. a. 6-petal. $\overline{\text{T}}$

4. *prostrata*, caule tereti articulado, flor.

uncorymbosis, fol. cordatis ovatisq., stam. corollae brevioribus. Fl. per. 1. p. 46. t. 75. f. c. In collib. peruvianis. Herbac. tripedalis.

5. *corymbosa*, caule 4-cono dichotomo, fol. cordatis, flor. corymbosis. Cav. ic. 4. p. 55. t. 3-q. Hab. in Nov. Hispania. Stam. cor. subbreviora. C. $\overline{\text{T}}$

6. *aggregata*, calycibus trifloris. Cav. lico cit. 5. p. 22. t. 437. Calyxthym aggregata, Dec. 7. p. 81. t. 11. Hab. in Nov. Hisp. in vicinis St. Augustini. Cal. villosus, semiquinquepartitus, globosus, non vero expansus in peltam uti in reliquis. C.

77. **VALERIANA.** Cal. o, aut margo minimus. Cor. 1-petala, subinfundibuliformis. 5-fida, basi hinc gibba, supera. Sem. 1. (Stam. 1, 2, 3 et 4. exserta.)

* *Valerianae.*

1. *rubra*, flor. monandris calcaratis, foliis lanceolatis integerrimis. Willd. Sp. pl. 1. p. 105. Hort. cliff. 15. Moris. hist. 3. 102 s. 7. t. 14. f. 15. Hab. in Europae, Orientis ruderatis, et in Atlante. Var. flor. rubris et albis. $\overline{\text{T}}$

2. *angustifolia*, florib. monandris calcaratis, fol. linearibus integerrimis. Cav. ic. 4. p. 32. t. 351. Desf. Fl. atlant. 1. p. 28. Allion. pedem. n. 2. *V. monandra*. Villars delph. 2. p. 280. Moris. hist. 3. p. 102. t. 7. t. 14. fig. 16. Pluk. 319. t. 232. f. 3. In albis Europae, et in Barbaria. $\overline{\text{T}}$

3. *pilosa*, flor. triandris, fol. lanceol. connatis integerrimis, margine revolutis. Flor. Per. 1. p. 59. t. 66. f. a. Hab. in Tarmae locis frigidis. Flor. capitato-corymbosi. Caulis elongatus, subundus. Plantag. albicans habitus. \odot

4. *connata*, flor. triandris, fol. lanceolatis integerrimis, apicis verticillatis. Fl. per. 1. c. 167. c. Cum priore. Suffrutic. Polyg. Persicar. habitu.

5. *Calcitrapa*, flor. monandris, foliis pinnatifidis. Flor. ups. 14. Moris. hist. 3. p. 101. s. 7. t. 14. f. 7. In Lusitania, Barbaria et Oriente. \odot

6. *dioica*, flor. dioicis, fol. pinnatifidis subtus venosis, inferiorib. ovatis integerrimis. Flor. dan. 1. 687. Roth. germ. II. p. 17. In Europae et Orientis uliginosis. Fl. corymbosi. $\overline{\text{T}}$

7. *brachiata*, fol. inferioribus lanceol. integerrimis, reliquis pinnatifidis laciniatis, panicula brachiata. *V. pinnatifida*. Flor. Peruv. 40. t. 69. b. Hab. in collib. aliis

Limaec. Succosa. Rad. tuberosa, odore V. Phu. \odot

8. *virgata*, fol. pinnatis, foliol. 2-3-fidis, laciniis linearibus, panicula subcorymbosa. Fl. Per. 1. c. 166. f. b. In Cantae praeruptis, in Peru. Tagetis minutae habitu. $\overline{\text{h}}$

9. *capensis*, fol. pinnatis, foliol. ovatis dentatis. Thunb. prod. p. 7. Ad Cap. bonae spei. \dagger

10. *globifera*, fol. pinnatis aequalib., foliol. angustis sinuato-dentatis, peduncul. radicalibus, flor. capitatis. Fl. per. 1. p. 43. t. 65. b. In Cantae et Tarmae albis. Rad. crassiuscula.

11. *sanguisorbae*, fol. imparipinnatis foliol. ovatis dentatis, flor. paniculatis. Cav. ic. 5. p. 34. t. 456. Hab. in albis Cordilleras. Fl. Jan.

12. *decussata*, foliis imparipinnatis, foliol. lanceolatis, supra majore, panic. divaricato-dichotoma. Fl. per. p. 42. t. c. f. b. In Huancae locis petrosis. Incana.

13. *paniculata*, fol. radicalib. indivisis cordatis acutis, caulinis pinnatis, panicula diffusa. Flor. per. 41. t. 70. f. a. In Peruviae uliginosis et petrosis. Villosa, radice odore foetido uti in V. Phu. Cor. subcalcarata.

14. *hyalinorhiza*, fol. radical. subrotundis crenatis, caulin. pinnatifido-dentatis, panicula terminali. Flor. per. 41. t. 67. b. Hab. in arenosis concent. Chili. Rad. tuberosa, hyalina, alba.

15. *chaerophylla*, fol. radical. subrhombis incis, caulin. imparipinnatis, foliol. laciniatis, stylo semitrifido. *V. laciniata*. Flor. Per. 1. p. 42. t. 69. a. *V. chaerophylloides*. Smith ic. ined. p. 53. t. 53. Boerhaavia Willd. Sp. 1. p. 22. Cresc. in collib. et nemorib. Limaec et Chancay. \odot

16. *Phu*, fol. caulinis pinnatis, radicalibus indivisis, caule laevi. Blacw. t. 250. In Alsatia, Silesia, et in Peruviae collibus. $\overline{\text{T}}$

17. *officinalis*, fol. omnibus pinnatis, foliol. dentat. lanceolatis, caul. sulcato, Blacw. t. 271. Flor. dan. 570. In nemoribus paludosis, et in Peruvia. $\overline{\text{T}}$

18. *tripteris*, fol. dentatis: radicalibus cordatis, caulinis ternatis ovato-oblongis. Jacq. austr. t. 3. Pluk. alm. 380. t. 237. f. 8. Barrel. t. 742. In albis Helvetiae, Austriae. Involucra diphylla setacea. $\overline{\text{T}}$

19. *pauciflora*, caulib. simplicibus, fol. radicalibus pinnatis, caulinis trifoliatis, foliolis ovalib. serratis, panicula pauciflora.

Michaux Flor. 1. p. 18. In Americae bor. montosis.

20. *montana*, fol. ovato-oblongis dentatis, caule simplic. Jacq. Flor. aust. t. 269. Hall. helu. n. 212. Habitat in Europae Alpibus. \mathcal{T}

21. *celtica*, fol. ovato-oblongis obtusis integerrimis, caulibus linearibus. Jacq. collect. 1. p. 24. t. 1. Hall. Helu. n. 209. In alpb. Helvetiae, Austriae, Valesiae. Fl. verticillati. \mathcal{T}

22. *tuberosa*, fol. radicalib. lanceolatis integerrimis, reliquis pinnatifidis. Ger. prov. 218. In Dalmatia, Sicilia, Gallo-provincia. \mathcal{T}

23. *saxatilis*, fol. subdentatis, radicalibus ovatis, caulibus linearibus lanceolatis. Jacq. Fl. austr. 3. t. 267. Clus. hist. 1. p. 56. bona. Pluk. alm. 380. t. 232. f. 2. In alpb. Europae australioris. Rami brachiati. \mathcal{T}

24. *elongata*, fol. radicalibus ovatis: caulibus cordatis sessilib. inciso-subhastatis, flor. racemosis. Jacq. austr. 3. t. 219. In alpb. Schneeberg Austriae inferioris. \mathcal{T}

25. *pyrenaica*, foliis caulibus cordatis dentatis petiolatis: summis ternatis. Lin. Sp. plant. 46. Pluk. alm. t. 232. f. 1. In Pyrenaeis. Fol. maxima uti in Lunaria. \mathcal{T}

26. *scandens*, fol. ternatis, caule scandente. Loeff. ii. 235. Hab. in Cumana. \dagger

27. *supina*, flor. 3-4-andris, fol. integris ciliatis: radicalibus rosaceis obovatis. Wulf. in Jacq. Misc. 2. p. 114. t. 17. f. 2. Willd. Sp. pl. 1. p. 180. Arduini Spec. 2. p. 13. t. 3. Habit. in Italiae et Austriae alpinis. Stam. regulariter 3. styl. simplex. Flor. corymbosi rubelli: singulus intra bracteolas (male involucrem nuncupatas), lineari-lanceol. sessilis. Wulf. \mathcal{T}

**** Fedia. Semina nuda aut dentibus coronata.**

28. *villosa*, flor. tetrandris aequalibus, foliis inferioribus auriculatis, superioribus dentatis villosis. Thunb. jap. 32. t. 6. Willd. Sp. pl. Lin. 1. p. 181. Hab. in Japonia.

29. *polystachya*, flor. triandris, foliis pinnatis, spica composita verticillata. Smith. Icon. ined. 3. p. 51. t. 51. In agro Bonariensi, locis aquosis.

30. *sibirica*, flor. tetrandris aequalibus, foliis pinnatifidis, seminibus paleae ovali adnatis. Gmel. sib. 3. p. 123. t. 24. *Valeriana rupest. is.* Pall. itin. 3. p. 215. In Sibiriae campis. Cor. lutea.

31. *ruthenica*, flor. tetrandris, foliis ovatis carnosius pinnatifido-dentatis, seminibus paleae ovali adnatis. Willd. 1. c. p. 181. *V. lutea humilis.* Amman ruth. 18. n. 25. t. 3. Hab. in Sibiria. \mathcal{T}

32. *carnosa*, flor. triandris, fol. ovalibus dentatis carnosius glaucis. Smith. Icon. ined. fasc. 1. p. 52. t. 52. In America meridion. ad fretum Magellanicum. \mathcal{T}

33. *Cornucopiae*, flor. diandris ringentibus, fol. ovatis sessilib. Kniph. origent. 10. n. 91. Salbat. hort. rom. 2. t. 15. Hab. in Armeniae, Mauritaniae, Siciliae, Hispaniae et regni Chilensis arvis et locis arenosis. Pedunculi incrassati. \odot

34. *serrata*, foliis lanceolato-spathulatis superne serratis, spicis verticillatis. Flor. per. 40. t. 68. c. In Peruviae subalpinis. Rad. crassa. Caul. plures. Sem. squamis coronata.

35. *coarctata*, fol. lanceolato-spathulatis integris, margine ciliato-denticulatis, spica coarctata (vericillis contiguis). Flor. per. 1. c. f. c. Rad. subfusiformis, ramosa, quae ut remedium specificum ad fracturas perhibetur. Fl. hyme in Tarmae locis altis frigidis.

36. *echinata*, flor. triandris regular. fol. dentatis, fructu lineari tridentato: extimo majore recurvato. Colum. ceph. 1. p. 204. t. 206. Hab. in Italiae et Mosspeli umbriosis. Cor. infundibuliformis, regularis. Stigma trifidum. Pedunculi incrassati. \odot

37. *olitoria*, caul. dichotomo, fol. linearilanceol. integerrimis, fructu nudo. Willd. 1. c. p. 182. *Valeriana Locusta.* Lin. flor. succ. 32. 36. β . Foliis summis dentatis. Inter segetes Europae et Barbariae. \odot

38. *dentata*, caule dichotomo, fol. lanceolatis, fructu tridentato: dentibus binis brevissimis. Willd. Hall. helu. n. 215. Cum priore. Variat foliis subdentatis. W. \odot

39. *vesicaria*, caul. dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu inflato globoso. Willd. *V. cretica*, fructu vesicario. Tournet. cor. 6. Boerh. lugdb. 1. p. 75. t. 75. Hab. in Creta. Calyx infl., dentibus setaceis 6. \odot

40. *coronata*, caul. dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu sexdentato. W. *Valerianella* semine Scabiosae stellata. Colum. ceph. 1. 207. t. 209. In Lusitania. \odot

41. *discoidea*, caule dichotomo, fol. lanceolatis dentatis, fructu duodecimdentato dentibus uncinatis. Moris. hist. 3. p. 104 s. 7. t. 16. f. 29. In Italia, Hispania. \odot

42. *radiata*, fol. spathulato-oblongis

subintegris, fructu pubescente sub-4-gono, capitulis involucreatis. Mich. Flor. 1. p. 18. *Valeriana Locusta* ratiata. Sp. plant. 48. In apricis Carol. infer. \mathcal{T}

43. *pumila*, caule dichotomo, fol. imis dentatis, summis linearib. multifidis. Sauv. monsp. 13. Thuil. Flor. par. p. 16. Hab. Mompeliu et Parisiis. \odot

78. PHYLLACTIS. Flor. involu-
crati : *Involucreum* 1-phyllum,
vaginans. *Cal.* margo minimus.
Cor. trifida. *Sem.* 1. (*Genitalia*
exserta.)

1. *rigida*, acaulis, radice crassa, fol.
radiantibus brevibus lanceolato-linearib.
mucronatis. *Valeriana rigida*. Flor. per. 1.
p. 39. t. 65. f. c. Hab. in Tarmae provinc.
alpihus. Fl. Octob., Novemb. Fol. vix disco
longiora. \mathcal{T}

2. *tenuifolia*, acaulis, radice fusiformi,
fol. radiantibus longis lineari-subulatis gra-
cilibus. *Valeriana tenuifolia*. Flor. per.
l. c. f. d. In Tarma et in Huarochiri pro-
vinciis Peruv. Nov. Dec. \mathcal{T}

3. *spatulata*, cespitosa, fol. spatulatis.
7. *spatulata*, fol. spatulatis sublinea-
ribusque obtusis, cor. 3-fidis, umbella ses-
sili involucreta. Flor. per. 1. p. 40. t. 68. b.
Hab. in Tarmae alpihus \mathcal{T}

Obs. Duae praesertim priores species flores
compositos mentientes, habitu a Valerianis
nimis recedunt, ut cum iis conjungi
possent.

79. TRIPTERELLA. *Cal.* 6-
fidus, alato-angulosus, supra
basin solidam tubulosus. *Cor.*
nulla. *Stigm.* 3. *Caps.* 3-quetra,
3-locul. polysperma. (*Stam.* in-
clusa.)

1. *capitata*, setacea, fol. subulatis, florib.
in capitulo terminali fasciculatis, calyce an-
gulis subaptero. Michaux Flor. 1. p. 10. t. 3.
Hab. in Carolinae et Cayennae udis. Simp-
lex, subaphylla. An *Vogelia* Gmel. S. N.
L. 2. p. 107 ?

80. OLAX. *Cal.* integer. *Cor.* in-
fundibuliformis, 3-fida. Nectar.
4-phyllum.

1. *seylanica*. Amoen. acad. 1. p. 187.
Vahl symb. 3 p. 7. In Zeylona. Arbor
ramis flaccis rugosis Visci.

81. MACROLOBIUM. *Cal.* duplex :
exterior 2-phyllus, interior tur-

binatus oblique 4-fidus. *Peta-
lum* 1. *Legum.* mono permuni.
Stam. longa.

1. *bifolium*, fol. binatis, foliol. ovatis
acuminatis obliquis, legumine oblongo basi
tricarinato. Willd. Sp. pl. 1. p. 186. Vouapa
bifolia. Aubl. guj. 1. p. 25. t. 7. Lam.
Illustr. p. 97. t. 26. In sylvis Cayennae,
Gujanac ad ripas fluviorum. \mathcal{h}

2. *sphaerocarpum*, fol. binatis, foliol.
ovat. acuminat. reticulatis, legumine sub ro-
tundo compresso. Willd. l. c. Vouapa Sinira.
Aubl. guj. 1. p. 27. t. 8. V. violacea Lam.
l. c. In sylvis Gujanac. \mathcal{h}

82. OUTEA. *Cal.* 5 dentatus bi-
bracteatus. *Petala* 5 : superiore
maximo, Filam. sterile recon-
dente. *Legumen* pedicellatum.
Stam. longissima.

1. *guianensis*. Aublet p. 29. t. 9. Lam.
illustr. p. 97. t. 26. *Macrobidium* pinna-
tum. Willd. Sp. pl. p. 186. Habitat in
Guiana. Arb. fol. impari-pinnata. Flor.
racemoso-spicati.

83. TAPURA. *Cal.* campanular.
6-partit. basi tribract. *Cor.* 5-
pet. bilabiata. *Stigm.* 3, revoluta.

1. *gujanensis*. Aubl. t. 48. *Rohria pe-
tioliiflora* In sylvis Gujanac. Fol. alterna
acuminata integerrima venoso-reticulata. \mathcal{h}

84. RUMPHIA. *Cal.* 3-fidus. *Pe-
tala* 3. *Drupa* 3-locularis.

1. *amboinensis*. R. tiliaefolia Lam. ill.
p. 66. t. 15. Rheed. mal. 4. p. 25. t. 11. In
India. Arbor procera. Racemi axillares. \mathcal{h}

85. GNEORUM. *Cal.* 3-4-lenta-
tus. *Petala* 3-4, aequalia. *Stam.*
3-4. *Drupa* 3-4-cocca.

1. *triconcon*, foliis glabris, florib. axil-
laribus. Lin. Lam. ill. p. 99. t. 27. Hab.
in Gallia meridion., Hispan. et Barbar.
Actris. Fol. lanceolata, sempervirens. \mathcal{h}

2. *pulverulentum*, fol. cinereo-pulve-
rulentis floriferis, petalis staminibusque 4.
Ventenat Pl. du Jard. de Cels. p. 77. t. 77.
Hab. in Teneriffa. Fl. aest. \mathcal{h}

86. COMOCLADIA. *Cal.* 3-parti-
tus. *Cor.* 3-partita. *Drupa* ob-
longa : nuce biloba.

1. *integrifolia*, fol. pinnatis, foliolis
petiolat. ovatis acumin. integerrimis. Willd.

Sp. pl. p. 187. Jacq. amer. 12. Sloan. jam. 184. hist. 2. p. 131. t. 222. f. 1. In America calidiore. h

2. *dentata*, fol. pinnatis, foliol. petiolat. oblong. spinoso-dentat. basi cuneatis. Willd. l. c. p. 188. Jacq. amer. 13. t. 173. f. 4. In America meridionali. Arbor odore stercoreis. h

3. *ilicifolia*, fol. pinnatis, foliol. sessilibus ovatis tridentatis basi subrotundis. Willd. l. c. p. 188. Swartz prod. et Flor. 75. Ilex Dodonaea. Lin. Sp. Plant. 2. p. 180. Plum. gen. 20. icon. p. 108. t. 118. f. 1. In insulis Caribaeis et Antiquae petros. calcareis. Arb. Flores racemosi ut in Rhoe.

4. *angulosa*, fol. pinnatis: foliol. sessilibus, subrotundis spinoso-dentatis. Willd. Lam. eucycl. t. 27. f. 2. In America. h

87. WILLICHIA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Caps. 2-locularis, polysperma.

1. *repens*. Hab. in Mexico. Mutis. Planta obscura videtur. Folia orbiculata, subpelata, hirsuta, subtus rubescentia. Flores parvi, rosei, calyce hirsuto. \odot

88. ROTALIA. Cal. tubulosus, 3-dentatus. Cor. o. Caps. 3-locularis, polysperma.

1. *verticillaris*, fol. verticillatis. Mant. 175. Hab. in India orientali. Fol. quaterna, rarius in ramis 5-8. C. lyx capsulam obvestiens, membranaceus. \odot

89. ORTEGIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. apice 3-valvis. 1-locularis, polysperma. *Sigm.* 1 et 3.

1. *hispanica*, caule ramoso, pedunculis multifloris. Willd. Sp. 1. p. 190. Cav. ic. 1. p. 35. t. 47. Desf. atl. 1. p. 31. In Hispania et Barbaria. E

2. *dichotoma*, caule dichotomo, pedunc. unifloris. Willd. l. c. Allion. stirp. ped. 176. t. 4. f. 1. In Italia. Statura Galii. Affinis Polycarpo. E

90. LOEFLINGIA. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petalis, minima. Caps. supera, 1-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *hispanica*, foliis subulatis mucronatis basi setosis, floribus axillaribus sessilibus. Willd. Spec. pl. p. 191. Loefl. it. 113. t. 1. f. 2. Cavan. ic. 1. p. 64. t. 94.

In Hispaniae collibus apricis, et prope Mascar in Barb. Desf. Facies Scleranthi, ramis diffusis. \odot

2. *indica*, fol. oblongis, florib. axillaribus cymosis. Willd. l. c. Retz. obs. 4. p. 8. Pharnaceum depressum. Lin. Mant. alt. p. 564. Hab. in India orientali. Caul. numero-i prostrati simplices. Planta Mollugini similis.

91. POLYCNUM. Cal. 3-phyllus. Pet. 5, calyciformia. Sem. 1, subnudum. (Stam. 1, 2, 3 et 5.)

1. *monandrum*, monandrum, fol. linearib. acutis caule erecto. Willd. Sp. pl. 192. Pall. itin. 1. app. n. 94. tab. G. f. 1. In Sibiria, locis aridis subsalsis. E

2. *sclerospermum*, diandrum, fol. teretibus carnosius, caule erecto ramoso. Willd. l. c. Pall. itin. 3. app. n. 84. t. M. fig. 2. E. c. In limosis salsis Sibiriae. \odot

3. *arvense*, triandrum, fol. subulatis triquetris, caule diffuso. Willd. l. c. In Europae arvis. \odot

4. *salsum*, triandrum fol. filiformibus carnosius vaginantibus, caule diffuso. Willd. l. c. P. *triandrum*. Pall. itin. 1. app. n. 95. tab. G. fig. 2. et H. fig. 1. Hab. in locis subsalsis Sibiriae.

5. *oppositifolium*, pentandrum, fol. oppositis carnosius semicylindricis, caule erecto. Willd. p. 193. Pall. itin. 1. app. 98. t. H. fig. 2. Hab. versus mare caspium. \odot

92. HIPPOCRATEA. Cal. 5-partitus. Petala 5, apice foveata. Caps. 3, compressae, bivalves: valvis carinatis. Sem. hinc alata.

1. *scandens*, fol. ovato-lanceolatis serratis, racemis corymbosis, capsulis obcordatis. Lam. ill. gen. 1. p. 100. t. 28. f. 1. (*H. obcordata*.) Jacq. Am. t. 12. Hab. in Amer. australi. h

2. *ovata*, fol. ovalibus leviter dentatis, caps. ovatis. Lam. l. c. f. 2. *H. volubilis*. β . L. Willd. Sp. 1. p. 193. Plum. gen. 8. ic. 88. Cum priore. h

3. *comosa*, paniculis comosis, pedunc. multifidis capillaribus, fol. ovatis integris. Swartz Flor. Ind. occid. 1. p. 77. Plum. ic. 77. t. 88. f. a. b. *H. multiflora*. Lam. l. c. p. 101? Loefl. it. p. 314. In Hispaniolae interioris sylvis. Fl. Febr. Nuclei albi, subdulces. h

4. *verticillata*, flor. verticillatis. α . *senegalensis*, fol. ovatis leviter dentatis,

ramulis punctatis, flor. verticillatis. Lam. ill. p. 101. h

β *madagascariensis*, fol. ovatis acutis minutis subintegerrimis, ramulis leprosis, flor. verticillatis. Lam. l. c.

γ *viridis*, scandens, corymbis dichotomis, fol. ovatis obtuse acuminatis. Flor. Per. t. p. 44. t. 74. f. a. In Andium nemorib. ad Poguzo. h

δ? *Anthodon*, flor. ciliato-dentatis. *Anthodon decussatum*, scandens, corymbis dichotomis, fol. oblongis larviter serratis. Flor. Per. t. p. 45. t. 74. f. b. Cum priore.

93. TONSELLA. *Cal.* 5-partitus, *Petala* 5. *Nect.* urceolatum. *Bacca* 1-locul., 4-sperma.

1. *scandens*, fol. integerrimis acuminatis. Willd. l. c. p. 194. Vahl. symb. 2. p. 17. Tontela scandens. Aubl. guj. 1. p. 31. tab. 10. In Gujana et insula Trinitatis. h

94. FISSILIA. *Cal.* urceolatus, integer. *Cor.* tubulosa, petalis 3, conniventibus: binis bifidis. *Stam.* 8: 5 sterilia. *Nux* 1-sperma, glandiformis.

1. *Psittacorum*. Lam. ill. p. 102. t. 28. Willd. Sp. pl. 194. In insula Bourbon. Pedunculi axillares uni- bi- vel triflori.

† INDEX (Gen. 95-112.) *Cor.* supera, tubulosa, 6-partita, rarius 6-petala, limboaequalant subingente. *Caps.* intera, 3-locularis, 3-valvis, polysperma, in affinis supera. *Filam.* 3, in nonnullis connata. Flores spathacei. *Fol.* ut plurimum ensiformia. *Radix* fibrosa, tuberosa, plerumque bulbosa, perennis.

95. CROCUS. *Spatha* radicalis. *Cor.* infundibuliformis: tubo longissimo gracili. *Stigmata* profunde incisa, cristata (crocea).

1. *officinalis*, foliis linearibus margine revolutis, stigmate exserto: segmentis longissimis linearibus. Smith Flor. angl. t. p. 39. Engl. bot. 1. 343. *C. sativus*. Willd. Sp. 1. p. 194. Hab. in Oriente, nunc in hortis ob usum colitur.

2. *vernus*, fol. linearib. planis, stigmate incluso: segmentis incrassatis brevissimis. Smith. l. c. 40. Engl. bot. t. 344. Curt. bot. mag. t. 45. Hab. in Europaeis alpinis, in pratis anglicis rarius et in Atlante. (Desl.)

3. *nudiflorus*, aphyllus, stigmate incluso trifido, segmentis capillaceo-multifid. Smith loco citato. p. 41. *C. multifidus*. Ramond

in Bulletin des Sciences, n^o. 41. t. 8. f. 1. p. 129. Cresc. in Anglia, in Pyrenaeis et in Gallia circa Dax. autumnos flores, folia vere Colchici ad instar profert.

96. GALAXIA. *Spatha* (subradicalis) 1-valvis. *Cor.* infundibuliformis: tubo longo. *Filam.* connata. *Stigmata* 3, lobata-fimbriata. (Plantulae subacaules; flor. plerumque lutei.)

1. *ovata*, fol. ovatis margine cartilagineis glabris. Th. diss. acad. 1. p. 49-50. Jacq. coll. p. 137. Ic. rar. 2. t. 291. Willd. Sp. 3. p. 583. Ixia. Lin. Suppl. p. 93. In Cap. bon. spei collibus, cum sequentibus. *Cor.* flava, passim et violacea.

2. *ciliata*, fol. elongatis ciliatis. *G. ovata* fol. ovatis margine ciliatis, *cor.* longissimis arcuatis flavis. Andrew Reposit. t. 94.

3. *graminea*, foliis lineari-subulatis. Thunb. l. c. *Fol.* basi dilatata. *Stigm.* infundibuliforme, lacero-multifidum. Jacq. coll. 2. p. 341. t. 189. f. 3.

97. ARISTEA. *Cor.* (caerulea) tubo breviusculo. *Stigma* simplex, obtuso-subconcauum: *Sem.* compressa, scabrida.

1. *eriphora*, florib. pedunculatis, spathis villosolaceris. *A. cyanea*. Aiton. Kew. 1. p. 67. Andrew t. 10. Willd. Spec. 223. Ixia. *africana* L. Gramen eriphorum. t. c. Pluck. mant. 98. Hab. ut et sequentes species, quibus coroll. plus minusve cyanea est, ad Cap. b. Spei.

2. *spicata*, fol. ensiformibus, florib. spicatis confertis. *A. major*. Andrew t. 160. *Spatha* diphylla, parva. *Stigma* orbiculare, marginatum. Flor. sessiles.

3. *bracteata*, fol. linearibus distichis, caule subpaniculato, floribus pedunculatis bracteis latis inclusis. Moraea *caerulea* Thunb. diss. acad. 2. p. 289. n^o. 15. t. 2. f. 2. *Spathae* universales (bractee) naviculares, partial. ovatae. Th.

4. *spiralis*, scapo compresso articulado, fol. erectis, flor. ternis subsecundis. Thunb. Diss. n. 2. Diss. acad. 2. p. 283. *Cpr.* albidocaerulea, intus basi macula cordata. *Stigm.* truncatum, villosum. Th.

5. *fruticosa*, caule ramoso fol. imbricato. Thunb. diss. de Ixia. t. 1. f. 3. Flor. *caerulea*, tubus filiformis. *Stigm.* simplex. Thunb. Hoc inter et sequens genus intermedia species videtur.

98. WITSENA. *Spatha* nulla? *Cor.* tubo ut plurimum longo, laciniisque rectis, inter folia disticha. *Stigm.* emarginatum, ant subtrifidum.

1. *Maura*, floribus discoloribus extus tomentosis. Thunb. Nov. gen. pl. afr. diss. ec. 1. p. 33. Antholyza L. *Ixia disticha*. Lam. encycl. 1. p. 333. secundum quem (contra *Thunbergium*) stigma trifidum et germinum inferum, uti in confinis. In montosis nemorosis Cap. b. Sp. Coll. atrum, limbus luteus.

2. *magellanica*, cor. tubo brevissimo profunde partito. Tapeina Jussieu gen. pl. p. 51. *Ixia* Lam. l. c. *Moraea* Willd. Sp. Galaxia Cav. Dis. 6. t. 189. f. 4. In fretu Magellanico. Fol. minima. Flor. parvuli, sessilibus inter folia spatharum acmula. Juss. An., uti et sequens, hujus generis?

3. *pyramidalis*, caule subramoso, fol. nervis striatis distichis patentissimis; superioribus spathacris. Lam. enc. 1. p. 334. sub *Ixia*. Hab. in Mauritia. Tub. longissimo filiformi, lacinia unica strictiore (ut in Antholyza nonnullis.) Stigmata 3-bifida. Lamarck.

99. ANTHOLYZA. *Cor.* (stipitata) longe tubulosa: tubo recurvo subcylindrico laciniæ ovato-lanceolatae: suprema fornicata longiore. *Spatha* bivalvis, ovata. (Genitalia exserta. Anth. sæpius cæruleæ. Stigmata 3-6.)

1. *Cænonia*, cor. subpapilionacea, lacin. duabus externis latioribus adscendentibus. Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 222. Mill. ic. 75. t. 113. Decand. et Relouté Liliacées, t. 12. Cor. peculiari est structura, intus nectarifer., colore coccineo. Hab. cum caeteris speciebus ad Cap. bonae Spei.

2. *aethiopica*, fol. ensiformib. attenuatis, spica disticha. Thunb. prod. p. 7. Andrew. Bot. Repos. t. 210. *Spath.* foliola connivent. Cor. flavo-coccinea, lacin. lanceolatis: superiore genitali longiore.

3. *ringens*, fol. ensiformib. plicatis, flor. subsecundis, scapo colorato. Andrew. t. 32. *Spath.* longior, patula. Cor. lacin. superiore genitali brevior. Scap. purpureasc.

4. *plicata* (hirsuta), fol. ensiformibus plicatis, spicis secundis, spathis ovatis villosis. Thunb. l. c. caule ramoso hirsuto, cor. ringente staminibus brevior. Lin. Suppl. p. 96.

5. *abbreviata*, fol. linearib. 4-gonis, spatha cor. tubum subaequante. Gladiolus *abbreviatus*. Andrew. t. 166. Cor. habitu præcedentium: lacin. breviusculæ, ovatae.

100. WATSONIA. *Cor.* recurvata tubuloso-cylindrica. aut (plerumque) tubuloso-dilatata, infundibuliformis: laciniis omnibus æqualibus strictis. (Spica disticha sæpius, foliolis sparsis oblecta, Genitalia exserta.)

1. *tubulosa*, flor. distichis, cor. tubuloso-clavata: laciniis brevibus ovatis, spatha 2-valvi, fol. lanceolatis. Andrew. t. 174. Flor. geniculati rosci, alboque variegati. Cum sequentibus ad Cap. b. Spei.

2. *Jacquinii*, flor. secundis, cor. tubulosa: lacin. rectis minutis ovatis, spatha trivalvi, fol. linearibus. Gladiolus *tubulosus*. Jacq. Coll. 4. p. 155. Ic. pl. rar. Flor. rubicundi Aloen referentes.

3. *fulgens*, flor. distichis cernuis: fæcæ ampla, fol. lanceolatis longissimis. Andrew. t. 192. Flor. coccinei, lacin. subreflexæ; anth. cæruleæ. Fl. maio.

4. *lucens*, fol. basi filiformib. apice linearibus nervosis, spica oblonga disticha. Anthol. *Lucidor* Lin. fl. Th. prod. p. 17. An hujus generis? Flor. oblongi, parva incurvati, lac. lanceolatis, subinaequales cfr. Willd. Sp. 221.

5. *præcox*, fol. ensiformibus, apice lineari-cruciatiss, flor. subsecundis parvis, Gladiolus. Andrew t. 38. Cor. rubra, subcampanulata, petal. non undulatis, sed semina marginata.

6. *revoluta*, cor. infundibulif., fol. linearibus revolutis. Gl. Watsonius. Thunb. Jacq. Coll. 3. p. 257. Ej. Ic. rar. 2. Pet. angusta. Fl. coccinei.

7. *humilis*, cor. infundibulif., fol. lineari-ensiformib. pilosis. Watsonia humilis. Mill. ic. t. 297. f. 2. Anth. *Merianella* L. Glad. Thunb. Willd. 1. p. 214. Hab. in Cap. b. Sp. summis montib. Cor. hypocrateriformis, tubo purpurascens, lacin. flavis.

8. *Meriana*, cor. subinfundibulif., fol. ensiformibus glabris. Lin. Gladiolus Th. Jacq. ic. rar. 2. t. 230. Coll. 4. p. 150. Plantæ liliacées, t. 11. Flor. rubri. Cor. Polyanthis.

9. *marginata*, spica longissima, flor. alternis cernuis, fol. ensiformib. multinerviis marginatis. Thunb. diss. n.º. 20. Willd. 218, sub Gladiol. Antholyza caryophyllea Hout. Syst. Lin. t. 79. f. 3.

10. *iridifolia*, cor. cernuis, lacin. oblongis campanulatis, fol. ensiformib. spathisque distichis. Jacq. coll. 4. p. 451. Ic. rar. 2. Glad. *cardinalis*. Geuns et Schneev. ic. t. 27. Styl. ramosus.

11. *laceata*, cor. infundibulif. cernuis, lac. ovatis planis, fol. lineari-ensiformib. alijquis. Gladiolus. Jacq. l. c. 111. ic. rar. Cor. laceae florentinae colore. Jacq.

12. *palustris*, fol. lineari-ensiformib., scapo polystachio altissimo. spicis penululis. *Ixia pendula*. Thunb. Willd. Sp. 1. p. 204. Lin. Suppl. p. 91. Cresc. in locis udis prope Kromrivier ad Cap. h. Sp. Caul. teres ramosus, ramis filiformib. auris. Cor. campan. sanguin. pet. lanceolatis. Th.

13. *recurva*, fol. ensiformibus, flor. pendulis subaequalib. lanceola is recurvis. Gladiol. Lin. mant. 28. Mill. ic. t. 235. f. 2.

14. *Hyacinthoides*, spica multiflora, flor. pedicellatis campanulatis suberectis, fol. falcatis brevibus. A. *spicata*. Andrew. t. 56. Cor. incarnata pallida, crassiuscula, lacinii ovatis, spatha rubro-marginata, vaginans: valvula altera linearis parva.

15. *amoena*, fol. ensiformi-linearibus glabris, caule ramoso, spathae valvula interiore apice bifida. Glad. *roseus* Jacq. Coll. Suppl. p. 22. ic. rar. t. 261. Willd. Sp. 1. p. 217. G. *amoenus*. Ehrh. Caul. flexuos. Spatha scariosa, straminea cum rubore. Flor. spicati, secundi, inodori. Jacq.

β *rosea*. Gladiolus *roseus*, fol. lanceolatus tortis rubro-marginatis pubescentib. flor. roseis odoratissimis. Andrew. t. 11. Fl. maj., jun.

101. GLADIOLUS. Cor. tubulosa, varia, erectiuscula; laciniae ovato-lanceolatae, undulatae. *Genitalia* adscendentia, pistill. pone stamina versus laciniam superiorem. (Spatha 2-3-valvis, valvulae plurimum lanceolatae, magnae. Stigm. 3. Sem. in multis alata.)

* Cor. *ringens*; laciniae inaequales. Tubus incrassatus, subincurvus.

1. *flexuosus*, cor. ringentis tubo spatha duplo longiore, scapo flexuoso. Thunb. diss. de Glad. n°. 2. t. 1. f. 1. Eiusd. diss. acad. 2. p. 160 et 163. et prod. p. 29. Crescit in caeterae fere omnes species ad Cap. h. nae spei. Fol. sub florentia nulla. Cor. albo-incarn. Th.

2. *tristis*, cor. cernuis, tubi simplici,

fol. trinerv. bisulcis linearib. (Thunb. l. c.), fol. lineari-cruciatis, cor. campanulatis, spatha 3-valvi. Jacq. coll. 4. p. 157. ic. rar. Trew. t. 39. Numerosas hujus speciei varietates vid. ap. Thunb. diss. acad. p. 165-166. Flor. pauci odoratiss. Cor. unicolor ochroleuca, incurva, laciniae planae. Jacq. *Antholyzis* hinc valde affinis. Cor. lacin. summa latissima, subfornicata, infima angustissima. Thunb., quo cum Hebeis convenit.

3. *spiralis*, fol. linearibus spiralibus, cor. fauce infundibulif., lacin. punctatis, spatha bivalvi 1-diphylla. Gl. *tristis*. β Jacq. coll. 5. p. 10. ic. rar. Cor. leucophaea, lacin. 3 superior. porum latiores.

4. *pterophyllus*, fol. linearib. quadrilatis, cor. infundibulif. subringente, spatha bivalvi. Glad. *tristis*, var. Lin. Jacq. coll. 4. p. 158. Scap. gracilis, superne inflexus, uniflor. plerumque, fol. vaginatus. Cor. triste caeruleo, lacin. crispatae, flavesce. cum adpersis punctis atropurpureis. Jacq.

5. *punctatus*, fol. lanceolato-linearib. planis basi vaginantib., scapo alioracemoso, cor. infundibuliformi compressula. Jacq. coll. 4. p. 160. ic. rar. t. 247. Cor. carulea, stigm. lacin. latescentes. Fol. infimum maculis punctisque variegatum.

6. *gracilis*, fol. linearib. vaginantibus, cor. subringente, lac. obtusis, scapo flexuoso subbifloro geniculato. Willd. sp. 1. p. 211. Jacq. col. 2. p. 159. ic. rar. t. 276. Bulb. pisi magnitudine. Flor. subcernui 1-2. Spatha 2-valvis, longa lanceolata. Cor. tub. albus, fauce violacea vel caerulea. Jacq.

7. *violaceus*, odoratus, cor. ringente, caule basi colorato punctato, fol. linearib. G. *ringens*. Andrew. α. fol. longissimis, lacin. infer. flavesce. t. 27. β fol. caul. flexuosum ad dimidium adaequante, lacin. 3 infer. striato-punctatis. t. 227. Col. violaceo-purpureo. Odor violae fortissimus. Species inter antecedentem et sequentem intermedia.

8. *brevifolius*, cor. subringente, spathis tubo brevioribus, flor. secundis, fol. lineari-convolutis vaginatis brevissimis. Willd. p. 213. Jacq. ic. rar. 2. t. 249. Collect. 4. 156. Hab. ad Cap. h. spei. Similis sequenti, sed foliis satis distinctis. W.

9. *communis*, cor. subringente, spathis tubo longioribus, flor. secundis, fol. ensiformibus nervosis. Willd. Fol. ensiformibus distantibus. Hort. cliff. 20. Bull. herb. ic. Roth. germ. 1. p. 18. Hab. in Europa australi et in Barbaria.

10. *carneus*, cor. subringente, fol. ensiformibus striatis glabris ad oras cartilagi-

neis, scapo flexuoso erecto, florib. cernuis. Jacq. ic. rar. 2. t. 255. Collect. 2. p. 370. Andrew. t. 240. Burm. prodr. cap. 2. Hab. ad Cap. bonae Spei. T.

** *HERBA. Cor. tubo brevi, lacin. divaricatis. suprema lanceolata fornicata, latera es obovata, inferiores angustae, pendulae subangulatae.*

11. *formosus*, cor. divaricata ringente, lacinii sublinearib. alternis crispis, foliis lanceolato-ensiformibus crispis ciliatis. G. *striatus* Jacq. coll. suppl. p. 28. ic. rar. 2. t. 260. Willd. sp. 1. p. 210. Cor. tubus caeruleus, lacin. interior. undulato crispae, luteae lasi rubicundae.

12. *alatus*, cor. divaricata ringente, lacin. summa falcata, fol. lineari-ensiformib. scapo ramoso. Jacq. coll. 4. p. 165. ic. t. 259. Willd. p. 216. Fol. linearia, longiss. Flor. odore corticis citri, tub. pollet. limb. cinerascit. Jacq.

13. *galeatus*, fol. ensiformib. obtusis, petalis lateralibus latissimis. L. Jacq. coll. 4. p. 167. ic. rar. t. 258. Cor. violaceo-pallens. β Andr. t. 122. lacin. summa rotundata. Cor. ru. ro-punicea, lacin. infer. sursum virescunt.

14. *tabularis*, fol. lanceolatis nervosis, scapo aphylo, cor. tubo spatha aequali. G. montanus. Thunb. Diss. n. t. 1. f. 4. Willd. Sp. 1. p. 208. Hab. in monte Tabulari ad Cap. b. Sp. Fol. radical. linearia, longitudine fere scapi.

15. *orchidiflorus*, spica multiflora, flor. secundis, fol. lineari-lanceolat. Andr. t. 241. Hab. ? Cor. fusco-fuliginea; lac. inferior. luteo-maculata. Stigm. 6. Flor. mart.

16. *bicolor*, cor. ringente, spathis lacero-ristatis. Thunb. Jacq. coll. Suppl. 25. ic. rar. t. 240. Cor. flavesce. lacin. apice caeruleis.

*** *LEMONIA. Cor. campanulata, tubo subbrevis parum incurvo, laciniiis profundis subaequalibus ovatis.* (Pourret in act. Tolos. vol. 3. p. 13.)

17. *tenellus*, cor. subringente infundibuliformi, fol. linearibus convolutis. Jacq. ic. rar. 2. t. 248. Coll. 3. p. 255. Var. β *flava*. Coll. 4. p. 169. t. 3. f. 1. Cor. ochroleuca, cum linea sordide violacea, laciniae a fauce punctatae. Cor. in β flava cum striis fuscescentibus, fol. lanceolato-linearia.

18. *strictus*, foliis lineari-lanceolatis, tubo spatha aequali. Ait. Kew. t. 1. p. 61. Willd. Sp. 220. Jacq. ic. rar. 2. t. 238. Var. cor. saturate caerulea aut pallide purpurasc.

19. *plicatus*, cor. ringente-subcampanulata, flor. subsecundis, spatha trivalvi, fol. ensiformibus plicatis hirsutis. Jacq. coll. 4. p. 155. Ic. rar. 2. t. 237. Thunb. diss. n. 24. Willd. Sp. 1. p. 220. Cor. subviolacea, lacin. superior curvata; inferiores reliqua paulo breviores, macula oblonga albida. Germ. hirsutum. Ixiom aut Antholyz. reiert. Th.

* *nervosus*, fol. ensiformibus plicato-nervosis villosis, racemulis plurib. alternis, tubo spathis brevior. Lam. enc. 2. p. 724. Flor. majores. Spath. pubescens.

20. *hyalinus*, cor. ringente: lacin. planis, scapo stricto paucifloro. Willd. Sp. 1. p. 211. G. strictus Jacq. coll. 4. p. 179. ic. rar. 2. t. 242. Cor. tub. caeruleo, limb. subpellucidus: lacin. summa latior albida cum reliquis flavescentib. striis punctisque purpurasc. Jacq.

21. *puniceus*, fol. linearibus, flor. horizontalib. secundis immaculatis, petal. inferioribus paulo longiorib. Lam. enc. 2. p. 727. Pluck. t. 187. f. 4. Breyn prodr. t. 12 f. 1.

22. *crocatus*, fol. ensiformib., flor. alternis, cor. campanulata, lacin. ovatis, basi hyalinis. Wendl. obs. bot. p. 5. t. 4. Ixia *crocata* Lin. Willd. p. 205.

Obs. Ob stigma pone stomina incurva huc relata est haec species cui quoque forte associandae essent Ixia *deusta* et *squalida*. Ait.

23. *sulphureus*, cor. infundibuliformi campanulata, lacin. lanceol. obtusiolis, fol. ensiformib. margine villosis. Jacq. coll. 3. p. 258. ic. rar. Cor. tub. incurvus violaceus, lacin. sulphur. Stigm. dilatata.

24. *mucronatus*, cor. subringente campanulata, lacin. mucronatis, fol. ensiformib. villosis, spatha trivalvi villosa. Jacq. coll. 4. p. 162. Ic. rar. 2. t. 253. Cor. flavesce. lacin. cuneiformes: 3 superiores purpureo-violaceae. Stigm. incrassata.

25. *nanus*, fol. lanceolatis plicatis pilosis scapum multiflorum aequantib., spatha crassa 3-valvi. Andrew. t. 13. Spath. basi ventricosa, apice scariosa. Cor. caerulea, in medio macula lineari rubra. Pet. repanda, submarginata. Stigm. incrassata.

26. *grandiflorus*, fol. ensiformib., scapo subtrifloro, petalis aequalibus emarginatis. Andrew. t. 118. Cor. sordide purpurascens: anth. coerul. Stigm. 6. An Watsonia?

27. *campanulatus*, fol. linecol. glabris scapo subtrifloro fol. longiore, cor. subcampanulata. Andrew. t. 187. Flor. maj. Flor. purpurascens, valde ap. ti.

28. *versicolor*, fol. lineari-cruciati, flor. magnis versicolorib., spatha tubo longiore. Andrew. t. 19. Color floris durante anthesi valde variabilis. Andr.

29. *albidus*, cor. subringente, lacin. acutis: 3 inferioribus. apice conniventib., fol. ensiformib. glabris subobliquis. Jacq. ic. t. 256. Coll. suppl. p. 21. Fol. plura, disticha. Stigm. apice latescentia, bilamellata. β . *blandus*, fol. lineari-lanceol. Ait. Kew. 1. p. Andrew. t. 29. Cor. alba: macula bina sanguinea.

30. *falcatus*, cor. limbo patente, fol. lanceolato-falcatis. Thunb. diss. n. 4. t. 1. f. 3. Linn. suppl. 96. Cor. caerulea. Ixiæ excisæ affinis. Thunb.

31. *biflorus*, cor. erectæ limbo campanulato, scapo bifloro, fol. linearibus. Thunb. diss. n. 5. Hab. ad fretum Magellanicum. Scapus totus vaginis foliorum tectus. Flor. termin. bini, coloris tristis. Th.

32. *dichotomus*, cor. erectæ limbo campanulato, scapo bis dichotomo quadrifloro, fol. linearibus. Thunb. diss. n. 6. Habitat? Spathaceum fol. lineare acutum sub dichotomis. Flores secundi erecti. Thunb. l. c. An hujus gen.?

**** Cor. tubo elongato substricto, infundibuliformi dilatato, spathis multo longiore: lacinis (inferiores) pterique medio macula (rubra) varia distinctæ, lanceolatae, patulae.

33. *cuspidatus*, fol. subcernuis, cor. subringente: lacinis lanceolatis attenuatis, fol. lineari-ensiformibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 25. Coll. suppl. p. 17. Andrew. t. 147. Spath. vaginans, longa. Cor. rubicunda: macula subcordiformi.

34. *affinis*, fol. ensiformib., cor. infundibuliformi recta, lacin. undulato-crispis, spath. valvulis aequalib. G. *cuspidatus*. β . Andr. t. 229. Cor. flavesc.

35. *crispus*, cor. tubo subgracili longissimo: lacin. subaequalibus, superioribus obovatis, fol. crispis. Thunb. Jacq. coll. suppl. 27. β . Andrew. t. 142. Fl. Jul.

36. *paniculatus*, scapo ramosissimo: ramis bifloris tubo stricto cylindrico, fol. ensiformibus undulatis. G. *polystachius*, Andrew. t. 66. Cor. lacin. patulae subaequales: unica macula arcuata rubra.

37. *angustus*, flor. secundis, cor. lacin. ovatis planis, fol. linearibus: L. Willd. l. c. p. 218. Mill. ic. 142. f. 2. Thunb. diss. n. 21. Cor. lacin. inferiores macula subrhomboidæ.

38. *trimaculatus*, fol. lineari-lanceolatis, tubo curvo limbo vix longiore, petalis 3 macula cordiformi inscriptis. Læmark encycl. 2. p. 727. Gladiolus flor. patentib. externe carneis, interne candidis, stella maculisque purpureis insignitis, suprema lacinia maxima. Breyn. prodr. p. 21. t. 7. f. 2. Anteced. affinis.

39. *bimaculatus*, fol. lineari-angustissimis, petal. superiorib. breviorib. patentireflexis, 3 inferiorib. sublinearibus. Lam. l. c. Mill. dict. t. 236. f. 1. Cor. albidorubra, patens.

40. *ventricosus*, fol. ensiformib. nervosis glabris subaculosis: cor. limbo ventricoso, stigm. lacinis dilatato-membranaceis spatulatis. Lam. l. c. Cor. tubo infundibulif., spath. subaequalis, lacin. valde inaequales.

41. *resupinatus*, cor. subringente campanulata resupinata, fol. lineari-ensiformib. glabris, scapo ramoso. Jacq. ic. rar. 2. t. 241. Coll. suppl. p. 26. Cor. lacin. macul. longitudinali atro-purpurea, lateral. interdum fascia marginali, fulva. Stigm. incrassata. J.

42. *tubiflorus*, polystachyus, corollae limbo subcampanulato, tubo filiformi longissimo, spathis villosis, fol. lineari-ensiformibus hirsutis. Willd. p. 219. Thunb. diss. n. 23. t. 2. f. 2. Linn. suppl. 96. Hab. ad Cap. h. Spei.

43. *tubatus*, polystachyus, cor. limbo sublabiato, tubo longissimo, spathis, foliisque oblongis plicatis hirsutis. W. Cor. tubo gracili longissimo, lacinis alternis mucronatis, fol. latis ensiformib. plicatis hirsutis, spatha bivalvi. Jacq. ic. rar. 2. t. 264. Collect. suppl. 18. β . *longiflorus*. Andrew. t. 5. Cor. purpurea-c. lacin. 3 in medio macula rubra, cordiformi. Ad Cap. bonae Spei. T.

44. *floribundus*, polystachyus, corollae limbo patenti subreflexo, spathis tubo longioribus, fol. lanceolatis ensiformibus nervosis glabris. Willd. Flor. erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 254. Collect. 4. p. 162. β ? *striatus* Andrew. t. 111.

45. *securiger*, fol. lineari-ensiformibus planis, cor. labio superiore trilaminato: laminis unguiformibus perpendicularibus, bract. obtusis. Ait. Kew. 1. p. 65. Ixiæ gladiolaris. Lam. enc. 3. p. 341. An potius Ixiæ? Cor. pallide fulva. Lacin. oblongo-ovatae, passim subemarginatae. Ait.

β ? *flavus*, fol. lanceolato-ensiformibus planis, cor. labio superiore trilaminato laminis unguiformibus perpendicularibus, bracteis acuminatis. Ait. p. 65. Willd. 1. p. 218. Antecedenti affinis.

46. *spathaceus*, fol. ensiformib. plicatis hirsutis, spathis membranaceis aristatis glabris. Thunb. diss. n.º. 25. Lin. suppl. p. 66. Flor. albi, tubo cor. spathis multo longiore. Gl. plicato et tubifloro similis. Th.

47. *longiflorus*, cor. tubo gracili substricto, lacin. obtusis, fol. ensiformi-linearibus, scapo ramoso. Thunb. diss. n.º. 22. Jacq. coll. suppl. 23. ic. rar. 2. t. 262. et 3. t. 263. Ixia Ait. Willd. 1. p. 203. Cor. albilo-incarnata, striis purpurasc. in fauce fascia flava, lacin. sublineares, quasi truncatae.

**** *Cor. tubo gracili subfiliformi. lacin. patulis subregularibus.* (Flor. parvuli, Ixia referentes. PAVROUSIA. Pourret in Act. Tolos. 3. p. 15.)

48. *anceps*, cor. tubo filiformi, scapo ancipiti flexuoso, fol. ensiformibus, margine crispis glabris. Willd. p. 216 Jacq. ic. rar. t. 266. Thunb. diss. n.º. 17. t. 2. f. 3. * Lam. enc. 2. p. 728.

49. *fissifolius*, cor. tubo filiformi, scapo ancipiti, fol. ovatis amplexicaulib., margine undulatis, subtus hirtis. Willd. Gl. tubo filiformi longissimo, florib. sessilib. axillaribus, fol. hirtulis, in superiore margine fissis, superiorib. quidem ad oppositum marginem usque, inferiorib. autem ad apicem indivisis. Jacq. ic. rar. 2. t. 208. Collect. 4. p. 164.

50. *silenoides*, cor. tubo filiformi, scapo compressiusculo, fol. lineari-ensiformibus planis striatis glabris. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 270. Collect. 4. 168. Pet. rubra, 3 infer. basi macul. flava.

51. *juncus*, polystachyus, flor. secundis, fol. lanceolatis. Thunb. diss. n.º. 18. Gl. fol. lato-lanceolatis, culmo ramoso, floribus secundis, stylo sexpartito. Lin. suppl. 44. Flor. caerulea.

¶ ? *marmoratus*, fol. ensiformib. nervosis glabris maculosis, flor. distichis, stylo sexpartito. Lam. enc. 2. p. 727. Fl. violacei.

***** *Spica disticha, spathis imbricatis, flores parvi sessiles. Stigmata* ? (Micranthus.)

52. *alopeuroideus*, cor. erectis, spica simplici imbricata, disticha, fol. linearibus. Ixia alopecuroidea, L. suppl. p. 62. Glad. spicatus. Thunb. 1x. spicata. Willd. sp. 1. p. 200. Spica. ovata. Hab. in Cap. bon. Sp. summis montibus.

53. *plantagineus*, spica imbricata disticha subramosa, fol. ensiformib., nervosis. Willd. 1. c. Glad. alopecuroides. L. Phalangium spicatum, Honytuyn syst. Lin. t. 80. f. d. Ixia plantaginea. Ait. 1. p. 59. Hab. in

C. h. Sp. collibus, viis. Var. scapo simplici et ramoso, flor. albis et caeruleis. Thunb.

54. *rossicus*, flor. imbricatis secundis, fol. ensiformib. Gl. imbricatus. Lin. Willd. 212. ¶ ? *parviflorus*. Jacq. obs. bot. 4. p. 2. t. 28. Georgi iter 1. p. 196. Habitat in Russia.

***** *AGLAIA. Cor. subcampanulato-bilabiata sessilis, s. tubo vix ullo. Caps. triloba, retusa. Sem. subrotunda, mucronata. Spatha duplex, 2-valvis sub corolla, 2-3-valvis ad basim pedunculi.*

55. *gramineus*, cor. tubo brevissimo, lacinis lanceolatis, subaequalib. aristatis, scapo paniculato. Jacq. ic. rar. t. 236. Coll. 2. p. 203. Willd. 1. p. 221. Andrew. t. 62. Phalangium. Burm. prodr. u.º. 3. Asphodelus Mill. Flor. pedunculati, gemini.

Obs. Eadem ratione ac Moraceae, quo accedit forma capsulae, a Gladiolis separari posset.

102. IXIA. *Spatha* 2-3-valvis ovata, brevis. *Cor.* tubulosa: tubo subgracili cum genitalibus recto, *Laciniae* hypocateriformes, subellipticae, planae. *Stigm.* subfiliformia. (Filam. stylum includentia, in nonnullis connata.)

* *ROMULEA. Cor. campanulata sessilis, fol. linearia.*

1. *minuta*, scapis unifloris longitudine foliorum, fol. linearis-etaceis. Willd. sp. 1. p. 176. Thunb. diss. n.º. 2. t. 1. f. 1. Ad Cap. b. Spei (uti fere omnes species), locis arenosis, inundatis Cor. albidis, striis purpur.

2. *rosa*, scapo unifloro breviss. aphylo. Syst. veg. 75. Mill. ic. 160. t. 240. Ait. Kew. 1. p. 56.

3. *chloroleuca*, scapo unifloro, fol. linearibus margine revolutis longissimis. Willd. 1. c. Jacq. ic. rar. 2. 272. Collect. 4. p. 180. ¶

4. *Bulbocodium (europaea)*, scapo 1-floro, fol. linearib. canaliculatis, cor. subcampanulata sessili. L. Jacq. ic. rar. 2. t. 271. Coll. 3. p. 265. Willd. sp. 1. p. 196. *Crocus* spatha diphylla flori approximata. Lin. sp. pl. ed. 1. p. 36. *Romulea* Mill. ic. t. 240. *Bulbocodium crocifolium*. Tournef. cor. p. 50. Hab. in Europa australi, Gallia, Italia, et in Barberia. Stigm. 6. Var. quoad magnitudinem, cor. caeruleam aut dilute purpuream, in fundo tantum aut ad medium usque croceam. Conf. Schousboe Ma-

roc. 1. p. 25. Ob cor. profunde partitam sessilem forte melius una cum Ixiis. n. 2, 3 et 5 ad Moreas amandanda, aut omnes Moreas cum Ixiis conjungendae essent, quod omnino ulterius requirit examen.

β. *capensis*, flor. subnutante, scapo folioso. Andrew. t. 170. An species diversa ab Europaea?

5. *cruciata*, scapo unifloro, fol. linearib. basi attenuatis quadricarinatis. Willd. l. c. p. 197. Jacq. ic. 2. t. 200. Collect. suppl. p. 16. Hab. in Cap. b. Spei.

6. *fragrans*, scapo simplici subbifloro, fol. linearibus. Willd. Jacq. ic. 2. t. 274. Collect. suppl. p. 9. Cor. immaculata, lutea. Caps. subrotundo-ovata.

7. *humilis*, scapo ramoso, floribus secundis, fol. falcatis erectis. Thunb. diss. n. 4. In Cap. b. Spei.

♂ *Scapo hirsuto, foliis longiore.*

8. *pilosa*, fol. linearibus pilosis, florib. alternis. Lin. suppl. 92.

9. *hirta*, fol. ensiformibus hirtis, florib. secundis. Thunb. diss. n. 6. Ixia secunda. Jacq. ic. rar. 2. t. 277. Collect. 4. p. 180. In arenosis humidis Cap. b. Spei.

10. *secunda*, fol. elliptico-ensiformibus, scapo villososcapro. Thunb. diss. n. 7. Caulis ramoso erecto, floribus secundis, stigmatibus latis membranaceis. De la Roche diss. 17. Houttuyn. 11. t. 78. f. 1. I. *scillaris*. L. Sp. pl. t. 52? Flor. sessiles, parvi, caerulei: tubo brevi, spathae foliola longa. Lam. enc. 3 p. 336.

*** *Scapo glabro foliis longiore, foliis crispis.*

11. *crispa*, fol. linearibus crispis, flor. spicatis alternis. Thunb. diss. n. 8. t. 2. f. 3. Lin. suppl. 91. Ad Cap. bonae Spei. Spatha hyalina. Tub. filiformis. Limb. lacin. obovatis oblongis.

12. *cinnamomea*, fol. lanceolat. crispis, flor. alternis. Thunb. diss. n. 2. t. 2. f. 1. Lin. suppl. 92. In collib. Leuwestaart Cap. b. Spei. Flos cinnamomi odore, praesertim vespere. Th.

13. *corymbosa*, fol. lanceolatis crispis, scapo simpliciter. Thunb. diss. n. 10. Jacq. ic. rar. 2. t. 284. Collect. 4. p. 179. Pluk. alm. 87. t. 25. f. 1. In sabulosis et ipsis viis Swartlandiae ad Cap. b. Spei. Flor. caeruleae parvi. Planta palmatis.

14. *fastigiata*, fol. ensiformib. linguatis nervosis crispis, caule flexuoso cinctis, flor. glomerato-fastigiatis. Lam. enc. 3.

p. 337. Ad C. b. Spei. Bulb. reticulatus. Cor. ex flavo purpurascens. L.

15. *heterophylla*, fol. radicalib. lineari-ensiformibus striatis planis, floralib. lineari-ensiformibus undulatis floribus aggregatis longioribus. Willd. l. c. p. 199. Galaxia plicata foliis plicatis. Jacq. ic. rar. t. 291. Collect. suppl. 30. Habitat in Cap. b. Spei. Ab omnibus foliis et inflorescentia distincta. Spatha univalvis. Cor. lactea: tub. longus, laciniis basi puncto nigro. Stamina libera Willd.

*** *Scapo glabro foliis longiore, foliis planis.*

16. *anemoneiflora*, scapo unifloro, fol. lineari-ensiformibus, superne obliquis, longitudine scapi erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 273. Collect. suppl. 10. Ad Cap. b. Spei. Cor. limbus magnus planus. Fol. glauca. W.

17. *coelestina*, scapo unifloro, foliis lineari-subulatis, scapo multo brevioribus. W. Sp. pl. 200. Bartram. itin. Habitat in Carolina.

18. *linearis*, fol. linearib. angustissimis convexis, scapo simplici erecto. W. Thunb. diss. n. 11. In Cap. b. Spei.

19. *pusilla*, fol. sublinearibus costatis crassis, scapo bifloro. Andrew. t. 245. Floret April. Stigmata crassiuscula. Fl. caerulei.

20. *filiformis*, fol. ensiformibus acuminate, scapo filiformi, spica nutante, tubo petalis brevior. Ventenat. descr. pl. p. 48. t. 48. Hab. ad C. b. Spei. Floret Majo. Tub. subincurvus.

21. *speciosa*, fol. linearibus costatis gramineis, scapo filiformi bifloro, cor. subcampanulatis. Andrew. t. 186. Fl. occineae, tub. brevis, spath. 3-valvis.

22. *incarnata*, scapo simplici erecto, fol. ensiformibus ad oras revolutis, floribus secundis spicatis. Jacq. ic. 2. t. 281. Collect. suppl. 13.

23. *patens*, fol. ensiformibus glabris, racemo terminali, cor. campanulatis patulis, laciniis alternis angustioribus. Ait. Kewens. 1. p. 59.

24. *capillaris*, fol. linearibus, scapo polystachyo, spathis scariosis Thunb. diss. n. 12. t. 2. f. 2. Lin. suppl. 92. Hab. in arenosis humidis Cap. bonae Spei.

25. *flexuosa*, foliis linearibus, racemo flexuoso multifloro. Ait. Kew. 1. p. 58. Mill. ic. 156. f. 2.

26. *angusta* fol. linearibus acutis

*capo flexuoso simplici, limbo subreflexo. Willd. sp. p. 202. Bulbo conico. Jacq. ic. rar. 2. t. 279. Collect. 4. p. 183.

27. *radiata*, fol. linearibus obtusis, scapo flexuoso geniculato simplici, limbo corollae patenti. Willd. p. 202. Bulbi conici basi plana excurrente in orbiculum dentato-radiatum. Jacq. ic. rar. 2. t. 280. Collect. suppl. 15. *β* *L. fistulosa*. Andrew t. 59. Stigm. longissima incurva. Flor. pedicell.

28. *scillaris*, fol. linearibus, floribus secundis, rachide flexuosa. Houttuyn 11. t. 77. f. 2. afr. Lam. enc. p. 338.

29. *leucantha*, scapo polystachio erecto, foliis lineari-ensiformibus obliquis erectis striatulis, flor. secundis nutantibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 278. Collect. suppl. 11. In Cap. bonae Spei.

30. *polystachya*, fol. linearibus, scapo spicis pluribus. Sp. pl. 51. *β* *incarnata*, flor. incarnatis; antheris conniventibus. Andrew t. 128. j. Cor. majore striata rubra, spath. valvula bifida? Jacq. coll. suppl. t. 2. Petala alba. Inter stylum tripartitum stamina eriguntur, quasi styli exteriores essent.

31. *maculata*, fol. ensiformibus, scapo polystachyo, flor. alternis, cor. versicoloribus basi maculatis. Thunb. diss. n.º 19. Willd. p. 215. Fol. Glab. lioli glabris, flor. corymbosis terminalibus. Mill. ic. 156. f. 1. *maculata*, fol. ensiformibus glabris, scapo duplo brevioribus, flor. alternis subspicatis, petalis basi obscuris ovatis concavis, stigm. bifidis. Andrew. t. 196. Spath. 3-valvis. Quoad colorem floris valde variat.

32. *capitata*, fol. lineari-ensiformibus, flor. majusculis subcapitatis, spatha polyphylla. Andrew t. 129, qui adhuc plures, forte distinctas, delineavit varietates; vid. tab. 23, 50, 129 et 232 ejus op. ris.

33. *viridiflora*, fol. linearibus striatis, spica simplici longissima. Lam. ill. 1. p. 112. *l. spicata*. Andrew. t. 29. Ad Cap. b. Spei. Spica pedalis. Flor. virescunt, limbo nigricant.

34. *lancea*, fol. ensiformibus, flor. secundis, scapo simplici flexuoso. Thunb. diss. n.º 21. Jacq. ic. 2. t. 281. Collect. suppl. 13.

35. *pentandra*, fol. ensiformibus, flor. pentandris. Thunb. prod. 10. Staminibus curvis. Lin. suppl. 92. Hab. prope Groene Kloof in collibus. †

36. *aulica*, flor. racemosis, bracteis integris, fol. ensiformibus planis nervosis laevibus. Aiton. Kew. 1. p. 57.

37. *falcata*, scapo subpolystach. flexuoso, fol. ensiformibus, striatis scapo brevioribus, rachis erecta. Jacq. ic. 2. t. 276. Collect. 4. p. 183. Lin. suppl. p. 92. In collibus Cap. b. Spei.

38. *excisa*, fol. ovatis, flor. secundis, scapo flexuoso. Thunb. diss. n.º 24. t. 1. f. 4. Lin. suppl. 92. Ad Cap. b. Spei. Cor. limbus violaceus. Var. glumis lanceolatis, floribus uno s. duobus. Th.

*** *EURYDICE, filamentis connatis.*

39. *columnaris*, flor. subcapitatis, filam. ultra medium tantum connatis. Andrew. t. 203. Cum sequentibus ad Cap. b. Spei.

l. angustifolia, fol. linearibus, flor. unicoloribus rubris, spatha trifida? Andrew fig. cit. et *versicolor*, petalis luteis basi nigrescentibus, spatha pluries incisa. Andr. t. 211.

β. latifolia, fol. lato-lanceolatis falcatis. Andr. t. 213. Flor. caerulescentes.

40. *grandiflora*, fol. linearibus longissimis, filam. totis connatis. Andrew. t. 250. Flor. violacei.

**** *BELEMCAANDA. Cor. tubo subbrevis, apice dilatato, limbo inciso subcampanulato. Laciniae ovatae. Stum. in nonnullis subincurva, in tubi medio.*

41. *chinensis*, cor. subhexapetala, caule flexuoso. Morea *chinensis*. Thunb. Willd. Sp. 1. p. 245. Rheed. hort. 11. t. 37. Sponte in India arenosis crescit.

42. *deusta*, fol. lanceolatis nervosis, flor. alternis sessilibus, petalis obtusis: exterioribus basi nigro-maculatis. Ait. p. 60. Andrew. f. 134. Cor. crocea. Fl. majore.

43. *squalida*, fol. lineari-lanceolatis, flor. alternis sessilibus, tubo bracteis longiore, pet. ovato-oblongis. Ait. 61. Cor. pallide lutea: venis obscurioribus.

44. *caerulescens*, fol. oblongo-lanceolatis villosis, spathis tubo aequalibus, cor. campanulata. Jacq. ic. rar. 2. t. 204. Willd. p. 198. (*l. villosa*.) Coll. 3. p. 267.

45. *cyanea*, fol. oblongo-lanceolatis villosis, spathis tubo brevioribus, limbo patentissimo. Jacq. ic. rar. 2. t. 285. Coll. 3. p. 268. *l. rubro-cyanea*. Willd. sp. 1. p. 198.

46. *punicea*, fol. oblongis villosis, scapo ramoso, flor. secundis: petalis mucronatis Willd. Jacq. ic. t. 287. Coll. suppl. p. 12.

47. *purpurea*, fol. ensiformibus subvillosis, vagi is glabris, scapo ramoso, limbo patentissimo. Jacq. t. 286. Coll. 3. p. 268.

Obs

08s. In 4 hisce speciebus spatha 3-
talvis est et folia plicata disticha.

48. *aristata*, fol. ensiformibus falcatis
glabris, scapo subbifloro; spathis laceris.
Thunb. diss. n.º. 15. Andrew. t. 87. *β. uni-
flora*. Lin. mant. p. 27. Jacq. ic. t. 283.
Cor. purpurea, magna.

49. *ambriata*, fol. ensiformibus, caule
regulari flexuoso, spathis fimbriato-laceris.
Lam. enc. 3. p. 339. Mill. ic. t. 237. f. 1.
et 2. Bel. *semi-flexuosa*. Mönch. meth.
pl. suppl. p. 214. Cor. flava.

50. *bulbifera*, fol. lineari-lanceolatis
subfalcatis, spathis membranaceis setaceo-
laceris. Thunb. Andr. t. 487. Mill. t. 236. f. 2.
Anillis bulbiferis, stam. lateralibus. Lin.
m. acad. 4. p. 300. Cor. sulphurea. Spatha
in Andrewii fig. tota integra picta.

103. MORAEA. Cor. hexapetala pa-
tentissima tubo subnullo. *Stigm.*
3-6, filiformia. *Caps.* oblonga.
(Flor. marcescendo in spiram
sæpius convoluti. *Filam.* in non-
nullis connata et petala alterna
minora.)

1. *lugens*, scapo ancipiti, petal. disco-
lobus alternis majorib. Linn. suppl. p. 99.
M. *metaleuca*. Thunb. diss. n.º. 1. t. 1. f. 3.
Ejard. diss. acad. 2. p. 277. Willd. sp. 1.
p. 240. Hab. (cum caeteris speciebus) ad
Cap. b. spei, inter frutices. Pet. exteriora
majora alba, interiora nigra.

2. *polyanthos*, scapo tereti, fol. flexuoso-
cuneis, petal. alternis minoribus. Thunb.
n.º. 12. Lin. suppl. p. 99. *Stigm.* 6. Cor.
caerulea, subregularis. Flor. in ultimis
ramulis capillaribus. Th.

3. *collina*, scapo tereti, fol. dependente,
lacin. cor. subaequalib. Thunb. n.º. 13. Jacq.
ic. rev. 2. t. 226. Sisyrinchium. Cav. diss.
bot. 6. p. 346. In collib. Cap. b. spei fre-
quens. Cor. rubicunda.

4. *virgata*, fol. linearib. longissimis,
scapo ramosissimo virgato, flor. solitariis.
Jacq. coll. 3. p. 194. Ic. rar. 2. t. 228. Ixia
Willd. 1. p. 202. *Stigm.* lacin. 6, involutae.
Germen lineare.

5. *longifolia*, scapo tereti articulado
flexuoso, fol. revolutis laxis. Thunb. diss.
n.º. 12. Lin. suppl. (M. *flexuosa*.) Ixia lon-
gifolia. Jacq. hort. 3. p. 47. t. 50. Cor.
alba, tubo satis longo. *Stigm.* 6.

6. *elegans*, scapo tereti, fol. unico li-
neari-ensiformi procumbente, petal. eglan-
dulis. Jacq. hort. Schoenbr. 1. p. 6. t. 12.

Sisyrinchium. Willd. sp. 3. p. 577. Flos
unicus, terminalis, magnus, flavus, in
medio petal. exteriorum macula magna
viridis.

7. *grandiflora*, scapo tereti simplici,
petal. obovatis, fol. lanceolatis plicatis.
Willd. sp. 3. p. 578. Cavan. diss. 6. p. 346.
t. 192. f. 2. sub Sisyrinchio. Spatha 3-flora.
Cor. lutea. Petala obtusissima. W.

8. *umbellata*, scapo tereti striato, spic.
umbellato-paniculatis, involuc. diphyllis
longissimis. Thunb. diss. n.º. 16. Flor. cae-
rulei, in apicib. solita ii.

9. *crispa*, scapo tereti articulado, fol.
convuluto crispo reflexo. Thunb. l. c. Flor.
pauci, petunculati, caerulei.

10. *pusilla*, scapo ancipiti, fol. distichis,
flore subsolitario. Thunb. diss. n.º. 4. Thunb.
prol. 11. Fol. radicalia lineari-lanceolata
subfalcata. Cor. caerulea, lacin. alternæ
angustiores.

11. *gladiata*, scapo foliisque compressis,
spica laterali solitaria, involucro duplo
breviore. Thunb. diss. n.º. 8. Thunb. prol.

11. Ixia gladiata, stylis tribus. Lin. suppl.
93. Cor. flava, patens. Bractea ensiformis,
corolla lutea extus rubra.

12. *aphylla*, scapo nudo foliisque com-
pressis, spica laterali solitaria, involucro
multoties brevior. Thunb. diss. n.º. 9,
t. 2. f. 1. Lin. suppl. 99. Cor. flava. Flores,
ut in Junco, laterales.

13. *filiformis*, scapo foliisque compressis
subfiliformibus, flore solitario terminali.
Thunb. diss. n.º. 10. tab. 1. f. 2. Lin.
suppl. 100. In Cap. b. spei. Flores cum
spathis referunt fl. Dianthi. Cor. lutea. Th.

104. SISYRINCHIUM. Cor. hexape-
tala. Stam. ut plurimum connata,
Germen subrotundo-triquetrum,
pedicellatum, extra spatham.
(Petala in nonnullis aristata.)

1. *capitatum*, scapo ancipite, fol. en-
siformibus plicatis, flor. capitatis, filam.
liberis. Moraea palmifolia. Thunb. n.º. 16.
M. *plicata*. Swartz. Flor. Ind. occid. 1.
p. 82. Willd. sp. pl. L. 1. p. 243. Plum.
amer. p. 35. t. 45. f. 2. Ixia americana.
Aubl. Guian. p. 33. Hab. in Jamaicae pas-
cuis montosis. Pet. alba, basi germi-
ni contigua. Sw.

2. *racemosum*, scapo teretiusculo nudo,
flor. racemosis secundis, fol. ensiformib.
plicatis. Jacq. coll. 3. p. 192. Ic. pl. rar. 2.
t. 227. (Moraea palmifolia.) Sisyrinch.
palmifolium. Willd. sp. 3. p. 579. Cav.

D

diss. 6. p. 348. t. 191. f. 1. Linn. Mant. 122.
Ency. syn. Hab. in Brasilia. Flor. parvi albi.

3. *spathaceum*, scapo foliisque teretibus filiformibus, spicis lateralibus aggregatis. Thunb. diss. n°. 11. Ej. diss. acad. 2. p. 286. In coll. C. b. spei frequens. Pet. lutea, vix basi connata, filam. libera. Hujus loci *Borbatia indica*. L. cfr. Willd. sp. pl. 1. p. 242.

4. *striatum*, scapo ancipiti ramoso alato, fol. ensiformibus sulcatis scapo brevioribus, flor. terminalibus subumbellatis. *S. striatum* Smith, spicatum Cavan? et reticulatum Quor. Hab. in Mexico. Flor. subventricosi, flavescentes, subtus fusco-lineati. Caul. 2-pedalis. Bract. 1-phylla.

5. *mucronatum*, fol. scapisque simplicibus subsetaceis, spatha colorata: valva altera in mucronem longum desinente. Mich. Flor. 2. p. 33. Hab. in Pennsylvania. Fol. ima parte glumisque amethysteis.

6. *Bermudianum*, fol. ensiformibus, caule ancipiti ramoso, spathis muticis, flore brevioribus. Lam. enc. 1. p. 403. Cav. diss. 6. p. 346. t. 192. f. 1. Dill. Elth. t. 41. f. 48. Hab. in Bermudis.

7. *anceps*, scapo simplici alato, spathis inaequalibus, fores superantib. Lam. enc. 1. p. 403. Cav. diss. 6. p. 345. t. 190. f. a. Willd. sp. 3. p. 579. *S. gramineum*. Cartis bot. mag. t. 464. In Virginia et Canada. Petala caerulea, apice in medio, uti prioris, aristata.

8. *micranthemum*, radice fibrosa, caule ancipiti, fol. canaliculatis, petalis linearibus. Cav. diss. 6. p. 345. t. 191. f. 2. In regno peruviano.

9? *ixioides*, fol. ensiformib. distichis, panicula trichotoma, petalis exterioribus brevioribus. Forst. prodr. Moraea. Thunb. n°. 7. Ferrara. Willd. 3. p. 582. In Nova Zeelandia. Pedunc. capillares, spathis longiores.

105. TIGRIDIA. Spatha bivalvis. Cor. campanulata, 6-petala: petala 3 interiora minora hastata (margine nectarifera). Filam. connata. Stigm. 3, bifida. Caps. oblonga, angulata.

1. *Pavonia*. Moraea Th. Ferrara L. Andrew. t. 178. Tigridia Juss. gen. Redouté Liliac. Hab. in Mexico. Cor. rubra fundo et petala, praesertim minora, guttato-variegata. Intra 6 horum spatium corolla speciosa evanescit, Fl. aetate,

106. FERRARIA. Spatha 1-phylla. Cor. 6-petala: petal. inaequalibus undulato-crispis. Filam. connata. Stigm. lacinae penicillatae.

1. *minor*, caule simplici, flor. inodoris. Moraea Ferrariola Jacq. coll. 4. p. 141. Ferrara Ferrariola. Willd. sp. 3. p. 581. Hab. ad Cap. b. spei. Pet. unguis virescunt, intus striis atropurpureis. Pet. angustiora immaculata: latiores flavovirent., striis punctisque violaceis. Jacq.

2. *punctata (undulata L.)*, caule ramoso, fol. punctatis. Moraea undulata. Thunb. n°. 21. Diss. acad. p. 298. Ferrarii de Cult. flor. p. 168. t. 171. Iris stellata Barr. ic. Prope Leuwestaart C. b. spei. Col. subtus flavo-nigrescit, fasciis purpureis supra purpureo-fuscis, margine subolivaceis. Olor *Stapeliae* cadaverosus muscas alliciens. Th.

107. IRIS. Cor. 6-petala: laciniis alternis reflexis. Stylus o. Stigm. petaliformia. Stamina incurbentia.

* *Barbatae, foliis ensiformibus.*

1. *ciliata*, barbata, fol. ensiformibus ciliatis. Thunb. diss. de Iride, n°. 1; et ejusd. diss. acad. 2. p. 101. Willd. sp. pl. p. 224. In collibus Cap. b. spei.

2. *minuta*, barbata, foliis ensiformib. glabris, scapo unifloro, petalis oblongis acutis. Thunb. diss. n°. 2. Lin. suppl. 98. Hab. in monte Leuwestart ad Cap. b. spei. Flor. lutei, scap. vaginatus.

3. *pumila*, barbata, scapo unifloro, fol. ensiformibus glabris brevioribus, tubo exserto, petalis oblongis obtusis. Willd. 1. c. Jacq. anst. t. 1. Lam. encycl. 3. p. 285. Hoffm. germ. ed. 2. p. 13. Hab. in Germaniae, Austriae, Galliae, Pannoniae collibus, muris. Flor. versicolores, plerumque purpureo-caerulei. Scap. fol. vaginantib. cinctus.

4. *lutescens*, barbata, scapo subunifloro, fol. ensiformibus glabris longiore, tubo spathis incluso, petalis oblongis obtusis. Willd. sp. p. 225. Lam. encycl. Hab. in Germaniae, Galliae montosis. Pumila. Cor. albidum flavescens, laciniis exterioribus basi violaceo-reticulatis undulat. emarginatis. W.

5. *cristata*, barbata, barba cristata, scapo subunifloro longitudine foliorum, cernimib. trigonis, petalis subaequalib. Willd. sp. p. 225. Aiton. Kewens. 1. p. 70. Hab. in America boreali, in montib. umbrosis Carriacinae. Radix repens. Caulis vix digitalis

1-2-florus. Cor. laciniae fasciae subtrifariam undulato-crenata. Michaux. p. 22.

6. *susiana*, barbata, fol. ensiformibus glabris, scapo unifloro, petalis rotundatis. Thunb. diss. n°. 4. Decand. et Proust. Liliac. t. 19. I. *susiana* flore maximo ex albo nigricante. Bauh. pin. 31. Hab. in Oriente.

7. *florentina*, barbata, fol. ensiformib. glabris, scapo subbifloro brevioribus, floribus sessilibus. Lam. ill. p. 121. Morison sect. 4. t. 5. f. 5. Hort. cyst. vern. 8. p. 4. f. 3. Cor. alba, lacin. latae, infer. venis pallide luteis pictae. Stigm. crenulata. Rad. odorata. Desf. Hab. in Europa austral. et in Barbaria.

* *alba*, barbata, caule multifloro fol. altiore, spathis basi foliaceis, apice marginisque scariosis, cor. tubo germine longiore. Savi. Flor. Pisana. 1. p. 32. Lob. ic. 59. Hab. prope Pisam.

8. *avissima*, barbata, fol. ensiformib. glabris, brevioribus scapo bifloro, germine obtuse trigono. W. Jacq. icon. rar. 3. t. 220. Collect. 4. p. 68. Gmel. sib. t. p. 31. t. 5. f. 2. Hab. in Sibiriae locis subhumidis. Scap. basi tantum vaginatus.

9. *arenaria*, barbata, scapo bifloro toto vaginato fol. ensiformibus brevioribus, flor. superiore abortiente. Walldst. et Kotsch. Pl. rar. Hong. p. 57. t. 57. Pumila flava, scap. vix pollice longior. Pet. basi venis rubrolacca.

10. *biflora*, barbata, fol. ensiformibus breviorib. scapo subtrifloro, germine tereti. Thunb. diss. n°. 6. Besl. cyst. vern. 114. Hab. in Lontaniae rupibus et ad lacum Baikal Sibiriae. Cor. violacea non emarginata. Floret quotannis bis.

11. *aphylla*, barbata, fol. ensiformib. glabris aequantibus scapo multifloro subnudo. Thunb. diss. n°. 7. *J. nudicaulis*, corollis barbatis, scapis subternis nodis semimultifloris vix longitudine foliorum, spatulis ventricosis viridibus. Lam. encyc. 3. p. 264. Habitat?

12. *variegata*, barbata, fol. ensiformib. glabris aequantibus, scapo multifloro. Th. diss. n°. 8. Curt. mag. t. 13. Habitat in Hungaria. Cor. alba, apice purpurea, venis atropurpureis, lacin. erectae flavae acutae; stigmata flava. Willd.

13. *squalens*, barbata, fol. ensiformib. glabris erectis brevioribus scapo multifloro, lacin. cor. deflexis replicatis, erectis emarginatis. Thunb. diss. n°. 11. I. *variegata*.

Jacq. aust. t. p. 7. 2. 5. In Europa australi. Cor. lacin. erectae emarginatae luteae, stigmata sordide lutea. W.

14. *plicata*, barbata, caule multifloro foliis altiore, petalis undulato-plicatis erectis latioribus. Lam. ill. p. 121. Coliur in hortis. Pet. albo et violaceo variegata, basi venis obscure purpur. Odo. flor. gratus.

15. *Swertii*, barbata, caule trifloro fol. altiore, petalis undulatis replicatis subemarginatis. Lam. l. c. et encycl. 3. p. 116. Swert. florileg. t. 41. f. 1. In hort. colitur. Pet. albidia, stigm. dilute purpur.

16. *japonica*, barbata, fol. ensiformib. falcatis glabris, brevioribus scapo compresso multifloro. Thunb. Act. Soc. Jap. Lond. 2. p. 32. Hab. in Japonia. Flores axillares. Corolla alba. Thunb.

17. *sambucina*, barbata, fol. ensiformibus glabris erectis, brevioribus scapo multifloro, lacin. corollae reflexis planis. Thunb. diss. n. 10. Jacq. t. p. 1. t. 2. J. laetifolia germanica sambuci odore. Bauh. pin. 31. Hab. in Europa australi. Similima I. germanicae, sed deflexa petala saturatius violacea. Stigmata serrata.

18. *lurida*, barbata, fol. ensiformib. glabris erectis, brevioribus scapo multifloro, lacin. corollae exterioribus revolutis. Willd. l. c. p. 229. Ait. Kew. t. p. 68. Hab. cum priore. Petala exteriora reflexa atropurpurea, petala interiora, lumina purpurascens; ungue squalide lutescente. Forte varietas ferec sambucinae, sed in flora. Ait.

19. *imbriata*, fol. ensiformib. glabris brevioribus scapo multifloro, cor. patulis, stigm. imbricato. Ventenat. descr. p. 9. t. 9. Hab. in China. Moraeis subaffinis. Corolla dilute caerulea; petal. margine denticulata.

20. *germanica*, barbata, fol. ensiformib. glabris falcatis, brevioribus scapo multifloro, tubo germine longiore. Thunb. diss. n°. 6. Blackw. t. 69. Roth. germ. I. p. 17. II. p. 41. In Europa australi. Vesicular. Rad. (sicca) odoratiss. Stigm. dentata. Petala interiora non emarginata.

* *pallide caerulea*, barbata, fol. ensiformib. glabris falcatis, breviorib. scapo multifloro, tubo longitudine germis Willd. l. c. p. 230. I. *pallida*. Lam. enc. 3. p. 264. I. *dilute caerulea*, involuero albo. Tabern. ic. 647. Hab. in Italia, in monte Pisan. Savi.

Obs. S. c. in lum Willd. l. c. a *germanica* constanter distincta, et quoad observatione.

Dom. Courset (Bot. cultiv. 1. p. 518) tantum ejus varietas.

21. *compressa*, barbata, fol. ensiformib. glabris, caule paniculato compresso. Th. diss. n.º. 12. Lin. suppl. 98. Hab. in interioribus regionibus Cap. b. spei. h

22. *dichotoma*, barbata, fol. ensiformib. glabris, caule paniculato tereti. Thunb. diss. n.º. 13. Lin. suppl. 97. Pall. it. 3. app. n.º. 61. t. A. f. 2. Hab. in rupestribus apricis totius Dauriac. Refert Ixiam. Flor. longe pedunculati, omnium congenerum minimi, dilute purpurascens.

**** Barbatae, foliis linearibus.**

23. *tripetala*, barbata, fol. lineari scapo unifloro longiore, petalis alternissubulatis. Thunb. diss. n.º. 14. Lin. suppl. 97. Jacq. ic. 2. t. 24. Collect. 3. p. 272. Hab. in Cap. b. spei. Var. florib. caeruleis, violaceis et carneis.

24. *tricuspis*, barbata, folio lineari scapo subbifloro longiore, petalis alternis trifidis. Thunb. diss. n.º. 15. Lin. suppl. 98. Houttuyn. 11. t. 80. f. 1. Ad Cap. b. spei. Cor. albo, luteo et purpureo variegata.

***** Imberbes, foliis ensiformibus.**

25. *plumaria*, barbata, fol. linearibus, scapo multifloro, stigmatib. multifidis. Th. diss. n.º. 16. Moraea *iriopectala*. L. suppl. p. 100. Willd. sp. p. 244. Ad Cap. b. spei.

26. *Northiana*, barbata, scapo folisque falcatis linearibus, petalis exteriorib. pendulis, interiorib. suberectis apice revolutis. Moraea *Northiana* Andrew. t. 255. Hab. in Brasilia. Hab. Junci. Flor. 2. sub apic. scapi foliiformis. Pet. exteriora alba, interiora flavo-caerulea.

27. *orientalis*, barbata, scapo tereti, fol. distichis linearibus decrescentib., flore subsolitario terminali. Thunb. diss. n.º. 18. (M. *iridioides*) Willd. p. 244. Mill. ic. t. 239. f. 1. *Iris orientalis*. Till pisan. 89. t. 33. Hab. in Oriente, Constantinop. Pet. interiora alba, immaculata, patentia Stigm. caeruleo. petaloides. Th.

28. *Xiphium*, imberbis, fol. ensiformib. canaliculato-subulatis, scapo bifloro, petal. stigmat. lere angustioribus, germine teretitrigono. Ehrh. Beitr. 7. p. 139. *Iris variabilis*. Jacq. collect. 2. p. 321. Besl. aest. t. 4. f. 2. t. G. f. 2. 3. t. 10. f. 1. Hab. in Hispania, Sibiria. Quoad color. variat.

29. *Xiphiodes*, imberbis, fol. ensiformibus canaliculato-subulatis, scapo bifloro, petalis stigmat. latioribus, germine acute

angulato. Ehrh. Beitr. 7. p. 140. *Iris Xiphium*. Jacq. Collect. 3. p. 320. Besl. syst. aest. t. 7. f. 1. t. 8. f. 1. t. 9. f. 1. Hab. in Hispania.

30. *Pseud-Acorus (paludosa)*, imberbis, fol. ensiformibus, petalis alternis stigmat. minoribus. Thunb. diss. n.º. 18. Fl. dan. t. 494. Roth. germ. 1. p. 17. II. p. 43. *Acorus adulterinus*. Bauh. pin. 34. Hab. in paludosis, aestate.

31. *foetida*, imberbis, fol. ensiformibus, scapo uniangulato. Thunb. diss. n.º. 19. Cor. imberbibus petalis interioribus patentissimis, caule uniangulato, fol. ensiformibus. L. Hort. cliff. 19. Moris. S. 4. t. 5. f. 2. mala. Hort. syst. 8. f. 1. Hab. in Gallia, Anglia, Hetruria, Hungaria et Barbaria. Cor. caerulescenti-tristis. Petala exteriora, ungue subtus plicis rugoso. Fol. foetidiss., obscure viridia.

32. *virginica*, imberbis, fol. ensiformibus, scapo folioso ancipiti. Thunb. diss. n.º. 20. Jacq. Collect. 2. p. 322. Cor. lacin. 3 fascia mucido-tomentosa, caps. trigona: angulis sulcatis. Mich. Fl. amer. p. 22. Hab. in Virginiae et Carolinae palustribus.

33. *versicolor*, imberbis, fol. ensiformibus, scapo tereti flexuoso, germinibus subtrigonicis. Thunb. diss. n.º. 21. Curt. mag. t. 21. Hab. cum priore. Petala apice obscure violacea basi flavescentibus venis violaceis, interiora carnea. Stigmata alba. Willd.

34. *halophila*, imberbis, fol. ensiformibus, radicalibus longissimis, scapo tereti, germinibus hexagonis. Ait. Kew. p. 72. Pall. it. 3. app. 63. t. B. fig. 2. In Sibiriae locis depressis salsis.

35. *ochroleuca*, imberbis, fol. ensiformibus depressis striatis, scapo subtereti, germinibus hexagonis. Thunb. diss. n.º. 22. Act. Petrop. 1781. 1. p. 242. t. 8. Hab. in Oriente. Petala reflexa, basi dilatata venis obscuriorib., limbo flavo marginib. albo; erecta nivea, basi venis flavescentib. Stigmata nivea. Affinis I. spuriae.

36. *spathacea*, imberbis, fol. ensiformibus rigidis, scapo tereti bifloro, spathis longissimis. Thunb. diss. n.º. 23. *Spathulata*. Lin. suppl. 99. In interioribus regionibus Cap. bonae spei.

37. *ramosa*, imberbis, fol. ensiformib., caule paniculato multifloro. Lin. suppl. 99. In Schwartlandiae arenosis ad Cap. b. spei.

38. *stylosa*, acaulis imberbis, fol. ensiformibus, cor. lacinis subaequalibus: tubo longissimo. Desf. 1. c. t. 5. I. *unguicularis*. Lam. ill. p. 124. In Algeria, in scipibus. Cor. caerulea. stigma angusta.

*** *Imberbes*, fol. *linearibus*.

39. *scorpioides*, acaulis imberbis, fol. caeliculatis, cor. laciniis tribus erectis minimis: tubo longissimo. Desf. l. c. t. 6. l. *microptera*. Lam. l. c. Hab. in Algeriae humilis. Fl. hyem. Stigm. maximum, profunde bifidum. D.

40. *juncea*, imberbis, bulbo tunicato, caule subbifloro, fol. subulatis canaliculatis, spatha diphylla acuta, cor. tubo elongato. Desf. atl. p. 39. t. 4. Poir. iter. ed. germ. t. r. (inala.) Hab. in collibus aridis in Atlant. Cor. lutea. Caps. longa. D.

41. *Sisyrinchium*, imberbis, fol. linearibus undulatis reflexis, scapo unifloro. Thunb. diss. n.º 25. Hab. in Hispania, Lusitania, Barbaria. Petala purpurea, macula lutea loco barbae. Bulbi ex gemino bulbo altero alteri imposito.

42. *longifolia*, fol. linearibus canaliculatis longissimis glaucis, scapo multifloro. Andrew. Repos. t. 45. Hab. in Cap. bonae spei. Flor. et Bulbi ut in antecedente. Fol. 3-petalia. Cor. macula lutea oblonga.

43. *verna (nana)*, imberbis, fol. linearibus planis, scapo unifloro, lac. corollae alternis aequantibus. Thunb. diss. n.º 26. Pluk. alm. 198. t. 166. f. 6. Habitat in Virginia. Pusilla. Fol. lineari-gladiata. Rad. fibrosa. Michaux p. 22.

44. *persica*, imberbis, fol. linearibus planis, scapo unifloro, petalis interioribus brevissimis patentissimis. Syst. veg. p. 79. Lam. ill. t. 33. f. 3. Rudb. elys. 2. p. 10. f. 9. Hab. in Persia.

45. *angusta*, imberbis, folio filiformi lineari erecto glabro, scapo subunifloro, spathis obtusis. Thunb. diss. n.º 28. Hab. ad Cap. b. spei.

46. *setacea*, imberbis, fol. filiformi-lineari erecto glabro, scapo glabro subunifloro, spathis acutis membranaceis. Th. diss. n.º 29. t. 1. f. 2. I. *setifolia*. Lin. suppl. 99. Cum priore.

47. *tenuifolia*, spatha biflora, folio longissimo filiformi, cor. tubo filiformi elongato. Lin. suppl. 97. Pall. it. 3. app. n.º 66. tab. C. fig. 2. In arenosis Davuriae et ad Wolgam. Cor. pallide caerulea, odore caryophylleo fragrans.

48. *ventricosa*, imberbis, fol. linearib., scapo subbifloro, spathis ventricosis, tubo elongato, germine trigono. Willd. l. c. p. 236. Pallas itin. 3. app. n.º 62. t. B. f. 1. Cum priore. Cor. pallide caerulea. Germen lateribus sulco bipartitis. Pall.

49. *elegans*, imberbis, fol. gramineis attenuatis, scapo subbifloro, spatha ventricosa, germine trigono, stigm. crenatodentato. In hortis rarius obvenerit. Caul. 2-petalis. Cor. magna elegans, lac. exter. flavesc. in medio macula lata fulva. Stigm. sulphur. margine caerulea.

50. *graminea*, imberbis fol. linearibus scapo subbifloro ancipiti superantibus, germinibus hexagonis. Thunb. diss. n.º 31. Jacq. aust. t. 2. Hab. in Austria.

51. *ensata*, imberbis, fol. linearibus, scapo subbifloro tereti, germinibus hexagonis. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 328. I. *graminea*. Thunb. jap. 34. Habitat in Japonia.

52. *spuria*, imberbis, fol. linearibus, scapo subbifloro tereti, germinib. hexagonis. Thunb. diss. n.º 32. I. *spathulata*, imb. fol. ensiformib. caule subbreviorib. pet. majorib. spathulatis. Lam. enc. 3. p. 300? Jacq. aust. t. 4. Hab. in Germaniae, Galliae, Sibiriae et Hongariae pratis.

53. *orientalis*, imberbis, fol. linearib. scapo subbifloro tereti articulo, germinib. trigonis, corollis fusco-reticulatis. I. *sibirica*. Thunb. jap. 33. Hab. in Japonia. Spathae fol. similes.

54. *pratensis (sibirica L.)* imberbis, fol. linearibus, scapo fistuloso subtrifloro tereti, germinibus trigonis. Thunb. diss. n.º 33. Lem. encycl. 3. p. 300. Jacq. aust. t. 3. Roth. germ. l. p. 18 II. p. 43. Hab. in Germaniae, Austriae, Helvetiae, Galliae, Sibiriae pratis. Fol. plana suberecta, caule breviora.

* *odorata*, imberbis, fol. gramin. caule subaequantib. attenuato-pungentib., caule tereti bifloro, germine trigono, cor. venosis. In horto quodam cultam inveni. Caul. subarticul. Flor. obscure caerulei: pet. exteriora medio lin. fulva, intus crispa. Odor gratus.

55. *martinicensis*, fol. linearibus, pet. foveolis glandulosis, germinibus trigonis. Thunb. diss. n.º 34. Jacq. amer. 7. t. 7. Xiphion flore ex luteo nigricante. Plum. spec. 8. ic. 260. t. 261. f. 1. Hab. in Martinica.

56. *crispa*, imberbis, fol. linearib. crispis. Thunb. diss. n.º 36. In collib. Cap. b. spei.

57. *pavonia*, imberbis, folio lineari glabro, scapo subunifloro. Thunb. Jacq. Coll. suppl. p. 8. Nob. ad Cap. b. spei. Caulis submentosus. Flos aurantiacus aut albus, macula bascos caerulea. Filam. connata.

58. *papilionacea*, imberbis, fol. linearibus reflexis hirsutis. Thunb. diss. n.º 37.

t. 2. f. 1. Jacq. Collect. suppl. p. 159. t. 3. f. 2. * Hab. ad Cap. b. spei.

59. *fugax*, imberbis, scapo tereti, fol. radicalib. lanceolato-linearib. canaliculatis, flor. terminalibus, stigmatib. erectis profunde bifidis. Moraea *fugax*. Andrew. t. 83. Ad Cap. b. spei. Rad. bulbosa, fol. interiora sublinearia. Flos *fugax*, 3 tantum horas durans.

60. *edulis*, imberbis, folio lineari pendulo glabro, scapo glabro multifloro. Th. diss. n°. 38. Moraea *fugax*. Syst. veg. 93. Jacq. Hort. 3. t. 20. In campis arenosis Cap. b. spei.

61. *tristis*, imberbis, fol. linearibus glabris, scapo hirsuto ramoso. Thunb. diss. n°. 39. Moraea *sordescens* Jacq. ic. rar. 2. t. 225. Ad Cap. b. spei.

62. *polystachya*, imberbis, fol. linearib. planis, scapo glabro ramoso. Thunb. diss. n°. 41. I. *lacera*, spathis laceris. Lam. ill. 125. Cum prioribus.

63. *viscaria*, imberb., fol. linearibus planis, petalis patentibus, caule viscoso. Lin. suppl. 48. In Cap. b. spei locis arenosis ad Salalahna bay. Odor bituminosus.

64. *bituminosa*, imberbis, fol. linearib. spiralibus, scapo viscoso. Thunb. diss. n°. 43. t. 2. f. 2. Petalis reflexis. Lin. suppl. 98. Ad Cap. b. spei. An varietas?

**** *Imberbes, foliis tetragonis.*

65. *tuberosa*, imberbis, fol. tetragonis. Thunb. diss. n°. 43. Moris. hist. 2. p. 348. s. 4. t. 5. f. 1. Hermodactylus. Tournef. cor. 50. In Arabia, Oriente.

108. MARICA. Cor. 6-petala, supera: laciniis interioribus minoribus. Stylus crassus. Stigma petaloideum, trifidum: laciniis indivisis acutis. Spatha magna flor. involvens.

1. *paludosa*, Willd. Sp. 246. Cipura paludosa. Aub. guj. 1. p. 18. t. 13. Lam. ill. p. 107. t. 30. Hab. in pratis humilib. Gujanæ. Folia graminea. Flores albi vel caerulei, spathis cincti. W.

109. DILATRIS. Cor. 6-petala supera hirsuta. Filam. tertium reliquis minüs. Stigma simplex. Caps. globosa, coronata, infera, trilocularis.

1. *corymbosa*, petalis ovatis, panicula hirsuta. Thunb. Act. Societ. Berol. 4. p. 46.

Berg. cap. 9. t. 3. f. 5. Dilatris *umbellata*, petalis ovatis, corymbo fastigiato hirsuto. Lin. suppl. 101. In sabulosis Cap. bonæ spei. Corollæ atropurpureæ, petalis connexæ. Stam. 3, longitudine petalorum. Stigma trigonum. Mant. T.

2. *Ixioides*, panicula ovata villosa, petalis ovalibus externe barbatis, stam. corolla longioribus. Lam. ill. p. 127. Hab. ad Cap. b. spei.

3. *viscosa*, petalis linearibus, panicula villosa-viscida. Thunb. prod. 10. Thunb. l. cit. 4. p. 48. Lam. ill. t. 34. In monte tabulari Cap. b. spei. T.

4. *paniculata*, petalis lanceolatis, caule paniculato. Thunb. l. c. 4. p. 51. Hab. in arenosis Cap. b. spei. Flor. purpureo-flavescentes. T.

5. *Heritiera*, fol. angustis irideis erectis, panicula subcorymbosa, petalis 3 linearibus, 3 alternis interiorib. lanceolatis. *Heritiera* Gmelini. Mich. Flor. amer. 1. p. 2. Her. tinctorum. Bull. des Sc. n°. 19. Hab. in Carolinae uliginosis. Cal. rubens. Cor. subcampanulata, tomentosa. Stigm. subtrilobum. Caps. 3-quetra. M.

110. WACHENDORFIA. Cor. 6-petala, inaequalis, infera. Caps. trilocularis, supera.

1. *thyrsiflora*, scapo subsimplici, panicula coarctata, fol. ensiformibus quinque-nerviis plicatis glabris. Th. prod. 12. Lam. ill. 1. p. 127. Burm. monogr. 2. f. 2. Ad Cap. b. spei, cum sequentibus omnibus.

2. *paniculata*, scapo polystachyo, panicula patente, fol. ensiformibus trinerviis plicatis glabris. Th. prod. 12. Smith. ic. pict. 1. p. 5. t. 5. Lam. ill. t. 34. f. 1. Erythrobulbus hellebori albi plicatis foliis. Pluk. mant. 70.

3. *hirsuta*, scapo polystachyo, panicula patente, fol. ensiformibus trinerviis plicatis villosis. Th. prod. 12.

4. *tenella*, scapo subpolystachyo, panicula patente, fol. linearibus trinerviis glabris. Th. prod. p. 12.

5. *graminea*, scapo polystachyo, panicula patente, fol. ensiformib. canaliculatis glabris. Th. prod. 12.

111. XIPHIDIUM. Cor. 6-petala, aequalis. Stam. recta. Caps. supera, 3-locul., polysperma. Spatha s. cal. o.

1. *album*, fol. glabris, petalis linearibus.

lanceolatis. Willd. Sp. 248. X. floribundum. Swartz prod. 17. et Flor. 1. p. 80. In Cumana, Amer. meridionali.

2. *caeruleum*, fol. hirsutis, pet. ovatis. Willd. l. c. X. *caeruleum*, florib. paniculatis, flore et fol. pilosis. Aubl. guj. 1. p. 33. t. 11. In pratis Gujanæ.

112. COMMELINA. Cor. 6-petala.

Nect. 3, cruciata, sitam. propriis inserta. Caps. subglobosa, 3-locularis.

* *Dipetalæ*, ob duo petala majora.

1. *communis*, corollis inaequalibus, fol. ovato-lanceol. acutis, caule repente glabro. Hort. ups. p. 18. Willd. sp. pl. 1. p. 249. Dill. elth. 93. t. 78. f. 89. Habitat in America. ☉

2. *polygama*, cor. inaequalibus diandris hermaphroditis et masculis, ramis prostratis radicanibus. Roth. catal. bot. 1. p. 1. et 2. p. 1. Kæmpf. amoen. 889. Hab. in Japonia.

3. *cayennensis*, procumbens, fol. ovato-lanceolatis acutis glabris: vaginis ciliatis, nectariis bilobis. Richard in Act. Soc. Lin. Paris. p. 106. In Cayenna.

4. *pilosa*, pumila diffusa, fol. lanceolatis, vaginis involucrique pilosis. Rich. l. c. Hab. cum priore.

5. *africana*, cor. inaequalibus luteis, fol. lanceolatis glabris, caule decumbente. Hab. in Aethiopia.

6. *bengalensis*, cor. inaequalibus, fol. ovatis obtusis, caule repente. Murr. comm. goett. 1779. p. 18. t. 5. Pluk. alm. 1. 27. f. 3. In Bengala.

7. *erecta*, cor. inaequalibus, fol. ovato-lanceolatis, caule erecto scabro simplicissimo Dill. elth. 94. p. 77. t. 88. Hab. in Virginia.

8. *virginica*, cor. subaequalibus, fol. lanceolatis subpetiolatis ore barbatis, caulibus erectis. Lin. Hab. in Virginia. Fol. supra retrorsum scabra: vaginis nervosis, ore barbatis pilis ferrugineis. ☿

♂? *longifolia*, caule stricto pubescente, fol. lanceolatis longissimis: vaginis rufobarbatis, pet. ternis subaequalib. Michaux Flora p. 23. In umbris sylv. Virginie et Carol. Julio. Sem. compressa subelliptica.

9. *angustifolia*, assurgens, debilis, fol. lineari-lanceolatis acutis planis, petalis duobus. Mich. l. c. p. 24. In Carolinae

campestris. Majo. Sem. cylindrica. Bract. subcordatae.

10. *longicaulis*, cor. subaequalibus, fol. lineari-lanceolatis sessilibus, vaginis ciliatis, caule decumbente. Willd. l. c. p. 251. pedicellis geminis filiformib. geniculatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 264. Collect. 3. p. 234. Hab. in humidis ad Caracas. ☿

11. *mollis*, cor. subaequalibus, foliis petiolatis ovatis pubescentibus, caule repente. Willd. Jacq. ic. rar. 2. p. 293. Collect. 3. p. 235. Cum priore. ☿

12. *vaginata*, cor. aequalibus, fol. linearibus, flor. diandris involucri vaginatis. Mant. 177. Pluk. alm. 1. 174. f. 3. In India orientali. Pedunc. terminati involucri convoluti. Corpuscula linearia. Antherae flavae, nigromaculatae. ☉

13. *nudiflora*, cor. aequalibus, pedunc. capillaribus, fol. linearibus, involucri nullo, flor. diandris. Mant. 177. Pluk. alm. 135. t. 27. f. 4. In Indiae orientalis aridis graminosis. Flor. nutantes. Corpuscula deltoidea. ☉

14. *cucullata*, cor. aequalibus, foliis ovatis, involucri cucullat. turbinatis. Mant. p. 176. Lam. enc. 1. p. C. *nervosa*: Burm. ind. 18. t. 7. f. 3. cfr. Loureiro Flor. Cochinchin. 1. p. 39. In India orientali. Involucri margine laterali coalita, Flores minuti.

15. *japonica*, fol. ovato-lanceolatis, undulatis, caule erecto angulato piloso, flor. paniculatis. Th. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 332. In Japonia.

16. *bracteolata*, cor. aequalibus, fol. lanceolato-linearib. undulatis subcrispis, pedunc. paniculatis bracteolis semivaginalibus. Lam. ill. gen. 1. p. 129. Habitat in India.

17. *spirata*, cor. aequalibus, fol. lanceolatis, flor. paniculatis, pistillo convoluti. Mant. 2. p. 176. In India orientali ad rivulos et locis humentibus. ☉

18. *hispida*, cor. aequalibus, fol. ovato-lanceolatis obtusis hispidis, pedunc. subquinquefloris. Flor. per. 1. p. 43. t. 73. f. a. Hab. in collibus provinc. Camanae. Stigm. subcapitatum. ☉

19. *fasciculata*, cor. aequalibus, fol. lanceolatis acutis, vaginis ciliatis, caule assurgente, rad. fasciculata. Flor. per. 44. t. 72. b. In collib. et arvis Limac. Pet. interiora caerulea, exteriora breviora, albidia. ☿

20. *nervosa*, cor. subaequalibus, fol. lan-

ceolatis 16-nerviis : vaginis hirsutis, caule erecto. Fl. per. l. c. Hab. in umbrosis ad Cuchero vicum peruvianum.

21. *gracilis*, eor. aequalibus, fol. ovatis acutis, margine scabris : vagin. longis ciliatis, caul. repente. Fl. per. l. c. t. 72. f. 2. Cresc. in Peruv. cultis et humidis. Pet. exteriora albidia.

22. *serrulata*, pedunc. axillarib. subsolitariis multifloris, fol. lanceolatis marginatis serrulato-scaberrimis, vagin. ciliatis. Vahl. eclog. amer. fasc. 2. In Cayenna.

113. CALLISIA. Cal. 3-phyllus. Pet. 3. Anth. geminae. Stigm. penicilliformia. Caps. compressa, 2-locularis. Nees. o.

1. *repens*, flor. axillaribus subsessilib. caule laevi, fol. glabris. Lam. enc. p. 563. ill. gen. t. 35. f. 1. Hapalanthus Jacq. amer. pict. p. 12. t. 12. Hab. in Amer. meridionali, locis udis.

2. *ciliata*, fol. cordatis vaginantibus denticulato-ciliatis, vaginis subtrifloris. C. *repens*. Flor. per. 1. p. 43. t. 73. f. b. Habitat ad urbem Huanaci in Peruv. in fruticetis.

3. *umbellata*, caul. sursum pedunculisque villosis, florib. umbellulatis diandris. Lam. ill. p. 130. t. 35. f. 2. In America meridionali observata a cl. Richard.

114. LEPTANTHUS. Spatha 1-flora, hinc dehiscens. Cor. tubo longo gracili : limbo sexpartito. Stam. laciniis inserta. Anther. lineares, aut bifformes triangulares. Caps. intra spatham, coronata, 3-locularis, polysperma, angulis dehiscens.

* *Antherae uniformes lineares, filamenta aequalia.*

1. *ovalis*, foliis ovalibus petiolatis. Michaux Flor. am. bor. 1. p. 25. t. 5. f. 1. Hab. in paludib. Illinoensib. Flos ex imo petiolo erumpit.

2. *graminea*, fol. linearibus, caul. fluante dichotomo. Mich. l. c. Cresc. in flumine Ohio. Potam. *graminei* habitus.

** HETERANTHERA. Filam. longitudine inaequalia, antherae bifformes.

3. *peruviana*, fol. lato-reniformibus, spatha subquadriflora. H. *reniformis*. Fl. per. 1. p. 43. t. 71. f. 2. In Peru. Caul. repens. ¶

4. *virginica*, fol. orbiculato-reniformib. spatha 1-flora. Michaux l. c. 1. p. 25. In Pennsylvania, Virginia.

115. SYENA. Cal. 3-phyllus. Petala 3. Antherae oblongae. Caps. 1-locularis, 3-valvis.

1. *fluviatilis*. Willd. sp. p. 254. Mayaca fluviatilis. Aub. guj. 1. p. 42. t. 15. M. Aubleti Michaux. In rivulis Gujanæ, et in Carolina. Planta muscosa. Fol. capillacea verticillata. Flor. axillares albi. W.

116. XYRIS. Glumae bivalves in capitulum. Cor. 3-petala, aequalis. Caps. supera, 1-ocular, 3-valvis.

1. *indica*, fol. ensiformibus scapum vaginantibus, capitulo globoso, squamis subrotundis. Willd. phytog. 1. p. 2. n. 6. Vahl symbol. 2. p. 7. Pluk. alm. 170. t. 416. f. 4. Moris. hist. 3. p. 229. s. 8. t. 9. f. 28. In India. ¶

2. *pauciflora*, fol. linearibus subulatis vaginantibus, capitulo oblongo, squamis ovatis obtusis. Willd. l. c. n. 7. t. 1. f. 1. In Malabar. ¶

3. *americana*, fol. triquetris linearibus subulatis basi distinctis, capitulo oblongo, squamis lanceolatis acutis. Willd. sp. pl. 1. p. 255. Aubl. gujan. 1. p. 40. t. 14. In America caliore. Flor. caerulei. ¶

4. *capensis*, fol. linearibus brevissimis, capitulo ovato acuto, squamis obtusis. W. l. c. Thunb. prod. 12. Hab. ad Cap. bonae spei. ¶

5. *subulata*, fol. distichis subulatis, scapo 1-2-phylo, spica 2-3-flora. Flor. per. 1. p. 46 t. 71. b. Habitat in Peruviae montosis humilib.

6. *brevifolia*, fol. subulato-gliatis, scapo teretiusculo, capitulo globoso. Michaux Flor. p. 23. In pratis udis Georgiae inferioris.

7. *anceps*, fol. linearibus obtusiusculis, scapo apice dilatato ancipiti, capit. squamis rotundatis. X. Jupicai. Mich. l. c. Cresc. a Marilandia ad Floridam.

† FLORES GLUMACEÆ. 1.) *Scirpoides* Caules cylindrici aut triquetri, sarcti, nodes, rarius articulati. Flor. spicati, squamis s. paleis imbricati, monogyni, stigm. 2-3; filam. numero et situ variant, ut plurimum tria. Sem. unicum, nudum, basi involucllo setulae lanac-palae ariliformi aut nullo cinctum Huc quoque per-

tinerent *Carices*, quae vero ob staminum autem ad classem monoeciam a Linnaeo relatae sunt.

117. *KYLLINGA. Spica* (Amentum L.) subrotunda aut oblonga sessilis, aut umbellata constans ex spiculis subimbricatis: *Cal.* 2-valvis: valvula inaequali, 1-florans. *Cor.* 2-valvis, cal. major. Sem. triquetrum. (Stam. 1-3. Stigm. 2-3.)

1. *monocephala*, culmo filiformi triquetro, capitulo globoso sessili, involucri triphyllongissimo. Lin. suppl. 104. Rottb. *gram.* p. 13. t. 4. f. 4. Willd. sp. pl. 256. Schoenus coloratus. Lin. ? Rumph. amb. 6. p. 8. t. 3. f. 2 ? In humidis Indiae orientalis et Americae. \mathcal{T}

2. *brevifolia*, culmo setaceo monophyllo, involucro triphyllongissimo, capitulo terminali sessili. Rottb. loc. cit. f. 3. In India orientali.

3. *pumila*, involucro triphyllongissimo, flor. diandris. Michx. Flor. amer. 1. p. 29. In Sharanensium regione ad amnem *Scioto*. Styl. bifidus uti in sequente.

4. *maculata*, involucro triphyllongissimo, capitulis 3 glomerato-sessilibus, monandris. Michaux l. c. Hab. in Carolina. Sequenti affinis dicitur.

5. *ovularis*, spicis umbellatis globoso-ovoidis, glumis lanceolatis, valvulis exterioribus ovalibus, stylo 3-fido. Michaux l. c. In Georgia, et Carolina.

6. *nivea*, capitulis terminalibus subternis glomeratis sessilibus. Lin. suppl. 104. Rottb. 6. (K. triceps.) L. Schoen. niveus Scheuchz. Agron. 401. t. 9. f. 11. Pluk. phytog. t. 197. f. 7. In humidis Americae et Indiae orientalis. Gramen laevissimum. Capitulum terminale (lateralibus 3 approximatis) ovatum seu niveum. Stylus semibifidus. L. \mathcal{T}

7. *panicea*, umb. terminali. spicis sessilibus pedunculatisque cylindricis imbricatis, involucro universalis subtriphyllongissimo, capitulis nullis. Lin. suppl. 105. Rottb. l. c. f. 1. In India, Oriente.

8. *filiformis*, umb. terminali simplici, spicis sessilibus pedunculatisque ovatis, spiculis ovatis acutis, involucro triphyllongissimo, capitulis nullis. Swartz prol. 20. Ej. Flor. p. 121. In Hispaniolae, Jamaicae camp. graminosis. Fol. lineari-convoluta. Invol. 3-phyl.

9. *umbellata*, umb. terminali, spicis

sessilibus pedunculatisque cylindricis squarosis, involucro universalis polyphyllongissimo, capitulis triphyllongissimo. Lin. suppl. 105. Rottb. l. c. f. 2. Scirpus cyperoides. Lin. Mant. 181. Rheed. mal. 12. p. 119. t. 63. β . *Kyllingia sumatrensis*, involucro partiali nullo. Retz. obs. 4. p. 13. In India orientali, β . in Sumatra.

10. *cyperina*, culmo triquetro striato basi folioso, umb. simplici, spicis strictis sessilibus, involucro universalis polyphyllongissimo, capitulis nullis. Retz. obs. 6. p. ar. In India orientali. Fol. culmo duplo fere longiora.

11. *incompleta*, culmo triquetro folioso, umb. composita, involucro universalis et partiali polyphyllongissimo, calyce univalvi. Willd. l. c. p. 258. Jacq. ic. rar. 2. t. 300. Collect. 4. p. 101. Hab. cum priore.

Obs. An ad hoc genus quoque pertinet *Carex hermaphrodita*. Jacq. ?

118. *MAPANIA. Involucr.* magnum triphyllum. Flor. capitati. *Cal.* 6-valvis, imbricatus, dentatus. *Cor.* o. Semen involucri (perispermio) 6 paleaceo involutum. Richard.

1. *sylvatica*. Aubl. gujan. 2. 47. t. 17. Willd. sp. 1. p. 258. Habitat in sylvis udibus Gujanae. Culm. basi squamis vel foliis imbricatis lanceolatis vestitus. Kyllingiam fere refert. W. \mathcal{T}

119. *REMIREA. Spiculae* in capitulum congestae. *Cal.* 2-valvis. *Cor.* 2-valvis, cal. minor; palea intima. (s. nectar. Schr.) semen non dimittente. Filam. longissima.

1. *maritima*. Aubl. Guj. 1. p. 44. t. 16. Lam. 1. p. 134. t. 137. Miegia Schreb. Willd. Sp. 1. p. 311. Hab. in arenosis maritimis Gujanae et Cayennae. Radix s. stirps repens. Culm. foliosus.

120. *DICHROMA. Spica* ovata s. capitata involucriata. Squamae (paleae) multis membranaceae subcongestim imbricatae. Styl. setaceus; Stigm. 2. Sem. nudum, rugulosum, apice tuberculo lunatim cincto. (Fol. floralia s. involucrum basi discolora ut plurimum albicantia.)

1. *leucocephalum* (glabra), erecta glabella, capitulo involucroque inferne can-

dilis. Michaux Flora. 1. p. 37. Hab. in Carolina et Georgia.

2. *ciliatum*, involuero foliisque basi ciliatis, spiculis oblongis attenuatis. Schoenus stellatus. Swartz prodr. p. 19. Willd. sp. 1. p. 264. Spica compacta alba, fol. ad spicam partim albis partim viridibus. Sloan hist. 1. p. 119. t. 78. f. 1. Hab. in Florida et insul. Caribaeis. Kyll. *triceps* refert. Sw. ¶

3. *reptans*, humilis reptans, fol. serulatis glabris, involucri subtriphylo breviusculo. Richard in Act. Soc. Paris. 1. p. 106 sub Scirpo. Hab. in Cajenna.

Obs. Forte nonnulli Schoeni auctor. Scirpus radiatus Thunb. Willd. 1. p. 289, et Cyperus leucocephalus. Retz. obs. 5. p. 11. huc quoque pertinent.

121. SCHOENUS. Spicul. subconvolutæ, acutæ. Squamæ fasciculatim congestæ, exteriores steriles, nitidæ. Cor. o. Sem. 1. subrotundum nudum, aut setis cinctum. (Stam. 2-3.)

* *Culmo tereti.*

1. *Mariscus*, culmo tereti folioso, fol. margine dorsoque aculeatis. Flor. succ. p. 35. Jacq. collect. 3. p. 72. Willd. sp. pl. 1. p. 259. Scheuchz. gram. 375. t. 8. f. 7-11. Moris. hist. 3. p. 237. s. 8. t. 11. f. 24. Hab. in Europæ paludibus. β. *effusus*. Sw. Flor. Ind. occid. 1. p. 98. Cresc. in inundatis maritimis prope Vera Crux.

2. *juncus*, culmo tereti subnudo, umbella sessili laterali. Willd. phytog. 1. p. 2. n°. 9. t. 1. f. 4. In Guinea. ¶

3. *mucronatus*, culmo tereti nudo, spiculis ovatis fasciculatis, involucri subhexaphyllo patente, fol. canaliculatis. Syst. veg. p. 81. Schousboe Maroc. 2. p. 28. Cyperus ægyptiacus. Gloxin. obs. bot. p. 20. t. 3. Moris. hist. 3. p. 227. s. 8. t. 9. f. 6. In Europæ australioris et Barbariæ maritimis.

Obs. Gramen quoad sedem dubium, non male quoque ad Scirpum S. Mariscum Hall. referri posset.

4. *pilosus*, culmo tereti, vaginis pilosis, flor. fasciculatis. Willd. Phytog. 1. p. 3. n°. 10. t. 1. f. 3. In Guinea. ¶

5. *filiformis*, culmo tereti capillari, capitulo oblongo, involucri triphylo. Thunb. prod. 16. S. *indicus*. Lam. enc. Plukn. amalib. 113. t. 1. 416. f. In Cap. b. spei. ¶

6. *striatus*, culm. tereti, capitulo ovato, involucri triphylo. Thunb. prod. 16. Ad Cap. b. spei. ¶

7. *Capitellum*, culmo tereti, capitulo ovato, involucri diphylo. Thunb. prod. 16. Ad Cap. b. spei. ¶

8. *scariosus*, radice bulbosa, scapis teretib. canaliculatis, fol. setacis rigidis, spica cylindrica terminali, squam. margine scariosis. Rottb. gram. 46. t. 16. f. 2. (Scirp. bulbosus). Willd. sp. 1. p. 261. Thunb. prodr. In India orientali et Cap. b. spei. Facies Scirpi palustris. Fol. radicalia opiosa conferta filiformia, basi membrana lata alba. ¶

9. *nigricans*, culmo tereti nudo, capitulo ovato, involucri diphylli ovati valvula altera subula longa terminata. Moris. hist. 3. p. 233. s. 8. t. 10. f. 28. Hab. in paludibus et maritimis. Var. culmo fol. longiore aut iis brevior. ¶

10. *ferrugineus*, culm. tereti nudo, involucri valvula majore lanceolata spicam æquante. Moris. hist. 3. p. 254. s. 8. t. 12. f. 40. In Gotlandiæ, Helvet. paludibus. ¶

11. *fuscus*, culmo teretiusculo aggregato stricto foliisque canaliculatis setaceis, flor. fasciculatis, involucri (bractea) diphylo longissim. Willd. sp. 1. p. 262. S. *setaceus*. Thunb. Flor. Paris. ed. 2. p. 19. Hab. in paludibus. A S. albo differt præter colorem fuscum flor. acutis et bract. his quadruplo longioribus; has species vero inter se non differre affirmat cl. Smith. Fl. Brit. 1. p. 46.

12. *rufus*, culmo tereti nudo, spica subdisticha involucri 1-phylo obtuso longiore, spiculis paucifloris, fol. canaliculatis. Smith l. c. p. 45. Light. Scot. t. 24. f. 2. Hab. in Scotiæ paludibus. Rad. repens. Sem. setosum.

13. *tristachyos*, culm. tereti articulo laevi, capitulis tribus terminalibus. Thunb. prod. 16. Ad Cap. b. spei. ¶

14. *cuspidatus*, culm. teretib. subnudis, panic. lineari, bract. annularib. obliquis brevissimis, mucrone longissimo terminat. Rottb. 66. t. 18. f. 3. Ad Cap. b. spei. ¶

15. *aristatus*, culmo tereti aphylo, spicis aggregatis, involucri monophyllo, glumis cuspidatis. Thunb. prod. 16. Ad C. b. spei. ¶

16. *compar*, culmo tereti aphylo, spicis aggregatis, involucri brevioribus, glumis acutis. Thunb. prod. 16. Rottb. p. 65. t. 18. f. 4. Ad Cap. b. spei. Spiculæ binæ in singulo racheos denti sessiles.

17. *flexuosus*, culmo tereti folioso, spicis paniculatis, glumis mucronatis. Th. prod. 16. β? *involucratus*, panicula foliosa nutante, spicis congestis aristatis sub-

Antichis, *flosculis gemellis nectariferis*.
Rottb. 64. t. 19. f. 1. Ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

18. *capillaceus*, culmo tereti folioso, spicis subracemosis, glumis cuspidatis, fol. capillaribus. In Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

19. *ustulatus*, culmo tereti folioso, spicis peduncul. pendulis oblongis aristatis. Mant. 1:8. Rottb. 63. t. 18. f. 1? Ad Cap. bonae spei. Folia caulina pauca. $\overline{\text{T}}$

20. *thermalis*, culmo tereti folioso, spic. peduncul. alternis aristatis. singula composita spiculis plurimis per totidem bracteas interstinctis. Rottb. p. 61. t. 18. f. 2. Willd. sp. 1. p. 26. Ad aquas calidas Cap. b. sp. Spic. turgidae, glum. mucrone longo.

21. *spicatus*, culm. tereti capillari, capitulis spicatis involucrentis. Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{T}}$

22. *Bobartiae*, culm. compresso, capitulo terminali, involuero pentaphyllo. Retz. obs. 4. p. 9. In Zeylona. $\overline{\text{T}}$

23. *hirsutus*, pedunc. axillaribus terminalibusque, pedicellis racemosis trispicatis. Vahl. E. log. 1. Hab. in America meridionali.

24. *bulbosus*, scapis foliisque setaceis basi alatis, capitulis glomeratis, per bracteas setaceas interstinctis. Willd. 1. p. 264. Ad Cap. b. spei Radix bulbosa. Folia numerosa, setacea, basi interstincta rumentis membranaceis albis. Facies Junci bulbosi. An hujus generis?

25. *inanis*, culm. tereti aphylo, spicis paniculatis, glumis acutis. Thunb. prod. 16. In Cap. b. spei $\overline{\text{T}}$.

Culmo triquetro.

26. *cephalotes*, culm. folioso triquetro: involuero tetraphyllo longissimo, deflexo, capitulo oblongo terminali. Rottb. 61. t. 20. In Surinamo. A Scirpo cephalote distinctus. Willd. sp. 1. p. 265. Habitus recedit. $\overline{\text{T}}$

27. *cyperoides*, culm. triquetro folioso, umbella terminali, spiculis glomeratis. Swartz prod. 19. Ej. Flor. p. 110 Jacq. icon. rar. 1. t. 10? Collect. 1. p. 113? In Jamaicae austral. montib. Stigm. cirrhosa. Stae 2. Sw. $\overline{\text{T}}$

28. *cymosus*, culm. triquetro folioso, umbella terminali composita, spiculis ovatis striatis glomeratis. Willd. sp. pl. 265. In America boreali. Fol. linearia cypripina numerosa. Spic. minutae, tres semper glomeratae sessiles. Involuc. universale polyphyllum inaequale. W. $\overline{\text{T}}$.

29. *glomeratus*, culm. triquetro folioso, flor. fasciculatis, fol. planis, pedunculis lateralibus geminis. L. Willd. p. 266. Swartz obs. 29. In Jamaica et America boreali. Sem. basi setis cinctum.

30. *Cladium*, culm. obtuse triquetro folioso laevi, fol. antrorsum aculeatis panic. diffusis, spiculis unidorsis sessilibus diandris. Swartz prod. 19. Ejusd. Flor. 1. p. 67. Cladium culmo nodoso, flor. quasi umbellatis, umbellis graatim assurgentibus. Brown. jam. 114. In humidis Jamaicae. $\overline{\text{T}}$

31. *Bestioides*, culm. inferne compresso - anticipitibus glaberrimis, flor. paniculatis, vaginis apice lanceolatis. Swartz prod. 19. et Flora. p. 104. In India occidentali. A caeteris differt habitu.

32. *corymbosus*, culm. folioso triquetro, pedunc. corymbosis, inferib. alternis distantibus, superiorib. confertis. Swartz prod. 19. et Flora ind. oced. 1. p. 99. Willd. p. 266. Rottb. 68. t. 21. f. 1. (S. surinamensis.) Scirpus *corymbosus*. Lin. Willd. sp. 1. p. 308. Fol. vaginae ventricosae, uno latere mucrone obtuso, altero fol. longissimo lineari instructae. R. Hab. in utraque India, in montosis.

33. *rugosus*, culm. triquetro folioso, pedunc. corymbosis distantibus, spicul. ovatis acutis, sem. undulato-rugosis. Vahl Eclog. Amer. 2. Hab. in Amer. meridionali. Anteced. affinis.

34. *polyphyllus*, culm. triquetro folioso, fol. carinatis, dorso marginibusque scabris, spicis decompositis axillarib. Vahl. 1. c. Hab. in Montserrat. S. Marisco similis.

35. *polycephala*, culm. triquetro folioso, pedunc. axillaribus et terminalib. capitulis plurimis globosis: intermedio sessili. S. triceps. Vahl. L. c. S. Holoschoenoides Rich. in Act. Soc. nat. Paris. 1. p. 106. Hab. in Amer. meridionali et Cajenna. Capit. ad 10-12.

36. *laevis*, culm. trigono folioso, capitulis lateralibus, glumis mucronatis, spicis ovatis. Thunb. prod. 17. Ad Cap. b. spei.

37. *lanceus*, culm. trigono folioso, spicis paniculatis lateralib. glumis spiculis lanceolatis. Thunb. prod. 17. Ad Cap. b. spei.

38. *albus*, culm. subtriquetro folioso, flor. fasciculatis, fol. setaceis, involuero flor. subaequali aut nullo. Fl. succ. 34. Fl. dan. 320. Roth. germ. II. p. 49. Hab. in Europae et Americae paludibus turfosis. $\overline{\text{T}}$

39. *sparsus*, culm. folioso triquetro, paniculis multifloris, spiculis sparsis, ovatis, minutis, semine transverse ruguloso. Michaux Flora 1. p. 35. Hab. in umbrosis Carolinae. Styl. bifidus.

40. *longirostris*, culm. triquetro, umb. foliosis, spicul. fasciculatis, semine compresso: mucrone longissimo. Michaux. 1. c. In Virginia et Carolina. Fol. lata. Setulae perispermæ 6, subulatae.

41. *inexpansus*, culm. obsolete triquetro, paniculae remotae ramulis approximato-erectis, spiculis fusiformib. Michaux. 1. c. Sem. suboblongum, mucrone brevi, setul. 6. Panic. contracta.

42. *rariflorus*, culm. fol. setaceis, paniculis paucifloris; spiculis ovatis, turgidis, sem. obovato rugoso. Michaux. 1. c. Panic. parvulae, spicul. pedicellatae.

43. *capitatus*, culm. triquetro, capitul. alternis, spicul. oblongis, semine stipitato, setulis retrorsum muricatis. Michaux. p. 36. Fol. angusta. Capit. interdum geminata. Sem. obovatum. M.

44. *ciliaris*, fol. linearib. obtusiusculis, bracteis ciliatis, semine lentiformi. Michaux. 1. c. Hab. in Florida. Flor. fascic. terminales. Setulae brevissimae sursum hispidulae. Spic. dorso pubentes.

45. *distans*, flor. fascicul. subcapitatis lateralibus; spiculis remotis, ovatis glabris, sem. lentiformi setul. longitudine. Michaux 1. c. Hab. in Carolina.

46. *fascicularis*, flor. fascicul. lateralibus et terminali, bract. brevibus; spic. oblongis: squamis mucronatis, setulis semine laevi duplo longioribus. Mich. 1. c. p. 37. Hab. in Carolina.

47. *gracilis*, culm. triquetro folioso longissimo filiformi, spicis lateralibus pedunculatis tereti-linearib. Swartz prod. 19. Fj. Flora p. 109. In Jamaica.

48. *setaceus*, culm. triquetro debili, fol. alternis distantib. setaceis, spiculis aggregatis, flosc. diandris. Swartz, prod. 20. Willd. sp. 268. Rottb. 62. t. 21. f. 2. *Triodon* Richard ob. sem. 3-dentata, glumas aristatas et stom. 2. In pratis Jamaicae et Surinami.

49. *pusillus*, culm. triquetro nudo filiformi, spicul. terminalib. subfasciculatis sessilib. foliolo subjecto, spicam aequante. Swartz. prod. 20. Ej. Icon. fasc. 1. p. 7. tab. 6. et Fl. p. 112. In graminosis montium Jamaicae australis. Sem. scabrum.

122. CYPERUS. *Glumæ paleaceae* distiche imbricatæ. Cor. o. Sem. 1, nudum. Spicula compressa.

* *Culmo tereti.*

1. *minimus*, culm. capillari spica solitaria geminaque, involucri monophyllo. Thunb. prod. 18. Willd. sp. 1. p. 268. Scirpus setaceus (L. Rottb. gram. 47. t. 15. f. 4. Pluk. 176. t. 300. f. 4. 5. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 120. t. 79. f. 3. In Jamaica, Africa.

2. *setaceus*, culm. setaceis striato-angulosis nudis, spica terminali subquadri-flora nuda. Retz obs. 5. p. 10. In graminosis humidiusculis Calcuttae.

3. *arenarius*, culm. compresso nudo, spicis capituli glomeratis sessilibus, involucri submonophyllo. Retz. obs. 4. p. 9. Pluk. almag. 178. t. 300. f. 7. In arena mobili Indiae orientalis. T.

4. *prolifer*, culm. tereti, capitulo glomoso prolifero. Thunb. prod. 18. Rottb. p. 55. t. 17. f. 2. In Cap. b. spei. T.

5. *effusus*, culm. tereti subligneo; umb. rara, spicis conglomeratis, involucri subulato triphylo. Rottb. p. 22. t. 12. f. 3. Ad Meccam in Arabia.

6. *articulatus*, culm. tereti nudo articulato Sp. pl. 66. Rottb. p. 26. Vahl. symbol. p. 7. C. niloticus. Forsk. Sloan. jam. 36. p. 121. t. 81. f. 1. In Jamaicae, Aegypti, Indiae rivulis. T.

7. *marginatus*, culm. tereti aphylo, umb. composita, spicul. oblongis brunneis. Thunb. prod. 18. In Cap. b. spei. T.

8. *complanatus*, culm. compresso plano nudo, umb. composita involucri diphylo, partiali brevissimo polyphylo, foliolis setaceis basi membranaceis. Willd. spec. 1. p. 270. Scirpus complanatus Retz. obs. 5. p. 14? Hab. in Java. Spiculae brunneae. Singulare gramen, culmo foliaceo lato compresso. W. T.

9. *texilis*, culm. tereti, umb. decomposita, involucri dodecaphyllo laevi breviori spiculis oblongis. Thunb. prod. 18. In Cap. b. spei. rivulis. T.

10. *compactus*, culm. tereti folioso, umb. decomposita, involucri pentaphyllo, spiculis congestis subspiralibus. Retz. obs. 5. p. 10. Hab. in China.

11. *atropurpureus*, culm. tereti subfolioso retrorsum scabro, fol. subulatis canaliculatis. C. striatus, Flor. peruv. 1. p.

47. Hab. in collib. aridis *Tarmæ* oppidi. Glom. ovatae, atropurpureae. Fol. vaginastis, ad medium inferne margine ciliata. Flor. fine hyemis.

48. *Culmo triquetro, spiculis simplicibus.*

12. *distachyos*, culm. triquetro filiformi basi folioso, spicis binis sessilibus involucri brevioribus. Willd. l. c. p. 272. Hab. in Italia. Culmus basi folio unico gramineo angusto instructus. W.

13. *triflorus*, culm. triquetro nudo, umbel. distachya, intermedia sessili, spiculis laciniatis. Mant. 180. Schoenus cyperoides. Retz. obs. 4. p. 8. In pascuis aridis Indiae. involuc. diphyllum.

49. *Culmo triquetro, umbella glomerata sessili.*

14. *nanus*, culm. triquetro setaceo, umb. sessili capitata involuc. diphyllum, lumis nervosis. Willd. l. c. Pluk. t. 417. 8. Hab. in Guinea.

15. *filiformis*, culm. triquetro nudo filiformi, fol. setaceis, spicis terminalibus sessilib. confertis tereti-subulatis. Swartz. rosl. 20. Ej. Flor. p. 120. In Jamaicae austral. nemorosis.

16. *dubius*, culm. setaceo triquetro, spiculo terminali, involucri tetraphyllo longissimo. Rottb. 20. t. 4. f. 5. Willd. p. 23. Cyperus leucocephalus. Retz. obs. 5. p. 1. In Malabar.

17. *capitatus*, culm. subanguloso striato setoso folioso, capitulo terminali triphylo, spicis sessilibus. Retz. obs. 4. p. 9. Hab. in India.

18. *niveus*, culm. triquetro filiformi nudo, umb. terminali sessili diphylla, spicis compressis lanceolatis. Retz. obs. 5. p. 2. In nemorosis ad Midnapour, Tschan-francoza Indiae. T.

19. *pannonicus*, cespitosus, culm. obsoleto triquetro prostrato, spicis subquaternis subovatis sessilibus. Ait. Kew. 1. p. 79. glumis lateralibus sphecelatis Lin. suppl. 103. Jacq. aust. 5. p. 29. app. t. 6. In Austria, Hungaria. ☉

20. *junciformis*, culmo subtereti, spiculis aggregatis; spatha diphylla: foliolo altero spicula breviori. Desf. atl. t. 7. f. 1. Euron. ic. 3. p. 2. t. 204. f. 1. Hab. in Arabia et Hispania. Spiculae nigrae. Cav.

21. *mucronatus*, culm. nudo vaginato triquetro, involucri monophyllo stricto, spicis lateralibus sessilibus. Rottb. p. 19. t. 8. f. 4. Vahl. symbol. 1. p. 7. Hab. in Arabia,

India. Culmus, inferne teres est. Spiculae saepe 4, 6, 8. Vahl.

22. *laevigatus*, culm. trigono, capitulo glomerato globoso obliquo, involucri diphylo, glumis obtusis. Thunb. prod. 18. Rottb. 19. t. 16. f. 1. Ad Cap. b. spei. Involuc. foliolis plano-canaliculis longis, majore erecto, inferiore patulo. Folia in flore gramine adsunt, vidi tamen squamas unciales emarcescentes lineares. Willd. T.

23. *ornithopus*, culm. cespitosus incurvis, umb. sessili sublaterali, spic. teretiusculis sublinearib., involuc. 3-phylo longissimo. Hab. in paludosis exsiccatis ad St. Domingo. Spic. acuminatae: squam. subamplexantes.

24. *squarrosus*, culm. triquetro nudo, umb. tetraphylla glomerata, spiculis ovatis, glumis mucronatis. Willd. p. 274. Cyperus (squarrosus) culmo triquetro nudo, umbella foliosa glomerata, spicis striatis squarrosis. Amoen. acad. 4. p. 303. Cyperus pygmaeus. Rottb. 20. t. 14. f. 4 et 5. Hab. in India. Involuc. 3- a. 4-phyllum.

25. *pygmaeus*, culmo triquetro folioso, capitulo globoso, involucri 6-7-phylo: foliol. 3 longissimis. Cavan. ic. 6. p. 65. t. 568. f. 2. Hab. in Mauritania juxta flum: Sebæ.

26. *nitens*, culm. triquetris basi foliosis, umb. subsimplicibus, involucri triphylo, flor. monandris. Retz. obs. 5. p. 13. Willd. Sp. 1. p. 275. Hab. in India.

27. *fascicularis*, culm. triquetro, involucri polyphylo, spicis linearibus lanceolatis corymbosis confertissimis. Rottb. 30. t. 11. f. 1. Desf. Atl. p. 43. Lam. ill. t. 38. f. 2. Cyperus polystachyos. Willd. Sp. 1. p. 275. Pluk. mant. 97. t. 416. f. 6. Hab. in India, ad Cap. b. spei et in Barbar. T.

28. *conglomeratus*, culm. subtriquetris fol. fasciculatis semiteretib. s. canaliculis breviorib. capitulo paniculato terminali triphylo. Rottb. 21. t. 15. f. 7. Hab. in Arabia. Fol. tenuis. margine punctis scabra, vagina atropurpurea. R.

29. *cruentus*, culm. triquetro, involucri polyphylo longo, umb. simplici, spicis conglomeratis, floscul. sulcato-punctatis. Rottb. p. 21. t. 5. f. 1. Vahl. symbol. 1. p. 8. Cyperus globosus. Forsk. p. 13. Hab. in Arabia. Spic. lineis et Ochreae punct. cruentis distinctae. T.

*** *Culm. 3-quetro, spic. umbellato-capitatis sessilib. et pedunculatis.*

30. *aristatus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spic. cylindraco-spicatis,

glumis subulatis uncinato-mucronatis. Willd. p. 275. Rothb. 28. t. 6. f. 1. Scirpus intricatus. Lin. Mânt. 18a. In Ind. orientali et Cap. b. spec. Pol. graminea laevis. Involuc. triphyllum. Umb. spicis sarpius pedunculatis, quartaque sessili. Spicae ovatae cylindricae obtusae.

31. *Luzulae*, culm. triquetro, umb. simplicis, spiculis ovatis capitato-spicatis, involucri polyphylo. W. p. 276. Rothb. t. 13. f. 3. Sloan. jam. t. 75. t. 1. In Amer. calidiore.

32. *conoides*, culm. triquetro folioso, umb. simplicis, spicul. compactis obtuse conicis. Richard in Act. soc. Lin. Paris. p. 106. Hab. in Cayenna. Affin. antecedenti.

33. *confertus*, culm. triquetro nudo, umb. simplicis foliosa, spiculis ovatis conglomeratis, glumis apice recurvis acuminatis. Swartz. Flor. Ind. Occid. 1. p. 115. In Jamaica australi. Involuc. 3-phyll. longissimum. T.

34. *Brisaens*, culm. triquetro, fol. angustis, umbellulis confertis aphyllis, spiculis oblongo-ovatis obtusis. Richard in Act. Soc. Lin. Paris. p. 106. Hab. in Amer. meridion. Spiculae subbrizaeformis.

35. *viscosus*, culm. subcompresso basi viscoso, fol. asperis, umb. foliosa composita, spiculis subconglobatis obtusis. Ait. Kew. p. 70 Swartz Flor. Ind. occid. 1. p. 113. Hab. in in arenosis, subhumidis Jamaica australi. Hujus loci est Cyp. elegans. Rothb. gram. p. 34. t. 6. f. 1. secundum Vahl Eclog. Amer. fasc. 2. Forte non diversus est a Cyp. odorato. L.

36. *ligularis*, culm. triquetro, umb. composita, flor. pedunculatis, spiculis paucifloris spicatis, glumis obtuse mucronatis, involucri polyphylo longissimo. Willd. p. 277. C. ligularis, culmo triquetro nudo, umbel. spiculis capitatis oblongis sessilibus, involucris longissimis serrato-asperis. Lin. Moen. acad. 5. p. 391. Rothb. 35. t. 11. f. 2. Hab. in Jamaica et ad C. b. sp.

37. *cinnamomeus*, culm. triquetro folioso, umb. ell. spiculis capitatis ovatis pedunculatis sessilibusque, involucri pentaphyllo serrato-scabro. Retz obs. 4. p. 10. Var. prioris?

38. *alopecuroides*, culm. triquetro, umb. antralecomposita, spicis digitatis oblongis, spicul. confertissimis imbricatis erectis. Rothb. 38. t. 8. f. 2. C. glomeratus. L. Willd. 277. calopcaroides, culmo trigono, umb. decomposita involucri polyphylo serrato breviori, spiculis cylindricis. Thunb. prodr. p. 18. Hab. in Arabia felici, India et Cap. b. spec. Planta speciosa. T.

39. *imbricatus*, culm. triquetro nudo, umb. decomposita, umbellularum radiis imbricatis, involucris hexaphylli foliis tribus longissimis, tribus brevissimis. Retz obs. 5. p. 12. In India.

* * * * * Culmo triquetro, umbella composita et decomposita, spiculis divaricatis.

40. *maderaspatanus*, culm. triquetro, umb. composita, spiculis linearibus, glumis lanceolatis uncinato-muricatis, involucri triphylo longissimo lanceolato. W. L. e. p. 278. Cyperus squarrosus. Rothb. 25. t. 6. f. 3. Pluk. amalth. 114. t. 397. f. 2. Hab. in India. Parvulus. ©

41. *castaneus*, culm. triquetro, umb. composita, spiculis linearib. multifloris, glumis obtusis recurvato-mucronatis, involucri triphylo longissimo convoluto-saccato. Willd. 278. Hab. in India.

42. *elegans*, culm. triquetro, umbell. subtrivariatis, spiculis subternis linearib. squamis obcorlatis substantib. mucronatis patulis, involucris planis. Vahl. Eclog. 2. Lin. Willd. spec. p. 278. Sloan. jam. t. p. 117. t. 75. f. 1. Hab. in Jamaicae paludosis.

43. *scopellatus*, umb. subhexaphyllis, radiis alternis confertis ramosis, fasciculatis aphyllis, spiculis lineari-lanceolatis. Vahl. Eclog. 2. Richard in Act. Soc. hist. nat. Paris. 1. p. 106. Hab. in Martinica.

44. *surinamensis*, culm. triquetro, umb. decomposita, spiculis ovatis, glumis acuminatis imbricatis, involucris triphylo. W. p. 279. Rothb. 35. t. 6. f. 5. Hab. in Surinamo.

45. *flavidus*, culm. triquetro striato, umb. composita triphylla, spicis lanceolatis, monandris. Retz. obs. 5. p. 13. In India.

46. *flavescens*, culm. triquet. nudo. umb. subcomposita triphylla, spicis confertis lanceolatis, glumis obtusis. Willd. p. 279. Rothb. germ. II. p. 50. Dest. Atl. 1. p. 46. Moris. hist. 3. p. 236. s. 8. t. 11. f. 37. Hab. in Europae et Barbariae paludosis. ©

47. *fuscus*, culmo triquetro, umb. composita, triphylla, spicis linearibus confertis glumis acutis imbricatis. Willd. 280. Flor. dan. t. 176. Leers. herb. t. 1. f. 2. Rothb. germ. II. p. 50. Hall. helv. n. 1349. Moris. hist. 3. p. 236. s. 8. t. 9. f. 38. Hab. cum priore. culm. sublaecidus. ©

48. *viridis*, culmo triquetro, umb. composita triphylla, spicis linearibus confertis, glumis acutis patulis. Willd. sp. 1. p. 280. Cyperus viridis. Krock. siles. n. 69.

t. 13. Hab. in montosis Silesiae et circa Argentoraturn. Culm. subrigidus. ☉

49. *difformis*, culm. triquetro nudo, umb. diphylla simplici trifida, spicis cuspidatis, intermedia sessili. Amoen. 4. p. 302. Rottb. 44. t. 9. f. 2. Pluk. alm. t. 192. f. 3. Hab. in India. Spicae numerosae, squamis ovatis concavis obtusis, latere scariosis.

50. *jemicus*, culm. triquetro seminudo basi bulboso, involucrio diphylo, umb. subsimplici, spiculis linearibus. Retz. obs. 4. p. 11. Rottb. 25. t. 8. f. 1. In Arabia felici, in regione Jeminensi inque graminosis Zeilonae. ☿

51. *strigosus*, culm. triquetro nudo, umb. subsimplici, involucrio 4-phylo, spiculis linearibus confertissimis horizontalibus. Lin. Sp. plant. 69. Rottb. 40. t. 11. f. 3. Sloan. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 2. 3. In Jamaicae, Virginiae paludibus, inque India. Radix subrotunda.

52. *tenuis*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spiculis subulatis confertis horizontali-reflexis, involucrio polyphylo foliol. linearisetaeis. Swartz. Flor. 1. p. 119. In Jamaicae occident. gramin. montosis.

53. *tuberosus*, culm. triquetro basi folioso, involucrio triphylo, umb. composita, spicis lanceolatis teretiusculis. Rottb. p. 28. t. 7. f. 1. In India.

54. *pumilus*, culm. folioso triquetro, involucrio tetraphyllo, umb. composita, spicis diversis orato-lanceolatis nitidis. Rottb. 29. t. 9. f. 4. β? Cyper. pumilus. L. Sp. plant. 67. Amoen. acad. 4. p. 302. Hab. in India. In β involucrio 2-phyllum dicitur.

55. *stoloniferus*, culm. nudo triquetro, umb. composita involucriata, spiculis lanceolatis. Retz. obs. 4. Hab. in India. ☿

56. *compressus*, culm. triquetro nudo, umb. universali triphylla, glumis mucronatis, lateribus membranaceis. Sp. 68. Rottb. 27. t. 9. f. 3. Sloan. hist. 1. p. 117. t. 76. f. 1. Hab. in praeis Jamaicae et Amer. septentr. Spicae radii 4, longe pedunculati, umb. media sessili.

57. *pulcher*, culm. trigono, umb. decomposita involucrio subhexaphyllo breviori, spiculis ovatis Thuub. prod. 18. Hab. in Cap. h. sp.

58. *monandrus*, culm. inferne folioso obtuse triangulo, umb. polystachia decomposita, spicis lanceolatis confertis sessilib. Ser. monandrus. Roth. catal. 1. p. 3. C. vegetosa. Willd. Sp. 1. p. 287. Affinis videtur praecedenti. An varietas C. glabri? W.

59. *albidus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, pedunculis corymbosis, involucrio polyphylo longissimo. Retz. obs. 6. p. 21. Hab. in India.

60. *hexastachyos*, culm. triquetro nudo fol. gramineis linearibus molliusculis glaucis, umb. simplici flaccida, spicis linearibus alternis subseni. Rottb. 28. t. 14. f. 2. Sw. Fl. ind. occid. 1. p. 117. Hab. in India et Jamaica. C. rotundus. L. sp. pl. ed. 1. diversus est. Sw. ☿

61. *Hydra*, culm. triquetro laevigato, umb. simplici sessili et 1-2 pedunculatis, spicul. linearib. fol. radical. recurvatis, radice repente tuberosa. Michaux. 1. p. 27. Hab. in cult. Amer. boreal. spic. castaneae. Planta tuberib. facillime renascens maximo agris damno. M. Praecedenti affinis.

62. *tetrastachyos*, culm. triquetro involucrio sub-4-phyll. corymbo breviori, spic. subquaternis arcuatis, acutis. Desfont. atl. 1. p. 45. t. 8. Hab. in Algeria ad ripas flum. Taddah. An priora varietas?

63. *glaber*, culm. triquetro nudo laevi, umb. triphylla, flor. glomeratis, inferiorib. brachiatis, fol. glabris. Lin. Mant. 179. Segu. suppl. 66. t. 2. 1. 1. Allion. pedem. p. Hab. in Veronae et Pedemont. humentibus. Culm. palmaris. Involucrio triphyllum culmo longius, praeter 3 foliola subulata brevia.

64. *brunneus*, culm. triquetro nudo, fol. lato-linearib. planis, umb. 8-phylla, spic. subsessilibus: glumis striatis. Swartz. l. c. p. 116. Hab. in Ind. occident. Setae 2. latiusculae ad latera germinis. Sw.

65. *odoratus*, culm. triquetro nudo, umb. decomposita simpliciter foliosa, pedicellis distiche spicatis. Lin. Sp. pl. 68. Rottb. p. 38. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 1. In America ad fluviolum ripas. ☿

66. *esculentus*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa, radicem tuberibus ovatis, zonis imbricatis. Morist. hist. 3. p. 236. Is. 8. t. 11. f. 10. Desf. atl. 1. p. 43. Villars Dauph. 1. p. Hab. Mompelii, in Italia, Oriente et Barbaria. ☿

67. *tenuiflorus*, culm. triquetro, fol. linearibus, umb. decomposita, spiculis linearib. acutis angustissimis. Rottb. gram. 30. t. 14. f. 1. Jacq. ic. rar. 2. t. 296. Collect. 3. p. 150.

68. *badius*, culm. triquetro nudo, fol. serrulatis, corymbo terminali, spicul. linearisubulatis congestis involucrio pedunculis longiore. Desfont. Atl. 1. p. 45. t. 7. f. 2. Ad. ripas rivulor. Algeriae. Involucria. 4-5

Phyll. Spicul. ferrugineae. Affinis C. tenuifloro. Rottb. T.

60. *pallenscens*, culm. triquetro basi folioso, pedunc. supradecompositis, spiculis lineari-subulatis rectis distinctis, involucr. sub-4-phylo umb. brevior. Desf. l. c. t. 9. Hab. ad lacum ripas prope la Calle. Spic. primo albidæ deinde pallide rufæ. T.

70. *Pangorei*, culm. triquetro basi folioso, involucri triphylo, umb. universalis decomposita: partialibus subtrifidis. Retz. obs. 4. p. 10. Rottb. 31. t. 7. f. 3.

71. *flavicomus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, involucri longissimo sub-5-phylo. Michaux. l. c. In Carolina. Umb. ramuli ab ipsa basi floriferi, spiculæ patentæ, flavæ oblongæ 7-floræ. M.

72. *virens*, culm. triquetro, umb. composita subnuda, involucri polyphylo longissimo pedunc. s. ramis divaricato-ramosis. Michaux. l. c. In Carolina. Majusculus. Spicul. fasciculatæ, virentes ovatae planæ. M.

73. *strigosus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, involucri longissimo, spic. teretiusculis, patentissimis. Mich. l. c. Cum priore.

74. *lanceus*, culm. trigonò folioso, umb. composita, involucri duplo brevior, spicul. oblongis. Thunb. prod. 18. C. denudatus. Linn. suppl. 108. Hab. in Cap. b. spei.

75. *longus*, culm. triquetro folioso, umb. foliosa supradecomposita, pedunculis nudis, spicis alternis linearib. Jacq. icon. rar. 2. t. 297. Collect. 3. p. 191. C. odoratus radice longa. Moris. hist. 3. p. 237. s. 8. t. 11. f. 13. Hab. ad rivulos Europ. austral. Spic. brunneæ, nitidæ.

76. *fastigiatus*, culm. triquetro, umb. decomposita, pedunculis longissimis filiformib. subquinquefidis, spicis plurimis linearib. sparsis. Rottb. 32. t. 7. f. 2. Burm. ind. 20. t. 8. f. 2. Hab. in India. T.

77. *canaliculatus*, culm. triquetro canaliculato nudo, umb. decomposita, pedunculis racemosis, involucri polyphylo longissimo. Retz. obs. 6. p. 20. Hab. in India orientali.

78. *Monti*, culm. triquetro, umb. decomposita paniculata, spiculis ovatis flor. cul. distinctis, involucri hexaphylo. Willd. p. 286. Linn. suppl. 102. Rottb. 31. serotinus C. serotinus odoratus, radice longa, panicula locustis latis ferrugineis compactis. Mont. gram. 12. t. 1. f. 12. In maritimis Italiae et Tergesti. T.

79. *niger*, culm. triquetro nudo glabro, fol. ensiformib. umb. foliosa, pedunc. plurimis longis, spicis laxis nigricantibus. Flor. Per. t. p. 47. Hab. in inundatis Prov. Cercado et Chancay. O

80. *Iria*, culm. triquetro seminudo, umb. foliosa decomposita, spiculis alternis, granis distinctis. Rottb. gram. 41. Willd. l. c. p. 286. Pluk. alm. 179. t. 191. f. 7. Iria s. Balari. Reed. mal. 12. p. 105. t. 56. Hab. in India. Distinctus spicul. linearibus, flor. dentium pectinis instar, parum distantibus. W.

81. *Santonici*, culm. triquetro, umb. supradecomposita verticillata paniculata. Willd. p. 287. Rottb. 41. t. 9. f. 1. Hab. in India.

82. *corymbosus*, involucri polyphylo, umb. supradecomposita, pedunc. filiformibus corymbosis strictis. Rottb. gram. 42. t. 7. f. 4. Cyperus, culmo trigono aphylo, umb. decomposita involucri brevior, spicis linearib. Thunb. prod. 18. Hab. in Asia et Cap. b. spei.

83. *racemosus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, pedunc. ramosis racemosisque, involucri polyphylo longo. Retz. obs. 6. p. 20. In India orientali.

84. *Haspan*, culm. triquetro folioso, umb. supradecomposita, spiculis umbellato-sessilibus. Rottb. 36. t. 6. f. 2. Pluk. alm. 179. t. 192. f. 2. Hab. in India, Aethiopia. T.

85. *elatus*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa supradecomposita, spicis sessilib. digitalibus imbricatis, spiculis subulatis. Amoen. acad. 4. p. 301. in Hab. India. Gramen magnum. Involucri universale polyphyllum longissimum, partialia spicis breviora. Spicæ longitudine digiti, ferrugineæ, imbricatæ ex spiculis teneris distichis. L.

86. *distans*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa supradecomposita, spicis alternis, filiformibus, flosc. distantibus. Linn. suppl. 103. Jacq. ic. rar. 2. t. 299. Collect. 3. p. 189. Cyperus elatus. Rottb. gram. 37. t. 10. Hab. in insulis Caribæis. T.

87. *diphyllus*, culm. subtriquetro diphylo, umb. supradecomposita, spiculis teretiusculis subpinnatis. Retz. obs. 5. p. 11. Hab. in Indiae orientalis rivulis.

88. *Papyrus*, culm. triquetro nudo, umb. involucri longiore, involuclis triphyllis setaceis longioribus, spiculis ternis. Syst. veg. 97. Rottb. gram. 32. Mich. gen. 44. t. 19. Papyrus. Bruce iun. 5. p. 1. t. 1. In fluviis Calabriae, Siciliae, Syriae, Aegypti. Involucri. 8-phyllum umbella brevius:

brevis: foliolis exterioribus 4 latoribus. 4 pedes et ultra altum. In caldariis colitur. Spic. tenerae.

89. *flabelliformis*, culmo sulcato triquetro: involucri polyphylo, foliol. alternis, lanceol. longissimis. pedunc. axillaribus umbellato-corymbiferis, spicul. 4-6 ovatis. Rottb. 42. t. 12. f. 2. In Arabia felici. Caul. crass. contortus. Fol. floral. pedalia.

90. *alternifolius*, culm. triquetro, fol. alternis, in summo culmi confertis, umb. axillarib. compositis, spic. linearibus. Willd. Sp. 1. p. 289. Jacq. ic. rar. 2. t. 298. Coll. 2. p. 366. In insula Madagascar. Culmi nudi, spic. fol. alternis confertis, ensiformibus gaudet. Pedicelli aliquot e basi spicae, spice ferentes spicam similem.

+ 181A. *Spica simplex*, squamis subdistichis imbricatis squamis congestis; infimis aristatis. Stam. 1. Stigm. 2. Sem muticum. (Richard.)

91. *caribaeus* caespite laxo, squamis his infimis aristatis. Rich. Cyperus *monostachyos*. Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 271. excl. syn. Rottb. Sloan. jam. 1. p. 120. t. 73. f. 2. Hab. in pascuis aridis Amer.

92. *indicus*, caespite stricto, squamis pluribus aristatis. Rich. Cyperus *monostachyos*. Rottb. gram. p. 18. t. 13. f. 3. Hab. in India orientali.

122. DULICHIMUM. Spicae subracemosa, ex axillis foliorum. Spiculae lineari-lanceolatae subcompressae: squamae subdistichae amplexanti-appressae. Stylus longissimus, bifidus. Germ. setulari retrorsum asperae. (Richard. Pleuranthus. Mst.)

1. *spathaceum*, culm. triquetro folioso, spiculis patulis, subsexfloris. Pleuranthus *floribundus*. Rich. Cyperus *spathaceus*, racemis axillaribus. Willd. Spec. pl. 1. p. 289. Schoenus *spathaceus*. L. Scirpus *spathaceus*. Michaux. Hab. in Virginia.

2. *canadense*, racemis simplicibus pedunculatis, spiculis paucis erectis subdecemfloris. Richard. Michaux. Hab. in Canada.

123. SCIRPUS. Glumae paleaceae s. squamae undique imbricatae. Cor. o. Sem. 1, nudum aut villis s. setulis brevioribus cinctum.

* *Monostachyi*.

1. *mutatus*, culmo triquetro nudo,

spica cylindrica terminali. Amoen. acad. 5. p. 391. Willd. Sp. pl. 1. p. 290. Hab. in Jamaica. Simillimus S. geniculato, sed triqueter, molliusculus, nec articulatus. T.

2. *spiralis*, culm. aggregatis subnudis triquetris, spica cylindrica terminali, flosc. cuneiformibus truncatis spiraliiter dispositis. Rottb. gram. p. 45. t. 75. f. 1. Hab. in India. T.

3. *articulatus*, culm. fistuloso tereti nudiusculo subaristulato, capitulo glomerato laterali. Sp. plant. 70. Vahl. symbol. 1. p. 8. Rheed. mal. 12. p. 135. t. 71. In Malabaricae aquosis arenosis. Spicae laterales in capitulum semiverrucillatum collectae. L.

4. *plantagineus*, culm. tereti ventricosissimo nudo, spica cylindrico-subulata terminali. Swartz. Flor. p. 123. Retz. obs. 5. p. 14. Rottb. gram. 45. t. 15. f. 2. Hab. in India et Jamaicae inundat. argillosis.

5. *nutans*, culmo compresso subtetragono nudo, spica ovata solitaria terminali nutante. Retz. obs. 4. p. 12. In uliginosis Malacca. T.

6. *quadrangulus*, aphyllus, culm. tetraquetro nudo stricto, spica cylindrica, squamis rotundato-obtusis. Michaux. Flor. 1. p. 30. Hab. in Carolina.

7. *tuberculosus*, culmo nudo, spicis turgidis ovatis, semine tuberculo terminato. Mich. l. c. cum priore.

8. *capillaceus*, minutus, culm. folisque capillaceis, spica oblongo-ovata acuta. Mich. l. c. Hab. in Nova Anglia. Affinis S. aciculari dicitur. Spic. squamae paucae, oblongae, castaneae. M.


9. *palustris*, culm. tereti nudo, spica ovato-oblonga subtereti, glumis acutis, rad. repente. Flor. dan. t. 273. Leers. t. 1. f. 3. Hoffm. germ. ed. 2. p. 21. Smith. Flor. brit. p. 48. Hab. in fossis.

10. *multicaulis*, culm. tereti basi vaginato, spica ovata terminali: glum. obtusis aequalib., radice fibrosa. Smith. Flor. brit. 1. p. 48. Flor. dan. t. 167. Rel. Rudb. 28. f. 2. Rupp. Flor. Jen. ed. Hall. p. 319. Hab. in paludosis turfosis Angl., Dauiae et Germaniae rarius. Spic. ferruginea ad basin saepius vivipara. Flor. Julio. S.

β ? *intermedius*, aphyllus, spica oblongo-ovata subacuta, bract. rotundatis, glumis obtusiusculis castaneis. Thuill. Flor. Paris. ed. 2. p. 21. Hab. in paludibus prope Ratisbonam procul a Parisiis. Fl. Maio.

γ *repens*, radice (stirpe) repante, culm. caespitoso: plurimis sterilib. recur-

E



vatis, spic. oblonga: squamis lanceolatis acutissimis. Thuillier. l. c. p. 22. Hab. ad ripas Sequanae.

12. *geniculatus*, culmo tereti nudo, spica oblonga terminali. Rottb. gram. p. 41. Sloan. jam. 37. hist. 1. p. 122. t. 75. f. 2. et t. 81. f. 3. Hab. in Jamaica.

13. *caespitosus*, aphyllus, culmo tereti sulcato rigido basi vaginato multiplici-squamoso, spica terminali glumis exterioribus maximis. Smith. l. c. t. 1. p. 48 Roth. Catal. 1. p. 7. Hab. in ericetis turfosis, montosis. Glum. inaequales ovali oblongae: majore spicam aequante Roth.

14. *Baeothryon*, aphyllus, culmo striato tereta, basi vaginato, squamis radicilib. subnullis, spica terminali, gluma exteriorib. longiore. S. *pauciflorus*. Smith. l. c. p. 50. Lghf. 1078. Lin. suppl. p. 103. S. *Halleri*. Villars delph. 2. p. 188. Hab. in palustrib. montosis. Stam. 3 longa, villota. Hoffm. Glumae obtusiusculae membranaceae; altera majore spica brevior.

15. *turgidus*, caespitosus, culm. confertis nudis, spica turgide ovata: squamis ovalibus obtusis. Thuill. l. c. p. 22. Hab. in paludosis prope Mendon; etiam prope Argentoratium (Strasburg) crescit. Spicae subrotundae fere.

16. *campestris*, culm. striato nudo, spica terminali calycem bivalvem vix superante, glumis oblongis membranaceis obtusis subaequalibus. Roth. Catal. 1. p. 5. et V. 2. p. 2. Hoffm. germ. ed. 2. p. 22. Flor. dan. t. 16. Scheuchz. t. 7. T. 10. Hab. in ducatu Oldenburgensi et in Francia. Culm. 2-5, setacei fol. longior. Styl. 3-fidus. Sem. triquet. $\overline{\text{L}}$

17. *capitatus*, culm. tereti nudo setiformi, spica subglobosa terminali, stylo trifido. Sp. pl. 70. *Scaribaeus*, culmis fasciculatis setaceis sulcatis triquetris, spica minima ovata terminali. Rottb. p. 46. t. 15. f. 3. In Virginia inque insulis Caribaeis. $\overline{\text{L}}$

18. *ovatus*, culm. subcompresso nudo filiformi, spica ovata terminali nuda, floribus diandris, stylo bifido. Rottb. Catal. 1. p. 5. Willd. Sp. 1. p. 194. *Scirpus capitatus* plur. auctorum. Moris. hist. 3. p. 233. f. 8. t. 10. f. 34. Hab. in Germaniae humidis. Setae 6. $\overline{\text{L}}$

19. *atropurpureus*, culm. setaceis teretibus fasciculatis, spicis terminalibus ovatis solitariis, flor. 1-andris. Retz. obs. 5. p. 14. Hab. in uliginosis Indiae.

20. *polytrichoides*, culm. compressis

setaceis, spicis terminalib. solitariis subnutantibus 1-andris. Retz. obs. 4. p. 1. Rumph. amb. 6. p. 17. t. 7. f. 1. Hab. in pascuis depressis subudis Zeylonae.

21. *acicularis*, culm. quadrangulo nudo setiformi, spica terminali ovata bivalvi, seminibus nudis. Lin. Flor. dan. t. 287. Moris. t. 8. t. 10. f. 37. Hab. in humidis inundatis ericetis, etiam in Amer. $\overline{\text{L}}$

22. *Auitans*, culm. teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido. Scheuch. t. 7. f. 20. Moris. hist. 3. p. 230. s. 8. t. 10. f. 31. Pluk. alm. t. 35. f. 1. β . *stolonifer*, culmo canaliculato, basi folioso, spica terminali bivalvi subbifida. Roth. in Usteri Neu. Bot. Annal. 4. p. 30. Hab. in udis. An styl. 3 fidus in β ?

23. *compressus*, culmo teretiusculo nudo, spica compressa ex spiculis pluribus subdistichis composita, involuc. monophyllo. S. Caricis Retz. Willd. Sp. p. 292. Schoenus compressus L. Leers. t. 1. f. 1. Hab. in pratis, et turfosis. Sem. basi setis cinctum.

**** Culmo tereti polystachyo.**

24. *fragrans*, culmo tereti striato nudo, spicis ovatis pedunculatis inaequalibus, terminalib. umbellatis. Flor. Peruv. 1. p. 47. Hab. in nemorum runcationib. Pillao. Rad. fascic. fibrosa odoratissima. Fol. setacea, pubescentia. Stigm. 3.

25. *glomeratus*, culm. nudo teretiusculo, umb. glomerata, involucro diphylo brevi, floribus diandris. Retz. obs. 4. p. 11. Hab. ad agrorum margines Zeylonae. $\overline{\text{L}}$

26. *arvensis*, culmis compressis striatis, umb. simplicibus, involucro monophyllo brevi. Retz. obs. 4. p. 11. Hab. in Zeylonae arvis.

27. *truncatus*, culm. tereti. capit. glomerato-globo, involucro diphylo, foliis linearibus. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. spei, cum 4 sequentibus.

28. *laciniatus*, culm. tereti, capit. triangulari, glumis ovatis, involucro diphylo. Thunb. prod. 17.

29. *membranaceus*, culm. tereti, capit. angulato, glumis ovatis membranaceis, involucro triphylo. Thunb. prod. 17.

30. *pilosus*, culm. compresso, capit. ovato, glumis lanceolatis ciliatis, involucro tetraphyllo. Thunb. prod. 18.

31. *Histrix*, culm. capillari, capit. subdistachyo, glumis acuminatis squarrosis,

involucro monophyllo. Thunb. prod. 17. Hab. in Cap. b. spei.

32. *domingensis*, culm. tereti nudo aluissimo, flor. corymbosis, pedicellis umbellatis simplicibusque, spic. teretiusculis, involucro corymbum aequante. Hab. in St. Domingo. Culm. 4-dripedalis et ultra, pro ratione tenuis. Fol. radicalia canaliculata laevissima, basi spadicea; spic. brunneae oblongae, squamae obtusis.

33. *lacustris*, culm. tereti elongato nudo, spicis ovatis sessilib. pedunculatisque terminalib. L. Willd. Sp. 1. p. 26. Mich. Flor. Amer. 1. p. 131. β . minor involuc. rigidioribus pungentib. Roth. germ. p. 57. Flor. dan. t. 454. Hab. in Europa, Canada et Barbaria, aquis stagnanti. Caul. sursum attenuatus, 2-3 pedalis.

34. *Holoschoenus*, culm. elongato tereti nudo, spicis subglobosis pluribus glomeratis pedunc. sessilibusque, involucro diphyl. inaequali mucronato Pluk. Phyt. t. 40. f. 4. Roth. Beyträge p. 86. Scheuch. t. 8. f. 2, 3, 4 et 5. Hab. in Europa australi, et in paludib. Algeriae.

35. *australis*, culm. tereti nudo, capit. laterali sessili, bractea reflexa, fol. canaliculatis. Syst. Veg. 85. Pluk. Phyt. t. 40. f. 5. Obs. cl. Roth. l. c. et Smith Flor. brit. 1. p. 53. hunc et sequentem pro varietate prioris habent. Culmi laeves, vix pedales.

36. *romanus*, culm. tereti nudo, capitulo laterali sessili conglobato, bractea reflexa. Jacq. aust. 5. p. 23. t. 48. Scheuch. gram. 373. t. 8. f. 6. Hab. in Galloprovincia, Sibiria et Romae. Obs. Huic culmi fili crassitie; Sc. holoschoeni vero crassi ut in S. lacustri et apice pungentes. Lin.

37. *nodosus*, culmo compresso nodoso, capitulo glomerato mucronato. Roth. gram. 52. t. 8. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei.

38. *radiatus*, culm. tereti, capitulo hemisphaerico, involuc. polyphylo. Thunb. prod. 18. Schoenus radiatus. Lin. suppl. 101. Hab. ad Cap. b. spei. Culmus aphyllus palmaris striatus. Folia linearia canaliculata. Semina absque pappo.

39. *setaceus*, culm. nudo foliisque setaceis, spic. lateralib. subgeminis sessilibus. Flor. dan. t. 311. Leers herb. n. 35. t. 1 f. 6. Hab. in uliginosis. Plant. tenera, minuta. Spicul. non terminal. uti vult Linnaeus, sed sub apice culmi laterales. Sem. nuda.

40. *supinus*, culm. tereti nudo, spicis sessilibus in medio culmo glomeratis. Dalib.

paris. 16. Roth. germ. 11. p. 58. fol. rotundoteteribus. Tournef. inst. 528. Hab. in Gallia et in Marchia.

41. *natans*, culm. compresso folioso flexuoso-erecto, spic. 2-lateralibus. Thunb. prod. 17. Hab. in aquis Cap. b. spei.

42. *vaginatus*, culm. filiformi, capit. lateralibus alternis involucro brevioribus. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. spei.

43. *tristachyos*, culmo capillari capit. tristachio laterali, glumis integris, involucro diphyllo. Thunb. prod. 17. Lin. suppl. 103. Roth. 48. t. 13. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. An involuc. potius 1-phyllum?

44. *uncinatus*, pilosus, culm. tereti folioso, spicis in capitulum conglomeratis terminalibus axillaribusque. Willd. Sp. p. 300. Pluk. 178. t. 190. f. 7. Hab. in India. Culm. biuncialis. Squamae mucronatae uncinatae elevato-nervosae. W.

45. *aristatus*, culm. striato tereti folioso, panic. terminali diphyllo, spicul. ovatis squarrosis - echinatis. Willd. l. c. Scirpus pilosus. Retz. obs. 6. p. 19. Hab. in India.

46. *autumnalis*, culm. ancipiti nudo, umb. decomposita, spiculis ovatis. Mant. 180. Hab. in Virginia et Jamaica. Culmi palmares, compressi, altero latere subcarnati. Facies Junci pilosi.

47. *diphyllus*, culm. semicylindricis striatis diphyllis, umb. composita involucro diphyllo longiore. Retz. obs. 5. p. 15. Hab. in Tranquebaria.

48. *fastigiatus*, culm. filiformi, capitulo convexo compresso, glumis extimis mucronatis, involucro nullo. Thunb. prod. 18. Hab. in Cap. b. spei.

49. *globulosus*, culm. compresso nudo, panic. terminali, spicula unica sessili: pedunculatis pluribus globosis Retz p. 19. obs. 6. Hab. in India.

50. *globiferus*, culm. nudo tereti, umb. terminali composita, capitulis globosis, ex spiculis pluribus arcu congestis. Lin. suppl. 104. Hab. in Tenariffa. Culm. aphyllus, terminatus spatha. Pedunc. terminati globulis ex spicis brevissimis congestis. Hi circa basin emittunt novos radios globiferos, iterum similiter dividendos, unde inflorescentia ex umb. basi proliferis constat. Lin.

51. *capillaris*, culm. nudo foliisque capillaribus, spicis pedunculatis ternis, intermedia sessili. Mant. 321. Burm. Zeyl. 108. t. 47. f. 2. Foliol. setaceum sub umb. spicis longius.

*** *Culmo triquetro, panicula nuda.*

52. *trispicatus*, culm. angulato nudo, spicis terminalibus ternis sessilibus nullis. Lin. suppl. 103. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. spei. Folia vix ulla, nisi squamae ferrugineae radicales. Involucrum polyphyllum, foliis subulatis brevissimis.

53. *lateralis*, culm. triquetris nudis, spicis subternis lateralibus, involucri monophyllo brevi. Retz. obs. 4. p. 12. et 5. p. 16. Hab. in Zeylona.

54. *triqueter*, culm. triquetro nudo, spicis lateralib. subsessilibus pedunculatisque, mucronem rectum aequantibus. Lin. Mant. 29. Willd. Sp. p. 302.

α. *S. trigonus*, culm. trigono nudo, spicis lateralib. ovatis fasciculatis sessilib. pedunculatisque, mucrone erecto. Roth. Beyträge 2. p. 60. *S. triqueter* Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 303. Hab. in Europa australi ad paludes. Gluma calycina corollas aequans. Ro h.

β. *S. triqueter* (triangularis), culm. triquetro nudo, spicis lateralib. sessilib. ovali-acuminatis, mucrone erecto Roth. l. c. p. 61. *S. mucronatus*. Roth. Flor. germ. Pollich. Cresc. cum priore. Spicae duplo acutiores quam praecedentis. Gluma corollis duplo fere major. Roth.

55. *mucronatus* (*tricarinatus*), culm. triangulo acuminato, spic. lateralib. sessilib. mucrone horizontali. Roth. l. c. Willd. Sp. l. c. Hab. rarius in stagnis. Omnib. in partibus crassior a antecedentibus. Caul. mollis, semen nigrum. Michx. gen. p. 47.

56. *americanus*, culm. acute triquetro nudo, spiculis sessilibus conglomeratis, oblongo-ovatis mucrone brevioribus. *S. triqueter*. Michaux Flora 1. p. 30. Hab. in Carolina inferiore. Ab Europaeo diversus videtur. Spiculae majores.

57. *dichotomus*, culm. triquetro nudo, umbella decomposita, spicis ovatis, dichotomicis sessilib. L. Flor. zeyl. 40. Rothb. Pluk. alm. 170. t. 119. f. 3. Hab. in India, Arabia et Aegypto.

58. *annuus*, culmo triquetro nudo multifloro, involucri diphylllo, umbel. simplici spicis solitariis peduncul. intermedia sessili Allion. Pedem. 2 p. 277. t. 88. f. 5. Destoni. Atl. 1. p. 51. Hab. in Helvetia, Pedemontano et Barbariae agris. Culm. plures ex una radice. Spic. ovato-acuminatae, unica in centro umb. sedet. A.

59. *echinatus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spicis ovatis. Fl. zeyl. 38.

Pluk. alm. 179. t. 51. f. 4. Hab. in India utraque.

60. *retrofractus*, culm. triquetro, umb. simplici, spicarum oculos retrofractis. Sp. pl. Pluk. phyt. 415. f. 4. In Virginia. T.

61. *ferrugineus*, culm. triquetro subnudo, involucri longitudine paniculae ciliatis. Willd. Sp. 1. p. 304. Schoenus polymorphus. Rothb. gram. 67. Sloan. jam. 38. hist. 1. p. 36. t. 77. f. 2. Hab. in Jamaicae paludibus et in siccis. T.

62. *pubescens*, fol. radical. angustis, umbel. terminali sparsa spicul. crassiusculis ovatis, squamis subpubescentib. ovalibus. Mich. Flora. p. 31. Hab. in Carolina et Georgia.

63. *castaneus*, fol. radicalib. angustis, erectis, culmo subtereti striato, umbel. terminali bracteis involucriata, spicul. subrotundo-ovatis, squamis suborbiculatis. Michaux. l. c. Squamae nitentes, haec. Hab. in Florida.

64. *Michauxii*, fol. radical. planis, culm. nudo subcapiti, umb. composita laxa, spicul. oblongo-ovatis: squamis lanceolatis, carina prominente discolori in mucronem desinente. *S. mucronulatus*. Mich. p. 32. Hab. in Carolina montib. Sem. nudum. Styl. trifidus.

65. *spadicеus*, culm. semitereti nudo retrorsum scabro, umbel. composita, spic. oblongis dichotomis sessilib. involucri brevibus. Vahl. Eclog. Lin. Willd. Sp. 1. p. 305. Hab. in America meridionali, Jamaicae fluvii.

66. *miliaceus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis subglobosis parvis intermediis sessilib. involucri setaceo. Sp. pl. 75. Retz. obs. 5. p. 16. Rothb. p. 57. t. 5. f. 2. Hab. in India Pedunc. dichotomi. Culm. tenuis. Spicae pedunculatae, at solitariae sessiles in ramificationibus umbellae, minutissimae ut semina Milli. Lin.

* *Bengalensis*, culm. tenui nudo, umb. supradecomposita, involucri tetraphyllo, spicul. intermediis sessilib. ovatis (minutis): squamis concavo-carinatis mucronatis. Communicatus a cl. Richard, qui cum ex Bengalia accepit. An diversa species?

67. *maritimus* (*riparius*), culm. triquetro, panic. globata foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata, involucri polyphylllo Hab. in lacub. et fossis. 2-3 pedalis.

β. *macrostachyus*, culm. acute triquetro folioso, bracteis plurib. longissimis,

spic. sessilib. pedunculatisque crassis ovatis squamis subaristatis. Michaux Flora. p. 32. Hab. in Carol. paludib. salis.

68. *compactus*, minor, spiculis omnibus sessilib. squamis trifidis, involuero diphylo. Kroecker Flor. Sil. t. 1. 15. Flor. dan. t. 937. Hab. in uliginosis subexsiccatis. Tam ob locum, quam parvitatem ab antecedente diversus.

69. *grossus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis pedicellatis, involuero triphylo lanceolato-subulato longissimo. Lin. suppl. 104. Hab. in India. Culmus orygalis. Involucrum foliol. unico longissimo. Simillimus *S. miliaceo*, sed magnitudine diversus. L.

70. *Luzulae*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa prolifera, spiculis subrotundis. L. in Pluk. mant. 97. t. 417. f. 3. Hab. in India. Involucrum universale polyphyllum: fol. ensiformib. umb. longioribus; partialia vix ulla. Capit. subrotunda, glomerata ex spiculis subrotundis.

71. *sylvaticus*, culm. triquetro folioso, umb. foliaceae, pedunc. nudis supradecompositis dichotomis, spicis confertis. Flor. dan. t. 307. Leers. t. 1. f. 4. Michaux, Flor. t. 1. p. 33. *β. radicans*, culm. triquetro folioso, umb. foliaceae, culmis sterilibus deflexis apice radicanibus. Schkuhr. Hoffm. germ. p. 26. Hab. in sylvarum fossis. T.

72. *aestivalis*, culm. depressis triquetris nudis, umb. compositis involucreis, flor. monandris. Retz. obs. 4. p. 12. Hab. in fundo fluviorum exsiccatorum Zeylonae. T.

73. *squarrosus*, culm. triquetro nudo folisque setaceis, spicis ternis sessilibus crassis squarrosis. Mant. 181. Rottb. p. 49. t. 17. f. 5. Hab. in Ind. orientali. Involucr. diphyllum; spicae squam. subulatis, exstantibus, basi nodosis, valde imbricatis.

74. *dipsaceus*, culm. setaceis triquetris, umb. simplicis, capitulis oblongis squarrosis, flor. subulatis recurvis diandris, germine echinato. Rottb. gram. 56. t. 12. f. 1. Hab. in India. Parvus. Involucr. 3-4 phyllum.

75. *junciformis*, culm. nudo filiformi subtrigono, paniculae spiculis sessilibus pedunculatisque, involuero diphylo. Retz. obs. 6. p. 19. Hab. in China.

76. *michelianus*, culm. triquetro, capitulo globoso, involucre. polyphylo longo. Lin. Bot. Annal. 1. p. 20. t. 2. Desf. atl. 1. p. 51. Till. pis. 51. t. 27. f. 5. Buxb. exot. 1. p. 34. t. 55. f. 1. Hab. in Europa Aegypto et in Marocco.

77. *ciliaris*, culm. triquetro folioso, umb. sparsis, squamis calycinis aristis ciliatis. Mant. 182. Rottb. t. 17. f. 1. *S. pubescens*. Desf. Atlant. 1. p. 52. Schousboe Maroc. ed. germ. p. 19. Hab. in India orientali et in Barbaria. Culmi palmares laxi. Spicae ovatae, hirtae pilis raris. Involucrum loco saepe foliola 1. seu 2. parva.

***** Culmo triquetro, Capitulo terminali.

78. *hottentottus*, culm. triquetro folioso, capitulo globoso, squam. lanceolatis hirtis. Lin. Mant. 182. Thunb. prod. 18. Ad Cap. b. spei locis paludosis. Folia caulina, 3, remotissima. Involucrum capituli triphyllum.

79. *antarcticus*, culm. triquetro nudo folisque filiformib. capitulo globoso, involucr. 1-phylo. Mant. 181. Thunb. prod. 17. Scirpus barbatus, vaginis suboppositis ora superiori barbatis. Rottb. gram. 52. t. 17. f. 4. Pluk. alm. 179. t. 299. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei et in Guinea. Spicae ovatae, trifariam imbricatae triquetrae.

80. *argenteus*, culm. setaceis triquetris, involucr. tetraphyllo longissimo, spic. cylindricis plurimis in capitulum glomeratis. Rottb. p. 51. t. 17. f. 6. Rheed. mal. 12. p. 101. Hab. in India.

* 81. *monander*, culm. triquetro, involucr. triphylo longo, capitulo sessili glomerato, flor. monandris. Rottb. p. 50. t. 14. f. 3. Hab. in India. Spic. ovato-teretes.

82. *cephalotes*, culm. triquetro nudo, capitulo ovato squarroso, involucr. triphylo longo. Lin. Willd. Sp. 1. p. 311. Houttuyt t. 88. f. 3. Hab. in India.

124. TRICHOPIPHORUM. Spicul. subovatae, squamis undique imbricatis. Sem. setulae capilliformes (nec lanam densam referentes) demum longe exserta numero definito sex. (Genus intermedium inter Scirpum et Eriophorum.)

1. *cyperinum*, culmo triquetro folioso, panicula decomposita, spiculis confertis ovatis. Scirpus Eriophorum. Michaux Flora. t. 1. p. 33. Eriophorum cyperinum Lin. Willd. Spec. 1. p. 313. Hab. in Amer. boreali. Gram. altum.

2. *lineatus*, culm. folioso paniculato, spicul. ovato-oblongis: squamis lanceolatis subcarinatis. Scirp. lineatus. Michaux. l. c. Hab. in Carolina. Priori simile.

3. *alpinum*, parvum, culm. nudo angulato spicato. Erioph. alpinum. Lin. Flor. dan. t. 620. Sowerb. engl. bot. t. 311. Hab. in Europae subalpinis.

β *hudsonianum*, majus, culm. nudo triquetro, fol. canaliculato - setaceis. Michaux. p. 34. Hab. ad sinum Hudsonis.

125. ERIOPHORUM. Glumæ paleaceæ undique imbricatæ. Sem. lana densa longissima cinctum.

* *Monostachya*.

1. *vaginatum*, culmis vaginatis teretibus, foliis triquetro - canaliculatis, spica ovata. Roth. N. Bot. Beyträge, 1. p. 95. Willd. Spec. 1. p. 372. Flor. dan. t. 236. Hab. in montosis uliginosis. Glum. acuminatæ.

2. *Scheuchzeri*, culm. basi vaginatis teretibus, fol. tereti - canaliculatis, spica rotunda. Roth. l. c. Scheuchz. Agrost. app. t. 7. E. capitatum. Hoffm. Flor. germ. ed. t. p. 26. Hab. in alpi. rhæticis et Salisburg. Glum. obtusæ.

** *Polystachia*, culm. foliosis teretibus.

3. *virginicum*, fol. angustis planis, spicis pluribus sessilibus. Willd. l. c. p. 313. Roth. l. c. p. 96. Hab. a Canada ad Carolinam. Flor. diandri Lana fulvescens. Mich.

4. *vulgare*, (polystachyum L.) fol. planis: mucrone triquetro, spicis pedunculatis nutantibus involucrium subaequantibus. Leers herb. t. 1. f. 5. Engl. bot. t. 563. Cresc. in paludosis. Involucr. basi membranaceo-dilatatum, 2-3-phyllum.

6. *angustifolium*, fol. canaliculato-tri-quetris, spicis pedunculatis, seminibus ovatis. Roth l. c. p. 94. E. *polystachyon* Huds. Curt. Flor. lond. t. 9. Involucr. 3-phyll. foliol. linearia: unico spicis multo longiore. Cum priore; etiam in America crescit.

6 *gracile*, fol. triquetris sursum canaliculatis, spicis pedunculatis, sem. linearibus, involucrio paniculæ uplo brevior. Roth. p. 95. Ejusd. Cat. 2. append. E. triquetrum. Hoppe. Hab. in Palatinatu et alpi. salisburgensis.

126. VAGINARIA. Spica ovata squamis undique imbricatis. Stigm. 3. Seminis involucrellum (Perispermium) alternatim tripaleaceum et trisetum.

1. *Richardi*, Fuirena *scirpoidea*, culmo aphylo vaginato, spica unica

squamis lanceolato - spathulatis. Michaux, Flor. p. 38. Hab. in Florida. Obs. Characteres hujus sequentiumque, ab eo constitutorum generum, concinnavit celeb. Richard.

127. FUIRENA. Squamæ mucronatæ in spiculas undique imbricatæ. Sem. involucrellum latum, paleæforme, sæpius aristatum.

1. *umbellata*, umbellis compositis, spicis oblongis aggregatis sessilibus, fol. lanceolatis. Vahl. Eclog. Amer. 2. Roth. gram. p. 70. t. 19. f. 3. F. *paniculata*. Lin. suppl. p. 105. Hab. in utraque India.

2. *obtusiflora*, umb. subcompositis, spic. cylindricis utrinque obtusis squarrosis. Vahl. l. c. In Amer. meridionali. Fol. glabra? An a sequente diversa?

3. *squarrosa*, fol. ciliatis, spic. squarrosis, squamis petiolato-spathulatis. Michaux. Flor. 1. p. 37-38. Hab. in Georgiae et Carolinae paludosis. Squamæ mucrones longi strigoso-squarrosi.

4. *canescens*, subtomentosocanescens; spicul. glomeratis, squamis mucrone erecto. Richard. Hab. in Africa.

128. HYPOLYTRUM. Spicula squamis undique imbricatis. Sem. involucrellum glumam 3-4-valvem mentiens. Stam. 2-3. Stigm. 1-2.

1. *latifolium*, maximum glabrum, fol. latis trinerviis, corymbo decomposito. Hab. in India. Stam. 2. Rich.

2. *senegalense*, spicul. pluribus capitatis congestis, squamis subacuminatis. Hab. in Senegal. Stam. 2. Stigm. 3. Rich.

3. *gracile*, fol. angustis, caule debili, spicul. 3. sessilibus subgloboso-ovatis, squamis spathulatis. Richard. Stam. 1. Stigm. 2.

129. DIPLASIA. Spica squamis undique imbricatis. Involucrellum glumam 4-valvem mentiens. Stam. 7. Stigm. 2.

1. *Karataefolia*, fol. longissimis carina margineque aculeatis, umb. decomposita. In Gujana. Fol. Bromeliae Karatas. Richard.

130. LEPIRONIA. Spicul. squamis orbiculatis cartilagineis. Sem. involucrellum 16-paleaceum. Stam. 4-6.

1. *mucronata*. Hab. in Madagascar.

Aphyllis. Culm. nodosus infra apicem 1-stachyus. Spica ovato-oblonga. Rich.

131. **CHRYSITRIX**. Spica imbricata squamis coriaceis setaceis. Stam. multa, inter singulas squamas singula.

1. *capensis*, Lin. fl. gen. gram. p. 27. f. 1. 2. Hab. ad. Cap. b. spei. Spica lateralis. An antecedens hujus generis?

** GRAMINA. Flor. glumacei, 3-andri.

Rad. fibrosa. Culmi ut plurimum fistulosi, articulati, simplices aut basi ramosi. Fol. linearia, vaginantis, vagina latere fissili, apice membrana albidula distincta, quae ligula aut stipula nuncupatur. Flor. spicati, racemosi, plerumque paniculati, rarissime foliis involucri (ut in priore familia); nonnulli saepius abortivi; alii polygami; pauci monoici. Stam. in plurimis tria (qualia gramina hac in serie solummodo enumerantur), in nonnullis sex (vid. Clas. Hexandriam), aut plura. Styl. communiter duo, in quibusdam 1, plerumque tamen bifidus. In unico tantummodo gramine stigmata tria observata sunt. Glumae interiores in multis semen maturum incrustant et cum eo indurantur.

MONOGYNIA.

132 **LYGEUM**. Flores intra spatham convolutam gemini. Cal. basi in tubum 2-locularem villosum concrescens, 2-valvis.

1. *Spartum*. Lin. Willd. Sp. 1. p. 316. Richard in Act. Soc. Hist. nat. Paris. p. 28. t. 3. Hab. in Hispania. T. Flor. omnium graminum maximi, interdum 3 intra involucrium. Styl. longus.

133. **CORNUCOPIÆ**. Involucr. cyathiforme. Cal. 1-phyllus, 2-partitus. Cor. 1-valvis, superne hiac fissa. Styl. brevis; Stigm. 2. (raro 1.) longissima. (Richard.)

1. *acutellatum*, spica mutica, involucrio crenato. Lin. Smith spicil. bot. t. 14. Willd. l. c. p. 319. Hab. in Oriente. ☉

2. *alopecuroides*, spica aristata. Lin. Mant. p. 29. Hab. in Italia. Similis Alopec. pratensis, vagina supremi fol. ventricosa. Involucr. hemisphaericum integerrimum. Lin.

134. **CENCHRUS**. Involucr. laciniatum, echinatum 3-4-florum. Cal.

2-valvis, 2-florum. Cor. 2-valvis, mutica. Styl. 2-fidus.

1. *Iappaceus*, paniculae patentis ramis simplicissimis, cor. retrorsum hispidis, cal. trivalvibus bifloris Lin. Willd. Spec. 1. p. 315. Hab. in India. Fol. cordato-lanceolata. Involucro o? Hujus generis non videtur. An Panicum?

2. *capitatus*, spica ovata simplici. Col. cephal. 1. p. 340 t. 338. f. 1. Barr. rar. t. 28. f. 1. *Echinaria capitata*. Desf. atl. 2. p. 385. Hab. in Gallia, Italia et Barbaria. ☉

3. *echinatus*, spica oblonga conglomerata, involucr. subgloboso 10-partito. Schreb. gram. 9. t. 23. f. 1. Cav. ic. 5. p. 39. t. 462. Pluk. alm. 177. t. 92. f. 3. Hab. in Americae et Barbar. arvis.

4. *tribuloides*, spica glomerata, glumis femineis globosis muricato-spinosis hirsutis. L. Michaur Fl. 1. p. 61. Sloan. jam. 30. hist. 1. p. 108. t. 65. f. 1. Moris. hist. 3. p. 195. s. 8. t. 5. f. 4. Hab. in Virginiae maritimis. ☉

5. *caliculatus*, culm. simplici erecto, spica glomerata, involucrio polyphylio scitaceo. Cav. l. c. t. 463. Hab. in Americor. insula Bahao. Fl. aet. Involucr. foliola subduodecim setulis rigidis, tomentosa, apice glabra. C.

6. *spinifex*, culmo ramoso, fol. brevibus cordato-lanceolatis, involucr. integerrimo echinato. Cav. ic. 5. p. 38. t. 461. Hab. in regno chilensi, et in Montevideo. Flor. januario.

7. *rufescens*, fol. glabris, spica elongata, involucr. confertis setiformibus (rufescentib.) inferne villosis, cal. sub-2-floro. Desf. atl. 2. p. 388. Hab. in arenosis prope Mascas.

8. *hordeiformis*, fol. retrorsum asperis, involucr. setosis flore 4-plo longioribus, inferne (albis) villosis, cal. 1-2-floro. Desf. l. c. (C. *asperifolius*). Willd. sp. p. 318. Alopecurus hordeiformis. Lin. Hab. in Asia et Africa.

9. *geniculatus*, racemo spicato simplici, flor. involucrio polyphylio scabro, culmo geniculato. Thunb. prod. 24. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *purpurascens*, racemo spicato simplici, flosculis circumvallatis aristis longissimis, culmo erecto. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 329. Willd. l. c. In Japonia. Arist. purpureae.

11. *frutescens*, capit. lateralibus sessilibus, fol. mucronatis, caule fruticoso. F. 4

Lio. Alpin. exot. t. 104. Hab. in Armenia. h

135. PENNISETUM. *Involucr.* multisetum. *Cal.* 2-valvis, 2-florus: flor. altero hermaphrodito; altero masculo (rarius neutro) utroque sessili. (Flor. spicati polygami. In plerisque speciebus involucr. heterobaton, setisque nonnullis inferne plumosis.)

1. *typhoideum*, fol. latis glabris, spica crassa cylindrica, involucri pedicellatis pennatis. Holcus *spicatus* L. Pluk. alm. t. 32. f. 4. Hab. in India. Styl. villosus. ☉

2. *setosum*, fol. basi villosis, spic. subsessili imbricata, involucr. sessilibus: setis nonnullis longissimis, stylo bifido. Cenchrus *setosus* Swartz. Flor. Ind. occid. t. p. 211. secundum quem *Panicum polystachium* L. eadem species est. Hab. in Ind. occid. 4plo cretaceo.

3. *cenchroides*, culm. geniculato, involucr. alternis dupla flor. longitudine: setarum una subulato-paleacea longiore. Cenchr. *ciliaris* L. Gisecke ic. t. 23. Desf. atl. 2. p. 387. Hab. ad Cap. bon. sp. et Barbariae arenosis. Fol. villosa. ☉

4. *orientale*, fol. subsetaceo-subulatis, involucr. sparsio stipitato: setis parvis flore longioribus plumosis. Cenchrus *orientalis* Willd. (ined.) Hab. in Oriente.

5. *violaceum*, caul. ramoso, fol. vaginisque pilosis, spic. cylindrica, involucr. sessilibus flor. aequantibus simplicibus. *Panicum violaceum*. Lam. ill. gen. 1. p. 169. Hab. in Senegal.

Obs. Characterem hujus generis, nec non specierum differentias communicavit clar. Richard. Ob affinitatem cum *P. setoso* forte huc quoque referendus *Alopecurus indicus*. L.

136. SESLERIA. *Cal.* 2-5 florus. *Cor.* 2-valvis, apice dentata. *Stigm.* subglandulosa. (Flor. spicati, sæpius cærulei basi involucrati.)

1. *cærulea* (*calcaria*), spica ovato-oblonga, fol. planis, involucri integro. *Cynosurus cæruleus*. L. Willd. Sp. t. p. 414. Arduin. spec. 2. p. 18. t. 6. Hab. præsertim in montosis calcareis, et in pascuis.

2. *sphaerocephala*. spica globosa (albida), involucr. ovatis subdentatis, cor. acuminatis. Hoffm. germ. ed. 2. p. 49.

sub *Cynosuro*. Hab. in Germaniæ subalpinis. Carinth. Tyrol.

3. *microcephala*, involucr. subdentato, cor. aristatis, spicis subrotundis. Hoffm. l. c. *Cynos. sphaerocephalus*. Wülf. ap. Jacq. Misc. 2. p. 71. Hab. cum priore.

4. *disticha*, involucr. nullo, spica disticha. *Poa disticha*. Wulf. Jacq. ic. v. 1. t. 19. Fol. setacea. In Carinthia, etiam in Pyrenæis crescit.

137. LIMNETIS. *Spica* lateriflora: flosculis subbifariam imbricatis. *Cal.* 2-valvis: valv. 1. minore. *Cor.* 2-valvis, mutica, compressa, carinata. *Styl.* longus. Nect. o. (Flor. paniculati, stricti.)

1. *pungens*, fol. convolutis pungentibus, spicis paucis appressis pubescentibus, cal. carinis inermibus. *Dactylis stricta*. Smith. Flor. Brit. Engl. bot. t. 380? *Spartina stricta*. Roth N. Beyträge p. 101. Hab. in Gallia et Anglia, ad litora maris.

2. *juncea*, fol. distichis breviusculis setaceo-convolutis, spicis paucis remotis patulis, cal. acuminati carinis asperis. *Trachynotia juncea*. Michaux. Flor. 1. p. 64. Hab. in siccis maritimis Carolinae Georgiæ.

3. *cynosuroides*, subglauca, fol. longissimis, spic. plurimis alternis secundis, cal. subaristato-acuminato: carinis aculeatis. *Dact. cynosuroides*. Lin. Hab. in Amer. boreali.

4. *polystachia*, fol. latis, spicis pluribus, undique versis longis linearibus: carinis aculeatis. *Trachynotia*. Michaux l. c. Hab. in inundatis maritimis Nov. Angliæ.

Obs. Horum graminum ad oras maris crescentium, unde nomen inditum, differentias observationibus cl. Richardi debeo.

338. NARDUS. *Cal.* 1-florus, 1-valvis. *Cor.* 1-valvis, inclusa. *Stigm.* 1. (Spica flor. alternis sessilibus.)

1. *stricta*, spica setacea recta, flor. secundis. Flor. dan. t. 1022. Willd. spec. 1. p. 314. Schreb. gram. t. 7. Leers t. 1. f. 7. Hab. in arenosis et collibus aridis. Var. magnitudine. ¶

2. *aristata*, spica setacea, calic. aristatis, (Lin.) corollis binis inaequaliter pedunculatis aristatis, squamula suffultis. Vill. delph. 2. p. 58. t. 2. Bocc. mus. 2. p. 74.

57. *Hab.* in Europa australi. Spica subente tenuissime pilosa.

3. *ciliaris*, spica incurva ciliata. *Hab.* in India. Folia graminea plana. Spica dimidiata. Lin.

130. **ORYZOPSIS.** *Cal.* 1-florus, 2-valvis, latus, obovalis. *Cor.* coriacea, subtereti-ovata, 2-valvis: valv. exteriori apice aristata. *Nect.* 2-paleaceum lineare. (Richard.)

1. *asperifolia*, culm. subnudo, fol. subpungentibus asperis. Michaux Flor. 1. p. 51. t. 9. *Hab.* per tractus montium a Sinu Hudsonis ad Quebec.

D I G Y N I A.

140. **MATRELLA.** *Cal.* o. *Cor.* cartilaginea s. indurata, compressa, mutica, 2-valvis: valv. demum connatae?

1. *junceae.* *Agrostis Matrella.* Lin. Willd. sp. pl. 1. p. 367? *A. junc.* a. Lam. ill. gen. t. 41. f. 2. *Hab.* in Malabaricae maritimis. Flor. subnitentes, 10-12 in rachi alternatim sessiles. Fol. disticha, pungentia.

141. **MUHLENBERGIA.** *Cal.* minutissimus, 1-2-valvis. *Cor.* 2-valvis, basi pilosa; valv. exteriori apice aristata. (Flor. paniculati.)

1. *diffusa*, culmo debili ramoso foliisque glabris; panicula coarctata, cal. 1-valvi. Richard. Roth. N. bot. Beyträge 1. p. 66. *Dilepyrum minutiflorum* Michaux. Flor. amer. bor. 1. p. 40. *Hab.* in apricis et pratis region. Kentucky in Amer. bor.

2. *aristata*, culmo firmo subsimplici foliisque pubescentibus; panicula laxa, cal. 2-valvi, arista longissima. Richard. Michaux l. c. M. *erecta*, culmo erecto, fol. lanceolatis; ligula oblonga barbata, panic. laxa. Roth. l. c. p. 97. *Hab.* in umbrosis Georgiae et Carolinae. T.

142. **TRICHODIUM.** *Cal.* 2-valvis; valvul. subaequalibus acutis: carina spinulosa. *Cor.* brevior, 1-valvis mutica. *Stigm.* subsessilia hispidula. (Flor. paniculati.) Richard.

1. *latiflorum*, culm. erectis, fol. angustiusculis: vagina subaspera. Mi-

chaux Flor. amer. bor. 1. p. 42. t. 8. *Cornucopiae hymnalis*, Walter. *Hab.* in humidis et pratis sinus Hudsonis. ♂.

2. *decumbens*, culm. decumbentib. fol. patulis: vagina laevi. Michaux l. c. C. perennans. Walt. *Agrostis ancymala* Willd. Sp. 1. p. 370. *Hab.* in Virginiae maritimis, ad ripas. ♂

143. **LEERSIA.** *Cal.* o. *Cor.* 2-valvis, clausa: valvul. compresso-navicularibus, muticis.

1. *Oryzoides*, panicula effusa, spiculis triandris patulis, glumis oblongo-ovalibus, carina ciliatis. Willd. Sp. 1. p. 125. Swartz prod. ar. Michaux. p. 39. *Phalaris oryzoides*. Lin. Schreb. gram. 6. t. 22. B. L. virginica. Willd. l. c. *Hab.* in paludosis et ad margines fluviorum passim; etiam in America. Gram. asperum.

2. *lenticularis*, panic. ramis subsolitariis, spicul. imbricatis, glumis orbiculatis ciliatis majusculis. Michaux 1. p. 39. *Hab.* in paludosis Illinoisib. in Amer. boreali.

3. *monandra*, panicula effusa, spicis remotis laxis, spiculis secundis subrotundis monandris, glumis laevibus. Swartz. prod. ar. c. j. Fl. p. 130. *Hab.* in Jamaicae nemorib. cretaceis. Vere.

4. *hexandra*, panic. effusa, spiculis alternis hexandris, glumis sublaevibus. Swartz prod. ar. Stigm. pallide purpurea. *Hab.* in Jamaicae aquis.

144. **ZOYDIA.** *Cal.* 1-valvis, carinatus. *Cor.* 1-valvis, membranacea.

1. *pungens.* Willd. in Nov. Act. Nat. cur. Berol. v. 3. *Hab.* in Malabaricae maritimis. Nardum refert.

145. **MILIUM.** *Cal.* 2-valvis, 1-florus, ventricosus. *Cor.* 2-valvis, brevissima. *Stigm.* penicillata, S. villosa.

1. *nigricans*, flor. paniculatis confertis, valvulis calycinis nitidis nigrescentibus, fol. ensiformibus longissimis. Flor. per. 1. p. 47. Colitur in Pillao, Cuchero ubi Maiz de Guinea audit. E seminib. torrefactis Peruviani farinam praeparant, ex qua potum et cibum faciunt.

2. *capensis*, panic. capillari, calycib. acumineis, cor. arista terminali incurva. Lin. mant. p. 185. Willd. Sp. 1. p. 358.

Hab. ad Cap. b. spei Cul. palmares. Fol. angusta subtus pilosa.

3. *punctatum*, panic. ramis simplicissimis, flor. alternis geminis secundis. Amoen. acad. 5. p. 392. Hab. in Jamaicae anguinosis, udis.

4. *lentigerum*, panicula subspicata, flor. aristatis. Schreb. gram. 14. t. 23. f. 3. Vahl. symbol. 2. p. 18. Agrostis australis. Lin. Mant. 30. Gouan. hort. 39. t. 1. f. 2. Alopecurus ventricosus. Huds. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 6. Hab. Mompeliu, in Anglia et Aegyptio.

5. *compressum*, spicis subternis, flosc. alternis muticis rachi adpressis, culmo medio articulato-compresso, pedunc. longissimis. Swartz prod. 24. Fl. p. 183. Hab. in Jamaica et India occidentali. Sem. compressum. S. ¶

6. *digitatum*, spicis digitatis subquaternis subsessilib. flosc. muticis appressis secundis, fol. margine cartilagineo-serratis. Swartz. Flor. p. 181.

7. *cimicinum*, racemis digitatis, calyc. valv. exteriori ciliata. Mant. 184. Panicum Retz. Obs. 3. p. 9. Hab. in Malabar. Flor. cum semine lapsi ob cilia cimicem quamdam referunt. Lam. enc. 1. p. 59. n. 19. In Jamaica, pratis aridis. ☉

8. *paniceum*, spicis subdigitatis alternis patentibus filiformibus; flosculis secundis muticis pedicellatis trigonis. Swartz Flor. p. 179. Hab. in Jamaica. Distinctum a M. cimicino. L.

9. *effusum*, flor. verticillato-paniculatis dispersis muticis. Lin. Flor. dan. t. 1143. Leers. t. 8. f. 7. Hab. in nemoribus. ¶

10. *confertum*, asperum, panicula coarctata, flor. coloratis muticis. Mill. dict. n. 4. Hab. in Helvetia et Gallia. Distincta species.

11. *globosum*, panic. patula, glumis muticis, pedicellis cingulo luteo. Thunb. jap. p. 49. Hab. in Japonia.

12. *caerulescens*, flor. paniculatis aristatis, aristis gluma breviorib. Schousb. maroc. 1. p. 34. Desf. adant. 1. p. 66. t. 12. In fissuris rupium Atlantis et circa urbem St. Crucis.

13. *paradoxum*, flor. paniculatis aristatis. Schreb. gram. t. 28. f. 2. Agrostis. Sauv. Monsp. 45. Hab. in Gallia meridionali, Carniola. Panicula alba. Semen nigrum.

14. *villosum*, panicula laxa, flosc. muticis, calycibus lanatis. Swartz prod. 24. Andropogon insulare. Lin. Amoen. acad.

5. p. 412. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 43. t. 14. f. 2. Hab. in Jamaica. ☉

15. *ramosum*, culmo ramoso, flor. paniculatis subbinatis hirsutis. Retz. obs. 6. p. 22. Hab. in India orientali.

146. AGROSTIS. Cal. 2-valvis, uniflorus, valv. acutis. Cor. 2-valvis. Stigm. longitudinaliter hispida, s. plumosa. (Flosc. patententes.)

* *Aristatae.*

1. *Spica venti*, petalo exteriori arista recta stricta longissima, panicula patula. L. Willd. Sp. 1. p. 361. Leers herb. t. 4. f. 1. Hab. inter segetes. ☉

2. *interrupta*, petalo exteriori aristato, panic. attenuata coarctata interrupta. Vahl. 88. t. 71. f. 4. (bona.) Hab. in Europa australiori. Virescens. Aristae longiusculae.

3. *spicaeformis*, panic. spicaeformi, flosc. biaristatis: arista altera receptaculo inserta geniculata longiori, altera infra apicem corollae rectis, cor. hirtis. Lin. suppl. p. 108. Hab. in Teneriffa.

4. *hirsuta*, panic. subspicata, culmo foliisque hirsutis, cor. dorso aristatis, apice bifidis. Lin. suppl. 108. Cresc. cum priore.

5. *miliacea*, petalo exteriori arista terminali recta mediocri, flor. ovatis laevibus. Gouan. illustr. 3. Hab. in Hispania, Gallia et Sibiria. ¶

6. *bromoides*, panic. simplici angustata, cor. pubescente: arista recta calyce longiore. Mant. 30. Gouan. illustr. 3. t. 1. f. 3. Hab. Mompeliu. Cor. arista recta, scabra, calyce duplo triplove longior ut in Bromis. L.

7. *arundinacea*, panic. oblonga, petalo exteriori deorsum villosa, basi aristato, arista torta calyce longiore. Lin. Calamagrostis arundinacea. Roth. germ. 1. 33. 11. 89. Hab. in rupestris, sylvis, glareosis iuniperetis. Pallescens. ¶

8. *Calamagrostis*, panic. incrassata, petalo exteriori toto lanato apice aristato, culmo ramoso. Hab. in Helvetiae, Veronae alpinis. Panic. densa.

9. *serotina*, panic. flosculis oblongis mucronatis, culmo oblecto fol. brevissimis. L. Mant. 30. Segu. ver. 3. p. 146. t. 3. f. 2. Hab. Veronae. Fol. brevia, vix articul. longiora, patentia.

10. *rubra*, panic. primo contracta: florente patentissima, petalo exteriori glabro, arista terminali tortili recurva.

Roth. germ. v. 31. II. 81. Hab. in Anglia, Succia vulgaris. Panic. rubescens.

11. *stricta*, panic. elongata stricta, cor. calyce minoribus, arista e basi petali, torilli, flore longiore. Willd. Sp. 1. p. 366. Hab. in America boreali. Affinis praecedenti. Fol. plana angusta linearia. Ligula lacera. Cor. tenera membranacea. W.

12. *ovata*, petalo exteriore ante apicem aristato; panic. ovata coarctata spiciformi. Forst prod. n. 40. Hab. in nova Zeelandia.

13. *canina*, calycib. ovatis coloratis, arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. Leers. t. 4. f. 2. Smith brit. 78. Hab. in pascuis graminosis. Arista setacea alba, medio notata geniculo fusco. L.

14. *alpina*, fol. setaceis, panicula coarctata, calycib. hispidiusculis coloratis: petalo exteriore truncato, arista dorsali geniculata. Leysser. halens. n. 67. ed. 2. p. 34. Scheuch. gram. prod. 22. t. 4. f. 1. Hab. in alpinis inque montibus Saxoniae. ☉

15. *rupestris*, fol. filiformi - setaceis, panicula patula, calycib. hispidiusculis patentibus coloratis, petalo exteriore arista dorsali geniculata flore duplo longiore. Willd. p. 368. Allion. pedem. n. 2161. Hab. in Helvetiae, Bohemiae, Italiae rupestribus. Flosculi stramineo-fusci nec violacei. W. ☉

16. *setacea*, cal. lanceolatis, cor. basi aristata: arista geniculata, fol. radicalibus setaceis. Smith. brit. p. 79. Curt. Flor. lond. 1. 12. Agr. alpina. Withering. Hab. in Angliae ericetis aridis. Fol. glaucescentia.

17. *littoralis*, cal. lineari - lanceolatis aristatis, cor. nuda, arista subterminali recta, culm. decumbentibus. Smith. Fl. brit. 1. p. 78. Withering Flor. t. 23. Hab. in littoribus marinis lutosi. Flor. Augusto.

18. *compressa*, panic. coarctata, calycib. aequalibus laevib. cor. infra apicem brevissime aristatis. Willd. A. dubia, cal. aequalibus laevib. cor. infra apicem mucronatis, fol. setaceis. Leers herb. t. 4. f. 4. Hab. in Germania.

19. *vinealis*, calycib. coloratis, petalor. arista dorsali longitudine fere calycis, culmis adscendentibus. Schreb. spicil. 57. n. 97. Hoffm. germ. 35. Hab. Lipsiae in agris, collib passim. Var. flosc. muticis. Priori affinis ☉

☐? *gigantea*, panic. parte superiore patentissima, calycibus hispidis, petalo exteriore glabro, dorso superne subaristato,

culmo erecto. Roth. Fl. germ. I. p. 31. Willd. l. c. Crescit ad ripas fluviorum. ☉

* * Muticae.

20. *capillaris*, panic. capillari patente flexuosa, calycib. subulatis aequalibus glabris coloratis muticis. Smith. ic. ined. fasc. 3. p. 54. t. 54. Willd. l. c. Agrostis capillaris. Lin. Sp. plant. ed. 2. p. 93. Hab. in Lapponiae alpinis, etiam in Lusitania secundum Swartz in bot. Journ. 2. p. 22.

21. *vulgaris*, panic. patente, ramulis divaricatis capillaribus, cal. aequalibus, petalo interiore duplo breviori retuso. Smith brit. 1. p. 79. Hoffm. germ. ed. 2. p. 36. A. hispida. Willd. Spec. 1. p. 370. Ag. capillaris Auctorum. Leers. t. 4. f. 3.

☐. *pumila*. Lin., minor, culm. fasciculatis, sem. ustilagine corruptis inclusis. Lightf. Scot. ic. in titulo. v. 2.

☐. *sylvatica*, panic. coarctata, cal. aequalibus: virgineis cor. brevioribus, foecundatis (ustilago) duplo longioribus. Lin. vid. Steinbuch im Naturforscher (promtuarium germanic.) Fasc. p. 233. t. 5. Smith. l. c.

22. *stolonifera*, panic. coarctata, culm. ramoso repente, flor. congestis, cal. aequalibus lanceolatis pubescentibus. Smith. l. c. Martin Flor. rustica t. 120.

☐? *coarctata*, panic. contracta, cal. subaequalibus, cor. brevioribus obtusis hispidulis: fol. angustis Hoffm. l. c. 37.

☐. *dulcis*, panic. densa breviuscula interrupta, flor. fasciculatis subsessilibus.

☐. *gracilis*, caespitosa, culm. gracili subdecumbente, panic. in spicam cylindricam coarctata, flosc. glabris subnitidis. Hab. in arvis, pratis, sylvaticis, collibus. Obs. An recensitae varietates huc aut ad albam pertineant, aut distinctae species sint, determinare hactenus nequeo. var. ☐ sub nomine Agr. dulcis Sibthorpii hinc inde colitur, etiam e Silesia habeo. In var. ☐, quam circa Lugdunum Gallorum collegi, glumae glaberrimae sunt, sed pedicelli subincrassati hispiduli ut vere in A. alba.

23. *pyramidata*, panic. patente parva pyramidata, cal. cor. longioribus vaginis ore pilosis. Lam. ill. gen. p. 161. Hab. in Amer. meridionali.

24. *barbata*, panic. contracta subspicata, cal. inaequalibus, vaginis barbatis. A. littoralis Lam. ill. p. 161. Hab. in Amer. meridionali. Rich.

β. senegalensis, ramis panicula longioribus. Lam. l. c. In Senegal.

25. *alba*, panicula laxa, calycibus muticis aequalibus, culmo repente.

α. palustris, panic. coarctata mutica, cal. aequalibus hispidiusculis, culm. repente. Huds. angl. 27. Flor. opaci subpurpurasc. demum pallescent.

β. verticillata, panic. subinterrupta, flor. fasciculatis subsessilibus nitidis, glum. muticis. Villars. Dauph. 2. p. 74. Flor. virescunt. Caeteris speciebus europaeis major. Hab. in pratis humidis.

26. *diandra*, panic. elongata contracta, floribus subulatis muticis diandris, foliis convolutis. Retz. obs. 5. p. 19. Hab. in India.

27. *ciliata*, panicula mutica, gluma calycina angulata ciliata. Thunb. jap. 49. Hab. in Japonia.

28. *capensis*, panicula spicata cylindrica mutica, culmo nutante. Willd. A. spicata. Thunb. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spei.

29. *pungens*, panic. contracta spicaeformi, fol. involutis rigidis pungentib. superioribus oblique oppositis, culmo ramoso. Schreb. gram. 2. p. 46. t. 27. f. 3. Lam. enc. 1. p. 59. A. Virginica Lin. Willd. sp. 1. p. 373. Hab. in maritimis Hispaniae, Galliae australis, etiam in America, Africa et Orienta. \mathcal{T}

30. *spicata*, panic. spicata, fol. involutis rigidis, in geniculis coarctatis, ramis infractis. Vahl. symbol 1. p. 9. A. virginica sarmentis repentibus fol. convolutis ciliatis. Forsk. descript. p. 20. Hab. in Arabiae desertis. \mathcal{T}

31. *maritima*, panic. spicata, ramulis brevissimis, cal. muticis laevibus aequalib. fol. involutis. Lam. ill. p. 161. enc. 1. p. 61. In arenosis maritimis prope Narbonne. Spic. fere ut in *Poa cristata* L. Hab. in desertis arenosis Arabiae. \mathcal{h}

32. *mexicana*, panicula oblonga congesta, cal. corollisque acuminatis subaequalib. muticis, radice tuberosa. Hab. in America calidior. Corollae. basi pilosae. Aristae nullae. Facies Cinnae. \mathcal{T}

33. *coumandolina*, panic. ovata patente, pedunc. simplicibus, flor. secundis muticis, cal. aequalib. acutis nitulis. Retz. obs. 4. p. 19. Vahl. symbol. 1. p. 10. Hab. in aridis duris Malabaricae, Arabiae.

34. *tenacissima*, panic. contractata

filiformi, flor. muticis linearibus valvulis parallelis. Lin. suppl. 107. Hab. in India orientali. Radix dura caespitosa, culmis pluribus. Panic. filiformis, floribus adpressis.

35. *purpurascens*, panic. coarctata elongata, ramis adpressis erectis, flosce. inaequalibus acuminatis. Swartz prod. 25. et Flor. p. 185. Hab. in Jamaica. Facie *Airae caespitosae*. Sw. Sequenti affinis.

36. *indica*, panic. contracta spicaeformi longissima, fol. vaginantibus spicam subaequantib. Sloan. jann. 35. hist. 1. p. 115. t. 73. f. 1. A. elongata. Lam. ill. p. 162. Hab. in Indiae occidentalis subhumidis. Panic. oblonga viridis et racemis lateralibus alternis, rachi approximatis. Lin.

37. *procera*, panic. pedunculis racemosis erectiusculis, flor. hirsutis muticis lanceolatis. Retz. obs. 4. p. 19. Hab. in graminosis subhumidis Malabaricae.

39. *linearis*, spic. subquaternis digitatis, flosce. unilateralibus alternis adpressis muticis. Retz. obs. 4. p. 19. Hab. in India ad vias tempore pulviscos.

39. *lenta*, spic. subternis umbellatis, flosce. muticis oblongis acutis, valvulis cal. subaequalibus, fol. vaginisque glabris. Ait. Kew. 1. p. 56. Hab. in India. \odot

40. *stellata*, spic. quaternis umbellatis, flosce. muticis ovatis compressis, valvulis cal. inaequalibus, fol. vaginisque glabris. Willd. p. 376. Hab. in Insula St. Helenae. Spicae quaternae basi folio involutae. W.

147. **STURMIA**. Cal. 2-valvis: valv. aequalibus truncatis. Cor. minor, 2-valvis ovata lanuginosa, mutica. (Spica filiformis, flor. alternis sessilibus.)

1. *verna*. Agrostis minima. L. Willd. Spec. 1. p. 372. Hoppe in Sturm. Flor. germ. icon. Hab. in Europ. australis agris, ruderalis; Vere.

148. **AIRA**. Cal. nitens, 2-valvis, 2-florus. Cor. 2-valvis, mutica aut basi aristata.

* Muticae.

1. *arundinacea*, panicula oblonga secunda mutica imbricata, foliis planis. Sp. pl. 95. Willd. Sp. 1. p. 376. Hab. in Oriente.

2. *minuta*, panicula laxa subsagittata ramosissima, flosce. muticis. Loefl. it 117. Schreb. gram. t. 21. f. 2. Hab. in Hisp.

3. *aquatica*; panic. patente, flor. muticis laevibus cal. longiorib., fol. planis L. Poa airoides. Kocler. Vall. paris. 89. t. 17. f. 7. Obs. An ob affinitatem cum Poa distante ad Poas amandanda? Hab. in aquosis.

4. *caerulea*, panicul. coarctata, flor. conico-cylindricis. Melica. Lin. Leers. t. 4. f. 7. Molinia caerulea. Kocler gram. p. 145. Hab. in pratis, pascuis sylvisque udis. Habitus arundinaceus, var. praesertim major sylvatica. Culm. fere enodus. Forte distincti generis. Interdum flosculi incompleti rudimentum adest.

5. *melicoides*, panic. subracematim coarctata, flor. majusculis lineari-lanceolatis muticis basi villosis: rudimento flosculi pedicellato. Michaux l. c. Hab. in Canada.

Obs. Ex secundi flosculi basi nascitur pedicellus elongatus villosus floris rudimento vix perceptibili terminatus Mich. l. c.

6. *obtusata*, panic. oblonga racemosa, fol. angustis, cal. valv. altera lineari; altera obovati, flor. muticis apice compressis, Michaux Flor. p. 62. Hab. in Carolinae aridis.

7. *involutrata*, panic. patente, basi sericeo-involucrata, flor. muticis longitudine cal., fol. convolutis. Willd. l. c. Caven. ic. t. 1. p. 33. n. 48. tab. 44. f. 1. Hab. in collibus sterilibus Hispaniae. ☉

*** Aristatae.

8. *subspicatu*, fol. planis, panic. spicata floscul. medio aristatis: arista reflexa laxiore. Lin. Planta adhuc dubia, forte Koeleriae generis? Hab. in Helvetiae, Lapponiae alpinis. ☿

9. *cespitosa*, fol. planis nervosis, panic. patente, petalis basi villosis aristatisque: arista recta brevi. Lin. Leers. t. 4. f. 8. Hab. in Europae pratis. Panic. nitens. Fol. scabra, plicata. ☿

10. *ambigua*, fol. subsetaceis, panic. amplex. pyramidata, glum. flavescentibus, petalis basi breviaristatis villosis. Mich. p. 61. Hab. circa lacus Mistassins.

11. *flexuosa*, fol. setaceis, culmis subnullis, panic. divaricata, pedunc. flexuosis L. Flor. dan. 157. Leers. t. 5. f. 1. Scheuch. gram. t. 6. f. 1. Hab. in arenosis.

12. *montana*, fol. setaceis, panic. coarctata floscul. basi pilosis aristatis: arista teretili longiore. Leers. t. 5. f. 2. Hab. in montosis. An prioris junior planta?

13. *alpina*, fol. subulatis, panic. densa

floscul. basi pilosis aristatis: arista brevi. Scheuch. gram. 222. Hab. in alpinis.

14. *antarctica*, fol. planis, panic. composita patente, calycib. trifloris, floscul. medio aristatis, arista elongata rectiuscula. Forst. prod. 41. Hab. in Nova Zelandia. An Avena?

15. *canescens*, fol. setaceis: summo spatheo paniculam inferne involvente, aristis clavatis cal. brevioribus. Hab. in arenosis, Panicula deflorata e vagina exit. Fol. glauca.

16. *articulata*, paniculata, cal. flosculo longiore acuto, arista clavata medio nodosa e basi glumae prodeunte. Desf. Atl. t. p. 70. t. 13. Prope Mascar in arvis. Fol. glauca lata: spica convoluta. D.

17. *chinensis*, fol. setaceis, panicula erecta, floscul. aristatis villosis. Retz. obs. 3. p. 10. Hab. in China.

18. *praecox*, fol. setaceis: vaginis angulatis, flor. subspic. flosculis basi aristatis. Flor. dan. t. 383. Smith angl. t. p. 87. Hab. in campis arenosis et sylvaticis. Floscul. basi nudis, dorso aristatis. Smith.

19. *caryophyllea*, fol. setaceis, panic. divaricata trichotoma, flor. aristatis distantibus. Leers. t. 7. f. 7. Hall. helv. n. 1482. Hab. in Angliae, Germaniae, Galliae glaucosis. ☉

20. *setacea*, fol. setaceis, panic. diffusa, floscul. basi pilosis: inferiore mutico, superiore arista brevi. Retz. obs. 3. p. 10.

140. MELICA. Panic. spicae aut racemiformis. Cal. coloratus; 2-valvis, 2-florus: glum. laxae, obtusae membranaeae, inaequales. Cor. 2 valvis, ventricosa, minor. Rudim. floris.

1. *ciliata*, spicata, flosculi inferioris petalo ciliato L. Hab. in collibus sterilib. saxosis. Pallescens. ☿

2. *decumbens*, corol. hirsutis, flor. racemosis nutantibus, culmo decumbente. Thunb. prod. 21. Ad cap. 6. Sp.

3. *racemosa*, corol. hirtis, racemis cernuis, culmo erecto. Thunb. prod. 21.

4. *nutans*, cal. bifloro, petalis imberbibus, panicula nutante simplici. Schreb. gram. 62. t. 6. f. 2. M. montana. Lam. enc. Hab. in Europae frigidioris sylvaticis montosis. Flor. subsecundi majusculi pedicellis breviusculis. Cor. subulcata. Cum sequente ut plurimum confunditur.

5. *uniflora*, panic. suberecta divisa cal. unifloro. Retz. obs. 1. p. 10. Willd. Spec. 1. p. 383. M. Lobelii, panic. ramosa, fol. vaginis acuminata oppositifolia, radice repente. Villars. delph. 2. p. 60. t. 3. f. 3. Passim cum priore, cui similis. T.

6. *minuta*, culmo ramoso, fol. setaceis, petalis imberbibus. Lin. Mant. 32. Hab. in Italia. Racemi simplices, capillares, pauciflori. Cal. bivalvis ovatus, flosculis dimidio brevior. Planta dubia.

7. *setacea*, flor. racemosis, fol. setaceis subdistichis, petalis subbarbatis. Hab. in Gallia prope Beaucaire. Fol. laevia.

8. *aspera*, fol. angustis conniventibus, panic. patente pyramidata, glumis imberbibus. Desf. Atl. 1. p. 71. Barrel. t. 95. f. 1. Hab. in fissuris rupium in Atlante. Vag. striata. Flor. racemosi, unilaterales. Cal. 3-florus. Desf.

9. *pyramidalis*, panic. patente pyramidata, glumis variis, fol. latiusculis subconvolutis. Lam. ill. p. 179. Morison sec. 8. t. 7. f. 1. Hab. in Barbaria, et Europa australi. B. Cor. subvillosis. Gmel. sib. 1. t. 19. f. 1.

10. *laxiflora*, panic. ramis divaricatis capillarib. multifloris, cor. altera ciliata. Cav. ic. 5. p. 48. t. 473. f. 2. Hab. in regno Chilensi.

11. *glabra*, tota glabra. panic. erecta laxa: ramulis simplicibus paucifloris, flor. glumis imberbibus. Michaux Flor. p. 62. Moris. hist. 3. s. 8. t. 7. f. 51. In Virginia et Florida.

12. *papilionacea*, calycis valvula inferiore maxima colorata, petalo exteriore subciliato. L. Mant. 31. in Brasiliana. Ard. spec. 2. p. 17. t. 6. f. 1. 2. Hab. in Brasilia. Forte una ex sequentibus huc pertinet.

13. *aurantiaca*, panic. subspicata, cal. valvula exteriore maxima aurantia. Cav. ic. 5. p. 46. t. 472. f. 1. Lam. enc. 4. p. 70. Hab. in vicinis Montevideo in Amer. Fol. subvillosa.

14. *violacea*, panic. subspicata secunda, cor. violaceis ciliatis, calyc. valvula exteriore argentea apice denticulata. Cav. l. c. Hab. in regno Chilensi. Priori affinis.

15. *rigida*, panic. subspicata secunda, cal. corollis aequali: harum valv. altera ciliata. Cav. ic. 5. p. 47. t. 472. f. 1. Cresc. in Montevideo. Fol. superioris vagina spathaeformis; ligula multifida. Cav.

16. *altissima*, panic. coarctata spicaeformi, petal. imberbibus. Willd. spec.

p. 385. Gmel. sibir. 1. p. 98. t. 20. Hab. in Sibiria. Flosculi majusculi oblongi pallidi.

17. *interrupta*, spica elongata interrupta flosculis oblongis linearibus coloratis imberbibus. In hortis subinde colitur.

150. *HOLCUS*. Flor. (polygam.) paniculati. Cal. 2-florus, 2-valvis, (opacus, nervosus). Cor. minor: valv. altera aristata. Nectar. lineare, 2-partitum. Sigm. subsessilia.

1. *lanatus*, glumis villosis mucronatis, flor. masculis arista incurva, fol. vaginis tumida villosa. Lin. Leers t. 7. f. 6. Schreb. grain. t. 20 f. 1. Hab. ubique in pratis. Rad. fibrosa. Glumae calycinae mucroni longiusculo distinctae.

2. *mollis*, subglabra, rad. repente, glum. nudiusculis, arista geniculata exserta. Lin. Smilh. angl. 1. p. 89. Schreb. l. c. f. 2. Curt. Lond. ic. Hab. in arvis et nemorosis. Panic. subflavescentes demum. Flor. omnes herma phroditi.

Obs. Reliquas Linnaei species, quarum descriptiones vide apud Reichard, Sys. pl. 4. p. 307-309, omisi, cum nesciam an jure sub hoc militent genere: fort pleraeque Aitae sunt. *Sorghis* species vid infra.

151. *PHALARIS*. Cal. 1-florus, 2-valvis: valvulis subovatis dors. membranaceo-carinatis, ant. lan. cecolatis, aequalibus, nervosis. Cor. inclusa, 2-valvis, basi pilos. (sarpinus.)

1. *arundinacea*, panicula oblonga vel tritica coarctata, glumis acuminatis. L. Arundo colorata. Aiton. Willd. Spec. p. 457. Hab. in pra. is-humidis et ad ripa. In hortis colitur var. fol. lineis albis pict. Semina nitida. Holcum refert.

2. *canariensis*, panic. spiciformi ovata glumis calycinis navicularibus integris, cor. 4-valvi: valvulis exterioribus lanceola glabris, interioribus villosis. Act. Kew. p. 85. Willd. Sp. 1. p. 326. Schreb. t. 10. 2. Hab. in Canariis inter segetes, hinc in in Europa colitur. ☉

3. *aquatica*, spica cylindrica glum. navicularibus denticulatis, cor. 3-valv. valvulis interiorib. villosis: exteriore nuda subulata. Act. l. c. p. 86. Ph. mini. Retz. Obs. 3. p. 8. Barr. rar. t. 700. f. 1. Ha. in Aegypto et ad Tiberim.

4. *sativa*, spica cylindrica, glumis

rinatis glabris margine membranaceis. P. *Bellardi*. Willd. in N. Act. berol. v. 3. p. 3. *Bulbosa*. Lin. Hab. in Italia, Oriente et etiam his in locis quasi sponte. Pro avicularum canariensium nutrimento in nonnullis regionibus collitur, et in Europam deportatur, cfr. Desf. Atl. 1. p. Rad. in paucissimis bulbosa seu fibrosa.

5. *tuberosa*, spica mutica subcylindrica glumis apice crenatis, culmo basi globoso-tuberoso. Ph. *bulbosa*. Cav. ic. 1. p. 46. t. 64. Hab. in Hispania. Culm. basi bulbis saepe tribus globosis, concatenatis. C.

6. *capensis*, panic. spicata ovata, glum. integris, culmo geniculato decumbente. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei.

7. *arenaria*, spica obovata, glumis cal. integerrimis ciliatis, vagin. ventricosa. Phleum spica ovata ciliata, caule ramoso. Lin. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 8. Crypsis. Desf. Atlant. 1. p. 61. Hab. in Europae et Barbar. arenosis. Cal. cor. multo major glumis lanceolatis. ☉

8. *alpina*, panic. cylindrica spiciformi, glumis calycinis mucronatis carinatis. dorso ciliatis. Willd. l. c. Hab. in alpinis.

9. *paradoxa*, panic. mutica oblonga spiciformi, glumis calycinis navicularibus unidentatis, corolla bivalvi glabra, flosc. infimis praemorsis. Ait. l. c. Linn. fil. dec. 35. t. 18. Schreb. gram. t. 12. Ph. praemorsa. Lam. ill. p. 164. Hab. in Oriente et Lusitania.

10. *cruciformis*, panicul. secunda linear. cal. 1-2 floris. Lin. Cynosurus cruciformis. Ait. Willd. Sp. 1. p. 412. Barr. rar. t. 29. Gmel. sib. 1. t. 29. Hab. in Europa australi, Sibiria et ad fretum Hudsonis.

11. *villosa*, panic. multiflora stricta, flor. obovatis villosis. Michaux Flor. p. 43. In sylvis Carolinae. Habitu recedit.

152. **CRYPISIS**. Cal. 2-valvis. Cor. 2-valvis, longior. Stam. 2-3. Spica folior. vagina involucreta; seu flor. in capitulum foliatum congestis.

1. *aculeata*, caule ramosissimo, spic. capitato - hemisphaericis, fol. vaginentibus brevibus pungentibus cinctis. Willd. Spec. p. 158. Lam. ill. gen. 1. p. 166. t. 42. f. 2. Anthoxanth. aculeatum. L. Moris. hist. 3. p. 196. s. 8. t. 5. f. 3. Hab. in Europae australis locis petrosis glareosis, etiam in Barbaria. ☉

2. *Schoenoides*, spic. ovatis vagina fo-

liacea cinctis, caul. romoso procumbente. Lam. l. c. f. 1. Phleum schoenoides. L. Jacq. Fl. austr. app. t. 7. Spartina phleoides. Rot. h. N. Bot. Beytr. 3. p. 101. Hab. in Italia, Gall. australi, Hisp. et Smyrnae Antecedente dimidio fere major. ♂

153. **PHLEUM**. Cal. (induratus) 2-valvis: valv. linearibus, apice retuso seu carina prominente utrinque bicuspidato. Cor. inclusa. (Flor. spicati.)

* *Spica composita.*

1. *Phalaris*, spica composita cylindrica, glumis ciliatis carinatis mollioribus. Phalaris *phleoides* L. Flor. dan. t. 531. Engl. bot. t. 459. Hab. in versuris agrorum. Cal. minus retuso et teneriore Phalaridi affine. ☉

2. *asperum*, spica composita cylindrica, cal. gibbo aspero. Villars dauph. 2. p. 61. t. 2. f. 4. Ph. *viride*. Allioni. Phalaris. Reitz. Willd. Sp. 1. p. 328. Hab. in Europa australi. Cal. subcartilagineus, fere glaber. ☉

3. *dentatum*, spic. subpaniculata cylindrica, glumis serratis, culm. geniculato. Thunb. prod. p. 19. Lin. suppl. p. 106. sub Phalar. Hab. ad Cap. b. spei. Glum. carina cartilaginea dentata: dentib. globosis. ☉

** *Spica simplic.*

4. *pratense*, spica cylindrica ciliata elongata, culmo erecto. Lin. Leers. Herb. t. 3. f. 1. Schreb. gram. t. 14. Hab. in pratis, ad versuras. ☿

5. *alpinum*, spica villosa ovato-cylindrica. L. P. spicis ovatis hirsutis, locustis longe bicornibus. Hall. helv. n. 1569. Hab. in alpinis. Spica nigrescens s. atro-purpurea.

6. *Gerardi*, spica subrotunda, glumis ciliatis, culmo simplici, vaginis ventricosis. Gerard prov. 78. n. 4. Jacq. ic. rar. 2. t. 301. Hab. in summis alpinis Europae austral. Stylus unicus? cfr. Jacq. ic. 301

7. *nodosum*, spica subcylindrica parva, culm. fide: endente, fol. obliquis radice bulbosa. Flor. dan. t. 380. Leers t. 3. f. 2. Gram. nodosum, spica parva. Bauh. Hab. in collib. graminosis. Spica glabra.

154. **ALOPICURUS**. Spica. Cal. 2-valvis. Cor. 1-valvis, basi aristata, aut mutica.

1. *bulbosus*, culmo erecto, spica cylindrica, radice bulbosa. Gouan. monsp. 37. Willd. Sp. 1. p. 356. A culmo erecto,

spica simplicissima attenuata, glum. calycinis distinctis (nec basi connatis.) Smith Flor. brit. 1. p. 73. Barr. ic. 699. f. 1. Hab. in Galliae, Angliae pratis. $\overline{\text{T}}$

2. *pratensis*, culmo erecto, glumis villosis, cor. muticis. Hab. in Europae pratis. $\overline{\text{T}}$

3. *capensis*, spica cylindrica, glumis glabris muticis. Thunb. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spei.

4. *antarcticus*, culm. erecto, spica ovata, glumis hirsutis, cor. aristatis: aristis cal. longioribus. Vahl. symbol. 2. p. 18. Hab. ad fretum Magellanicum.

5. *agrestis*, culm. erecto, spica cylindrica (purpurascens) glum. laevib. Less. t. 2. f. 5. Schreb. gram. 140. t. 19. f. 2. Hab. in agris. $\overline{\text{T}}$

6. *subaristatus*, culm. erecto, glumis ovalibus obtusis, arista vix exserta. Mich. Flor. amer. 1. p. 43. Hab. in Canadae paludosis.

7. *geniculatus*, culm. spicato infracto, cor. muticis. Less. t. 2. f. 7. Roth. germ. 2. p. 78. Hab. in uliginosis. $\overline{\text{T}}$

8. *echinatus*, panic. spicata ovata, glum. punctatis ciliatis, culmo geniculato. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei.

9. *utriculata*, spica ovata, valv. calycinis compressis subcallosis, carina pilosis, arista articulata, fol. vag. superne utriculata. Phalaris utriculata. Lin. Scop. delict. insubr. t. 12. Tozzettia pratensis. Savi in act. ital. v. 8. p. 47. Hab. in Anglia; praesertim vero in Italia in pratis Mediolanensib. et Ticinensibus quae Martiae vocantur. Scop. An distincti generis cum sequente?

10. *ventricosa*, elongata, spica cylindrica, glumis villosis, cor. aristatis, vagina ventricosa. Hab. in Gallia. Phal. *utriculata* quorundam. Cor. uniglumis uti in priore. A. *pratensi* affinis.

155. **POLYPOGON.** Cal. 2-valvis; aristatus, uniflorus. Cor. 2-valvis: valvula exteriori aristata.

1. *monspeliense*, (*crinitum*), panicula coarctata subspicata, calycib. subpubescentibus margine ciliatis. Willd. in Act. nov. Soc. Nat. Berolin. vol. 3. Desf. atl. 1. p. 67. Alopecurus Lin. Phaeum crinitum. Schreb. gram. t. 20. f. 3. Smith. Flor. brit. 1. p. 71. β . *panicum*. Alopecurus, minor, glumis villosis Lin.

syst. veg. Barrel Ic. t. 115. f. 1. Hab. in Galliae et Angliae maritimis.

2. *maritimum*, panicula coarctata subspicata ovata, cal. hirsutis margine ciliatis, culmo geniculato. Willd. l. c. Hab. ad oras maris circa Rochelle. Bompland.

3. *vaginatum*, panic. coarctata subspicata ovata, val. villosis, vaginis inflatis. Willd. l. c. Alopecurus. Pallas in Nov. Act. Petropol. 10. p. 304. Cresc. in Tauria, locis siccis.

4. *fasciculatum*, panic. subracemosa, cal. valvula exteriori longissime aristata, inferiore mucronata. Willd. l. c. (*P. subspicatum*). Chaeturus fasciculatus. Link in Schrad. Bot. Journ. 1793. 2. p. 313. Crescit in Estremadura Hispaniae, in agris.

156. **CHRYSURUS.** Flor. spicato-racemosi. Spiculae bifformes: steriles pendulae muticae multivalves ad basin fertilium involucrium mentientes; *fertilium Cal.* 2-valvis, 2-3-florus. Cor. 2-valvis: valvula exteriori longe aristata.

1. *Cynosuroides*. Cynosurus aureus. Lin. Willd. 1. p. 418. Koeler gram. p. 377. Barr. rar. t. 4. Hab. in Europa australi ad rupes, Barbaria et in Oriente. Spic. densa, flavo-virens.

157. **PANICUM.** Inflor. var. Cor. 3-valvis: valvula tertia dorsali minima. Cor. 2-valvis.

* *Spicata.*

1. *polystachyon*, spicis teretibus, involuclis unifloris fasciculato-setosis, culmis erectis superne ramosis. Lin. Willd. Sp. p. 333. Hab. in India et Aegypto. P. glauco similis. Stigm. sanguinea. σ

2. *purpureum*, spic. tereti, involucl. 1-2-setis inaequalib. flosculo majoribus 1-floris, culmo tereti ramoso. Flor. Per. 1. p. 48. Hab. in praeruptis Tarmae. Stigm. plumos., purpureum.

3. *sericeum*, spica tereti, involucl. setaceis villosis unifloris longitudine flosculorum, fol. planis. Ait. Kew. 1. p. 88. In Ind. occidentali. \odot

4. *verticillatum*, spica verticillata, racemulis quaternis, involucl. unifloris bisetis, culm. diffusis L. Roth. germ. 2. p. 60. Curt. Lond. ic. Hab. in Europa australi et Oriente. \odot

5. *helvolum*,

5. *helvolum*, spica tereti, involuclis unifloris fasciculato-setosis, seminibus nervosis. Lin. suppl. 107. Hab. in India orientali. Simillimum P. glauco. Culm. sespedalis, ramosus. Folia versus basin pilis albis, patentibus. ☉

6. *glaucom*, culm. basi decumbente, spica subovata tereti, involuc. l. floris fasciculato-pilosis, seminibus undulato-rugosis. Leers. t. 2. f. 2. Schreb. gram. t. 25. *β. elongatum*. culm. longiore erecto. Hab. in agris post messem frequens; etiam in India. *β. ex America*. Pedunc. sulcatus, spica lutescens. ☉

7. *viride*, spica cylindrica, involuclis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. Leers. t. 2. f. 2. Flor. dan. t. 852. Cum priore.

8. *germanicum*, spica composita coarctata, spiculis glomeratis, involuclis setaceis flore longioribus, rachi hirsuta. Willd. spica composita ovata, setis brevioribus, pedunculo hirsuto. Roth. germ. I. p. 27. II. p. 71. Hab. in Europa australi. ☉

9. *italicum*, spica composita basi interrupta nutante, spiculis glomeratis, involuclis setaceis, flore multo longioribus, rachi tomentosa. Willd. Sp. t. p. 336. Rumph. amb. 5. t. 75. f. 2. Hab. in India et Europ. australi.

10. *setosum*, spica composita, spiculis paniculato-fasciculatis, setis flosculis immixtis longissimis, pedunculis subglabris. Swartz. prol. 22. Flor. ind. occid. p. 139. Hab. in Jamaicae montosis fruticetis.

11. *lanceolatum*, spic. alternis, calyc. valvula extrema ciliata aristata, fol. lanceol. Retz. obs. 5. p. 17. Hab. in India.

12. *stagninum*, spic. secundis alternis, calycib. bifloris aristatis hispidis. Retz. obs. 5. p. 17. Hab. in stagnis Indiae orientalis.

13. *crus corvi*, spic. alternis secundis spiculis subdivisis, glumis subaristatis hispidis, rachi trigona. Sp. plant. 84. Hab. in India. Sequente tenerius. Aristae longae.

14. *crus galli*, spic. alternis conjugatisque secundis, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari. Leers. herb. n. 41. t. 2. f. 3. Curt. lond. ic. Hab. in Europae, et Virginiae cultis. Var. aristis subnullis. ☉

15. *muricatum*, humifusum, glumis turgidis, muricato-hispidis. Michaux Flor. p. 47. Hab. in Canada ad ripas. Cenchrum referit.

16. *setigerum*, spic. remotis, flore secundis, racheos dentibus setigeris. Hab. in China.

17. *colonum*, spic. alternis secundis muticis ovatis scabris, rachi teretiuscula. Lin. Vahl. symbol. 1. p. 9. Pluck. alm. 174. t. 189. f. 5. Ehret. pict. t. 5. f. 3. Hab. in Indiae culis. Spiculae sessiles absque fasciculis pilosis. ☉

18. *fluitans*, spic. alternis sessilibus secundis, valv. calycina tertia minuta. Willd. Sp. p. 338. Retz. obs. 3. p. 8. et 5. p. 13. Vahl. symbol. 1. p. 8. Pluk. Am. 110. t. 417. f. 7. In Madagascar, Arabia, India.

19. *brizoides*, spic. alternis sessilibus secundis, valv. calycinis binis corolla multo brevioribus retusis tertia longitudine corollae. Willd. l. c. Retz. obs. 5. p. 18. Pluck. alm. 174. t. 191. f. 1. Hab. in India. Obs. An. cum priore potius ad Digitarias pertinet?

20. *paspalodes*, spic. alternis muticis appressis sessilibus, glum. ovatis mucronatis glaberrimis. Pan. Brizoides. Lam. l. c. Hab. in India.

21. *granulare*, spic. alternis muticis, erectis sessilibus, glum. laevibus subglobosis, culm. ramoso. Lam. ill. gen. p. 170. Hab. in Insula Franciae.

22. *flavidum*, culm. folioso, spicul. remotis sessilibus appressis secundis paucifloris. Retz. obs. 4. p. 15. Hab. in Zeylona Antecedenti affine.

23. *dimidiatum*, spic. dimidiato-secunda, spiculis quinquefloris, rachi excavatae alterne appressis. Retz. obs. 6. p. 23. Lin. Syst. veg. 13. p. 50. Burm. ind. 25. t. 8. f. 5. Hab. in India. Spiculae flosculis 5: cal. singuli flosculi lanceolatus: valvula extrema minuta obtusa L.

24. *pilosum*, spic. paniculatis alternis secundis, spiculis geminis, altero minore, acuminatis laevibus, rachi compressa pilosa, culmo divaricato geniculato. Swartz. prod. 22. Ej. Flor. p. 141. In Jamaicae pascuus sylvis.

25. *molle*, spic. paniculatis alternis secundis patentibus, spiculis approximatis pedicellatis secundis muticis, culm. ascendente, fol. villosis. Swartz. flor. p. 143. In pratis Jamaicae fertiliorib. Culmi quasi succulenti. Sw.

26. *fasciculatum*, spic. paniculatis alternis erectis subfastigiatis, spiculis secundis subrotundis. Swartz. prod. 22. Ej. Flor. p. 145. Hab. in Jamaica, gram. depressis

27. *scabrum*, spic. alternis, crassis subsecundis scabris, glumis aristatis hispidis, rachi tuberculata. Lam. ill. p. 171. Hab. in Senegal.

28. *barbatum*, spic. alternis subdivisis, glumis glabris striatis subaristatis : rachi vaginisque fol. barbatis. Lam. l. c. In Insula Franciae.

29. *pyramidale*, spic. alternis numerosis pyramidatis, glumis mucicis sublaevibus, fol. glaucis. Lam. l. c. Hab. in Senegal et in America occident.

30. *plicatum*, spic. alternis remotis mucicis brevibus, cor. rugosis, fol. plicato-sulcatis. Lam. l. c. In Insul. Franciae?

31. *chartagenense*, spic. paniculatis, fol. brevioribus, spiculis secundis ovatis acutis, culm. prostrato-ramosiss. vag. pubescentibus. Swartz. Flor. t. p. 148. Hab. in America meridionali, Chartagena. $\overline{\text{T}}$

32. *conglomeratum*, spic. secunda subovata flosc. obtusis. Mant. 524. *indicum* racemo spicato simplici, culmo filiformi repente ramosissimo. Mant. 184. Retz. obs. 3. p. 9. Hab. ad villas et plateas Indiae orientalis. Racem. terminalis, pedunculatus, subspicatus, folio brevior, stig. plumos., magnitudine totius floris.

33. *interruptum*, spic. simplici interrupta, spiculis bifloris pedicellatis nudis. Willd. sp. p. 341. *P. caudatum*. Thunb. prod. 19? Hab. in Indiae stagnis. Nodi culmi nigri. Fol. longa linearia. Spica simplicissima, pedalis. Pedunc. uniflor. Willd.

** *Spic. composita, spicul. compressis secundis.*

34. *hirtellum* (undulatifolium), culm. repente, foliis latiusculis undulatis, spica composita : spicul. appressis alternis, cal. geminis : valv. omnibus aristatis : extima longissima. Lin. Amaen. acad. 5. p. 391. Wulf. et Jacq. Coll. t. p. 263-264. Allion. Pedum. 2. p. 270. *P. undulatifolium*. Arduin. spec. 2. t. 4. Hab. in India, Austria. infer. et Italia.

35. *setarium*, spic. alternis brevissimis subtrifloris sessilibus, cal. aristatis : extima singissima. Lam. ill. p. 170. In Amer. meridionali.

36. *bromoides*, spic. alternis sessilibus, cal. aristatis, involu. setosis : fol. brevibus. Lam. l. c. Hab. in Insul. Franciae.

37. *cespitosum*, spic. alternis erectis, spicul. secundis ovatis, culm. subramoso repente, ramis diffusis filiformibus, fol. ovato-

lanceolatis. Sw. Flor. Ind. occid. t. p. 146. Hab. in pascuis sicciorib. Jamaicae.

38. *loliaceum*, spic. secundis alternis longis sessilibus, flor. distichis geminis remotis, cal. aristatis. Lam. ill. p. 170. In India.

39. *compositum*, culm. repente, spica composita, spiculis linearibus secundis flosc. geminis remotis, calycibus aristatis. L. Willd. sp. p. 346. Fl. zeyl. 42. Houltuyn. t. 50. f. 1. Hab. in Zeylona. Spiculae 4. s. 5. alternae, rachi adpressae, unilaterales.

40. *elatius*, culmo erecto, spica composita, spiculis oblongis sparsis adpressis, flosculis confertis, calycibus mucronato-aristatis. Linn. suppl. 107. Habit. in Malabaria. \odot Spiculae 12 in orani latere racheos, nec secundae.

*** *Paniculata.*

41. *dichotomum*, paniculis simplicibus, culmo ramoso dichotomo. L. Gron. Habit. in Virginia. Refert arbusculum.

42. *ramosum*, panicula ramis simplicibus, flor. subternis : inferiore subessili, culmo ramoso. Mant. 29. Hab. in utraque India. Fol. margine fauceque ciliata.

43. *deustum*, panicula patenti, flor. solitariis, glumis glabris epice purpureis. Thunb. prod. 13. Hab. ad Cap. b. spei.

44. *coloratum*, panic. patente, staminibus pistillisque coloratis, culmo ramoso, ram. filiformibus. Mant. 30. Jacq. Misc. v. 2. p. 365. Icon. rar. t. 12. Hab. Cairi. Antherae croceae et Pistilla saturate violacea.

45. *repens*, panic. virgata fol. divaricatis, culm. basi repente. L. Willd. p. 347. Cav. ic. t. 110. Desf. Atl. t. p. 60. In India Barbaria et Hispania. \odot Fol. inferiora, undique caulam vaginis pubesc. vestientia patentissima.

46. *numidianum*, culm. erecto, flor. paniculato-racemosis secundis geminis : altero sessili. Desf. l. c. t. 11. Lam. ill. n. 502. Hab. i rope la Calle in arenis humidis.

47. *ischaemoides*, panic. erecta contracta, calycibus bifloris polygamis acutis, culmo simplicis, fol. distichis rigidis. Retz. obs. 4. p. 17. Hab. in Malabariae locis udis.

48. *remotum*, panic. ramis triquetris, flosc. subgeminatis, altero pedicellato, culmo ramoso tetragono-compresso. Retz. l. c. In India orientali.

49. *aristatum*, culmo repente radican-

te; panic. ramis indivisis, flosc. linis sessilibus aristatis. Retz. l. c. Hab. in China.

50. *Milium (miliaceum)* L., panic. laxa flaccida, fol. vaginis hirtis, glumis mucronatis nervosis. Hab. in India; nunc ubique colitur. ☉

51. *lance*, panic. laxa subflaccida, glum. oblongis laevibus, fol. vaginis glabris. Lam. ill. gen. 1. p. 172. Hab. ad St. Domingo. Cal. interdum 4 valvis.

52. *miliare*, panic. laxa subflaccida, glum. subconfertis acutis striatis, vaginis glabris. Lam. l. c. p. 173. In India.

53. *antidotale*, panic. nutante, calycib. bifloris polygamis acutis, culmo erecto ramosissimo. Retz. obs. 4. p. 17.

54. *notatum*, panic. patente: axillis notatis, fol. lanceolatis ciliatis. Retz. obs. 4. p. 18. In Sumatra.

55. *muricatum*, panic. patente, flor. solitariis muricatis, culmo radicante adscendente. Retz. l. c. Hab. in India.

56. *capillare*, panic. capillari ramosissima patente, flor. minutis; pedunc. strictis, calyc. acuminatis laevibus, vaginis hirsutissimis. Retz. obs. 3. p. 9. Lin. Syst. veg. 106. Michaux Flor. p. 48. Habit. in Virginia, Pennsylvania, Jamaica. Simile Poae capillari, sed totum hirsutum. ☉

57. *capillaceum (filamentosum)*, panic. capillacea patente, glumis obtusis minimis, fol. latis basi vaginisque ciliatis. Lam. ill. p. 173. Sloan. t. 72. f. 3. Cal. 1-florus. Lam.

58. *tenellum*, glaberrimum, panicul. parva patente, glum. obtusis curvatis, culm. ramoso filiformi. Lam. l. c. Hab. in Sierra Leona. Cal. valv. aequales. Lam.

59. *flexuosum*, panic. capillari patente, pedunculis flexuosis, calycibus ovatis, geniculorum barba retorsa. Retz. l. c. Hab. in India. Var. glabra. Retz. obs. 4. p. 16.

60. *grossarium*, panic. ramis simplicibus, flor. geminis pedicello altero brevissimo, altero longitudine floris, culm. erecto. Amoen. acad. 5. p. 392. Hab. in Jamaica.

61. *maximum*, panic. ramis simplicibus pedunculis capillacis adpressis divel trifloris, fol. lineari-lanceolatis, culmo erecto. Jac. ic. rar. 1. t. 13. Collect. 1. p. 76. Hab. in insula Guadeloupe. Stigm. plumosa purpurea. ¶

62. *hirsutum*, panic. composita capillari patente, culm. vaginisque setoso-hirsutis, fol. lanceolatis acuminatis nervosis strictis. Sw. Flor. Ind. occident. l. p. 173.

Hab. in Jamaicae et Hispaniolae graminosis. Priori affue.

63. *jumentorum*, panic. composita capillari patente, flosc. polygamis, ramis racemosis, nodis articulorum hirsutis. P. *polygamum*. Swartz. prodr. p. 24. Frequens ad animalia domestica nutrienda in Amer. meridionali colitur. Genuinus locus natalis est Africa septentr. inde ab incolis *Guinea-Gras* nuncupatur. A. P. maximo. Jacq. diversum.

64. *nemosum*, panic. simplici, ramis distantibus erectis flosc. remotis sparsis ovatis acuminatis; culmo decumbente geniculato, vaginis colloque pilosis. Sw. prodr. 22. In Jamaica, Domingo, nemorib. montosis.

65. *acuminatum*, panic. simplicib. fol. brevioribus, ramis capillaribus diffusis, spiculis remotis obovatis, culmo decumbente geniculato ramoso, fol. lanceolato-subulatis erectis, vaginis villosis. Swartz. prodr. 23. ej. Fl. p. 150. In Jamaicae montosis, campis arenosis. Stigm. villosa atropurpurea.

66. *rigens*, panic. simplici rigida patente, culmo ramoso decumbente, fol. horizontalibus scabris. Swartz. l. c. Ej. Flor. p. 154. Hab. in Jamaica.

67. *fusum*, panic. simplici, ramis erectis, flosc. secundis geminis, altero brevius, pedicellato, cumulo erecto subdiviso, fol. lato-lanceolatis. Swartz l. c. Ej. Flor. p. 156. Hab. in Jamaicae graminosis uliginosis. P. carthagenensi simile. S.

68. *laxum*, panic. simplici nutante, ramis capillaribus, spiculis approximatis alternis adpressis, culmo simplici filiformi flaccido, fol. lineari-lanceolato. Swartz. l. c. Ej. Flor. p. 157. Hab. in Jamaica, nemorib. aridis. Sub fine anni flor. Sw.

69. *latifolium*, panic. racemis lateralibus, simplicibus, fol. ovato-lanceolatis collo pilosis. Moris. s. 8. t. 5. f. 4. Hab. in America boreali, in pratis sylvaticis. ¶

70. *flavescens*, panic. simplici erecta stricta, ramis subfastigiatis, infimis oppositis, spiculis approximatis secundis, pedicellis bifloris. Swartz. Flor. p. 158. In Jamaicae austral. aridis variis.

71. *diffusum*, panic. simpliciuscula capillari patente, spiculis distantibus, culmo decumbente simplici, fol. linearibus, collo pilosis. Swartz 23. Flor. p. 160. Hab. in Jamaicae graminosis siccis. Vulgare. P. *rejuncta*. affin. l. S.

72. *Oryzoides*, panic. subsimplici, ramis

erectis, flosc. remotiusculis ovatis acutis, culmo erecto indiviso, fol. lato-lanceolatis basi rotundatis, vaginis sulcato-striatis. Sw. Flor. p. 167. In Jamaica, nemoros. montosis. Spiculae maximae.

73. *clandestinum*, racemis occultatis in foliorum vaginis. Hab. in Pensylvania. $\overline{\text{L}}$

74. *arborescens*, panic. ramosissima, fol. ovato-oblongis acuminate. Lin. Habit. in India. h

75. *glutinosum*, panic. composita patente, ramis flexuosis, glum. ovatis viscosis, majusculis, culm. subramoso. Lam. ill. gen. p. 174. t. 43. f. 3. fol. lato-lanceolatis Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 174. Hab. in Amer. meridion.

76. *curvatum*, panic. racemosa, glumis curvatis obtusis nervosis Lin. Syst. Nat. 12. p. 730. Hab. in India orientali. Culmi filiformes, folia lanceolata. Fructescentes calyces evadere triplo majores, multisulcati, purpurascens. L.

77. *virgatum*, panic. virgata, glumis acuminatis laevibus : extima deliscente, fol. longissimis planis. Sp. pl. 87. Michaux p. 48. Habit. in Virginia ad ripas fluviorum. $\overline{\text{L}}$ Gramen altissimum.

78. *patens*, panic. oblonga flexuosa capillari patente, calycib. bifloris, fol. linearilanceolatis, culm. radicante. Habit. in India.

79. *trigonum*, panic. erecta, pedunc. bifloris. calycib. obtusis hispidis unifloris, seminibus trigonis. Retz. obs. 3. p. 9. P. patens. Burm. Ind. 26. t. 10. f. 2. Hab. in Ind.

80. *pallens*, panic. composita ovata, ramis confertis erectis, spiculis ovatis subulatis, culm. subdiviso geniculato, fol. ovato-lanceolatis, vaginis collo margineque ciliatis. Swartz. prod. 23. Flor. p. 164. Apluda Zeugites. Aubl. gujan. 2. p. 333. In Jamaicae nemorosis. Fol. basi obliqua.

81. *anceps*, panic. interrupte racemosis, fol. longis : vagin. pilosis ancipitibus. Michaux l. c. In Carolinae herbosis humidis sylvaticis.

82. *scoparium*, villosum, fol. lanceolatis, panic. erecta ramosissima, pedunc. setaceis, glumis turgidis pubescentibus. Michaux p. 49. Hab. cum priore, in apricis caecitosis. \odot

83. *pubescens*, ramosissimum foliosum, subpubescens, fol. lanceolatis ciliatis, panic. minimis nudis, flor. subglobosis. Michaux. In herbosis sylvarum Carolinae.

84. *nitidum*, panic. capillari ramosissima, flor. minutis ovatis obtusis, fol. lanceolato-linearibus remotis. Michaux l. c. In Pensylvania et Carolina.

85. *barbatum*, parvulum, culm. gracili subramoso : nodis barbatis, fol. lanceolato-linearibus, panic. capillari parvula. Mich. Cum priore.

86. *ramulosum*, parvum, culm. gracili ramuloso geniculique glabris, panic. parva capillari, flor. ovatis obtusis minutis, fol. subtus pilis sparsis ciliatis. Mich. l. c. p. 50.

87. *melicarium*, caul. debili, fol. angustis, panic. contracta, glum. membranaceis lanceolatis subaequalibus, rudimento florum ciliatis. Michaux l. c. In Georgia et Carolina.

88. *lanatum*, panic. composita erecta glabra, spiculis ovatis, culmo ramoso, fol. ovato-lanceolatis pubescentibus, vaginis lanuginoso-hirsutis. Swartz. prod. 24. et Fl. p. 168. Hab. in Jamaicae subalpinis.

89. *arundinaceum*, panic. composita patente, ramis strictis capillaribus, spiculis subrotundis, culm. geniculato, fol. lanceolatis acuminatis rigidis. Swartz prod. 24. Hab. in Jamaica.

90. *radicans*, paniculatum, culmo ramoso radicante, fol. basi vaginisque longitudinaliter ciliatis. Retz. obs. 4. p. 18. Hab. in China.

91. *trichodes*, panic. ramosissima patente, ramis ramulisque subdivisis capillaribus, culmo declinato geniculato, foliis ovato-lanceolatis glaberrimis. Swartz Flor. p. 176. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 86. 115. t. 72. f. 3. Pluck. alm. 176. t. 189. f. 4. P. brevifolium. Lin. Willd. Sp. p. 353. cfr Sw. l. c. p. 178. Hab. in Jamaicae Hispaniolae subalpinis.

92. *divaricatum*, panic. brevibus muticis, culmo ramosissimo divaricatis : pedicellis bifloris : altero brevior. Amoen. acad. 5. p. 392. Hab. in Jamaica.

158. DIGITARIA. Cal. 2-3-valvis, concavus : valvula extrema minutissima, aut o secunda variabili, intima longitudine corollae. Cor. 2-valvis, oblongo-ovata, teres mutica. Styli longissimi. Nectar. fissum. Spicae digitatae, lineares : flor. geminatis : altero subsessili. (Richard.)

1. *sanguinalis*, culm. repentibus, flor. imbricatis, vaginis folisque papilloso-pilo-

sis. *Panic. sanguinale*. Lin. Willd. Sp. 1. p. 342. Schreb. gram. t. 16. Leers t. 2. f. 6. Curt. Lond. ic. Hab. in Europa australi et Amer. ☉

Obs. Var. fol. longis et brevibus sub-lanceolatis. Vix specie diversum est *Panicum* filiforme, quod idem videtur esse ac *Panic. debile*. Desf. Atl. 1. p. 59.

2. *humifusa*, ramosissima effusa tota glabra, spicis paucioribus subalternis. Hab. in arenosis circa Parisios. Rich. Priori similis, sed specie diversa.

3. *appressa*, spicis pluribus sessilibus alternis culmo adpressis, flor. ovatis acuminatis bifarctis. Lam. ill. 1. p. 196. sub *Paspalo*. Hab. in Amer. meridion.

4. *villosa*, culm. erectis, fol. vaginisque villosis, spic. plurib. setacis. Michx. Flor. Amer. bor. 1. p. 45. *Syntherisma villosa* Walter. Hab. in sabulosis sylvarum Carolinae.

5. *serotina*, culm. decumbente, fol. vaginisque villosis, spic. pluribus setacis, flor. binis minutis pedicellatis. Michaux p. 46. *Syntherisma* Walter. Gmel. Syst. N. Linn. 2. p. 154. Hab. in Carolinae graminosis humidis.

6. *umbrosa*, spicis subquaternis remotis, flosc. geminis inaequaliter pedicellatis, culm. repente flaccido. Retz. obs. 4. p. 16. Hab. in Indiae graminosis umbrosis. ☿

7. *ciliaris*, spicis subdigitatis approximatis (rectis filiformibus, rachi flexuosa, dentibus bifloris, flor. pedicellatis, valvula exteriore ciliata, culmo foliisque pilosis. Willd. Sp. 1. p. 344. sub *Panico*. Retz. obs. 4. p. 16. Hoffm. germ. 2. p. 31. Hab. in Java et China. ☉

8. *linearis*, spicis digitatis subquaternis linearibus, flosc. solitariis secundis muticis. Burm. ind. 25. t. 10. f. 3. (*Panicum*.) Hab. in Indiae. Culmi prostrati, laeves, ramosi.

9. *distachya*, spicis subternis secundis laevibus, fol. planis, brevibus margine scabris. Linn. Mant. p. 138. Lam. ill. t. 43. f. 2. In India orientali. Facies *Pasp. distichi*. Spic. saepius 3 et 4. Retz.

10. *paspalodes*, culm. repentibus, fol. vagin. collo villosis, spic. geminis basi subvillosis, rachi latiuscula. Michaux Flor. 1. p. 76. Hab. in Amer. bor. pascuis aridis.

11. *longiflora*, spic. duabus sessilibus erectis, flosc. ovali-oblongis, culm. adscendente ramoso. Willd. Sp. 1. p. 332. Retz. obs. 4. p. 18. Sub *Paspalo* Hab. in Malabarica et agrorum margines.

159. *CYNODON*. Cal. 2-valvis, patens, lanceolatus. Cor. major, 2-valvis: valv. exteriore maxima ovoides. Nect. truncatum. Spica digitata, florib. unica serie imbricatis, solitariis. (Richard.)

1. *Dactylon* (sarmentosum), spicis digitatis patentibus, basi interiore villosis, flor. solitariis, sarmentis repentibus. Linn. Montic. 99. Wither arrang. t. 21. sub *Panico*. Hab. in arenosis, etiam maritimis. Ex radice flura perennis sarmenta exerit longissima fol. vaginis cincta.

160. *TRACHYS*. Spic. digitata: flosc. in rachi membranacea 1-laterales; pedicellis pinnatis. Bract. s. involucrium ovatum cartilagineum. Cal. 1-florus, 2-valvis. Cor. 2-valvis.

1. *mucronata*. *Cenchrus mucronatus*. L. *Panicum squarrosum*. Retz. obs. 4. p. 15 et fasc. 5. t. 1. Willd. spec. 1. p. 545. Hab. in Malabaricae arenosis. Involuc. Retzii est pedicell. ramosus et cal. exterior, qui in *Panicis* minimus esse debet, revera involucri species. Flor. indurati. ☉

161. *LAPPAGO*. Cal. subtrivalvis muricata. Cor. 2-valvis, resupinata.

1. *racemosa*. Willd. sp. 1. p. 484. *Cenchrus racemosus*. Linn. *Tragus*. Hall. Schreb. gram. t. 41. Hab. in Europa australi, Arabia et utraque India. Spiculae semina Caulicidis referunt. ☉

162. *CERESIA*. Flosc. laterales bifarii sub *Rachi* lata membranacea cymbiformi. Cal. 2-valvis, 1-florus, lanatus.

1. *elegans*. *Paspalum membranaceum*. Lam. ill. gen. p. 177. t. 43. f. 2. Hab. in Peru. Rachi tenuis subhyalina, fuscescens. Anth. bifurcatae.

163. *PASPALUM*. Cal. 2-valvis, æqualis orbiculatus. Cor. ejusdem magnitudinis. Stigm. penicilliformia. Flor. 1-laterales.

1. *dissectum*, spicis alternis, rachi membranacea, floribus alternis apice pilosis. Linn. Willd. Sp. 1. p. 330. Pluck. mant. 94. t. 356. Houttuyn. t. 89. f. 2. Hab. in America calidiore. Gramen prostratum foliorum vaginis fere spathaceis. L. ☉

2. *scrobiculatum*, spicis alternis, rachi membranacea, floribus alternis, calycibus multinerviis extus scrobiculatis. Mant. 29. Houttuyn l. t. 89. f. 3. Hab. in India orientali. Culmi erecti, basi hirsuti, vagin. purpurascens, margine ciliata. $\overline{\text{T}}$

3. *villosam*, spicis alternis secundis: rachi hirsuta, flor. villosis duplici ordine, alternis secundis. Thunb. jap. 45. t. 8. Paspalum distichum. Houttuyn tab. 89. f. 4.

4. *virgatum*, spicul. paniculatis alterni basi villosis flor. geminis. Syst. Veg. 89. Jacq. Collect. 1. pag. 112. Gaertn. de fruct. 2. p. 1. t. 80 f. 1. Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 112. t. 69. f. 1. Hab. in Jamaica. $\overline{\text{T}}$

5. *floridanum*, erectum, fol. inferioribus pilosis, vaginis longissimis, spicis erectis, glum. biserialis suborbiculatis majusculis. Michaux Flor. 1. p. 44. Hab. in Florida et Georgia.

6. *plicatum*, erectum glabrum, spic. pluribus alternis erectis. glum. subtriseriatis ovatis (subrufescentibus), valv. plana margine plicatula. Michaux l. c. p. 45.

7. *strictum*, paniculato-polystachium, spicis approximatis, vaginis longis hirsutis, ligula villosa. Hab. in Insul. Antill. et ad St. Domingo. Gram. magnum.

8. *paniculatum*, spicis paniculatis verticillato-aggregatis. Sp. pl. 81. Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 115. t. 72. f. 2. Hab. in Jamaica. \odot

9. *stoloniferum*, spicis numerosis subverticillatis, rachi undulata, flor. alternis secundis: glumis plicato-crispis, caule geniculato, stolonifero. Willd. Sp. p. 331. P. *purpureum*. Flor. Per. 1. p. 48. Miliun *latifolium* Cav. ic. 3. p. 37. t. 273. P. *racemosum*. Jacq. ic. t. 302. Praestantissim. hoc pabulum s. onto inter segetes Limaec etc. crescit, ibique ter per annum metitur, quapropter in Europa propagari meretur. In locis calidioribus et maritimis per totum fere annum floret. Fl. Per.

10. *repens*, spicis paniculatis subverticillatis nutantibus, culmo repente. Berg. Act. helv. 7. p. 129. t. 7. Habit. in Surinamo. $\overline{\text{T}}$

11. *hirsutum*, spicis alternis subbinatis, rachi membranacea, calycibus multinerviis laevibus, fol. pedicellisque hirsutis. Retz. obs. 2. p. 7. Hab. in China.

12. *Kora*, spic. alternis subbinatis, rachi membranacea, calycib. subrotundis quinquenerviis, culmo foliisque glabris. Habit. in India.

13. *distichum*, spic. duabus erectiusculis

sub4-gonis, altera sessili, flosculis oblongis glabris, culmo adscendente, fol. planis? Sw. obs. 15. t. 2. f. 1. Hab. in Jamaicae graminosis subhumilis. Fol. involuto-subulata. σ

14. *conjugatum*, spic. duabus horizontalibus conjugatis, spicul. ovatis culmo erecto fol. involutis. Swartz prod. 21. Bergius Act. helv. 7. p. 129. t. 8. P. tenue. Gaertn. Hab. in Jamaica, Surinamo.

15. *vaginatam*, spic. duabus, spiculis bifloris acuminatis, culm. ramoso geniculato, geniculis vaginatis. Swartz prod. 21. Ej. Flor. 1. p. 135. Hab. in Jamaica.

16. *filiforme*, spica subsolitaria linearisecunda, spiculis ovatis compressis, culm. folisque filiformibus. Swartz prod. 22. Ej. Flor. p. 136. Hab. in Jamaicae campis. Vulgare.

17. *decumbens*, spica unica secunda, pedunculis longissimis, spiculis alternis orbiculato-acuminatis glabris, culmo procumbente. Swartz prod. 22. Flor. 1. p. 136. Hab. in Jamaicae campis apricis montosis.

164. CYNOSURUS. Cal. 2-valvis, multiflorus; Recept. proprium unilaterale, foliaceum, s. spiculæ bracteis subjectæ.

1. *cristatus*, bracteis pinnatifidis. Schreber gram. 69. t. 8. f. 1. Willd. Sp. p. 411. Hab. in Europæ pratis. $\overline{\text{T}}$

2. *effusus*, panic. laxa, bract. lanceolatis acutis, fol. planis. Link in Bot. Journ. 2 p. 315. Hab. in Lusitaniæ pratis.

3. *echinatus*, bracteis pinnato-paleaceis aristatis. Hab. in Europa australiori, Oriente. \odot Racemus glomeratus, secundus.

4. *paniculatus*, spica composita ovata, calyce multifloro, gluma altera mucronata, corollis basi pilosis. Thunb. prod. 23. Hab. in Cap. b. spei.

5. *Lima*, spica secunda, calycis gluma interiore spiculis subjecta. Loefl. it. 41. Cavan. ic. 1. p. 62. t. 91. Desf. Aul. t. 19. Habit. in Hispania et Barbaria.

6. *retroflexus*, spica composita, spicul. aggregatis, calycibus bifloris aristatis, flosc. muticis. Vahl symbol. 2. p. 20. Habit. in India orientali.

7. *Uniolæ*, spica solitaria disticho-secunda, cal. multifloro mucronata, cor. basi villosis. Thunb. prod. 23. ebracteatus, spica secunda, spiculis bifloris alternantibus adpressis ovatis carinatis obliquis. Lin. suppl. 110. Hab. ad Cap. b. spei. Facies Uniolæ,

And calyx bivalvis, nec multivalvis. Spica linearis. L.

Obs. An hujus generis una cum sequentibus?

8. *filiformis*, spica solitaria disticha, calycib. subulatis trifloris, flosculo sterili mutico. Vahl. symbol. 2. p. 20. Hab. in Ind.

9. *monostachyos*, spica terminali, calyc. subulatis subtrifloris, flosculis aristatis unilateralibus. Vahl. l. c. Cum priore.

10. *soccifolius*, spicis linearibus rectis, fol. conduplicatis, margine alterne barbatis. Vahl. symbol. 1. p. 10. Forsk. descr. 21. n. 73. Hab. in Arabia.

11. *elegans*, panic. ovata laxa, flor. fasciculatis, cal. valva altera aristata, bracteis setiformibus. Desf. Atl. 1. p. 82. t. 17. Hab. in Algeria.

165. ELEUSINE. Spicæ digitatæ. Flor. secundi, mutici. Cal. multiflorus. Cor. 2-valvis mutica. (Flor. omnes hermaphroditi.)

1. *corocana*, spicis incurvatis, culm. compresso erecto farcto, fol. suboppositis. Lin. sub Cynosuro. Schreb. gram. 2. p. 71. t. 35. Gaertn. 1. p. 8. t. 1. fig. 2. Rumph. t. 76. f. 2. Hab. in arenâ ad maris littora in Ind. ☉

2. *aegyptia*, spic. quaternis obtusis patentibus dimidiatis, cal. mucronatis, caul. repente. Lin. Willd. spec. 1. p. 416. E. *cruciata*. Lam. ill. t. 48. f. 2. Cum priore in Eriheria et in Aegypto. Spic. cruciatum dispositæ. ☉

3. *indica*, spic. digitatis strictis, spicul. subsexfloris, fol. vaginis compressis, collo piloso. Michaux. Flor. 1. p. 64. Cynosurus indicus. Lin. Hab. in India e America bor.

4. *mucronata*, spic. numerosis filiformibus paniculatis, spicul. minutissimis, cal. mucronato quadrifloro, flor. muticis. Mich. l. c. Hab. in cultis Illinoisensibus.

5. *domingensis*, panic. ramoso-digitata, ramis simplicibus, spiculis subquinqüefloris, flosc. aristatis. Jacq. ic. rar. 1. t. 22. Mich. 2. p. 363. Hab. in Jamaica, St Domingo. An cum sequente hujus generis?

6? *virgata*, spicis alternis gracilib., spicul. purpurascensibus subsexfloris aristatis: floscul. ultimis submuticis. Lam. ill. gen. p. 189. sub Festuca. Cynosurus. Lin. Willd. Sp. 1. p. 417. Sloan. Jam. 1. t. 70, f. 2.

7. *filiformis*, panic. ramosissima coarctata: ramis simplicibus filiformibus spiculis alternis (purpurascensibus) 2-4. floris mu-

ticis, vaginis subpilosis. Hab. in America meridion. Pila in vaginis e glandulis sub lente percipiendis proveniunt.

166. CHLORIS. Polygama. Spica ut plurimum digitata unilateralis. Cal. 2-valvis, 2-6-florus (flor. dissimilibus); valv. carinatae muticæ aut aristatæ.

1. *monostachya*, spica unica, spicul. subsexfloris, florib. aristatis margine barbatis, glum. calycis exteriori scrobilato-glandulosa dorso aristata. Michaux. Flor. amer. 1. p. 59. Hab. in sylv. Carol. inferioris. Sapor piperinus.

2? *villosa*, monostachya, culmo compresso, flor. dense spicatis, glumis cor. villosis, flor. omnibus aristatis. Tetrapogon villosum Desf. Atl. 2. p. 389. t. 255. In arenis prope Cassam.

3. *falcata*, spica subsolitaria falcata, calyc. quadrifloro, glumis cor. margine carinaque ciliato-villosis. Swartz in Nov. Act. Soc. Berol. 3. p. 159. t. 1. f. 1. Cynos. falcatus. Willd. sp. 1. p. 411. Hab. ad Cap. b. spec. ☉

4. *cruciata*, spic. subquaternis cruciatis, flosc. acuminatis. Swartz Prodr. p. 25. et Ejusd. Flor. 1. p. 192. Agrostis cruciata. L. Hab. in Jamaicae campis aridis.

5. *petraea*, spicis 4-6 strictis erectis, flosculis imbricatis subglabris muticis, glum. calycis exteriori aristata. culm. compresso. Swartz Flor. 1. p. 194. Cynos. paspaloides. Vahl. symb. 1. p. 21. t. 27. Cresc. in Jamaic. littorib. petraeis etiam ad Cap. b. sp.

6. *mucronata*, culm. repente, spic. plerumque 4: rachi triangulari mucronata, spic. subquadrifloris, glum. exteriori aristata. Michaux. Flor. l. c. Pluck. t. 300. f. 8. Cresc. in Carol. infer. cultis. ☉

7. *ciliata*, spiculis digitatis subquinis erectiusculis, glum. coroll. interioribus margine ciliatis. Swartz Flor. 1. p. 197. Andropogon pubescens. Ait. Hab. in aridi. Antillarum, Jamaicae. ☉

8. *penicillata*, spic. digitatis, cal. 4-floris dorso atistatis, petal. exterioribus hermaphroditis aristatis, penicillis barbatis. Vahl synb. 2. p. 21. sub Cynosuro. Hab. in India orientali.

9. *polydactyla*, spic. plurimis fasciculatus laxis, glum. interioribus ciliato-villosis. Swartz l. c. p. 196. Androp. polydactyl. Lin. Sloan. jam. p. 33. Hist. 1. p. 111. t. 65. f. 2. In Amer. australioris collib. gramin.

10. *barbata*, spic. plurimis fasciculatis laxiusculis, glum. barbatis: masculinis ventricosis aristatis. Sw. p. 200. Androp. barbatum. L.

11. *radiata*, spic. plurimis fasciculatis erectiusculis, flosc. subulatis glabris. Swartz p. 201. Agrostis radiata et Androp. fasciculatum. L. Cresc. frequens in Indiae orient. culcus.

12. *virgata*, spic. plurimis fasciculatis erectis, glum. exteriori aristata, interiore gibbosa ciliata; aristis longioribus. Swartz p. 203. Hab. in Antigua. Cal. distichis aristatis a priore differt. S.

13. *curtipendula*, culm. adscendente ramoso, spicul. plurimis brevibus distichis pendulis. Mich. Flor. 1. p. 59. In aridis regionis Illinoensis. Habitus recedit festuroides.

167. **DACTYLIS.** Cal. 2-valvis, compressus; altera valvula majore carinata. Spic. aggregatae et capitatae.

1. *cespitosa*, panicula ovata coarctata, undique spiculis imbricata. Forst. Comm. goett. vol. 9. p. 22. Willd. 1. p. 407. Hab. in Novi Anni iufulis.

2. *glomerata*, panic. secunda glomerata. Schreb. gram. t. 8. f. 2. Leers t. 3. Hab. in ruderalis, et sylvis.

3. *littoralis*, panic. spicata, culmo repente, fol. ramorum steriliu distichis: vaginis pilosis. Willd. l. c. 408. Poa littoralis. Vahl. symbol. 2. p. 19. Gouan. monsp. 470. Pluck. Alm. t. 33. f. 3. Hab. in maris littora Tergesti, Galliae australis, Hispan. et Sisarae Tuncet. Calycis valvulae sunt carinatae, inaequales, undecimflorae. W. T.

4. *laevis*, panic. coarctata, glum. laevibus. Thunb. prod. 22. D. capitata. Lin. sup. 110. Cap. b. spei. T.

5. *spicata*, panic. spicata cylindracea basi interrupta, corol. apice aristatis. Willd. in N. Act. Berol. v. 3. Pluck. phytog. t. 190. f. 6. In agris oryzaceis Malabaricae crescit.

6. *villosa*, panic. spicata, glumis villosis. Thunb. prod. 22. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *serrata*, panicula coarctata, glumis carina serrulatis. Thunb. prod. 22. Ad Cap. b. spei.

8. *ciliaris*, spic. capitata secunda, calycibus trifloris, caule repente. Mant. 185. Thunb. prod. p. 22. Caules articulati, radiculis longis albis. Hab. ad Cap. b. spei.

9. *hispida*, panicula spicata ovata nuda, calyce hispido, geniculis barbatis: Thunb. prod. 22. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *lagopoides*, spica subrotunda, cor. basi margineque villosis, pedunc. glabro, fol. margine hispidis culm. basi ramoso. Willd. in N. Act. Berol. 2. Lin. mant. p. 557. Burm. Ind. t. 12. f. 2. Hab. in Malabarica c. sequente.

11. *brevifolia*, spica globosa secunda, cor. pilosiusculis, pedunc. pubescente, fol. convolutis rigidis, culm. decumbente ramoso. Willd. l. c. et Ejusd. sp. 1. p. 410.

12. *repens*, culm. repente, ramis fasciculatis, fol. villosis subulatis rigidis, flor. spicato-capitatis secundis. Desf. Atlant. 1. p. 79. Hab. ad maris litora in deserto. T.

13. *pungens*, culm. erecto superne nudo, spicul. terminalibus sessilibus in capitulum congestis, involucri squamoso. Desf. l. c. p. 80. t. 16. Sesleria cehinata. Lam. ill. t. 147. f. 2. Hab. in arenis prope Mascara. Involuc. squamulis plurib. ovatis. Styl. 2. barbati. Desf. ☉

168. **POA.** Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula ovata mutica: valvulis margine scariosis (discoloribus.)

1. *aquatica*, altissima, panicula diffusa, spiculis sexfloris sessilibus in capitulum congestis, glumis nervosis obtusis. Moris. hist. 3. p. 201. s. 8. t. 6. f. 25. Hab. ad ripas fluviorum.

2. *domingensis*, alta, panic. ramosissima subcontracta, spiculis parvulis 4-floris, fol. lanceolatis longissimis. Hab. in arenosis maritimis ad St. Domingo. (Poiteau). 4-pedalis. Fol. basi subplicata.

3. *maritima*, panic. subsecunda disticha subcoarctata, spicul. 5-floris, floscul. obtusiusculis obsolete quinquenerviis, radice repente, fol. involutis. Smith. brit. 1. p. 97. Flor. dan. t. 251. Willd. sp. 396. Hab. in arenosis maritimis.

4. *distans*, panic. ramosa effusa, spicul. 5-floris, floscul. obtusiusculis distantibus obsolete 5-nerviis nitidis, fol. planiusculis. Lin. Willd. l. c. t. 1. p. 401. Smith. 96. P. *salina* Poll. P. *arenaria*. Lam. Aira *aquatica*. Schreb. Huds. P. *retroflexa* Curt. Hab. in pratis, locis salinis et ruderalis maritimis.

5. *divaricata*, panic. divaricata, pedicellis incrassatis, spicul. quadrifloris, fol. filiformib. Gouan. illustr. 4. t. 2. f. 1. Willd. 402. Hab. Mompellii et Marpurgi.

6. *bulbosa*, panic. subovata, spiculis 4-flor. subcordatis pubescentibus: glumis interioribus margine villosa ciliatis, culm. subnudo basi tuberoso. Gramen vernum, radice scalonica. Vaill. Bot. Paris. t. 17. f. 8. P. *trivialis* Koeler. Hab. primo vere, in graminosis colluciosis; colore plerumque fuscolubente.

7. *crispa*, elatior, spiculis glabris in foliola cornuta excrecentibus. Thuill. Paris. p. 45. Moris. t. 5. f. 14. Vill. delph. 2. p. 131. In sylvaticis, ad saepes. Primo intuitu a priorē diversa videtur.

8. *alpina*, panic. subovata, spicul. 6-floris cordatis, culmo basi crassiusculo, radice densa fibrosa P. *alpina*, spic. 3-floris apice retusis, valv. corol. exteriorib. ovatis pilosis interiorib. ciliatis. Braun. Flor. Salzbg. p. 67. Hab. in montosis, subalpinis. Var. quoque spicul. in folia excrec. seu viviparis.

9. *laxa*, panic. contracta subracemosa, spiculis trifloris, basi dorsoque pubescentibus, radice repente. Willd. p. 386. Haenke sudet. p. 118. Scheuchz. it. VI. p. 457. t. 6. f. 16. Hab. in alpihus Europ. Priori affinis.

10. *hirta*, panic. patula virgata, calycib. subtrifloris angulatis, vaginis punctato-ciliatis. Willd. 307. Hab. in Japonia.

11. *trivialis*, panic. subdiffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo scabro subcapite, ligula longa. Curt. Lond. ic. P. *pratensis* Leysser. P. dubia, vaginis folisque subtus scabris. Leers. t. 6. f. 5. P. *palustris* quorumd. P. *scabra*. Ehrh. Hab. in pascuis, ruderalis et humidis. Spic. atrovirentes. Fol. subtus scabra, passim cum vagin. laeviuscula.

12. *angustifolia*, panic. diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti laevi, fol. radicalib. filiformi-involutis. Lin. Willd. p. 387. Flor. suec. 77. St. Pollich. gal. Leers. t. 6. f. 3. Hoffm. germ. p. 43-44. Poa glabra. Ehrh. Hab. ad agrorum versuras et in muris, et pratis. Fol. caulium breve, latiusculum. ¶

13. *pratensis*, panic. diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti glabro, ligula brevi truncata, fol. planis. Curt. Lond. ic. Hab. in pratis et sylvaticis. Spic. 4-florae glum. 5-nerviis villo connexis. Smith, secundum quem antecedens hujus tantum varietas est.

14. *cilianensis*, panic. elongata ramosa flexuosa, spicul. quadrifloris glabris. Willd. l. c. p. 388. Allion. pedem. n. 2207. t. 91. f. 1. Barr. obs. 3. t. 743. In Italia. ¶

15. *caesia*, panic. diffusa, spic. ovatis quinquefloris, glum. lanceolatis subsericis

liberis, stipulis brevissimis obtusis. Smith. l. c. p. 103. P. *glauca*. Wither. arrang. p. 148. Hab. in Scotiae montosis. Herb. glauca; vag. striata, subscabra. S. ¶

16. *flexuosa*, panic. flexuosa, spic. trifloris, glumis ovatis basi villo connexis, ligula lanceolata caulium passim lacera. Smith l. c. p. 101. In Alib. scoticis. Glauca. Fol. supra scabra. -S.

17. *variegata*, fol. involutis, panicula oblonga contracta, spicul. 3-4-floris teretiusculis purpureo-raculosis. Lam. ill. 1. p. 182. P. *cinerea* Villars. Hab. in Arveniae et Delphinat. subalpinis. Fol. intus cinerea. V

18. *hydrophila*, panic. subattenuata, spiculis parvis subtrifloris apice lutescentibus, ligula elongata. Cresc. in aquosis. Huc pertinent P. *crocea*. Michaux et P. *palustris* quorumd. Fol. subscabra.

19. *debilis*, fol. longo-linearibus, panic. debili multiflora spicul. 3-4-flor. parvulis albido-viridulis. Thuill. Flor. Paris. Hab. in pratis. Uti et antecedens P. *nemoralis* affinis.

20. *palustris*, panic. diffusa, spicul. subtrifloris pubescentibus, fol. planis demum involutis subtus scabris. Hoffm. germ. ed. 2. p. 43. Willd. sp. 1. p. 397. P. *trivialis*. Leers t. 6. f. 2. Cresc. in humidis ad ripas. Gramen dubium. Spicul. spadiceo-purpureae, apice flavae. H.

21. *biflora*, panic. densa, cal. subbifloris glabris, culmo ascendente. Retz. obs. 5. p. 19. Hab. in India.

22. *nemoralis*, panic. attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culm. tenui, fol. patentibus, ligula brevissima. Leers. t. 5. f. 3. In nemorosis, ad rupes umbrosas.

23. *contracta*, panic. contracta, floscul. lanceolatis trifloris nudis sessilibus, fol. filiformibus. Retz. obs. 3. p. 11. Hab. in India.

24. *filiformis*, panic. patenti, spiculig acutis quadrifloris, fol. filiformibus. Thunb. prod. 21. Hab. in Cap. b. spei.

25. *lineata*, panic. debili pendula spicul. subquadrifloris, floscul. subdistantibus glabris manifeste striatis. P. *striata*. Michaux. Flor. 1. p. 69. Hab. in Amer. boreali. Glumae fere ut in P. ciliari L. transversae, obtusae.

26. *striata*, panic. diffusa capillari, spiculis glabris subquinqueflor. cor. exquisitè striatis. Lam. ill. gen. 1. p. 183. Hab. in Virginia. Cal. brevis. Cor. majuscula ovata.

27. *nervata*, panic. stricta, spiculis glabris quinquefloris nervosis. Willd. sp. 1. p. 389. Hab. in America boreali. Panic. fere

semipedalis, ramis capillaceis ramosis adpressis. W.

27. *trinervata*, panic. diffusa, spiculis subquinquefloris acutissimis scabris: corollae gluma exteriori tri-, interiori binervata. Schrad. spicil. p. 3. Willd. l. c. Ehrh. Beit. 6. p. 131. Poa sylvatica. Poll. palat. n. 87. Roth. germ. I. p. 43. II. p. 117. Hab. in sylvaticis. T.

28. *sudetica*, panic. erecto-patente, spic. tridoris glaberrimis mucronatis, culm. erecto compresso, vaginis laxis ancipitibus. Haenke sudet. p. 120. P. quadripedalis. Ehrh. Hab. in montibus Silesiae. Gramen altum quadripedale, fol. latis, culm. ancipiti, spiculis lacte viridibus. W.

♂ *atrata*, fol. planis latiusculis obtusis, culmo laevi compresso, panic. diffusa, spic. ovatis subquinquefloris atrovirescentibus. P. *sylvatica*. Villars delph. 2. p. 128? Hab. in montosis, subalpinis pratis. Culm. basi arundinaceus.

29. *anceps*, panic. diffusa, spiculis quinquefloris, acutis, basi pubescentibus, culmo ancipiti. Forst. prod. n. 43. Hab. in nova Zeelandia.

30. *annua*, parvula, fol. margine subundulatis, panic. diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culm. obliquo compresso. Leers. t. 6. f. 1. Hab. ad vias, locis irrigatis vulgaris. ○

31. *flava*, panic. diffusa, spiculis ovato-oblongis nitidis. Sp. pl. 100. Hab. in Virginia.

32. *compressa*, panic. secunda coarctata, culm. adscendente compresso, flos. 3-9 angulosis basi villo connexis. Smith. brit. t. p. 99. Lin. Willd. sp. 1. p. 397. Cresc. in muris, pascuis, et agrorum veruris.

33. *barbata*, panic. patula capillari, spiculis sexfloris oblongis, glumis glabris carinatis, genicul. barbatis. Thunb. jap. 50. t. 10. Willd. 1. p. 391. Hab. in Japonia. ○

34. *pilosa*, panic. patente stricta: ramificationibus primariis pilosis. Sp. plant. 100. Hab. in Italia, Carniolia.

35. *glutinosa*, panic. patente stricta, spiculis subnovemfloris hirsutiusculis glutinosis, culm. simplici, fol. subpilosis Swart. prodr. 26. et Flor. p. 214. Sloan. hist. 114. t. 71. f. 2. Hab. in Jamaica.

36. *prolifera*, panic. patente stricta, spiculis multifloris, (18-20.) culmo ramosissimo nodoso, ad nodos prolifero. Sw. prod. 27. et Ej. Flor. p. 216. Hab. in insulis Cari-

beis, Guadeloupe. Genicula junioris plantae originib. quasi prolifera. Sw.

37. *thermalis*, panic. conferta ovata, spiculis undecimfloris distichis ovatis, basi pubescentibus. Willd. sp. p. 392. (P. *baudensis*.) Hab. in rupibus ad thermas Baudenses in Austria inferiori.

38. *amabilis*, panic. patente, spiculis octodecimfloris linearibus. L. Fl. zeyl. 46. P. *rubens*. Lam. ill. t. 45. f. 2. ? Hab. in India.

39. *Eragrostis*, panic. patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris (8-15), glumis trinerviis. Sp. pl. 100. Schreb. gram. 2. p. 81. t. 38. Hab. in Helvetia, Italia, Barbaria et Sibiria. Vag. setulis coronata. An. P. *ferruginea*. Thunb. jap. p. 50. Willd. 1. p. 388. mera varietas?

40. *brizoides*, panic. racemosa, spiculis ovatis compressis 8-9-floris, culm. compresso. Lin. suppl. Briza capensis Thunb. Willd. p. 404. Hab. in Cap. bon. sp.

41. *cynosuroides*, panicul. composita stricta pyramidalis, pedunc. patentissimis, spiculis dependentibus distichis. Retz. obs. 4. p. 20. Uniola bipinnata panic. subspicata, racemis pinnatis, subtus imbricatis L. Sp. pl. 104. Briza bipinnata. Amoen. acad. 4. p. 450. Hab. in Aegypti et Indiae aridis. Gramen speciosissimum.

42. *unioloides*, panic. erectiuscula, spiculis subdecemfloris ovatis, calyc. inferioribus multivalvibus. Retz. obs. 5. p. 19. Hab. in India. An potius Uniola?

43. *cyperoides*, panic. spicato-glomeratis, spiculis 11-floris, culmo ramoso, foliis subulatis. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. spei.

44. *racemosa*, panic. coarctata, spiculis ovatis novemfloris, pedunculis brevissimis. Thunb. prod. 21. Hab. ad Cap. b. spei.

45. *verticillata*, panic. patente capillari flexuosa, spiculis undecimfloris lineari-subulatis. Willd. sp. 1. p. 393. Cav. ic. 1. p. 63. t. 93. In Hispania.

46. *megastachya*, panic. patente, pedicel. subsolitariis, spiculis lanceolatis 15-20-floris, seminib. reticulato-rugosis. Koeler. Gram. p. 181. Briza Eragrostis. Lin. Poa Eragrostis. Cav. ic. t. 92. Schreb. gram. t. 38. Hab. in Europae et Barbariae agri et arenosis.

47. *atrovirens*, tota glabra, culmo erecto, panic. patente, spic. plantis linearibus 8-10-floris, fol. subrigidis. Desf. Atl. 1. p. 73. t. 17. In arvis incultis prope la Calle in Atlante. T.

43. *hypnoides*, spicul. linearibus subsessilibus confertis longissimis sub 50-floris, culm. brevissimo ramoso. Lam. ill. t. p. 185. Hab. in Amer. meridion.

49. *aspera*, panic. patente ramosissima, pedunc. asperis, spicul. 10-floris vaginis antice hirsutis. Lam. l. c. Jacq. hort. 3. t. 56.

50. *tremula*, ramosissima capillari patente, spicul. linearibus glabris sub 30-floris. Lam. l. c. Hab. in Senegal.

51. *madagascariensis*, panic. ramosa laxa patentissima, spic. subro-floris, vagin. nudis, culm. simplice. Lam. l. c. Hab. ad Madagasc.

52. *subsecunda*, panic. oblonga laxa, spicul. linearibus acutis multifloris, lateralibus extrorsum versis. Lam. ill. p. 184. Hab. in China. Spiculae glabrae, 15-30-florae. L.

53. *pectinacea*, panic. laxa pyramidata, spicul. linearibus subro-floris, rachi demum valvul. interiorib. persistentibus pectinata. Mich. Flor. Am. bor. t. p. 69. Hab. in arvis Illinoensibus. Spiculae 7-13-florae.

54. *elegans*, panic. elongata angustata interrupta, spic. subdecemfloris, cor. valvis intus carinatis. Lam. Poir. Hab. in Portorico.

55. *reptans*, culm. reptante, panic. coarctata, spic. 6-10-floris sublinearib. fol. distichis subconvolutis. flor. dioclis. Mich. Flor. t. p. 69. t. 11. Ad ripas regionis Illinoensis. Spiculae faemineae majores.

56. *abyssinica*, panic. capillari laxa erecta, spicul. quadrifloris laevibus linearilanceolatis, fol. glabris subconvolutis. Ait. Kew. t. p. 100. Jacq. ic. rar. 1. tab. 17. Colitur in Abyssinia. ☉

57. *hirsuta*, culmo crasso simplici, vagina hirsuta, panic. ramosissima capillari, spicul. 5-floris. Michaux. p. 68. In Carolina inferiore. Habitus Panic. capillaris.

58. *malabarica*, panic. ramis simplicissimis, florib. sessilibus, seminibus distantibus, culmo repente. L. Willd. l. c. Sp. pl. 100. Hab. in Indiae arenosis.

59. *tenella*, panic. oblonga capillari subvericillata, flor. sexfloris minutissimis nutantibus. ? P. Japonica. Thunb. jap. 51. Pluck. alm. 176. t. 300. f. 2. Burm. zeyl. 110. t. 47. f. 3. Rumph. amb. 6. t. 4. f. 3. Hab. in India. Panicula ad pedunculorum basin fasciculos gerit e pilis longis 3-16 candidissimis. Retz. ☉

60. *nutans*, panic. contracta apice nutante, spicul. decemfloris, valvulis reversis. Retz obs. 4. p. 19. Hab. in India ad agrorum margines.

61. *punctata*, panic. diffusa, spicul. duodecimfloris, florib. diaphan. laevibus, puncto intus fusco. Lin. suppl. 109. Hab. in Malabar. Spiculae 12-14 florae. Flosculi diaphani, cum punctointus fusco, et stria viridi utrinque. L.

62. *spinosa*, paniculae ramis alternis compressis spinescentibus, spiculis alternis pedunculatis 10-floris, culmo ramoso Willd. p. 397. Thunb. prod. 22. Festuca spinosa, frutescens, ramis ramulisque spinosis, pedicellis aculeatis. Lin. suppl. 111. Hab. in Cap. b. spei. ☿

63. *sarmentosa*, panicula coarctata, spicul. lanceol. decemflor., culmo sarmentoso. Thunb. prod. 21. Hab. ad Cap. b. spei. ☿

64. *amboinensis*, panic. coarctata secunda, culmo tereti. L. Mant. p. 557. Retz. obs. bot. 4. p. 20. Rumph. amb. 6. p. 10. t. 7. f. 37. Hab. in India. Antecedenti simillima.

65. *viscosa*, panic. oblonga patente, spicul. inferioribus trifloris, superioribus 12-floris, culm. rigidis demum viscosis. Retz. obs. 4. p. 20. In Malabar. aridis. ☿

66. *peruviana*, panic. spicata, spiculis quinquefloris ovatis, fol. culmisque procumbentibus hirsutis. Willd. p. 402. Jacq. ic. rar. 1. t. 18. Collect. 1. p. 107. Hab. in Peru. ☉

67. *glomerata*, panic. spicata glomerata, spicul. quadrifloris, corollis ciliatis. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. spei.

68. *ciliaris*, panic. contracta, glumarum valvulis interioribus piloso-ciliatis, apice mucronatis. L. Syst. Veg. 69. Jacq. Coll. 2. p. 338. In India occidentali. Spicula demum purpurascens: glumis membranaceis laxis. Koclerius affinis.

69. *plumosa*, panic. diffusa, cal. 6-floris, valv. coroll. interioribus linearibus recurvis dorso ciliatis. Retz. obs. 4. p. 20. Hab. in India. Flosc. cum seminibus pellucidi. R.

70. *panicea*, panic. ramis subbinatis remotis filiformibus, cal. 2-floris vaginis punctato-pilosis. Retz. obs. 3. p. 11. In India. Panic. pedalis tenuissima. Flor. pedicellati. R.

71. *chinensis*, panic. ramis simplicissimis, flor. sessilibus, culm. erecto. Burm. ind. t. 11. f. 3. P. *sessilis*. Lam. ill. p. 185. Hab. in Ind. Vulg. quoque in Amer. insulis.

72. *bifaria*, spic. sessilibus distichis, in-

serioribus remotis erectis superioribus ap-
proximatis recurvatis. Vahl. symb. 2. p. 19.
In Ind. orientali..

73. *bromoides*, subspicata, spicul. lan-
ceolatis 25-floris, inferiorib. breve pedicel-
latis, superioribus sessilibus, fol. bifariis-
involutis. Vahl. symb. 3. p. 10. Hab. in Lima?

74. *sicula*, spica disticha compressa,
spicul. lanceolatis oblongis sessilibus. Jacq.
ic. rar. 2. t. 303. Triticum unioloides. Willd.
sp. 1. p. 488. Scop. delie. t. 11. Hab. in Ita-
lia et Barbariae maritimis.

75. *lioliacea*, spica simpliciter secunda, flos-
turgidis ovatis, culm. cespitoso. Huds. Tri-
ticum. Smith. brit. 1. p. 15. Engl. bot. t.
221. Hab. in arenosis maritimis.

Obs. Non vera Poa est, quod valet de
priori et sequentibus quoque, nec bene ad
Tritica pertinet. Forte distincti generis, si
characteres modo sufficerent.

76. *subverticillata*, panic. laxa basi ver-
ticillata, pedicellis elongatis, spicul. raris
subquinq. floris, cal. crossiusculis suban-
gularis obtusis. Lam. ill. 1. p. 183. (*P. laxa*.)
Hab. in Virginia. Tritico mariumo L. affi-
nis videtur.

77. *rigida*, panic. lanceolata disticho-
secunda coarctata glabra: rachi marginata,
spic. 7-floris, flos. teretibus enerviis. Smith.
brit. p. 99. Lin. Willd. Curt. Lond. ic. Hab.
in muris, arenosis. ☉ Var. rachi subfiliformi,
an distincta?

78. *procumbens*, panic. lanceolata se-
cunda coarctata scabra: rachi tereti, spic.
subquinq. floris, floscul. obtusiusculis ner-
vosis. Smith. l. c. Curt. Lond. ic. Sowb.
engl. bot. t. 532. *P. rupestris*. Wither-
arraeg. t. 26. In Angliae ruderalis, mari-
timis. ☉

169. BRIZA. *Cal.* 2-valvis, multi-
florus. *Spicula* disticha: valvu-
lis veni-ricosis cordatis, obtusis:
interiore minuta.

1. *minor*, spiculis triangulis, calyce flos-
culis (7) longiore. Scheuchz. gram. 205. t.
4. f. 9. Hab. in Europa et ad Cap. b. spei.
Glum. margine inflexae. ☉

2. *virens*, spic. ovatis, calyce floscul. (7)
aequali. Sp. pl. Hab. in Oriente, Hispania
et ad Cap. b. spei. ☉

3. *canadensis*, erecta longifolia, panic.
laxa, spicul. erectis 4-10-floris, cal. par-
vulo, cor. valv. exteriore ovali acuta. Mi-
chaux. Flor. p. 11. Hab. in Canada. Spicul.
virescent.

4. *media*, spicul. ovatis, calyce flosculis
(7) brevior. Flor. dan. t. 258. Leers. t. 7.
f. 2. Hab. in pratis, sylvis. Var. spicul. pur-
purascens et albidis. ☉

5. *geniculata*, spicul. ovatis, calyce. flos-
culis brevior, culmo geniculato. Thunb. prod-
21. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *erecta*, panic. subspicata, spicul. ova-
tis erectis subnovemfloris, cor. acutiusculis
laevibus. Lam. ill. 1. p. 187. Hab. in Monte-
video. Glum. albidae.

7. *rubra*, panic. subsimplici, spicul. cor-
dato-ovalibus erectis 9-floris, glum. mar-
gine rubris. Lam. l. c. Hab. in India. Cor.
subpubescens.

8. *maxima*, spic. cor. latis: flosculis sep-
tendecim. L. Lam. ill. t. 45. f. 2. Hab. in
Italia, Lusitania, Cap. b. spei, India. Cal.
spadiceus. ☉

170. UNIOIA. Spicula multiflorae,
planae ancipites, ovatae: *Cal.* mul-
tigliumis. *Cor.* 2-valvis, mutica:
valv. interiore minore, intra ex-
teriorem recumbente. *Stam.* 1-3.
Appendices 2, subbicornes ad
ba in germinis. *Stigm.* longa, mu-
ricata.

1. *latifolia*, fol. latis planis, panic. laxa,
cal. trivalvi, spiculis longe pedicellatis, flor.
monandris. Michaux. Flor. Amer. bor. 1. p.
70. Hab. in Amer. montibus Alleghanis. In
hortis sub nomine U. paniculatae colitur.

2. *maritima*, fol. convolutis, panic. lon-
ga, spiculis subsessilibus, cal. multivalvi,
flor. 3-andris. Michaux. l. c. p. 71. U. *pa-
niculata*. Lin. Will. spec. 1. p. 406. Hab.
in Virginiae littoribus arenosis.

171. FESTUCA. *Cal.* 2-valvis,
multiflorus. *Spicula* oblonga, te-
retiuscula aut divergens, mutica
aut arista terminali instructa.

* *Spica simplic.*

1. *lioliacea*, spic. elongata, spiculis al-
ternis sessilibus muticis. Huds. Smith. brit.
1. p. 112. Curt. Lond. ic. F. *elongata*. Ehrh.
F. Phoenix. Thuill. Hab. in pratis et pascuis
humidis. An potius Lolium? quod refert;
sed cal. 2-valvis, quod etiam passim obti-
net in L. temulento.

2. *monostachya*, culm. filiformi, fol. ci-
liatis, spicula unica terminali longe aristata.
Desf. Atl. p. 92. t. 24. f. 2. Hab. in arvis
prope La Calle.

3. *cynosuroides*, spicul. breviter petiolatis secundis compressis aristatis. Def. l. c. p. 88. t. 21. In arenosis prope Cassam. ☉

Obs. Ob affinitatem cum *Festuca ovina* hic forte melius collocandum esset *Triticum tenellum*.

** *Panicula plus minusve ramosa secundata coarctata.*

4. *magellanica*, panic. secunda stricta subspicata, spicul. violaceo-fuscis aristatis subsexfloris, fol. radicalibus setaceis. Lam. ill. 1. p. 189. Hab. in fretu Magellanico.

5. *capillata*, panic. angusta subsecunda, spicul. sub4-floris aristatis, culm. laevi uniformi, fol. capillaribus. Lam. l. c. p. 150. Hab. in umbrosis et nemoribus. F. *ovinae* affinis. †

6. *tenuifolia*, panic. subsecunda coarctata mutica, culm. 4-gono apice submentoso, fol. capillaribus. Hoffm. germ. p. 51. Leers. t. 8. f. 4. In collibus et sterilibus.

7. *ovina*, cespitosa, panicula secunda coarctata, floscul. teretiusculis basi glabris, culmo tetragono glabro, fol. omnibus setaceis scabris. Smith. brit. 1. p. 113. Willd. Sp. 1. p. 410. Leers. t. 8. fig. 3. Habit. in collibus aridis, etiam in sylvaticis. Rad. fibrosa nigrescens.

8. *vivipara*, panic. secunda coarctata, floscul. compresso-carinatis muticis calyceque subpubescentibus, culm. 4-gono, fol. staccis laevibus. Smith. l. c. Raj. synopsis. t. 22. f. 1. Scheuchz. prodr. t. 1. f. 2. Hab. in subalpinis. In hortis vivipara manet S. An F. *ovinae* tantum varietas?

9. *rubra*, panic. secunda, flosc. teretiusculis aristatis, fol. linearib. aequalibus supra pubescentibus, radice late repente. Smith. l. c. p. 116. Stilling fl. Misc. t. 9. Habit. in pascuis, montosis, sylvaticis, etiam in arenosis maritimis, ubi radicis flagellis longissime per arenam mobilem tendens. Sm.

Obs. F. *rubra* Auct. diversa videtur.

10. *duriuscula*, panic. secunda diffusa, floscul. aristatis, culm. tereti, fol. caulinis planis, radice fibrosa. Smith. l. c. p. 115. Leers. t. 8. f. 2. Engl. bot. t. 470. (β *dumetorum*, flosculis mollissime pubescentibus. Lin. Flor. dan. t. 700. Hab. in pratis et pastu siccorioribus β in dumetis. Videtur F. *rubra* plurimum auctorum.

11. *glauca*, panic. secunda subspiciformi, spic. laevibus subquinquefloris subaristatis, fol. glaucis rigidis subulatis. Lam. ill.

1. p. 190. t. 46. f. 3. Hab. in Europ. australiori; in hortis ad latera areolarum etiam colitur.

12. *cinerea*, fol. subulatis recurvis, panic. subsecunda, spicul. subhirsutis aristatis 5-floris. Villars delph. 2. p. 98. Hab. in montosis Galliae austral. An a priori satis diversa?

13. *varia*, fol. setaceis duriusculis, panicula collecta, spiculis teretibus subquadri-floris subaristatis. Vill. delph. 2. p. 102. (F. *pumila*). Willd. sp. 420. F. *varia*. Jacq. Collect. 2. p. 94. Hab. in alpinis Delphinatus, Helvetiae, Styriae. Tr.

14. *amethystina*, panicul. flexuosa, spiculis secundis inclinatis submuticis, fol. setaceis. Lin. Gramen montanum, panicul. Leteromalla spadicea et velut amethystina. Scheuchz. gram. 276. Habit. in montosis. Species dubia.

15. *reptatrix*, panic. ramis simplicibus, spiculis subsessilibus, fol. involuto-filiform. Sp. pl. 108. Willd. p. 421. Hab. in Arabia; Palaestina. Radix longissime reptans sub terra, vestita latis foliorum rudimentis. Tr.

16. *heterophylla*, fol. radicalibus setaceis, caulinis planis latioribus, panic. rara secunda, spiculis subsexfloris lanceolatis glabris aristatis. Jacq. Collect. 2. p. 93. Vaill. bot. Paris. t. 19. f. 6. F. *nemorum*. Leyss. Hab. in sylvaticis. Tr.

17. *Myurus*, panicula spicata longa nutante calycibus minutissimis muticis, flosc. scabris; aristis longis, fol. setaceis. Leers. t. 3. f. 5. Gramen murorum, spica longissima. Moris. s. 8. t. 7. f. 43. Habit. in pratis arvis, muris. ☉

18. *alopecurus*, racemo subspicato, spicul. alternis distichis aristatis, cor. villosa-ciliatis. Schousb. Maroc. 1. p. 281. Hab. in arenosis prope Tingidem. In planta culta racem. transit in paniculam secundam. Roth.

19. *bromoides*, panic. erecta secunda laxiuscula, spiculis laevibus, flosc. longissime aristatis. Lam. ill. p. 189. t. 46. f. 4. Willd. sp. 1. p. 418. F. panic. secunda erecta, flosc. subulatis aristatis apice scabris, fol. setaceis vagina brevioribus. Smith. brit. 1. p. 117. Pluck. Phyt. t. 33. f. 10. Bromus. *dertonensis*. Allioni. B. *ambiguus* Cyrilli. Hab. in muris et arenosis. Velv. interior margine pubescens. An F. *sciurioides*. Roth. Willd. 1. p. 423. eadem species?

20. *uniglumis*, panic. secunda erecta subsimplici, flosc. subulatis compressis arista-

tis, cal. valvula altera brevissima. Smith. p. 118. Raj. Syn. t. 17. f. 2. Lolium Bromoides. Hu ls. Stipa membranacea Linn.? Hab. in Angliae arenosis maritimis. Fol. lanceolata subinvoluta striata.

21. *ciliata*, culm. adscendente, fol. subconvolutis, spic. racemosa, cal. valva altera minima: corollinae exteriori margine ciliata. Link. in Schrad. Journ. 2. p. 315. Hab. in Lusitaniae litore arenoso fluv. Douro, et in Gallia meridionali.

22. *Halleri*, minuta, fol. setaceis duris, panic. stricta, spicul. teretibus hirsutis, longius aristatis. Vill. del; b. 2. p. 103. Hall. Helv. n^o. 1441. Ilion. pedem. 22 1/2. Cresc. in subalpinis. Culm. 2-3. unc. longus. Spic. griseae. V.

23. *montana*, panic. secunda depauperata, spicul. solitatis quadrifloris hirsutis, fol. linearib. rigidis pilosis. Savt. Pis. 1. p. 118. Hab. in monte Pisano. ¶

24. *stipoides*, panic. erecta secunda, spicul. subquinq. floris, glum. breviter aristatis, pedicellis ensiformibus. Desf. atl. 1. p. 91. Bromus stipoides. Lin. Mant. p. 557. Barrel. t. 76. f. 1. Hab. in Majorca et prope Blascar. Aristae ex apice. ☉

25. *rubens*, panic. fasciculata secunda, spicis subsessilibus villosis rubescentibus aristis rectis elongatis. Brom. rubens. Linn. Hab. in Hispania.

Obs. Aristas in hac et antecedente specie terminales observavi. Forte Br. *rubens*. Cav. ic. 1. p. 34. t. 45. f. 2. est Brom. *sco-parii* L., species adhuc dubia.

26. *scabra*, panic. secunda coarctata, spiculis compressis sexfloris flosc. scabris. Vahl. symb. 2. p. 21. Hab. ad Cap. b. Spei.

*** Panicula aequali.

27. *fusca*, panic. erecta ramosa, spiculis sessilibus carinatis muticis, fol. involutis. Lin. Sp. pl. 109. An. F. fascicularis. Lam. ? Hab. in Palestina. Culmus altus. Spiculae erectae longae, flosc. 16. s. 24. L.

28. *decumbens*, panic. erecta, spiculis subovatis muticis, calyc. floscul. majore, culmo basi decumbente. L. Fl. suec. p. 92, 93. Leers. t. 7. f. 5. Bromus decumbens. Koel. gram. p. 242. An potius Bromus ? Valv. corollinae enim margine versus basin ciliatae. Hab. in sylvaticis, pascuis. ¶

29. *pauciflora*, panic. patula, spiculis subquadrifloris aristatis scabris, fol. villosis. Thunb. jap. 52. Hab. in Japonia.

30. *elatior*, panic. secunda suberecta,

spiculis obtusiusculis: exterioribus teretibus. Leers. t. 8. f. 6. Hab. in pratis fertilissimis. Est F. *elatior* plurimum auctorum.

31. *spadicea*, panic. contracta subsecunda, spicul. compressis, quadrifloris muticis (coloratis), fol. linearib. demum convolutis. Smith. in Act. Lin. 1. p. 113. Willd. Sp. 1. p. 421. Hab. in Galliae montosis. Cal. valv. altera minor.

32. *arundinacea*, panic. erecta stricta, spic. oblongis erectis 4-floris brevissime aristatis. Hoffm. germ. Schreb. spirul. p. 57. Hab. in humilibus ad margines rivulorum. Hujus loci. F. *elatior* Curtis. Smith. brit. 1. p. 124 ?

33. *caerulescens*, fol. hinc striatis rigidis, panic. secunda coarctata, spicul. subtrifloris, glumis acutis muticis. Desf. Atl. 1. p. 87. Hab. in Algeriae arvis.

34. *gigantea*, panic. secunda nutante ramosa laxa, floscul. lanceolatis ventricosis aristatis, fol. ensiformibus laevib. Smith. l. c. p. 120. Br. *giganteus*. Linn. Habit. in sylvis umbrosis humilissculis. Glum. interior non pectinato-ciliata ut in Bromis. S. ¶

35. *poaeformis*, fol. longissimis, panic. ramosissima pallida, spiculis oblongis subduodecimfloris obtusis muticis. F. Poaeoides. Thuill. Paris. p. 51. Hab. in sylvaticis siccis. Spic. primo subteretes ut in F. lolioideis.

36. *poaeoides (americana)*, glaberrima, culm. geniculato subbinodi, panicul. subconferta: ramis inferioribus simplicibus, spiculis oblongis 9-10-floris muticis. Michaux, p. 67. Hab. ad ripas fluv. St. Laurentii.

37. *polystachya*, panic. erecta coarctata, ramis s. pedicellis simplicibus: spiculis tenuibus unilateralibus 8-10-floris, fol. longissimis glabris. Michaux, p. 66. In America boreali.

38. *calamaria*, panic. secunda erecta ramosissima coarctata, flosc. parvis oblongis angulatis muticis, fol. ensiformib. striatis. Smith. brit. 121. Hab. in sylvat. subalpinis Scotiae. Spic. virescunt 3-5-florae. Culm. teres, vag. longae. ¶

39. *fluitans*, culmo adscendente, panic. ramosa ramis patentibus, spiculis subsessilibus adpressis teretibus muticis. Schreb. gram. 37. t. 3. Leers. t. 8. f. 5. Poa fluitans. Smith. brit. 1. p. 95. Glum. margine scariosae s. coloratae ut in Pois. Hab. in fossis et paludibus. ¶

40. *divaricata*, culm. basi geniculato

spicul. teretibus elongatis muticis paniculato-dichotomis. Desf. Alt. 1. p. 89. t. 22. Hab. in Barbariae arenosis maritimis.

41. *miseria*, panic. coarctata, glum. aristatis scabris, culmo geniculato, fol. ensiformibus. Thunb. jap. 52. Hab. in Japonia.

42. *indica*, panic. contracta erecta, spicul. compressis subaristatis subsexfloris. Retz. obs. 4. p. 21. Willd. p. 427. Rheed. mal. 12. p. 75. t. 45. Hab. in India, in agris oryzae. Colore coerulescenti-viridi e longinquo dignoscitur. R.

43. *calycina*, panic. coarctata, spicul. linearibus, calyce flosculis longiore, fol. basi barbatis. L. Cavan. ic. 1. p. 33. t. 44. f. 2. Lam. ill. 191. t. 46. f. 5. Hab. in Hispania. P. pilosa quorundam.

44. *pungens*, spica glomerata ovata, spicul. sexfloris teretibus lanuginosis, fol. involutis rigidis. Vahl. symbol. p. 10. t. 2. P. mucronata. Forst. descr. 22. n. 74. Hab. in Arabia. T.

45. *phalaroides*, spica brevi densa lobata secunda, spicul. 2-3-floris hirsutis breviter aristatis. Lam. ill. 1. p. 190. Hab. in Gallia australi. An potius Dactylis?

172. BROMUS. Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula oblonga, disticha: arista infra apicem saepius bifidum, (glum. interior pectinato-ciliata. Smith.)

1. *secalinus*, panicula nutante, spicul. ovatis glabris compressis glumis nudis distinctis, aristis subulatis brevioribus flexuosis rectis. Lin. Willd. sp. 1. p. 428. B. villosus. Weigel. obs. p. 4. t. 1. f. 2. Hab. in agris inter segetes. Arist. subobsoletae. ©

2. *multiflorus*, panic. patente, spicul. pubescentibus lanceolatis compressis, glumis nudis marginatis imbricatis, aristis capillaribus aequalibus rectis. Roth. germ. I. 47. Weigel. obs. bot. p. 2. t. 1. f. 1. Leers. herb. t. 11. f. 2. Scheuchz. gram. t. 5. f. 9. Inter segetes; priore rarior observatur.

3. *mollis*, panic. erecta coarctata, pedunculis ramosis, spic. ovatis (subturgidis) pubescentibus: glumis ellipticis, vaginis foliisque mollissime villosis. Lin. Smith. Brit. 1. p. 126. Ubique frequens. Fol. pilis longis distincta, quo sequentes varietates? quoque conveniunt.

4. *leptostachys*, cespitosus, panic. stricta pedunc. subsimplicibus, spic. ovato-linearibus glaberrimis subquinguefloris, glumis teretibus aristisque purpurascens, vag. folisque pilosis. Hab. in pratis et sylvaticis.

Obs. An huc pertinet Br. pratensis Ehrh? cui spicul. quoque glabrae nitidae, uno latere subsapideae et pedic. simplices sunt.

5. *conglomeratus*, cespitosus, spicul. ovatis 8-floris in capitulum conglomeratis vaginisque tomentosis. Prope Montpellier lectus a Cl. Thibaud. Pedalis. Glum. minus latae.

6. *erectus*, elongatus, panic. stricta, pedunc. subsimplicibus, flosc. coloratis aristatis birtis, fol. radicalib. angustis pilosis. Smith. brit. 1. p. 131. B. pratensis. Lam. B. perennis. Villars. B. agrestis. Allion. B. arvensis. Poll. In Europ. australioris pratis frequens. B. inermis similis. Spiculae saepe quasi truncatae apparent fusco-purpureae, divergentes ut in Festucis, quibus valde affinis. T.

7. *racemosus*, panic. erectiuscula diffusa, pedunc. simplicibus, spicul. ovatis sexfloris, floscul. imbricatis depressis nervosis glabris. Smith. Brit. 1. p. 128. Moris. s. 8. t. 7. f. 19. Hab. in Anglia et Galliae pascuis, sylvaticis. Spicul. viridi alboque vittatae. Sm.

8. *canadensis*, panic. laxa capillari pendula, spicul. subsexfloris compressis, flosc. valva exteriori breviter aristata margine villosa. Michaux. Flor. 1. p. 63. Hab. in Canada.

9. *pectinatus*, panic. patente, spicul. ovatis glabris, corollae valvula inferiore ciliata mutica. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. spei.

10. *lanceolatus*, panicul. ramosa erecta patente, spicul. lanceolatis glabris subcompressis, aristis floralibus rectis, seminalibus refractis. Roth. Cat. 1. p. 18. Hab. locis aridis circa mare Caspium. ©

11. *squarrosus*, panic. nutante, spicul. ovatis: aristis in spica matura divaricatis, pedunc. simplicibus. Scheuchz. gram. t. 5. f. 11. Hab. in Europ. australi. ©

12. *japonicus*, panic. patente ramosa, spicul. oblongis glabris, aristis divaricatis. Thunb. jap. p. 52. t. 11. Hab. in Japonia. ©

13. *alopecurus*, fol. villosis, panicula coarctata erecta, spicul. 15-floris subsessilibus pubescentibus, aristis basi contortis. Desf. Atl. 1. p. 95. t. 25. B. (contortus). Poir. iter. IIab. prope la Calle. ©

14. *macrostachys*, culmo basi geniculato, spic. maximis teretibus glabris, aristis rigidis patentibus. Desf. l. c. p. 96. t. 19. f. 2. In Atlante prope Flemsen. Spicul. maximae, glabrae inferiores nutantes. ©

15. *turgidus*, panic. ramosa stricta, spic.

turgidis 6-floris subvillosis, aristis divaricatis subserratis. B. *squarrosus* var. β . Lam. ill. Buxb. Cent. 5. t. 38. f. 1? Hab...

14. *simplex*, panic. simplici, spicul. sessilibus 8-10-floris glabris aristis paucidorsalibus divaricatis, vaginis villosis. Hab...

15. *purgans*, panic. nutante crispa, fol. utrinque nudis: vaginis pilosis, glumis villosis. Sp. pl. 113. Willd. sp. p. 431. Hab. in Canada. Kalm. T. Folia latitudine arundinis, supra fere nuda. L.

16. *catharticus*, panicul. patente erecta subsimplici, spiculis lato-lanceolatis striatis scabris, aristis brevibus rectis. Vahl. symb. 2. p. 22. Few. peruv. 705. t. 1. Hab. in Lima. Differt a priore vaginis non ciliatis.

17. *inermis*, panic. erecta, spiculis subteretibus subulatis nudis subnudiis. Roth. germ. I. p. 48. Schreb. gram. t. 13. Speciosa. Schreb. spicil. p. 59. Hab. in Germania, Helvetia. T.

18. *asper*, panic. ramosa nutante scabriuscula, spiculis linearibus subteretibus decemfloris pilosis aristatis, culmo folisque hirtis. Aiton. Kew. 1. p. 109. B. *ramosus*. Lin. Syst. veg. ed. 13. p. 102. Nec Mant. p. 34. B. hirsutus. Curt. lond fasc. 2. t. 8. Hab. in sylvis, ad saepes. Pili sparsi, deorsum spectant. C

19. *verticillatus*, panic. aperta pedunculis horizontalibus verticillatis, elongatis simplicibus ramosisque. Cav. ic. 6. p. 60. t. 50. Hab. in Regn. Aragonensis agris. Cal. 12-florus. C. Br. *sterili* affinis.

20. *pallens*, panic. erecta subcontracta, pedunc. inaequalibus, spicul. 5-floris: aristis capillarib. longissimis. Cav. J. c. p. 66. t. 59. f. 1. Hab. in Manilae viciniis.

21. *littoreus*, panic. erectiuscula scabra, spiculis oblongis subquadrifloris (4-6) glabris muticis. Retz. scand. ed. 2. n. 140. B. *arundinaceus*, panicul. erecta contracta, spic. oblongis scabris subaristatis paucifloris. Roth. Flor. germ. 2. p. 141. Gmel. fib. 1. p. 110. n. 44. t. 21. Scheuchz. gram. 266. t. 5. f. 8. Hab. in Suecia, Pomerania, Helvetia, Sibiria. T. Maximus omnium.

22. *ciliatus*, panic. nutante, fol. utrinque vaginisque subpilosis, glumis ciliatis. L. Hab. in Canada. Culmi tenues.

23. *arvensis*, panic. nutante, spiculis ovato-oblongis glabris. Weigel. obs. p. 6. t. 1. f. 3. Leers. t. 11. f. 3. B. *versicolor*. Pollich. Palat. n. 104. Hab. ad versuras agrorum. Ant. puniceae. Spic. purpureas. rarius viridis. C

24. *sterilis*, panic. patula subsimplici pendula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. Leers. t. 11. f. 4. Hab. in agris, sylvis, ad vias. Pedicelli asperi. C

25. *tectorum*, panicula nutante ramosa, spiculis pubescentibus linearibus. Leers. t. 10. f. 2. Hab. in collibus siccis, tectis et muris. Panic. debilis, a minimo vento mobilis. C

26. *geniculatus*, panic. erecta, fol. distantibus, pedunculis angulatis, culmo genu procumbente. Mant. p. 33. Schreger. 2. p. 60. t. 31. Hab. in Lusitania. C

27. *rigens*, panic. spicata: spiculis subsessilibus erectis pubescentibus subquadrifloris. Mant. 33. Hab. in Lusitania. Vaginae totum culmum tegentes.

28. *scoparius*, panic. fasciculata, spic. subsessilibus glabris, aristis patulis. Amoen. acad. 4. p. 266. Conf. Cav. ic. 6. p. 65. t. 59. f. 2. Hab. in Hispania.

29. *madritensis*, pubescens, panic. patula subsecunda, spic. linearibus retrorsum scaberrimis, aristis longissimis scabris. Vahl. symbol. 2. p. 23. Cav. ic. 6. p. 67. B. panicula rariore patulo-erecta, spic. linearibus, intermediis geminis, pedicellis superne incrassatis. Lin. Amoen. acad. 4. p. 267. B. *diandrus*, flosc. lanceolatis nervosis diandris. Smith. Flor. brit. 1. p. 135. B. *rigidus*. Roth. Catal. 1. p. 17. B. *maximus*. Desf. Atl. t. 26. Hab. in Anglia, et in suburbiis Martii, et in regno Valentino. C

* Culmo s. panic. simplici.

30. *gracilis*, villosus, spica simplici gracili, spicul. alternis sessilibus teretibus longius aristatis. Weig. obs. p. 15. B. *sylvaticus*. Smith. brit. 1. sp. 136. In nemorib. Vagin. et fol. magis lanata.

31. *pinnatus*, glaber, spic. simplici disticha, spicul. alternis subsessilibus teretibus longis subaristatis, culm. nodis pubescentibus. Lin. Willd. sp. 1. p. 438. Triticum Hall. Festuca Kohl. Hab. in graminosis sylvaticis.

32. *longifolius*, culm. basi ramoso, fol. involuto-subulatis culmum aequantibus, spicul. teretibus recurvatis. Schousb. Marroc. ed. germ. p. 31. In Barbaria.

33. *retusa*, caespitosa, culm. elongato simplici, fol. subulatis breviusculis, spic. teretibus submuticis, glum. apice retusomucronatis. Hab. in Gall. meridionali, in maritimis. B. *ramosus* L. Willd. sp. 1. p. 437? B. *caespitosus*. Desf. Atl. 1. p. 91?

34. *distachyos*, spiculis ut plurimum duabus

duabus erectis alternis. Lin. Festuca ciliata. Gouan. Hab. in Europa australi et Oriente. Var. spicul. 1, 2 et 3. B. *polystachyos*. Lam. ill. 1. p. 195.

Obs. Quae hac in subdivisione enumeratae species eodem jure ad Festucas aut ad Tritica amandari possent. Valvula interior pectinato - ciliata certius Bromi indicium praebet, quam aristae insertio, dicit cl. Sm. (Flor. Brit. 1. p. 137), quae in his terminalis est.

173. KOELERIA. Cal. multiflorus, 2-valvis, compresso - carinatus. Cor. 2-valvis, brevi-aristata: glumis nervosis. (Spica composita ex spiculis compressis, saepius pubescentibus subsessilibus.)

1. *gracilis*, spica basi interrupta elongata subramosa, spicul. bifloris nitidis muticis. Poa nitida. Lam. ill. 1. p. 182. Poa cristata. Krock. sil. ic. An Aira subspicata. L. ? Hab. in sylvaticis. Fol. angusta, dein convoluta.

2. *cristata*, spica laxiuscula, spiculis divergentibus 3-4-floris subaristatis rugulosis carina subciliatis. Poa cristata auctorum. Fol. plana vag. et culm. apice pubescens.

3. *grandiflora*, spiculis magnis dilatis. Ex Helvetia. Richard.

4. *pectinata*, panic. spicata nitida, glum. patulis pectinatis subquinquefloris, culm. superne villosus. Lam. l. c.

5. *pyramidata*, panic. pyramidalis, glum. laevibus nitidis muticis trifloris, vagin. villosus-pubescentibus. Lam. l. c. p. 183.

6. *tuberosa*, spica elongata densa, spic. 2-floris subciliatis, culm. basi tuberoso, fol. linearibus. Aira *vallesiaca* Allioni? Aira cristata. Smith. brit. 1. p. 81. etiam hujus loci. Hab. in Italia, Anglia et Helvetia.

7. *setacea*, rad. tuberosa, fol. brevibus duris setaceis, spica cylindrica, cal. 2-3-floro subovali obtusiusculo inermi glabro, cor. subarista. Richard. Hab. in Pyrenaeis. An tunc varietas?

8. *Phleoides*, spic. cylindrica, spicul. 5-floris aristatis, glumis sublaeviculis nervosis hirsutis exasperatis. Festuca. Villars. Dauph. 2. p. 95. Avena pumila. Lam. ? videtur. Poa cristata. Linnæi. Hab. in Gallia meridionali et in Barbaria.

9. *villosa*, vagin. suburgula foliisque pubescentibus, spica ovata, spicul. 2-floris villosis-bispidis. Phalaris pubescens. Poir. Aira pubescens. Vahl. symb. 3. p. 6. De L.

Atl. 2. p. 446. Hab. in Europa et Barbaria ad maris littora.

174. TRISETUM. Cal. 2-3-florus, acuminatus, carinatus. Cor. aristis 2 terminalibus subdentiformibus (glum. apice setoso-bifidis), 1 dorsali recta nec contorta, flosc. ut plurimum glabris. (Spiculae compressae, pallescentes.)

1. *striatum*, panicula tenui, pedicellis brevibus incrassatis, cal. glumis nervosis, 2-3-floris striatis, floscul. basi villosis. Avena striata. Lam. ill. 1. p. 200. (3. A. dubia. Leers. tenuis. Willd. 1. p. 448. Y. hirta, fol. hirsutis. A. triaristata. Villars. Huc quoque pertinere videtur Bromus triflorus. L. Cir. Koel. gram. p. ... Hab. in Europa austr.

2. *villosus*, panic. trichotoma, cul. bifloris, cor. (triaristatis), aristis lateralibus basi villosis brevioribus. Thunb. prod. p. 22. Avena trisetum. Hab. cum sequente ad Cap. b. spei.

3. *nudum*, panicula trichotoma, cal. 2-floris, aristis nudis: intermedia longiore. Av. pallida. Thunb.

4. *nitidum*, panic. spicata, glumis membranaceis nitidis villosis (triaristatis) Desf. Atl. 1. p. 102, t. 31. f. 2. In arenosis prope Mascari. Spicul. majusculae.

5. *lateum*, panic. patente, cal. 2-floris subulatis, cor. nudis triaristatis: arista intermedia flexuosa. Lin. suppl. p. 112. In insula Martinica.


6. *parviflorum*, fol. pubescentibus, panic. laxa, cal. 2-3-floris, arista brevi setiformi infra glumae apicem. Desf. l. c. 103. t. 32. Hab. inter segetes in Atlante.

7. *pratense*, panic. subcontracta, spic. nitidis, vagin. longis striatis glabris, fol. superne villosis. Av. *arescens*. L. Leers. t. 10. f. 5. In pratis frequens. An Bromus bifidus. Thunb. jap. hujus quoque loci.

8. *panicum* (lusitanicum), panic. contracta, vaginis hirsutis. Link. in Schrad. bot. journ. 8. p. 314. Hab. in Lusit. Sequen. affine.

9. *hispanicum*, panic. subspiciformi vaginis folisque subpilosis. Av. Loeftingiana. L. A. panicea. Lam. ill. p. ... non multum differt. Habitat in Hispania.

10. *pisanum*, panic. ex spicis densis composita, spicul. subquadrifloris, fol. sublaeviculis vaginisque pilosis. Av. neglecta. Sav. Flor. Paris. p. 132. t. 1. f. 4. Hab. in America prope Pisanum frequens. Communicatum a cl. auctore.



10. *ovatum*, spica ovata densa, spicul. 3-5-floris, fol. villosis brevibus. Cav. ic. 6. p. 67. t. 591. f. 2. sub Bromo. Cresc. in Hispaniae collibus. Spic. saepius quoque globosa, pallide virens.

11? *Aristidoides*, panic. trichotoma, cal. bifloris, cor. bifidis aristatis. Thunb. prodr. 22. sub Avena. Ad Cap. b. spei.

Obs. Nonnullae generis *Avenae* species ex. gr. *Av. pensylvanica*, lupulina et purpurea huc quoque pertinere videntur, quae ulterius examen hinc merentur.

175. *LAGURUS*. *Cal.* 2-valvis, 1-florus: aristis villosis. *Cor.* gluma exterior aristis 2 terminalibus, tertia dorsali retorta.

1. *ovatus*, spica ovata villosa. L. Schreb. gram. t. 19. f. 3. Smith. brit. r. p. 143. Alopecuros. Moris. s. 8. t. 4. f. 1. Habit. in Europ. austral. campis arenosis.

176. *PAPPOPHORUM*. *Cal.* 2-valvis, 2-florus. *Cor.* 2-valvis, multiaristata.

1. *alopecuroideum*, Vahl. symbol. 3. p. 10. t. 51. Saccharum pappiferum. Rich. Lam. ill. 1. p. 139. Hab. in Americ. Folia convoluta-subulata.

177. *ARISTIDA*. *Cal.* bivalvis, uniflorus. *Cor.* 1-valvis: aristis tribus terminalibus.

1. *adscensionis*, panicula ramosa, spicis sparsis. L. Willd. sp. 1. p. 458. *Aristida paniculata*. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 16. f. 2. f. 56. Hab. in Jamaicae australis locis sabulosis et insula Adscensionis.

2. *americana*, panic. simplici, cor. bivalvis, altera aristis dorsalibus, altera terminalibus. Swartz. obs. 41. 1. 2. f. 2. Lin. Amoen. acad. 5. p. 393. Hab. in Americ. calidioris sabulosis.

3. *gigantea*, panic. elongata effusa secunda, aristis subaequalibus rectis. Lin. suppl. 113. Hab. in Teneriffa. Gram. altissimum, glaberrimum.

4. *Hystrix*, panic. divaricata patentissima, flosc. simplicissimis glabris, aristis rectis divaricatis. Linn. supp. 113. Pluck. alm. 174. t. 191. f. 3. Habit. in Malabar et ad Cap. b. spei. Gramen repens stoloniferum.

5. *pallens*, panic. pauciflora, pedicell. alternis bifloris approximatis, aristis capillaribus longissimis. Cavan. icon. 5. p. 43.

t. 468. f. 2. Habit. in regno Chilensi. Fol. filiformia.

6. *vestita*, panic. trichotoma patenti, aristis aequalibus glabris, calyce inaequali. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei.

7. *dichotoma*, cespitosa, culm. dichotomis subspicatis, arista contorta gluma brevior: lateralibus brevissimis. Mich. Flor. 1. p. 41. Hab. in Carolinae superioris glareosis.

8. *stricta*, culm. folisque pubescentibus strictis, racemo in spicam elongatam coarctato, aristis gluma longioribus. Mich. 1. c. In Carol. infer. Var. fol. planiusc. et convolutis.

9. *oligantha*, culm. stricto subramoso, fol. convulso-filiformibus, flor. distantibus solitariis. Michaux. 1. c. Hab. in pratis Illinoensibus. Fol. longissima.

10. *rigida*, panic. contracta, fol. rigidis acumine glabris culmo parallelis, aristarum media duplo longiore. Cav. icon. 5. p. 44. t. 469. f. 2. Hab. in insul. Philippicis.

11. *vagans*, panic. ramis divaricatis paucifloris, cor. calyce longiore, aristis brevibus: media productiore, fol. subulatis. Cav. 5. p. 45. t. 471. f. 2. Hab. in Nov. Hollandia.

12. *laxa*, panic. laxa: pedicellis nudis elongatis bifidis, spicis terminalibus, aristis lateralibus brevissimis. Cav. 1. c. t. 470. Hab. prope Montevideo. Arista glum. longior basi contorta.

13. *Luzonensis*, culm. ramoso, panic. contracta, spiculis alternatim pluribus: aristis subaequalibus. Cav. 1. c. t. 470. f. 2. Hab. in ins. Philippica Luzow. Cor. marginata involuta et in maturis in cylindrum convoluta punctisque fuscis variegata. C.

14. *ternipes*, panic. coarctata longissima: ramulis alternatim ternis capillaribus: aristis 2 lateralibus brevibus. Cav. 1. c. p. 46. Fol. convolutum subulatum. †

15. *murina*, panic. densa spicaeformi: ramis alternatim binis subquinq. floris, calycibus violaceis. Cav. 1. c. p. 44. t. 469. f. 1. Hab. in Mandaneo insula. Hordeum refert. Palmaris.

16. *caerulescens*, panic. coarctata elongata arcuata subsecunda interrupta, aristis laevibus subaequalibus, fol. glabr. Desf. Atl. 1. p. 109. Habit. in arvis prope Kerwan. †

17. *elatior*, caule ramoso altissimo, panic. elongata, cal. violaceis, aristis aequalibus. Cav. ic. 6. p. 65. t. 589. f. 1. In Hispaniae aridulis prope mare Malacitanum, etiam in regno Valentino.

18. *arundinacea*, paniculata, arista in-

termidia longiore laevi. Lin. Mant. p. 186. In India. Arist. subrecurvata; ad hujus basin utrinque arista minuta vix manifesta. L.

19. *depressa*, culm. trifido-ramosis decumbentibus, aristis scabriusculis. Retz. obs. 4. p. 22. In Malabaricae sterilibus.

20. *setacea*, culm. stricto simplici, aristis scabriusculis. Retz. l. c. † Cor. basi lanata uti in praecedente. An ambae species satis distinctae?

21. *interrupta*, panic. ramis interruptis, fol. vaginatis subulato-longissimis, aristis ciliatis. Cav. ic. 5. p. 45. t. 471. f. 2. Hab. in Mexico.

22. *lanata*, arista intermedia longiore lanata, culmis villiosis. Vahl. symbol. 1. p. 11. t. 3. Lam. ill. t. 41. f. 1. *lanata*, panicula ramosa, arista medio lanata. Forsk. descr. 26. n. 87. Hab. in Armenia, et in regno Tunetano. Desf. p. 109. Aristis lanatis refert Supam pennatam.

23. *capensis*, panicul. trichotoma patente, aristis omnibus villosis. Thunb. prod. 19. *Avena capensis*. Lin. suppl. 112. Hab. ad Cap. b. spci.

24. *pungens*, culm. fruticoso, fol. subulatis rigidis; panic. laxa, aristis plumosis. Desf. Atl. 1. p. 109. t. 35. Hab. in Barbariae arenis humidis. h

178. *STIPA*. Cal. 2-valvis, 1-florus. Cor. brevior, 2-valvis: valv. involutis truncatis. *Arista* terminalis, basi contorta, decidua, longissima.

1. *pennata*, foliis filiformibus, aristis plumosis basi glabris. L. Willd. sp. 1. p. 440. Lam. ill. 1. t. 41. f. 1. Hab. in Germania et Suecia. T

2. *barbata*, fol. rigidis striatis, aristis longissimis totis barbatis. Desf. Atl. 1. p. 97. t. 27. Hab. in Barbariae collibus. T

3. *humilis*, flor. panic. spicata vagina subinclusis, aristis pennatis. Cav. ic. 5. p. 41. t. 466. f. 1. In Americ. meridionali. *Arista* medio pilis longis barbata.

4. *tortilis*, panic. spicata basi involuta, cal. interiore villosa, aristis tortilibus. Desf. l. c. p. 99. t. 31. f. 1. Hab. in arvis. Flores decidui vestimentis adhaerent cutimque pungunt viatorum damno. D. ©

5. *juncea*, fol. convolutis filiformibus, panic. laxa elongata, aristis longis pubescentibus. Desf. Atl. 1. p. 98. t. 28. β. *Stipa juncea*, aristis nudis rectis, cal. semine

longioribus. Lin. Willd. sp. 1. p. 440. Hab. in collibus aridis. T

6. *capillata*, aristis nudis curvatis, calycibus semine longioribus, fol. intus pubescentibus. Lin. Hab. in Germania, Gallia. An Var. prioris? T

7. *tenacissima*, aristis basi pilosis, panicula subspicata, fol. filiformibus. Moench. acad. 4. p. 266. Desf. l. c. p. 99. t. 50. Hab. in Hispaniae et Barbariae collibus arenosis. Panic. flavesco. T

8. *capensis*, aristis basi pilosis, panic. spicata, foliis ensiformibus. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spci. T

9. *spicata*, aristis basi pilosis, racemo spicato secundo. Thunb. prod. 20. Linn. suppl. 111. Hab. ad Cap. b. spci. T

10. *bicolor*, aristis nudis, seminibus obovatis basi barbatis. Vahl. symbol. p. 24. Cav. ic. 5. p. 42. t. 466. f. 2? Hab. in Brasiliae monte Video.

11. *eminens*, aristis nudis, seminibus tomentosis, fol. striatis. Cav. l. c. t. 467. f. 1. Hab. in Mexico. Panic. laxa, pedalis. C.

12. *virginica*, panic. pauciflora, calyc. majusculis, cor. stipitata stipite barbato. Michx. Flor. 1. p. 51. Hab. in sylv. Virginiae et Carol. superioris. *Arista* crassa, longissima. *Stipa* avenacea. Walt. St. barbata. Michaux.

13. *sibirica*, paniculata, aristis nudis cal. duplo longioribus, seminibus lanatis. Lam. ill. 1. p. 158. *Avena sibirica* Lin. Hab. in Sibiria.

14. *Aristella*, aristis nudis rectis cal. subduplo longioribus, germinibus laxatis. Lin. Hab. Monspelii prope Foulon. T

15. *avenacea*, aristis nudis, calycibus semen aequantibus. Sp. pl. 116. Andropogon folio superiore spathaceo, pedunculo lateralibus oppositis unifloris, aristis flexuosis. Gron. Virg. 138. Hab. in Virginia.

16. *parviflora*, fol. radicalibus rigidulis filiformibus, panicula diffusa, aristis medio capillaribus. Desf. p. 98. t. 29. In Barbariae collibus aridis. T

179. *AVENA*. Cal. 2-valvis, multiflorus: arista dorsali, contorta. (Glumae membranaceae subfolliculosae.)

1. *stipiformis*, panic. calycib. bifloris, aristis semine duplo longioribus, culmo ramoso. Lin. Mant. p. 34. Willd. sp. 1. p. 444. Hab. ad Cap. b. spci. Culmi saepe reclinati, geniculis fuscis. Ramus etiam florifer. L.

2. *pennsylvanica*, panic. attenuata, cal. bifloris, seminib. villosis, aristis calyce duplo longioribus. Lin. Sp. l. 117. Hab. in Pennsylvania. ☉

3. *brevis*, paniculata, calycib. subtrifloris, seminib. brevibus obtusis, apice bidentatis, arista dorsali scabra. Roth. germ. l. 40. Hab. inter segetes ducatus Bremensis.

4. *alba*, paniculata, calyc. bifloris, corol. pilosis, altera aristata. Vahl. symb. 2. p. 24. Hab. in regno Tunetano. Fol. glauca. Petala villis candidissimis ad basin pilosa. Vahl.

5. *strigosa*, panic. oblonga contracta secunda, flos. geminis apice biaristatis, dorso arista geniculata. Schreb. spicil. 52. Retz. obs. 1. p. 11. Hab. inter segetes. ☉ An Triscum?

6. *orientalis*, panic. coarctata secunda, spiculis bifloris horizontalibus parallelis, seminibus laevibus. Schreb. spicil. 52. A. racemosa. Thuil. Paris. p. 5c. Hab. in cultis.

7. *sativa*, paniculata, calycib. dispermis, seminibus laevibus altero aristato. Originem habet ex insula Juan Fernandez versus Chili. l. Var. flor. muticis et seminibus nigris. ☉

8. *Forskælei*, paniculata, calycib. trifloris cor. hirsutis aristatis, culmo ramoso, fol. involutis rigidis. Vahl. symbol. 2. p. 25. Avena pennsylvanica. Forsk. 23. n. 81. Hab. in Aegypto.

9. *nuda*, paniculata, calyc. trifloris receptaculo calycem excedente, petalis dorso aristatis; tertio flos. mutico. L. Sp. pl. 118. Hall. conum. nov. Goett. VI. p. 19. t. 2. et 4. Moris. s. 8. t. 7. f. 4. Hab. ? Affinis A. sativæ, sed semina decorticata decidunt. ☉

10. *fatua*, paniculata, calyc. trifloris, flosculis patulis omnibus aristatis basi que hirtis. Schreber. gram. 109. t. 15. Hab. in agris inter segetes. ☉ Gram. altum. Flos. barba lutesc.

11. *sterilis*, panicul., cal. 5-floris, flos. pilosis: interioribus muticis. Lin. Pet. Gaz. t. 38, f. 7. In Europa austr. Var. prioris? ☉

12. *elephantina*, panic. composita, cal. quadrifloris corol. pilosis bifidis aristatis. Thunb. prod. 23. Hab. in Cap. b. spei.

13. *sequiteria*, paniculata, cal. subtrifloris, flos. omnibus aristatis, receptaculis barbatis. L. Mant. 34. Schenchr. gram. 220. t. 4. f. 17. Hab. passim in agris. Flor. pilosi videntur, sed pili omnes insident pedicellis s. receptaculis intra calycem. L.

14. *glatior*, panic. subcontracta nutante,

glumis bifloris: flos. hermaphrodito submutico; masculo aristato, culm. geniculis alabris, radice repente. Willd. in N. Act. Soc. Herol. v. 2. Schreb. gram. 1. t. 1. Leers. t. 10. f. 4. Holc. *avenaceus* quorund. In pratis et pomariis frequens. ¶

15. *bulbosa*, panic. verticillata, glumis bifloris polygamis, genicul. pubescentibus, radice nodosa bulbosa. Willd. l. c. Av. praecatoria. Thuill. Hab. passim in agris et arenosis. An varietas?

16. *sempervirens*, panic. subpatula, cal. trifloris hermaphroditis basi lanatis, fol. rigidis subinvolutis intus striatis. Villars. Delph. 2. p. 140. t. 5. Hab. in montosis apricis Delphinatus. β. *striata*, fol. longissimis intus striatis, cal. 2-floro. Lam. ill. gen. Cresc. cum priore et in H. P. colitur.

17. *pullens*, panic. ramis erectis, cal. bifloris, cor. hirsutis, fol. setaceis. Link. in Bot. Journ. 2. p. 314. Hab. in Lusitania. Av. *elatior* minor dicitur.

18. *setacea*, fol. setaceis, vagin. lanuginosis, panic. purpurascens, flos. majusculis, val. 3-floris, aristis nigris recurvis. Villars. p. 144. t. 5. A. *subulata*. Lam. ill. 201. A. *aurata*. Allioni. Habit. in Helvetiae, Italiae et Gall. meridion. alpinis.

19. *odorata*, glum. trifloris acuminatis, flos. diandris, arista inclusa recurva. Hof. germ. ed. 2. p. 58. Holc. odoratus. L. Flor. dan. t. 663. Savastana hirta. Schrank. Flor. bav. 1. p. 33. In pratis pascuis montosis Europae australioris.

20. *redolens*, fol. involutis, glum. 3-floris, flos. lateralibus mascul. aristatis margine pilosis. Vahl. symb. bot. 2. p. 102. Sub Holco. Hab. in Terra del Fuego.

21. *palustris*, fol. planis linearibus, panic. confertiuscula, glum. 2-floris flos. glabris: altero mutico, altero ad apicem tenuissime aristato. Michaux, Flor. p. 72. In Gergor. et Carol. paludosis.

22. *pratensis*, panic. erecta, cal. subquinquefloris, recept. pilosis, fol. involutis serrulatis glabris. Smith. Brit. p. 141. Leers. tab. g. f. 1. Hab. in pratis et pascuis. Spic. majusc. purpureo-argent. ut in sequente.

23. *pubescens*, panic. erecta, subimplici, cal. subtrifloris, recept. barbatis, fol. planis vaginisque pubescentibus. Smith. l. c. p. 140. Leers. f. 2. In pratis, collibus et fruticetis.

β. *montana*, fol. caespitosis planis subhirsutis rigidis, panic. erecta ramosa, spicul. pedunculatis subtrifloris. Vill. delph. 1. p. 151. Hab. in pratis montosis. ¶

24. *versicolor*, subspicata, calyc. subquinquefloris, rachi pilosa. Willd. sp. 1 p. 452. Panic. spicata flavescens, spiculis sexfloris distinctis, rachi hirsuta, pedunc. longitudine spicularum. Vill. delph. 2. p. 142. t. 4. f. 5. Avena Scheuchzeri. Allion. pedem. 2250. Scheuchz. it. alp. 6. p. 455. t. 19. Hab. in Alpibus.

25. *distichophylla*, panic. subspicata, calyc. trifloris, flosculis basi pilosis, culmo basi ramoso, fol. distichis. Willd. sp. 452. A. culmis basi ramosis, foliis fasciculatis distiche patentibus, paniculae spiculis binatis trifloris. Villars. l. c. p. 144. t. 4. f. 4. Hab. in alpibus Helvetiae. Delphinatus. T.

26. *pumila*, flor. paniculato-spicatis, spicul. sub 4-floris, glum. dorso ciliatis aristis setiformem aequantibus. Desf. Atl. 1. p. 103. Hab. in Barbariae arenosis.

27. *hispida*, spic. racemosa (simplice) cal. 3-floris piloso-hispidis. Thunb. prodr. p. 22. Willd. sp. 1. p. 451. Av. capensis. Barm? Ad Cap. b. Spci. Veg. pilosa.

28. *mollis*, tota mollissime pubescens, panic. racemoso spicata, cal. 2-floris. Michaux, p. 72. Hab. in Canada.

29. *lupulina*, panic. coarctata ovata, cal. 3-4 floris lanceolatis, cor. villosis, gluma exteriori bisubulata, arista intermedia reflexa, vagin. tomentosa. Lin. suppl. 113. Thunb. prodr. p. 23. Hab. ad Cap. b. spci. Panic. lutea, arcte coarctata in figuram Coai lupulini.

30. *purpurea*, glaberrima, panicula coarctata, calyc. quadrifloris, cor. villosis aristatis, culmo decumbente. Lin. supp. 112. Cum priore. Glum. calycinae purpureae. Flor. laevigine alba vestiti.

31. *antarctica*, panic. coarctata, calyc. quadrifloris, cor. bifidis aristatis. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. spci.

32. *striata*, panic. coarctata variflora, glum. 5-flora, flos. subimberbibus, valv. exteriori striata, dorso longe aristata, sem. nudo. Michaux, Flora p. 73. Hab. per tractus montium a sinu Hudsonis ad Canadani.

33. *glumosa*, panicul. rariflora, gluma calyc. flos. 6 longiore, cor. valv. exteriori ex apice bicorni aristata. Michaux. For. p. 19. Avena spicata. Lin. Willd. 1. p. 453. Hab. in Pensylv. et Carol. Infloresc. revera panicula nec spica. Arista-basi spiralis. T.

34. *calycina*, spicata, gluma flos. 5 aequantibus. A. *calycina*, fol. planis basi pilosis, panic. simplicis spicul. 5-floris longitudine calycis. Vill. delph. 2. p. 148. t. 9. f. 9. Hab. in Delphinatus. Spic. secundae. C

35. *fragilis*, spicata, spica fragili articulata, cal. 4-floris flosculo longioribus. Lin. Mant. p. 326. Schreb. gram. 1. 24. f. 3. Hab. in Europa australi. Triticum non male refert. C

36. *bromoides*, subspicata, spiculis pluribus subconvolutis-teretibus 8-floris, aristis divaricatis. Lin. Monti. prodr. t. 66. In Helvetia, Monspelii, et in Algeriae colibus. T.

180. **SORGHUM.** Flor. polygami, paniculati. Flosc. gemini: altero hermaphrodito sessili, altero pistico pedicellato masculo neutrove.

Hermaphr. Cal. 2-valvis. *Cor.* 3-valvis: valv. secunda aristata, tertia nectaria villosa connectens. *Cor.* in masc. mutica. *Sem.* majuscula.

1. *vulgare*, panic. coarctata ovali: matrescente cernua, seminib. nudis utrinque subcompressis. Holc. Sorghum. Lin. H. Dora. Mieg. in Act. Helv. 8. t. 4. f. 3. Hab. in India. Sem. alba, puncto umbilicali nigro.

2. *bicolor*, glumis glabris nigris, seminibus globosis albis aristatis. Lin. Mieg. 1. c. p. 129. t. 4. f. 4. Gaertn. de sem. 2. p. 3. Hab. in Persia.

3. *rubens*, glumis glabris dilute castaneis semine dimidio brevioribus, seminibus nudis obovatis rutilantibus. Gaertn. 1. c. Besl. Eyst Autumn. II. t. 13. f. 12. In Africa.

4. *saccharatum*, panic. subverticillata patentissima, sem. ellipticis glumis villosis persistentibus tectis. Mieg. 1. c. p. 119. t. 4. f. 12. Altitudo humana. Fol. Sacchari, linea longitudinali alba. Lin.

5. *halepense*, panic. sparsa, glumis oblongis glabris, flor. hermaphroditis lanceolatis muticis, foemineo aristato. Lin. Schreb. gram. p. 129. t. 18. Mieg. t. 4. f. 2. In Syria et Mauritania. Sem. oblonga, complanata. Fol. acuminato-setacea.

6. *nitidum*, glumis 1-floris villosis, flor. omnibus muticis, culm. geniculis barbatis. Vahl. symb. p. 112. Sub Holco. Hab. in India.

181. **MIEGIA.** *Stigmata* tria. Flor. polygami paniculati. *Cal.* multiflorus, 2-valvis, brevis, inaequalis. *Cor.* 2-valvis (mutica). *Appendices* binii, lato-lanceolati,

acuti, plani in utroque flore.
Sem. nudum, maximum.

1. *macrosperma*. Arundinaria *macrosperma*, altissima glabra, fol. lineari-lanceolatis subulicatis. Michaux. Flor. amer. 1. p. 74. Ad ripas flum. Mississippi. Martio flor. ns. Habitus Bambois aut Nastii. Ab omnibus hucusque cognitis graminibus tum stigin. 3, tum semine grandi sane differt.

182. *TRICHOON*. *Cal.* 2-valvis, 1-florus. *Cor.* 2-valvis, cal. duplo major: uterque nudus. *Germen* lana cinctum.

1. *Karka*. Roth. Catal. 2. p. 2-3. Arundo *Karka*. Retz. obs. 4. p. 21. Vulgare in India orientali, ubi ad tecta adhibetur.

Obs. In Saccharo *Calyx*, in Arundine *Corolla*, in *Trichoo* *Germen* tantummodo lana est cinctum.

183. *ARUNDO*. *Cal.* 2-valvis, 1-multiflorus, glaber. *Cor.* lana (longa) cincta.

1. *Donax*, cal. quinqueflor. panic. diffusa, culmo subruticoso. L. Willd. sp. 1. p. 454. Hab. in Europa australi et Barbaria, Carniolia, collibus calidis. Gram. altum. Var. fol. pictis.

2. *mauritanica*, culmo fruticoso, flor. paniculatis, cal. 1-3-floris, glum. exteriori subaristata. Desf. atl. 1. p. 106. A. micranthus Lam. Monti prodr. t. d. f. Hab. in Algeria. Priori affinis sed tenerior, hortis sepiendis inservit. h

3. *festucoides*, spicul. compressis subquadrifloris, glumis mucronatis, fol. asperius striatis. Desf. Atl. I. p. 168. t. 34. A. biflora. Lam. A. mauritanica. Poir. et. A. tenax. Vahl? Hab. in Barbariae collib. incultis, ubi densissimo caespite crescit. T

4. *Phragmites*, calycib. quinquefloris panicula laxa. Hab. in Europae et Barbariae lacubus, fluviis. T.

5. *bifaria*, culmo erecto folioso, fol. bifariis, panic. coarctata, calycib. trifloris. Retz. Hab. in fossis Indiae orientalis.

6. *benghalensis*, calycib. bifloris, paniculae erectae pedicellis trifloris. Retz. obs. 5. p. 20. Hab. in Bengala. Culmi alti inanes crassi foliosi. R.

7. *sagittata*, altissima, cal. 2-floro; panic. densa nutante, fol. lanceolatis longissimis serrulato-aculeatis. Saccharum sa-

gittatum. Aublet Guian. 1. p. . . . Hab. in Gujana et St-Domingo. Gram. altissimum.

8. *conspicua*, calycib. unifloris, panic. erecto-patente, petali exterioris arista reflexa longissima. Forst. prod. n.º 48. Hab. in Nova Zeelandia.

9. *Epigejos*, calycib. unifloris, panicula erecta, fol. subus glabris lanceolatis. L. Smith. brit. 1. p. 145. Hab. in collibus aridis. T. Flosc. minus papposi.

10. *stricta*, cal. 1-floris, cor. lanceolatis glabris; exterioris arista dorsali erecta, panic. coarctata spiciformi, culm. simplici. Timm. in Roth. N. Beytr. 1. p. 118. Hab. prope Mecklemburg. T

11. *Calamagrostis*, cal. unifloris laevibus, cor. lanuginosis, culmo ramoso, fol. linearibus. Smith. l. c. Engl. bot. t. 403. Flor. Dan. t. 280. Hab. in uliginosis.

12. *bicolor*, panic. coarctata elongata, cal. 2-floro; flosc. altero sterili, glum. subaristatis. Desf. l. c. p. 107. t. 33. Hab. prope la Calle. T

13. *arenaria*, cal. 1-floris cor. longioribus, panic. spicata, flor. erectis muticis, fol. involutis pungentibus. Lin. Smith. brit. 1. p. 148. Flor. dan. t. 917. Moris. sect. 8. t. 4. f. 16. An huius generis? Phal. *arundinaceae* affinis. Ligula lanceolata, quae in Ph. arundinacea brevissima. In arenosis maritim.

184. *SACCHARUM*. Flor. omnes hermaphroditi. *Cal.* lanugine longa involucreatus, 2-valvis. *Cor.* 1-2-valvis, mutica, aut aristata. *Stam.* 1-3.

1. *Teneriffae*, foliis subulatis planis, flor. paniculatis muticis, involucre piloso nullo, calyce villosissimo. Lin. suppl. p. 106. Willd. sp. 1. p. 320. Hab. in Teneriffa.

2. *japonicum*, racemis fasciculatis, petalis ciliatis; exterioribus aristatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 328. S. polydactylon. Thunb. jap. p. 42. Houttuy. t. 89. f. 1. Hab. in Japonia.

3. *spontanum*, fol. convolutis, panicula effusa; spicis capillaribus simplicibus, flor. remotis involucreatis geminatis; altero pedunculari. Lin. suppl. 106. Hab. in Malabar aquosis. T. Culmi 12-pedales.

4. *officinarius*, flor. paniculatis geminatis; altero sessili, altero pedicellato, cor. 1-valvi mutica. Lin. Hort. cliff. p. 26. Rumph. amb. 5. p. 186. t. 74. f. 1. In utraque India. *β. violaceum*, fusco-violaceum, culm. nodis magis approximatis. Hab. in

India. Ulterius examinandum, et determinandum gramen.

5. *arundinaceum*, paniculae confertae pedunculis divisis, flosc. geminis sessili pedicellatoque, coroll. trivalvibus polygamis. Retz. obs. fasc. 4. p. 14. n.º. 34. Habit. prope Tranquebar. Styli nigricantes. Culmi ad tectorum stratum adhibentur. Retz.

6. *polystachyon*, flor. paniculatis, spicis filiformibus longissimis fastigiatis, flosc. remotiusculis. Swartz. prod. 21. Ejusd. Flor. p. 127. In insula St. Christophori, Ind. occid. Rachis filiformis.

7. *benghalense*, panicul. confertae pedunculis divisis, flosc. geminis sessili pedicellatoque, coroll. bivalvibus hermaphroditis. Retz. obs. fasc. 5. p. 16. Hab. in Bengalía. $\frac{1}{2}$ A priore differt. cor. bivalvibus, et stigm. fusco-flavescentibus. Retz.

8. *repens*, panic. patula, flosc. geminatis sessilibus aristatis, fol. planis, vaginis pilosis. Willd. p. 322. Hab. in Guinea. $\frac{1}{2}$ Culm. pedalis simplex. Panic. patens, magnitudine Holci lanati. W.

9. *Ravennae*, panic. laxa: rachi lanata, flor. aristatis. Andropogon Ravennae. Lin. Spec. p. 1481. A. farcta alium Ravennae. Zanoni. hist. 1. p. 64. t. 24. Moris. 1. 8. t. 8. f. 32. Hab. in Italia.

** IMPERATA: spic. cylindrica, flor. 2-andris.

10. *cylindricum (europaeum)*, panic. spicata cylindrica sericea, ramulis brevissimis composita, flor. muticis diandris, fol. convolutis. Lamark. encyc. 1. p. 588. t. 40. f. 2. Lagurus cylindricus. Lin. S. Sissa. Cav. ic. 3. t. 2. S. Thunbergii. Willd. 1. p. 323? Imperata arundinacea. Cyrill. ic. rar. 2. fasc. 2. t. 11. Hab. Monspelii, in Italia, Africa, Hispania et Barbaria. Habitu a Saccharis recedit. Spica nivea lanata. $\frac{1}{2}$

11. *Koenigii (indum)*, panic. spicata cylindrica, flor. diandris, culmo geniculis barbatis, fol. planis. Retz. obs. 5. p. 16. Hab. in India.

*** ERIANTHUS. Cal. gluma bivalvis, mutica, valvis linearibus-oblongis canaliculatis, basi villis densis involucreta. Cor. bivalvis: valva interiore longe aristata. 1-andra.

12. *giganteum*, vaginis lanatis, gluma villis brevioribus, valvis exterioribus villosis. Michx. Flor. Boreali. Amer. p. 55. Anthoxanthum giganteum. Walt. Gram. 6-9-pedale. Hab. in Carolinae humilis.

13. *brevibarbe*, vaginis collo subvillosis,

gluma villis longiore, valvis acutissimis nudis. Michaux. 1. c. In collib. Tennessee et Carolinae.

185. PEROTIS. Cal. nullus. Cor. bivalvis: valvulae aequales aristatae, lanugine involucreta.

1. *latifolia*, culmo simplici, fol. undulatis, geniculis glabris. Willd. Sp. 1. p. 323. Saccharum spicatum, flor. spicatis, fol. undulatis. Lin. Sp. pl. 79. Thunb. prodr. 1. 20? Pluck. alm. 177. t. 199. f. 1. Rheed. mal. 12. t. 62. (P. *Burmanni*, foliis planis lanceol. Willd. 1. c. Burm. ind. tab. 9. f. 3. Hab. in Indiae petrosis, et ad Cap. b. spei. ☉

2. *polystachya*, culmo ramoso, fol. planis, geniculis barbatis. Willd. 1. c. Saccharum panicum, floribus spicatis aristatis, culmo ramoso polystachyo. Lam. encyc. 1. p. 588. t. 40. f. 3. Hab. in India.

186. ANDROPOGON. Flor. polygami, geminati: altero hermaphrodito sessili; altero masculino rarius neutro pedicellato mutico.

HERMAPHR. Cal. 2-valvis, 1-florus. Cor. 3-valvis: valv. secundae minore aristata, tertia minima minuta. Stam. 1-3. Recept. s. rachis plerumque villosa. Involucr. s. villi fasciculus ad basin spicularum, in nonnullis fol. cymbiforme.

1. *filiforme*, spica simplici imbricata: sericibus binis florum aristatorum sessilibus; binis pedicellatorum muticorum, cal. univalvibus. A. *serratum*. Retz. obs. bot. 5. p. 21. Cresc. ad oras flum. in Bengalía. Arista longa.

2. *crinitum*, spic. solitaria hirsuta, aristis nudis geniculatis longissimis. Thunb. Flor. jap. p. 40. Hab. in Japonia.

3. *caricosum*, spica solitaria imbricata, seminibus hirsutis, aristis nudis contortis. Lin. Rumph. amb. t. 7. f. 2. A. Hab. in India. Gram. 4-5-pedale.

4. *divaricatum*, spica oblonga, flor. lanatis remotis divaricatis, arista flexuosa nuda. L. Reich. syst. 4. p. 299. Lagurus. Gron. Virg. p. 135. In Virginia.

5. *Gryllus*, panic. pedunc. simplicissimis trifloris, flosc. hermaphrodito aristato ciliato basi barbato. Lin. Amoen. 4. p. 332. Festuca urticulis lanugine flavescentibus. Bauh. pin. Hab. in Europ. australi et in Barbaria.

6. *serratum*, panic. laxa, flosculo altero sessili, altero pedicellato, pedicellis hirsutis. Thunb. jap. 41. Hab. in Japonia.

7. *cotuliferum*, panic. patula villosa, arista tortili nuda, pedicellis incrassatis pateriformibus. Thunb. l. c. Hab. in Japonia.

8. *avenaceum*, fol. asperis, panic. oblonga subcoarctata, flor. breviusculis villosis, arista contorta Michaux, Flor. 1. p. 58. Hab. in pratis Illinoensis. in America.

9. *saccharoides*, panic. ramis simplicibus, flosc. geminatis: hermaphrodito aristato sessili, altero mutico tabescente, pedicellis rachibusque lanatis. Swartz prodr. p. 26. et ejusd. Flor. 1. p. 205. Hab. in siccis montosis Jamaicae australis. Vag. nodi villosi.

10. *fastigiatum*, panic. spicis solitariis, pedunc. elongatis subfastigiatis, rachi laxata, floscul. utrisque lanatis. Swartz. l. c. p. 207. Crescit cum priore. Glum. calycin. purpurascunt. Sw.

11. *Nardus*, panic. ramis supradecompositis proliferis. Lin. Flor. Zeyl. p. 45. (*sub Laguro*). Rumph. amb. 4. p. 22. t. 6? Hab. in India. Rad. odorata carminativa. Culm. arundinacei, alti. An *Nardus indica* officinarum? Vid. Lam. encycl. 2. 375.

12. *glaucum*, invol. cymbiformi, panic. foliacea, involucellis calycibusque bidoris, flor. sessilium cal. trivalvibus. Retz. obs. bot. 5. p. 20. Hab. in India. Anthistirii affine.

13. *lanigerum*, fol. convolutis, spicul. lanuginosis vagina cinctis, cal. exteriore nullo, flor. hermaphrodito aristato. Desf. Atl. 2. p. 379. In montib. prope Cassam. Styl. 1. Rachis villosa. D. An hujus generis?

14. *macrourum*, fol. vaginis villosis, panic. lateralibus fasciculato-polystachyis, flor. 1-andris. Michaux. p. 56. In Carolinae humidis.

15. *dissitiflorum*, vagin. glabris, culm. stricto, spicul. lateralibus dissitis, flor. 1-andris. Michaux. Cum priore sed in sylvis. Involucr. etiam cymbiforme.

Obs. Utraque species a Waltero ad *Cin-nam* relata.

16. *scoparium*, vagin. villosis, panic. elongata stricta, spicul. simplicibus 3-andris, flosc. neutro aristato. Michaux. l. c. Hab. in aridis sylvarum Carolinae.

17. *cymbarium*, panic. sparsa, bracteis cymbiformibus, flor. transversis aristatis ternis. Mant. 303. Hab. in India orientali.

Culmi orales, farcti. Bractea triflora, cymbiformis.

18. *distachyum*, spicis binis terminalibus, culmo indiviso. Ger. prov. 106. t. 3. f. 2. Jacq. Coll. 1. p. 165-166. Ic. rar. Desf. Atl. 1. p. 377. Scheuchz. gram. p. 95. Bocc. sicc. 20. t. 11. Hab. in collibus Algeriae, Siciliae, Galliae. Fol. vaginantia Aristae spicae accumbunt, in sicca planta recedunt. Jacq.

19. *Schoenanthus*, panic. spicis conjugatis ovato-oblongis, rachi pubescente, flosc. sessilibus, arista tortuosa. Rumph. amb. 5. t. 72. Ventenat. Descr. 88. Hab. in Indiae maritimis. In hortis colitur ob odorem gratum. Spiculae post anthesin reflexae pendulae.

20. *incurvatum*, spicis filiformibus subdigitatis, flor. geminatis: foemineo pedicellato aristato; masc. sessili mutico, cal. 1-valvibus. Retz. obs. bot. 5. p. 21. Habit. in Tranquebaria juxta flumina. Arista longa torta partim fusca, partim alba. R.

21. *binatum*, spicis geminatis lanatis, cal. valvula altera acuminata: altera truncata 3-dentata, petalo majore aristato. Retz l. c. Culm. filiformis. Racheos dente lanugine flava fasciculata. Species ulterius examinanda.

22. *virginicum*, panic. spicis conjugatis: pedunculis simplicibus, rachi lanata, flosc. muticis: masculo tabescente. Sloan. hist. 1. p. 110. t. 68. f. 2. Hab. in America.

23. *bicorne*, paniculae spicis conjugatis, pedunculis ramosissimis, rachi lanata, flosc. arista caduca: masculo tabescente. Forsk. aegypt. cent. 6. p. 173. Sloan. 1. hist. p. 42. t. 15. Hab. in Brasilia, Jamaica.

24. *hirtum*, panic. spicis conjugatis, calycibus hirsutis. L. Roy. Lugd. B. 53. Pluck. alm. 175. t. 92. f. 1. Bocc. Mus. 315. t. 8. f. 1. In Lusitania, Sicilia, Smyrnae, et Algeriae collib. Pedunculi hirti, uti et rachis et glumae.

25. *muticum*, spicis digitatis subternis: flosc. alternis sessilibus muticis. Hab. ad Cap. b. spei. Petala contraria calyci, colorata, tenera. Aristae nullae. L.

26. *Ischaemum*, spicis digitatis plurimis, flosc. alternis sessilibus muticis, pedicellis lanatis. Hab. in Europae australioris aridis, collibus et arvis.

27. *provinciale*, spicis pluribus, fasciculatis laevibus, floscul. alternis subsessilibus secundis aristatis. Retz. obs. 3. p. 43. An provinciale, spicis digitatis, floscul. alternis geminis, masculo mutico peduncu-

culato. Ger. prov. p. 107. t. 4. Hab. in Galia meridionali.

28. *undulatum*, spic. digitatis plurimis, flosc. obtusis sessilibus aristatis pedicellatis muticis, geniculis barbatis. Vahl. symb. p. 102. In Ind. orientali. Ligula membranacea auda.

29. *pertusum*, spicis digitatis, glumis valvula pertusa. Lin. Mant. p. 301. Sub Holco. Hab. in Ind. orient., ad Madagascar. Petal. exterius in flore masculo non pertusum. Spic. 5. L.

30. *muricatum*, panic. contracta, spic. stricis verticillatis, cal. muricatis muticis. Retz. obs. 3. p. 43. A. squarrosus. Linn. suppl. 433? In India. Radix ob odorem gratum usitatissima apud incolas.

31. *ambiguum*, panic. coarctata, ramis setaceis, cal. 1-floro, cor. imberbi longe aristata. Mich. For. 1. p. 58. In Carolinae sabulosis.

Obs. Haec antecedensque species, quo Palaris hispida. Thunb. Flor. jap. p. 44. pertinere videtur, aliud ad genus forte amandanda.

187. **ANTHISTIRIA.** Flor. polygami fasciculati in panicula laxa. *Masc.* 4, sessiles, verticillati, *Neutri* 2, pedicellati, 3-valves, mutici. *Hermaphr.* centralis, 2-valvis. Arista tortilis e fundo corollæ.

1. *imberbis*, culmo ramoso, glumis imberbibus. Desfont. in Journ. de Physiq. vol. 40. p. 292. t. 1. A. *imberbis*; fol. involucrique nudis. Retz. obs. 3. p. 11?

2. *ciliata*, glumis barbato-glandulosis, vaginis glabris. Desf. l. c. Andropogon *nautans* et 4-valve. Lin. Hab. in Virginia et Jamaica.

3. *barbata*, glumis vaginisque barbato-glandulosis. Desf. l. c. t. 2. Gaerlin. dessem. 2. p. 465, t. 175. Androp. *ciliatum* panic. cernua, cal. exteriori multifido ciliato, aristis contortis pilosis. Thunb. jap. p. 40. In Ind. Japonia. An prioris varietas?

4. *prostrata*, culmis ramosissimis radicibus prostratis, fol. laevibus margine scabris. Androp. *prostratum*. Lin. Mant. p. 304. Hab. in India orientali.

5. *glauca*, culmo ramoso compresso, glumis imberbibus, arista inferne villosa geniculata. Desf. Atlant. 2. p. 380 t. 254. *Sipa paleacea*. Poir. iter. 2. p. 107. Habit. in collib. arenosis in Barbaria.

6. *gigantea*, culmo altissimo arundinaceo, fol. canaliculatis, calycibus pilosissimis, flor. panic. Cav. icon. 5. p. 36. t. 458. Hab. in ins. Philippica Luzon. Culm. 10-pedalis. Arista o. An hujus generis?

Obs. Forte nonnullae species ex affini genere Andropogon huc quoque pertinent.

188. **APLUDA.** Flor. polygami. *Involucr.* 2-phyllum: foliol. 1 majus parum distans. *Cal.* 4-florus, cartilagineus, b'lamellatus s. 2-valvis: valv. anteriore truncata. *Flosc.* inferiores gemini: altero *hermaphrodito*, altero *samineo*; prioris *cor.* 1-valvis, navicularis, striata, 3-dentata dente intermedio aristata. *Stigm.* crassa hirsuta. *Flosc.* superiores *masculi*, valv. truncatae insistentes (vid. Gærtn. de Sem. et fruct. plant. 2. p. 466, t. 175.)

1. *mutica*, foliis lanceolatis, flosc. omnibus muticis. Lin. syst. pl. ed. Reich. 4. p. 311. Culmi longissimi, debiles, glabri, geniculis tumidis. Panicula angusta, lateribus exiens ex vaginis foliorum minorum uti Andropogon.

2. *aristata*, foliis lanceolatis, flosculis masculis muticis: sessili arista terminali. Amoen. acad. 4. p. 303 Scheuch. gram. 118-119. t. 3. f. 2. Hab. in India.

3. *Zeugites*, fol. ovatis flosc. masculis muticis: sessili arista terminali. Amoen. acad. 6. p. 412. *Zeugites* arundinaceus ramosus minor rufescens, panicula sparsa terminali. Brown. jam. 341. t. 4. f. 3. Hab. in Jamaica.

189. **ISCHEMUM.** Flor. polygami. *Hermaphrod.* *Cal.* 2-florus, 2-valvis: valv. subæqualibus cartilagineis; exteriori subovata gibba apice bifida. *Cor.* minor 2-valvis: valv. exteriori ventricosa, mutica aut aristata, bifida. *Nectar.* foliolis 2, spatulatis, truncato-marginatis. *Masc.* Flor. idem sed. mutici. Flor. spicati, geminati. *Schreb.*

1. *muticum*, floribus muticis. Lin. Retz. obs. bot. 6. p. 34. Hab. in India. Fol. in hac et sequentib. lanceolata. T

2. *imberbe*, floscul. nudis, cal. sessilibus, valvula exteriori utrinque binodulosa, corollaeque arista tortili elongata. Retz. l. c. p. 35. J. aristatum. Lin. Hab. in China. ♀

3. *barbatum*, cal. bifloris, basi barbatis, margineque ciliatis: sessilibus margine utrinque binoduloso, arista torta geniculata. Retz. l. c. Hab. in Java. Spic. racheos dentes ciliato-barbati.

4. *ciliare*, culm. decumbente, cal. bifloris, pedicellis ciliatis, flore utroque foemineo, arista torta geniculata. Retz. l. c. p. 36. Hab. in China. Culm. genicula pilosa.

190. MANISURIS. Flor. polygamij spicati. *Hermaphr.* Cal. 1-florus, 2-valvis: valv. inaequales, variae. Cor. 2-valvis, inclusa. Masculi et neutri Cal. regularis s. uniformis.

1. *granularis*, spicis pluribus, flor. hermaphroditis valvula exteriori orbiculari punctato-callosa. Cenchrus granularis. Lin. Swartz. Flor. t. p. 186. Gaertn. de Sem. 2. p. 463. t. 175. Roxb. Corom. 2. fasc. 1. p. 11. t. 118. Panicum clandestinum Lin.? Hab. in siccis Jamaicae et in Indiae fruticetis.

2. *Myurus*, spicis solitariis, flor. hermaphr. valv. late marginata laevi. Lin. Mant. p. 300. Roxb. l. c. t. 117. In Indiae siccis et arenosis. Valv. apice lateribusque emarginatae.

191. POMMEREULLA. Cal. 2-valvis, subdistans, 4-florus, (Involucr. Lin.) Cor. 2-valvis: valv. altera major, 5-dentata: dente intermedio aristato. Styl. 2. Spica unilateralis? (Ex Roxburgh Plant. coromand. vol. 2. Fasc. 2. t. 131.)

1. *Cornucopiae*. Lin. suppl. p. 105. Willd. sp. 1. p. 319. Hab. in Indiae fruticetis et locis incolitis. Styrp. repens. Culm. brevis foliosus. Spic. vaginae fol. partim. inclusa. Linnaeus (filius) perperam hoc genus ad 2-andriam 1-gyniam retulit.

192. ROTTBOELLA. Flor. polygami. Rachis articulata teretiuscula, in pluribus filiformis. Cal. ovato-lanceolatus planus uni-vel bivalvis. Cor. minor, 2-valvis. Flosc. alterni in rachi flexuosa.

• *incurvata*, spica tereti subulata in-

curvata, gluma bipartita subulata adpressa. Willd. sp. 1. p. 463. Lin. suppl. 114. Flor. Dan. t. 938. Cav. ic. t. 213. Aegilops incurvata. Lin. Moris. hist. 3. 6. 8. t. 2. f. 8. Hab. in Europae maritimis.

2. *filiformis*, spica recta subcompressa subulata, gluma calycina ensiformi adpressa, bipartita obtusa. Roth. Catal. bot. 1. p. 21. Ejusd. N. Beitr. p. 120. Barr. ic. 1164. t. 117. f. 1. Hab. in Europa australi. ♀

3. *biflora*, spic. tereti subulata erecta, cal. 2-floris 2-valvibus, glumis obtusis adpressis, margine scariosis. Roth. N. Bot. Beytr. 1. p. 121. Hab. in Hungaria. Ligula longa. ☉

4. *monandra*, spic. tereti subulata erecta, glum. calycina 1-valvi integra, flosc. aristatis. Roth. l. c. floribus distichis. Cav. ic. n°. 41. t. 39. f. 1. Hab. circa Madritum. ☉

5. *setacea*, spica setacea secunda subincurva. Roxb. Corom. 2. p. 18. t. 132. Naradus indicā. Lin. In Indiae vallibus. Cor. hirsuta.

6. *fasciculata*, spic. axillaribus aggregatis arcuatis, flor. 4-fariam dispositis. Desf. Atl. 1. p. 110. t. 36. Cresc. ad lacuum ripas prope la Calle in Barbar. ♀

7. *repens*, spica tereti subulata, gluma calycina univalvi indivisa. Forst. prod. n°. 151. Hab. in insulis maris pacifici.

8. *laevis*, pedunc. longissimis, spica flosculis binatis lateralibus, calycibus ovatis impunctatis laevibus. Retz. obs. 3. p. 11. Hab. in Tranquebaria.

9. *Thomaca*, minuta, spica simplici subulata, fol. pilosis breviori, culmo vaginis tecto. Willd. 1. p. 465. (R. pilosa). Roxb. Coromand. 2. t. 132. Hab. in Malabar et Tranquebaria.

10. *compressa*, spica compressa subulata, gluma calycina lanceolata plana indivisa. Lin. suppl. 114. Retz. obs. 3. p. 12. R. *Tripsacoides*. Lam. ill. p. 205. t. 48. f. 1. B? Hab. in Indiis.

11. *hirsuta*, spica subulata hirsuta, flosc. hermaphroditis patentibus, sterilibus pedicellatis adpressis. Vahl. symb. 1. p. 11. Hab. in Aegypto. ♀

12. *Coelorachis*, spica tereti unilaterali, flosc. geminis, altero pedicellato, calyce bivalvi. Forst. prod. n°. 49. Hab. in insula Tanna. An sequens varietas?

13. *dimidiata*, culm. decumbentibus, spica dimidiata compressa lineari, latere exteriori aggregato-flosculosa, inferiori

heri nudo. Lin. suppl. 114. Mich. 1. p. 60. Hab. in utriusque Indiae arenosis et maritimis.

14. *exaltata*, spica tereti-filiformi undique flosculosa, glumis ovatis obtusis, vaginis punctato-hirsutis. Lin. suppl. 114. Hab. in Indis. Gramen altum culmo farcto. Vaginae sulcatae punctatae, punctis elevatis, utra terminatis.

15. *corymbosa*, spicis aggregatis lateralibus filiformibus, flosc. bifariis patentibus, fol. basi ciliatis. Lin. suppl. 114. R. punctata. Retz. obs. 3. p. 12. Aegilops exaltata. Lin. Hab. in Malabar ad fossas agrorum.

16. *muricata*, spicis teretibus pluribus longe pedunculatis, cal. ciliato-aculeis, neutris bifidis. Retz. obs. 3. p. 12. Hab. in India orientali.

17. *sanguinea*, panic. spicis aristatis alternis simplicibus pedunculatis, bract. laterali ciliata. Retz. l. c. p. 25. Habit. in China.

193. *COLLADEA*. Flor. spicati. rachis flexuosa. Cal. 2-4-partitus: laciniis subovatis basi sinu (dentate) distinctis, 2-floris. Cor. 2-valvis, cal. brevior, mutica aut aristata.

1. *distachya*, aristata. Colladea culm. ramoso, fol. cordatis lanceolatis acutissimis, vaginis cymbaeformibus. Cav. ic. 5. p. 37. t. 460. Hab. in humilis insulae Mindanae in America. Arista tortilis prope germen inserta. C.

2. *monostachya*, mutica. Tripsacum hermaphroditum. Lin. Dec. pl. t. 9. Hab. in Jamaica.

Obs. A Tripsaco tam ob habitum, quam ob glumas calycinas partitas omnino diversa.

194. *ÆGILOPS*. Cal. subtriflorus, coriaceus latissimus multiaristatus, aristis rigidis divergentibus. Cor. 2-valvis: valva exterior ovata, aristis 2-3 terminata. Flor. polygami et hermaphroditi spicati.

1. *coata*, spica brevi ovata, cal. omnibus 3-4-aristatis. Lin. Gaertn. 2. t. 175. Moris. s. 8. t. 7. f. 10. Hab. in Europa meridionali et in Barbaria. Glauca. Rach. compressa. ☉

β? *geniculata*, culm. elongato, geniculato, fol. villosis, glumis 4-aristatis. Roth. Beobacht. p. 45.

2. *caudata*, spica elongata, cal. muticis: terminali aristis 2 longissimis rectis. Lam. enc. 2. p. 146. Cal. omnibus 2-aristatis. Lin. Hab. in Candia.

3. *triuncialis*, spic. elongata, cal. inferioribus 2-aristatis. Schreb. gram. t. 10. f. 1. Crescit in locis aridis cum priore. Aristae 2-3, longissimae. Cal. villosus. ☉

4. *squarrosa*, subinermis: spica subulata aristis longiore. Schreb. gram. t. 10. f. 4. Buxb. cent. 1. t. 50. f. 3. Habit. in Oriente et prope Mascar. Cal. 1-3 aristatus: aristae breves. Rachis nodosa. ☿

195. *ELYMUS*. Flor. spicati. Cal. involucriformis 4-phyllus lateralis, bivalvis, aggregato-ternus multiflorus.

1. *arenarius*, spica erecta arcta, calycibus tomento is flosculo longioribus, fol. pungentibus. Willd. Sp. 1. 467. Habit. ad Europae littora marina, inque arena mobili. Fol. arundinea glauca involuto-mucronata. Ligula exigua. ☿

2. *geniculatus*, spica inflexo-pendula laxa, cal. setaceis patulis, spicula longioribus, fol. mucronato-pungentibus. Smith. brit. t. p. 151. Amoen. Acad. 7. t. 2. f. 5. With. arrang. 1. t. 2. f. 26. Hab. in Angliae littorib. maritimis. Priore altior. ☿

3. *giganteus*, spica erecta arcta, spiculis cenis sexfloris villosis, cal. subulatis glabris, spicula longioribus. Vahl. symbol. 6. p. 10. E. racemosus. Lam. Hab. Grain. altum. Spica stricta, viridi-pallens.

4. *sibiricus*, spica pendula arcta, spiculis binatis calyce longioribus. Schreb. gram. t. 21. f. 1. Emcl. sibir. 1. p. 323. t. 28. Hab. in Sibiria. Var. Spic. 3. ☿

5. *tener*, spica pendula, flosculis geminis. Lin. suppl. 114. Hab. in Sibiria. Collum bipetalis geniculis rubris. Aristae saepe flexuosae.

6. *canadensis*, spica nutante patula, spiculis inferioribus ternatis: superioribus binatis. Moris. s. 8. t. 10. f. 2. Hab. in Canada. β? Elymus philadelphicus? L.

7. *virginicus*, spica erecta, spiculis trifloris, involucro striato. Sp. pl. 123. Habit. in Virginia. Spic. basi fol. vagina inclusa?

8. *striatus*, spica erecta, spiculis bifloris pubescentibus, involucro striato brevioribus. Willd. sp. 1. p. 470. Hab. in America bor.

9. *europaeus*, spica erecta: spiculis bifloris aristatis, involucro laevi aequalibus.

Hordeum cylindricum. Murr. prodr. p. 43. *H. sylvaticum*. Huds. Involucr. 6-phyllum ut in *Hordeis*. Hab. in sylvis umbris.

10. *Caput Medusae*, spiculis bifloris, involucri setaceis patentissimis. Schreb. gram. t. 24. f. 2. Hab. in Lusitaniae et Hispaniae mariumis.

11. *Hystrix*, spica erecta, spiculis patentibus involucri desuntis. Lin. In Oriente. *Asperella Hystrix*. Humboldt.

196. **HORDEUM**. Flor. spicati. *Cal.* 1-2-florus hexaphyllum involucriformis; foliolis per paria digestis, setaceis. *Flosc.* terni intermedio sessili, lateralibus stipitatis (saepius sterilibus). *Cor.* stipitata, 2-valvis acuta: exteriore aristata.

1. *vulgare*, (*sativum*) flosc. omnibus hermaphroditis aristatis: ordinibus duobus erectioribus. Lin. Willd. spec. 1. p. 472. *β. caeleste*, seminibus decorticatis. Habit. circa Mergamen in Sicilia. L. Var. sem. nigris. ☉

2. *hexastichon*, flosc. omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus sexforam positus. Viborg. cereal. 30. t. 2. ☉

3. *distichon*, flosc. lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus imbricatis. Viborg. t. 3. Moris. s. 8. t. 6. f. 1. Hab. ad Samaram, Tartariae fluvium. ☉

4. *Zeocriton*, flosc. lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus patentibus corticatis. Viborg. t. 4. ☉

5. *strictum*, floscul. lateralib. masculis muticis, involucri aristatis scabris glabris, radice bulbosa. Schousb. Maroc. Desf. atl. 1. p. 113. t. 37. Cresc. in camp. aridis regni tunetani. Sequenti va. de affine. ☉

6. *bulbosum*, flosc. omnibus fertilibus ternis aristatis, involucri setaceis basi ciliatis. Amoen. acad. 4. p. 304. Bar. ic. 112. f. 2. Moris. s. 8. t. 6. f. 7. Hab. in Italia, Oriente. ☉

7. *marinum*, flosc. lateralibus masculis aristatis, involucri intermediis ciliatis lanceolatis. Flor. dan. t. 629. Ubique vulgare. ☉

8. *pratense*, flosc. lateralib. masculis brevius aristatis: dorso hirsutis, involucri scabris hirsutis. Roth. N. bot. Beytr. 1. p. 124. Smith. brit. 156. *H. maritimum*. Roth. germ. t. 1. p. 51. Engl. bot. t. 409. *Hordeum nodosum* Lin. Hab. in pratis et pascuis.

9. *secalinum*, flosc. lateralibus neutris brevius aristatis: dorso glabris, involucri setaceis scabris. Roth. l. c. 125. Willd. spec. 1. p. 475. Gramen spicatum *secalinum minus*. Scheuchz. gram. 17. n. 3. Monti gram. p. 60 f. 96. Hab. in Europae pratis, minus frequent. +

10. *maritimum*, flosc. lateralibus masculis, brevius aristatis, dorso glabris, floscul. lateralium foliolo interiore semiovalo. Roth. Beytr. p. 127. Smith. l. c. Flor. dan. t. 630. *H. maritimum*, flosculis omnibus aristatis, lateralibus masculis, involucri scabris, interioribus masculorum semilanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 25. Cresc. in pascuis et arenosis maritimis. ☉

11. *rigidum*, flosculis lateralibus spuriiis aristatis, involucri lateralis foliolo altero margine exteriore alato. Roth. Catal. p. 24. Monti gram. f. 93. Hab. in Ducatu Oldenburgensi. Involucri intermedia scabra nec ciliata. R

12. *Hystrix*, floscul. lateralibus masculis brevius aristatis dorso glabris, involucri omnibus aristatis scabris rigidis patentibus, spica ovata subcompressa. Roth. N. Beytr. Musd. Cat. 1. p. 23. In Hispania. ☉

13. *jubatum*, aristis involucrique setaceis longissimis. Sp. pl. 126. *Elymus crinitus*. Schreb. gram. 15. t. 24. f. 3. Buxb. cent. 1. p. 33. t. 52. f. 1. Hab. Smyrnae. ☉

197. **SEGALE**. *Cal.* oppositus, 2-valvis, aut multiflorus, solitarius: glum. lineari-lanceolatis, laevib. aut utrinque canaliculatis.

1. *cereale*, glumarum ciliis scabris, squamis calycinis angustis minoribus. Hab. in Creta. Spic. passim ramosa. ☉

2. *villosum*, glumarum ciliis villosis, squamis calycinis conneiformibus. L. Willd. sp. 1. p. 471. Buxb. cent. 5. p. 21. t. 47. Hab. in Europa australi, et in Oriente. ☉

3. *orientale*, glumis hirsutis, squamis calycinis subulatis. Willd. in N. Act. Ber. 2. t. 4. f. 3. Hab. ad Archipelagum.

4. *creticum*, glumis extrorsum ciliatis. Sp. pl. 125. Hab. in Creta.

5. *pungens*, spica subovata glumis subulatis scabris pungentibus. Hab. An *Triticum squarrosum*, spica ovali squarrosa, spiculis distichis, calycibus trifloris patentissimis, valvul. calycinis corollinisque lineari-subulatis scabris rigidis. Roth. N. Bot. Beytr. 1. p. 128-129. (Hab. in Aegypto). Verum in meo gramine cal. 4-6-florus est: descriptio Rothii ceterum

convenit. Glumae sub lente ad marginem aculeatae.

6. *prostratum*, spica unica ovata compressa bifaria, glumis glabris aristato-mucronatis. Triticum. Lin. suppl. 114. Willd. spec. 1. p. 480. Jacq. hort. 3. p. 540. t. 19. f. 4. Agropogon triticeum. Gaertn. Hab. in desertis Caspicis. Calycis forma cum prioribus convenit, hinc hujus potius loci.

7. *pumilum*, spica ovata, glumis subaristatis: calycinis bisulcatis. Lin. suppl. p. 115. sub Tritico. Hab. in Sibiria. An sativum distinctum?

108. **TRITICUM**. *Cal.* bivalvis, solitarius, multiflorus. *Flos* obtusiusculus, glumis muticis aut interrupte aristatis. *Spiculae* breviusculae e latere plano rachi approximatae.

1. *sativum*, a *aestivum*. calyce quadrifloro ventricosus glabro imbricato aristato. Lin. Willd. sp. 1. p. 476. Hab. apud Baethiros in campis. ☉

β. *hybernium*, calyc. quadrifloro ventricosus. Levi imbricato submutico. Lin. Batk. t. 40. f. 1. 2. 3. ☉

Obs. Locus natalis genuinus hujus et specierum 3-5 sequentium adhuc incertus est.

γ. *durum*, culm. fere to, glumis pubescentibus aristatis, seminibus duris. Desf. atl. 1. p. 114. T. *sativum*. Lam. enc. 2. p. 557. Hab. in Barbaria, ubi frequenter praeiens hoc gramin.

2. *compositum*, spica composita, spiculis confertis aristatis. Lin. suppl. 115. Moris. hist. 3. p. 105. s. 8. t. 1. f. 7. Hab. in Aegypto. Seritur Neapoli. ☉

3. *polonicum*, calyc. bifloro nudo, flosculis longissime aristatis, racheos dentibus barbatis. Moris. s. 8. t. 1. f. 8.

γ. *turgidum*, calyc. quadrifloro ventricosus villosus imbricato obtuso. Syst. Veg. 108. Moris. l. c. t. 1. f. 14. Hab. Etiam varietas prioris videtur.

4. *Spelta*, calyc. quadrifloro truncato, flosculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro. T. flor. quaternis, duobus secundis glumis adherentibus. Hall. helv. n. 1424. Moris. t. 6. f. 1. ☉

5. *monococcum*, calyc. subtrifloro: primo aristato; intermedio sterili. T. spica disticha, flor. ternis, fertili unico, glumis tridentatis, floralis aristato. Hall. helv. n. 1425. Moris. t. 6. f. 2. ☉

6. *hispanicum*, calyc. sexfloro flosculis secundis apice aristatis. Mant. 325. (T. *maritimum* sp.) Willd. sp. 1. p. 479. Hab. in Hispania. ☉

7. *juncum*, cal. truncatis 5-floris muticis, fol. involuto - mucronato-pungentibus. Smith. brit. 1. p. 157. Roth. N. bot. Beytr. p. 157. Schousb. maroc. pag. 52. Hab. in arenosis maritimis. Rad. repens articulata. Fol. superne pubescentia. Schousb. T.

* *pungens*, glaucum, radice repente, fol. denum subulato-convolutis pungentibus, glum. acuminatis muticis: carina submucronata. Triticum juncum. Auct. T. repens. γ Smith. l. c. p. 158.

8. *repens*, cal. subulatis multinerviis 5-floris, flos. acuminatis, fol. planis, radice repente nodosa. Smith. l. c. Willd. 1. p. 481. In cultis, ad saepes. Var. Spicul. aristatis.

α. *glaucum*, totum amoene glaucum, fol. planis, spiculis majoribus aristatis aut muticis. Lam. ill. 1. p. Cresc. cum antecedente.

β. *multiflorum*, altum totum viride, spicul. 8-floris subaristatis. In sylva Meudon observata a cl. Richard. Spic. fere spithamae. Fol. lata.

γ. *capillare*, spicul. subtrifloris, basi in pedicello flosculoso-villosis, aristis capillaribus glumis duplo fere longioribus. Passim in pratis provenit. Tener. sequenti affine.

9. *caninum*, cal. acuminatis subquingeneriis 4-floris, floscul. aristatis, fol. planis, radice fibrosa. Smith. p. 159. Elymus *caninus*, spica nutante erecta, spicul. rectis involucri destitutis: infimis geminis. Lin. Willd. spec. 1. p. 466. Moris. s. 8. t. 1. f. 2. Hab. ad saepes, in sylvaticis.

* *vaginans*, fol. vagina subventricosa spicem basi includente, spicul. 3-floris aristatis. Ex Americ. meridionali hoc gramin habeo.

10. *distichum*, calyc. quadrifloro glabro mutico, flor. distichis, fol. filiformibus. Thunb. prod. 23. Hab. ad Cap. b. spci.

11. *cristatum*, spicul. ovatis 6-8-floris muticis in spicam subtetragonam imbricatis. An Fromus cristatus? L. Willd. Sp. 1. p. 439.

12. *fragile*, spica tetragona, cal. 6-floris muticis subacutis, cor. obtusissimis, fol. radicalib. planis tomentosis, culmeis demum involutis, caule fragili. Roth. N. bot. Beytr. p. 138. Pluck. alm. t. 33. f. 4. Hab. Vagin. infimae densissime tomentosae. R. T.

13. *nigricans*, spica 4-gona, glumis margine villosis (nigrescentibus), aristis longis. In Normandiae maritimis observavit cl. Bory. Secale aut Hordeum refert, spica subtergida.

14. *caudatum*, spica parva, aristis longissimis 4-plo brevior. Scheuchz. gram. 1. f. 4. ic. optima. Mihi Dr. Schleicher, qui speciem hanc distinctam in Helvetia invenit, praeter Scheuchzerum a nemine descriptam. Glum. cal. brevius aristatae, corollinae vero aristae, 2. unc. fere longae sunt.

15. *maritimum*, humile, calycib. multifloris, floscul. mucronatis, spica basi ramosa L. Vahl. sym. ol. 2. p. 26. Festuca lanceolata. Forsk. descr. 22. Boeck. mus. 2. p. 133. p. 95. Hab. in Galliae et Angliae maritimis. Fol. longitudine culmi vaginis purpurascenjibus. L.

16. *lolioides*, spica elongata attenuata, spicul. ovatis diuantiibus: inferioribus pedunculatis. Lectum in ericetis prope Mans. Spica ultra spitham longa, basi subcomposita. Color viridis.

17. *tenellum*, calyce subquadrifloro, flosculis muticis, acutis, fol. setaceis. Sp. pl. 17. Hab. in Helvetia, Gallia.

199. *LOLIUM*. Cal. 1-phyllus, fixus, multiflorus. Spica simplex.

1. *perenne*, spica mutica, spiculis compressis multifloris. Leers. herb. t. 12. f. 1. Ubique vulgare.

β. *cristatum*, spiculis in capitulum distiche aggregatis; Scheuchz. Agrost? 2. Passim cum priore.

γ. *ramosum*, spica ramosa. Leers. l. c.

2. *tenue*, spica mutica tereti: spiculis trifloris. L. Sp. pl. 122. Hab. in Gallia, Germania et Helvetia. Var. prioris?

3. *temulentum*, spica aristata, spiculis compressis subsexflores cal aequantibus. Lam. ill. p. 206. t. 48. f. 2. Culm. superne scabro. Sm. Flor. brit. 1. p. 150. Leers. t. 12. f. 2. Hab. in Europae agris. Cal. passim 2-glumis. ☉

4. *multiflorum*, spica breviter aristata, spiculis compressis suboctodecimfloris, cal. triplo longioribus. Lam. l. c. Hab. passim inter segetes.

α. *compositum*, alsissimum, racemo longissimo interne composito, spicul. numerosis 16-20-floris subaristatis. Thuill. Paris. p. 62. In agris passim.

β. *arvense*, spica submutica; spicul. longitudine calycis, flosc. ellipticis, culm.

glaberrimo. Smith. Flor. brit. 1. p. 150. Morison, s. 8. t. 2. f. 1. Hab. in Angliae et Scotiae et Germaniae agris. 1. *temulentum* minus et totum glabrum. Huc. L. *remotum*. Schrank. An diversum a L. *multifloro*?

5. *maximum*, calyce longitudine spiculae multiflorae compressae, flosculis summis aristatis. Willd. sp. 1. p. 462. Hab. in Jamaica an varietas prioris?

200. *THUAREA*. Flor. laterales, polygami: inferiores hermaphroditi. *Rachis* membranacea demum involuta, decidua. Cal. 2-florus, 2-valvis. Cor. 2-valvis, ovata, mutica.

1. *sarmentosa*. Culm. repens. Fol. disticha, tomentosa. Hab. in Madagascariae arenos., ubi speculare hocce gramen ob spiculum, quae demum uti in *Arach. hypogaea* terram intrat, cum numerosis rarioribus aliis plantis observatum a Dom Aubert du Petit-Thouars necumque cum charactere generico benevole communicatum.

201. *SPINIFEX*. Flor. polygami. Cal. biflorus. 2-valvis; valvulis rachi parallelis. Cor. 2-valvis, mutica.

1. *squarrosus*. Frutescens, fol. spinescens. Moris. 2. 8. t. 8. f. 11. Hab. in India. Spica fere uti in *Triticum*.

TRIGYNIA.

202. *ERIOCAULON*. Cal. communis: capitulum imbricatum. *Petal.* 3-6 aequalia. *Stamina* supra germen. *Caps.* 3-locularis.

1. *triangulare*, culmo triangulari, foliis ensiformibus; capitulo ovato. Willd. Sp. pl. p. 485. Breyne. cent. t. 50. Moris. hist. 3. p. 253. s. 8. t. 16. f. 17. Hab. in Brasilia.

2. *quingulare*, culmo quingulari, fol. ensiformibus, calyce universal pentaphyllo. Pluck. Alm. 366. t. 221. f. 7. Hab. in India. h

3. *sexangulare*, culmo sexangulari, fol. ensiformibus. Burm. ind. t. 9. f. 4. Hab. in India.

4. *setaceum*, culmo sexangulari, fol. setaceis. Rheed. mal. 12. t. 61. Hab. in India.

5. *decangulare*, culmo decangulari, fol. ensiformibus. Pluck. amalth. t. 409. f. 2. Hab. in Americae septentrionalis paludibus.

8. *pubescens*, scapo subvillosa, fol. ensiformibus pubescentibus maximis, capitulo plano tomentoso. Lam. ill. gen. 1. p. 213. Hab. in India. Madagascaria.

9. *compressum*, culm. compresso tenaciter striato, cal. argenteo, capitulo superne plano tomentoso. Lam. l. c. Hab. in Carolina.

10. *fasciculatum*, surculo brevi folioso, fol. patentibus, scapis plurimis fasciculatis pilosis. Lam. ill. p. 214. t. 50. Hab. in Guiana.

11. *repens*, caule decumbente folioso, fol. ensiformibus recurvatis, scapis axillaribus solitariis. Willd. l. c. Lamark. encyc. 3. p. 264. t. 50. f. 2. Hab. in insula Bourboniae.

12. *umbellatum*, caule nudo umbellifero, involucrio polyphylo, radiis inaequalibus longissimis. Lam. l. c. t. 50. f. 4. Hab. in Guiana.

203. MONTIA. Cal. 2-phyllus. Cor. 1-petala, irregularis. Caps. 1-locularis, 3-valvis.

1. *fontana*. α . *repens*, caule repente, fol. ovatis. β . *erecta*, caule erecto fol. lanceolatis. Hab. ad scaturigines. ☉

204. PROSERPINACA. Cal. 3-partitus, superus. Cor. 0. Nux tri-locularis.

1. *palustris*, α . fol. linearilanceolatis imis inciso-serratis. β . fol. omnibus pectinato-pinnatifidis. Michaux, Flor. p. 76. Trisis, Mitch. Hab. in Virginiae paludibus.

205. HOLOSTEUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. unilocularis, subcylindracea, apice dehiscentis.

1. *cordatum*, foliis subcordatis. Lin. Willd. Sp. 1. p. 488. Herm. parad. 11. t. 11. Hab. in Jamaica et Surinamo.

2. *diandrum*, caulibus procumbentibus rigidiorebus, fol. subrotundis, flor. diandris. Swartz. prod. 27.

3. *succulentum*, fol. ellipticis carnosissimis. Amoen. acad. 3. p. 21. Hab. in Novaeboraco.

4. *hirsutum*, foliis orbiculatis hirsutis. Amoen. acad. 3. p. 21. Hab. in Malabar.

5. *umbellatum*, flor. umbellatis, petalis dentatis. Flor. dan. t. 1203. Hab. in arvis, gaminosis. Vere. Tota glauca.

206. KOENIGIA. Cal. 3-phyllus. Cor. nulla. Sem. 1. ovatum, nudum.

1. *islandica*. Flor. dan. t. 418. Lam. ill. gen. t. 51. Hab. in Islandia. Facie Polycarpi. Caulis succulentus. Stipulae vaginales intrafoliaceae. Fol. quaterna. L.

207. POLYCARPON. Cal. 5-phyllus. Petala 5, minima, ovata. Caps. ovata, 1-locularis, 3-valvis.

1. *tetraphyllum*, caule ramoso prostrato, foliis quaternis. Holosteum tetraphyllum. Thunb. prod. 24. Hab. in Italiae, Hispaniae, Istriae, Gal. Narbonensis vicinis. ☉

* *diphyllum*, fol. oppositis orbiculatis. Cavan. Diss. 2. p. 40. t. 151. f. 1. Hab. prope oppidum Puig, in Hispania. An praecedentis var?

2. *stipulifidum*, erectum ramosissimum ramis setaceis, fol. spatulatis flor. terminalibus fasciculatis, stipulis setaceo-multifidis. *Stipulicida* setacea. Michaux, Flor. 1. p. 26. Hab. in Carolinae aridis sabulosis. Monogynum et diandrum.

Obs. An potius distinctum genus? cui adnumeranda Holosteum *cordatum* L. et *diandrum*. Swartz? quamvis capsula ovata 3-valvi conveniunt cum Polycarpi.

208. DONATIA. Cal. 3-phyllus. Cor. polypetala. Caps. 3-locular. infera.

1. *fascicularis*, Forst. char. gen. 5. t. 5. Willd. sp. 1. p. 491. Polycarpon *magellanicum*. Lin. suppl. 115. Hab. in Terra del Fuego, in rupestribus humidis, cespites densissimas formans.

209. MOLLUGO. Cal. 3-phyllus. Cor. 0. Caps. 3-locularis, trivalvis.

1. *oppositifolia*, foliis oppositis lanceolatis, ramis alternis, pedunculis lateralibus confertis unifloris. Pluck. alm. 21. t. 75. f. 6. Hab. in Zeylona.

2. *stricta*, fol. subquaternis lanceolatis, flor. paniculatis nutantibus, caule erecto angulato. Pluck. phyt. 21. t. 256. f. 2. Burm. zeyl. 31. t. 5. f. 3. Hab. in Africa. ☉

3. *hirta*, fol. quaternis obovatis villosis, caule decumbente. Willd. l. c. Thunb. pr. 24. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

4. *pentaphylla*, fol. quinis obovatis aequalibus, florib. paniculatis. In Zeylona.

5. *verticillata*, fol. verticillatis cuneiformibus acutis, caule subdiviso decumbente, pedunc. unifloris. Pluch. mant. 9. t. 33a. f. 5. Ekret. pict. t. 6. f. 3. Hab. in Virginia, in cultis. ☉

6. *radiata*, caulib. procumbentibus radiatis, fol. obovatis acuminatis. Flor. peruv. 1. p. 48. Hab. in inundatis locis Conceptionis, Chile. Caul. plures.

210. MINUARTIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 1-locularis, 3-valvis. Semina nonnulla.

1. *dichotoma*, floribus confertis dichotomis. Loeß. it. 121. t. 1. f. 5. Willd. sp. 1. p. 492. Hab. in Hispania. ☉

2. *campestris*, flor. terminalibus alternis bractea longioribus. Act. Stockh. 1758. t. 1. f. 3. Hab. in Hispaniae collibus planis. ☉

3. *montana*, flor. lateralibus alternis bractea brevioribus. Loeß. it. 122. t. 1. f. 4. Hab. cum priore.

211. QUERIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 1-locularis. Sem. 1.

1. *hispanica*, floribus confertis. Willd. p. 493. Q. bracteis patulis hamatis. Loeß. it. 48. Hab. in Hispania.

2. *canadensis*, flor. solitariis, caule dichotomo. Hab. in Canada, Virginia. Folia utrinque punctis fuscis. L. ☞

3. *trichotoma*, flor. racemosis, caule trichotomo. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2.

p. 549. Rubia. Thunb. jap. p. 357. n°. 44. Hab. in Japonia. An hujus generis?

212. LECHEA. Cal. 3-phyllus. Petala 3, linearia. Caps. 3-locularis, 3-valvis. valvulis totidem interioribus. Sem. 1.

1. *major*, *villosa*, fol. ovato-lanceolatis, flor. lateralibus vagis (fasciculatis) Amoen. acad. 3. p. 11. t. 1. f. 4. Lam. Ill. t. 52. f. 2. Menandra foliis alternis. Gron. virg. 2. p. 20. Hab. in Canada et Carolinae aridis.

2. *minor*, fol. lineari-lanceolatis, florib. paniculatis. Amoen. acad. 3. p. 10. Lam. ill. t. 52. f. 1. Habit. in Canada, sylvis glareosis. ☞

* *thymifolia*, caul. erecto subaspero, ramis paniculatis, flor. foliato-fasciculatis. Michaux, Flor. 1. p. 77. Habit. in Carolinae aprici. An a priore diversa?

3. *racemosa*, pubescens caul. erecto paniculato-racemuloso, fol. linearibus acutis ciliatis, racemulis sparsis nudis. Michaux, l. c. Menandra ramis ternis. Gronov. Virg. p. 21. In Virginia.

4. *tenuifolia*, humilis, caul. assurgentibus patulis, fol. subulato-linearibus, flor. alternis solitariis. Michaux, l. c. Habit in collib. sabulosis juxta amnem Santee. Caps. majusculae.

5. *verticillata*, fol. oblongo-ovatis serrulatis, flor. verticillatis, caule hispido. Willd. sp. 1. p. 495. In India orientali. Habitu Spermacocae. W. ☞

M O N O G Y N I A.

Galium trifidum. Pontederia limosa. Narcissus triandrus. Laurus triandra. Amaranthi nonnulli. Fagariae quaedam. Hirtella triandra. Juncus conglomeratus, effusus. Tradescantia multiflora. Sw. Rivina brasiliensis.

D I G Y N I A.

Chenopodium triandrum. Ehrhartiae species (gram.) etc.

T R I G Y N I A.

Moraea s. Ixia gladiata Lin. Elatine triandra. Xanthoxylis. Species. Tillaea muscosa. Alsine.

C L A S S I S I V.

T E T R A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

213. *PROTEA*. Cor. 4-fida s. 4-petala. *Anther.* lineares, insertæ petalis infra apicem. *Cal.* proprius 0; (communis imbricatus). *Nux* 1-sperma, supera.

* *Pinnatæ* : foliis pinnatis filiformibus.

1. *decumbens*, foliis trifidis filiformibus, caule decumbente. Thunb. prod. 25. et Diss. acad. 2. Willd. Sp. pl. p. 58. Fol. simpliciter trifida secunda. Th.

Obs. In campis arenosis Cap. b. spei, ubi paucis speciebus exceptis, omnes sequentes crescant, quæ h. sunt.

2. *florida*, fol. trifidis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis bracteis obvallatis. Thunb. Diss. n^o. 2. t. 1. f. 1. In Cap. b. spei montibus : Fransche Hoek.

3. *cyanoïdes*, fol. trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis nudis. Thunb. L. Mant. 188. Pluck. mant. t. 345. f. 6. Cor. intus purpureascens, extus tota lanata pilis longis densisque albis. Th.

4. *patula*, fol. trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis aggregatis. Cor. niveo-tomentosa.

5. *pulchella*, fol. bipinnatis glabris filiformibus, capitulis terminalibus clavatis aggregatis aphyllis bracteatis. Willd. l. c. p. 507. Sert. Hannov. 1, fasc. 2. p. 15. t. 7. Cav. ic. t. 550. Hab. in Nova Hollandia. Distincta capitulis verticillato-aggregatis in ramorum apice. W.

6. *sphaerocephala*, fol. bipinnatis filiformibus, pedunc. capitulis brevioribus, squamis calycinis ovatis basi villosis. Th.

7. *tridactylides*, fol. bipinnatis : pinnulis linearis-cuneiformibus : ultima trifida,

8a, strobilis sphaericis solitariis terminalibus. Cav. ic. 6. t. 548. Hab. cum 2 sequentibus in N. Hollandiæ sinu botanico, prope Jackson.

8. *acufera*, fol. pinnatis : pinnulis oppositis, strobilis sphaeroides, cor. 1-petalis. Cav. l. c. p. 33. t. 549. Cor. flava uti in priore.

9. *dichotoma*, ramis dichotomis, fol. bipinnatis filiformibus glabris, strobilis in dichotomia solitariis conicis subscissilibus. Cav. l. c. 34. t. 551.

10. *Serraria*, fol. multifidis filiformibus hirtis, pedunc. capitulis longioribus, squamis calycinis ovato-lanceolatis hirtis. Th. *Serraria* foliis tenuissime divis, floribus rubris apetalis. Burm. afr. p. 264. t. 99. f. 1. Var. fol. glabris.

11. *triternata*, fol. bipinnatis filiformibus glabris, pedunculis capitulis longioribus, squamis calycinis lanceolatis hirtis. Thunb. Caul. superne flexuosus sesquipetalis. Cor. lanata pilis argenteis. Th.

12. *glomerata*, fol. bipinnatis filiformibus, pedunculo communi elongato nudo, pedicellis capitulis longioribus. Thunb. Andrew. t. 264. Capitulum hemisphaericum.

13. *phylicoides*, fol. bipinnatis filiformibus, capitulis terminalibus solitariis lanatis. Thunb.

14. *Lagopus*, fol. bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis aggregatis villosis. Thunb. Andrew. t. 243. Spic. villo densissimo albo distinctae.

15. *spicata*, fol. bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis distinctis. Thunb. Andr. t. 234. Folia filiformia bipinnata pinnæ 3 oppositæ, apicis glandula oblonga favesce. Th.

16. *Sceptrum*, fol. inferioribus bipinna-

tis, superioribus trifidis integrisque. Thunb. Protea Sceptum Gustavianum. Sparm. Act. holm. ann. 1777. p. 55. t. 1. Hab. in summis montibus Hottentots Holland.

**** Dentatae : foliis dentatis callosis.**

17. *crinita*, fol. quinquedentatis glabris, caule erecto, capitulis subternis terminalibus. Thunb. P. *criniflora*. Lin. suppl. 117.

18. *Conocarpa*, fol. quinquedentatis glabris, caule erecto, capitulo terminali. Th. Pluck. alm. 212. t. 200. f. 2. Boerh. Lugd. B. 2. p. 196.

Obs. Var. caule glabro et villosa, fol. 7-dentatis, 5-dentatis, 3-dentatis et indivisis, Th.

19. *elliptica*, fol. ellipticis tridentatis glabris, caule erecto, capitulo terminali. Thunb. Cor. longae hirsutae. Th.

20. *Hypophylla*, fol. tridentatis glabris secundis, caule decumbente, capitulo terminali. Thunb. Boerh. Lugd. B. 2. t. 198. Hab. in campis sabulosis.

21. *cucullata*, fol. tridentatis glabris, capitulis lateralibus. Thunb. Boerh. l. c. t. 206. Hab. in campis arenosis, ad rivulos Cap. b. spei. Caulis nodulosus, tomentosus. Flor. flavescent.

22. *tomentosa*, fol. tridentatis tomentosis. Thunb. Tota incano-tomentosa.

23. *heterophylla*, fol. tridentatis integrisque, caule decumbente. Thunb.

***** Acerosae : foliis filiformibus subulatis.**

24. *pinifolia*, fol. filiformibus, florib. racemosis calyculatis glabris. Thunb. Andrew. t. 76. In locis montosis.

25. *racemosa*, fol. filiformibus, flor. racemosis calyculatis tomentosis. Thunb.

Obs. Haec est unica hucusque nota species calyce uniflora; qua nota optime a P. *caudata* et *incurva* distinguitur. Thunb.

26. *incurva*, fol. filiformibus incurvis glabris, racemoso capitulis spicatis tomentosis, cal. 4-floro. Thunb. t. 3. f. 2.

27. *caudata*, fol. filiformibus hirtis, capitulis subsessilibus spicatis. Thunb. t. 2. f. 3. Cal. communis 4-phyllus 2-florus, raro uni-vel triflorus.

28. *bracteata*, fol. filiformi-canalicul. capitulo terminali. bracteis multifidis. Th. Diss. t. 1. f. 2. Boerh. Lugd. B. t. 193. Caulis pedalis simplex.

29. *comosa*, fol. inferioribus filiformibus, superioribus lanceolatis, capitulo terminali. Thunb. Caul. a foliorum casu nodulosus.

30. *purpurea*, fol. linearibus recurvatis, capitulis terminalibus cernuis, caule decumbente. Cor. ferruginae minutae. Th.

31. *prolifera*, fol. lineari-subulatis adpressis, caule prolifero. Thunb. Hab. in summis montibus Hottentots Holland.

32. *corymbosa*, fol. lineari-subulatis adpressis, ramulis verticillatis subfastigiatis. Thunb. Diss. t. 2. fig. 1. P. *bruniades*. Lin. suppl. 117. Hab. in campis sabulosis Cap. b. spei. Caulis quadri- et talis, ramis subverticillato-aggregatis subfastigiatis. T.

33. *rosacea*, fol. lineari-subulatis, capitulo terminali, calyce colorato. Thunb. (P. *nana*). P. *rosacea*, flor. solitariis, radio calycino colorato patenti; fol. subulatis. L. Mant. 180. Petiv. gazoph. p. 40. t. 25. f. 7. Hab. in montibus Roo de Sand Cap. b. spei. Calicis squamae interiores purpureo-coloratae. Cor. lana aurea extus tecta. Rosam referentibus floribus statim noscitur. Thunb.

34. *lanata*, fol. triquetris adpressis, capitulo terminali lanato. Thunb. Diss. t. 3. fig. 1. Cor. pilis argenteis tota lanata et barbata. Th.

***** Lineares : foliis linearibus.**

35. *torta*, fol. linearibus obliquis callosis. Thunb. prod. 26. Fol. medio latiore, torta, cartilagine apice subfusca. Wendl. Hort. Herrenb. p. 11. t. 1. 7.

36. *alba*, fol. linearibus sericeo-tomentosis. Thunb. Tota argenteo-tomentosa.

****** Lanceolatae : foliis ellipticis et lanceolatis.**

37. *aulacea*, fol. lineari-spathulatis glabris, flor. racemosis calyculatis. Willd. Sp. 1. p. 520. Thunb. Diss. t. 2. f. 2. Hab. in montibus Platte Kloof Cap. b. spei. Caul. 3-vel 4-pedalis. Antherae medio petali insertae spirales albae. Th.

38. *umbellata*, fol. lineari-spathulatis glabris, capitulis terminalibus, bracteis multifidis. Willd. l. c. Andrew. t. 248. Hab. in summitate montis tabularis. Nomen minus aptum. Caul. bipedalis.

39. *linearis*, fol. spathulatis glabris, capitulo terminali tomentoso. Willd. Th. Diss. t. 4. f. 2. In arenosis ad. Parl et Drakenstein. Caul. quadripedalis ramosus. Cor. tubus compressus.

40. *cinerea*, fol. lineari-cuneiformibus sericeis, capitulo terminali sericeo. Ait. Kew. t. p. 127. Willd. Sp. p. 521. Caul. bipedalis ramis verticillatis.

41. *Scolymus*, fol. lanceolatis acutis, capitulo terminali rotundo glabro. Th. Boerh. t. 192. In ericetis montis Tigrilis, C. b. sp. Cor. purpurascens. Th. Cor. flavo-virens, dipetala quasi, e quibus unum discedit. Sert. hannov. t. 20.

42. *abyssinica*, fol. lanceolatis basi attenuatis obtusis, capitulo terminali hemisphaerico. Willd. p. 522. Bruce it. 5. app. p. 55. cum iconae. Hab. prope Lamalmon in Abyssinia. Caulis 9-pedalis.

43. *mellifera*, fol. lanceolato-ellipticis, capituloque terminali oblongo glabris. Th. Wendl. Hort. Herrenbus. t. 13. P. *repens*, flor. solitariis : radio calycino lanceolato stricto reinoso, fol. lanceolatis. L. Mant. 189. Boerh. t. 187. Caul. arboreus orgyalis, ramosus. Capit. magnum ovato-oblongum viscosum.

44. *repens*, fol. lanceolato-ellipticis capitulo ovato glabris, caule decumbente brevissimo. Thunb. Boerh. t. 190. Caul. vix palmaris. Th.

45. *plumosa*, fol. lanceolato-cuneiformibus incanis, capitulo terminali oblongo pedalis inferne glabris, superne pilosis : pilis longissimis. Aiton Kew. t. p. 127.

46. *obliqua*, fol. ellipticis glabris callosis obliquis, capitulo caulino terminali. Th. Caul. bipedalis. Fol. glandula terminali obliqua. β . *arcuata*, fol. spatulatis arcuatis laevibus, ramis glabris prolificis, capitulis solitariis. Lam. ill. 234.

47. *parviflora*, fol. ellipticis obtusis callosis obliquis, capitulis terminalibus ramulorum glabris. Thunb. Diss. t. 4. f. 1. Caul. ramosissimus ramis virgatis filiformibus. Th.

48. *pallens*, fol. lanceolatis basi attenuatis glabris acutis callosis, capitulo terminali involucreto, involucreto longo pallido. Hort. Herrenbus. t. 19. Thunb. prod. 27. P. *pallens*, flor. ovatis involucreto epaleatis laevibus, fol. linearibus. L. Mant. 193. Boerh. t. 203. Ad Cap. b. spei in collibus arenosis. Caul. pedalis ramis divaricatis simplicibus.

Obs. Est mas Proteae conferae auctoritate Massonii. Willd. p. 525.

49. *confiera*, fol. lanceolatis basi attenuatis glabris acutis callosis, capitulo terminali involucreto, involucreto longo acuto concolore. Thunb. Hort. Herrenbus. t. 20.

50. *Levisanus*, fol. obovatis obtuse acuminatis imbricatis glabris, caule piloso, capitulo involucreto obtuso longiore. Willd. Sp. p. 526. Thunb. prod. 27. *Levisanus capensis serpyllifolio*. Petiv. gazoph. p. t. 5. f. 7. Wendl. Hort. Herrenb. t. 1. Hab. in campis arenosis. Caul. pedalis ; capit. flavum.

51. *strobilina*, fol. elliptico-oblongis retuso-callosis capituloque terminali glabris. Thunb. Sert. hannov. t. p. 7. tab. 1.

52. *imbricata*, fol. lanceolatis glabris striatis imbricatis, capitulo terminali. Th. Diss. t. 5. f. 2. Wendl. Hort. Herrenb. t. 14. Capitula in ramis terminalia. Cor. extus lana flavescens tota tecta. Th.

53. *sericea*, fol. lanceolatis sericeis, ramis filiformibus, caule decumbente. Th. Cor. luteo-tomentosa. Th.

54. *saligna*, fol. lanceolatis sericeis, caule fruticoso, capitulis oblongis involucreatis. Thunb. Pluck. Mant. t. 229. f. 4.

55. *argentea*, fol. lanceolatis argenteo-tomentosis ciliatis, caule arboreo, capitulis globosis. Thunb. Folia nitidissima argentea.

***** *Oblongae : foliis oblongis, ovatis.*

56. *acaulis*, fol. oblongis capituloque globoso glabris, caule decumbente brevissimo. Thunb. Boerh. t. 191.

57. *myrtifolia*, fol. oblongis glabris, capitulis terminalibus aggregatis. Caul. tripedalis. Fol. apice glandulosa, basi obliqua.

58. *grandiflora*, fol. oblongis venosis capituloque hemisphaerico glabris, caule arboreo. Thunb.

59. *glabra*, fol. oblongis arenis capituloque hemisphaerico glabris, caule fruticoso. Thunb.

60. *formosa*, fol. lanceolatis pubescentibus, caule villosa, capitulo hemisphaerico, (aurantio.) Andrew. t. 17.

61. *speciosa*, fol. oblongis glabris, capitulo oblongo, squamis calycinis apice barbatis. Thunb. Andrew. t. 103. β . *nigra* calyc. interiorib. apice incurvatis barbatis nigris. Capit. obovatum. Squam. calyciniae : rubrae, sub apice villo longo nigro barbatae. : γ *rubra*. Andr. t. 270. δ . *latifolia*, fol. ovatis rubro-marginatis, squamis calycinis apice incurvis incarnatis. Andrew. t. 110. Capit. rotundum. An diversa species?

62. *longifolia*, fol. sublinearibus basi angustis obliquis, squamis calycinis interioribus lanceolatis erectis, capitulo longo cylindrico. Andrew. t. 132.

β. *ferruginoso-purpurea*, capitulo subgloboso. Andrew. t. 133.

γ. *turbinata*, capit. turbinato. Andrew. t. 144. Flor. plumis atropurpureis. A.

63. *Totta*, fol. ovatis glabris callosis capitulo ovato, corol. cylindricis hirtis. Th.

* *venosa*, fol. ovatis nudis venosis imbricatis, ramis villosis, capitulis pluribus subterminalibus. Lam. ill. p. 234.

64. *lonziflora*, fol. ovato-ellipticis nudis imbricatis subsessilibus, ramis villosis, capitulo oblongo. Lam. l. c. Boerb. t. 195?

65. *chamaelea*, fol. lanceolatis obtusculis basi attenuatis nudis, capitul. terminalibus glabris involucreatis. Lam. p. 237. Brey. cent. t. 9?

66. *hirta*, fol. ovatis glabris, florib. lateral. Th. Boerb. t. 193. Hab. in campis infra Taffelberg. Caul. villosus tripedalis.

67. *pubera*, fol. ovatis capitulisque terminalibus tomentosis. Thunb. Habit. in summis montibus Hottentots Holland. Fol. elliptica, breviuscula. Caulis bipedalis. Var. fol. ovatus et oblongis. Thunb.

68. *divaricata*, fol. ovatis hirtis, capitulis terminalibus, ramis divaricatis. Th. P. dichotoma. Lam. Caul. pedalis, flexuosus. Capit. fol. obvallatum.

***** *Rotundatae* : fol. subrotundis.

69. *spathulata*, fol. spathulatis subeucullatis glabris. Thunb. Diss. t. 5. f. 3.

* *concava*, fol. ovalib. concavis imbricatis subsessilibus, ramis villosiusculis, capitulis aggregatis. Lam. ill. gen. p. 234.

70. *Cynaroides*, fol. subrotundis petiolatis glabris. Thunb. Boerb. t. 184. Hab. ad Cap. b. spei in summitatibus montium. Caul. rucosus simplex vix pedalis. Capitul. magnitudine fere capitis infantis.

71. *cordata*, fol. cordatis. Thunb. Hab. in montibus Hottentots Holland. Caulis decumbens, striatus, spithameus. Fol. subrotunda, inferiora palmaria. Th.

214. LAMBERTIA. Perianthium commune imbricatum, squamis interioribus longioribus, 1-florum. Cor. 4-fida, laciniis revolutis

stamiferis. Caps. tricornis, 1-locularis, disperma.

1. *formosa*. Frutex ramis virgatis, foliis ternis. Cav. ic. 6. p. 32. t. 547. Smith. act. Soc. Lin. 4. t. 20. Andrew. t. 69. Protea nectarina. Sert. Hannov. p. 5. t. 21. Hab. in N. Hollandia. Cor. coccinea.

215. CONOSPERMUM. Cal. o. Cor. 1-petala ringens, stamifera: labium superius fornicatum; inferius trifidum. Stigm. obtusum. Sem. 1, nudum, pappo coronatum. Smith. in act. soc. Linn. v. 4.

1. *Smithii*. Hab. in Australasia. Frutex. Plures species hujus generis existere videntur, quarum descriptio a cl. autore expectanda est.

216. BANKSIA. Infloresc. strobiliformis, solitaria. Cor. 4-petala. Stamina limbo inserta, Caps. 2-valv. 2-sperma, interjecto seminibus dissepimento semibifido. Sem. alata.

1. *serrata*, foliis linearibus in petiolum attenuatis aequaliter serratis, apice truncatis cum mucrone. Lin. suppl. 126. Cav. ic. 6. t. 540. Andrew. t. 82. Willd. Sp. t. 535. Banksia conchifera. Gaert. sem. t. p. 221. t. 48. f. 1. Hab. in Nova Hollandia, ubi omnes formosae hujus generis species crescunt, quae h. sunt.

2. *dentata*, fol. oblongis in petiolum attenuatis curvis flexuosis dentatis: dentibus spinula terminatis, subtus albis. Lin. suppl. p. 127. Wendl. Hort. Herrenhus. t. 8.

3. *integrifolia*, fol. cuneiformibus integerrimis, subtus tomentoso-albis. Cav. ic. 6. t. 546. Banksia spicata. Gaert. sem. t. p. 221. t. 48. f. 2.

4. *praemorsa*, fol. cuneatis praemorsis serratis, subtus albo-punctatis, flor. externe purpureis. Andrew. t. 258. Spica ovata maxima.

5. *microstachia*, fol. lanceolato-linearibus serrato-spinosis subtus tomentosis albis, (flor. tomentosis luteo-croceis). Cavan. ic. 6. p. 28. t. 541. An ab antecedente satis diversa?

6. *oblongifolia*, fol. oblongis serratis, subtus tomentosis, caule arboreo. Cav. l. c. t. 542. Rami villosi. Spica elliptica. Cor. luteo-aurea. Fol. ovato-lanceolata. C.

7. *Robur*, fol. ovato-oblongis serrato-spinosis sparsis, subtus ferrugineo-tomentosis. Cav. l. c. p. 29. t. 533. Cresc. in Botany-Bay. Fol. sinuato-serrata, Querc. similis.

8. *salicifolia*, fol. sparsis oblongis integerrimis, apice breviter mucronatis. Cav. l. c. p. 31. Frutex oryvalis, ramis tomentosis. Fol. subtus primo ferruginea, dein alba. Cav.

9. *marginata*, fol. linearibus truncatis margine revolutis, caps. compressis. Cav. l. c. p. 29. t. 534. Frut. 4-5-pedalis. Fol. subtus albo-tomentosa. C.

10. *oleaeifolia*, fol. verticillatis sublan- ceolatis integerrimis subtus tomentosis albis. Cav. 6. p. 30. t. 535.

11. *spinulosa*, fol. linearibus revolutis mucronulatis, apicem versus denticulato-spinosis. Smith. Nov. Holl. 1. p. 13. t. 4. Cav. ic. 6. p. 25. t. 537.

12. *ericaefolia*, fol. approximatis acro- sis truncato-emarginatis glabris. Lin. supp. p. 227. Cav. l. c. t. 538. Fol. hujus minima.

117. HAKEA. Flor. distincti. Cal. communis imbricatus polyphyllus: squamis deciduis (Gemma?). Cor. 4-petala: petalis linearibus apice concavis ibique staminiferis. Germen pedicellatum, basi glandulosum. Caps. lignosa, 2-valvis, 2-sperma. Sem. 2, alata.

1. *pugioniformis*, caule fruticoso, fol. alternis teretibus mucronatis, capsulis pugioniformibus. Cav. ic. 6. p. 24. t. 533. Hakea glabra. Sert. Hannov. p. 27. t. 17. Hab. in sinu Botanico, in Nova Hollandia cum reliquis speciebus.

2. *gibbosa*, caule fruticoso, fol. sparsis numerosis teretibus, caps. ovatis gibbosis rugosis. Cav. t. 534. Banksia gibbosa. White. it. p. 224. ic.

3. *dactyloides*, fol. alternis ovato-lanceolatis rigidis trinerviis, caps. globoso-ovatis scabris. Cav. l. c. p. 25. t. 535. Banksia dactyloides. Gaertn. t. 47.

4. *pyriformis*, caul. arboreo, fol. lanceolatis oppositis, flor. spicatis oppositis capsulis pyriformibus. Cav. p. 25-26. t. 536. Banksia Gaertn. l. c. f. 1. White. p. 224. Caps. pubescentes.

Obs. Genus vix a *Banksia* diversum, for. forma et fol. integerrimis ab ea distinctum; etque nomen *Conchium* quoque im-

positum est a cel. Smith. in Act. Soc. Lin. v. 4.

218. BRABEJUM. Polygamum. *Amentum* squamis ovatis obtusis. Cor. 4-partita: laciniis revolutis, basi staminiferis. *Drupa* sicca subrotunda, villosa, 1-sperma.

1. *stellulifolium*. Lin. Syst. pl. ed. Reich. 4. p. 127. Lam. enc. t. 847. Pinck. alm. t. 265. f. 3. Hab. ad Cap. b. sp. Fol. lanceolata, subsinuata, Myricaeformis. h

219. RUPALA. Cal. o. Petala 4 basi coherentia, Stamina medio petalorum inserta. Pericarp. 1-locul. monospermum?

1. *montana*, fol. ovatis petiolatis. Willd. Sp. 1. p. 536. Hab. in insula Cajenna. h

2. *sessilifolia*, fol. cuneato-oblongis sessilibus. Willd. Richard, in Act. Soc. Hist. Nat. Paris. 1. p. 106. Habit. cum priore. h

Obs. An forsans Embotherii species? cum flores convenient et fructus ignotus sit.

220. EMBOTHRIMUM. Cal. o. Cor. tetrapetala. Stamina limbo petalorum inserta. Folliculus polyspermus, Sem. alata, imbricata.

1. *speciosissimum*, fol. obovatis obtusis dentatis, corymbo capitato involucreto. Willd. Sp. 1. p. 538. Emb. fol. obovatis obtusis inaequaliter serratis, spica subcapitata, involucreto polyphylo. Smith. Nov. Holl. 1. p. 19. t. 7. Hab. in Nova Hollandia. h

2. *coccineum*, fol. ellipticis integerrimis, racemo terminali coarctato. Willd. l. c. E. *emarginatum*. Flor. Peruv. 1. p. 62. t. 95. Ad fretum Magellanicum et in Terra del Fuego. h

3. *grandiflorum*, fol. ovatis integerrimis, racemis elongatis, corollis fissis quadrilobis. Willd. l. c. p. 538. Lam. encyclop. 2. p. 351. Hab. in Peru. +

4. *umbellatum*, fol. oblongis integerrimis aveniis, umbellis axillaribus pedunculatis. Willd. p. 538. Lin. suppl. 228. β ? *salignum*. Andrew. t. 215. Hab. in Nova Caledonia. h

5. *lanceolatum*, fol. lanceolato-linearibus integerrimis. Flor. Per. 1. p. 62. t. 196. Hab. in collibus et montibus excelsis in R. Chilensi.

6. *obliquum*, fol. ovatis serratis glabris, petalis apice obliquis. Fl. Per. p. 61. t. 97. Hab. cum priore. Frutex 2-orgyalis. Pedicelli villosi.

β? *hirsutum*, fol. cordato-ovalibus subdentatis, racemulis brevibus, pedunculis ramisque villosis. Lam. ill. p. 245. Hab. in Peru.

7. *monospermum*, fol. ovatis serratis lanuginosis, folliculis monospermis. Fl. Per. l. c. t. 98. Arbor triorgyalis, quae in Peruvia montib. crescit.

8. *pinnatum*, fol. simplicibus pinnatisque. Fl. Per. l. c. t. 99. f. a. Hab. in Munn, ruderatis et versuris. Arb. 4-orgyalis, vere florens.

9. *sericeum*, fol. ternis lanceolatis integerrimis, margine revolutis subtus sericeis, racemo terminali coarctato, folliculo tuberculato glabro. Willd. p. 539. Smith. Nov. Hol. 1. p. 25. t. p. E. cytoides. Cav. ic. 4. p. 50. t. 483. f. 2. Hab. in Nova Hollandia. h Var. foliis : β. E. *linearifolium*. Cav. t. 386. f. 1.

10. *filiaefolium*, fol. tripinnatifidis, laciniis decurrentibus acutis, flor. spicatis geminatis pedicellatis. Smith. l. c. p. 23. t. 8. E. herbaceum. Cavan. ic. 4. p. 58. t. 384.

221. GUEVINA. Cal. c. Cor. 4-petala : petalis apice concavis, tribus revolutis. Stam. cavitatibus petalorum insidentia. Drupa monosperma.

1. *Avellana*. Molin. Chil. p. 198. Quadria *heterophylla*, fol. pinnatis bipinnatisque, racemis longis simplicibus. Flor. Peruv. t. p. 61. t. 99. f. 6. Hab. in sylvaticis Regn. Chilensis. Arbor 6-orgyalis, utilissima. — Nuclei sapore grati.

222. PERSONIA. Cal. o. Cor. primo conica, quadrifida, laciniis revolutis, basin versus staminiiferis. Glandulae 4 ad basin germinis. Drupa monosperma.

1. *laurina*, foliis ovatis coriaceis, flor. subracemosis tomentosis.

2. *salicina*, fol. oblongis lato-lanceolatis, flor. racemosis.

3. *lanceolata*, fol. lanceolatis, flor. parvis. Andrew. t. 74. Linkia laevis. Cav. c. 4. p. 61. t. 389?

4. *linearis*, fol. linearibus subvillosis? Andrew. t. 77. Flor. flavi uti in antecedente.

5. *hirsuta*, villosa-hirsuta, fol. linearibus margine revolutis.

Obs. Cel. Smith, vir tam animi candore, quam cognitione in Histor. naturali veneralis, in Act. Soc. Linnacanae, v. 4, hoc genus constituit ejusque species mecum benevole communicavit, quae omnes frutices sistunt, foliis alternis et fructibus edulibus distinctos quintamque orbis partem, nempe Australiam s. Novam Hollandiam, incolunt.

223. GLOBULARIA. Cal. communis imbricatus; proprius tubulatus, inferus. Cor labio superiore 2-partito : inferiore tripartito. Receptac. paleaceum. (Flor. aggregati.)

1. *longifolia*, caul. fruticoso, foliis omnibus lineari-lanceolatis integerrimis capitulis axillaribus. Ait. Kew. t. p. 130. Willd. sp. 1. p. 539. Sloan. jam. 124. hist. 1. p. 19. t. 5. f. 3. Hab. in Madera. h.

2. *Alpium*, caul. fruticoso, fol. lanceolatis tridentatis integrisque, capitulis terminalibus Ait. Kew. t. p. 131. Lam. encycl. 2. p. 724. *Alpium monspeliensis*, s. Frutex terribilis. Bauh. hist. 1. p. 598. Hab. in Europae meridionalis sylvis ad rupes et saxosa. h.

3. *bisnagarica*, caul. fruticoso, fol. radicalibus cuneiformibus retusis; caulinis lanceolatis. L. Sp. pl. 139. Hab. in Bisnagaricae sylvis. h.

4. *linifolia*, caul. herbaceo, folioso, fol. radicalibus spathulatis trigulis apice tridentatis, caulinis angustis lineari-lanceolatis acuminatis. Lam. encycl. 2. p. 722. G. cespitoso. Ortega. Hab. in Hispania. ¶

5. *vulgaris*, caul. herbaceo fol. radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. Hab. in apricis, montosis, subalpinis.

6. *spinosa*, fol. radicalibus crenato-aculeatis, caulinis integerrimis mucronatis. Lam. encycl. 2. p. 722. In Granadae montibus. ¶

7. *cordifolia*, caule subnudo fol. cuneiformibus tridentatis : dente intermedio minimo. L. Mill. Lam. ill. gen. t. 56. f. 2. Moris. s. 6. t. 15. f. ult. Hab. in Pannonia Austria, Helvetia, Pyrenaeis. ¶

8. *nana*, scapis nudis brevissimis : fol. ovato-spathulatis integerrimis. Lam. encycl. 2. p. 723. In Gall. australi, Pyrenaeis.

9. *nudicaulis*, caule nudo, fol. integerrimis lanceolatis. Moris. s. 6. t. 15. f. 4.

Hab. in Pyrenæis et Austriae, Helvetiae montibus. $\overline{\text{L}}$

10. *orientalis*, caule subnudo, capitulis alternis sessilibus, fol. lanceolato-ovatis integris. Hab. in Nativia. $\overline{\text{L}}$

224. **CEPHALANTHUS.** *Cal.* communis o: proprius superus, infundibuliformis. *Recept.* globosum, pilosum. *Caps.* 2-4-partibilibus. *Sem.* solitaria, oblonga.

1. *occidentalis*, fol. oppositis ternisque. Lin. Lam. ill. p. 257. t. 86. Pluck. alm. 336. t. 77. f. 4. Hab. in Amer. septentrionali. $\overline{\text{L}}$

225. **DIPSACUS.** *Cal.* communis polyphyllus; proprius superus. *Recept.* paleaceum. (Flor. compositi.)

1. *fullonum*, fol. sessilibus serratis, paleis uncinatis. Willd. sp. 1. p. 543. Carduus fullonum. Tobel. ic. 2. t. 17. Hab. in Europa australi. $\overline{\text{L}}$

2. *sylvestris*, fol. sessilibus serratis, paleis rectis, involucri capitulo longioribus. Jacq. aust. 5. t. 402. Hab. ad vias in humidiusculis. $\overline{\text{L}}$

3. *laciniatus*, fol. connatis sinuatis. Hab. in Alsacia (Colmar), Germania, Carniolia, Gallia, (prope Dijon). $\overline{\text{L}}$

4. *pilosus*, subparvus, fol. petiolatis appendiculatis. L. Jacq. Flor. austr. t. 248. Hab. in sylvis, praesertim calcaris. Capit. globosa. $\overline{\text{L}}$

226. **SCABIOSA.** *Cal.* communis polyphyllus; proprius duplex superus. *Recept.* paleaceum aut nudum. (Flor. compositi.)

* *Corollulis quadrifidis.*

1. *alpina*, corollulis quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis, floribus cernuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis. Willd. sp. pl. Lin. p. 545. Dipsacus foliis pinnatis, pinnis serratis, capitulis globosis. Hall. helv. n.º. 200. Hab. in alpinis. $\overline{\text{L}}$

2. *ustulata*, cor. quadrifidis aequalibus, calycis squamis acutis, fol. lyratis dentatis. Thunb. prod. 29. Hab. ad Cap. b. Spei.

3. *rigida*, coroll. quadrifidis subradian-
tibus, calycibus imbricatis obtusis, fol. lanceolatis serratis auriculatis. Lin. Thunb.

prod. p. 28. Comm. hort. 1. p. 185. t. 93. Hab. in Aethiopia, et ad Cap. b. sp. $\overline{\text{L}}$ Caul. suffruticosus, scaber.]

4. *attenuata*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycib. imbricatis: squamis oblongis obtusis, fol. linearibus glabris integris basi-
sque pinnatifidis. Aiton. Kew. 1. p. 134. S. trifida. Thunb. prod. 28. Hab. ad Cap. b. spei. $\overline{\text{L}}$

5. *scabra*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycis squamis obtusis, fol. bipinnatifidis scabris rigidis. Thunb. prod. 29. Lin. supp. 118. Ad Cap. b. spei. $\overline{\text{L}}$ Caul. teretes simplices scabri.

6. *transylvanica*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycibus paleisque aristatis, fol. radicalibus lyratis. Jacq. hort. t. 111. Moris. 6. t. 13. f. 13. Hab. in Transsylvania. \odot

7. *syriaca*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis paleisque aristatis, caule dichotomo, fol. lanceolatis. Hab. in Syria.

8. *leucantha*, coroll. quadrifidis subaequalibus, squamis calycinis ovatis imbricatis, fol. pinnatifidis. β ? Scabiosa trenta. Macquet. pl. alp. p. 13. t. 4. f. 1. S. Haquetii. Lam. ill. p. 250. Hab. in collibus Narbonae, et in Delphinatu. β . in Carniolia. Flores subglobosi, albi. $\overline{\text{L}}$

9. *corniculata*, cor. 4-fidis aequalibus calyc. squamis obtusis, seminum angulis in cornicula exeuntibus. Walldst. et Kitaib. pl. rar. Hung. p. 11. t. 13. In apricis Banatus et Transylv.

10. *centauroides*, coroll. quadrifidis subaequalibus, fol. radicalibus integerrimis, caulinis decussive pinnatis, cal. imbricato. Lam. ill. p. 250. Hab. in Galloprovinciae alpinis. Flor. ochroleuci.

11. *parviflora*, coroll. quadrifidis subaequalibus, caul. dichotomo, fol. inferiorib. obovatis crenatis, capitul. ovatis. Desf. Alt. 1. p. 119. Vaill. Acad. 1722. p. 181. Hab. in Algeria. Cor. parva subvillosa. Cal. interior brevissimus. D.

12. *succisa*, coroll. quadrifidis aequalibus, caul. simplici, ramis approximatis, fol. lanceolato-ovatis: caulinis subdentatis, flor. subglobosis. Curt. Lond. t. 10. Hab. in Europae pascuis, humidiusculis. Flor. autumn. Rad. praemorsa.

13. *integrifolia*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. indivisis: radicalibus ovatis serratis integris, rameis lanceolatis; caul. herbaceo. L. Roth. germ. I. 58. II. 164. Hab. Monspelii et in Helvetia. \odot . Corolla ru-

*lra. Folia radicalia Bellidis. Calyx 10-phyl-
lus; flore brevior.*

14. *amplexicaulis*, coroll. quadrifidis
radiantibus, fol. amplexicaulibus lanceola-
tis integerrimis: radicalibus trifidis cren-
atis. Lin. Hab. . .

15. *humilis*, coroll. quadrifidis inae-
qualibus, calycis squamis obtusis, fol. li-
nearibus dentato-pinnatifidis. Thunb. prod.
28. Hab. ad Cap. b. spei cum sequente.

16. *decurrens*, coroll. quadrifidis inae-
qualibus, calycis squamis ovatis, fol. pin-
natifidis: pinuis decurrentibus. Thunb.

17. *tartarica*, coroll. quadrifidis radian-
tibus, caule hispido, fol. lanceolati. pinna-
tifidis: lobis subimbricatis. Gmel. it. 1. p.
159. Act. ups. 1744. p. 11. t. 1. Hab. in
Tartaria. Planta 12-pedalis. Flor. lutei. ♂

18. *arvensis*, coroll. quadrifidis radian-
tibus, fol. pinnatifidis incis. caule hispido.
Curt. Flor. Lond. t. 13. Hab. in arvis, pratis.

* *dubia*, coroll. quinquefidis radiantibus
aequalibus, involucri tetraphyllo. Moench.
hass. n°. 116. t. 3. Hab. in monte Meisner
in Hassia.

19. *uralensis*, coroll. quadrifidis radian-
tibus, fol. radicalibus simplicibus, caulini-
bus decussate pinnatis, palcis arilis apice
reflexis. Murr. goett. 2782. p. 13. t. 4. Hab.
in Sibiria. ☉

20. *sylvatica*, coroll. quadrifidis radian-
tibus, fol. omnibus indivisis ovato-oblongis
serratis, caule hispido. Jacq. austr. 4. t.
362. Hab. in Austriae, Helvetiae, Germa-
niae, Galliae sylvaticis et pratis montosis.

21. *longifolia*, coroll. 4-fidis radiantibus,
fol. oblongis lanceolatis integerrimis,
caule inferne glabro. Pl. rar. Hung. p. 4.
t. 5. Cresc. in alpis. Marmaronensibus. Rad.
multiceps. Sem. hirsuta. Priori affinis.

22. *canescens*, tomentoso - canescens,
coroll. quadrifidis radiantibus. caul. multido-
ro, fol. radicalibus ovato-lanceolatis, caul.
pinnatifidis pinnatisque. Plant. rar. Hung.
p. 53. t. 53. Hab. in Hungaria, Bohemia,
et Germania, in montosis, collibus. Confundit
cum *S. columbaria*; differt vero to-
mento, cal. fol. obtusis, radio 2-3 brevior.
Nonnunquam occurrit caul. 1-flo. et tunc
cum pyrenaica non male congruit. Loc. cit.

23. *pyrenaica*, coroll. quadrifidis radian-
tibus, fol. tomentosis integris, dentatis
et pinnatifidis, caul. 1-flo. Willd. sp. 1.
p. 552. Allion. pedem. t. 25. f. 2. Boc. mus.
p. 22. t. 6. Hab. in Pyrenaeis, Sabaudia et
Helvetia. +

* *Corollulis quinquefidis.*

24. *gramuntia*, coroll. quinquefidis, ca-
lycib. brevissimis, fol. caulinis bipinnatis
filiformibus. Sauv. monsp. p. 268. Desf.
Atl. 1. p. 120. Hab. Monspelii et in Barba-
ria T

25. *columbaria*, coroll. quinquefidis ra-
diantibus, fol. radicalibus ovatis lyratisque
crenatis, caulinis pinnatis linearibus. Flor.
don. t. 314. Habit. in Europae agris siccio-
ribus.

26. *daucoides*, coroll. quinquefidis ra-
diantibus, fol. bipinnatis, cal. communi
villosa pinnatifido. Desf. Atl. 1. p. 123. t. 38.
Hab. in collib. Algeriae.

27. *granliflora*, coroll. quinquefidis ra-
diantibus, fol. radicalibus oblongis crenatis:
caulin. pinnatifidis: pinuis lanceolatis li-
nearibus patulis. Scop. Delic. Insul. 3. p.
29. t. 14. Desf. l. c. Hab. in Barbariae arvis.
Affin. *columbariae*: differt fol. pinna-
terminali lanceolata.

28. *tomentosa*, coroll. quinquefidis inae-
qualibus, fol. tomentosis: radicalibus pin-
natifidis caespitosis, caulinis pinnato-linea-
ribus. Cav. ic. 2. p. 66. t. 183. Hab. in Regni
Valentini montib. Cor. dilute violacea. Fol.
albido-cinerea. T

29. *lucida*, cor. quinquefidis, fol. radi-
calibus lanceolatis acute serratis glabris,
caulinis bipinnato-setaceis. Villars Dauph.
2. p. 293. In Delphinatus sylvaticis, pratis
alpestribus. Fol. radicalia lucida, saepius
incisa.

30. *sicula*, coroll. quinquefidis aequali-
bus calyce brevioribus, fol. lyrato-pinna-
tifidis. L. Jacq. hort. 1. p. 5. t. 15. Hab.
in Sicilia. Caulis ruber, debilis. Pappus
corona campanulata, plicata, multiden-
tata, centro octocalloso. L. ☉

31. *rutaefolia*, coroll. quinquefidis, fol.
pinnatis summis linearibus, calycibus mo-
nophyllis quinquefidis. Vahl. symbol. 2. p.
26. Boc. sic. p. 95. t. 52. Hab. Tuneti circa
Cap. Zebibo et in maritimis Siciliae. Corol-
lae subaequales, calyce vix longiores, pau-
cae villosae.

32. *maritima*, coroll. quinquefidis ra-
diantibus calyce brevioribus, fol. pinnatis:
summis linearibus integerrimis. Habit. in
Sicilia, Monspelii. ☉

33. *stellata*, coroll. quinquefidis radian-
tibus, fol. dissectis, receptaculis florum
subrotundis. Clus. hist. 2. p. 1. icon. Lob.
ic. 539. Hab. in Hispania, praesertim in
agro Granatensi, et in Barbaria. ☉. Pap-

pup stellae limbo rotato, membranaceo, radiato setis 40.

β? *simplex*, caul. superne nudo, fol. bipinnatifidis villosis : foliol. linearibus acutis, cal. seminibus maximo campanulato. Desf. Atl. 1. p. 136. t. 39. f. 1.

34. *prolifera*, coroll. quinquefidis radiantibus, flor. subsessilibus, caule proliifero, fol. indivisis. Herm. parad. 125. t. 125. Hab. in Aegypto et Barbaria. ☉

35. *atopurpurea*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. dissectis, receptaculis florum subulatis. Hab. in India? Var. quoad Corollae colorem. ☉

36. *argentea*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. pinnatifidis : laciniis linearibus, pedunculis longissimis, caule tereti. Desf. Atl. 1. p. 121. β. Hab. in Oriente, et Algeria. ☿

37. *urceolata*, coroll. 5-fidis radiantibus, cal. multifido urceolato, fol. subcarnosis pinnatifidis. Desf. Atl. 1. p. 102. Bocc. alic. 2. 40. f. 3 et t. 52. Moris. s. 6. t. 13. f. 24. Hab. ad maris littora.

38. *indurata*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. ovato-lanceolatis erosis basi dentatis, caule rigente. Mant. Sc. altissima. Jacq. hort. 2. t. 185. Hab. in Africa. ♀. Panicula dichotoma : prima dichotomia pedunculifera, reliquis apice proliferis. S. africanæ varietas? L.

39. *africana*, coroll. quinquefidis aequalibus, fol. simplicibus incis, caule fruticoso. Herm. parad. 219. t. 219. Hab. in Africa, Oriente. Plures dantur varietates vid. Willd. p. 556.

40. *monspeliensis*, coroll. quinquefidis aequalibus, calyce brevioribus, fol. omnibus pinnatis ciliatis. Jac. ic. rar. 1. tab. 24. Misc. 2. p. 320. Hab. Monspelii. ♂

41. *pumila*, coroll. quinquefidis radiantibus, subcaulis, fol. pilosissimis : radicalibus lyratis, caulinis pinnatis incis. Scabiosa *acaulis*. Thunb. prod. 29? Hab. ad Cap. b. spei.

42. *cretica*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. congestis lanceolatis subintegerrimis, caule fruticoso. L. Hab. in Creta. ♀

43. *saxatilis*, coroll. subquinquefidis subaequalibus, fol. lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, caulinis connatis, caul. herbaceo. Cav. ic. 2. p. 68. t. 184. Hab. in mont. fissuris regni Valentini. Cor. alba. ☉

44. *limonifolia*, coroll. quinquefidis aequalibus, fol. cuneiformibus integerrimis, subtus rugosis incanis. Vahl. symb. 2.

p. 27. Hab. in Sicilia. Fol. inferne fere Statice Limonii. ♀

45. *graminifolia*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. linearis-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo. Almoen. acad. 4. p. 207. Bauh. prodr. 127. t. 127. Moris. s. 6. t. 15. f. 36. Hab. in alpibus Europaeis et in Barbariae collibus.

46. *lyrata*, coroll. radiantibus, laciniis integris, fol. inferioribus oblongis serratis, superioribus basi pinnatifidis. Vahl. symb. 2. p. 27. Hab. ad Dar-lancellos.

47. *palaestina*, coroll. quinquefidis radiantibus : laciniis omnibus trifidis, fol. indivisis subserratis : summis basi pinnatifidis. Mant. 37. Gouan. illustrat. p. 5. Hab. in Palaestina. Flores albi, aut citrini. Fructus Sc. stellatae. ☿

48. *isetensis*, coroll. quinquefidis radiantibus calyce longioribus, fol. bipinnatis linearibus. Mant. 37. Hab. in Sibiria Isetensis rupibus. Semina ut in priore.

49. *ucranica*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. radicalibus pinnatifidis : caulinis linearibus basi subciliatis. Gmel. sib. t. 87. Hab. in Ucraina.

50. *ochroleuca*, coroll. subquinquefidis radiantibus, fol. radicalibus bipinnatis linearibus. S. tenuifolia. Roth. germ. 1. p. 59. II. 167. Moris. s. 9. t. 13. f. 23. Barr. ic. 770. f. 2. Hab. in pratis siccis. ♂

51. *banatica*, coroll. 5-fidis radiantibus, fol. radicalibus lyratis : caulinis subbipinnatis, calycib. discum aequantibus. Plant. rar. Hungar. p. 10. t. 12. In saxonis Banatis ad Ciklovam. Affin. S. ochroleucae. Cor. rubellae.

52. *papposa*, coroll. quinquefidis inaequalibus, caule herbaceo erecto, fol. pinnatifidis, seminibus aristatis plumosoque papposis. Syst. veg. Hab. in Creta. Knautiam refert. Caulis filiformis, brachiatus.

53. *pterocephala*, subcaulis, coroll. quinquefidis, caule procumbente fruticoso, fol. laciniatis hirsutis, pappo plumoso. Pterocephalus perenn. humilis laciniatus et incanus. Vaill. act. 1722. p. 184. Hab. in Graecia? ♀

227. KNAUTIA. Cal. communis oblongus, simplex, quinqueflorus ; proprius simplex, superus. Cor. irregulares. Recept. nudum. (Flor. aggregati.)

1. *orientalis*, foliis incis, corollulis quinque calyce longioribus. L. Willd. sp. 1. p. 561. Hab. in Oriente. ☉. Semina compressa, apice multidentata.

2. *propontica*, fol. superioribus lanceolatis integerrimis, corollulis denis calyci aequalibus. Villi. pis. 153. t. 48. In Oriente. Sem. corona 15-dentata ciliata. ♂

3. *palaestina*, fol. integris, calycibus hexaphyllis, seminibus papposis. Habit. in Palaestina. Semin. pappus radiis octo villosis. ○

4. *plumosa*, fol. superioribus pinnatis, calycibus decaphyllis, seminibus papposis. Hab. in Oriente. Pappus radiis 12, pilosis longis. ○

228. ALLIONIA. *Cal.* communis oblongus, simplex, triflorus; proprius obsoletus, superus. *Corollulae* irregulares. *Recept.* nudum. (Flor. aggregati.)

1. *violacea*, foliis cordatis, calycibus quinquefidis trifloris. Sp. pl. Hab. in Cumana.

2. *incarnata*, fol. oblique cordatis altero majore, calycibus triphyllis trifloris. L'Herit. strip. 63. t. 32. Flor. Peruv. 1. p. 49. Wedelia. Loeff. it. 180. Hab. in rupibus et arenosis Peruvianis. ○

229. OPERCULARIA. *Cal.* communis monophyllus, campanulatus inaequaliter dentatus; proprius o. *Corollulae* 4. - 5-fidae, aequales. *Recept.* claudens operculiforme, cui semina inferne affixa.

1. *umbellata*, flor. umbellatis monandris. Willd. sp. p. 563. Gaert. sem. 1. p. 112. t. 24. Hab. in Nova Hollandia.

2. *aspera*, flor. capitatis, calyce sulcato glabro. Willd. p. 564. Gaert. sem. 1. p. 112. t. 24. f. 4. Hab. in Nova Zeelandia cum sequente.

3. *diphylla*, flor. capitatis, cal. hispido. Willd. l. c. Gaert. sem. 1. p. 113.

230. CRYPTOSPERMUM. *Cal.* communis hexaphyllus: foliolis patentibus inaequalibus; proprius? e paleis receptaculi, triphyllus. *Corollulae* (sub-20) quadrifidae, primo ovatae. *Receptac.* globosum, paleaceum, subtus seminiferum. (Capsulae 1-loculares in receptac. subglobosum coalitae, medio longitudinaliter dehiscentes. Young.)

1. *Youngii*. Opercularia paleata. Tho-

mas Young. In Act. Soc. Lin. 3. p. 30. c. icon. Hab. in N. Hollandia. Flores aggregati ut in priore genere, a quo calyce polyphylo et receptaculi forma satis differt. ¶

231. EVEA. *Cal.* communis polyphyllus: foliolis 4 exterioribus latioribus; proprius quadridentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Pericarp.* . . . (Flor. aggregati.)

1. *guianensis*, capitul. axillaribus brevissime pedunculatis. Lam. ill. p. 258. t. 59. Aubl. Hab. in Guyana. †

232. HEDYOTIS. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis. *Caps.* 2-locularis, polysperma, infera. *Recept.* dissepimento undique adnata. *Gertn.*

1. *fruticosa*, fol. lanceolatis petiolatis, corymbis terminalibus involucriatis. Lin. Willd. sp. 1. p. 564. Fl. zeyl. 63. In Zeylona.

2. *racemosa*, fol. lanceolatis, racemis axillaribus et terminalibus nudiusculis. Lam. encycl. 3. p. 76. t. 62. f. 2. Rheed. mal. 10. p. 49. t. 25. Hab. in India.

3. *auricularia*, fol. lanceolato-ovatis, flor. verticillatis. Burm. zeyl. 227. t. 108. f. 1. Hab. in Zeylona. ¶

4. *hispida*, fol. lineari-lanceolatis hispidis, flor. verticillatis. Retz. obs. 4. p. 23. Hab. in China.

5. *maritima*, fol. ovalibus obtusis, flor. oppositis sessilibus. In India orientali. Caul. herbacei prostrati.

6. *pumila*, fol. ovatis acutis, flor. alternis pedunculatis. Lin. suppl. Hab. in Tranquebaria. Facies Anagallidis.

7. *setosa*, fol. ovatis acutis cum acumine, flor. terminalibus ternis. Flor. Peruv. 1. p. 56. t. 88. f. a. Hab. in Andium montib. in Tarma. h

8. *juniperifolia*, fol. linearib. margine revolutis, caul. procumbente ramosissimo, flor. terminalibus ternis. Fl. Per. p. 57. t. 87. Cresc. in Tarmae et Cantae locis frigidis. h

9. *thymifolia*, fol. linearibus, margine revolutis, flor. corymbosis. Fl. Per. 1. p. 56. t. 88. Cum priore. h

10. *filiformis*, fol. linearibus acuminatis, caul. ramosissimo filiformi repente, flor. solitariis terminalibus. Fl. Per. 1. p. 57. t. 87. b. In Andium alpiibus. Herbacea repens, habitu Galii.

11. *conferta*, fol. linearibus acuminatis, caul. ramosissimo repente, flor. terminilibus solitariis. Fl. Per. l. c. fig. a. Habit. in alpib. Cantae et Tarmae. h

12. *diffusa*, fol. lanceolatis acutis, flor. alternis pedunculatis, caule procumbente diffuso. Willd. p. 366. Habit. in India orientali.

13. *herbacea*, fol. lineari-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. Oldenlandia *tenuifolia*. Burm. ind. 37. t. 14. f. 1. Hab. in Zeylona.

14. *graminifolia*, fol. linearibus, caule decumbente, panicula racemosa dichotoma. Vahl. symbol. a. p. 27. Lin. suppl. 119. Alsiue spergulae foliis, capitulis brevibus duris. Pluck. mant. g. t. 332. f. 2. Hab. in India orientali. Caules filiformes debiles Stellariae gramineae.

15. *virgata*, fol. linearibus, caule erecto, panicula nuda dichotoma stricta, pedunculis lateralibus geminatis. Willd. p. 567. Hab. in Guinea.

16. *rupestris*, fol. quadrifariis subulatis canaliculatis, flor. sessilibus axillaribus, coroll. villosis: tubo curvo. Swartz. prod. 29. et Flor. H. americana. Jac. amer. 20. Sloan. hist. 2. t. 202. f. 1. Hab. in rupestribus maritimis Indiae occidentalis. h

232. SPERMATOCOCCE. Cal. 4-dentatus. Cor. 1-petala, infundibulif. Sem. 2, bidentata.

* *Floribus verticillatis.*

1. *tenuior*, glabra, foliis lanceolatis, staminibus inclusis, flor. verticillatis, seminibus hirtis. Willd. sp. 1. p. 568. Dill. elth. 370. t. 277. f. 359. Hab. in Carolina, Jamaica.

2. *coerulescens*, fol. ovatis acutis pilosculis laevibus, stipulis floribus verticillatis aequantibus, staminibus exsertis. Vahl. eclog. 1. p. 9. Aublet. t. 19. f. 2. Cresc. cum priore.

3. *prostrata*, glabra, fol. subsessilibus ellipticis acutis, flor. verticillatis, caule prostrato. Willd. Aubl. t. 20. f. 3. Hab. ad ripas Gujanae.

4. *radicans*, glabra, fol. subsessilibus lanceolatis, flor. verticillatis, caule procumbente radicante. Willd. Aubl. t. 20. f. 4.

5. *verticillata*, (*hyssopifolia*), glabra, fol. lanceolatis, verticillis globosis capitatisque. Mill. dict. n. 2. Dill. elth. t. 277. f. 353. Hab. in Jamaica, Africa. h. Odor Trifolii Meliloti.

6. *villosa*, villosa, simplex, fol. ovato-lanceolatis pubescentibus, summis quaternis, flor. verticillatis, stam. inclusis. Swartz.

7. *scabra*, fol. subrotundis cauleque hispidoscalbris, flor. verticillatis, stam. exsertis. Willd. sp. pl. 572. Hab. in India orientali. Foliis parvis orbiculatis distincta. W. t.

8. *articularis*, fol. ellipticis obtusiusculis subscabris. Lin. suppl. p. 119. Hab. in Indiae orientalis apricis argillosis. ©

9. *assurgens*, fol. lanceolatis lineatis margine scabris, verticillis parvis. Fl. Per. 1. p. 60. t. 92. Pluck. Alm. t. 136. f. 4? Cresc. in ruderatis Linnae et Huanuci, ubi per totum annum floret. t.

10. *gracilis*, glabra, fol. lanceolatis angustis, ramis inferioribus oppositis, superioribus dichotomis, verticillis minimis. Flor. Per. p. 61. t. 92. f. 2. ©

11. *stricta*, fol. lineari-lanceolatis lineatis, flor. verticillatis angustis. Linn. suppl. 120. Hab. in India orientali. ©

12. *linifolia*, fol. lineari-lanceolatis villosis laevibus, summis quaternis, flor. verticillatis, stam. exsertis Vahl. eclog. 1. p. 8. Hab. in Cajenna.

13. *spinosa*, suffruticosa, fol. lineari-bus spinulis ciliatis, flor. verticillatis paucifloris. Swartz. obs. 45. Hab. in Americae calidioris arvis. Folia Rosmarini.

** *Flor. axillaribus.*

14. *longifolia*, glabra, fol. lanceolatis utrinque cutis, margine scabris, verticillis dimidiatis (flor. axillaribus). Vahl. eclog. 1. p. 8. Aubl. Guj. 1. p. 58. t. 21. In Cajenna, Gujana.

15. *latifolia*, glabra (flavescens), fol. ovatis, caule erecto quadrangulati, stipul. calycib. villosis, flor. axillaribus. Lam. ill. p. 274. Aubl. t. 19. f. 1. In Gujana.

16. *aspera*, fol. ellipticis scaberrimis acutis glabriusculis, flor. axillaribus confertis, stam. inclusis. Vahl. eclog. 1. p. 10. Aubl. t. 22. f. 6. In India occidentali.

17. *hirta*, scabra, ramosa, fol. ovato-lanceolatis, flor. confertis axillaribus, stam. exsertis. Swartz. prod. p. 45. Lin. Syst. veg. p. 124. Hab. in Jamaica in graminosis siccis. ©

18. *hispida*, hispida, fol. obovatis obliquis, flor. axillaribus. L. Murr. Com. Gott. 3. t. 5. p. 77. Hab. in Zeylona. Cor. violacea turbinate-campanulata. ©

*** *Flor. terminalibus capitatis.*

19. *alata*, fol. ovatis, summis sessilib., flor. terminalibus capitatis, caule 4-gono alato repente. Willd. sp. p. 569. Aub. t. 22. f. 7. Hab. in Gujana ad ripas. Flor. caerulei. ¶

20. *hexagona*, fol. ovatis petiolatis, flor. terminalib. (capitatis), caule prostrato 6-gono. Willd. c. Aubl. t. 22. f. 8. C. priore.

**** *Flor. corymbosis.*

21. *sumatrensis*, fol. lanceolatis hispidis, corymbis terminalibus dichotomis. Retz obs. 4. p. 21. Hab. in Sumatra.

22. *peruviana*, fol. lanceolatis nervosis plicatis, flor. dichotomo-corymbosis terminalibus. S. *corymbosa*. Flor. Per. 1. p. 60. t. 91. a. Hab. in Munae rudceratis in Peruvia. Suffruticosa.

23. *procumbens*, fol. linearibus, caule procumbente, corymb. lateralibus pedunculatis. L. syst. veg. 19. p. 124. In India. S. *corymbosa*. L. Sp. pl. ed. 2. p. 149.

134. *SHERARDIA*. Cor. 1-petala, infundibulif. Sem. 2, tridentata.

1. *arvensis*, fol. omnibus verticillatis, flor. terminalibus. Flor. dan. t. 439. Hab. in arvis. ☉

2. *muralis*, fol. floralibus binis oppositis binis floribus. Allion. pedem. n°. 34. t. 77. f. 1. Column. exphr. t. 302. Hab. in Italia, et Constantinopoli in vetustis muris. Fruct. reflexi asperi. ☉

3. *fruticosa*, fol. quaternis aequalibus, caule fruticoso. Hab. in insula Adscensionis An hujus generis? ¶

235. *ASPERULA*. Cor. 1-petala, infundibuliflor. Sem. 2, globosa.

1. *odorata*, foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis, fructu hispidulo. Smith. brit. 1. p. 172. Curt. Lond. ic. Hab. in umbris, sylvis montosis.

2. *hexaphylla*, fol. senis linearibus, flor. umbellatis terminalibus subsessilibus. Allion. ped. n°. 48. t. 77. f. 3. Hab. in rupibus Pedemontanis. ¶

3. *arvensis*, fol. senis, flor. terminalibus sessilibus aggregatis. Hab. in agris praesertim cal. arcis. Flor. caerulei.

4. *hirta*, fol. senis linearibus acutis hispidis, flor. terminalibus aggregatis involucro longioribus. Raymond in Bull. d. sciences n°. 41. p. 131. t. 9. Hab. in Pyre-

nacis, in siccis, rupestribus, praesertim cal. arcis. Flor. nivi, extus subpurpureascentes.

5. *algerica*, fol. senis linearibus acutis denticulatis, inferioribus hirsutis, flor. aggregatis terminalibus. Desf. Atl. 1. p. 127. (Asp. *hirsuta*). Hab. in collibus Algeriae. Cor. pallide rosea: laciniis ovoideis. D.

6. *taurina*, fol. quaternis ovato-lanceolatis, flor. fasciculatis terminalibus. Moris. 8. q. t. 21. f. 1. Hab. in alpinis Helvetiae, Italiae.

7. *crassifolia*, subfrutescens, fol. quaternis oblongis lateralibus revolutis obtusiusculis pubescentibus. Hab. in Creta, Oriente. Flores fasciculati, terminales. Cor. extus pubescentes. ¶

8. *aristata*, fol. linearibus subcarnosis, inferioribus quaternis, fl. subternis aristatis. Linn. suppl. Hab. in Europa australi.

9. *tinctoria*, fol. linearibus: inferioribus senis; intermediis quaternis, caule flaccido, flor. plerisque trifidis. Hab. in Sueciae, Germaniae, Galliae, Sibiriae collibus aridis. Rad. rubra. ¶

10. *pyrenaica*, fol. quaternis lanceolato-linearibus, caule erecto, flor. saepius trifidis. Hab. in Pyrenaeis et prope Valentiam.

11. *cynanchica*, fol. quaternis linearibus: superioribus oppositis, caule erecto, floribus quadrifidis. Hab. in pratis aridis ad vias. Cespitosa.

12. *laevigata*, fol. quaternis ellipticis obsolete nervosis laevibus, margine glabris, fructibus scabris. Willd. sp. p. 579. Moris. 8. q. t. 21. f. 4. Hab. in Europa australi. Non confundenda cum Galio rotundifolio.

236. *DIODIA*. Cor. 1-petala, infundibuliformis. Caps. 1-locularis, 2-sperma.

1. *virginica*, caule ramo procumbente laevi, fructib. hirsutis. Mich. Flor. 1. p. 81. Jacq. ic. rar. 1. t. 29. Lam. ill. t. 63. Hab. in Virginiae aquis. ¶

2. *simplex*, caul. herbaceo simplici erectiusculo laevi, fol. ovato-lanceolatis. Sw.

3. *glabra*, procumbens, glabra, fol. ovali-lanceolatis, verticillis multifloris. Michaux. Flor. 1. p. 82. Hab. in sabulosis sylvarum Carolinae.

4. *verticillata*, caul. herbaceo simplici erecto laevi, fol. lanceolatis verticillatis. Willd. sp. p. 580. Vahl. symb. 2. p. 28. Hab. in insula St. Crucis.

5. *prostrata*, caul. suffruticoso subdico. ramis prostratis filiformibus, fol. linearibus hirsutiusculis revolutis. Swartz. prod. 30. Hab. in Jamaica, Cumana. \bar{h}

6. *scandens*, caul. scandente suffruticoso, fol. ovato-lanceolatis rigidis scabris. Swartz. prod. 30. Hab. in Hispaniola. \bar{h}

7. *sarmentosa*, caul. flaccido fruticoso, ramis oppositis patentibus, fol. oblongis acutis scabriusculis. Sw. In Jamaica.

237. **HYDROPHYLAX.** *Cor.* 1-petala infundibuliformis. *Cal.* quadripartitis, Bacca exsueca angulata 2-locul. dissepimento transversa. *Sem.* solitaria.

1. *maritima*. Lam. ill. t. 76. Lin. suppl. 126. Sarissus anceps. Gaert. sem. 1. p. 118. t. 25. f. 4. Hab. in Indiae arenosis. Facies Arenariae rubrae.

238. **KNOXIA.** *Cor.* 1-petala, infundibuliformis. *Sem.* 2, sulcata. *Calycis* unicum folium maius.

1. *zeylanica*, floribus spicatis, fol. glabris. Willd. p. 582. Burm. ind. 34. t. 13. f. 2. Lam. ill. t. 59. f. 1.

2. *corymbosa*, flor. corymbosis, fol. subtus pubescentibus. Willd. Gaert. sem. 1. t. 25. f. 8? Lam. t. 59. f. 2. Hab. in India orientali.

239. **CARPHALEA.** *Cor.* 1-petala infundibuliformis intus hirta. *Cal.* 4-fidus: laciniis spatulatis scariosis. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *corymbosa*. Willd. sp. 1. p. 583. Carphalea madagascariensis. Lam. ill. t. 59. f. 4. Hab. in Madagascar.

240. **HOUSTONIA.** *Cor.* 1-petala infundibulif. *Caps.* 2-locularis, 2-sperma, supera.

1. *coerulea*, fol. radicalibus ovatis (spatulatis), caule composito, pedunculis primis bifloris. L. Moris. 4. 15. t. 4. f. 1. H. Linnaei. Michaux. Fl. p. 84-85. Hab. in Virginia. Var. magnitudine et flor. albis.

2. *serpillifolia*, caespitosa, fol. ovalibus in petiolum angustatis, pedunc. terminalib. 1-floris longissimis. Michaux. Flor. 1. p. 85. Hab. ad rivulos in montibus Carolinae. Fol. subciliata. *Cor.* caerulea. \bar{h}

3. *rotundifolia*, repens, fol. suborbiculatis ciliatis, pedunc. axillarib. 1-floris. Mich. l. c. Cresc. in apricis submarinis Floridae. Sempervirens. *Cor.* alba.

4. *angustifolia*, erecta ramosissima, fol. linearibus, flor. terminalib. fasciculatis subsessilibus saepe ternis. Mich. Hab. in submarinitis uti antecedens. *Cor.* purpurasc. Caps. subturbinata.

5. *coccinea*, fol. ovato-lanceolatis subternis, caul. suffruticoso, flor. corymbosis. Andrew. Repos. t. 106. Hab. in Mexico.

6. *purpurea*, fol. ovato-lanceolatis, corymbis terminalibus, flor. superis. Knoxia purpurea. Lam. ill. p. 250. Hab. in Virginia. An diversi generis? Conf. Michaux, Flor. 1. p. 86.

241. **GALIUM.** *Cor.* 1-petala, plana. *Sem.* 2, subrotunda.

* *Fructu glabro, passim scabro nec hispido. Fol. quaterna.*

1. *Rubioides*, fol. quaternis lanceolatis ovatis trinerviis rigidis subscabris, caul. erecto, fructibus glabris. Schrad. spicil. p. 10. Hab. in Europa australi et in Sibiria. Caulis firmus, erectus. \bar{L} .

(?) *hyssopifolium*, fol. quaternis inaequalibus linearilanceolatis obtusis glabris Hoffm. germ. ed. 2. p. 71. Hab. in pascuis sylvaticis montosis. Caul. erectus (subflaccidus). Panic. trichotoma subovata. \bar{H} .

2. *articulatum*, fol. ovatis trinerviis scabris, caul. ascendente: articulis nodosis. Lam. ill. t. 1. p. 260. Hab. in Oriente.

3. *latifolium*, caul. erecto laevi, fol. quaternis amplioribus oblongo-ovalibus trinerviis: margine nervisque subhispidis, pedunc. divaricatis multifloris. Mich. Flor. 1. p. 79. Hab. in Carolinae subalpinis. Flor. violaceo-purpurci.

4. *palustre*, fol. quaternis obovatis inaequalibus, caulib. diffusis. Hab. in paludosis. caul. flaccidus. \bar{H}

5. *trifidum*, fol. quaternis linearibus, caule procumbente scabro, cor. trifidis. Flor. dan. t. 48. In Dania, Canada. Stam. 3.

6. *fruticosum*, fol. quaternis linearibus obtusis glabris, caule tetragono frutescente, seminibus glabris. Willd. p. 585. Tournef. cor. 4. Hab. in Creta. \bar{h}

7. *montanum*, fol. subquaternis linearibus laevibus, caul. debili scabro, sem. glabris. \bar{L} . Hab. in Germania, Gallia. Inter G. Molluginum et glaucum medium. Corymbi trifidi. \bar{L} . \bar{H}

8. *hirsutum*, procumbens hirsutum, fol. quaternis lanceolatis aequalib. caul. ramossissimo, pedunc. 1-floris, fructib. scabris. Flor. Peruv. t. p. 59. Hab. in Peruvia in Cantae umbrosis. ☉

9. *corymbosum*, repens, fol. quaternis lanceolatis oblongis, ramulis corymbosis, pedunc. 1-floris, fructib. glabris. Fl. Per. l. c. In alpihus Tarmae. ☉

10. *ciliatum*, procumbens, fol. quaternis lanceolatis ciliatis aequalibus reflexis, pedunc. 4-phyllis 1-floris, fructib. glabris. Flor. Per. l. c. Cresc. in collibus aridis Tarmae. Vere.

11. *ovale*, scandens hirsutum, fol. quaternis oblongo-ovalibus acuminatis aequalibus, pedunc. 1-floris, fructib. glabris. Fl. Per. l. c. Hab. in Peruviae versuris et rudertatis. Vere.

12. *croceum*, procumbens, fol. quaternis linearibus ciliatis subtus scabritusculis, pedunc. 1-floris, fructib. glabris rubris. Fl. Per. p. 59. Cum priore.

13. *mucronatum*, diffusum, fol. quaternis linearibus mucronatis aequalib. corol. 4-fidis, fructibus glabris lacteis. Fl. Per. t. p. 60. Habit. in aridis Tarmae ad Curis tractus.

Obs. An forte ex enumeratis hisce Peruvianis speciebus quaedam ad Valantiae genus pertinent? An *G. croceum* idem ac *Rubia chilensis* Molinae?

14. *Claytoni*, caul. procumbentibus: angulis retro scabris, fol. subquaternis lineari-lanceolatis obtusis margine nervisque hispidulis. Michaux. Flor. t. p. 78. Hab. in Canada. Flor. pauci, minuti, albi.

15. *asperellum*, caul. decumbentibus retro aculeatis, fol. senis ovali-lanceolatis: eumine flaccido margine nervisque hispidulis. Michaux l. c. Cresc. in Canadae septentrionalibus.

16. *uniflorum*, fol. quaternis longo-linearibus acutis glabris, caul. laevi, pedunc. unifloris cernuis, fructu glabro. Michaux. Hab. in Carolina. Sequenti affine.

* * *Fol. ut plurimum senis.*

17. *tinctorium*, fol. linearibus: caulibus senis: ramorum quaternis, caul. flaccido, pedunculis subbifloris, fructib. glabris. Hab. in America septentrionali.

18. *capense*, fol. senis linearibus glabris, caule frutescente erecto. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. spei. ? *G. frutescens*. Cav. ic. 3. p. 3. t. 206. f. 2. In Hispania.

19. *mucronatum*, fol. senis linearibus mucronatis glabris, caule pubescente debili. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

20. *expansum*, fol. senis linearibus mucronatis glabris, ramis divaricatis pubescentibus, panicula trichotoma. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

21. *asperum*, fol. senis oblongis serratis, caule hispido piloso, florib. paucis. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

22. *glabrum*, fol. senis oblongis serratis, caule hispido glabro, flor. paniculatis. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

23. *viscosum*, fol. infimis quaternis obovatis superioribus senis lineari-lanceolatis antrorsum serratis, carina canleque laevi. Vahl. symbol. 2. p. 29. Hab. in montosis Tuncii. ☉

24. *purpureum*, fol. verticillatis linearisetaceis, flor. terminalibus subpaniculatis, pedunc. capillaribus folio longioribus. Hab. in Italia, Gallia et Helvetia.

25. *rubrum*, fol. verticillatis linearibus patulis, pedunculis brevissimis. L. Hab. in Palatinatu, Italia.

26. *megalospermum*, fol. quinatis lanceolatis margine hispidis, pedunc. geminatis terminalibus. Willd. p. 594. Allion. pedem. n. 35. t. 79. Hab. in monte Cenasio. Flor. albedo-flavi. Semina magna scabra. W.

27. *spurium*, fol. senis lanceolatis carinatis scabris, retrorsum aculeatis, pedunc. axillarib. ramosis divaricatis, fructib. laevibus. Roth. N. Beytr. p. 141. *G. hispidum*. Ej. germ. 2. p. 185. Hab. in culis, ad sacpes. *G. Aparine* simile. ☉

28. *uliginosum*, fol. senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis mucronatis canleque rigidis, cor. fructu majore. Lin. Hab. in uliginosis montosis, pascuis aquosis. ☉

* *hircynicum*, glabrum cespitosum procumbens, fol. senis obovatis mucronatis, ramis brevibus confertis, flor. glomeratis. *G. hircynicum*. Weig. obs. p. 25. Hab. in montosis, sylvaticis, graminosis, arcnosis satis frequens. Vix a sequente diversum.

29. *saxatile*, fol. senis obovatis obtusis, caule ramosissimo procumbente, fructu granulato. Smith. brit. p. 175. Petiv. herb. brit. t. 30. f. 6. *G. montanum*. Huds. Habit. in Hispania, Italiae, Helvetiae, et Angliae alpinis et ericetis.

30. *Witheringii*, fol. quinis reflexis lanceolatis aristatis ciliatis, caul. erectiusculo simplici scabro, panic. terminali tri-

chotoma. *G. montanum*. Withering. arang. 1. p. 187. t. 28. Smith. Brit. 1. p. 174. Hab. in ericetis montosis subhumilis in Anglia.

31. *austriacum*, fol. suboctonis glabris mucronatis, caul. diffuso, ramis floriferis subtrichotomis. *G. glabrum*. Hoffm. germ. el. 2. p. 72. *G. austriacum*. Jacq. austr. t. 60. *G. laeve*. Thuill. Paris. p. 77? Hab. in Germania et Gallia?

32. *erectum*, fol. suboctonis lanceolatis antrorsum aculeato-serrulatis mucronatis, panic. trichotomis, caul. laeviusculo flaccido. Smith. Brit. 1. p. 6. With. arrang. 1. p. 189. Hoffm. l. c. Hab. in Anglia et Germania. Caul. ramosissimus, flaccidus. Sm.

33. *scabrum*, caespitosum, caul. sublaevi depresso ascendente, basi tomentosa, fol. 6-8 linearibus subasperis mucronatis, infimis minutissimis (emarciditis) ellipticis, pedunculis trichotomis s. ternis. *G. scabrum*. Jac. austr. t. 422. Murr. Syst. veg. p. 151. *G. pusillum*. Lin. Smith. Brit. 1. p. 177. Engl. bot. t. 74. *G. Bocconi*. Allion. Willd. sp. 1. p. 587. *G. supinum*. Lam. *pachale*. Vahl? *G. asperum*. Schreb. *G. vivipare*. Poll. *G. pallens* et nitidulum. Thuill. hujus loci sunt. Hab. in montosis praesertim calcareis satis frequens, etiam in sylvaticis.

Obs. *G. anisophyllum*, pusillum argenteum, corrodacofolium *Villarsii* hujus tantum varietates?

34. *tenue*, fol. senis subulatis laevibus, pedunc. trifidis, petalis aristatis. Willd. Vill. delph. 2. p. 322. t. 7. Hab. in alpinis Delphinatus. \mathcal{T}

35. *Jussieu*, fol. subsenis lineari-subulatis laevibus, flor. umbellatis, caule ascendente. Willd. Caulib. filiformibus prostratis, fol. quinque angustis acutissimisque, flor. subumbellatis. Villars delph. 2. p. 323. t. 7. *G. caespitosum*, Lam. enc. An sequentis var.? Juss. Act. paris. 1714. p. 373. t. 15. f. 2. In alpinis Delphinatus et Salsandiae. \mathcal{T}

36. *pyrenaicum*, fol. senis, flor. lateralibus oppositis subsessilibus solitariis. Lin. suppl. 121. Gouan. illust. 5. t. 1. f. 4. *G. mucoides*. Lam. *G. hypnoides*. Vill. delph. Hab. in Pyrenaeis. \mathcal{T}

*** *Fol. plus minusve octonis.*

37. *minutum*, caul. decumbente, fol. octonis lanceolatis mucronatis serrato-aculeatis glabris incurvis, fruct. reflexis. Gmel. sib. 3. p. 169. Hab. in imperio ruthenico. Flor. lutei. Caul. laevis.

38. *verum (luteum)*, fol. octonis linearibus sulcatis, flor. paniculatis, ramis floriferis brevibus. Hab. in sylvaticis ad versuras agrorum. \mathcal{T}

39. *Mollugo*, nitidum, fol. octonis ovato-linearibus subserratis reflexis mucronatis, caule flaccido, ramis patenibus. Flor. dan. t. 455. β . pubescens. Schrad. spic. p. 16. Cresc. in pratis, ad sepes, vias. Flor. citrini, albi.

40. *lucidum*, caespitosum, fol. verticillatis suboctonis breviusculis patulis nitidis rigidis linearibus, caul. erecto: cortice basi secedente emarcido. Allion. pedem. n^o. 21. t. 77. f. 2. *G. rigidum*. Vill. delph. 2. p. 319? Hab. in Europa meridionali, locis siccis petrosis. Praecedenti affine.

41. *elatum*, caul. elongato valido: geniculis tumidis, fol. suboctonis obovatis breviusculis opacis, panic. densa. Thuill. Paris. p. 76. Cresc. in dumetis, ad sepes. Flor. albi. Inter *G. Molluginem* et sequentem media species. \mathcal{T}

42. *sylvaticum*, fol. octonis lanceolatis laevibus subscabris: floralibus binis, pedunc. capillaribus, caul. laevi stricto: geniculis tumidis. Lin. *G. laevigatum*. Villars? Hab. in sylvis. Flor. primo penduli.

43. *linifolium*, fol. subseptenis linearilanceolatis laevibus, pedunc. capillaribus, caul. erecto tetragono. Aiton. Kew. 1. p. 144. Hab. in Europ. australi. \mathcal{T}

44. *rigidum*, fol. verticillatis linearibus supra scabris, paniculis divaricatis, caul. erecto tereti piloso-scabriusculo. Ait. Kew. 1. p. 144. Hab. \mathcal{T}

45. *aristatum*, fol. octonis lanceolatis laevibus, panic. capillari. petalis aristatis, sem. glabris. Syst. veget. booc. mus. 83. t. 75. Hab. in Baldo. \mathcal{T}

46. *obliquum*, fol. octonis angustis, inferioribus cano-hirtis superioribus glabris, cor. aristatis. Vill. Delph. 2. p. 320. t. 8. Hab. in pascuis, locis aridis lapideis in Delphinatu. A. G. scabro ob petala omnino diversum videtur.

47. *glomeratum*, glabrum, fol. octonis linearibus serratis, caul. aspero paniculato, petal. aristatis, sem. glabris. Desf. Atl. 1. p. 128. Hab. in Barbaria inter segetes.

48. *hierosolymitanum*, fol. denis lanceolato-linearibus, umbellis fastigiatis, fructibus glabris. L. Hab. in Palaestina. \dagger

49. *glaucum*, caul. tereti, fol. linearibus margine revolutis subulis laevibus, ramis pe-

danculisque trichotomis, cor. campanulatis. Jacq. aust. t. 81. Hoff. germ. p. 73. Hab. in Germania. Cor. magna.

*** *Fructu hispido.*

50. *loreale*, fol. quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, sem. hispidis. Hab. in pratis, sylvis.

51. *rotundifolium*, fol. quaternis subrotundo-ovatis trinerviis hispido-ciliatis. Willd. Roth. germ. II. 186. G. decipiens. Ehrh. herb. 63. Bo. c. sicul. 10. t. 6. f. 1. Mor. s. 9. t. 21. f. 5. In montosis nemorosis.

52. *bermudianum*, fol. quaternis linearibus obtusis, caul. ramosissimo Sp. pl. 151. Hab. in Virginia.

53. *lappaceum*, fol. quaternis hispidis oblongis acuminatis, pedunc. 1-floris, fructibus lappaceis. Flor. Per. 1. p. 59. Hab. in Peruvia. Herbacea, subscandens.

54. *ericoides*, fol. subquinis oblongis hispidis, margine revolutis, fructib. ciliatis sessilibus et axillaribus. Lam. encycl. 2. p. 577. Hab. in Monte Video Brasiliæ.

55. *hispidulum*, pumilum ramosissimum cum fructu hispidum, fol. quaternis subovalis-lanceolatis margine revolutis subrugosis. Michaux, p. 80. Hab. in Carolina inferiore.

56. *punctatum*, caul. subaspero, fol. quaternis ovalibus obtusis inermibus margine nervisque subpubescentibus punctatis, fructib. lappulaceis. Mich. l. c. Habit. in Carolina inferiore. Flor. purpurei. G. purpureum. Walter.

57. *circaezans*, caul. erecto laevi, fol. quaternis ovalibus planis inermibus, margine ciliato, pedunc. divaricatis paucifloris, fruct. cernuis lappulaceis. Michaux. Cresc. cum prior.

58. *triflorum*, caul. procumbente basi hispidulo, fol. 6 ovali-lanceolatis mucronatis laevibus, pedunc. lateralibus et terminalibus trifloris, fructu hispidulo. Mich. l. c. In sylvis umbrosis Canadae.

59. *setaceum*, fol. senis lineari-subulatis glabris denticulatis, caul. laevi subereti, fructib. hispidis. Lam. ill. p. 264. enc. 2. p. 584. Desf. Atl. 1. p. 129. In Hispan. et Barbar.

60. *provinciale*, fol. 6-8 linearib. rigidis margine scabris, panic. parvis terminalibus. Lam. l. c. Hab. in Gallia australi et Italia.

61. *divaricatum*, fol. subsenis linearibus hispidis, ramis divaricato-dichotomis,

Lam. l. c. Hab. in Galliae arenosis et petrosis.

62. *tunetanum*, caul. tereti canescente, fol. 8-12 linearib. pubescentibus margine revolutis asperis, sem. hispidis. Desf. Atl. 1. p. 129. Lam. ill. p. 263. Hab. in Algeria in sepibus. Facies G. veri. L.

63. *ruthenicum*, fol. suboctonis linearibus scabris mucronatis, margine revolutis, caule pubescente, pedunculis germinibusque hirtis. Willd. r. p. 597. Hab. ad Wolgam inferiorem. T. Facie et magnitudine G. lutei. Flores albi. W.

64. *Aparine*, fol. octonis lanceolatis cernis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis. Flor. dan. 495. In Europae cultis et ruderalis, ad saepes. ☉

65. *aparinoides*, fol. senis oblongis margine carinaque retrorsum aculeatis, geniculis glabris. Vahl. symbol. 2. p. 30. Forsk. descr. p. 30. Hab. in umbrosis Arabiae.

66. *album*, fol. suboctonis oblongis inermibus margine scabris, caule pubescente herbaceo laevi. Vahl. l. c. Hab. Smyrnae.

67. *microcarpum*, fol. subsenis; inferioribus oblongis, superioribus setaceis, pedunc. trifidis. Vahl. symb. Hab. in montosis aridis Tuneti, rarius in Hispania. Simil. G. parisiensi.

68. *parisiense (tenerum)*, fol. linearibus subsenis cauleque scabris, pedunc. bifloris, fructibus hispidis. Gallium parisiense tenuifolium, flore atropurpureo? Tournef. G. *anglicum*. Huds. Smith. brit. 1. p. 179. Raj. angi. 3. t. 9. f. 1. Hab. in Anglia Hispania, Helvetia, Gallia, in arenosis.

*** *Fructu villosa.*

69. *pilosum*, fol. quaternis subovalibus pilosis enerviis, seminib. pilosis. Ait. Kew. 1. p. 145. In Amer. boreali.

70. *maritimum*, caule hirtio, fol. quaternis hispidis, pedunc. unifloris, fructibus villosis. Gouan. illust. 5. Hab. in Oriente, Monspelii.

71. *maritimum*, hirtum, fol. subsenis lineari-lanceolatis, caul. lignosis. L. Hab. in Cretae rupibus. h. Caulces varie flexi, tortuosi, lignosi.

72. *capillare*, caul. tenui 4-gono, fol. octonis, fructu minimo albo-tomentoso. Cav. ic. 2. p. 73. t. 131. f. 1. Hab. in Hispaniae monte St. Michaelis et in colle Montana verda. Cor. rubens. ☉

VALANTIA.

42. **VALANTIA**. Flor. polygami.
Hermaphr. Cal. o. (subintegerr.
 Juss.) *Cor. 4-fida. Styl. 2-fidus.*
Sem. 1: altero sæpius abortivo.
Flor. Masculini. Cor. ut plurimum
trifida, et 3-4-andra: pistillo
abortivo. (Fol. an Bractæ? post
anthesin reflectuntur et fructum
obtegunt.)

1. *Cruciata*, fol. quaternis ovatis hirsutis, pedunc. lateralibus diphyllis, flor. masculinis plurimum 4-fidis. Lin. Gal. cruciatum. Smith. brit. 1. p. 173. Söwerb. engl. bot. t. 143. Hab. ad sæpes, in sylvaticis. \mathcal{T}

2. *glabra*, flor. masculis 4-fidis, pedunc. dichotomis, fol. 3-nerviis ovalibus ciliatis. Scop. carn. p. 344. Schkuhr. Handb. t. 345. Hab. in Carinthiæ, Italiæ et Ungariæ umbrosis. Priore tenerior, et fere glabra. \mathcal{T}

3. *articulata*, flor. masc. 4-fidis, pedunc. dichotomis aphyllis, flor. cordatis. Hort. ups. p. 303. Hab. in Aegypto, Syria et Mauritania. Fructu maturo, caulis ad articulos discedit. L.

4. *muralis*, tota glabra, flor. masculis trifidis, fructu laevi. Moris. s. g. t. 29. f. 2. Col. esphr. 1. p. 298. t. 297. Hab. in Galliæ meridionalis et Italiæ muris. \odot

5. *hispida*, flor. masc. trifidis, caul. fructibusque hispidis. Lin. In Europa australi.

6. *Aparine*, pedunc. trifloris, flore intermedio sessili, lateralibus masculis trifidis subpedicellatis, fructu tuberculato. Vaill. paris. t. 4. f. 3. b. Cresc. passim inter segetes. Facies Galii Aparines. Caul. scaber. Fol. antorsum aculeata. Roth. \odot

7. *spuria*, pedunc. trifloris, flor. omnibus pedicellatis, fructu (majusculo) granulato reflexo, caul. decumbente simplici aculeato. Galium spurium auct. G. tricornis. Smith. Valantia tricornis. Roth. N. Bot. beyer. p. 142. Vaill. paris. t. 4. f. 3. a. a. In agris frequens. Fol. retrorsum aculeata.

8. *coriata*, fructibus subrotundis bractea lata cordata obtectis. Hab.... Sub segetis nomine passim occurrit.

9. *Cucullaria*, caul. ramosissimo multifloro, bract. pedicellatis ovatis fructum laxare involventibus. Burz. cent. 1. p. 13. t. 29. f. 2. Hab. in Hispania et Oriente.

Obs. Ob fructus formam peculiare hac ex specie constitui meretur genus.

43. **CRUCIANELLA**. *Cor. 1-petala, infundibuliformis: tubo fili-*

formi; limbo unguiculato. Cal. 2-phyllus. Sem. 2, linearia.

1. *angustifolia*, erecta, fol. senis linearibus, floribus spicatis. Lin. Hab. Monspelii

2. *latifolia*, procumbens, fol. quaternis lanceolatis, floribus spicatis. Lin. C. priore.

3. *aegyptiaca*, fol. quaternis sublinearibus; flor. spicatis quinquefidis. Mant. Hab. in Aegypto. \odot

4. *patula*, diffusa, fol. margine revolutis, bracteis lineari-subulatis scabriusculis, flor. sparsis. Willd. sp. pl. 602. Hab. in Hispania. \odot

5. *pubescens*, erecta, fol. subsenis linearibus pubescentibus, capitulis pedunculatis axillaribus et terminalibus. Willd. l. c. Hab. in Creta. Cor. purpurascens pube tenui tectæ. W.

6. *maritima*, procumbens suffruticosa, fol. quaternis mucronatis, florib. oppositis quinquefidis. Lin. In Creta et Monsp.

7. *capitata*, procumbens suffruticosa, fol. senis sublinearibus, flor. capitatis quinquefidis. Billardiere icon. pl. Syr. Decas. 1. p. 12. t. 3. Hab. in Monte Libano. Flores atri, capitati.

8. *monspeliaca*, procumbens, fol. acutis: caulinis quaternis ovatis; ramis linearibus, flor. spicatis. Lin. Hab. Monspelii, inque Palaestina. \odot


244. **RUBIA**. *Cor. 1-petala, campanulata, 4-5-fida. Baccæ 2, monospermæ. (Stam. 4-5.)*

1. *tinctorum*, fol. lanceolatis subsenis annuis, caule aculeato scandente. β . *sylvestris*, fol. inferioribus senis, superne quaternis binisve, utrinque asperis. Mill. Hab. Monspelii, in Italia, Helvetia, Danubii pratis. Flor. 4-5 fidi.

2. *acaliculata*, caul. laevi hexagono, fol. petiolatis ovato-lanceolatis retrorsum aculeatis. Cav. ic. 2. p. 75. t. 195. Hab. in Madras. Fl. Dec. Cor. 5-partita. Stam. 5. Cal. o, uti in quibusdam albis. \mathcal{T}

3. *chilensis*, fol. annuis quaternis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris, caule laevi. Willd. p. 604. Molin. chil. p. 118. An Galium croceum. Flor. Per. Feuill. peruv. 85. t. 45. Hab. in regno chilensi. \mathcal{T}

4. *pergrana*, fol. subquaternis perennantibus linearibus supra laevibus, caul. asperis. R. h. florum. Willd. Moris. sect. 9. t. 21. f. 2. Hab. in Gallorum Monte Pilati,



Lugduni, Nicaeae. inque Anglia, Russia.
Flor. 5-fidi et stam. 5. Sm. ☞

5. *lucida*, fol. perennantibus (4-6) ellipticis lucidis, caule laevi. Hab. in Majorca. Similis R. peregrinae, sed folia margine tantum retrorsum scabra, non vero carina. Flor. 5-fidi. Stig. 2, capitata.

6. *fruticosa*, fol. perennantibus ellipticis margine carinaque aculeatis, caule frutescente aspero. Ait. Kew. 1. p. 14. Jacq. ic. rar. 1. t. 25. Collect. 1. p. 71. Habit. in fruticetis Teneriffae. ☞

7. *angustifolia*, fol. perennantibus linearibus supra scabris, caul. diffuso. Mant. p. 39. Lam. ill. gen. 1. 60. f. 2. Hab. in Minorca. Flores lutei, 5-fidi.

8. *cordifolia*, fol. perennantibus quaternis cordatis. Pall. itin. 3. app. n. 68. t. 1. fig. 1. Hab. in Maiorca, Cap. b. spei, Sibiria, China, Japonia. ☞

9. *Browni*, subhispida, fol. quaternis ovalibus, pedunculis solitariis uniflor. Mich. Fl. 1. p. 81. Brown. jam. p. 141. Valantia hypocarpia. Lin. Hab. in Carolinae umbrosis.

245. **MATTUSCHKÆA**. *Cal.* 4-partit. *Cor.* infundibulif. 4-fida. *Sem.* 4, nuda.

1. *hirsuta*. Willd. sp. 1. p. 606. Vahl. symbol. 3. p. 11. Perama hirsuta. Aubl. gujan. 1. p. 54. t. 18. Lam. ill. 1. 68. Hab. in Gujenae locis humidis arenosis. ☉

246. **SIPHONANTHUS**. *Cor.* 1-petala, infundibulif. longissima, infera. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* 4, monosperma.

1. *indica*. Willd. sp. 606. S. salicis folio, flore flavescente. Amm. Act. petrop. Lam. ill. p. 318. t. 79. f. 1. Hab. in America meridionali. Racemus terminalis.

247. **ROUSSEA**. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* campanulata, 4-fida, infera: lacin. revolutis. *Bacca* 4-angularis polysperma.

1. *simplex*. Smith. icon. ined. 1. p. 6. t. 6. Hab. in insula Mauriti. ☞

248. **FROELICHIA**. *Cal.* superus 4-dentatus. *Cor.* tubulosa. *Bacca* 1-sperma exsucca. *Semen* arillatum.

1. *paniculata*. Willd. sp. 1. p. 607. Billardiera paniculata. Vahl. eclog. 1. p. 13. t. 10. Hab. in insula Trinitatis. ☞

249. **SCOLOSANTHUS**. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* tubulosa, limbo revoluta. *Drupa* monosperma.

1. *versicolor*. Willd. l. c. Vahl. eclog. 1. p. 11. t. 10. Catesbaea parviflora. Lam. ill. 1. 67. f. 2. Hab. in insula St. Crucis. ☞

250. **CATESBÆA**. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis, longissima superpera. *Stam.* intra faucem. *Bacca* polysperma, bilocularis.

1. *spinosa*, cor. tubo longissimo baccis ovalibus. C. longiflora. Swartz. Catesb. carol. 2. p. 100. t. 100. Hab. in insula Providentiae. ☞

2. *parviflora*, cor. tubo tetragono abbreviato, baccis subrotundis. Swartz. Vahl. eclog. 1. p. 12. Sloan. hist. 2. p. 100. t. 207. f. 1. Hab. in Jamaica. ☞

251. **IXORA**. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis longa. *Stam.* supra faucem. *Stigm.* 2-fidum crassum. *Bacca* 4-sperma.

1. *coccinea*, fol. sessilibus ellipticis obtusis mucronatis, corymbis terminalibus. Willd. sp. 1. p. 609. Burm. zeyl. 125. t. 57. Rumph. amb. 4. p. 105. t. 46. Rheed. mal. 2. p. 17. t. 13. Hab. in India. Caulis tuber. ☞

2. *parviflora*, fol. subsessilibus lanceolato-oblongis, panicula terminali. Vahl. symbol. 3. p. 11. t. 52. Cum priore.

3. *alba*, fol. ovato-lanceolatis, florib. fasciculatis. Pluck. alm. Rheed. mal. 2. p. 19. t. 14. In India. ☞

4. *Pavetta*, fol. ovato-lanceolatis undulatis obtusis petiolatis, flor. corymbosis. Andrew. t. 78. Hab. in India. Flor. odorati, lutescentes.

5. *ternifolia*, fol. ternatis lanceolatis subsessilibus, flor. fasciculatis coccineis. Cav. ic. 4. p. 3. t. 305. Hab. in Nova Hispania.

6. *americana*, fol. ternis lanceolato-ovatis, flor. thyrsoidis. Amoen. acad. 5. p. 393. Hab. in Jamaica. ☞

7. *fasciculata*, fol. ovato-ellipticis, ramulorum subfasciculatis, pedunculis filiformibus subtrifloris. Swartz. prodr. 30. Chomelia fasciculata. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 238. Hab. in Jamaica. ☞

8. *multiflora*, fol. lanceolato-ovatis fasciculatis, pedunc. aggregatis unifloris brevius-

simis, bacca monosperma. Swartz. prod. 30. Hab. in Jamaica. *h*

Obs. An hujus quoque generis *Lonicera* corymbosa L. ? Limites inter hoc et sequens genus non satis distincti extant. Ambo hinc a cel. Laniarckio conjunguntur. Vid. ill. gen. p. 285.

252. PAVETTA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Stigm.* incrassatum, curvum. *Lin.* *Bacca* 1-locularis, 1-2-sperma:

1. *amplexicaulis*, glabra, fol. amplexicaulibus ovalibus, corol. laciniis acute lanceolatis. Hab. in India orientali.

2. *indica* (obtus), fol. subspicatis obovatis, cor. laciniis rotundatis. Cum prior, quacum saepius confunditur. De Pavetta indica L. vide. Willd. sp. 1. p. 128. *Ixora paniculata*. Lam. ill. p. 205? *h*

3. *villosa*, ramis calycibusque villosis incanis, fol. lanceolato-ellipticis, floribus fasciculatis. Vahl. symbol. 3. p. 12. Hab. in Arabia felici. *h*

4. *longiflora*, ramis glabris, fol. lanceolato-ellipticis, stipulis intus pilosis, calycibus quadrifidis, flor. fasciculatis. Vahl. symb. 3. p. 12. *Ixora occidentalis*. Forsk. Hab. in Arabia feli i. *h*

5. *caffra*, fol. obovatis, flor. subumbellatis, calycibus setaceo-aristatis. Thunb. pr. 29. Lin. suppl. 121. *Grinitha capensis*. Houttey. t. 40. f. 1. Hab. ad Cap. h. spec. *h*

6. *pentandra*, fol. oblongo-lanceolatis acuminatis, panic. trichotoma axillari, flor. pentandris. Willd. p. 611. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 233. Plum. ic. t. 156. f. 1. Hab. in India occidentali. Flor. suaveolentes. *h*

253. ERNODEA. *Cor.* 1-petala hypocrateriformis. *Cal.* 4-5-partitus. *Bacca* 2-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *littoralis*, fol. lanceolatis 5-nerviis, floribus sessilibus. Lam. ill. p. 276. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 223. t. 4. Sloan. hist. t. 189. f. 1. et 2. Hab. in Jamaica, in Insul. Carib. *h*

2. *pungens*, fol. lanceolatis rigilibus multinerviis mucronato-pungentibus, flor. pendunculatis. Lam. 1 c. Hab. in Amer. meridionali. *Cal.* 5-fidus.

Obs. An Ernodelae cum sequente genere potius ad *Ixoras* aut *Pavettas* pertinent? Plura haecce *Rubiaceae* genera, inter se

nimis affinia, in *visis* denno accuratius examinari debent, quo characteres firmiores eruantur.

254. SIDERODENDRUM. *Cor.* tubulosa. *Cal.* 4-dentatus. *Sigm.* 2, revoluta. *Bacca* dicocca 2-locul. *Sem.* solitaria.

1. *triflorum*. Vahl. eclog. 1. p. 10. Jacq. amer. 19. t. 175. f. 9. Pluck. alm. 346. t. 224. f. 2. Hab. in sylvis montosis Martinicae et Monserrat. Arbor procera. *Cor.* saepe mutatur in folliculum oblongum forte ab insecto quodam. V. *h*

255. HOFFMANNIA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* hypocrateriformis, 4-partita, tubo brevissimo. *Filam.* 6. *Anth.* conniventes. *Bacca* bi-locularis poly-perma infera.

1. *pedunculata*. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 242. Hab. in Jamaica. *T*

256. CHOMELIA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* hypocrateriformis 4-partita. *Drupa* infera nucē 2-loculari. *Stigm.* 2, crassiuscula.

1. *spinosa*. Jacq. amer. 18. t. 13. Hab. in Carthagenae sylvaticis. Arbor ramis horizontalibus. *h*

257. PETITIA. *Cal.* 4-dentatus inferus. *Cor.* 4-partita. *Drupa* nucē 2-loculari.

1. *domingensis*. Jacq. amer. 14. t. 182. f. 6. Hab. in Domingo sylvaticis. Arbusecula ramis tetragonis striatis. *h*

258. MYONIA. *Cal.* minimus subinteger. *Cor.* 4-partita tubo brevi. *Drupa* nucē 5-locul. 4-sperma.

1. *obovata*, foliis obovatis acuminatis. Willd. sp. 1. p. 614. Lam. encyclop. t. 68. f. 1. Hab. in insula Borbonia. *h*

2. *lanceolata*, fol. lanceolatis. Willd. Lam. t. 68. f. 2. Hab. in insula Borbonia. *h*

259. PYROSTRIA. *Cal.* minimus sub 4-dentatus. *Cor.* campanula 5-fida fauce tomentosa. *Drupa* pyriformis infera, 8-striata. *Nuces* 8, monospermae.

1. *salicifolia*. Pyrostria Lam. t. 68. f. 4. Hab. in insula Mauriui. *h*

260. MELANEA. *Cal.* 4-dentatus.

Cor. infundibuliformis, 4-fida.
Drupa infera nuce 2-locul. *Stylus*
2-fidus.

1. *sarmentosa*. Cunninghamia: caule
scandente; fol. oppositis obovatis obtusis sub-
tus tomentosis. Willd. sp. 1. p. 615. Melanea
sarmentosa. Lam. encyc. 3. p. 653. t. 66. f. 2.
Aubl. guj. 1. p. 106. t. 41. Hab. in Gujana. h

2. *verticillata*, caule erecto, fol. ternis
glabris oblongis acuminatis. Willd. l. c.
Lam. t. 66. f. 1. Antirhea borbonica. Gmel.
Juss. Hab. in insulis Mauritiis et Borbonia. h

261. *EGIPHILA*. *Cal.* 4-dentatus.
Cor. 4-fida. *Styl.* filiformis se-
mibifidus. *Bacca* 2-locularis: lo-
culis 2-spermis.

1. *martinicensis*, fol. ovato-lanceolatis
acuminatis glabris, ramis diffusis, panic.
terminalibus axillaribusve, calycib. glabris.
Swartz. prod. l. 51. Jacq. obs. 2. p. 3. t. 27.
Lam. ill. gen. t. 70. f. 1. In Martinica ad
sylvaram margines. h

2. *arborescens*, fol. ellipticis acuminatis
glabris planis, corymb. axillaribus, cal.
ramisque incanis. Vahl. ecl. 1. t. 10. Ma-
neha. Aubl. t. 24. Hab. in Gujana et ins.
Trinitatis. h

3. *villosa*, corymb. axillaribus termina-
libusque, fol. ellipti o-lanceolatis subius
pedunc. calicibusque villosis incanis. Vahl.
l. c. Maneha. Aubl. p. 62. t. 23. In Cajen-
nae campis aridis. Priori affinis. h

4. *laevis*, fol. ovatis acuminatis glabris,
cymis capitatis tripartitis axillaribus, fruc-
tibus oblongis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 66.
t. 25. Aeg. lutea. Lam. ill. t. 70. f. 3. Hab.
in sylvis Gujanae. h

5. *foetida*, fol. ovato-lanceolatis, subius
petiolisque hirsutis, pedunculis axillaribus
solitariis. Swartz. prod. 32. Hab. in Ja-
maica. h

6. *trifida*, fol. ovato-lanceolatis glabris,
pedunculis axillaribus trifidis confertis. Sw.
prod. 32. Hab. in Jamaica. h

7. *multiflora*, fol. oblongis, flor. axilla-
ribus. Flor. Per. 4. p. 50. t. 76. Hab. in
Peruvia ad fluviorum margines. Frutex
ligno durissimo et Corni habitu.

262. *NUXIA*. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 1-
petala, 4-fida. *Stam.* in fauce.
Stigm. truncatum. *Caps.* carnosa,
disperma. Lam.

1. *verticillata*, fol. ternis verticillatis.
Lam. ill. gen. t. 71. Hab. in ins. Borbonia.

2? *elata*, fol. ellipticis acuminatis sub-
membranaceis oppositis. Aegiphila elata.
Swartz. Flora 1. p. 254. Brown. Jam. t. 3.
f. 3. Incolit fruticeta Jamaicae. Stam. ex-
serta. Pistill. abbreviatum. Sw.

263. *MITCHELLA*. *Cor.* 1 - petalae
superæ, binæ eidem germini.
Stigm. 4. *Bacca* bifida, 4-
sperma.

1. *repens*. Chamaedaphne. Mitch. gen.
27. Pluck. amalth. 198. t. 444. f. 2. Gatesb.
carol. 1. p. 20. t. 20. Hab. in Carolina,
Terra Mariana, Virginia. h

264. *COCCOCYPSILUM*. *Cal.* 4-
dentatus. *Cor.* infundibuliformis.
Stylus semibifidus. *Bacca* inflata,
2-locularis, polysperma. Sem.
lentiformia, libera.

1. *repens*, caule herbaceo repente, foliis
ovatis, flor. confertis axillaribus sessilibus,
Willd. sp. 1. p. 618. Swartz. prod. 31.
Brown. jam. 144. t. 6. f. 2. Hab. in montosis
Jamaicæ. h

2. *Condalia*, caul. herbaceo repente,
fol. ovatis acutis, flor. umbellatis. Condalia
repens. Flor. peruv. 1. p. 54. t. 84. Hab. in
Peruviae nemorosis.

3. *lanceolatum*, caul. herbaceo radi-
cante, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc.
multifloris. Fl. Per. l. c. Sub Condalia. Cum
priori in umbrosis.

4. *sessile*, caul. erecto suffruticoso, fol.
oblongis acutis, flor. sessilib. congestis axil-
laribus. Fl. Per. l. c. Sub Condalia.

5. *obovatum*, caul. erecto suffruticoso,
fol. obovatis acuminatis, pedunc. aggrega-
tis, flor. racemosis. Fl. Per. l. c. In nemori-
bus Andium ad Chinchao montes.

6. *uniflorum*, caule erecto fruticoso, fol.
obovatis acuminatis, pedunculis axillaribus
unifloris, stigmatib. capitatis. Willd. Fern-
elia buxifolia β. Lam. encyc. 2. p. 448.
t. 67. f. 1. Hab. in ins. Mauritiis. h

7. *biflorum*, caule erecto fruticoso, fol.
ovatis acutis, pedunculis axillaribus biflo-
ris, stigmatibus subulatis. Willd. Fernelia
buxifolia α. Lam. enc. 2. p. 448. t. 67. f. 2.
Hab. in insula Borbonia.

265. *GONZALEA*. *Cal.* campanula-
tus, 4-dentatus. *Cor.* infundibu-
liformis. *Drupa* nuce 4 poly-
spermas includens.

1. *pendula*, fol. ovatis subcrenatis, ra-

mis pendulis. *Gonzalagunia* dependens. Flor. Per. 1. p. 56. t. 86. Hab. in Serunaë nemoribus. Cor. etiam sequentis, subto- mentoso rubella. h

2. *panamensis*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis, stigm. 4-5do. Buena. Cav. ic. 6. p. 50-51. t. 571. Hab. in Panama. h

296. HIGGINSIA. Cal. 4-dentatus. Cor. infundibuliformis: limbo 4-partito. *Stigma* 2-labiatum prominens. *Bacca* bilocularis, bisulca, umbilicata, polysperma.

1. *aggregata*, fol. oppositis lanceolatis, pedunc. aggregatis verticillatis. Flor. Per. 1. p. 55. t. 83. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. h

2. *obovata*, fol. oppositis obovatis acuminatis, pedunc. aggregatis multifloris inaequalibus. Flor. Peruv. p. 56. t. 85. Cresc. in provincia Panatahuarum locis umbrosis. h

3. *verticillata*, fol. ternis lanceolatis, pedunc. solitariis dependentibus subquadri- floris. Flor. Per. 1. p. 55. t. 85. f. a. In Muna nemoribus per runcationes. h

Obs. An hujus generis *Bertiera*. Aubl. ? vid. Willd. sp. 2. p. 980.

297. WALLERIA. Cal. 4-fidus, inferus, laciniis obtusis. Cor. tubu- losa, 4-fida: lacin. erectis. *Bacca* 1-sperma.

1. *laurifolia*. Swartz. Flor. 1. p. 248-249. t. 6. Bryonia nigra fruticosa, fol. lau- rimis. Sloan. hist. 2. 234. t. 145. f. 5. Hab. in Jamaica, Hispaniola. h

298. CALLICARPA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. *Bacca* 4-sperma.

1. *americana*, foliis ovalibus serratis subtus tomentosis, cymis sessilibus. Lam. encycl. 1. p. 556. Pluck. alm. 33. t. 136. f. 3. Catesb. carol. 2. p. 47. t. 47. Hab. in Caro- lina, Virginia. Cal. cylindricus, vix qua- dridentatus. h

2. *cana*, fol. ovatis denticulatis per peti- olem semidecurrentibus, subtus villosos- canis, paniculis dichotomis. Vahl. symb. 3. p. 12. Retz. obs. 5. p. 1. Hab. in Malaba- ria, Cochinchina. h

3. *lanata*, fol. ovatis basi rotundatis in- tegerrimis subdenticulatis, supra rugosis subtus ramisque lanato-tomentosis. Vahl. l. c. p. 13. C. tomentosa. Lin. Hab. in India. h

4. *macrophylla*, fol. lanceolato-ellipticis

crenatis attenuatis, supra rugosis, subtus ra- misque tomentoso-incanis. Vahl. p. 13. t. 53. Hab. in India. h

5. *globiflora*, fol. oblongo-lanceolatis dentato-serratis integerrimisque, cymis di- chotomis. Flor. Per. 1. p. 49. t. 77. Hab. in Chinchoa nemoribui. h

6. *cordifolia*, fol. cordatis ovatisque acutis integerrimis, cymis brachiatis. Flor. Peruv. 1. p. 50. t. 77. f. a. Cresc. in Munna nemorib. Hirsuta. h

7. *ferruginea*, fol. lato-lanceolatis ser- ratibus subtus scabriusculis, cymis termina- libus axillaribusque. Swartz. prod. 31. Hab. in Jamaica. h

8. *reticulata*, fol. elliptico-lanceolatis subseratis reticulato-nervosis, subtus to- mentoso-incanis. Swartz. prod. 61. Flor. 1. p. 252. Hab. in Jamaica. h

9. *longifolia*, fol. lato-lanceolatis utrin- que glabris, superne serratis. Vahl. symb. 3. p. 13. Lam. encycl. p. 556. t. 69. f. a. Hab. ad Malaccam. h

10. *integrifolia*, fol. ovatis acutis inte- gerrimis, subtus subtomentosis, racemis densis axillaribus et terminalibus, tubo co- rollae calyce quadruplo longiore. Willd. p. 62. Jacq. amer. 15. tab. 173. f. 7. Hab. in sylvaticis Carthagenae. h

11. *villosa*, fol. oblongo-ovatis integer- rimis, subtus venoso-reticulatis villosis, racemis axillaribus, pedic. multifloris. Vahl. symbol. 3. p. 14. Habit. in India orientali. ? h

12. *japonica*, fol. oblongis acuminatis medio serratis glabris. Willd. Thunb. jap. 60. Hab. in Japonia. h

299. AQUARTIA. Cal. campanula- tus. Cor. rotata: laciniis linea- ribus. *Bacca* polysperma.

1. *aculeata*, foliis repandis tomentosis. Willd. p. 62. Jac. amer. 15. t. 12. Lam. ill. t. 82. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. Stam. numero solummodo a Solanis differt. h

2. *microphylla*, fol. minimis integris subnudis, aculeis subgeminatis patentibus. Lam. l. c. p. 327. t. 82. f. 2. Hab. in St. Domingo. Solanum lycioides refert. h

300. WITHERINGIA. Cor. subcam- panulata: tubo quadrigibulo. Cal. minimus, 4-dentatus. *Bacca* 2- locularis. Anth. conniventes.

1. *solanacea*. L'Herit. sert. 1. 33. tab. 1

Lam. ill. t. 82. Habit. in America meridionali. Umbel. axillares. $\text{\textcircled{T}}$

271. *MYRMECIA*. *Cal.* campanulatus, 5-dentatus. *Cor.* tubulosa: faucē inflata. *Glandul.* 5, germinis basin cingentes. *Caps.* 2-locul. 2-valv. polysperma.

1. *scandens*. Willd. sp. p. 623. *Tachia gujanensis*. Aubl. gujan. 1. p. 75 t. 29. Hab. in sylvis Gujanæ ad ripas rivulorum. In cavitatē trunci et ramorum degunt formicæ, unde nomen. Aubl. h

272. *POLYPRIMUM*. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida, rotata: lobis rotundatis. *Caps.* compressa, emarginata, bilocularis, polysperma.

1. *procumbens*. Willd. sp. 1. p. 623. Lam. encyl. t. 71. Michaux. Flor. 1. p. 83. Pet. gaz. q. t. 5. f. 6. Hab. in Carolina, Virginia. Flos. plurib. bracteolis circumvallatus. $\text{\textcircled{O}}$

273. *LABATIA*. *Cal.* 4-phyllus inferus. *Cor.* subcampanulata, 4-fida: lacinia 2, minutæ, in divisionis corollæ. *Caps.* 4-locul. *Sem.* solitaria.

1. *sessilifolia*, florib. sessilibus, foliis tomentosis. Willd. sp. 1. p. 623. Habit. in Hispaniolæ fruticetis montosis. *Caps.* passim 2-locul. Swartz.

2. *pedunculata*, flor. pedunculatis, fol. glabris. Willd. *Ponteria gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 86. t. 33. Habit. in sylvis Gujanæ. h

274. *LASIOSTOMA*. *Cal.* 5-fid. *Cor.* infundibuliformis: faucē villosa. *Caps.* 1-locul., disperma.

1. *cirrhusa*. Willd., p. 624. Rouhamon gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 93. t. 36. Ad ripas fluminum Gujanæ. h

275. *MANETTIA*. *Cal.* 4-5-8-partitus. *Cor.* infundibuliformis, 4-5-partita: faucē barbata. *Caps.* oblonga, 2-locularis, 2-valvis: valvis duplicatis. *Sem.* numerosa, imbricata alata. (Stain. 4-5. Plantæ volubiles aut scandentes.)

1. *umbellata*, fol. ovatis subcordatis-

que, stipulis connatis acuminatis, pedunc. umbellatis multifloris. Flor. Per. 1. p. 58. t. 90. f. a. Hab. in Munna nemorib.

2. *mutabilis*, pubescens, fol. ovatis oblongisque acuminatis, stipulis semicircularibus, flor. subracemosis lateralib. Flor. Per. l. c. t. 89. (M. *racemosa*.) *Cal.* plerumque 4-5-partitus, sæpe 8-10-partitus.

3. *acutiflora*, fol. lanceolatis acutissimis connatis acuminatis, pedunc. 1-3-floris. Flor. Per. t. 89. f. b. In Peruviae nemoribus. Glabra.

4. *Lygistum*, fol. ovatis acutis venosis, caule volubili suffrutescente. Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 323. *Petesia Lygistum*. L. Brown. jam. 142. t. 3. f. 2. Hab. in Jamaica, in montibus altis. $\text{\textcircled{T}}$

5. *coccinea*, fol. ovatis acuminatis, racemis multifloris, caule volubili fruticoso. Willd. sp. 1. p. 625. *Nacibea coccinea*. Aubl. gujan. 1. p. 96. t. 37. f. 1. Habit. in Gujana. h

6. *picta*, fol. ovatis acutis, calyce quadridentato, caule volubili fruticoso. Willd. Aubl. guj. 1. p. 98. t. 37. f. 2. Hab. in Gujana. Folia luteo-variegata. h

7. *lanceolata*, fol. lanceolatis, calyce quinquefido inequali, florib. pentandris, caule erecto. Willd. Vahl. symbol. 1. p. 12. Hab. in montibus altioribus Hadie. h

276. *TONTANEA*. *Cal.* 4-fid. superus. *Cor.* 4-fida. *Nect.* margo 4-lobus stylum cingens. *Caps.* 2-locul. 2-partibilis polysperma.

1. *repens*. *Tontanea gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 108. t. 42. Lam. ill. t. 64. *Bellaridia*. Willd. sp. 1. p. 626.

277. *PENŒA*. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* campanulata. *Stigm.* 4-lobum. *Caps.* tetragona, 4-locularis, 8-sperma.

1. *Sarcocolla*, fol. ovatis planis imbricatis, calyc. ciliatis folio majoribus. Pluck. mant. 183. t. 446. f. 6. Willd. sp. 1. p. 626. Lam. ill. t. 78. f. 2. Hab. in Aethiopia. h

2. *mucronata*, flor. terminalibus fol. acuminatis glabris. Thunb. prod. 30. Hab. in Aethiopia et in Cap. bon. spei cum sequentibus speciebus. Flor. rubri. Stylus tetragonus.

3. *marginata*, fol. cordatis marginatis, flor. lateralibus. Habit. juxta Capitiis b. spei

furio. Fol. opposita s. terna, cordata, subsessilia obtusiuscula. *h*

4. *lateriflora*, fol. ovatis, florib. lateralibus sessilibus. Lin. suppl. p. 122. Hab. in Cap. b. spei. Fol. opposita sessilia acutiuscula. *h*

5. *tomentosa*, flor. lateralibus, fol. ovatis tomentosis. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei. *h*

6. *fuscata*, fol. rhombeo-ovatis, bracteis cuneatis acutis coloratis. Mant. 199. Lam. t. 78. f. 2. Hab. in Capitis b. spei montibus. Flor. purpurei. *h*

7. *squamosa*, fol. rhombeo-cuneiformibus carnosiss. Thunb. prod. 30. Hab. in Aethiopia, et Cap. b. spei. Cor. majuscula.

8. *fruticulosa*, fol. oblongiusculis obtusis, bracteis orbiculatis acutis. Lin. suppl. 121. Thunb. prod. 30. Ad Cap. b. spei. *h*

9. *Myrtilodes*, fol. lanceolatis. Lin. sup. 122. Thunb. prod. 30. Cum priore.

278. *BLERIA*. Cal. 4-partitus. Cor. 4-fida. Stamina receptaculo inserta. Caps. 4-locularis, polysperma.

1. *ericoides*, antheris muticis exsertis, calycibus tetraphyllis, bracteis ternis longitudine calycis. Foliis quaternis oblongo-acerosis pilosis imbricatis, cor. campanulatis. Aiton. Kew. t. p. 149. Willd. sp. 1. p. 629. Erica Blæria. Thunb. prod. 72. Pet. gar. t. 2. f. 10. Hab. uti omnes sequentes species, quae frutices sunt, ad Cap. bonae spei.

2. *scabra*, antheris muticis, fol. quaternis lanceolatis piloso-hispidis, florum capitulis erectis, corollis clavatis. Erica scabra. Thunb. prod. 72. (qui hoc genus *Ericis* inseruit.)

3. *fasciculata*, antheris muticis, fol. quaternis lanceolatis ciliato scabris, capitulis erectis.

4. *articulata*, antheris muticis exsertis, fol. quaternis ovatis glabris, florum capitulis cernuis, cor. cylindricis. Lam. ill. t. 78. Erica eriocephala. Encycl. n°. 78. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *purpurea*, antheris muticis inclusis, fol. quaternis ovatis subciliatis, florib. umbellatis, caule flexuoso erecto. Lin.

6. *muscosa*, antheris muticis subexsertis, calycib. monophyllis pilosis, corollis cam-

panulatis superne pilosis, floribus axillaribus, stigmatibus peltatis. Aiton. Kew. 1. p. 150. Erica albens. Thunb. prod. 70?

7. *pusilla*, antheris muticis, fol. ternis linearibus piloso-hispidis, flor. racemosis cernuis. Lin.

8. *glabella*, antheris aristatis, fol. quaternis oblongis glabris margine scabris, flor. aggregatis terminalibus. Blæria purpurea. Berg. cap. 34. Sebaethes. 1. p. 30. t. 20. f. 2. Hab. in Cap. b. spei.

9. *ciliaris*, antheris aristatis, fol. quaternis glabris, calyce lacero ciliato. Erica plumosa. Thunb. prod. 73. Hab. in Cap. b. spei.

279. *BUDDLEIA*. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Stamina ex iucisuris. Caps. 2-sulca, 2-locularis, polysperma.

1. *americana* (*Verbusci*), fol. ovato-lanceolatis serratis, stipul. subreniformibus revolutis, racemis compositis subpaniculatis. Flor. Per. 1. p. 53. t. 82. Willd. sp. 1. p. 631. Hab. in Caribæis ad ripas et torrentes et in Peruvia. *h*

2. *occidentalis*, fol. lanceolatis integris serratisque, flor. paniculatis: spicis verticillatis. Flor. Peruv. 1. p. 53. t. 82. Pluck. alm. 270. t. 210. f. 1. Hab. in America, prope Limam. etc. *h*

3. *globosa*, fol. lanceolatis acuminatis crenatis, subtus tomentoso-albis, capitulis globosis oppositis pedunc. Lam. encyc. 1. p. 507. t. 69. f. 2. Flor. Per. 1. p. 52. t. 83. Jac. ic. rar. 2. t. 307. Collect. 2. p. 332. Hab. in Chili locis humidis. *h*

4. *incana*, fol. oblongis lanceolatisque crenulatis, stipul. marginalibus, pedunc. ternatim divisis, flor. capitatis. Flor. per. 1. p. 52. t. 80. Hab. in Peruviae ripis. Arbor 6-orgialis.

5. *connata*, fol. lanceolatis connatis crenatis, stipulis reniformibus, pedunc. solitariis capitatis. Flor. Peruv. 1. p. 52. t. 81. Hab. in Chancay segetibus et versuris. *h*

6. *diffusa*, subscandens, fol. ovatis subcordatisque acutis, stipul. reniformibus reflexis, pedunc. axillaribus, flor. capitatis. Flor. per. t. 80. Hab. in Peruv. ad agrorum margines, ubi fere semper floret.

7. *picata*, fol. ovatis utrinque acutis serratis, spicis longissimis simplicibus. Flor. Peruv. p. 53. t. 81. In versuris et locis aridis Munnæ. *h*

8. *salvifolia*, fol. lanceolatis cordatis crenatis rugosis, subtus tomentosis, florib. paniculatis. Willd. p. 612. *Lantana salvifolia* fol. oppositis subsessilibus, flor. racemosis. Lin. Hab. ad Cap. b. spei. h

9. *madagascariensis*, fol. ovato-lanceolatis subtus tomentosis integerrimis, racemis terminalibus. Vahl. symbol. 3. p. 14. Lam. encycl. 1. p. 507. t. 69. f. 3. Hab. in Madagascar. h

10. *salicifolia*, fol. lanceolatis extrorsum serratis, subtus tomentosis, racemis terminalibus, pedicellis multifloris, floribus nutantibus. Vahl. symbol. 3. p. 14. Hab. in Bonaria?

11. *diversifolia*, fol. ovalibus glabris integerrimis subrepandisque, corymbis axillaribus subquinqüefloris. Vahl. symbol. 3. p. 15. Hab. in Java. h

12. *virgata*, fol. lineari-oblongis obtusis integris, racemis terminalib., ramis virgatis erectis. Lin. suppl. 123. Hab. in Cap. bon. spei. Habitus Hyssopi. h

13. *incompta*, fol. fasciculatis ovatis canis, ramis flexuosis rigidis, racemis terminalibus. Lin. suppl. 123. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei. h

280. LINNÆA. *Cal. superus duplex: fructus 2-phyllus; floris 5-partitus. Cor. campanulata. Stam. subdidynama. Bacca sicca trilocularis.*

1. *borealis*. Flor. dan. t. 3. Habit. in Suecia, Germania etc. et in Amer. boreali. *Cal. fructus 4-phyllus?* Plauta sempervirens, e fam. Caprifol. T.

281. CODONIUM. *Cal. duplex: inferus 1-phyllus inæquale bifidus; superus turbinatus subinteger. Cor. campanulata. Drupa obovata. Stigm. capitatem.*

1. *arborescens*. Von Rohr Genera plant. in Skriver af Naturhistorie Selskabet 1793. X. p. 206-207. t. 6. Arbuscula 8-10-pedalis. Genus Lonicerae affine.

282. EXAGUM. *Cal. 4-phyllus. Cor. 4-fida: tubo globoso. Caps. 2-sulca, 2-locularis, polysperma, apice dehiscens: locul. 2-spermis.*

1. *viscosum*, fol. oblongis nervosis amplexicaulibus, florib. quinquefidis, bracteis cordato-perfoliatis calyce longioribus.

Smith. icon. pict. fasc. 3. t. 18. Willd. sp. p. 634. *Gentiana viscosa*. Ait. Kew. 1. p. 321. Hab. in Canariis. T.

2. *pedunculatum*, flor. quadrifidis terminalibus, calycis foliolis ovatis, fol. lanceolatis trinerviis impunctatis. Vahl. symbol. 3. p. 15. Pluck. mant. 43. t. 343. f. 3. Hab. in India orientali. ☉

3. *albens*, fol. subdecurrentibus, staminibus exsertis. Lin. suppl. 123. Burm. afr. 207. t. 74. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

4. *aureum*, fol. sessilibus, flor. cymosis, staminibus exsertis. Lin. suppl. 123. Lam. ill. t. 80. Pluck. alm. 94. t. 275. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

5. *sessile*, flor. quadrifidis lateralibus terminalibusque, capsulis nutantibus, fol. cordatis. Vahl. symbol. 3. p. 16. Habit. in Zeylona ad agrorum limites, et in sylvaticis. Caulis simplicissimus. Cor. subcampanulata albidula.

6. *cordatum*, flor. quinquefidis, calycis foliolis cordatis striatis. Lin. suppl. 124. *Gentiana exacoides*. Sp. pl. 332. Burm. afr. 208. t. 74. f. 5. Seb. mus. v. 1. t. 22. f. 7. Pluck. alm. 94. t. 275. f. 4. Habit. ad Cap. b. spei. ☉

7. *punctatum*, fol. brevissime petiolatis oblongis trinerviis punctatis, stam. exsertis. Lin. suppl. 124. Hab. in India. Cor. coerulescens.

8. *quadrangulare*, calycib. truncatis quadridentatis quadrangularibus longitudine tubi. Willd. sp. 1. p. 636. *Gentiana quadrangularis*. Lam. encycl. 2. p. 638.

9. *gujanense*, cor. quadrifidis, calycib. membranaceo-carinatis laevibus, fol. lanceolatis. Vahl. symb. 3. p. 16. Aubl. gujan. 1. p. 68. t. 26. f. 1. Hab. in Cajenna. ☉

10. *diffusum*, cor. quadrifidis, calycib. membranaceis quadrifidis, fol. ovatis acutis trinerviis, caule divaricato ramoso. Willd. *Gentiana diffusa*. Vahl. symbol. 3. p. 47. Hab. in India orientali. ☉

11. *tennifolium*, cor. quadrifidis, calyc. quadripartitis. laciniis lanceolato-subulatis, panicula dichotoma. Willd. p. 638. Aubl. guj. 1. p. 70. t. 26. f. 2. Hab. in pratis humidis Cajennae, Gujanae. ☉

12. *filiforme*, cor. quadrifidis, caule filiformi subramoso, foliis radicalibus subrotundis, caulinis subulatis. W. *Gentiana filiformis*. L. Fl. dan. t. 324. Vaill. paris. 32. t. 6. f. 3. Hab. in pratis humidiusculis.

13. *aphyllum*, cor. quinquefida, caule

simplici aphylo. Willd. *Gentiana aphylla*, Jacq. amer. 87. t. 60. f. 3. Hab. in sylvis montosis Martinicae.

14. *heteroclitum*, cor. quadrifidis, caule alato brachiato, floribus sessilibus. Willd. p. 639. Hab. in Malabaricae agris. Stamina inaequalia : tria intra tubum, quartum faucibus insertum. Stigma bilabiatum. An species Coutoubae?

15. *verticillatum*, flor. verticillatis, cor. quinquefidis, laciniis mucronatis, calycibus apice reflexis capsula longioribus, caule scaberrimo simplici. Willd. p. 640. *Gentiana verticillata*. L. Vahl. symb. 3. p. 46. Plum. spec. 3. ic. 81. f. 2. Hab. in America calidiore.

16. *hyssopifolium*, flor. verticillatis, cor. quinquefidis : laciniis acutis, calycibus capsula brevioribus, caule subramoso glabro. Willd. Retz. obs. 2. p. 15. Burm. afr. 206. t. 74. f. 3. Hab. in India orientali. Cor. fulva.

283. **CENTAURIUM**. *Cal.* 4-partitus appressus. *Cor.* subcampamulata 4-partita. *Stigm.* crassum, glandulosum subbifidum. *Caps.* (cal. et cor. persistentibus involucreta) 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *vernum*, caule simplice, cor. laciniis oblongis, stylo germine longiore. Michaux. Flor. 1. p. 98. t. 12. f. 2. (*Centaurella*). Hab. in humidis, sphagnosis Car. inferioris.

2. *autumnale*, caul. subramoso, cor. laciniis ovalibus, stylo germine multo brevior. Michaux l. c. t. 12. f. 1. (*Centaurella paniculata*). Cum priore.

Obs. Plantulae sunt graciles antecelenti generi affines, ex quo nonnullae species forte huc referendae.

284. **COUTOUBEA**. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 1-petala, 4-fida : *Squamæ* 4, cucullatae. *Stigm.* bilabiatum. *Caps.* 2-valvis, polysperma.

1. *spicata*, foliis binis, spicae floribus subsparis. Aubl. gujan. t. 27. *C. alba*. Lam. ill. p. 319. t. 79. *Exacum spicatum*. Vahl umb. 3. p. 17. Willd. Spec. 1. p. 639. Hab. in Guiana ad ripas rivulorum.

2. *ternifolia*, fol. ternis, spic. flor. densa. Cav. ic. 4. p. 14. t. 328. Hab. in Panama. Flor. pariter albi. ☉

3. *purpurea*, caule ramoso, flor. pedicellatis axillaribus. Lam. ill. l. c. C. ramosa. Aubl. t. 28. *Exacum ramosum*. Vahl. l. c. Cresc. in Guiana et Cayennâ in sylvis ad rivulorum ripas. Flor. purpurei.

Obs. Genus hocce, *Gentianis* affine, ab ill. Schreber (Gen. pl. p. 791.) *Picrium* denominatum est.

285. **FRASERA**. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida patens : Petala medio glandula barbata. *Caps.* compressa submarginata, 2-locularis. *Sem.* pauca imbricata.

1. *caroliniensis*. Gmel. Syst. Nat. L. 2. p. 256. Fr. *Walteri*. Michaux flor. 1. p. 96-97. Hab. in paludosis Carolinae. Planta altissima, fol. oblongo-ovalibus oppositis verticillatisque.

286. **PLANTAGO**. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida : limbo reflexo. *Stamina* longissima. *Caps.* 2-locularis, circumscissa.

† *Acaules*, scapo nudo.

* *Fol. latis*, ut plurimum ovatis.

1. *cordata*, fol. cordatis (?) latissimis subdentatis glabris, spica longissima floscul. imbricatis. Lam. ill. 1. p. 338. *P. canadensis*. Hort. Par. *P. Kentuckensis*, fol. lato-ovalibus subintegris, spic. flor. sparsis glomeratisque, cal. bracteisque rotundatis. Mich. Flor. 1. p. 94. Hab. in Kentucky, et Canada.

2. *cucullata*, fol. ovatis concavo-enculatis novemnerviis, subtus pubescentibus, spica cylindrica imbricata, scapo tereti alto. Lam. ill. p. 339. *P. maxima*. Ait. Jacq. ic. rar. t. 26. Willd. sp. 1. p. 642. In Sibiria. T.

3. *sinuata*, fol. ovatis sinuato-dentatis glabriusculis, spica cylindrica, caps. retusis. Lam. l. c. Hab. in ins. mauritiana.

4. *crispa*, fol. ovatis (basi) sinuato-dentatis undulatis subcarnosis, scapis brevissimis. Lam. ill. p. 339. Jacq. coll. suppl. p. 34. t. 16. *P. crassa*. Willd. *P. crassifolia*. Roth. Hab. in Europa meridionali?

5. *vaginata*, caule fruticoso (fol. deciduis) basi vaginato, fol. ovatis denticulatis. Vent. Jard. de Cels. p. 29. t. 29. Cresc. sponte in Mauritania. *Caps.* 1-locular. 1-sperma. h

* *bracteata*, fol. ovatis glabris in petio-

lum longum subdecurrentibus, bracteis patentibus longissimis. Moench. meth. p. 439. P. rosea, flor. expanso. C. B. Moris. s. 8. t. 15. f. 3. Var. sequentis.

6. *major*, fol. ovatis glabris, scapo teretibus, spica flosculis imbricatis. L. Willd. sp. 1. p. 641. cum varietatibus. Hab. ad vias. \mathcal{T}

7. *asiatica*, fol. ovatis glabris, scapo angulato, spica flosculis distinctis. Gmel. arb. 4. n. 2. t. 37? Hab. in China, Sibiria. Refert P. majorem. \mathcal{T}

8. *media*, fol. ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. Flor. dan. t. 58r. In pascuis sterilibus, apricis, argillosis. Var. fol. hirsutis et spic. ramosis.

9. *virginica*, fol. lanceolato-ovatis pubescentibus subdenticulatis, floribus remotis, scapo tereti. Gisecke. ic. fasc. 1. n. 4. Michaux, flor. 1. p. 94. Moris. s. 8. t. 15. f. 8. Hab. in Virginia. Cor. subrostratum connivens. Mich. Fol. semitrinervia et scapus pubescentia. \odot

10. *australis*, fol. ovato-lanceolatis subpetiolatis glabris, integris spica cylindrica. Lam. ill. p. 319. Hab. in Buenos-Ayres.

11. *tomentosa*, fol. ovatis tomentosis, scapo sulcato, spica cylindrica. Lam. l. c. p. 340. Hab. in Montevideo. Var. fol. ovato-lanceolatis.

** *Fol. plus minusve lanceolatis.*

12. *amplexicaulis*, subcaulescens, fol. lanceolatis amplexicaulibus pilosis, pedunc. axillaribus elongatis. Cav. ic. t. 125. Willd. sp. p. 650. Roth. cat. 2. p. 12. In Hispania in muro arcis Saguntinae. Bract. carinata-alatae. Sem. 2. R. Psyllium?

β ? *lagopoides*, fol. lanceolatis nervosis ciliatis, caul. sulcoso, pedunc. axillaribus, spic. ovatis: bracteis membranaceis. Desf. atl. 1. p. 133. t. 39. In Barbariae arenosis.

13. *villosa*, subcaulescens, fol. lineari-lanceolatis, obsolete trinerviis subdenticulatis villosis-canescens, spic. subrotunda, bracteis alatis carinatis flore brevioribus. Roth. Cat. 2. p. 11. Moench. meth. p. 459. Sem. 2. hinc convexa, inde plana, brunnea. R.

14. *pilosa*, fol. lineari-lanceolatis pilosis trinerviis integerrimis, scapo tereti pilosissimo, spic. ovato-oblonga bract. linearibus rigidiusculis squarros. Roth. l. c. p. 10. t. 1. Hab. in Hispania? Caps. disperma. Cor. quasi ringens. R.

15. *nutans*, subcaulescens, fol. lanceolato-acutis hirsutis, spic. subnutante capitata bract. membranaceis linea nigra notatis. Poir. enc. 4. p. 381. Hab. in Malaga, Hispania. Sem. 3-4, nigra compressa. P.

16. *altissima*, fol. lanceolatis quinque-nerviis dentatis glabris, spica oblongo-cylindrica, scapo angulato scabro. Jacq. obs. 4. t. 83. Hab. in Italia. Folia sesquipedalia. \mathcal{T}

17. *lanceolata*, fol. lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. Habit. in campis sterilibus. Var. scapo polystachio.

β . *syriatica*, altior, spicis longis cylindricis.

γ . *atrata*, fol. lanceolat. subdentatis, scapo tereti hirsuto, spic. subovata nigricante. Hoppe. In Alpibus Salisburgens.

18. *capensis*, fol. ellipticis, spicae floribus distinctis. Thunb. prod. 29. Habit. ad Cap. b. spici.

19. *Lagopus*, fol. lanceolatis subdenticulatis, spica ovata albo-tomentosa, scapo tereti piloso. L. Moris. hist. 3. s. 8. t. 16. f. 13. Hab. in G. Narbonensi, Hispania.

20. *Iusitanica*, fol. lato-lanceolatis trinerviis subdentatis subpilosis, scapo angulato, spica oblonga hirsuta. Lin. Vid. Link in Schraders Bot. Journ. 1800. p. 58. Hab. in Hispania et Lusitania. Spica Pl. Lagopi, sed oblonga. \mathcal{T}

21. *patagonica*, fol. lanceolato-linearibus subcanaliculatis integerrimis lanato-pilosis, scapo tereti hirsuto, spicis cylindricis, staminibus tubum corollae non superantibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 306. Collect. suppl. 35. Habit. in Patagonia. Affinis sequenti. \odot

22. *albicans*, fol. lanceolatis obliquis villosis, spica cylindrica erecta, scapo tereti. L. Cav. ic. 2. t. 124? Desf. atl. 1. p. 136. Hab. in Hispaniae, Narbonae et Barbariae aridis. β ? P. minuta Pall. it. 2. tab. E. fig. 1. a. 6. ab hac vix differre videtur. \mathcal{T}

23. *argentea*, fol. angusto-lanceolatis integerrimis sericeis iucanis, scapo laevi, spic. tereti flor. congestis. Desf. atl. p. 136. spic. ovata villosa. Lam. ill. p. 340. P. monosperma. Pourret Chlor. Narb. p. 29. Hab. in Barbar. et Gall. meridion.

24. *victoralis*, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus, spic. subrotunda basi scapoque subangulato-villosis. Gerardi Gall. prov. Poir. encyc. 4. p. 377. Hab. in Gall.

meridion. praesertim ad montem Victoire prope Aix.

25. *gracilis*, fol. lanceolatis serratis subnudis, spica gracili glaberrima. Poir. enc. 4. p. 115. Lam. ill. p. 341. Hab. in Barbariae collib. aridis, petrosis.

26. *interrupta*, fol. lanceolatis integris villosis, spica filiformi interrupta. Poir. enc. 4. p. 375. P. sparsiflora. Michx. Cresc. in Amer. septentr.

27. *Bellarli*, fol. lineari-lanceolatis scap. tereti hirsuto altioribus, spic. ovata. Vahl. symb. 2. p. 31. Willd. sp. 1. p. 646. scap. fol. longitudine, spic. cylindricis. Allioni pedem. 1. 85. P. *holostea*. Lam. Poir. enc. 1. c. p. 378. et P. *villosa*. Lam. ill. p. 340. β . pilosa. Lam. 1. c. Habit. in Hispania, Italia et in Barbariae sabulosis. Var. α . magnitudine insigni, et β parvitate distinguitur. P.

28. *ciliata*, fol. incanis angusto-lanceolatis, scap. hirsuto fol. adaequante, spic. rotundata, cor. ciliatis. Desf. p. 137. t. 39. f. 3. Hab. in Barbariae arenosis desertis.

29. *remota*, fol. lineari-lanceolatis integris nudis basi lanatis, spic. longis glabris, flor. remotis. Lam. ill. p. 341. Habit. ad Ca. l. b. spci.

30. *Myosuros*, minuta, fol. lineari-lanceolatis trinerviis glabris, scap. tereti subpiloso, spic. cylindrica. Lam. ill. p. 342. Lecta in Montevideo a Commerson. Myos. minimum refert.

31. *limensis*, fol. lanceolato-linearibus, trinerviis, denticulis rarissimis, spic. ovato-cylindrica. Flor. Peruv. 1. p. 51. t. 78. P. hirsuta. Hab. in collibus Limaec.

*** *Fol. ut plurimum linearibus, nec subulatis, neque laciniatis.*

32. *microcephala*, fol. linearib. longissimis striatis villosis, scapo pubescente filiformi, spica minima nuda. Poir. enc. 4. p. 378. Col. in Hort. Paris. Sponte in India? \dagger

33. *velutina*, fol. linearib. acutis villososericeis, spica brevi subglabra, bract. obtusis ciliatis. Poir. 1. c. p. 379. Hab. in Italia, Calabria. Rad. crassa, elongata, flexuosa.

34. *glomerata*, minuta, fol. linearibus angustissimis villosis-ciliatis, scapo filiformi subpubescente, spica pauciflora glaberrima. Poir. 1. c. p. 385. Cresc. in ins. Teneriffa. 2. unc. vix longa.

35. *pigmaea*, villosa, fol. linearib. integerrimis, scapo fol. brevior. spic. capitata lanuginosa. Lam. ill. p. 341. Hab...

36. *scorzoneraefolia*, fol. linearibus nervosis nudis, scapo tereti, spica cylindrica glabra. Lam. ill. p. 342. Tournef. coroll. 5. Hab. in Oriente.

37. *scirpoides*, fol. linearib. longissimis trinerviis nudis, scapo tereti, spica ovata. Lam. ill. p. 342. Poir. enc. 380. Hab. in Hispania?

38. *montana*, fol. linearib. pilosis, scapo tereti hirsuto, spica ovata villosa. Lam. ill. p. 341. In montosis et prope Montpellier. Rad. longa fusiformis.

39. *hispidula*, acaul. fol. linearib. integerrimis, scapis longissimis scabris, spica longa. Flor. Per. 51. t. 78. In Chile arenosis.

40. *hirsuta*, fol. linearib. ciliatis, spica cylindrica, scapo hirsuto. L. Habit. ad Cap. b. spci.

41. *alpina*, fol. linearibus planis, scapo tereti hirsuto, spica oblonga erecta. Jacq. hort. t. 125. Hab. in Helvetiae, Austriae alpinis. \ddagger

42. *cretica*, fol. linearibus, scapo tereti brevissimo lanato, spica subrotunda nutante. P. cretica minima tomentosa, caule adunco. Tournef. cor. 5. Hab. in Creta. \odot

43. *maritima*, fol. linearibus subtus canaliculatis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. β . *dentata*. fol. lanceolatis carnosius planiusculis glabris triconatis hinc inde dentatis: dentibus ramosis teretiusculis, scapo tereti. Roth. germ. 1. 61. II. 173. Hab. in littoribus maritimis locisque salis.

44. *graminea*, fol. linearibus subnudis remotissime dentatis, scapo tereti hirsuto, spic. cylindricis. Lam. ill. p. 343. Doll. pempt. ic. Hab. in Gall. meridon. marium et montosis. \dagger

45. *recurvata*, fol. linearibus canaliculatis recurvatis nudis. Mant. 2. p. 198. Murr. Comm. goett. 1780. p. 19. tab. 6. β ? *serpentina*. Lam. ill. p. 345. Poir. enc. 4. p. 383. Hab. in Europa austriaci, Orient.

*** *Fol. laciniatis dentatis in corn. rangiferin. formam.*

46. *Coronopus*, fol. subhirsutis, semipinnatis, pinnis raris lanceolatis. Hall. helv. n°. 658. Blakw. t. 460. Willd. p. 648. β . *Columnac*, fol. bipinnatis, basi lanatis,

foliolis confluentibus, summis auriculatis, scapo tereti. Gouan. illust. p. 6. Hab. in Europae et Barbariae glareosis. ☉

γ? *Cornuti*, fol. pinnatis: pinnis inaequalibus et distantibus, scapo tereti, stylis longissimis, filamentis brevissimis. Jacq. ic. rar. 1. t. 27. Misc. 2. p. 351.

47. *Loeflingii*, fol. linearibus subdentatis, scapo tereti, spica ovata: bracteis carinatis membranaceis. Loefl. it. 124. Jacq. hort. t. 126. Hab. in Hispaniae collibus agrorumque marginibus. Rad. fibrosae. Fol. caespitosa. P. Coronopa minor et praecocior.

48. *macrorrhiza*, fol. spatulatis serratis subnudis, spica cylindrica. Poir. it. 2. p. 154. Vahl. symb. 2. p. 31. Willd. sp. p. 648. P. crithmoides. Desf. Mor. s. 8. t. 17. f. 36. In Barbaria ad vias et littora maris. ☿

49. *alopecuroides*, fol. linearibus praelongis, superne rariter dentatis calycibusque ciliatis, spica longissima. Poir. in enc. bot. 4. p. 387. Lam. ill. 1. p. 342. Hab. in Barbaria.

50. *Serraria*, fol. lanceolatis 5-nerviis dentato-serratis scapo tereti tomentoso, spica longissima. Lin. P. apula laciniata bulbosa. Col. ephr. t. 256. Hab. in umbrosis subhumidis Barbariae, Apuliae et Germaniae. Rad. crassa subfrutescens. Poir. enc. 1. c.

51. *barbata*, fol. spatulato-lanceolatis dentatis, capit. subquadrifloris. Forst. Comment. Goett. 9. p. 25. t. 4.

***** *Fol. subulatis.*

52. *sericea*, caule decumbente suffruticoso, fol. lineari-subulatis incurvis sericeis, spica ovata. Flor. Peruv. p. 51. t. 79. f. b. Hab. in collibus Tarmae.

53. *congesta*, caule suffruticoso patente, fol. lineari-subulatis, spica ovato-oblonga. Flor. Per. l. c. Cresc. in eodem antecedentis loco.

54. *triquetra*, fol. subulatis triquetris striatis scabris, scapo tereti. P. *subulata*. Lin. P. fol. triangulari-prismaticis. Guett. Stamp. 2. p. 428. Lob. ic. 439. Habet. in maritimis Mediterranei. Rad. crassa. Fol. conferta. ☿

55. *aristata*, fol. subsetaceo-linearibus, spica oblongo-cylindrica, bracteis subulato aristatis flor. longioribus. Michaux, Flora 1. p. 95. Hab. in pratensib. Illinoensium.

56. *philippica*, fol. subulatis villosis, scapo nudo fol. aequante, spic. ovatis. Cav.

ic. 4. p. 35. t. 359. f. 2. Hab. in St. Cruz, in insulis Philippicis. Cor. quadrifida alba, centro violacea. Cav. ☉

†† *Psyllia*, caule ramoso folioso, fol. linearibus. (Flor. capitati. Caps. 2-locularis, 2-sperma. Juss.)

57. *Psyllium*, caul. ramoso herbaceo, fol. subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. Hab. in Europa australi, inter segetes.

58. *stricta*, caul. ramoso erecto herbaceo, fol. linearibus canaliculatis integerrimis, capit. aphyllis. Schousb. maroc. 1. p. 69. ic. 145. Psyllium majus erectum. C. B. p. 191. Moris. s. 8. t. 17. f. 2. Cresc. in agris circa Mogadore. A priore vix specie diversa videtur.

* *arenaria*, caule ramoso, subherbaceo, fol. pubescentibus subviscosis, spicis ovatis compactis subfoliosis. Poir. in enc. bot. 4. p. 392. P. *arenaria*, herbacea pilosocana, caule erecto, fol. subintegerrimis, capit. ovatis, bracteis calycibusque ovatis. Plant. rar. Hung. p. 51. t. 51? Videtur Plant. Psyllium auctor. et ab Linnaeano vix diversa. Hab. in arenosis.

59. *egyptiaca*, caule ramoso herbaceo decumbente, fol. linearibus integerrimis, capit. longe foliosis laxis. Jacq. ic. rar. 1. t. 28. Collect. 1. p. 45. P. *squarrosa* Murr. Willd. sp. 1. p. 850. Hab. in Aegypto.

60. *parviflora*, fol. oppositis linearibus ciliatis, pedunc. folio brevioribus, spic. rotundis, bract. adpressis cal. aequantibus. Desf. atl. 1. p. 141. Hab. in Barbaria. Rad. longa, tortuosa.

61. *arborescens*, fol. filiformibus confertis glaberrimis pedunc. longioribus, capit. paucifloris aphyllis, caul. arborescente. Poir. in enc. bot. 4. p. 389. Hab. in Insul. canariens. Broussonet. Ramosa, lignea, dura cortice cinereo.

62. *genevensis*, fol. angustissimis confertis recurvis pedunc. brevioribus, capit. aphyllis glabris, caule fruticoso. Poir. l. c. p. 390. Hab. in montibus prope Genève. P. Cynops affinis.

63. *Cynops*, caule ramoso suffruticoso, fol. integerrimis filiformibus strictis, capit. subfoliatis. Pall. it. 3. p. 626. Moris. s. 8. t. 17. f. 1. Hab. in Gallo-Provincia, Italia, Sibiria. ♀

64. *indica*, caule ramoso herbaceo, fol. integerrimis reflexis, capitulis foliosis. Hab. in Aegypto et circa Astracan.

63. *afra*, caule ramoso fruticoso, foliis lanceolatis dentatis, capitulis aphyllis. Moris. 4. 8. t. 13. f. 4. Hab. in Sicilia, Barbaria.

66. *pumila*, caule ramoso herbaceo, fol. integerrimis carnosius, ramis laevibus. Lin. suppl. 125. P. (*exigua*). Murr. comm. goett. 1778. p. 94. t. 5. Hab. in Europa australi. ☉

27. **CENTUNCULUS.** *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida: limbo patente. *Stam.* brevissima. *Caps.* 1-locularis, circumscissa, polysperma.

1. *minimus*, fol. alernis ovatis, flor. sessilibus, Curt. Lond. t. 11. Sowerb. engl. bot. t. 531. Vaill. bot. t. 4. f. 2. Habit. in uliginosis, pascuis et ericetis inundatis. ☉

2. *lanceolatus*, fol. deorsum angustatis: inferioribus ovalibus, superioribus lanceolatis; flor. pedicellatis. Michaux. 1. p. 94. Hab. in Carolinae udis. ☉

28. **SPIELMANNIA.** *Cal.* 5-fidus. *Cor.* fauce barbata: limbo 5-lobato subæquali. *Stigma* uncinatum. *Drupa* nucce biloculari.

1. *africana*. Lam. ill. 1. p. 336. t. 85. Lantana. Lin. Willd. sp. 3. p. 311. Spielmannium. Medic. in act. palat. 3. p. 196. t. 15. Stam. aequalia.

29. **SCOPARIA.** *Cal.* 4-partita. *Cor.* 4-partita, rotata, fauce pilosa. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *dulcis*, fol. ternis, floribus pedunculatis. Willd. sp. 1. p. 652. Lam. ill. t. . . . Vahl. symb. 1. p. 12. Habit. in Jamaica, Curassao. ☉

2. *procumbens*, fol. quaternis, floribus sessilibus. Jacq. amer. 18. Hab. in America calidiore. ☉

3. *arborescens*, fol. lanceolatis alternis integerrimis, corymbo supradecomposito triphloemato. Lin. suppl. 125. Hab. ad Cap. b. veri. Arbor habitu Oleae s. Phillyreae. An hujus generis? h

30. **BARTONIA.** *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* campanulata, 4-fida, persistens. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *tenella*. Muhlenberg, Willd. in Act. Soc. natur. cur. Berol. 4. v. 3. Hab. in Philadelphia. Primo obtutu Bufoniae tenuifoliae similis.

291. **SANGUISORBA.** *Cal.* 2-phyllus inferus. *Cor.* supera. *Germe*n inter calycem corollamque.

1. *officinalis*, spicis ovatis, *stam.* cor. subaequalibus. Flor. dan. t. 97. *Sp. auriculata*, altior, fol. auriculatis. Hab. in pratis siccioribus.

2. *mauritanica*, villosa, fol. profunde serratis, spic. ovatis (virescentibus), calyce rugoso. Desf. Atl. 1. p. 142. Moris. s. 8. t. 18. f. 4. Priori affinis; foliola profundius serrata. Habit. in Algeriae sepibus. ☉

3. *media*, spicis cylindricis, *stam.* cor. longioribus. Moris. s. 8. t. 18. f. 2. Hab. in Canada. ☉

4. *canadensis*, spicis longissimis, *stam.* cor. triplo longioribus. Lam. ill. p. 344. spicis albidis digynis. Michaux. Flora p. 100. Cornut. canad. 175. t. 174. Habit. in Canada, Sibiria. ☉

292. **KRAMERIA.** *Cal.* 6. *Cor.* 4-5-petala. *Nectarium* 4-phyllum, biforme. *Anthera* perforata. *Drupa* echinata.

1. *triandra*, fol. obl. obovatisque acuminatis, tomentosis, flor. triandris. Flor. Per. 1. p. 61. t. 93. Hab. in Peruviae montium declivibus, in arenosis. h

2. *Irina*, fol. lanceolatis, racemo terminali, cor. 4-petalis. Lin. Willd. s. pl. 1. p. 693. Hab. in Cumanae Americae. h

3. *cytisoides*, fol. alternis ternatis tomentosis, racem. terminalibus, cor. 5-petalis Cav. ic. 4. p. 60. t. 390. Hab. in N. Hispania. Ad latus germinis foliola 2 ovata, et ex filam. basi exsurgunt corpuscula 3, filiformia, nectarium vulgo nominata. Cav.

4. *linearis*, fol. lineari-attenuatis, pedunc. solitariis, cor. 5-petalis. Flor. Per. 1. p. 62. t. 94. f. a. Hab. in Peruv. collibus argillosis. h

293. **ACÆNA.** *Cal.* 4-5-phyllus, superus. *Cor.* 6. *Filam.* 2-4-5. *Nect.* 6. *Stigm.* penicillatum. *Drupa* angulata obovata, glochidibus echinata. (Fol. imparipinnata.)

1. *lappacea*, caul. erecto, foliolis oblongis obovatisque serratis, racem. paucifloris. Flor. Per. 1. p. 66. t. 93. f. a. Cresc. in locis calidis et praeruptis Tarmae. Repens villosa. Autumn. h

2. *trifida*, caulib. erectis, foliol. cuneiformib. trifidis, spicis globosis. Flor. Per. 1. p. 67. t. 97. f. c. In regni chilensis pascuis, campis et collib. Vere ob fructus vestibus adhaerentes *Amor secco* ab incolis nuncupatur.

3. *argentea*, caule repente, foliolis ovato-oblongis, spic. globosis. Flor. Per. 67. t. 93. Fewill. 3. p. 55. t. 41. Cum priore abunde in uliginosis arvisque. Vernacule Broquin. Pl. medicinalis. \mathcal{T}

4. *ovalis*, caule repente, foliol. ovalibus profunde serratis linearis, spic. globosis. Fl. Per. 1. c. In locis umbrosis et humilibus Pillao. \mathcal{T}

5. *cylindristachya*, scapis prostratis, foliol. oblongis argute serratis, spic. cylindricis. Flor. Per. 1. p. 68. t. 104. Habit. in collib. frigidis Tarmae, \mathcal{T}

6. *pinnatifida*, scap. erectis, foliolis obovatis pinnatifidis, spic. longis interruptis. Flor. Per. 1. c. fig. b. In Chile collibus Incana. \mathcal{T}

294. *CISSUS*. *Cal.* quadridentatus inferus. *Petala* 4, libera reflexopatula decidua. *Nect.* Discus germ. cingens. *Bacca* 2-locularis, 1-2-4-sperma. (Stam. passim 5.)

* *Foliis simplicibus, plerisque.*

1. *compressicaulis*, fol. cordatis acute serratis, flor. umbellatis, pedunc. dichotomis. Flor. Peruv. 1. p. 64. t. 100. Hab. in Chanca y ruderalis.

2. *Ampelopsis*, fol. cordatis dentatis, racemis duplicato-bifidis, flor. 5-andris. *Ampelopsis* cordata. Michaux. Flor. 1. p. 159. Hab. in Amer. bor. in dumetis et ad ripas annis Savannah. Fol. superne passim angulata.

3. *vittiginea*, fol. cordato-subrotundis lobatis subindivisisque villosis dentatis. Vahl. symb. 3. p. 18. Pluck. mant. t. 337. f. 4. Hab. in India. \mathcal{h}

4. *repanda*, fol. cordatis integris sublobatisve repandis utrinque glabris. Vahl. symb. 3. p. 18. Hab. in India orientali. Rami teretes, flexuosi.

5. *latifolia*, fol. cordato-ovatis villosis acuminatis setaceo-serratis, ramis tetragonis. Vahl. symb. 3. p. 18. Willd. sp. 1. p. 656. Hab. in India orientali et Madagascariae sylv. \mathcal{h}

6. *cordifolia*, fol. cordatis integerrimis. Hab. in America. Fol. magna. \mathcal{T}

7. *potundifolia*, fol. cordato-subrotundis serratis. Vahl. symb. 3. p. 19. Saelanthus. Forsk. descr. p. 35. tab. 4. Habit. in sylv. Arabiae felicis.

8. *Sicyoides*, foliis subcordatis nudis, setaceo-serratis, ramulis teretibus. Swartz. obs. 48. Lam. ill. t. 84. f. In Jamaica. \mathcal{T}

9. *quadrangularis*, fol. cordatis dentatis carnosiss serrato-dentatis, caule tetragono-imbricatusculo. L. Mant. 37. Saelanthus quadragonus. Forsk. descr. p. 33. tab. 2. Rumph. amb. 5. p. 81. t. 44. f. 2. Habit. in Arabia, India. Caulis longissimus. \mathcal{T}

** *Foliis angulatis.*

10. *tomentosa*, fol. subpentagonis obtuse dentatis, subtus tomentoso-ferrugineis. Lam. ill. 1. p. 380. Hab. in Ins. Bourboniae. Fol. basi truncata.

11. *angulata*, fol. subpentagonis angulato-lobatis crenulatis subtus tomentosis. Lam. p. 331. Hab. in India orientali.

12. *capensis*, fol. 5-angularibus dentatis subtus ferrugineo-tomentosis, flor. subcapitatis. Thunb. prod. p. 44. Hab. ad Cap. b. spei.

*** *Foliis ternatis,*

13. *acida*, fol. ternatis obovatis glabris carnosiss incisiss. Sloan. iam. 106. hist. 1. p. 233. t. 142. f. 6. Pluck. alm. 71. t. 152. f. 2. Hab. in America calidior. \mathcal{h}

14. *cinerea*, fol. ternatis, foliol. pubescentibus dentatis: lateralibus subcordatis, petiol. teretibus. Lam. ill. p. 332. In India orientali.

15. *cirrrosa*, fol. ternatis villosis, foliol. ovatis serratis. Vitis cirrhosa. Thunb. prod. 44. Hab. in Cap. b. spei.

16. *alata*, fol. ternatis subrotundis hirsutis subdentatis, ramis membranaceo-angulatis. Jacq. amer. 23. t. 182. f. 10. G. trifoliata. L. Hab. in Jamaica. Scandit superatque altissimas arbores. \mathcal{T}

17. *microcarpa*, fol. ternatis oblongis serratis glabris membranaceis. Vahl. eclog. 1. p. 16. Plum. Cat. p. 18. Ic. t. 259. f. 4. Hab. in India occidentali. \mathcal{h}

18. *crenata*, fol. ternatis, foliol. anbroundis crenatis. Vahl. symb. 3. p. 19. Vitis trifolia. L. Rumph. amb. 5. p. 450. t. 166. f. 2. Hab. in India orientali. \mathcal{h}

19. *carnosa*, fol. ternatis ovatis obtusis serratis glabris, ramis petiolisque teretibus. Vahl. symb. 3. p. 19. Lam. encyclop. 1. p. 31. Rheed. mal. 7. p. 17. t. 9. Hab. in India orientali.

20. *obovata*, fol. ternatis, foliol. obovatis integerrimis glabris, Vahl. symb. 3. p. 19. Hab. in ins. St. Crucis.

**** *Foliis quinatis.*

21. *hederacea*, caul. radicante scandente, fol. quinato-digitatis, racem. subsessilib., flor. 5-andris. Hedera quinquefolia. L. Ampelopsis. Michaux. Hab. in America. In hortis et parietes tegendos optime adhibetur. Foliola superne dentata.

22. *pentaphylla*, (tenuis) fol. quinatis, foliol. indivisis serratis, caule herbaceo filiformi. Vitis pentaphylla. Thunb. jap. 105. Hab. in Japonia. Flor. racemosi. ¶

23. *striata*, fol. quinato-digitatis: foliol. serratis, caul. striato-flexuoso, cymis coarctatis. Flor. Per. 1. p. 64. t. 100.

24. *granulosa*, fol. quinatis: foliolis obovatis, caul. angulato granuloso. Flor. Per. l. c. t. 101. In Peruv. praeruptis.

***** *Foliis pedatis.*

25. *pedata*, fol. pedatis, foliol. lanceolatis serratis, subtus tomentosis. Vahl. symb. 3. p. 20. Lam. encycloped. 1. p. 31. Rheed. mal. 7. p. 17. t. 10. In India. An huius generis, cum fructus quadrilocularis sit? Habit. in India orientali. ¶

26. *japonica*, fol. pinnatis subpedatis glabris, foliol. crenatis: crenis aristatis. Willd. sp. 1. p. 659. Vitis japonica Thunb. In Japonia. ¶

***** *Foliis pinnatis: foliolis oppositis.*

27. *obliqua*, fol. simpliciter pinnatis, foliol. 2-3 oblique cordatis. Flor. Per. I. p. 65. t. 101. In Tarmae praeruptis. Flor. corymbosi.

28? *Mappia*, fol. subbipinnatis: foliol. ovatis integerrimis. Lam. ill. p. 332. Hab. in ins. Frangiae.

29. *orientalis*, fol. bipinnatis, foliol. ovatis serratis, caul. frutescente scandente? Lam. l. c. t. 84. f. 2. In Oriente. Pinna lateralis ex foliis 3 constat.

30. *stans*, fol. bipinnatis, foliol. incisoserratis, flor. pentandris, caul. arborescente. Vitis arborea. Lin. Ampelopsis. bipinnata. Michaux. Hab. in Carolina et Virginia.

Obs. Petalis liberis, nec calyptratum cohaerentibus, stam. ut plurimum 4, facilius rutorum ad nodos solubilitate hoc genus praecipue a Vite differt. Auct. Flor. Boreali-americanae especibus 2, 21 et 28 ob

numerum staminum quinarium distinctum constituit genus.

295. *EFIMEDIUM*. *Nectaria* 4, cyathiformia, petalis incumbentia. Cor. 4-petala. Cal. caducis.

1. *alpinum*. Engl. bot. t. 439. Batsch. Anal. flor. I. n.º 10. Hab. in Alpium umbrosis. ¶

296. *CORNUS*. *Involucrum* 4-phyllum saepius. *Petala* supera 4. *Drupa* nucis 2-loculari.

* *Involucrata umbellata.*

1. *suecica*, herbacea, foliis omnibus oppositis sessilibus nervosis. Willd. phytog. 1. p. 3. n.º 12. et sp. 1. p. 660. herbacea ramis binis. L. Flor. lapp. 65. t. 5. f. 3. Hab. in Europa et Asia boreali in quo Kamtschata.

2. *canadensis*, herbacea, fol. summis verticillatis subpetiolatis venosis. Willd. l. c. l'Herit. Corn. n.º 2. t. 1. In Canada, Labrador etc. Fructus globosus.

3. *florida*, arborea, involucro maximo: foliol. obcordatis. L. l'Herit. Corn. n.º 3. Casteb. carol. 27. t. 27. Hab. in Virginiae sylvis. Fructus ovatus.

4. *mascula*, arborea, umbellis involucrum aequantibus. In sacibus Europae. Vere floret, priusquam folia erumpunt.

** *Nudae cymosae.*

5. *sanguinea*, ramis rectis, fol. ovatis concoloribus, cymis depressis. l'Herit. Corn. n.º 5. Hab. in Europae, Asiae, Americae borealis dumetis, ad saepes. Fruct. niger. ¶

6. *alba*, ramis recurvatis, foliis lato-ovatis subtus canis, cymis depressis. l'Herit. n.º 7. Hab. in Sibiria, Canada. Fructus albus. ¶

7. *sericea*, (caerulea), ramis patulis fol. ovatis subtus ferrugineo-sericeis, cymis depressis. l'Herit. t. 2. Willd. arb. 75. C. Amomum. Vogel ic. rar. t. 101. C. caerulea. Lam. Hab. in Carolina meridionali, Pennsylvania. Fructus caerulei. ¶

8. *circinata*, ramis verrucosis, foliis orbiculatis subtus tomentosis canis, cymis depressis. l'Herit. n.º 8. t. 3. C. tomentosa. Michaux. 9. Hab. in Pennsylvania. ¶

9. *stolonifera*, caul. inclinato, ramis debilibus, fol. ovalibus utrinque subpubescentibus subtus albicantibus, cymis parvis. Michaux. Flor. I. p. 52. Cresc. ad

ripas Canadae et N. Angliae. Frutex stoloniferus, purpureus.

10. *fastigiata*, subglabra, ramis strictis fastigiatis, fol. ovalib. longe acuminatis, cymis longius pedunc. Michaux. Habit. in dumosis et ad ripas Virginiae, Carolinae. Sequenti affinis. Ramuli fusi subquadrang.

11. *stricta*, ramis strictis, foliis ovatis concoloribus nudiusculis, cymis paniculat. l'Herit. t. 4. Habit. in America septentr.

12. *paniculata*, ramis erectis, foliis ovatis subtus canis, cymis paniculat. l'Her. n.º 10. t. 5. C. *rucemosa*, cymis paniculato-racemosis. Lam. ill. p. 303. Habit. in America septentrionali. h

13. *alternifolia*, fol. alternis. Lin. supp. 125. l'Herit. Corn. n.º 11. t. 6. Var. ramulis rubris et viridibus, apice corymbosis. In America septentrionali. Petala revoluta. h

297. **FUSANUS**. *Cal.* superus, 4-fidus. *Cor.* 6. *Stylus* subnubilus. *Stigm.* 4. *Drupa* 1-sperma.

1. *compressus*. Linn. syst. veg. ed. 13. Lam. ill. t. 77. Thesium Colpoen. Lin. supp. p. 16r. Berg. cap. t. 1. f. 1. Habit. ad Cap. bon. spei. Arb. ramis compressis. Racemi axillares.

298. **GLOSSOMA**. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Anth.* membrana coherentes. *Stigma* 4-fidum. *Drupa* nuce sulcata, 1-sperma.

1. *arborescens*. Willd. sp. 2. p. 664. Votomita gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 91. t. 35. Habit. in sylvis Gujanæ. h

299. **SAMARA**. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* basi petali inserta. *Stigm.* infundibuliforme. *Drupa.* 1-sperma.

1. *laeta*, floribus confertis pedicellatis, fol. ovatis obtusis. Swartz. prod. 151. Lam. ill. t. 74. Memecylon umbellatum. Lin. Fl. zeyl. 460. Burm. Zeyl. 76. t. 31. In India orientali. Flor. infra folia.

2. *coriacea*, floribus sessilibus conglomeratis, fol. lanceolato-ovatis acutis subcoriaceis. Sw. flor. 1. p. 261. In Jamaicae sylvis montosis. h

3. *pentandra*, floribus pentandris, fol. ellipticis. Ait. Kew. 1. p. 160. Habit. ad Cap. b. spei. h

4. *floribunda*, floribus pentandris, fol.

obovatis. Willd. sp. 1. p. 665. *Rananea gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 121. t. 46. Habit. ad pratorum margines Cajennæ et Gujanæ. h

300. **FAGARA**. *Cal.* 4-5-fidus. *Cor.* 4-5-petala. *Capr.* 2-valvis, monosperma, simplex aut multiplex. (*Stam.* 4. 5 et 8.)

1. *triphylla*, fol. ternatis, foliol. ovatis acumin. integerrimis, paniculis supraaxillaribus. Willd. sp. 1. p. 666. Lam. encycl. 2. p. 443. Rumph. amb. 2. p. 138. t. 62. Habit. in insulis Philippinis. h

2. *Evodia*, fol. ternatis, foliol. lanceolatis integerrimis. Willd. *Evodia hortensis*. Forst. char. gen. p. 13. t. 7. Habit. in insulis Americarum et novis Hybridibus. Vix a precedente diversa. h

3. *Pterota*, fol. pinnatis, foliol. obov. emarginatis, petiolo communi marginato articulo inermi. Willd. Lam. ill. t. 84. Brow. Jam. 146. t. 5. f. 1. Habit. in Jamaica. Odor hircosus. h

4. *Piperita*, fol. pinnatis, foliol. oblongis basi inaequalibus crenatis. Thunb. Jap. 64. Kaempf. amoen. t. 893. Habit. in Japonia. h

5. *tragodes*, fol. pinnatis, foliol. cuneiformibus emarginatis, petiolo communi alato-articulato aculeato. W. Jacq. amer. 21. t. 14. Habit. in America. *Pterotæ* nimis adfinis. h

6. *Zanthoxylodes*, petiolis costisque foliorum aculeatis, floribus quinque-fidis dioicis. Lam. encyclop. 2. p. 462. Habit. in Senegal et Guinea. h

7. *horrida*, fol. pinnatis, pinnis ovatis crenatis, spinis ramorum spinosis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 322. Habit. in Japonia. h

8. *capensis*, fol. pinnatis : pinnis ovatis obtusis crenatis, ramis aculeatis flexuosis. Thunb. prod. 28. Habit. ad Cap. b. spei. h

9. *armata*, fol. pinnatis : pinnis crenatis, ramis petiolisque aculeatis. Thunb. prod. 28. Habit. ad Cap. b. spei. h

10. *Avicennæ*, fol. pinnatis : foliolis lanceolatis integerrimis glabris. Willd. 2. p. 668. Lam. encyclop. 1. p. 441. Lobel. ic. 2. t. 133. Habit. in China. h

11. *octandra*, fol. pinnatis utrinque tomentosis : foliol. ovatis dentatis, petiolo communi articulo-alato, flor. octandris. Willd. sp. 1. p. 668. Habit. in Curacao duris. An cum sequente distincti generis? h

12. *elaphrium*,

12. *Elaphrium*, foliis pinnatis glabris : foliol. oblongo-lanceolatis obtuse dentatis, petiolo communi articulato-alato, floribus octandris. Willd. Jacq. amer. 106. t. 71. f. 3. Hab. in Carthagenae fruticetis marit. h

301. HARTOGIA. *Cal.* 4-fidus. *Petal.* 4, patentia. *Drupa* ovata. *Nuce* 2-sperma.

1. *capensis*. Lin. suppl. 128. Thunb. Diss. N. G. 5. p. 87. c. ic. Willd. sp. 1. p. 669. Schrebera schinoides. Thunb. prod. p. 28. t. 2. Hab. in Cap. b. spec. sylvis. Myrsinaceae species? h

302. AZIMA. *Cal.* 4-fidus, urceolatus. *Cor.* 4-petala. *Bacca* 2-locularis : loculis 2-spermis : 1 saepius abortivo.

1. *tetracantha*, fol. oppositis petiolatis orato-lanceolatis glabris apice pungentibus ; spinis stipularibus quaternis. Lam. enc. 1. p. 319. Seb. th. 1. t. 13. f. 1. Monetia barlerioides. L'Her. Willd. In India et ad Cap. b. sp. h

303. BLACKBURNIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus inferus. *Stigm.* simplex. *Bacca*? monosperma.

1. *pinnata*. Forst. char. gen. p. 12. t. 6. Ptelea pinnata. Lin. sup. 126. Hab. in insul. deserta Norfolk. h

304. PTELEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Stigmata* 2. *Caps.* rotundata membranaceo-alata, 2-locular. 2-sperma.

1. *trifoliata*, fol. ternatis. Trev. rar. 12. t. 9. Hab. in Virginia. Flor. passim apetalis et abortiunt. h

305. GYROCARPOS. Flor. polygami. *Cal.* 4-partitus inaequalis. *Cor.* o. Nect. 4. *Stigm.* sessile. *Caps.* 1-locularis, 1-sperma. 5-alata.

1. *Jacquinii*. Roxbourg. Corom. t. 1. G. Americanus Jacq. amer. pict. t. 263. f. 90. H. in Carthagenae sylva. et Coromandeliae montosis. Arbor elegans, procera. Pueri ludendi gratia fructus in altum projicere solent, qui ob alas lente et in gyros descendunt. Inde nomen.

306. SKIMMIA. *Petal.* 4 concava. *Cal.* 4-partitus. *Bacca* 4-sperma.

1. *japonica*. Thunb. jap. 62. Hab. in

Japonia. Fol. sempervirentia. Panicula terminalis. h

307. OTHERA. *Petal.* 4 lanceolata. *Cal.* 4-partitus. *Capsula*?

1. *japonica*, flor. aggregatis pedunculatis, stigm. sessili. Lam. ill. p. 310. Thunb. jap. 61. Ej. ic. fasc. 2. Hab. in Japonia. Ilex? h

2. *Oriza*, flor. racemosis, stylo manifestis. Lam. l. c. Oriza japonica. Th. l. c. Willd. Sp. p. 672. In Japonia.

Obs. Ambae plantae ulterius examinandae an diversi aut ejusdem generis sint, fructus enim ignotus est.

308. LUDWIGIA. *Cor.* 4-petala, aut o. *Cal.* 4-partitus, superus : lacin. longis persistentibus. *Caps.* 4-gona, 4-locularis, infera, poly-sperma.

* *Fol. oppositis*,

1. *oppositifolia*, (zeylanica), fol. oppositis lanceolatis, caule diffuso. L. Syst. Veg. p. 135. caule diffuso, fol. lanceolatis, capsulis pedunculatis fol. dimidio brevioribus. Fl. zeyl. 66. Hab. in India. h

2. *erigata*, fol. oppositis lanceolatis, caule erecto, flor. terminalibus. Ludwigia triflora. Lam. encycl. 3. p. 538. Habit. in India. Germine tetragono-alata. Capsula subcubica. Lin. ☉

3. *nitida*, caul. assurgente, fol. oppositis ovalibus, flor. axillaribus minimis, caps. subovata. Michaux. Flor. 1. p. 87. Hab. in Carolinae inferioris humidis. Bractee nul-lae. Majo.

4. *pedunculata*, repens sub-pubescent, fol. oppositis lineari-lanceolatis glabris, pedunc. axillaribus longissimis, caps. clavato-oblongis. Michaux. p. 88. In paludosis submaritimis Carolin. infer. Flos ratione plantae parvulae maximus. M.

* * *Foliis alternis*.

5. *Jussiaeoides*, erecta glabra, foliis lanceolatis decurrentibus, flor. axillaribus subsessilibus, caps. clavatis oblongis. Michaux. p. 89. Cum priore in aquosis umbrosis.

6. *angustifolia*, erecta ramosissima glabra, fol. linearibus, flor. axillaribus, caps. turbinato-prismatica oblongiuscula. Michaux. p. 88. Juxta fossas Car. infer.

7. *virgata*, erecta glabra, ramis virgatis, fol. sessilibus linearibus, flor. subjici-

h

catie; caps. globoso-4-gonis. Michaux p. 89. In aridis sylvis Carol. infer. Majo.

8. *capitata*, radice repente erecta, fol. sublinearibus, flor. capitatis; petal. calice brevioribus, caps. sub4-gono - semiglobosa. Michaux p. 99. L. suffruticosa. Walter. In aquis apricis Carol.

9. *macrocarpa*, major subpubescens, fol. longo-lanceolatis acutis, subius albicantib., flor. subpedicellatis caps. globoso-4-gona cal. laciniis maximis coronata. Michaux p. 89 L. alternifolia. Linn. In Virginiae pratensibus. Fol. in plurimis alterna.

10. *microcarpa*, subprocumbens glaberrima, fol. obovalibus punctis callosis marginatis, flor. axillaribus apetalis minutis. Michaux. Flor. p. 88. Cresc. in humidis. Folia parvula, obtusa cum mucrone.

11. *mollis*, subtomentoso-pubescent, fol. lanceolatis oblongis, flor. apetalis subterminalibus, caps. subrotundis. Michaux p. 90. In Car. infer. paludosis. Julio.

300. ISNARDIA. *Cal.* campanulatus, 4-fidus. *Cor.* o. *Caps.* 4-gona, 4-locularis, cal. cincta.

1. *palustris*, fol. ovatis integris. Willd. sp. 2. p. 686: excl. synonym. nonnullis Lam. ill. t. 77. Roth. germ. 2. p. 199. In Europae meridionalis et Americae? paludosis. Pediculi similis. ¶

Obs. Non est Ludwigiae species, cum duo haec genera etiam quoad ordines naturales inter se distincta sint.

2. *hastata*, foliis semialexicaulibus hastato-lanceolatis. Flor. Peruv. 1. p. 66. t. 86. f. 2. Hab. in Peruviae paludosis. Suffruticosa.

310. OLDENLANDIA. *Cor.* tetrapetala. *Cal.* 4-partitus, superus. *Caps.* 2-locularis, infera, polysperma; Receptacula libera. G. (*Styl.* 1-2.)

1. *verticillata*, florib. verticillatis sessilibus, stipulis setigeris. Lin. Willd. sp. 1. p. 674. Rumph. amb. 6. p. 25. t. 10. Hab. in Amboinae, Jamaicae collibus apricis.

2. *trinervia*, caule decumbente, fol. ovatis trinerviis, flor. verticillatis axillaribus, caps. hispidis. Retz. obs 5. p. 23. Habit. in Indiae umbrosis praecipue sub Pandano.

3. *glomerata*, decumbens hirsuta, fol. ovalibus, flor. conglobatis. Michaux. Flor. 1. p. 83. In Car. infer. humidis.

4. *depressa*, caule diffuso, fol. ellipticis petiolatis glabris, pedunc. geminatis axillaribus. Willd. l. c. p. 675. Rheed. mal. 10. p. 61. t. 31. In India orient. ¶

5. *capensis*, pedunc. axillaribus unifloris, fol. linearibus acutis. Lin. suppl. 127. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *uniflora*, caule repente, pedunculis simplicissimis lateralibus, fructib. hispidis, fol. subovatis acutis Lin. Flor. Per. 1. p. 54. Hab. in Virginiae, Jamaicae et regni Chilensis aquis.

7. *biflora*, pedunc. bifloris petiolo longioribus, fol. lanceolatis. Burm. zeyl. 22. t. 11. Hab. in India. ☉

8. *pentandra*, flor. pentandris monogynis, fol. linearibus, pedunc. bifloris. Retz. obs. 4. p. 22. Heuchera dichotoma Murr. comment. goett. 1772. p. 64. t. 12. Habit. in Tranquebaria. ☉

9. *umbellata*, umbel. nudis lateralibus alternis, fol. linearibus. Roxb. coromand. 1. p. 2. t. 3. Hab. in India. ¶

10. *corymbosa*, pedunc. multiflor. fol. lineari-lanceolatis. Gaertn. de fr. 1. p. 147. Ebrt. pict. 1. 2. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. ☉

11. *hirsuta*, umbel. axillaribus, caule calycibusque hispidis, fol. ovatis acutis. Lin. suppl. 127. Hab. in Java.

12. *debilis*, umbel. axillaribus, pedunc. paucifloris, fol. ovatis sessilibus. Forst. pr. n. 56. Hab. in insula Tongatabu maris pacifici.

13. *fatida*, umbel. terminali trichotoma, fol. spathulatis. Forst. prodr. n. 55. Hab. in insula Tongatabu.

Obs. Plures, uti videtur, *Oldenlandiae* species cl. Cavanilles in vol. sexto Ic. plant. hisp. sub genere *Hedyotis* descripsit, cum in mentem Lamarckii et Schreberi, et forte nec immerito, duo haec genera haud diversa putet.

311. AMMANNIA. *Cor.* 4-petala, aut o, calyci inserta. *Cal.* 1-phyllus, plicatus, 8-dentatus, inferus. *Caps.* 4-locularis. (Passim 2-locul. et Stamp. 8.)

1. *latifolia*, fol. semialexicaulibus, caul. tetragono, ramis erectis. Lin. Willd. sp. 2. p. 678. Sloan. hist. 1. p. 44. t. 7. f. 4. Hab. in Caribaeis, locis humidis. ☉

2. *ramosior*, fol. semialexicaulibus, caul. tetragono erecto, ramis patentissimis

flor. inferioribus verticillatis. Lin. Michaux 1. p. 99. Hab. in Virginia. Pet. purpurea. ☉

3. *humilis*, procumbens, fol. lanceolatis deorsum angustatis, flor. omnibus solitariis, caps. 1-locularibus. Michaux Fl. p. 99. A. ramosior. Walter. Hab. in Carol. septentrion. paludosis.

4. *debilis*, fol. lanceolatis basi attenuatis, caul. ramoso, flor. fasciculatis axillaribus, caps. bilocularibus. Ait. Kew. 1. p. 163. Hab. in India orientali. ☉

5. *sanguinolenta*, fol. sessilib. linearilanceolatis basi cordatis, pedunc. brevissim. multifloris, florib. octandris petaloideis. Willd. p. 679. Swartz. prod. 33. In fossis et aquosis Jamaicae, Hispaniolae.

6. *coccinea*, fol. sessilib. linearilanceolatis basi cordatis, pedunc. subunifloris, flor. octandris petaloideis. Willd. (A. octandra). Am. coccinea. Rottb. progr. 1773. n. 4. Hab. in India orientali. Caulis erectus giganteus brachiatus. Pet. sanguinea. Simil. praecedenti.

7. *verticillata*, fol. subsessilib. lanceolatis, flor. congesto-verticillatis sessilib. cal. 4-dentato. Lam. ill. p. 311. t. 77. f. 3. Cornelia verticillata. Ard. spec. 2. t. 1. Hab. in Italia.

8. *indica*, fol. linearibus sessilib. decurrentib., umbel. axillarib. brevissimis, cal. 4-dentato. Lam. J. c. Am. baccifera. Burm. ind. t. 15. f. 3. ? In India.

9. *senegalensis*, fol. sessilib. subaristulatis, flor. pedicellatis aggregatis, cal. 4-dentato. Lam. ill. p. 312. t. 77. f. 2. In Senegal.

312. TRAPA. Cor. 4-petala. Cal. 4-partitus, Nux spinis 4, oppositis cincta, quæ calycis folia fuerit.

1. *natans*, nucib. quadricornibus, spinis petentibus. Linn. suppl. 128. Willd. sp. 2. p. 681. fol. natantibus, petiolis ventricos. Hal. belv. n. 527. In Europae australis Atque stagnis limosis. ☉

2. *bicornis*, nucibus bicornibus. Lin. suppl. 128. Gaert. sem. 2. p. 84. t. 95. Hab. in China.

313. POTHOS. Spatha. Spadix simplex floribus tectus. Cal. o. Petala quatuor. Bacca disperma.

1. *scandens*, petiol. latitudine foliorum, caul. radicante. Lin. Willd. sp. 1. p. 684.

Rumph. amb. 5. p. 460. t. 184. f. 1. 2. 3. Rheed. mal. 7. t. 40. Hab. in India. ☉

2. *acaulis*, fol. lanceolatis integerrimis. enerviis. Jacq. amer. 240. t. 153. Habit. in Americae calidioris arboribus. ☉

3. *lanceolata*, fol. lanceolatis integerrimis trinerviis, scapo apice triquetro. Sp. pl. 1373. Plum. 47. t. 62. fil. t. 206. Hab. in Amer. calidiore. ☉

4. *crenata*, fol. lanceolatis crenatis. Plum. sp. 4. ic. 39. Hab. in insula St. Thomae. ☉

5. *violacea*, caulescens, fol. ovato-lanceolatis integris nervosis punctatis. Swartz. Dracontium scandens. Aubl. Guj. 2. p. 836. In Jamaica et India occident. ☉

6. *crassinervia*, fol. oblongis acuminate integerrimis venosis, costa media fol. tricarinata. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 610. Collec. 4. p. 122. Hab. in sylvis montosis Americae calidioris ad Caracas. ☉

7. *cordata*, fol. cordatis, lobis imbricatis, spadice spatham subaequant. Willd. Plum. spec. 4. ic. 38. fil. t. 205. Cum priore. ☉

8. *macrophylla*, fol. cordatis, spadice longissimo, radice nodosa. Swartz. prod. 33. Jacq. ic. rar. t. 610. Collect. 4. p. 121. Plum. amer. 48. t. 63. Habit. in India occidentali. ☉

9. *pinnata*, foliis pinnatifidis. L. Rumph. amb. 5. p. 489. s. 183. t. 2. In India. ☉

10. *palmata*, fol. palmatis. L. Plum. amer. 49. t. 64. 65. In America calidiore. ☉

11. *digitata*, fol. digitatis. Jacq. ic. rar. 3. t. 611. Collect. 4. p. 119. Hab. in sylvis montosis Americae calid. ad Caracas. ☉

12? *pentaphylla*, fol. digitatis quinatis ovatis acuminatis. W. Aubl. guj. 2. p. 837. t. 326. In sylvis Cajennae, Gujanae. ☉

314. COMETES. Involucrum 4-phyllum, 3-florum. Cal. 4-phyllus. Caps 3-coccae.

1. *alterniflora*, Burm. ind. t. 15. f. 5. Hab. in Suratte. ☉

315. CURTISIA. Cal. 4-part. Petala 4. Drupa supera, subrotunda, succulenta: Nuce 4-5-loculari.

1. *sageina*. Willd. sp. 1. p. 687. Ait. Kew. 1. p. 162. Sideroxylum. Burm. afr. 235. t. 82. Hab. ad Cap. b. 51. e. ☉

316. **CHLORANTHUS**. *Cal. o. Petalum* 3-lobum, lateri germinis insidens. *Anth.* petalo accretæ. *Bacca* 1-sperma.
1. *inconspicuus*, Swartz. L'Hérit. sert. angl. 1. 35. t. 2. Nigrina spicata. Thunb. Hab. in China, Japonia. h
317. **ELÆAGNUS**. *Cal. coloratus*, 4-fidus, campanulatus, superus. *Cor. o. Drupa* monosperma.
1. *angustifolia*, fol. lanceolatis. Lin. Willd. sp. 1. p. 688. Pall. ross. 1. p. 10. t. 4. L. (inermis) fol. lanceolatis. Mill. dict. n.º 2. Hab. in Bohemia, Hispania, Syria, Cappadocia, inque Aquis Sextiis locis subhumidis. h
 2. *orientalis*, fol. oblongis ovatis opacis. Mant. 41. Pall. Ross. 1. p. 11. t. 5. Hab. in Oriente. Folia neutra pagina nitentia aut argentea. L. h
 3. *spinosa*, fol. ellipticis, subtus argenteis, ramulis basi spinosis. Lam. ill. p. 299. Hab. in Aegypto. h
 4. *pungens*, ramulis spinescentibus, fol. oblongis undulatis; flor. axillaribus binis. Thunb. jap. 68. p. 789. Habit. in Japonia. h
 5. *latifolia*, fol. ovatis maculatis Lam. ill. t. 73. f. 2. Hab. in Zeylona. Fol. lineis atro-rubentibus. h
 6. *crispa*, inermis, fol. lanceolato-oblongis obtusis undulatis fl. solitar. Thunb. jap. 66. Hab. in Japonia cum sequentibus speciebus. h
 7. *multiflora*, inermis, fol. obovatis obtusis, flor. axillaribus aggregatis, pedunc. flore longioribus. Thunb. jap. 66.
 8. *umbellata*, inermis, fol. obovatis obtusis, flor. axillaribus aggregatis, pedunc. flore brevioribus. Thunb. jap. 66. t. 14. In monte Fakona Japoniae. h
 9. *glabra*, inermis, fol. ovato-oblongis acuminais, flor. axillaribus subsolitariis. Thunb. jap. 67.
 10. *macrophylla*, inermis, fol. rotundato-ovatis argenteis. Thunb. l. c. Habit. in Japonia. h
318. **GONATOCARPUS**. *Cal. o. Cor.* 4 fida. *Drupa* infera, octogona, 1-sperma.
1. *micranthus*. Willd. Sp. 2. p. 690. Thunb. jap. 69. t. 15. Hab. in Japonia. Fl. spicati cernui minuti. Th. h
319. **SANTALUM**. *Cor.* 4-petala petalis calyci innatis, præter *Glandulas* 4. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca* infera, monosperma.
1. *album*. Sirium myrtifolium L. Mant. p. 800. Roxb. corom. 1. p. 2. t. 2. Hab. in India. h
320. **DRAPETES**. *Cal. o. Cor.* infundibuliformis: limbo 4-fido. *Receptacula* pedicellata, barbata: *Sem.* 1, tectum. (Flor. aggregato-fasciculati.)
1. *muscoïdes*, Lam. in Journ. d'Hist. natur. n.º 5. p. 186. t. 10. Habitu *Passe-rinae*. Generi *Dais* affinis. L.
321. **CANSIERA**. *Cal.* globoso-nuceolatus, 4-dentatus, inferus. *Nect.* 4, dentata germen cingentia. *Bacca* 1-sperma. Juss.
1. *scandens*, Roxbourg. 2. p. 1. t. 103. Habit. in Coromandelia.
322. **STRUTHIOLA**. *Perianthium* 2-phyllum. *Cor.* tubulosa, ore glandulis 4-8. *Bacca* exsucca, 1-sperma.
1. *virgata*, fol. lanceolatis striatis, summis ciliatis, ramis pubescentibus. Thunb. prod. 76. Retz. obs. 5. p. 26. Burm. afr. p. 127. t. 47. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h
- Obs.* Omnes generis species crescunt ad Cap. b. spei, tempore vespertino et nocturno, odore grato fragrant et sæpius bis per annum florent.
2. *erecta*, fol. linearibus glabris, ramis glabris tetragonis. Thunb. prod. 76. Wendl. obs. bot. p. 9. t. 2. f. 10. Flor. albid.
 3. *nana*, fol. linearibus obtusis, pilosis, flor. terminalibus fasciculatis toment. Lin. suppl. 128. Bractee coerulescentes. h
 4. *juniperina*, fol. linearibus acutis patentibus, corollis calycibusque nudis. Retz. obs. 3. p. 26.
 5. *angustifolia*, fol. oppositis erectis linearibus dorso trisulcatis, ramis compositis villosis. Lam. ill. p. 214. h
 6. *ciliata*, fol. sparsis lanceolatis mucronatis ciliatis concavis quadrifariam imbricatis apice incurvis. Andrew, t. 146. Fl. albid, vespere fragrantissimi. Augusto. S. ciliata. Lam. ?

♂. *rubra*, flore rubro, fol. minus incurvis. Andrew. t. 139.

7. *imbricata*, fol. ovatis sulcatis quadrifariis confertis margine ciliatis, glandulis corollinis quatuor. Andrew. t. 113. Aestate.

♀? *striata*, pubescens, fol. oppositis ovatis subimbricatis sulcato-striatis, cor. tomentosis. Lam. ill. p. 214. h

8. *ovata*, fol. ovatis glabris, ramis glabris rugosis. Thunb. prod. Andrew. t. 119. Flor. majusculi.

323. RIVINA. *Cor.* 4-pectala, persistens. *Cal.* nullus. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* lentiforme, scarbrum. (*Stam.* 4, 8 et 12.)

1. *humilis*, racemis simplicibus, flor. tetrandris, fol. pubescentibus. (Piercea tomentosa). Mill. Styl. supra germen decurrit. In Caribaeis, Jamaica, Barbados. h

2. *laevis*, racemis simplicibus, florib. tetrandris, fol. ovatis acuminatis glabris planis, caul. teretj. Willd. Sp. 1. p. 694. Lam. ill. t. 81. f. 2. *humilis*. Mill. Hab. in America. Fol. margine purpurascens.

* *latifolia*, florib. tetrandris, baccis aëcis, fol. lato-ovatis laevibus. Lam. ill. p. 324. In ins. Madagascar.

3. *brasiliensis*, racemis simplicibus, flor. tetrandris, fol. ovatis undulato-rugosis, caul. sulcato. Willd. l. c. fol. cordatis. Noca in Ulster bot. Annal. 6. Stück. p. 63. Hab. in America. h

4. *secunda*, glabra, foliis ovatis acuminatis obsolete denticulatis, cal. bilabiato. Flor. Per. 1. p. 65. t. 102. Hab. in sylvis Pozuzo. h

5. *octandra*, racemis simplicibus, flor. octandris dodecandrisve. Amoen. acad. 4. p. 305. R. dodecandra. Jacq. In America calidior. *Stam.* 4. intra calycis folia; reliqua 8 alternantia. L. h

324. SALVADORA. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* arillo vestitum.

1. *persica*. Lin. Roxb. coromand. 1. p. 26. Willd. Sp. 2. p. 695. Habit. ad Sinum persicum, in India orient. h

325. EMPLEURUM. Flor. polygami. *Cal.* 4-fidus, inferus. *Cor.* o. *Styl.* lateralis. *Caps.*

magna, oblonga, latere dehiscent. *Sem.* 1, arillatum.

1. *serrulatum*, Ait. Kew. 3. p. 340. Lam. ill. 1. p. 345. t. 86. Diosma unicapsularis. Linn. suppl. p. 155. Ad Cap. b. spei. h

326. CAMPHOROSMA. *Cal.* urceolatus: dentibus 2 oppositis, alternisque minimis. *Cor.* nulla. *Stam.* exerta. *Caps.* 1 sperma.

1. *paleacea*, fruticosa, ramis spicaeformibus paleaceis pilosis. Lin. suppl. 128. Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *monspeliaca*, fol. hirsutis linearib. Lam. ill. t. 86. Buxb. cent. 1. p. 18. t. 28. f. 1. Hab. in Hispaniae Narbonae, Tartariae arenosis. h

3. *acuta*, fol. subulatis rigidis glabris. Hab. in Italia, Tartaria. h

4. *glabra*, fol. subtriquetris glabris inermibus. Hab. in Helvetia? Facies Polyneumi. h

327. PTERANTHUS. *Cal.* 4-partitus persistens, lacin. concavis: 2-majoribus cristatis. *Cor.* o. *Filam.* basi connata. *Caps.* membranacea, 1-sperma, cal. tecta.

1. *echinatus*. Desf. atl. 1. p. 144-145. Camphrosma Pteranthus. Lin. Louichea cervina. L'Herit. stirp. t. 65. Hab. in Barbariae et Arabiae arvis argillosis. Pedicelli plani, obovati. ☉

328. ALCHEMILLA. *Cal.* 8-fidus. *Cor.* o. *Sem.* 1, cal. vestitum.

1. *capensis*, fol. reniformib. sublobatis repando-crenatis, racemis axillarib. Willd. Sp. 1. p. 698. Lam. ill. t. 106. Hab. ad Cap. b. spei. Facies sequentis, sed minor.

2. *vulgaris*, fol. reniformibus novem-lobis acute dentatis utrinque subnudis, corymbis terminalibus. Willd. Flor. dan. t. 693. In sylvis vulgaris.

3. *hybrida*, (*pubescens*), fol. lobatis sericeis acute serratis, caule petiolisque longis dense pilosis. A. *pubescens*. Lam. pluk. phyt. 240. f. 2. In Europ. pascuis. h

4. *alpina*, fol. digitatis serratis subtus argenteo sericeis. L. Fl. lapp. 61. Fl. dan. t. 49. A. argentea. Lam. In alpinis Euro. ac. h

5. *pentaphylla*, fol. quinais ternatisque

multifidis glabris. Hab. in monte Cenisio, Furca, Gouthardo Rhætorum. ☞

6. *Aphanoides*, fol. multipartitis, caul. erecto. Lin. suppl. 129. Hab. in N. Granada. An sequentis generis? ☉

DIGYNIA.

329. *APHANES*. Cal. 8-fidus: laciniis alternis minimis. Cor. o. Sem. 2, calyce vestita: uno interdum abortivo. (Stam. 1, 2 et 4.)

1. *arvensis*, foliis trifidis pubescentibus, flor. axillaribus glomeratis. L. Flor. dan. t. 973. *Alchemilla Aphanes*. Willd. Sp. 2. p. 699. Hab. in arvis et agris.

Obs. Stam. a nonnullis aut 4, quorum 3 vero abortiunt, ab aliis observata. - Sequentes species ob stylos 2 et semina 2, ad hoc genus retuli, forte genere diversas, cum diandrae sint et stylos diversos habeant: Auctores ipsi hac de re dejudicent iconibusque illustrent.

2. *tripartita*, villosa, fol. 3-partitis, laciniis cuneiformibus multifidis, flor. dichotomo-corymbosis. Flor. Peruv. t. 68. sub *Alchemilla*. Hab. in montibus et scaturiginibus Pillao et Tarmæ.

3. *orbiculata*, villosa, fol. orbiculato-reniformibus lobatis serratis, flor. spicato-corymbosis. Fl. Per. l. c. Hab. in Peruviae montibus frigidis et humidis. Caul. ramosissimus, sarmentosus.

4. *pinnata*, foliis pinnatis: pinnulis 2-3-fidis. Flor. Per. p. 69. sub *Alchemilla*. Crescit cum prioribus.

330. *CRUZITA*. Cal. 4-phyllus: exterior 3-phyllus. Cor. o. Sem. 1, cal. vestitum.

1. *americana*, Lam. ill. p. 548. C. hispanica. L. Hab. in Cumana Americae nec in Hispania. Caulis altus. Flor. spicati.

331. *BUFFONIA*. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala, brevior. Caps. 1-locularis, 2-valvis, 2-sperma.

1. *annua*, caul. paniculato, flor. lateralibus terminalibusque, cal. striato. Lam. ill. p. 349. B. tenuifolia. Lin. Pluck. alm. t. 75. f. 4. Habit. in Gallia australi, et in Angliae maritimis rarius. ☉

2. *perennis*, caule apice ramoso florifero, cal. margine scarioso. Lam. l. c. t. 87. f. 2. Hab. in Gallia australi. ☞

332. *HAMAMELIS*. *Involucrum* triphyllum. Cal. proprius 4-phyllus. Petala 4, linearia. Nux bicornis, 2-locularis.

1. *virginica*. Lin. Duham. arb. 1. p. 287. t. 114. Wild. Sp. p. 701. In Virginia. Floret autumno, insequente vere semina perficit.

333. *PAGAMEA*. Cal. 4-dentatus persistens. Cor. 4-fida, urceolaris, intus villosa. Drupa supera, 2-locularis, nuculis 2, bilocularibus.

1. *gujanensis*, Aubl. gujan. t. 44. Lam. ill. p. 352. t. 88. Hab. in Gujana. Stipul. 2. vaginantes deciduae. Fol. lanceolata. ☞

334. *HYPECOU*. Cal. 2-phyllus. Petala 4: exterioribus duobus latioribus. Siliqua.

1. *procumbens*, siliquis arcuatis compressis articulatis, petalis binis majoribus obtuse trilobis. Willd. Sp. 1. p. 704. Hab. inter Archipelagi, Galliae segetes. ☉

2. *littoralis*, siliquis articulatis compressis arcuatis, petalis integris: exterioribus longioribus lineari-spathulatis. Jacq. ic. rar. t. 309. Collect. 2. p. 205. Habit. in sabulosis aridis Austriae littoralis. ☉

3. *pendulum*, siliquis cernuis teretibus cylindricis, petalis majoribus obtuse trilobis. Willd. p. 705. Sauv. monsp. 263. Pall. it. 3. p. 553. Hab. in Galloprovincia, Sibiria. ☉

4. *erectum*, siliquis erectis teretibus torulosis. Amm. ruth. 58. t. 9. i. 9. Habit. in Davuria. Flores reliquis majores. W.

335. *NERTERIA*. Cal. o. Cor. infundibuliformis, quadrifida, supera, Bacca bilocularis, 2-sperma.

1. *depressa*. Smith. ic. ined. fasc. 2. p. 28. t. 28. Gaert. sem. 1. p. 124. t. 26. f. 1. Flor. Per. 1. p. 60. t. 90. Gomoria granadensis. Lin. suppl. 129. Lam. ill. t. 87. Hab. in Novae Granadae locis humidis et regno Chilensi.

336. *GALOPINA*. Cal. o. Cor. supera 4-fida. Sem. 2, muricata.

1. *circaeoides*. Thunb. Nov. Gen. 1. p. 3. Anthospermum. Thunb. prod. 32. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

TRIGYNI A.

337. BOSCIA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 4-locularis,

1. *undulata*. Thunb. prod. p. 32. Hab. ad Cap. b. spec. h

TETRAGYNIA A.

338. MYGINDA. *Cal.* minimus, 4-partitus. *Petala* 4. *Stigm.* 2-4. *Drypa* globosa 1-sperma.

1. *Uragoga*, fol. subcordatis acuminatis subserratis pubescentibus. Swartz. Willd. sp. 2. p. 722. Jacq. amer. t. 16. Habit. in America meridion. Corymb. axillaris. h

2. *Rhacoma*, fol. lanceolato-ovatis crenatis, flor. 1-gynis, stylo 4-5do. Swartz. Flor. 1. p. 340. Jacq. ic. rar. 2. t. 311. Rhacoma Crossoptalum. Lin. In Jamaicae maritimis. h

3. *latifolia*, fol. ellipticis crenatis subcoriaceis, stigm. 2-7. Swartz. l. c. p. 342. Hab. in Caribaeis. h

4. *rotundata*, fol. ovato-subrotundis crenatis petiolatis, pedunc. axillariis. simplicibus paucifloris. Lam. ill. n.º 1546. Hab. in insulis antillicis. Fol. subtus pubescentia. h

5. *integrifolia*, fol. ovatis integerrimis, fructib. subsolitariis. Enc. bot. 4. p. 396. Cresc. in ins. Martinica. Cortex griseo-albidus, glandulis parvis obsitus.

6. *ilicifolia*, fol. ovato-subrotundis dentato-spinosis subtus incanis, pedunc. axillariis furcatis. Enc. bot. l. c. Hab. ad St. Domingo. Cort. in adultis flavus. Lign. durum album. h

339. ILEX. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* rotata. *Stylus.* o. *Bacca* 4-sperma.

1. *Aquifolium*, fol. acutis spinosis nitidis undulatis, flor. axillariis. subumbellatis. Ait. Kew. 1. p. 168. W. sp. p. 307. Flor. dan. 508. β . heterophylla, foliis dentatis spinosis integrisque γ . I. ferox, fol. supra echinatis. Habit. in Europa australiori, Japonia, Virginia. Polygama dioica. Planta hermaphrodita 5-petala, pentandra? Ger. h

2. *japonica*, fol. oppositis ovatis acuminatis spinosis sessilibus, racemis terminalibus. Willd. sp. 1. p. 707. Thunb. jap. 79. Hab. in Japonia. h

3. *opaca*, fol. ovatis acutis spinosis

glabris planis, flor. ad basin ramulorum annotinorum sparsis. Ait. Kew. 1. p. 169. Hab. in Carolina. h

4. *crocea*, fol. oblongis serratis: serraturis ciliato-spinosis. Thunb. prod. 32. II. in sylvis Cap. b. spec. h

5. *serrata*, fol. acutis ciliato-serratis, flor. axillaribus solitariis. Thunb. jap. 78. Habit. in Japonia. h

6. *latifolia*, fol. ovatis serratis, florib. axillaribus aggregatis. Thunb. jap. 79. In Japonia. Caulis arborescens.

7. *Perado*, fol. ovatis cum acumine, inermibus subintegris. Ait. Kew. 1. p. 169. Hab. in Madera. h

8. *Prinoides*, fol. elliptico-lanceolatis acutis deciduis serratis, serraturis muticis. Ait. Kew. 1. p. 169. Habit. in Carolina, Virginia. h

9. *myrtifolia*, fol. ovatis utrinque acutis integerrimis, flor. fasciculatis lateralibus dioicis. Lam. ill. p. 356. Hab. in insulis Caribaeis. Fol. et infloresc. Sideroxyli. h

10. *rosmarinifolia*, fol. linearib. acutis sparsim dentatis: margine reflexo, cymis brevibus lateralibus. Lam. l. c. 1. Cassine γ . enc. bot. Hab. in Carolina.

11. *aestivalis*, fol. ovato-ellipticis planis superne crenato-mucronatis, pedunc. simplicibus. Lam. l. c. Prinos lucidus. Ait? Cresc. in Madera.

12. *cuneifolia*, fol. cuneiformibus tricuspidatis. Lin. Plum. ic. 118. f. 2. Hab. in America meridionali. h

13. *Cassine*, fol. alternis distantibus semipervirentibus lanceolatis serratis: serraturis acuminatis. Ait. Kew. 1. p. 170. Hab. in Carolina. h

14. *vomitaria*, fol. alternis distantibus oblongiusculis obtusiusculis crenato-serratis: serraturis muticis. Ait. 170. Cassine *Peragua*. Lin. Mill. dict. t. 83. f. 2. Cassine vera Floridanorum Catesb. carol. 2. t. 57. In Florida austr. h

15. *crenata*, fol. ovatis crenatis, pedunc. rameis sparsis subtrifloris. Thunb. jap. 78. Hab. in Japonia. h

16. *emarginata*, fol. obovatis emarginatis, flor. axillaribus binis. Thunb. Hab. in Japonia. h

17. *salicifolia*, fol. lanceolatis utrinque attenuatis dentatis, pedunc. petiolo longioribus axillaribus cymosis. Willd. sp. p. 710. Jacq. collect. 4. p. 36. t. 2. f. 2. Hab. in ins. Mauritiis. h

18. *asiatica*, fol. lato-lanceolatis obtusis integerrimis. Lin. In India. h

19. *integra*, fol. oblongis obtusis integerrimis, flor. sessilibus umbellatis pedunc. unifloris. Thunb. jap. 77. Hab. in Japonia. h

20. *rotunda*, fol. rotundatis acutis integerrimis, pedunc. umbelliferis. Thunb. jap. 77. Hab. in Japonia. Rami nodulosi. h

21 ? *obcordata*, stigmate simplice, fol. obcordatis coriaceis, caul. fruticoso. Swartz. Flor. 1. p. 338. Hab. in montibus coeruleis Jamaicae. h

22 ? *Macoucoua*, (*acuminata* Willd.) fol. ovatis acuminatis emarginatis integerrimis, pedunc. cynosoidis axillaribus. Willd. sp. 711. *Macoucoua gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 88. t. 34. Lam. ill. t. 75. In Gujana, Cajenna. h

23 ? *Paltoria*, fol. ovalibus crenatis, pedunc. subtrifloris, stig. magno tetragono integro. *Paltoria ovalis*. Flor. Per. 1. p. 44. t. 84. Habit. in Peruviae montibus altissimis. Biorgyalis. h

340. **RIQUERIA**. *Cal.* triplex. *Petala* 4, concava. *Filam.* compressa. *Caps.* 4-locularis, stylis coronata.

1. *avenia*. Fol. oblonga avenia. Racemi terminales. Flor. Per. 1. p. 70. In Peruviae nemoribus. h

341. **POTAMOGETON**. *Cal.* o. *Petala* 4. *Stylus* o. *Semina* 4.

1. *natans*, fol. natantibus petiolatis ellipticis acutis basi rotundatis subcordatis. Willd. sp. p. 712. Flor. dan. t. 1025. Habit. in Europae lacubus et stagnis. ¶

2. *fluitans*, fol. natantibus longe petiolatis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis Willd. Bot. germ. II. 202. In Europae fluviis. Simile praecedenti. ¶

3. *heterophyllum*, fol. superioribus petiolatis ellipticis utrinque attenuatis, inferioribus confertis sessilibus linearib. Willd. Schreb. spicil. p. 21. Habit. in stagnis et rivulis.

4. *perfoliatum*, fol. cordatis amplexantibus. Habit. in Europae lacubus et fluviis. Totum praeter spicas submersum. ¶

5. *densum*, fol. ovatis acumin. oppositis confertis, caule dichotomo, spica quadriflora. Enal. bot. t. 397. Hab. in Europae meridionalis fossis.

6. *lucens*, fol. lanceolatis planis oppositis in petiolos desinentibus trinerviis. Hab. in lacubus, stagnis. ¶

7. *crispum*, fol. lanceolatis alternis oppositis undulatis serratis. Curt. Lond. ic. Flor. dan. t. 927. Hab. in fossis et rivulis lentis.

8. *serratum*, fol. lanceol. oppositis subundulatis. P. fol. tennibus ellipticis, nervis convergentibus. Hall. P. caul. longe ramosis. Guett. Hab. in rivulis. Differt a priore: raecipue fol. confertioribus integerrimis. Willd. p. 715.

9. *compressum*, fol. linearibus obtusis, caule compresso, spicis brevibus 4-6-floris. Flor. dan. t. 203. Hab. in fossis paludosis. ☉

10. *striatum*, fol. linearibus striatis, caul. compresso, flor. spicatis. Flor. Per. 1. p. 70. t. 96. Hab. in Peruviae aquis. Fluitans.

11. *Zosteracifolium*, fol. linearib. longissimis obtusis cum mucrone, alternis oppositisque sessilibus, caule compresso, spic. uncialibus multifloris. Schumacher. Flor. Zaeolland. septent. 1. p. 50. Habit. in Zaeollandiae rivulis et piscinis.

12. *gramineum*, fol. lineari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus, caule tereti subdichotomo. Smith, brit. 1. p. 196. Raj. syn. ed. 3. t. 4. f. 3. In fossis et fluviis. Stipula involuto-tubulosa.

13. *pusillum*, fol. linearibus alternis oppositisque stipul. angustioribus basi patentibus, caule tereti, pedunc. axillarib. paucifloris. Smith, l. c. p. 197. Vaill. bot. t. 32. f. 4. Hab. in aquis argillaceis. Stipulae amplexicaul. fol. latiores.

14. *pectinatum*, fol. setaceis parallelis approximatis disuchis, basi vaginantibus. Smith. l. c. Flor. Dan. t. 186. β. maritimum. Lin. Var. *pectinati* secundum fcl. Smith. Caul. subflexuosus. Schum. p. 51. Vaill. bot. t. 32. f. 3.

15. *filiforme*, fol. linearib. marginibus involutis, caul. tereti pedunculique filiformibus elongatis, spic. 3 - glomeratis. Schumacher. l. c. p. 51. P. *setaceum*. Frequens in Zaeollandiae lacubus. A P. *setaceo* diversum dicit auctor. †

16. *setaceum*, fol. lanceolatis oppositis acuminatis. Lin. Hab. in fossis paludosis. †

242. **RUPPIA**. *Cor.* o. *Cal.* o. *Sem.* 4, pedicellata.

1. *maritima*, flor. dan. t. 364. Engl. bot. t. 136. Michx. gen. t. 35. Hab. in Europae et Americae maritimis et fossis stagnantibus. ¶ ?

Obs. Pedunc. subspirales longissimi vel breves, Valisneriae modo, a planta contrahuntur aut laxantur. vid. Smith, brit. 1. 199. Planta videtur monoica.

343. *SAGINA*. *Cal.* 4-phyllus. *Petal.* 4. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis, poly-perma.

1. *cerastoides*, caule diffuso dichotomo, fol. spathulatis obovatisque recurvis, pedunc. fructiferis reflex. Smith. Act. Soc. Linn. Lond. 2. p. 343. Willd. sp. 1. p. 718. Habit. in arenosis maritimis et fissuris rupium, in Bodotriæ insulis. ☉

2. *procumbens*, caulib. glabris procumbentibus. Curt. Lond. 3. t. 12. Hab. in pascuis sterilibus, aridis. Var. floribus apetalis. ☉

3. *apetala*, caule erectiusculo pubescente, flor. subapetalis. Curt. t. 14. Habit. in agris et arenosis. ☉

344. *MOENCHIA*. *Cal.* 4-phyllus, connatis: lacin. lanceolatis acutis. *Cor.* subbrevis: petal. integris. *Caps.* evalvis, 1-locularis, apice 5-fariam dehiscens. *Sem.* reniformia scabra.

1. *glauca*, caul. erecto 1-2-floro. *Sagina* erecta. Lin. Curt. Lond. Fasc. 2. t. 12. Engl. bot. 1. 609. *M. quaternella*. Ehrh. *Alsinella erecta*. Moench. meth. p. 222. In pascuis, ericetis, sylvaticis. Veré. ☉

345. *RADIOLA*. *Cal.* multifidus. *Petal.* 4. *Caps.* supra, 8-valvis, 8-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *Millegrana*, caule ramosissimo dichotomo. Smith. brit. 1. p. 202. *Radiola* linnaea. Roth. germ. 2. p. 199. *Linum Radiola*. Linn. Flor. dan. t. 178. *Millegrana*. Raj. syn. *Chamaelinum*. Vaill. Bot. t. 4. f. 6. Cresc. in inundatis arenosis, sabulosis. ☉

346. *TILLÆA*. *Cal.* 3 - s. 4 - partitus. *Petal.* 3 s. 4, æqualia. *Caps.* 3 s. 4, bi- poly-spermae.

1. *aquatica*, caule erecto, fol. linearibus, flor. sessilibus. Willd. Sp. 1. p. 720. Hab. in Suecia et Germaniæ inundatis. ☉

2. *prostrata*, caul. prostrato, fol. lanceolatis, flor. axillaribus pedunculatis W. 1. c. Schkuhr. in Ust. Nov. Annal. bot. 6. p. 4. Hab. in Germaniæ humidis. Stam. 8: 4 sterilia. ☉

3. *Vaillantii*, caule erecto dichotomo, pedunc. elongatis cal. turbinato semiquadrifido. Willd. sp. p. 720. Buillarda. L'Her. Decand. Pl. grass. ic. Vaill. Paris. t. 10. f. 2. In Galliæ humidis. ☉

Obs. Ob calyc. et squamas nectarinas 4, integras lineares forte distincti generis, quononnullae aliae species forsitan pertinent.

4. *capensis*, fol. oblongiusculis, flor. quadrifidis. Lin. suppl. 129. *Crassula nans Thunb.* prod. p. 54. Hab. ad Cap. b. spei. Rad. capillares copiosae. Nectaria purpurea triangularia. ☉

5. *perfoliata*, fol. perfoliatis ovatis, corymbis terminalibus, floribus quadrifidis. Lin. suppl. 120. *Crassula inanis* Th. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

6. *connata*, caule erecto, fol. connatis linearibus, carnosis, flor. axillaribus. Flor., Per. 1. p. 70. t. 96. f. a. Hab. in collibus Chancay, supra saxa. ☉

7. *umbellata*, fol. subpetiolatis ovalis obtusis integris, caule capillari erecto, flor. umbellatis. Willd. p. 721. *Crassula* Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

8. *decumbens*, decumbens, fol. subulatis, petalis calyce brevioribus. Willd. H. ad Cap. b. spei. ☉

9. *muscosa*, procumbens, flor. trifidis. Lin. Decand. Plant. Grass. ic. Lam. ill. t. 90. f. 2. Mich. gen. 22. t. 20. In Europae merid. humilis. turfosus muscosus. Numerus partium in planta culta interdum quinarius. *Caps.* articulatae, 2-spermae.

347. *COLDENIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. *Styli* 4. *Caps.* 4, approximate, 1-spermae.

1. *procumbens*. Linn. Lam. ill. t. 89. Pluck. alm. 363. t. 64. f. 6. Habit. in India. Fol. petiolata, obovata, sublunata. L. ☉

M O N O G Y N I A.

Valeriana supina, *sibirica*, villosa. *Boerhaavia* 4-andra. *Justicia pulcherrima*. *Lycium* 4-andrum. *Cordia* 4-andra. *Solanum flexuosum*. *Citharexyl* quaedam

species. *Cuscutae* quaedam. *Convallaria bifolia*. *Coffeae* nonnullae species. *Nondeletia pilosa*, *virgata*. *Hillia* 4-andra. *Guetterda elliptica*, *membranacea*. *Portlandia* 4-andra. *Evonymi* plures. *Portulaca meridiana*. *Cinchonae* nonnullae. *Lageria coriacea*. *Melastoma* 4-andra. *Lythrum thymifolium*. *Prinos* glaber et nitidus. *Peplis indica*. *Stroemia* 4-andra. *Thesium alpinum*. *Corchorus Coreia*. *Eraca* quaedam.

D I G Y N I A.

Gentianae quadrifidae. *Swertiae* nonnullae. *Mygynda latifolia*. *Ulmus suberosa*. *Herniaria fruticosa*, *glabra*?

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

ASPERIFOLIAE s. BORRAGINEAE. Juss.
Gen. 348-378. Caule sunt ut plurimum
herbaceo, etiam frutescente, rarius ar-
boresc.; foliis alternis, saepe asperis;
semina habent plerumque 4, pericarpio
inclusa; aut nuda (nuculae), calice
persistente cincta. *Cor.* regularis infun-
dibuliformis, fauce nunc squamulis
fornicata, nunc nuda.

† *Semina 4, nuda.*

348. **HELIOTROPIUM.** *Cor.* hypo-
crateriformis, 5-fida, interjectis
dentibus aut plicis: fauce nuda.
(Spicae recurvato-involutae.)

1. *peruvianum*, fol. lanceolato-ovatis,
caule fruticoso, spicis numerosis aggregato-
corymbosis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 740. In
Peru. Vanillam redolet. h

2. *amplexicaule*, fol. lanceolatis obtu-
sis semiamplexicaulibus, spicis ramosis,
caule fruticoso. Vahl. symbol. 3. p. 21. In
Brasilia. h

3. *indicum*, fol. cordato-ovatis (ovalib.)
acutis scabriusculis, spicis solitariis, fruc-
tibus bifidis. Lin. Pluck. phyt. 245. f. 4. In
India utraque. ©

4. *parviflorum*, fol. ovatis rugosis sca-
bris oppositis alternisque, spicis subcon-
jugatis. Mant. 201. Dill. elth. 178. t. 146.
f. 175. Hab. in India. ©

5. *inundatum*, fol. oblongis obtusis hir-
sutis, spicis quaternis erectis, caule frutes-
cente. Swartz. profl. 40. Ej. Flor. 1. p. 343.
Hab. in insulis Caribaeis, in Jamaicae locis
submaritimis.

6. *villosum*, fol. subrotundo-ovatis in-

tegerimis planis villosis-tomentosis, spicis
solitariis. Willd. l. c. p. 741. Tournef. cor.
7. Hab. in insula Melo. ©

7. *europaeum*, fol. ovatis integerrimis.
tomentosis rugosis, spicis conjugatis. Linn.
Jacq. aust. 3. t. 207. In Europa australi.
Inodora. ©

8. *coromandelianum*, fol. obovatis vil-
losis integris, spicis simplicibus conjuga-
tisque, seminibus punctatis. Retz. obs. 2.
p. 9. Hab. in India.

9. *malabaricum*, fol. ovatis plicatis strig-
osis integerrimis, spicis subsolitariis. Retz.
obs. 4. p. 24. Burm. ind. 40. t. 16. f. 1.
Hab. in India.

10. *marifolium*, fol. lanceolatis hisp-
idis, caulibus procumbentibus fruticulosus,
spicis simplicibus alternis. Retz. obs. 2. p.
8. Hab. in India. h

11. *supinum*, fol. ovatis integerrimis
tomentosis plicatis, spicis solitariis. Gouan.
monsp. 17. c. fig. Tournef. Cor. 7. it. vol. 1.
p. 342. t. 23. Hab. Salmanticae juxta agros,
Monspelii in litore et in Barbaria. ©

12. *undulatum*, fol. lanceolatis hispidis
margine revolutis undulatis, spicis conju-
gatis, corollis villosis, caule procumbente.
Vahl. symbol. 1. p. 13. Lithospermum his-
pidum. Forsk. arab. p. 38. n.º 24. Hab. in
Aegypto. h

13. *lineatum*, foliis ellipticis petiolatis
villosis margine revolutis planis, spicis con-
jugatis, caule procumbente. Vahl. symb.
1. p. 13. Forsk. arab. p. 39. n.º 25. Habit.
in Aegypto. h

14. *strigosum*, fol. lineari-lanceolatis
strigoso-papillosis, spicis conjugatis, caule
erecto fruticoso. Willd. l. p. 743. Habit. in
Guinea. Facies H. zeylanici. h

15. *fruticosum*, fol. lineari-lanceolatis pilosis margine revolutis, spicis solitariis sessilibus, caule fruticoso. Lam. ill. p. 394. Sloan, hist. 1. t. 13a. f. 4. Habit. in insulis Caribaeis.

16. *curassavicum*, fol. lanceolato-linearibus glabris aveniis, spicis conjugatis. Pluck. alm. 18a. t. 36. f. 3. Moris. s. 11. t. 31. f. 12. Hab. in Americae calidioris maritimis. ☉

17. *zeylanicum*, fol. lineari-lanceolatis utrinque attenuatis subtus villosis, spicis solitariis conjugatisque filiformibus longissimis nudis. Willd. p. 744. Lam. encyclop. 5. p. 50. et ill. p. 393. Burm. ind. t. 16. fig. 2. Hab. in Zeylona. h

18. *persicum*, fol. lineari-lanceolatis villosis recurvatis, caule fruticoso, spicis terminalibus foliosis. Lam. l. c. Burm. t. 19. f. 1. Hab. in Persia. h

19. *corymbosum*, fol. oblongo-lanceolatis, caule fruticoso, spicis terminalibus aggregato-corymbosis, lacin. calycis longis subulatis. Flor. Per. 2. p. 2. t. 107. Hab. in Peruvia. h

20. *oppositifolium*, fol. ovatis acutis latis integerrimis, caule fruticoso, spic. dichotomo-corymbosis. Flor. Per. l. c. t. 108. In Munna aridis. Corol. extus hispidiuscula.

21. *incanum*, fol. ovatis acutis crenatis latis rugosis, caul. fruticoso, spic. dichotomo-corymbosis. Flor. Per. l. c. fig. a. Hab. in Huanuci collib. aridis. Cal. fructus ventricosus.

22. *myrcalix*, fol. oblongo-lanceolatis, caule suffruticoso, spicis oppositifol. dichotomis, cal. minimis 5-dentatis. Flor. Per. p. 3. t. 109. In Peruviae collibus.

23. *pilosum*, fol. lanceolatis integerrimis, caule fruticoso procumbente, spicis brevibus subquaternis, fructu hispidulo. Fl. Per. 1. p. 3. t. 110. f. a. Hab. in Limae collibus aridiisculis.

24. *lanceolatum*, fol. lanceolatis, caule fruticoso, spicis terminalibus dichotomo-corymbosis. Flor. Per. 2. p. 4. t. 101. H. in Pillao et Huanuci nemoribus. Cor. dilute caerulea.

25. *microstachyum*, fol. oblongis alternis, caul. herbaceo, spicis aggregatis brevibus, fruct. bipartibili. Flor. Per. l. c. fig. b. Hab. in aridis Tarmae. Sem. 2, bilocularia, nonnulla 1-locularia. l. c.

26. *synzostachium*, fol. ovatis oppositis intermediis alternis, spicis longissimis ge-

minis, fructu 2-partibili. Habit. in Limae segetibus et campis aridis. Cor. tubus clavatus longissimus: laciniis acutis.

Obs. An cum priore Messerschmidiae aut distincti generis species? cum semina pericarpio manifeste inclusa sint.

27. *scabrum*, fol. lanceolatis strigosis, caule ramoso diffuso, flor. congestis. Retz. obs. 2. p. 8. Hab. in India. Facies fere Sherardiae. Retz. ☉

28. *orientale*, procumbens, fol. linearibus glabris aveniis, flor. sparsis lateralibus. Lin. Habit. in Asia. ☉

29. *gnaphalioides*, fol. linearibus obtusis tomentosis, pedunculis dichotomis, floribus quaternis, caule frutescente. L. Jacq. amer. 25. t. 173. f. 11. Ed. 2. t. 264. f. 77. Moris. hist. 3. s. 11. t. 28. f. 6. In Barbados, Jamaicae maritimis. h

30. *ternatum*, fol. ternis alternisque lanceolatis subtus incanis, spicis terminalibus conjugatis. Vahl. symbol. 3. p. 21. Hab. in India occident. Facies H. fruticosi, et forte non nisi varietas. Vahl. h

31. *pinnatum*, fol. pinnatis. Vahl. l. c. Hab. ad fretum Magellanicum.

349. MYOSOTIS. Cor. hypocrateriformis, 5-fida, subemarginata: fauce clausa fornicibus. Sem. laevia aut echinata.

* *Seminib. laevibus.*

1. *scorpioides*, semin. laevibus, caule subsimplici, fol. lanceolatis obtusis, cal. corollaeque patulis. Willd. sp. p. 746. Flor. dan. t. 581. M. palustris Roth. germ. l. 87. II. 221. Hab. in Europae humidis, rivulis. Fol. ligulata subcarnosa. h

2. *arvensis*, caule basi ramosissimo foliisque pilosis, racemo nudo, corol. connivente. Bull. herb. t. 355. Habit. in pratis, arvis. Var. caule simplicissimo, fol. rosaceo-congestis, petalis non emarginatis: M. simplex. ☉

β? *sylvatica*, caule elongato hirsuto, fol. linearibus lanceolatis, racemo conjugato. Ehrh. Freq. in sylvis. Caul. 5-gonus, ultra pedalis. Fol. rad. marcida subovata.

γ? *versicolor*, subcaespitosa, caul. elongato foliisque ligulatis pilosis, flor. minutis flavis. In sylvaticis. Caul. teretiusculus scaber. Fol. caul. alterna. Cor. flava et caerulea. Cal. clausus. Vid. Roth. germ. 2. p. 222.

3. *lutea*, caule herbaceo erecto, foliis

ovatis alternis ciliatis villosis, flor. sparsis racemosis, cor. limbo integro patentissimo. *Anchusa lutea*. Cav. ic. 1. p. 50. t. 69. f. 1. Habit. in Matriti viciniis. Martio. Rad. fibrosa, rubesc. ☉

4. *Apula*, seminibus nudis, fol. lineato-lanceolatis hispidis, racemis foliosis. Lam. ill. p. 395. *Lithospermum apulum*. Vahl. Pluck. Phyt. 16. f. 5. Hab. in Europa meridionali, in Alpibus et ad Cap. bon. spei. Rad. lignosa fere. Flores terminales. Cor. lutea vix cal. longior.

5. *obtusa*, semin. laevibus, fol. lanceolatis acutis hispidis. cal. obtusissimis, radice repente ramosa. Plant. rar. hungar. p. 103. t. 100. Cresc. in Hungariae graminosis et pratis. Petala non emarginata. Sem. basi alba, circulo tumido. ☿

6. *nana*, seminibus laeviusculis margine serrulatis, caule simplici paucifloro. foliis oblongis villosis. Willd. Vill. Delph. 2. p. 459. *M. tergentensis*. Haecq. pl. alp. p. 12. t. 2. f. 6. In Alpibus. Flor. majusculi. ☿

7. *fruticosa*, seminib. laevibus, caule fruticoso laevi. L. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

8. *spatulata*, seminib. laevibus, foliis spatulatis hispidis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. Forst. prod. n.º 62. In Nova Zeelandia.

9. *rupestris*, seminib. laevibus, foliis linearibus villosis, racemis altero. Willd. p. 748. Pall. itin. 3. app. n.º. 71. t. E. f. 3. Hab. in Davuriae saxosis apricis siccis. ☿ Flor. speciosi.

10. *corymbosa*, seminib. laevibus, fol. linearibus acutis, caul. divaricatis, flor. corymbosis. Flor. Peruv. 2. p. 5. Hab. in Chile campis. Subhispidi. ☉

11. *granulosa*, sem. granulosis, foliis linearibus hispidis punctis albicantibus, flor. secundis. Flor. Per. l. c. Habit. in limae arenosis.

12. *humilis*, semin. rugosis, fol. linearibus, caul. brevibus, florib. lateralibus secundis. Flor. Per. l. c. Habit. in Peruviae campis. Procumbens. ☉

13. *Lappula*. Sem. s. fructibus echinatis.

14. *virginiana*, sem. aculeato-glochidibus, fol. ovato-oblongis, racemis divaricatis. Lin. Moris. & 11. t. 30. f. 9. In Virginia. Sequentis var. ? ☉

15. *Lappula*, sem. aculeis glochidibus, fol. lanceolatis pilosis. L. *Cynoglossum glandulosum* glabris. Isell. helv. n.º 589. Hab. in argillosis, ruderalis, muris. ☉

15. *squarrosa*, seminum angulis setoso-uncinatis, fol. lanceolatis pilosis apice calosis. Retz. obs. 2. p. 9. Hab. in Sibiria ad Volgam. ☉

16. *echinophora*, sem. undique hamato-aeuleatis, pedunc. apice incrassatis axillaribus solitariis, fol. lanceolatis pilosis. W. Pall. itin. 3. app. n.º 71. t. h. f. 1. Hab. in Sibiria ad Volgam in ripis praeruptis nitrosis. ☉

17. *spinocarpus*, semin. muricato-spinosis, racemis foliosis, floribus remotis, fol. linearibus pilosis. Vahl. symb. 2. p. 32. *Anchusa spinocarpus*. Forsk. descr. p. 41. Circa Alexandriam. Flores albi. Caulis diffusi. ♀

18. *borbonica*, sem. aculeis glochidibus echinatis, fol. subnatis linearibus lanceolatis longissimis. Lam. l. c. In insula Borbonia. Fol. tuberculata.

19. *gracilis*, sem. echinatis, fol. linearibus, caul. gracilibus, flor. lateralibus laxe spicatis secundis. Flor. Per. 2. p. 5-6. Hab. in Chile campis et collib. Cor. alba. ☉

20. *Cynoglossoides*, seminib. depresso-concavis: aculeis glochidibus radiatim muricatis, fol. oblongis hispidis, flor. axillarib. Lam. l. c. Hab. ad Cap. b. spei.

21. *pectinata*, sem. apice setosis, racemis rectis, fol. ovato-lanceolatis villosis. Willd. Pall. it. 3. app. n.º. 71. t. E. f. 4. Hab. in Sibiria in rupibus muscosis frigidis ad Jeniseam. ☿

350. **TIQUILEIA**. Cal. 5-partitus. Cor. infundibuliformis: laciniis emarginatis, fauce nuda. Stam. exerta. Styl. filiformis, longior. *stigmata* 2, simplicia. Sem. 4: unum sapius abortivum.

1. *dichotoma*. *Lithospermum dichotomum*, semin. laevibus, caul. prostrato, fol. oblongo-obovatis lineatis rugosis, floribus congestis. Flor. Per. 2. p. 5. t. 111. Hab. in Peruviae arenosis. Caul. dichotomus, geniculatus, nodosus. Habitus omnino a *Lithospermis* recedit. Nom. vernaculum *Tiquilo*.

351. **LITHOSPERMUM**. Cor. infundibulif. fauce perforata, nuda. Cal. 5-partitus. Sem. ossea, nitida. (Genitalia inclusa.)

1. *officinale*, semin. laevibus, corollis vix calycem superantibus, fol. lanceolatis venosis. Engl. bot. t. 134. Willd. sp. p. 751. Flor. dan. t. 1084. Hab. in ruderalis, sylvaticis. Sem. alba. ☿

2. *latifolium*, fol. lato-ovalibus nervosis supra asperis subnudis, sem. lucidis punctatis, Michaux, Flor. 1. p. 131. Habit. in umbrosis Kentucky. Priori affine.

3. *angustifolium*, pumilum procumbens, fol. linearib. pilis brevib. appressis, semin. nitidis punctatis, Michaux, p. 130. Ad flumen Ohio. Puncta in seminibus uti antecedentis excavata.

4. *distichum*, sem. laevibus lucidis, fol. ovato-lanceolatis, margine revolutis, flor. axillaribus petiolatis. Ortega Decad. p. 8. In insula Cuba. Cor. alba : fauce lutea. Sem. alba. Folia latiuscula, fere avenia.

5. *arvense*, seminib. rugosis, corol. vix calycem superantibus. Engl. bot. t. 123. Fl. dan. t. 456. Hab. in agris et arvis. Planta tinctoria videtur. ☉

6. *tinctorium*, semin. rugosis, corollis cal. superantibus, fol. lineari-lanceolatis, flor. lateralibus solitariis. Flor. Per. 2. p. 4. t. 114. In Chile arenosis. Pl. herbacea, hinc inde purpurea.

7. *cuneifolium*, incanum, fol. cuneiformibus, flor. axillaribus solitariis, semin. nitidis. Flor. Per. 2. p. 4. Hab. in Peruviae collibus aridis.

8. *hispidum*, sem. rugosis, fol. lanceolatis sessilibus, apice revolutis. Flor. Per. 1. c. p. 5. In Peruviae saxosis. Albicans. Cor. lutea. ☉

9. *muricatum*, sem. muricatis, cor. cal. aequante, fol. lanceolato-linearibus. Flor. Per. 2. p. 4. Cal. fruct. expansus. In Chile ruderatis et praetibus.

10. *incanum*, seminibus asperis, spicis terminalibus compositis coarctatis, foliis linearibus villosis. Forst. prod. n.º 65. In insula Teautea et feroci. h

11. *papillosum*, seminib. rugosis, fol. lanceolato-ovatis papillois hirsutis. Thunb. Prod. 34. Hab. ad Cap. b. spei.

12. *tetrastigma*, fol. lanceolatis hirsutis, flor. in spicis terminalibus secundis, stigmatate quadrifido. Lam. encyc. 3. p. 29. et ill. p. 368. Hab. in Aegypto. ☉

13. *scabrum*, seminib. laevibus, foliis lanceolatis piluloso-scabris hirsutis. Th. prod. 34. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *orientale*, ramis floriferis lateralibus, bracteis cordatis amplexicaulibus. Habit. in Oriente. ☉

Obs. Habitus recedit. Cal. subdecagonus. Cor. flava, fauce margine pilosa, Stigm. ca-

pitatum. Sem. subpubescentia : *Oskampia* trichotoma. Moench. Method. p. 420.

15. *purpureo-ceruleum*, sem. laevibus, corollis calyc. multoties superantibus. L. H. in nemoribus et secus vias. Caulcs steriles repentes radicante. ☉

16. *fruticosum*, (*rosmarinifolium*), fruticosum, fol. linearibus hispidis, margine revolutis, staminib. corollam aequantibus. Mill. dict. n. 3. *Anchusa* lignosior Monspelienisium, flore violaceo, Barr. ic. 1168. Buglossum, rosmarini fol. Garid. aix. t. 15. Hab. in Europa australi. h

17. *decumbens*, (*pentagonum*), callosulo-hispidum, fol. lanceolatis, cal. basi pentagonis strigosis, sem. tuberculatis, caule herbaceo. Venten. Descr. p. 37. t. 37. Habit. in Bagdad. ☉

18. *callosum*, decumbens, fol. lanceolato-linearibus callosulo-verrucosis hispidis, caule suffruticoso hispidulo. Vahl. symbol. 1. p. 14. Hab. in desertis prope Cairo. h

19. *ciliatum*, fol. ovatis incanis margine callosis ciliatis, caule suffruticoso muricato hispidulo. Vahl. symbol. 1. p. 14. Habit. ad canales prope Cairo. h

20. *tenuiflorum*, fol. lineari-lanceolatis strigosis, corol. filiformibus. Lin. suppl. 130. Hab. in Aegypto. Cor. caerulea. ☉

21. *dispermum*, semin. duobus, caly. cib. patentibus. Lin. dec. 1. t. 7. In Hispania Calyx quasi inflatus. ☉

22. *retortum*, fol. inferioribus spatulatis summis linearibus, calycibus fructiferis pendulis ciliatis monospermis, semine confuso callosulo-punctato. Willd. sp. 2. p. 755. Pall. it. 3. app. n.º 72. t. li. fig. 2. Hab. in Sibiria ad ripas praerupt. nitrosas Volgae. ☉

β ? *incurvum*, fol. sublanceolatis incanis, cal. lacinjis apice incurvatis, seminib. quaternis. In Hispaniae collibus. Thibaut.

352. **BATSCHIA.** *Cal.* subquinquefidis. *Cor.* hypocrateriformis (majuscula), tubo recto, cal. longior : intus basi annulo barbato : fauce nuda, lacinjis rotundatis. *Sem.* dura nitida.

1. *carolinensis*, hirsuta, fol. floralibus ovatis, cal. longis sublanceolatis. B. Gmelini. Michaux. Flor. 1. p. 130. Gmel. syst. II. p. 315. Hab. in aridis sylvis Carolinae inferioris.

2. *canescens*, candicante-villosa, fol. omnibus oblongis, cal. brevissimis. Mich.

1. 14. In collibus sylvaticis Tenessee. *Obs.*
An Lithospermum orientale L. hujus generis?

353. *ANCHUSA. Cor.* infundibuliformis : fauce clausa fornicibus. *Sem.* basi insculpta, superficie ut plurimum venosa.

1. *paniculata*, fol. lanceolatis strigosis integerrimis, panicula dichotoma divaricata, flor. pedunculatis, cal. quinquepartitis, laciniis subulatis. Ait. Kew. 1. p. 177. Willd. sp. 2. p. 756. *A. macrophylla*. Lam. ill. p. 402? Hab. in Madera. \mathcal{H}

2. *capensis*, foliis lanceolatis callosis villosis, racemis trichotomis. Thunb. pr. 34. Hab. ad Cap. b. speci.

3. *officinalis*, foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis, bract. ovatis. Lin. Fl. dan. t. 572. Hab. ad ruderata, vias, agros. Cal. 5-partitus. \mathcal{H}

4. *angustifolia*, fol. oblongo-lanceolatis integris, flor. spicatis, calycib. quinquefidis, bract. lineari-lanceolatis. Moris. 11. t. 26. f. 4. In Italia, Germania. \mathcal{H}

5. *undulata*, strigosa, fol. linearibus dentatis, pedicellis bractea minoribus, cal. fructiferis inflatis. Boccon. mus. t. 77. Barr. ic. 578. Hab. in Hispaniae, Lusitaniae, Si. briae praetis. \mathcal{H}

6. *tinctoria*, tomentosa, fol. lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. H. Mompelii et in Barbaria. \mathcal{H}

7. *hispida*, pedunc. axillaribus diphyllis, fol. lanceolatis repando-dentatis hispidis. Vahl. symb. 2. p. 33. In Aegypto.

8. *virginica*, flor. sparsis, caule glabro. A. Paecon indigenis dicta qua se pingunt americani. Pluck. alm. 30. Moris. s. 11. t. 28. f. 4. Hab. in Virginia. \mathcal{H}

9. *lanata*, fol. villosis, calycib. hirsutis, staminibus corolla longiorib. H. Algiriae.

10. *sempervirens*, peduncul. diphyllis capitatis. Hab. in Anglia, Hispania. Flor. vere. Cor. caerulea Myosotidis. \mathcal{H}

11. *parviflora*, fol. linearibus cauleque ramissimo hispidis, racemis paucifloris confertis. Willd. p. 759. Hab. in Oriente.

12. *caespitosa*, foliis linearibus obtusis basi attenuatis caule longioribus, racemo terminali simplici subquadrifloro. Willd. Lam. encycl. 1. p. 498. Hab. in Creta. Rad. crassa, \mathcal{H}

† *EUCLOSSUM : squamulis faucis cor. penicilliformibus.*

13. *italica*, caule exaltato, fol. lucidis strigosis, racemis bipartitis diphyllis, flor. subaequalibus, fauce barbatis. Retz. obs. 1. p. 12. Trew. Dec. 2. p. 14. t. 13. Moris. s. 11. t. 26. f. 1. Hab. in Europa australi in campis : saepius cum *A. officinali* confunditur. (Bugl. caeruleum.)

Obs. An *Cynoglossum fulvum*, cor. cal. aequali limbo fornicumque spicibus barbatis Rudolphi in Scrad. bot. Journ. 2. p. 280. hujus loci? qualis plantae prope Lisbonam crescentes pedunculi lanugine aurca vestiti sunt.

354. *CYNOGLOSSUM. Cor.* infundibuliformis : fauce clausa fornicibus. *Semina* depressa, latere interiore stylo affixa.

1. *officinale*, staminibus corolla brevioribus, fol. lato-lanceolatis basi attenuatis tomentosis sessilibus, laciniis calycinis oblongis. Ait. Kew. 1. p. 179. Willd. sp. 2. p. 760. Flor. dan. t. 1147. Hab. in ruderatis. Odore murino foetet. Smith.

2. *montanum*, stam. corolla brevioribus, fol. spatulato-lanceolatis lucidis nudiusculis subtus scabris. Smth., brit. 1. p. 216. (*C. sylvaticum*.) *C. montanum*. Lam. *C. virginianum*. Lin. syst. veg. ed. 13. nec Sp. pl. *C. Dioscoridis*. Villars. *C. virente folio*. montana frigidarum regionum. Column. Ecphr. t. 175. *C. sylvaticum* Haenke in Jacq. coll. 2. p. 77. non differre videtur. Hab. in sylvaticis montosis. Vix foetet. Sm.

3. *pictum*, corollis calyci subaequalibus venosis, laciniis calic. ? subrotundo-lilatis, fol. lanceolatis tomentosis : superioribus basi cordatis. Ait. l. c. *C. creticum*. Villars. Hab. in Europa australi, Barbaria et Madera. \mathcal{H}

4. *lanceolatum*, fol. lanceolatis utrinque attenuatis supra punctato-scabris inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus. Vahl. symbol. 2. p. 34. Hab. in Arabia.

5. *virginicum*, foliis amplexicaulibus, Gron. virg. 19. Moris. s. 11. t. 30. f. 9. Hab. in Virginia. \odot

6. *amplexicaule*, hirsutissimum, foliis ovali-oblongis : superioribus amplexicaulibus, corymbo terminali aphylo, seminibus obovatis. Mich. Fl. 1. p. 132. In montibus Alleghanis. An idem cum antecedente?

7. *clandestinum*, fol. lanceolatis villosis, corol. calycem aequantibus apice

tomentoso-pubescentibus. Desf. atl. I. p. 159. t. 42. Habitu ad limites agrorum Algeriac. Sem. echinata spinulis peltato uncinatis. D.

8. *cheirifolium*, corollis calyce duplo longioribus, fol. lanceolatis sericeis. C. fol. spatulatis lincanis tomentosis semialexi-caulibus. Gouen. monsp. 20. Hab. in Creta, Gallia, Hispania, Oriente. Corollae albae venis sanguineis. ♂

9. *apenninum*, staminibus corollam aequantibus. Col. ecephr. t. 170. Hab. in alpinis Apenninis et Campoclarensibus. ♂

10. *hispidum*, fol. oblongis obtusis setacco-hispidis, stam. corolla brevioribus. Thunb. procl. 34. Hab. ad Cap. b. spei, cum trilus sequentibus. ♂

11. *hirsutum*, foliis lanceolatis villoto-hispidis, seminibus aculeis uncinatis. Th.

12. *echinatum*, fol. lanceolatis obtusis papillo-hirsutis, semin. subconicis uncinato-aculeatis. Thunb. h.

13. *muricatum*, fol. ovatis villosis scabris, semin. callosomuricatis. Thunb. h.

14. *angustifolium*, fol. linearibus hispidis, stylo corollae campanulatis longiore, seminibus laevibus. Willd. l. c. p. 761. Tournef. Cor. 7. Hal. it. in Armenia. Cor. calyce multo longior. Semina glabra clypeata. ♀

15. *laevigatum*, fol. lanceolato-ovatis glabriusculis, calycibus tomentosis, sem. laevibus. Linn. suppl. 131. C. *Rindera*. Pall. Flor. ross. 2. p. 96. t. 88. *Rindera* tetraspis. Pall. it. t. p. 486. t. F. f. 1. 2. Hab. in Sibiria. Cor. pervia. ♀

16. *glastifolium*, fol. lanceolatis glabris subtus papulosis, seminib. membranaceis centro submuricatis. Willd. p. 764. Tourn. Cor. 7. Hab. in Armenia.

17. *cristatum*, fol. lineari-lanceolatis hispidis, sem. membranaceis centro et margine muricatis. Willd. l. c. C. seminibus margine membranaceo cristatoque peltis instar cinctis. Lam. encycl. 2. p. 238. Hab. in Oriente.

18. *decurrens*, fol. lanceolatis decurrentibus venosis, caule anguloso-alato. Fl. Per. 2. p. 6. Hab. in Chile nemoribus. Sem. echinata: aristis glochidatis. ♂

19. *revolutum*, stam. corol. brevioribus, cor. calyce duplo longioribus, fol. lanceolatis: caulinis sessilibus. Flor. Per. l. c. Crescit in umbrosis. Semin. echinato-hamosa. ♂

20. *pilosum*, fol. linearibus, flor. solitariis fol. alternantibus. Flor. Per. l. c. t. 111. Cresc. in locis aridis. Fruc. cristatus, uncinatus. ♂

21. *lineare*, canescens, fol. linearibus; florib. solitariis oppositifoliis, sem. dentatis. Flor. Per. l. c. p. 6. In campis aridis. ♂

22. *pauciflorum*, hispidum, fol. lanceolatis inferne angustatis, pedunc. subopertifloris. Flor. Per. l. c. Cum priore. ♂

23. *lusitanicum*, fol. cordatis amplexicaulis glabris, margine laevibus. Vahl. symb. 2. p. 34. Hab. in Lusitania. Cal. nudus. ♂

24. *linifolium*, fol. lineari-lanceolatis glabris, margine denticulato-scabris. Vahl. l. c. Moris. s. 11. t. 30 f. 11. In Lusitania. Cal. basi strigosus. ♂

25. *lanatum*, calyce tomentoso-lanatis, corol. limbo acuto profunde quinquefido, racemulis cernuis. Lam. Hab. in Oriente.

26. *japonicum*, cal. villoso, fol. oblongis villosis, caulibus prostratis. Thunb. jap. 81. Ej. Icon. pl. Jap. Hab. in Japonia. ♂

27. *lateriflorum*, fol. linearibus agutis angustis pilosis, flor. lateralibus solitariis subsessilibus, sem. radiatim cristatis. Lam. ill. p. 400. Hab. in Lima. ♂

28. *scorpioides*, caule prostrato, foliis lanceolatis scabris, pedunculis axillaribus unifloris, sem. umbilicatis glabris. Jacq. Collect. 2. p. 3. Schmidt holern. 1. n. 220. Hab. in nemorosis umbrosis: udis Bohemiae. ♂

29. *Omphalodes*, fol. radicalib. ovato-cordatis, caulinis ovatis petiolatis. Willd. p. 766. Curt. bot. mag. t. 7. Moris. s. 11. t. 26. f. 3. Hab. in Lusitaniae, Carniolae nemorosis ad radices montium. Vere. ♂

30. *cappadocicum*, fol. petiolatis radicalibus cordatis, caulinis infimis lanceolatis, summis cordatis sessilibus. Willd. p. 767. Hab. in Cappadocia. ♀

31. *myosotoides*, fol. radicalibus spatulato-lanceolatis, caulinis linearibus sessilibus, seminib. membranaceis laevibus margine ciliato denticulatis. Willd. l. c. Billard. Icon. pl. Syr. 2. p. 6. t. 2. *C. lithospermifolium*. Lam. Hab. in summo cacumine montis Libani. ♀

355. PULMONARIA. Cor. infundibuliformis, fauce pervia. Cal. prismaticeo-5-gonus.

1. *angustifolia*, fol. radicalibus lanceolatis.

ecolatis. Flor. dan. 483. Hab. in Pannonia, Helvetia, Suecia, Germania. Sequenti nimis affinis, solum foliis angustis sublinearibus distinguenda. L. $\overline{\text{L}}$

2. *officinialis*, fol. radicalibus ovato-cordatis scabris. P. foliis ovatis hirsutis. Smith. brit. 1. p. 216. Engl. bot. t. 118. Hab. in nemoribus. $\overline{\text{L}}$

3? *suffruticosus*, fol. linearibus scabris, calycibus subulatis quinquepartitis. Pluck. phyt. 42. f. 7. Hab. in alpihus Italiae. \dagger

* *MERTENSIA*. Calyces abbreviati, tubo corollae dimidio breviores.

4. *paniculata*, calyc. abbreviatis quinquepartitis hispidis, fol. ovato-oblongis acuminatis pilosiusculis. Ait. Kew. 1. p. 181. Hab. ad fretum Hudsonis. \odot

5. *virginica*, calyc. abbreviatis glaberrimis, fol. ovatis, caule erecto, flor. subpaniculatis terminalibus. Michaux. Flor. 1. p. 131. Mertensia pulmonarioides. Roth. catal. bot. 1. p. 34. Pluck. alm. t. 227. f. 6. Hab. in Virginia et Carolina ad ripas arenosas. $\overline{\text{L}}$

6. *parviflora*, caule diffuso procumbente glaberrimo. fol. ovali-spathulatis carnosis, pedunc. l teralibus 1-floris. Michaux, l. c. Hab. ad litorea maris prope flumen St. Laurentii.

7. *sibirica*, calycibus abbreviatis, foliis radicalibus cordatis. Sp. pl. 194. Gmel. sib. IV. t. 39. Habit. in Sibiria. Corymbi ramosi, nutantes. L. $\overline{\text{L}}$

8. *maritima*, calycib. abbreviatis, foliis ovatis glaucis, caule ramoso procumbente. Lightf. scot. 1. p. 134. t. 7. In Angliae et Europae boreal. littoribus. \odot

356. *SYMPHYTUM*. Corollae limbus tubulato-ventricosus: fauce clausa radiis subulatis.

* *Foliis ovatis*.

1. *officinale*, (album), foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. Lin.

(β). *purpureum*, cal. patente: S. *patens*. Sibth. Flor. oxon. p. 70

γ . S. (α et β). *bohemicum*, caule anguloso-hirsuto, racemis apice revolutis, stylo cor. excedente. Schmidt bohern. n. 212. Habit. in Europae umbrosis subhumidis. Radix nigra. $\overline{\text{L}}$

2. *tuberosum*, fol. ovatis semidecurrentibus, summis oppositis, (radice alba.) Jacq. obs. 1. p. 12. t. 63. Hab. in Germania australi, Mompelii, Hispania. $\overline{\text{L}}$

3. *orientale*, fol. ovatis acutis subpetiolatis. Lin. Buxb. cen. 5. p. 36. t. 58. Habit. juxta Constantinop. rivulos, primo vere. $\overline{\text{L}}$

* *Foliis cordatis*.

4. *tauricum*, fol. cordatis crenulatis basi inaequalibus. Willd. in Nov. Act. Soc. Nat. cur. Berol. 2. p. 120. t. 6. f. 1. S. orientale Pallas in Act. Petrop. 1792. p. 306. Hab. . .

5. *pannonicum*, foliis cordatis acuminatis integerrimis basi aequalibus. S. cordatum. Willd. l. c. Pl. rar. Hungar. p. 6. t. 7. Hab. in pinetis Comit. Beharensis et in Transylvania. Cor. luteo-alba.

357. *CERINTHE*. Cor. limbus tubulato-ventricosus: fauce pervia. Noces 2, biloculares.

1. *major*, corollis obtusis patulis apice ventricosus campanulatis, staminib. corolla brevioribus. Roth. cat. 1. p. 32. Lam. ill. t. 93. Willd. p. 772. Habit. in Sibiria, Helvetia. \odot

(β ?) *aspera*, cor. obtusis patulis cylindricis, stamin. corollae aequalibus. Roth. l. c. p. 33. Hab. in Europa australi. \odot

2. *minor*, fol. amplexicaulibus integris, coroll. acutis clausis. Jacq. austr. t. 124. In Austriae, Styriae agris et Jenae. \odot

358. *ONOSMA*. Cor. campanulata: limbo tubuloso-ventricosus, 5-dentato, fauce pervia. Styl. inclusus. Semina 4.


1. *simplicissima*, corollis ventricosis, fol. lineari-lanceolatis hirsutis. Willd. sp. 2. p. 773. Gmel. sib. 4. p. 76. t. 40. Hab. in Sibiria. $\overline{\text{L}}$

2. *orientalis*, corollis cylindricis acutis, fructibus pendulis, foliis linearibus hirtis. Willd. l. c. Hab. in Oriente. $\overline{\text{L}}$

3. *echioides*, coroll. cylindricis obtusis fructibus erectis, fol. lanceolatis hispidis. Willd. sp. p. 774. Jacq. austr. t. 295. Lam. ill. t. 95. Hab. in Europae rupibus. $\overline{\text{L}}$

4. *taurica*, cor. cylindricis obtusiusculis, racemis axillaribus submutantibus, foliis lineari-lanceolatis hispidis. Willd. in Nov. Act. Soc. Nat. Cur. Berol. v. 2. Pallas in Nov. Act. Petrop. 1792. p. 306. Fol. et cor. angustiora quam in antecedente, cui affinis.

5. *geraniifolia*, simplicissima, foliis angustolanceolatis ventricosis, strob. nutantibus, sem. tuberculoso. Desfont. Atl. r. p. 161. t.



41. *Hab. in arenis deserti prope Casam.*
Sem. magna. ♂

6. *sericea*, fol. petiolatis oblongo-lanceolatis sericeo-villosis. Willd. l. c. Symphytum orientale oleae fol. argenteo, flore flavescente. Tournef. Cor. 6. In Oriente. ♀

7. *coerulea*, fol. sessilibus lanceolatis sericeo-villosis, stamin. corolla longioribus. Willd. 775. Tournef. Cor. 7. Habit. in Armenia. ♀

8. *tenuiflora*, fol. sessilibus linearibus obtusis hirtis, corollis cylindricis calycinis foliolis linearibus parum longioribus. Willd. Symphytum orientale Echii folio, flore albo tenuissimo. Tournef. Cor. 6. In Oriente. Parvitate fol. distincta. W.

9. *caspica*, caule ramoso divaricato, fol. oblongo-lanceolatis hispitis, pedunculis axillaribus fructiferis reflexis, cor. obtusis. Willd. Onosma orientalis. Pall. it. 2. t. l. (bona.) Habit. in arenosis versus mare caspium. ☉

10. *micrantha*, caule ramoso divaricato, fol. oblongis petiolatis subtus incano-hispitis, racemis nudis. Willd. Pall. it. 2. app. n. 100. t. l. Hab. in Sibiria ad Irtn et inter Jaikum et Volgā, locis arenosis. ☉

* *gigantea*, caule ramoso altissimo, fol. oblongo-lanceolatis scabris, cal. pilosissimis. Lam. ill. p. 407. Hab. in Oriente.

359. **ONOSMODIUM.** *Cal.* profunde 5-partitis. *Cor.* oblonga subcampanulata: fauce nuda; limbo ventricoso semiquinquesido: lacin. subconniventibus acutis. *Anth.* sessiles inclusae. *Stylus* exsertus.

1. *hispidum*, fol. obovali-lanceolatis papilloso-punctatis, corol. lacinis subulatis. Michaux. Flor. 1. pl. 133. Lithospermum virginianum. L. Hab. in Virginia.

2. *molle*, villosio-candicans, fol. oblongo-ovalibus subtriplinerviis, cor. lacin. subovalibus. Mich. t. 15. Habit. in Tennessee, circa Nashville.

360. **BORAGO.** *Cor.* rotata: fauce radiis clausa.

1. *officinalis*, fol. alternis, calycibus patentibus. Blackw. t. 36. Willd. sp. 1. p. 776. Hab. sponte in Aleppo. ☉

2. *indica*, fol. ramificationum oppositis amplexicaulibus, pedunc. unifloris. Cal. aurito. Pluck. alm. 30. t. 76. f. 3. Hab. in India. ☉

3. *africana*, foliis oppositis petiolatis ovatis, pedunc. multifloris. In Aethiopia. ☉

4. *longifolia*, foliis lineari-lanceolatis sessilibus alternis, calyc. basi hirsutissimis. Poir. it. 2. p. 157. t. 3. Desf. Atl. t. 44. In locis humidis Numidiae.

5. *zeylanica*, fol. rameis alternis sessilibus, pedunc. unifloris, calyc. inauritis. Mant. 202. Jacq. Collect. 3. p. 169. Ic. rar. 2. t. 314. Hab. in India orientali.

6. *crassifolia*, foliis ovato-lanceolatis subcarnosis dentato-spinosis, superne scabris glaucis, petalis linearibus. - Venten. Descr. p. 100. t. 100. Hab. in Oriente. Num. floris partium passim quaternarius.

7. *orientalis*, calycibus tubo corollae reflexae brevioribus, fol. coriatis. Tourn. iun. t. 521. Buxb. cent. 5. p. 16. t. 30. Hab. circum Constantinopolim. Pedunc. axillares multiflori. Stam. exserta, villosa. ♀

8. *cretica*, calycibus longitudine tubi corollae reflexae, fol. ovatis. Willd. p. 778. Hab. in Creta. Distincta a praecedente foliis calycinis ovato-rhombeis. W.

361. **ASPERUGO.** *Cal.* fructus compressus: lamellis plano-parallelis, sinuatis.

1. *procumbens*. Lin. Flor. dan. t. 552. Hab. in ruderalis pinguis. ☉

362. **LYCOPSIS.** *Cor.* tubo incurvato, et rectiusculo. *Cal.* inflatus aut ventricosus.

1. *vesicaria*, foliis integerrimis, caule prostrato, calycibus frutescentibus inflatis pendulis. Lin. Willd. sp. p. 779. Echiioides violacea. Desf. Atl. 1. p. 164. Nonea decumbens. Moench. Meth. p. 422. Hab. in Europa australi. ☉

* *nigricans*, caule procumbente, foliis integerrimis, cal. fruct. inflatis pendulis, cor. calyce brevioribus. Desf. l. c. Moris. s. 11. t. 26. f. 11. Habit. in arenosis prope Torzer. ☉

2. *pulla*, fol. integerrimis, caule erecto, calycibus frutescentibus inflatis pendulis. Jacq. austr. t. 188. Hab. in Tartaria, Germania, in arvis.

3. *ciliata*, foliis lanceolatis denticulatis hispido-ciliatis, calyce fructifero inflato pendulo. Willd. p. 780. Hab. in Oriente.

4. *obtusifolia*, foliis lanceolatis obtusis subintegerrimis, calyce fructifero inflato erecto. W. In Chio. ☉

5. *variegata*, fol. repandis dentatis callosis, caule decumbente, corollis cernuis. Lin. Moris. s. 11. t. 26. f. 10. Anchusa perlata. Lam. ill. p. 403. Hab. in Creta. ☉

6. *aegyptiaca*, foliis ovato-lanceolatis verrucosis scaberrimis, florib. axillaribus alternis pedunculatis. Lin. sp. ed. l. p. 138. Asperugo aegyptiaca. Lin. Willd. p. 779. Anchusa verrucosa. Lam. Jacq. hort. 3. t. 21. Hab. in Aegypto. Cor. ochroleuca: tubo recto. Sem. rugosa subtus concava. J. An potius Anchusae species?

7. *arvensis*, foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis, (cor. tubo incurvo.) For. lapp. 77. Flor. dan. t. 435. In arvis. ☉

8. *echioides*, foliis lanceolatis hirsutis, caule ramosissimo erecto, floribus secundis sessilibus. Buxb. cent. 1. p. 1. t. 1. Habit. in Armenia. ☿

9. *orientalis*, foliis ovatis integerrimis scabris, calycib. erectis. Hab. in Oriente. ☉

10. *virginica*, fol. lineari-lanceolatis confertis tomentosis mollibus, caule erecto. Gron. virg. 140. Habit. in Virginia ad vias. ☉

Obs. Hocce genus forte in duo separandum est.

363. ECHLUM. Cor. ut plurimum irregularis, fauce nuda, ampla.

1. *fruticosum*, (africanum), caule fruticoso, fol. lanceolatis basi attenuatis villosis strigosis aveniis, foliolis calycinis lanceolatis acutis. Ait. Kew. 1. p. 186. W. sp. p. 781. E. africanum fruticosum. Comm. hort. 2. p. 107. t. 54. Pluck. Mant. 33. t. 341. f. 1. Habit. in Aethiopia. Plura fruticosa sunt, nomen hinc minus aptum.

2. *formosum*, caule fruticoso, foliis nitidis lanceolatis hispidis; corollis magnis aequalibus. E. grandiflorum. Andrew. t. 20. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. rubra, stam. longior, limbo brevi, obtuso.

3. *serox*, caule fruticoso, ramis foliisque aculeatis, flor. spicatis, cor. subaequalibus. Andrew. t. 39. Cum priore. Cor. smoeine violacea, limbo patente obtuso, tubo brevi?

4. *candicans*, caule fruticoso, foliis lanceolatis nervosis ramisque hirsutis, foliolis calycinis oblongis lanceolatis acutis, stylis hirsutis. Ait. Kew. 1. p. 186. Jacq. Col. 1. p. 44. Ic. rar. 1. t. 30. Habit. in Maderae rupibus altis. Tota planta albicat, quasi argentea. ♀

5. *giganteum*, caule fruticoso, fol. lanceolatis basi attenuatis pilosis, pilis brevissimis; bracteis calycibusque strigosis, staminibus corolla longioribus. Ait. Lin. snpp. 131. Hab. in rupibus Teneriffae. Corollae subaequales albae.

6. *strictum*, caule fruticoso stricto ramoso, fol. oblongo-lanceolatis pilosis, cor. subcampanulatis, staminibus corolla longioribus. Ait. Kew. 1. p. 185. Linn. suppl. 131. Hab. in rupibus Teneriffae. ♂

7. *argenteum*, caule foliisque lanceolatis acutis sericeo-villosis, spica terminali simplicifolia. Thunb. prodr. 33. Andrew. t. 154. Hab. in Cap. b. spei montibus nigris. ♀

8. *sericeum*, fol. lineari-cuneatis, cauleque suffruticoso incanis. In Aegypto. ♀

9. *setosum*, foliis lineari-lanceolatis cauleque suffruticoso procumbente hispidis incanis. Vahl. symb. 2. p. 35. Habit. in Aegypto. Corolla unguiculari canescens.

10. *trichotomum*, caule glabro subtrichotomo, ramis tomentosis, fol. lanceolatis imbricatis tomentosis. Thunb. prodr. 33. Ad Cap. b. spei. ♀

11. *hispidum*, caule glabro, ramis apice foliisque lanceolatis piloso-hispidis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

12. *paniculatum*, caule pubescente, ramis angulatis, fol. piloso-hispidis. Thunb. l. c. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

13. *trigonum*, caule villosa, fol. oblongis canaliculatis piloso-hispidis. Thunb. Ad Cap. b. spei. ♀

14. *capitatum*, caule piloso, floribus capitato-corymbosis aequalibus, staminibus corolla longioribus, foliis hispidis. Mant. 42. Thunb. prodr. 33. Hab. ad Cap. b. spei. Corolla parva. ♀

15. *glaucophyllum*, caule fruticoso, ramis calycibusque glabris, foliis lanceolatis glaucis aveniis ad oras strigosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 312. Collect. 2. p. 325. Andrew. t. 165. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

Obs. Echium laevigatum Lin. et E. glabrum Thunb. hujus videntur loci.

16. *incanum*, caule villosa, foliis lineari-ensiformibus sericeo-tomentosis, racemo spicato lineari. Thunb. prodr. 33. Hab. ad Cap. b. spei.

17. *spicatum*, caule villosa, foliis ensiformi-ellipticis villosis, spica composita lineari-oblonga. Thunb. Linn. suppl. 132. Cum priore. Ad Cap. b. spei.

18. *caudatum*, caule villosa, fol. oblongis setaceo-hispidis, spica composita ovato-oblonga. Thunb. Ad Cap. b. spei.

19. *italicum*, caule herbaceo piloso, fol. lineari-lanceolatis strigoso-hirsutis, inferioribus nervosis, cor. subaequalibus, staminibus corolla longioribus. Ait. Kew. t. p. 187. E. caule erecto piloso, spicis hirsutis, corollis subaequalibus, staminibus longissimis. Lin. p. ? *Echium altissimum*. Jacq. aust. 5. app. t. 6. Hab. in Anglia, Italia, Helvetia, Pannonia, Gallia, in collibus siccis. Corolla subparva, alba. Stam. longissima. ♂

20. *aspernum*, caule ramoso pilosissimo, fol. lanceolatis tuberculosis, corolla villosa, stam. exsertis. Lam. ill. p. 412. E. pyrenicum. Desf. Atl. t. p. 164. Lin. mant. p. 335. In agro Tunetano et Algeriensi.

21. *flavum*, caule implici, fol. lanceolatis, hirsutissimis, stam. cor. subregulari duplo longioribus. Desf. l. c. t. 45. Hab. in Atlante, prope Tlemcen.

22. *humile*, fol. angusto-lanceolatis pilosis scabris in petiolum decurrentibus, cal. hirsutissimis. Desf. l. c. Hab. in arenosis prope Cassam.

* *angustifolium*, caule simplici hispido, foliis linearibus, cor. calyce duplo longioribus. Lam. ill. p. 412. Barrelet. ic. n. 1011. Hab. in Hispania. ☉

23. *rubrum*, caule ex racemulis brevibus longe spicato, corollis subaequalibus, fol. lineari-lanceolatis hispulis. Host. synop. p. 93. Jacq. aust. 5. app. t. 3. Hab. in pratis Austriae, Pannoniae. ☉

24. *vulgare*, caule tuberculato-hispido, fol. caulinis lanceolatis hispulis, floribus spicatis lateralibus. Fior. dan. t. 445. Black. t. 299. Hab. ad vias et agros. Var. fol. pubescentibus submollibus. ♂

25. *violaceum*, caule diffuso, cor. stamina aequantibus, tubo calyce brevior. Lin. Hab. in Austria, Germania, Italia. ☉

26. *maritimum*, fol. spatulato-lanceolatis villosa-strigosis, staminibus corolla brevioribus. Willd. sp. 788. Tournet. inst. 136. Bocc. mus. 2. p. 84. t. 78. In maritimis Italiae, Siciliae. ☉

27. *tenuis*, caule erecto tenui foliisque lanceolatis strigosis, stam. brevioribus. Roth. Catal. 2. p. 16. E. micranthum. Schousboe. Hab. in arvis in Barbaria. Cor. coerulesca: striis albis. ☉

28. *parviflorum*, caule erecto dichotomo, fol. caulinis ovali-oblongis, corol.

subaequalibus longitudine calycis, stamin. corol. brevioribus. Roth. l. c. p. 14. Moench. method. p. 423. Hab. . . Cor. vix calycem superans.

* *australe*, fol. caulinis ovatis utrinque attenuatis, stam. corol. aequantibus. Lam. ill. p. 413. Cresc. in Europa australi? Ab E. lusitanico distinctum videtur.

29. *grandiflorum*, foliis pubescentibus mollibus: caulinis ovato-oblongis, caule subramoso piloso, cor. calyce 4-plo longioribus. Desf. Atl. t. p. 166. t. 46. H. . . ☉

30. *plantagineum*, fol. radicalibus ovatis lineatis petiolatis, cor. calyce majoribus. Lin. Barr. ic. t. 1026. In Italia. Bract. semicordatae. ☉

31. *creticum*, caule procumbente, calycibus frutescentibus distantibus. Lin. Hab. in Creta, Oriente. ☉

32. *orientale*, caule ramoso, fol. caulinis ovatis, flor. solitariis lateralibus. Lin. Hab. in Oriente. ☉

33. *lusitanicum*, cor. stam. longioribus caule simplici, fol. caulinis lanceolatis sericeis, flor. spicatis lateralibus. Roy. Lugd. 407. Hab. in Europa australi. ☉

364. ECHIOCHILON. Cal. 4-partitus. Cor. bilabiata: labio superiore bilobo; inferiore 3-lobo: lobis rotundatis; tubo gracili arcuato. Sem. 4.

1. *fruticosum*, caule fruticoso, ramis hirsutis, fol. subulatis asperis, flor. solitariis axillaribus. Desf. Atl. t. p. 167. t. 47. Hab. prope Kerwan in regno Tunetano. Hyeme floret.

++ *Fructus baccatus. Caul. frutescens aut arboreus.*

365. MESSERSCHMIDIA. Cor. tubo basi globoso, fauce nuda. Bacca muricata suberosa, bipartibilis: singulo dispermo.

1. *fruticosa*, caule fruticoso, fol. petiolatis ovato-lanceolatis cor. hypocrateriformibus. Lin. suppl. 132. Hab. in Teneriffa et insulis Canar. h.

β. *angustifolia*, fol. petiolatis lineari-lanceolatis. Lam. ill. p. 415. Habit. in ins. Canariis.

2. *Argusia*, caule herbaceo, fol. sessilibus, corollis infundibuliformibus. Linn. suppl. 132. Act. Petropol. 1763. p. 315. t.

11. Gmel. It. 2. p. 197. t. 27. Arguzia montana. Amin. ruth. 38. In Davuriæ apicis glareosis. Caulis palmaris

366. *TOURNEFORTIA*. Cor. infundibuliformis: tubo basi glabro. *Bacca* 2-locularis, 2 4-sperma, supera, apice duobus poris perforata.

1. *hirsutissima*, fol. ovatis petiolatis acuminatis, caule hirsuto, spicis ramosis terminalibus, buccis hirsutis. Swartz. obs. 56. Habit. in America calidiore. h

2. *volubilis*, foliis ovatis acuminatis glabris, petiolis reflexis, caule volubili, pedunc. corymboso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 148. f. b. Lam. ill. t. 93. f. 2. Sloan. hist. 1. t. 143. f. 2. Pluck. alm. 689. t. 235. f. 6. Hab. in Jamaica, Mexico, Peruvia. Arbor scandens. Bac. 4-sperma. h

3. *Springaefolia*, fol. subcordato-ovatis acuminatis glabris, spicis ramosis. Vahl. symb. 3. p. 23. Hab. in Cajenna. h

4. *laurifolia*, caule volubili, fol. ovato-oblongis repandis glabris, petiol. geniculatis, bacca torulosa 2-partibili. Vent. choix de Plant. rar. p. 2. t. 2. Hab. in Porto Rico et St. Thomas.

5. *macrophylla*, fol. ovato-lanceolatis vix maximis, pedunc. ramosis, spicis prælongis pendulis. Lam. ill. p. 416. T. cymosa. Lin. Jacq. coll. 1. p. 96. Ic. rar. t. 31. Sloan. jam. t. 212. f. 2. Hab. in Jamaica. h

6. *bifida*, fol. ovatis glabris petiolatis, pedunc. bifidis axillaribus, spicis divaricatis. Lam. ill. p. 417. Hab. in insula Franciæ. h

7. *foetida*, fol. ovato-lanceolatis hirtis, pedunc. ramosis, spicis pendulis. Pittonia racemosa, Nicotianæ foliis foetidissimis, Plum. gen. 5. ic. 220. Habit. in Mexico, Jamaica. h

8. *humilis*, foliis lanceolatis sessilibus, spicis simplicibus recurvis late alibus. Pittonia humilis, Anchusæ fol. Plum. gen. 5. ic. 227. f. 2. Hab. in America calida. h

9. *bicolor*, foliis ovatis acuminatis glabris, superne rugosiusculis, spicis cymosis erectis recurvis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 344. Hab. in fruticetis Jamaicae. h

10. *polystachia*, fol. ovatis acutis rugosis hirsutis, pedunc. terminalibus corym-

boso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 149. f. a. Habit. in Peruviae præruptis. Bacca 4-sperma.

11. *undulata*, fol. oblongo-lanceolatis acutis lineatis rugosis, pedunc. corymboso-dichotomis polystachiis. Flor. Per. p. 25. f. 6. Hab. in Camanæ collibus. Cor. pubescens. Bacca 2-sperma. h

12. *longifolia*, fol. oblongo-lanceolatis obliquis venosissimis: marginesubrevoluto, pedunc. corymbosis. Flor. Per. l. c. t. 150. In Peruviae nemoribus. Bacca 2-sperma. Symphyti habitus. h

13. *angustiflora*, foliis ovatis venosis acumine obliquo, pedunculis bifurcatis, cor. angustis. Flor. Per. 2. p. 25. t. 151. f. a. Cum priore. Bacca alba, 2-sperma, Glabra, suffruticosa.

14. *virgata*, fol. ovato-oblongis subundulatis hispidulis integerrimis, pedunculis terminalibus subdichotomis. Flor. Per. l. c. t. 150. Spic. revolutæ.

15. *mutabilis*, foliis ovatis integerrimis scabris, spicis cymosis brevibus, cor. lobis crenulatis. Vent. choix de Plant. p. 3. t. 3. Habit. in Jamaica.

16. *argentea*, fol. ovatis obtusis tomentoso-sericeis, spicis terminalibus compositis. Lin. suppl. 133. Rumph. 4. t. 55. Habit. ad littora maris Zeylanici. Truncus brevissimus, cortice fisso. h

17. *sericea*, fol. ovato-lanceolatis subtus tomentosis sericeis, spicis lateralibus terminalibusque dichotomo-paniculatis. Vahl. eclog. I. p. 17. Hab. in insula Monferrat. h

18. *suffruticosa*, (*incana*), fol. sublan- ceolatis incanis undulatis, caul. suffruticoso spicis ramosis laxis. Lam. ill. p. 417. Hab. in Jamaica. Plures dantur suffruticosæ. h

367. *CORDIA*. Cor. infundibuliformis. *Stylus* dichotomus. *Drupa* nuce 2-loculari.

1. *Myxa*, fol. ovatis supra glabris, corymbis lateralibus, calycibus decemstriatis. Lin. Willd. sp. 2. p. 1072. Pluck. alm. 306. t. 217. f. 3. Hab. in Aegypto, Malabar. Folia Alni. h

2. *rotundifolia*, foliis subrotundis crenatis scabris, pedunc. corymboso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 148. f. a. Hab. passim in Limæ arenosis. Cal. striatus.

3. *obliqua*, fol. integerrimis subrotundo-

cordatis nervoso-venosis obliquis. Willd. phytos. 1. p. 4. f. 1. Hab. in India orientali. Calyx non striatus. An prioris varietas?

4. *monica*, fol. subrotundo-ovatis densatis venosis scabris, corymbis axillaribus monicis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 43. t. 58. Hab. in sylvis Indiae. An potius polygama? h

5. *spinescens*, fol. ovatis acutis serratis scabris, petiolis subspinescentibus. Mant. 206. Hab. in India orientali. Rami tomentosi, ferruginei. h

6. *Sebestena*, foliis oblongo-ovatis repandis, scabris s. Jacq. am. ed. 2. t. 44. And. t. 157. *Sebestena* scabra flore miniatu crispo. Dill. elth. 341. t. 255. f. 331. Hab. in Ind. h

7. *aspera*, fol. ovatis acuminatis asperis, floribus cymosis rugosis. Forst. prod. n. 109. Habit. in insula Tongatabu. h

8. *dichotoma*, fol. oblongo-ovatis vix crenatis, corymbis dichotomis. Forst. prod. n. 110. Hab. in N. Caledonia. h

9. *Gerascanthus*, fol. lanceolato-ovatis scabris, panicula terminali, calycibus decemstriatis. Jacq. amer. t. 175. f. 16. Brown. jam. 170. t. 29. f. 3. Hab. in Jamaicae sylvis. An species *Cerdana* cum n. 1? h

10. *flavescens*, fol. oblongis acuminatis reticulato-venosis glabris, racemis axillaribus. Willd. Fructus viridi-flavescens cerasiforme. Aubl. guj. 1. p. 226. t. 89. In sylvis Gujanae et Cajennae ad margines pratorum. h

11. *Toqueva*, fol. cordatis acuminatis villosis, flor. racemosis. Aubl. guj. 1. p. 228. t. 90. Hab. in sylvis Gujanae. h

12. *macrophylla*, foliis ovatis villosis sesquipetalibus. Mill. dict. 3. Sloan. jam. 184. hist. 2. p. 130. t. 221. f. 1. Hab. in Jamaica. h

13. *micranthus*, fol. ellipticis acutis integris membranaceis venosis, racemis compositis laxis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 460. In Jamaicae sylvis montium. h

14. *elliptica*, fol. oblongis apice attenuatis integris subcoriaceis, racemis compositis diffusis, drupis acuminatis. Swartz. l. c. p. 461. Hab. in Jamaica, Dominica. h

15. *Collococca*, fol. oblongo-ovatis integerrimis, florib. corymbosis, calycibus interne tomentosis. Sloan. hist. 2. t. 203. f. 2. Pluck. phyt. t. 158. f. 1. Hab. in Jamaica. h

16. *hirsuta*, fol. oblongis utrinque attenuatis pubescentibus, caule pedunculisque

corymbosis terminalibus axillaribusque birsutis. Willd. p. 1076. Aubl. guj. 1. p. 219. t. 86. Hab. in sylvis Cajennae et Gujanae. h

17. *tetrandra*, foliis ovatis acutis, basi inaequaliter cordatis subius scabris, cyma terminali, floribus tetrandris. Willd. Fructus albo tetrapireno. Aubl. In Gujana ad fluviorum ripas. h

18. *tetraphylla*, fol. quaternis obovatis integerrimis glabris, pedunc. lateralibus multiflor. Willd. C. fol. verticillatis, fructu olivaeformi. Aubl. 1. p. 224. t. 88. Hab. in maritimis Gujanae. h

368. PATAGONULA. *Cor.* rotata. *Stylus* dichotomus. *Cal.* fructifer maximus. *Sem.* . .

1. *americana*. Lin. Dill. elth. t. 226. f. 293. Lam. ill. t. 96. *Cordia* Patagonula. Ait. Willd. sp. p. 1076. Hab. in Patagonia. A *Cordia* differt calyce et forte fructu.

369. MENAIS. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* hypocrateriformis. *Bacca* 4-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *topiaria*. Lin. Hab. in America meridionali. Fol. ovata, integra. An *Ehretiae* species? h

370. EHRETIA. *Cor.* tubulosa. *Drupa* 2-locularis. *Nuces* solitariae, 2-loculares. *Stigma* emarginatum.

1. *tinifolia*, fol. oblongo-ovatis integerrimis glabris, flor. paniculatis. Amoen. acad. 5. p. 595. Willd. sp. 2. p. 1077. Lam. ill. t. 96. Trew. Ehret. t. 24. Hab. in Jamaica. h

2. *aspera*, fol. ovatis scaberrimis, flor. corymboso-spicatis secundis. Willd. phyt. 1. p. 4. t. 2. f. 1. Roxb. corom. 1. p. 41. t. 55. Hab. in rupestribus siccis Indiae. Medium tenet inter *Ehretias* et *Tournefortias*, et cum *Cordiis* stigmate convenit. Willd. h

3. *laevis*, fol. ovatis glabris, flor. lateralibus corymboso-spicatis secundis divaricatis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 42. t. 56. Habit. in montibus Circarensibus Indiae. Simillima praecedenti. W. h

4. *internodis*, fol. oblongo-ovatis glabris, paniculis infrafoliaceis. Willd. l'Her. stirp. 1. p. 47. t. 24. E. petiolaris. Lam. In rupibus insulae Mauriit. Corolla campanulata. h

5. *spinosa*, spinosa. Jacq. amer. 46. t. 80. f. 18. Hab. in America. h

6. *Sourreria*, foliis ovatis integerrimis laevibus, flor. subcorymbosis, calycibus glabris. Linn. *Beurreria succulenta*. Jacq. Brown. jam. 168. t. 15. f. 2. In Jamaica. *Beurreria* affinitate jungit Ehretias cum Cordiis. h

7. *virgata*, fol. oblongis integris superne scabris, ramis filiformibus, pedunc. terminalibus sparsis unifloris, calycibus hirsutis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 463. In desertis Hispaniolae. h

8. *exsucca*, fol. cuneiformi-lanceolatis margine reflexis. Lin. *Beurreria exsucca* fructibus exsuccis quadrisdis. Jacq. amer. 45. t. 173. f. 17. Hab. in Amer. merid. h

9. *microphylla*, fol. cuneiformibus obtusis, superne scabris punctatis, pedunc. brevibus axillaribus subunifloris. Lam. ill. p. 425. Pluck. t. 37. f. 1. Hab. in India. h

10. *buxifolia*, fol. fasciculatis obovatis calloso-punctatis, apice subtridentatis, pedunc. multifloris. Willd. Roxb. corom. 1. p. 42. t. 37. *Cordia retusa*. Vahl. symb. 2. p. 42. Hab. in India orientali. h

371. VARRONIA. *Cal.* campanulatus 5-dentatus. *Cor.* tubulosa cal. paullo longior: ore patente crenato-plicato. *Styl.* dichotomus. *Stigma* 4. *Drupa* ovata 1-locularis (4-locular. Linn.), 1-sperma. Flor. Per. 2. p. 22.

1. *crenata*, fol. ovato-subrotundis crenatis rugosis, pedunculis lateralibus, flor. capitis. Fl. Per. l. c. t. 146. f. 6. Habit. in Peruviae petrosis et argillosis. *Lantanae* forma. h

* *parviflora*, fol. ovato-oblongis serratis, pedunc. oppositifoliis alternantibusque, spicis globosis. Orteg. Dec. plant. p. 86. In N. Hispania et Peruvia. An una ex enumeratis Peruviae speciebus?

2. *lineata*, fol. lanceolatis lineatis, pedunculis lateralibus petiolo adnatis, spicis globosis. Amoen. acad. 5. p. 394. Willd. sp. 2. p. 1073. Brown. jam. t. 13. f. 2. Pluck. alm. t. 328. f. 5. Hab. in America. h

3. *bullata*, fol. ovatis venoso-rugosis, spicis globosis. Linn. l. c. Swartz. obs. 88. Hab. in Jamaicae fruticetis aridis. h

4. *globosa*, foliis lanceolato-oblongis, caule dichotomo, pedunc. axillaribus elongatis nudis, spicis globosis. Hab. in Amer. Varietas V. bullata? Swartz. obs. 88. h

5. *geniculata*, (*mirabil.* Jacq.), fol. ovatis rugosis serratis, floribus racemosis secundis,

corollis hypocrateriformibus. Swartz. prod. p. 465. Jacq. amer. 41. t. 33. Tournefortia serrata. Lin. vid. Lam. ill. 418. Hab. in fruticetis et petrosis graminosis Hispaniolae. Pedic. geniculati. h

6. *martinicensis*, foliis ovatis acuminatis, spicis oblongis. Jacq. amer. 41. t. 32. Hab. in Martinica. A V. curassavica non diversa. Swartz. obs. p. 89. h

7. *curassavica*, fol. lanceolatis, spicis oblongis. Jacq. amer. ed. a. p. 25. Swartz. obs. 88. In Jamaicae fruticetis, pascuis. h

8. *dichotoma*, foliis ovato-lanceolatis acutis sursum serratis, pedunc. umbellatisque spicatis. Flor. Per. l. c. f. a. Copiose in Per. ruderalis etc. *Drupa* coccinea. h

9. *obliqua*, foliis ovatis acutis oblique obtuse serratis, pedunculis ramcatis, spicis oblongis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 147. f. a. In Peruviae praeruptis. Flor. densi sessiles. h

10. *cytindristachya*, fol. ovatis acutis dense serratis rugosis, spicis longis supra-axillaribus et terminalibus. Flor. Per. p. 23. t. 147. f. a. (*macrostachya*) Cresc. in Peruviae saepibus. *Drupa* calyce involuta, alba. h

11. *ferruginea*, fol. ovatis dentatis subtus tomentosis, pedunc. lateralibus, spic. oblongis. Lam. ill. p. 418. Hab. in America. h

12. *angustifolia*, fol. linearibus scabris subdentatis obtusis, spicis linearibus oblongis. Willd. p. 1081. Hab. in insula St. Crucis. Fol. inferne tomentosa.

13. *alba*, fol. cordatis, florib. cymosis. Jacq. amer. ed. picta. p. 26. Hab. in America. h

14. *monosperma*, fol. ovato-lanceolatis, spicis subrotundis, nuce 1-loculari. Jacq. Sevenbr. 1. p. 18. t. 39. Habit. ad Caracas. h

372. CERCIDANA. *Cal.* tubulosus, 10-striatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5-partito. *Nectar.* cyathiforme, germen ambiens. *Stigm.* 2, bifida.

1. *alliadora*, fol. oblongis ovatisque, flor. paniculatis. Flor. Per. p. 47. t. 184. In Peruvia, in nemoribus Potuzo et Munna. Arbor excelsa, cujus cortex, recenter evulsus, odorem foetidum spirat, deinde vero, uti et folia, allium redolet. Fol. saepissime a Formicis exiguis devorantur. l. c.

+++ *Asperifoliae fructu capsulari.*

373. ALDEA. *Cor.* campanulata. *Styl.* bifidus. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, 2-sperma, cal. 5-partito involuta. (Genitalia longe exserta.)

1. *pinnata*, fol. pinnatis, superioribus simplicibus. Flor. Per. 2. p. 8. t. 14. Hab. in Chile et Peruvia. Filam. hirsuta. Spicae recurvatae. Sequenti generi affinis.

374. PHACELIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* subcampanulata, 5-fida. *Stam.* exserta. *Caps.* 2-locul., 2-valvis, 4-sperma.

1. *bipinnatifida*, (simplex), erecta, fol. pinnatifidis: lacin. inciso-lobatis, spicis utplurimum bifidis, corollae lobis margine simplicibus. Michaux, Flor. 1. p. 134. t. 16. Hab. in sylvis occidentilibus montium Alleghanis.

2. *imbriata*, assurgens, foliis pinnatifidis: lacinis integris, spica solitaria, cor. lobis ciliato-fimbriatis. Michaux l. c. Pluck. t. 245. f. 5. Cresc. in Carolinae montibus altis.

375. HYDROPHYLLUM. *Cor.* campanulata, interne striis 5 melliferis. *Stigm.* 2-fidum. *Caps.* glohosa, 2-valvis.

1. *magellanicum*, tomentoso-lanuginosum, fol. pinnatis. Lam. in Journ. d'hist. nat. n.º. 10. p. 373 t. 19. Valerianam refert. ¶

2. *appendiculatum*, hirsutum, foliis radicalibus subpinnatifidis: caulinis sublobato-angulosis, calycis sinibus appendiculatis. Michaux Flor. 1. p. 134. Hab. in sylv. montanis Tenassée. Cor. caerulea.

3. *virginicum*, fol. pinnatifidis pinnatisque: lacinis ovali-lanceolatis incis. Lin. Lam. ill. t. 97. f. 1. Hab. in Carolinae et Virginiae sylvis montanis. ¶

4. *canadense*, glabrescens, fol. lobato-angulosis. Lin. Lam. l. c. t. 97. f. 2. In Canadae sylvis humilis. ¶

376. ELLISIA. *Cor.* infundibuliformis angusta. *Bacca* sicca, 2-locularis, 2-valvis. *Sem.* 2 punctata: altero super alterum.

1. *Nyctelea*. Hab. in Virginia. Fol. pinnatifida.

377. NOLANA. *Cal.* 5-fidus: laciniiis latis. *Cor.* campanulata. *Stigm.* capitatum subpentagonum. *Sem.* 5, recept. caruoso coalita, arillata?

1. *prostrata*, (gallinacea), caule prostrato, fol. ovato-oblongis, cal. laciniiis triangulari-sagittatis. Fl. Per. 2. p. 6. L. sp. pl. ed. Willd. p. 794. Schmidel ic. t. 18. Hab. sponte in Peruviae maritimis arenosis. Cibus gallinis jucundus. ☉

2. *coronata*, caule prostrato, calycis laciniiis subcordatis. cor. fauce villosa. Flor. Per. l. c. t. 112. f. b. Hab. in Peruviae saxosis collibus. Faux villis pulchre coronata. Caul. pubescens. ☉

3. *spathulata*, caule erecto, fol. cordato-triangularibus, calyc. laciniiis spathulatis. Flor. Per. t. 113. f. a. Cum priore Cal. in fructu bipartitus. Fol. carnosa.

4. *inflata*, caule prostrato, fol. radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis, calyc. inflatis. Flor. Per. t. 112. f. a. In Camanae collibus arenosis.

5. *revoluta*, caule procumbente, foliis confertis linearibus margine revolutis, cal. ventricosus. Flor. Per. 2. p. 8. t. 113. f. b. Cresc. in Peruviae arenosis.

Obs. Nolanae, dicunt auctores laudati operis, plantae sunt succosae, inferne ramosissimae, unica specie excepta, prostratae, habitu solanaceae, fructu vero diversae, cujus nuculae epilermiae succulenta oblectae, quadriloculares sunt: locul. 1-3 vero saepe abortientibus.

LYSIMACHIAE. Juss. (gen. 378-396.)
Cor. regulares: limbo saepius 5-lobo. *Stam.* rarius plura aut pauciora quam 5. *Caps.* 1-locularis, polysperma: placenta centrali libera. Caulis herbaceus. Fol. opposita aut alterna.

378. ARETIA. *Cor.* hypocraterif. 5-fida: tubo ovato. *Stigm.* depresso-capitatum. *Caps.* 1-locularis, glohosa, 5-valvis, subpentasperma.

1. *helvetica*, fol. imbricatis, floribus subsessilibus. L. Willd. sp. 2. p. 795. Diapensia helvetica. Sp. pl. 2. p. 203. Aretia fol. subhirsutis, ovatis, cauliculis tegentibus. Hall. helv. n.º 617. t. 11. Androsace Dia-

pensia. Vill. Delph. 2. p. 472. Hab. in alp. Helvetiae, Galliae, in petrosis aridis. ☞

2. *alpina*, foliis linearibus patentibus, florib. pedunc. L. Jacq. aust. 5. t. 18. Androsace alpina. Lam. ill. t. 98. f. 3. A. fol. ovatis repandis, scapis unifloris. Hall. helv. n. 618. t. 11. Hab. in Vallesia et Delphinatu. ☞

3. *Vitaliana*, fol. linearibus recurvatis, flor. subsessilibus: tubo elongato. Primula Vitaliana. Vill. Dauph. 2. p. 470. Habit. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis, et Italicis. ☞

Obs. Primulae flor. lutei, Aretiae folia pilis ramosis et caps. 5-valvis ei adsunt.

379. ANDROSACE. *Involucrum* umbellulæ. *Cor.* tubus ovatus: ore glanduloso. *Caps.* 1-locularis, ovato-globosa, 5-fariam dehiscentis, polysperma.

1. *maxima*, fol. ovatis dentatis, perianthiis fructuum maximis. Lin. Jacq. aust. t. 331. Willd. sp. p. 796. Lam. ill. t. 93. f. 1. Hab. inter Germaniae, Austriae, Helvetiae segetes. ☉

2. *elongata*, glabra, foliis lanceolatis dentatis, umbellae fructifera elongata, cor. calyce angulato brevioribus. Retz. obs. 2. p. 10. Jacq. aust. 4. t. 330. Folia cinerea. Hab. in Austria, Germania. ☉

3. *filiformis*, fol. ovatis dentatis petiolatis, umbellae radiis capillariis, corollis calycem campanulatum excedentibus. Retz. obs. 2. p. 10. Gmel. sib. 4. p. 81. t. 44. f. 4. Hab. in Sibiria. ☉

4. *septentrionalis*, fol. lanceolatis dentatis glabris lucidis, perianthiis angulatis cor. brevioribus. Gmel. l. c. t. 43. f. 1. Flor. dan. t. 7. Roth. germ. II. 232. Vill. Delph. 2. p. 481. In alpinis Lapponiae, Russiae, Galliae, Germaniae. Var. fol. subpinnatis in locis fertilibus. Vill. ☉

5. *odoratissima*, fol. triquetris lanceolatis ciliatis, umbellae radiis brevibus, perianthiis angulatis corolla brevioribus. W. l. c. Schreber. Dec. p. 7. t. 4. Hab. in Capadociae alpinis. ☞

6. *villosa*, fol. ovato-lanceolatis ciliatis, pedunc. brevissimis, cor. calyce majore. Hoppe. A. fol. pilosis, perianthiis hirsutis. Lin. Jacq. Flor. aust. 4. t. 332. Ej. coll. 1. p. 163. Hab. in alpinis Rheticiis, Pyrenaeis et Carniolicis. ☞

7. *Chamaejasme*, hirta, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc. brevissimis, corollis

calyce majoribus. Hoppe. v. Wulf. in Jacq. coll. 1. p. 194. In Carniolicis alpinis.

8. *lactea*, glabra, fol. linearibus integerrimis, pedunc. longissimis, cor. calyce majoribus. Hoppe. Jacq. austr. 4. t. 333. A. pauciflora. Vill. Delph. p. 477? Habit. in Austria, Helvetiae et Galliae alpinis.

9. *obtusifolia*, foliis lanceolatis basi angustatis glabris, perianthiis angulatis pubescentibus. W. Allion. pedem. n. 326. t. 46. f. 1. Aretia foliis ellipticis lanceolatis glabris, scapis umbellatis. Hall. ☞ ? *brevifolia*, fol. petiolatis lanceolatis hispidis, pedunc. involucri quadruplo longioribus. Vill. Delph. 2. p. 480. t. 15. Hab. in Helvetiae, Italiae, Galliae, Styriae alpinis. Planta Villarsii est sola varietas. ☉

10. *carnea*, fol. subulatis glabris, umbella involucri aequante. Lin. Pluck. alm. 332. t. 108. f. 5. ☞. Aretia Halleri, fol. ciliatis. Lin. sp. pl. 1. p. 142. Hab. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis. ☞

11 ? *spatulata*, fol. caespitosissimis spatulatis, flor. corymboso-racemosis. Cav. ic. 5. p. 56. t. 484. f. 1. Habit. in Americae meridionalis humilis.

Obs. Cor. carneo-rubens, absque glandulis in fauce, nec involucrum infra flores adest secundum auctorem, qui cum Villarsio et Lamarkio *Androsacen* et *Aretiam* in unum conjungit genus.

380. PRIMULA. *Involucr.* umbellulæ. *Cor.* tubus cylindricus: ore patulo; limbo emarginato. *Stigm.* globosum. *Caps.* 1-locularis: ore 10-fido.

1. *verticillata*, foliis serratis glabris: floribus verticillatis. Vahl. symb. 1. p. 15. t. 5. Hab. in monte Kurma ad rivulos. ☞

2. *veris*, (*officinalis*), foliis rugosis dentatis, limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo. Flor. dan. t. 433. Bull. t. 171. Engl. bot. t. 5. Habit. in fruticetis argillosis. Corolla odorata. Cal. inflatus.

3. *elatior*, fol. rugosis dentatis hirsutis, limbo corollae plano, tubi collo hemisphaerico, floribus interioribus nutantibus. Jacq. misc. 1. p. 158. Fl. dan. t. 434. Engl. bot. t. 513. Hab. in sylvis. Fl. pallide lutei.

4. *acaulis*, fol. rugosis dentatis, subtus hirsutis, scapis unifloris. Jacq. misc. 1. p. 158. Fl. dan. t. 164. Curt. Fl. lond. ic. P. vulgaris. Smith. brit. 1. p. 222. Primula sylvestris. Scop. P. grandiflora. Lam. Cresc. in nemoribus, sepibus.

5. *farinosa*, fol. rugosis crenatis-gla-

bris, subtus farinosis, umbella erecta. Jacq. misc. 1. p. 159. Flor. dan. t. 125. Curt. Lond. ic. Hab. in alpinis et in pratis uliginosis Germaniae, Sueciae, Gallicae. $\overline{\text{T}}$

6. *Cortusoides*, foliis rugosis lobatis, scapo multifloro. Andrew. t. 7. Gmel. sib. 4. p. 85. t. 45. f. 1. Habit. in Sibiria. Corolla rubra. Folia Cortusae. $\overline{\text{T}}$

7. *villosa*, foliis planis serrulatis hirsutis, Jacq. l. c. 1. p. 159. Ej. Flor. Aust. 5. app. t. 27. Curt. mag. 1. 14. P. foliis subhirsutis dentatis, scapo paucifloro. Hall. hist. n.º 613. β . pubescens, foliis planis serrulatis subvillosis. Jacq. misc. 1. p. 157. t. 18. f. 2. Hab. in alpinis Carinthiae, Helvetiae. $\overline{\text{T}}$

8. *nivalis*, foliis lanceolatis planis argute dentatis glaberrimis. Willd. sp. p. 803. Pall. it. 3. app. n.º 81. t. 9. f. 2. Hab. in alpinis Davuriae ad scaturigines frigidissimas. $\overline{\text{T}}$

9. *longiflora*, foliis serratis glabris, subtus farinosis, umbella nutante, corol. tubo longissimo. Jacq. Fl. aust. 5. app. t. 46. Allion. pedem. t. 39. f. 3. Habit. in alpinis. $\overline{\text{T}}$

10. *glutinosa*, foliis serrulatis glabris glutinosis, involucri foliolis maximis. Jacq. Fl. aust. 5. app. t. 26. Puck. phyt. t. 149. f. 6. Hab. in summis alpinis. Odor Orchidis conspicuae. $\overline{\text{T}}$

11. *marginata*, foliis obovatis serrato-dentatis albo marginatis, scapo multifloro, involucri foliolis pedunculatis brevioribus. Curt. mag. 131. Hab. in alpinis Helvetiae. $\overline{\text{T}}$

12. *Auricula*, foliis serratis carnosius obovatis, scapo multifloro, calycibus subfarinosis. Jacq. aust. t. 405. Hab. in alpinis. Color genivus luteus, qui cultura tam varius et pulcher factus est.

* *lutea*, foliis spatulato-subrotundis integerrimis, tubo floris calyce angustiore. Villars 2 p. 469. cal. brevi subfarinaceo. Lam. ill. p. 429. Hab. in Galliae et Helvetiae alpinis.

13. *longifolia*, foliis oblongo-obovatis denticulatis, involucri foliolis basi auriculatis. Curt. mag. t. 392. P. auriculata. Lam. ill. p. 429. Ventenat. hort. Cels p. 42. t. 40. Hab. in Oriente. Scapus apice farinosus. Lam. Corolla intus citrina. V.

14. *gigantea*, foliis serratis glabris rhombico-ovatis, scapo paucifloro alussimo. Jacq. misc. 9. p. 160. Gmel. sib. 4. p. 84. Hab. in Sibiria. $\overline{\text{T}}$

15. *minima*, foliis glaberrimis nitidis

cuneiformibus argute serratis, scapo paucifloro. Jacq. l. c. Flor. aust. t. 273. Hab. in alpinis. Corolla carnea. $\overline{\text{T}}$

16. *integrifolia*, foliis integerrimis ellipticis, ad oras subcrenato-cartilagineis, umbella erecta, calycibus longe tubulosis obtusissimis. Jacq. Flor. aust. t. 327. Habit. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis, Austriacis, Styriacis, Carniolicis. $\overline{\text{T}}$

17. *carniolica*, foliis integerrimis ellipticis, umbella erecta, calycibus acutis brevissimis. Jacq. l. c. Fl. aust. 3. app. t. 4. In Carniolia. Folia mariae non cartilaginea. Calyces abbreviati. Willd. $\overline{\text{T}}$

18. *norvegica*, foliis integerrimis ovatis glabris petiolatis, floribus infundibuliformibus, calycibus tubulosis obtusis. Retz. scand. n. 229. Flor. dan. t. 188. P. finmarctica. Jacq. Willd. p. 806. Hab. in alpinis Norvegiae. $\overline{\text{T}}$

19. *viscosa*, foliis ovatis integerrimis villosis-viscosis, umbella erecta, cor. hypocrateriformibus. Willd. l. c. Allion. pedem. n.º 338. t. 5. f. 1. Hab. in alpinis Pedemontanis. $\overline{\text{T}}$

20. *sibirica*, foliis integerrimis ovatis longe petiolatis, umbella pauciflora nutante, cor. hypocrateriformi. Jacq. misc. 1. p. 161. Gmel. sib. 4. p. 81. t. 46. f. 1. Hab. in pratis humilioribus Sibiriae. $\overline{\text{T}}$

381. **CORTUSA.** Cor. rotata, tubo subnullo, fauce annulo elevato, lacini ovatis acutis. Caps. 1-locularis, ovalis, apice 5-valvis.

1. *Mathioli*, calycibus corolla brevioribus. L. Jacq. ic. t. 32. Andrew. t. 1. In alpinis Austriae, Sibiriae, Silesiae. $\overline{\text{T}}$

2. *Gmelini*, calycibus corollam excedentibus. Lin. Moen. 2. p. 340. Gmel. sib. 4. p. 79. t. 43. f. 1. Lam. ill. t. 99. f. 2. Hab. in Sibiria. $\overline{\text{T}}$

382. **SOLDANELLA.** Cor. campanulata, laceris-multifida. Caps. 1-locularis, apice multidentata.

1. *alpina*. Jacq. aust. t. 13. Curt. mag. t. 49. S. foliis reniformibus sublobatis. Sch. bohem. 1. 2. n. 147. β . Clusii, fol. reniformibus integerrimis. Schmidt. bohem. 1. n. 148. Hab. in alpinis. $\overline{\text{T}}$

383. **DODECATHEON.** Cor. rotata, reflexa. Stam. tubo insidentia. Caps. 1-locularis, oblonga.

1. *Meadia*, foliis oblongo-ovalibus den-

rato-repandis, umbellis multifloris laxis, bracteis ovalibus. Michaux Flor. 1. p. 123. Trew. Ehret. t. 12. Meadia. Catesb. car. 3. t. 1. Hab. in Virginia. ¶

2. *integrifolium*, fol. subspathulatis integerrimis, umbellis paucifloris strictis, bracteis linearibus. Michaux, l. c. Pluck. alm. t. 79. f. 6. In montibus Alleghanis juxta rivulos sylvaticos.

384. CYCLAMEN. *Cor.* rotata, reflexa, tubo brevissimo: fauce prominente. *Bacca* tecta capsula.

1. *colum*, fol. orbiculatis cordatis integerrimis. Aiton. Kew. 1. p. 195. Curt. mag. t. 4. Hab. in Europa australi. ¶

2. *europaeum*, fol. orbiculatis cordatis crenatis. Ait. p. 196. Jacq. aust. 5. p. 1. t. 401. Engl. bot. t. 217. Hab. in Silesiae, Bohemiae, Austriae, Barbariae sylvis umbrosis montosis. Rad. tuberosa magna. Scapi, germine impraegnato, spiritaliter contorquentur fructumque in terra recondunt. Smith.

3. *persicum*, foliis oblongo-ovatis cordatis crenatis. Aiton. l. c. Curt. mag. t. 44. In insula Cypro. ¶

4. *hederaefolium*, foliis cordatis angulatis denticulatis. Aiton. l. c. Lob. ic. 605. Swert. florileg. t. 59. Hab. in Italia. ¶

5. *indicum*, corollae limbo nutante. In Zeylona. ¶

385. MENYANTHES. *Cor.* hirsuta. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* 1-locularis, (in Plaut. emersis 2-valvis: valvul. medio placenteris; in natantibus ruptilis. Michaux.)

1. *nymphoides*, foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. L. Flor. dan. t. 319. Waldschmidia nymphoides. Corolla 5-fida. Glandul. ad basin germinis. Pepo 1-locularis. Semina ciliata. Hayne in Schr. bot. Journ. 1800. p. 14. Hab. in Europae australioris aquis stagnantibus, fossis majoribus. ¶

2. *trachysperma*, cor. glabra, laciniis integris, stylo subnullo, seminibus vesiculososis scabris. Michaux, p. 126. Villarsia aquatica. Gmel. S. N. Lin. 2. p. 447. Vent. Choix des Plant. p. 9. Habit. in America boreali. An distinctum genus?

3. *ovata*, fol. ovatis petiolatis, caule paniculato. Lin. suppl. Houttuyn t. 47 f. 1. Vent. l. c. t. 9. Hab. in aquis Cap. b. spei. ¶

4. *indica*, fol. cordatis subcrenatis, petiolis floriferis, corollis interne pilosis. L. Sloan. Cat. 121. hist. t. 252. Rumph. 6. t. 72. f. 3. Hab. in Malabarica, Zeylona, Cap. b. spei, Jamaicae fossis. ¶

5. *trifoliata*, corollis superne dense barbatis, foliis ternatis. Flor. dan. t. 541. Curt. Lond. ic. Engl. bot. t. 495. β. minor. Mich. Flor. 1. p. 125. Hab. in Europae et Americ. aquis et palustribus. Fl. Hyacinthoides. ¶

386. HOTTONIA. *Cor.* hypocrateriformis. *Stamina* tubo corollae imposita. *Stigm.* globosum. *Caps.* 1-locularis.

1. *palustris*, flor. verticillatis pedunculatis. Willd. Sp. p. 812. Flor. dan. t. 487. Hab. in fossis. ¶

2. *sessiliflora*, flor. verticillatis sessilibus. Vahl. symbol. 2. p. 36. Hab. in India.

3. *indica*, pedunculis axillaribus solitariis, fol. multifidis Pet. gaz. Erica africana equiseti folio. Seb. mus. 2. t. 37. f. 5. Burm. zeyl. t. 55. f. 1. Rheed. 12. t. 36. Habit. in India.

4. *serrata*, pedunc. axillaribus solitariis, foliis lanceolatis tenuissime serratis. Willd. sp. a. 814. Hab. in India. Caulis subramosus. V.

387. CORIS. *Cal.* ventricosus: dentibus subspinosus. *Cor.* 1-petala, irregularis. *Caps.* 5-valvis, calyce cincta. *Sem.* plurima.

1. *mo-speliensis*, Linn. Willd. 2. p. 1000. Vill. 2. p. 464. Lam. ill. t. 202. Hab. in Europae australis maritimis. *Cor.* purpurea. Fol. (superiora) spinulosa. Var. foliis omnibus denticulato-spinosis, vid. Lam. ill. t. 202. An species distincta?

388. SAMOLUS. *Cor.* hypocrateriformis, 5-fida squamis interstincta. *S. am.* tubo inserta. *Caps.* seminifera, 1-locularis, 5-dentata, polysperma.

1. *Valerandi*, caule erecto, fol. obtusis, racemo multifloro. Smith. brit. 1. p. 259. Flor. dan. t. 198. Curt. Lond. ic. Hab. in paludosis, maritimis, locis salsosis per omnem terrarum orbem. ¶

2. *repens*, parvula repens. Sheffieldia repens. Lin. suppl. p. 135. Forst. gen. p. 18. t. 9. Willd. sp. p. 833. Hab. in N. Zealand. et insula Paschatia. Pepl. Portulacae similis. ¶

389. *LYSIMACHIA*. *Cor.* rotata. *Caps.* globosa, mucronata, 10-valvis. (Filam. in quibusdam basi connata.)

* *Pedunculis racemosis.*

1. *vulgaris*, foliis ternis ovatis lanceolatis, racemis terminalibus. Flor. dan. t. 689. Curt. Lond. ic. Willd. sp. 1. p. 816. Hab. ad ripas et paludes. Var. fol. 4. \mathcal{T}

2. *decurrens*, racemis simplicibus terminalibus, corollae segmentis obtusis, staminibus corolla longioribus. Forst. prod. n.º 65. Hab. in insula Tanna.

3. *Ephemerum*, racemis terminalibus, petalis obovatis patulis, fol. lineari-lanceolatis sessilibus. Ant. Kew. 1. p. 198. Murr. Comment. goett. 1782. p. 9. t. 2. Till. pis. 106. t. 42. f. 2. Hab. in Media, Sibiria. Differt a sequente foliis subtus fusco-punctatis. \odot

4. *atropurpurea*, spicis terminalibus, petalis lanceolatis, staminibus corolla longioribus. L. Comm. rar. 33. t. 33. Hab. in Oriente. \odot

5. *dubia*, racemis terminalibus, petalis connatis, stam. corolla brevioribus, fol. lanceolatis petiolatis. Ait. Kew. 1. p. 199. *Lysimachia atropurpurea*. Murr. l. c. p. 6. t. 1. Buxb. cent. 1. t. 33. Cum priore. \odot

6. *angustifolia*, glaberrima ramulosa, fol. oppositis verticillatisque longo-linearibus, punctatis, racemo terminali brevi, petalis oblongis. Michaux Flor. 1. p. 128. L. stricta. Ait. Willd. sp. 2. p. 818? Hab. in Carolina inferiore?

7. *raceosa*, glaberrima elata, foliis ovali-lanceolatis oppositis punctatis, racemo terminali longissimo laxo, petalis oblongo-ovalibus. Michaux, Lam. ill. p. Pluck. Amalth. t. 48. f. 4? Hab. in New-York. Cor. uti in priore flava. \mathcal{T}

8. *thyrsiflora*, racemis lateralibus pedunculatis. L. Flor. dan. t. 517. Naumburgia guttata. Moench. meth. suppl. p. 23. ob stam. libera. Hab. in Eur. borealis paludib. inque alpibus australioris, et America? cfr. Michaux, Flor. p. 127. \mathcal{T}

* *Pedunculis unifloris.*

9. *quadrifolia*, foliis quaternis petiolo ciliatis, pedunc. quaternis unifloris. L. Pet. Gaz. 5. t. 2. f. 5. β ? *hirsuta*, caule hirsuto, foliis subsessilibus 3-4-nis oppositisque ovalibus punctatis, pedunc. 4-nis, petalis integris. Michaux, Flor. 1. p. 127. Hab. in Canada. β . in Carolina.

10. *ciliata*, foliis petiolatis subcordato-ovalibus margine subpullescentibus; petiolo ciliato, flor. cernuis, pedicel. subgeminis, petalis rotundatis crenulatis. Michaux, Flor. 1. p. 126. Willd. sp. 2. 819. Wach. hort. t. 12. Hab. in New-York et Connecticut.

11. *hybrida*, glabra, fol. oppositis longe petiolatis lanceolatis, petiolo ciliato, flor. cernuis, petalis crenulatis. Michaux p. 127. L. *angustifolia*, foliis lineari-lanceolatis basi ciliatis, ped. nec filiformibus 1-2-oris, cor. dentatis. Willd. in N. Act. Soc. Berol. v. 3? Hab. in Carolina, Pennsylvania.

12. *heterophylla*, gracilis, foliis oppositis, imis suborbiculatis breviter petiolatis; superioribus linearibus sessilibus basi subciliatis, flor. cernuis. Michaux l. c. Hab. in Georgia.

13. *punctata*, fol. subquaternis subsessilibus, pedunc. verticillatis unifloris. Linn. Jacq. aust. t. 366. Habit. in Holland. inter arundines, et in Helvetia, Sibiria, Carniolia. Petala maculis fulvis punctata. \mathcal{T}

14? *Linum stellatum*, calyc. corollam superantibus, caule erecto ramo-issimo. L. Magn. Monsp. 161. t. 162. Hab. in Galliae et Italiae collibus Parva, 2-3-pollicaris. Cor. 5-fida. Fructus 5-valvis.

15. *nemorum*, fol. ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. Linn. Flor. dan. t. 174. Anagallis lutea nemorum. Bauh. Hab. in nemoribus roritis. Anagallidem refert: fol. subtus quoque punctata, sed caps. differt.

16. *japonica*, fol. subcordatis, floribus axillaribus subbinis, pedunc. folio brevioribus. Thunb. jap. p. 83. Habit. in Japonia. \odot

17. *Nummularia*, fol. subcordatis, flor. solitariis, caule repente. Lin. Flor. dan. t. 493. Hab. in pascuis humidis et in umbrosis. \mathcal{T}

390. *LUBINIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* hypocraterif. limbo plano 5-partito aequali. *Filam.* medio tubi adnata. *Stigm.* obtusum. *Caps.* 1-jocularis, polysperma, mucronata.

1. *spatulata*. Vent. Hort. Cels. p. 96. t. 96. *Lysimachia mauritiana*. Lam. Willd. p. 820. Hab. in insula Mauritiae. Habitu Conv. tricoloris. Folia alterna. Caps. non sponte dehiscit, sed compressione 2-4-valvis. Vent. 5-valvis. Lam. \mathcal{O}

391. *ANAGALLIS*. *Cor.* rotata. *Filam.* hirsuta. *Caps.* circumscissa.

1. *arvensis*, caule diffuso nudo, petalis integris planis margine pilis capitatis. A. *arvensis*. L. Willd. sp. 2. p. 821. A. mas. Vill. Dauph. 2. p. 461. Blackw. t. 43. Engl. bot. t. 529. In arvis.

2. *caerulea*, caule erectiusculo subalato, petalis dentatis demum reflexis. A. *caerulea*. Schreb. A. femina. Vill. Cresc. cum antecedente, sed minus frequens. Praeter color. caeruleum floris, caulibus super minus ramosus est. Folia sursum angustiora, subtus magis punctata.

3. *ovalis*, caule erecto, foliis ovalibus cum brevi acumine, floribus subsessilibus. Flor. Per. 2. p. 8. t. 115. f. a. Hab. in Peruviae collibus arenosis. Pusilla. Flores axillares. ☉

4. *alternifolia*, fol. oblongo-ovatis alternis, flor. axillaribus longe pedunculatis. Cav. ic. 6. pl. 3. t. 505. f. a. Hab. in humidis Concep. Chili. Fol. glauco-viridula venosa. In Gonorrhea a Chilensibus adhibetur. C.

5. *pumila*, caule erecto, fol. subrotundis acutis sessilibus. Swartz. ind. occid. 1. p. 345. Hab. in Jamaicae montibus altis, locis paludosis. ☉

6. *Monelli*, fol. lanceolatis, caule erecto, herbaceo. Schousb. Mar. p. 78. β? A. verticillata erecta, fol. caulibus verticillatis, axillis foliorum in caule et ramis florigeris. Allion. ped. n. 318. t. 85. f. 4. Hab. in Italia et Barbaria. Flor. coerul. ☉

7. *collina*, fol. lanceolatis, caule diffuso basi lignoso (fruticoso). Schousb. l. c. Hab. in Barbaria. Cor. phoeniceo.

β? *orientalis*, caule basi lignoso, flor. rubris. Similis *arvensis*, sed maior et perennis. Ad eadem ac *collina*? colitur apud Cels.

8. *latifolia*, fol. cordatis amplexicaulis, caule compresso. Lin. In Hispania. Cor. caerulea. Caulis erecto-patens, brachiatus, quadrangularis: angulis oppositis, triplo latioribus. L.

9. *linifolia*, fol. linearibus, caule erecto. L. Hab. in Lusitania, Hispania.

10. *tenella*, fol. subrotundis acutiusculis, caule repente. Linn. Curt. Lond. ic. Engl. bot. t. 510. Iraschia alpina. F. W. Schmidt. Obs. bot. in Usteri annal. bot. 2. p. 124. Hab. in Galliae, Angliae, Germaniae, Italiae ericetis humidis. ¶

11. *crassifolia*, caule repente stolonij-

fero, foliis subrotundis, pedunc. axillaribus. 1-floris. Thore chloris du Département des Landes. p. 62. Hab. prope Dax in uliginosis, turfosis. Cor. alba. Filam. hispida basi coalita. *Lysimachii* affinis.

392. *DORÆNA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala, 5-fida. *Stigma* emarginatum. *Caps.* supera, 1-locularis, 1-valvis, polysperma.

1. *japonica*. Thunb. jap. p. 84. Hab. in Japonia. Fol. oblonga, alterna. Flor. racemosi. h

393. *BACOPA*. *Cal.* 5-partitus inaequalis. *Cor.* rotata: tubo staminifero. *Stigma* capitatum. *Caps.* 1-locularis, polysperma.

1. *aquatica*. Aubl. Guian. p. 120. t. 49. Lam. ill. p. 445. t. 102. Willd. Sp. 2. p. 84. Hab. in Cayenna. Fol. opposita lanceolata. Pedunc. axillares.

394. *BASSOVIA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata. *Bacca* ovata, nodulosa. *Sem.* marginata, nidulantia.

1. *sylvatica*. Aubl. 1. p. 217. t. 85. Lam. ill. t. 102. Willd. 2. p. 1065. In sylvis Gujanæ humidis. Folia alterna pedunculi axillares. ¶

395. *SPHENOCLEA*. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-fida, cal. minor. *Caps.* compressa, 2-locularis, circumscissa. *Sem.* numerosa, subteretia.

1. *zeylanica*. Gaertn. de fruct. et sem. 1. p. 113. t. 24. f. 5. Willd. sp. p. 927. Pongatium indicum. Lam. ill. p. 44. Gaertnera. Retz. Rheede. 11. t. 24. Habit. in Indiae humidis. ☉

+ *Genera ericoidea s. bicornia, pentandra* (gen. 396-404.)

396. *POIRETIA*. *Cal.* 5-partitus, imbricatus persistens. *Cor.* 5-petala. *Stam.* receptaculo inserta. *Anth.* connatae. *Caps.* 5-locul., 5-valvis, dissepimentis e medio valvularum.

1. *cucullata*. Cav. ic. 4. n. 378. t. 343. Sprengelia incarnata. Smith. Act. holm. 1794. p. 260. t. 8. W. sp. 2. p. 833. Andrew. t. 2. Hab. in Nova Hollandia. Frut. bipedalis, rigidus.

397. *EPACRIS*. *Cal.* duplex: exterior imbricatus. *Stigma* capi-

tatum. *Germ.* cinctum squamulis 5. *Caps.* 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, polysperma. *Cav.*

1. *longiflora*, foliis cordato-ovatis rigidis apice subspinosis, flor. tubulosis elongatis. *Cav. ic.* 4. p. 25. t. 344. Corolla purpurea.

Obs. Omnes hujus generis species in Australasia, seu Nova Hollandia aut Zeelandia praesertim prope oppidum Jackson lectae sunt, etiam omnes fructus sunt.

2. *pulchella*, fol. imbricatis cor. latis : acumine rigido, flor. axillaribus tubuloso-campanulatis. *Cav. l. c.* p. 26. t. 345. Cor. rubens.

3. *pungens*, fol. ovatis imbricatis rigidis : acumine spiniformi, cal. exteriori conico. *Cav. t.* 346. Cor. tubus rubescens : limbo albo.

4. *spuria*, fol. ovato-mucronatis : limbo revoluti, flor. axillaribus subternis. *Cav. 2. p.* 27. t. 347. f. 1. An diversa a sequente ?

5. *grandiflora*, fruticosa, foliis ovatis acuminatis mucronatis recurvatis, floribus axillaribus. *Willd. sp.* p. 834. Hab. in Nova Hollandia. *h*

6. *pumila*, herbacea ? fol. ovato-oblongis imbricatis : florib. sessilibus subsolitariis terminalibus. *Forst. l. c.* Lin. suppl. 138. Hab. in Nova Zeelandia. *h*

7. *longifolia*, arborea, fol. lineari-lanceolatis basi vaginantibus, racemis erectis articulatis lateralibus. *Forst. prod.* n. 68. Lin. suppl. p. 138. Hab. in N. Zeelandia. *h*

8. *rosmarinifolia*, fruticosa, fol. linearibus obtusis rigidis vaginantibus : flor. solitariis lateralibus. *Forst. Hab.* in N. Zeelandia. *h*

9. *villosa*, foliis linearibus imbricatis, ramis villosis, flor. axillaribus. *Cav. t.* 347. f. 2. Cor. lacin. intus tomentosis.

398. STYPHELIA. *Cal.* imbricatus. *Cor.* tubulosa, 5-fida : laciniis saepe revolutis hirsutis aut glabris. *Nect.* membranaceum, lacinum, germen cingens. *Stigma* capitato-5-fidum. *Stam.* fauci inserta. *Drupa* 5-locularis : locul. 2-spermis.

1. *tubiflora*, corol. clavata longissima : limbo revoluti hirsuto, florib. axillaribus solitariis, fol. obovato-linearibus. *Smith. Nova Holl.* p. 45. t. 14. *Willd. sp.* 2. p. 835. Creant omnes species in Nova Hollandia seu Australasia et *h* sunt.

2. *triflora*, foliis imbricatis ovatis mucronatis glaucis, flor. axillaribus ternis. *Andrew. Repos. t.* 72. Cor. longissima, rubescens, apice flava.

3. *ericoides*, cor. limbo patente hirsutissimo racemis axillaribus brevissimis erectis, fol. lanceolato-ellipticis revolutis. *Smith. l. c.* p. 48.

4. *strigosa*, corollae limbo patente imberbi : fauce pilosa, racemis axillaribus brevissimis erectis, fol. subulatis. *Smith.*

5. *scoparia*, cor. limbo concaviusculo imberbi, racemis axillaribus brevissimis recurvis, fol. lineari-lanceolatis. *Smith.*

6. *daphnoides*, corollae limbo patente subpubescenti, florib. axillaribus solitariis, foliis ellipticis concaviusculis. *Smith. l. c.*

7. *Gnidium*, cor. limbo reflexo hirsuto, spicis terminalibus solitariis ovatis, foliis lineari-lanceolatis sparsis. *Hort. Malmanson. p.* 23. t. 23.

8. *lanceolata*, cor. limbo revoluti hirsuto, racemis aggregatis terminalibus, foliis lineari-lanceolatis. *Smith. Ardisia acerosa Gaert. sem.* 2. p. 78. t. 94 ? *Epacris juniperina. Lin. suppl.* p. 138.

9. *elliptica*, cor. limbo patente imberbi, racemis aggregatis subterminalibus, fol. lanceolato-ellipticis. *Smith.*

10. *juniperina*, arborea, foliis sparsis linearibus cuspidatis serrulatis, flor. sessilibus solitariis terminalibus. *Forst. prodr.* n. 71. sub genere *Epacris*.

* *procumbens*, caule procumbente, fol. lineari-lanceolatis imbricatis ciliatis, flor. axillaribus solitariis. *Ventenatia procumbens. Cav. ic.* 4. p. 28. t. 349. f. 1. Fol. nervis parallela.

* *humifusa*, fol. linearibus sparsis numerosis, floribus axillaribus. *Cav. l. c.* t. 348. Caulis ramosissimus.

Obs. Forsitan duae hae species ab enumeratis non diversae, quare stellulas apposui. Hoc genus ab *Epacris* fructu tantum differt.

399. PEROA. *Cal.* duplex : exterior triphyllus. *Cor.* hypocrateriformis : lacin. acutis tomentosis. *Germ.* ovatum nudum. *Stigm.* simplex. *Caps.* ovata, 1-locularis, 1-sperma. *Sem.* oblongum.

1. *microphylla*, caule fruticoso, foliis ovatis imbricatis, flor. terminalibus. *Pero-*

jos. Cav. ic. 4. p. 29. t. 349 f. 2. Copiose inter Jackson et Botany-Bay. Differt ab *Epacri* stigm. simplice, squamularum circa germen defectu et fructu 1-spermo. C.

400. PYXIDANTHERA. *Cal.* 5-partitus : laciniis incumbentibus paleaceo-membranaceis. *Cor.* campanulata, 5-partita. *Filam.* lamellata. *Anth.* loculis subglobosis circumscissis. *Styl.* crassus. *Stigm.* 3. *Caps.* ..

1. *barbulata*, fol. cuneato-lanceolatis acutis basi interna barbulatis. Michaux, Fl. 1. p. 152. Hab. in Carolina superiore. Pusilla repens, Azaleae procumbentis habitu. \mathcal{T}

401. BÆOBOTRYS. *Cor.* tubulosa, 5-fida. *Cal.* duplex, superus; exterior 2-phyllus; inferior campanulatus, 5-dentatus. *Bacca* 1-locularis, polysperma. (*Cal.* squamula duplici infra persistente cinctus. Juss.)

1. *nemoralis*, fol. ovato-dentatis. Vahl. symb. 1. p. 19. Willd. sp. p. 992. Maesa. Forsk. Juss. Hab. in insula Tanna. \mathcal{H}

2. *lanceolata*, foliis lanceolatis serratis. Vahl. l. c. t. 6. Maesa Forsk. Juss. gen. p. 180. In montibus Arabiae felicitis. Racemi supradecompositi, axillares. \mathcal{H}

402. ARGOPHYLLUM. *Cal.* 5-fidus, semisuperus. *Cor.* 5-partita. *Nec.* s. tubus interior, 5-gonus, pyramidatus truncatus. *Caps.* semiuifera, 3-locularis, 3-fariam dehiscens; polysperma.

1. *nitidum*. Lin. suppl. p. 22. Lam. ill. 2. p. 1. t. 111. Hab. in Nova Caledonia. Frutex sericeus. Flores paniculati.

403. BROSSÆA. *Cal.* carnosus superus. *Cor.* conica truncata. *Caps.* 5-sulca, 5-locularis, tecta calyce persistente, 5-fissuris per-via. J.

1. *coccinea*. Lin. Plum. gen. 7. ic. 64. f. 2. Hab. in America calidior. Frut. multicaulis. Flores solitarii.

404. CYRILLA. *Cal.* minutus sub-turbinatus, 5-partitus, superus. *Petala* 5, stellatim patentia (ri-

gidula). *Styl.* 2-fidus. *Bacca* (Caps. L.) exsiccabilis, 2-locularis. *Sem.* solitaria funiculo appensa. M.

1. *caroliniana*, foliis lanceolato-cuneatis acutis membranaceis nervosis. Michaux Flor. 1. p. 158. C. racemiflora. Linn. Itca cyrilla L'Herit. Stirp. t. 66. Jacq. ic. rar. t. 47. Hab. in Carolina. Petala pedicello longiora. M. \mathcal{H}

2. *antillana*, foliis cuneato-oblongis obtusis coriaceis subtus enerviis. Michaux, l. c. In ins. Antil. Spicae crassiores. \mathcal{H}

405. ITEA. *Cal.* 5-fidus campanulatus. *Petala* 4, linearia reflexo-patentia, cal. inserta. *Stigma* capitatum, bilobum. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis: valvis margine introflexo seminiferis. M.

1. *virginica*, foliis serratis, spicis pubescentibus. Michaux Flor. 1. p. 157. Hab. in Virginia.

Obs. Etiam ordine naturali, 'qui *saxifrageae*, a priore genere, quocum ab aliquibus conjuncta, differt. Richard apud Michaux. l. c.

406. PLUMBAGO. *Cal.* oblongus glanduloso-scaber. *Cor.* infundibulif. *Stam.* squamis basin cor. claudentibus inserta. *Stigma* 5-fidum. *Sem.* 1, oblongum, tunicatum.

1. *europaea*, foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris (rigidis), caule stricto. Willd. sp. 2. p. 837. Habit. in Europa australi et in Peruvia. Pl. tinctoria videtur. \mathcal{T}

2. *lappathifolia*, foliis amplexicaulibus lanceolatis laevibus, caule divaricato. Willd. Hab. in Iberia. Similis praecedenti. \mathcal{T}

3. *capensis*, foliis petiolatis oblongis integris subtus glaucis, caule erecto. Th. prod. 33. Hab. ad Cap. b. spei. \mathcal{H}

4. *zeylanica*, foliis petiolatis ovatis glabris, caule filiformi. Lin. Rheed. 10. t. 8. Hab. in India. \mathcal{H}

5. *rosea*, fol. petiolatis ovatis glabris subulenticulatis, caule geniculis gibbosis. Linn. Rumph. 5. t. 168. Hab. in India. \mathcal{H}

6. *scandens*, foliis petiolatis ovatis glabris, caule flexuoso scandente. Lin. Sloan. 1. p. 211. t. 133. f. 1. Hab. in America calidior. \mathcal{H}

7. *auriculata*, fol. ovato-oblongis petiolatis subtus squamoso-punctulatis, petiolis auriculatis caulem emplexantibus. Lam. enc. 2. p. 267. Hab. in India. \bar{h}

407. *WEIGELIA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. *Styl.* e basi germinis. *Stigma* peltatum. *Sem.* 1.

1. *japonica*, fol. sessilibus ovato-lanceolatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. 2. p. 331. Ej. Flor. jap. t. 16. Willd. sp. p. 836. Hab. in Japonia. \bar{h}

2. *coracensis*, fol. petiolatis obovatis. Thunb. l. c. Kaempf. ic. select. t. 45. Cum priore. \bar{h}

408. *ABRONIA*. *Cal.* 6. *Cor.* infera, hypocrateriformis, supra germen coarctata. *Sem.* 1, 5-angulare, cor. basi indurata tectum.

1. *umbellata*. Lam. ill. p. 460. t. 105. *Tricraus* admirabilis. L'Herit. Willd. sp. 2. p. 807. Hab. in Californiae maritimis. Fl. capitato-umbellati.

409. *MIRABILIS*. *Cor.* infundibuliformis, inferne coarctata, supera. *Cal.* inferus. *Nectarium* globosum, germen includens. *Stigma* globosum. *Nux* infra corollam, striata.

1. *dichotoma*, flor. sessilibus axillarib. erectis solitariis. Lin. Willd. sp. 2. p. 999. Admirabilis. Clus. hist. 2. p. 90. Habit. in Mexico. \bar{h}

2. *Jalapa*, flor. congestis pedunculatis, fol. glabris. Willd. Batsch. anal. plant. 2. p. 34. Hab. in India utraque. Flor. flavi, rubri, albi, vespera explicantur.

3. *longiflora*, flor. congestis longissimis subnutantibus terminalibus, foliis subvillosis. Lin. Act. holm. 1755. p. 176. t. 6. f. 1. Habit. in Mexici frigidis montibus. \bar{h}

410. *FABIANA*. *Cor.* infundibuliformis, limbo plicato revoluta; *Tubus* longissimus. *Stam.* inaequalia. *Stigma* emarginatum. *Caps.* bilocularis, 2-valvis.

1. *imbricata*, fol. imbricatis ovalis minutis. Flor. Per. 2. p. 12 t. 122. Habit. in Regni Chilensis campis et ripis arenosis. Resinosa, Tamarisici habitus. \bar{h}

411. *NIEREMBERGIA*. *Cor.* subhypocrateriformis: tubo longissimo; fauce coarctata plicata. *Stam.* inaequalia, superne adpressa. *Stigma* bilobum. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis.

1. *repens*. Flor. Per. 2. p. 1 t. 123. f. 1. Habit. in Regni Chilensis campis apricis et pascuis arenosis Conceptionis. Herbacea, pedalis. *Convolvulacea*?

412. *XUAREZIA*. *Cor.* rotata. *Stigma* compressum. *Caps.* bilocularis, 2-valvis: valvis bifidis.

1. *biflora*, fol. lanceolatis superne serratis, flor. geminis. Flor. Peruv. 2. p. 13. t. 123. f. a. *Capraria* peruviana. Fewill Peruv. 2. p. 764. t. 48. In Peruviae arenosis, ripis et argillosis. Ab incolis loco Theae adhibetur. \bar{h}

413. *PORANA*. *Cor.* campanulata. *Cal.* 5-fidus, in fructu maior. *Styl.* semibifidus, longior, persistens. *Stigmata* globosa. *Per.* bivalve.

1. *volubilis*. Barm. ind. 51. t. 21. f. 1. Willd. Sp. p. 843. Lam. ill. t. 186. In India orientali. Fol. ovata, serrata, plicata. L. \bar{h}

CONVOLVULACEI (monostyli. Gen. 414-418.) calyce sunt 5-fido, ut plurimum persistente, corolla campanulata aut infundibuliformi tubo elongato, capsula 2-3-4-loculari, eorumque folia alterna sunt, insuper herbas assim. frutices, sistunt saepius volubiles et quasdam lactes. Monogynae aut Polygynae sunt.

414. *RETZIA*. *Cor.* cylindrica extus villosa. *Stigma* bifidum. *Caps.* 2-locularis, polysperma.

1. *spicata*. Thunb. Act. lund. 1. p. 55. t. 1. f. 5. Lam. ill. t. 105. Hab. in Cap. b. spei altissimis montibus. Corol. rufescentes. \bar{h}

415. *ENDRACHIUM*. *Cal.* coriaceus, 5-phyllus. *Cor.* campanulata s. urceolata extus hirsuta. *Stam.* exserta. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* substipitata, lignosa, 2-locularis.

21. *Madagascariense*. Gmel. Syst. veget. Thouinia spectabilis. Smith ic. ined. 1. p. 7. t. 7. Willd. spec. 2. p. 935. *Endrachium*

drachium Juss. *Humbertia madagascariensis*. Lam. ill. t. 103. Hab. in Madagascar. f.

416. *CONVOLVULUS*. *Cor.* campanulata, plicata. *Stigm.* 2, simplicia. *Caps.* 2-3-locularis: loculis disjunctis.

* *Caule volubili.*

1. *arvensis*, fol. sagittatis utrinque acutis, pedunc. subunifloris. Lin. Willd. sp. p. 844. Flor. dan. t. 369. Hab. in agris. Bract. remotae. f.

* *auriculatus*, foliis linearibus hastato-acuminatis, auriculis integris. Lam. enc. bot. 3. p. 540. Bocc. mus. t. 33. Pluck. alm. t. 24. f. 3. Var. *β. prioris*. Lin.

2. *incarnatus*, foliis sagittatis oblongis acuminatis glabris: lobis divaricatis acutis integerrimis, pedunc. t-floris. Vahl. Eclog. amer. 2. Hab. in Curassao. *C. arvensi* affinis.

3. *ruber*, fol. sagittatis glabris emarginatis: lobis obtusissimis divaricatis integerrimis, umbellis involucreatis, caule piloso. Vahl. l. c. Hab. in America meridionali.

4. *sepium*, fol. sagittatis postice truncatis, pedunc. tetragonis unifloris, bracteis cordatis maximis. Flor. dan. t. 458. Engl. bot. t. 313. Flor. Per. 2. p. 10. Habit. in sepibus et salicetis, etiam in America et Peruvia. Stigma simplex.

5. *Scammonia*, foliis sagittatis postice truncatis, pedunc. teretibus subtrifloris. Lin. Moris. hist. 2. s. 1. t. 3. f. 5. Mill. dict. t. 102. *Scammonia syriaca*. Baub. pin. 294. Hab. in Syria, Mysia, Cappadocia. f.

6. *involucratus*, fol. cordato-hastatis pubescentibus, pedunc. subtrifloris, calycibus bracteatis. Willd. sp. p. 845. Hab. in Guinea.

7. *Hermanniae*, fol. cordato-sagittatis subhastatisque crenato-sinuatis: nonnullis integerrimis, pedunc. bifloris. Flor. Per. 2. p. 10. L'Her. Surp. p. 67. t. 33. Hab. in Peru. Cor. alba. Caps. helvola, carnosa.

8. *crenatifolius*, fol. sagittatis crenatis, pedunc. longis, flor. umbellatis. Flor. Per. l. c. t. 118. f. a. Cum priore. ©

9. *sagittifolius*, fol. oblongo-sagittatis: sinu profundissimo, auriculis subacuminatis, pedunc. 1-floris, cal. laciniis rotundato-ovalibus. Mich. flor. 1. p. 138. Pluck.

t. 85. f. 3. Hab. in America boreali. Cor. ampla, rosea.

10. *bonariensis*, fol. hastatis, basi cuneatis, apice setula terminatis, pedunc. subtrifloris. Cav. ic. 5. p. 54. t. 48. f. 2. Hab. in planitie de Buenos-Ayres. Corol. alba venulis roseis variegata.

11. *farinosus*, fol. cordatis acuminatis repandis, pedunc. trifloris, caule farinoso. Lin. Jacq. hort. t. 35. Hab. in Madera. ©

12. *lanuginosus*, fol. cordatis oblongis subhastatis tomentoso-sericeis: auriculis dentatis, pedunculis trifloris, caule piloso. Vahl. symb. 3. p. 23. Hab. in Oriente. Fol. tomento subferrugineo tecta. Cor. fere C. Scammoniae, flavescentes.

13. *villosus*, fol. cordatis ovatis acuminatis margine villosis subciliatis, capit. pedunculatis hirsutis involucreatis. C. ciliatus. Vahl. Eclog. amer. 2. Hab. in Cajenna. C. guianensis habitu.

14. *nummularius*, villosus, fol. cordatis mucronatis, pedunc. multifloris folio longioribus, calycib. ovatis, bracteis lanceolatis. Vahl. l. c. In America meridionali. Sequenti affinis.

15. *nodiflorus*, fol. subtomentosis ovatis subcordatisve, pedunc. bifidis multifloris fol. brevioribus, Vahl. l. c. Lam. enc. 3. p. 557. Hab. in ins. St. Crucis. An diversus a C. verticillato?

16. *parviflorus*, foliis cordato-oblongis mucronatis, peduncul. ramosis multifloris brevib. subverticillatis. Enc. bot. 3. p. 556. Burm. amer. p. 83. t. 94. f. 2. Habit. ad St. Domingo in collibus petrosis, ubi flores Decembri.

17. *ovalifolius*, glaber, foliis ovalibus integerrimis emarginatis, pedunc. 1-7-floris, cal. obovatis. Vahl. Eclog. 2. Hab. in India orientali.

18. *incanus*, tomentoso-sericeus, fol. lanceolatis sagittatis obtusis basi subdentatis, pedunc. bifloris. Vahl. l. c. Hab. in America. Cor. extus villosa.

19. *emarginatus*, fol. lanceolatis: inferioribus emarginatis mucronatis, pedunc. unifloris, foliolis calycinis exterioribus semiovatis magnis Vahl. l. c. Burm. ind. 47. t. 21. f. 2. ? Hab. in India.

20. *Medium*, glaber, fol. linearib. hastato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunc. unifloris, cal. sagittatis, caule volubili. Lin. Vahl. symb. 3. p. 24. Rheed. 11. t. 55. Hab. in India. Affinis C. reptanti. L. Calycis

M

foliola sagittata, ut in *Campanula* Medio. Lin. ☉

21. *glicaulis*, foliis lineari-lanceolatis obtusis mucronatis, basi dilatatis dentatis, foliolis calycinis oblongis. Vahl. l. c. Hab. in Guinea. ☉

22. *simplex*, foliis linearibus hastato-acuminatis: auriculis dentatis, foliolis calycinis simplicibus. Lam. enc. 3. p. 542. (C. hastatus.) In India orientali.

23. *dentatus*, fol. hastatis glabris: auriculis dentatis, pedunc. multifloris muricatis. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orientali.

24. *hastatus*, fol. lanceolatis hastatis, pedunc. axillaribus geminis bifloris. Vahl. symb. 1. p. 15. Hab. in Aegypto.

25. *panduratus*, radice crassa, foliis cordatis integris panduriformibus, calycib. laevibus. L. Mich. Flor. 1. p. 138. C. megalorhizus, flore amplo lacteo; fundo purpureo. Dill. elth. 107. t. 85. f. 99. In Virginiae arenosis. Junior subtomentosus. ¶

26. *bracteatus*, fol. cordatis subintegris triloboque hastatis attenuatis, pedunculis unifloris, foliolis exteriorib. calycis bracteiformibus. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orientali.

27. *bicolor*, fol. cordatis villosis, basi angulato-sublobatis, pedunc. unifloris, foliolis exterioribus calycis bracteiformib. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orient.

28. *trilobus*, fol. cordatis villosis trilobis: lobis ovatis acutis, pedunc. unifloris, caule volubili. Thunb. prod. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

29. *platanifolius*, fol. cordatis trilobis: lobis lateralibus dentato-angulatis, pedunc. subtrifloris calycibusque subaequalibus glabris. Vahl. symb. 3. p. 26. Fewill. 3. p. 16. t. 11. Pluck. t. 167. f. 3. Hab. in Amer. australi. ¶

30. *acuminatus*, fol. cordatis trilobisque acuminatis, pedunc. elongatis multifloris calycibusque glabris. Vahl. l. c. Habit. in insula St. Crucis.

31. *obscurus*, fol. cordatis acuminatis, pedunc. filiformibus unifloris calycibusque glabris, caule hirsutissimo. Vahl. symb. 3. p. 27. C. flore minore lacteo, fundo atropurubente. Dill. elth. 98. t. 83. f. 95. Hab. in China, Batavia, Zeylona et Surinamo. ☉

32. *acvus*, fol. cordatis repando-sublobatis denticulis apice mucronatis, pe-

duncul. bifidis multifloris. Willd. p. 852. Burm. ind. 77. t. 30. f. 27 In India orient.

33. *angularis*, fol. cordatis quinqueangulatis integerrimis villosis, pedunculis multifloris. L. Burm. ind. 46. t. 19. f. 2. Habit. in Java.

34. *Batatas*, fol. cordatis hastatis quinqueangulis, caule repente hispido tuberoso. L. Michaux Flor. 1. p. 138. C. radice tuberosa esculenta. Catesb. car. p. 60. t. 60. Rumph. 5. t. 130. Hab. in India utraque. Fol. modo hastato, modo angulato-lobata. Mich.

35. *maximus*, fol. cordatis ovatis acuminatis integerrimis glaberrimis, caule petiolisque glabris. Lin. suppl. 237. Rheed. 11. t. 53. Hab. in Zeylona. Caulis inferno ligneus. ¶

36. *gemellus*, fol. cordatis subtus villosiusculis, pedunc. bifloris. Vahl. symb. 3. p. 27. Burm. ind. 46. t. 47. f. 1. Hab. in Javae et Tranquebariae ruderalis. Floret ante meridiem usque ad 12 horam, quod raro in calidis regionibus. Koenig.

37. *cymosus*, fol. cordatis integerrimis, caule filiformi, pedunc. multifloris umbellato-cymosis. Flor. Per. 2. p. 9. t. 117. f. b. In Peruvia ad Pozuzo versurus. Caul. ramosissimus pilis deciduis hirsutus.

38. *sphaerostigma*, fol. cordatis subvillosis, flor. umbellatis, stigm. binis divaricatis capitatis. Cav. ic. 5. p. 54. t. 481. Habit. in Mindanao. Calyx villosus. An potius Ipomoea?

39. *pentanthus*, fol. cordatis acuminatis glabris subrepandis, umbellis pedunc. capitatis quinquefloris, cal. ciliatis. Willd. p. 855. Jacq. ic. rar. 2. p. 316. Collect. 4. p. 210. Hab. . . h

40. *gujanensis*, foliis cordato-ovatis subtus calycibusque tomentosis, pedunc. elongatis, flocc. corymboso-subcapitatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Aubl. guj. 1. p. 136. t. 59. Hab. ad ripas rivulorum in Cajenna et Gujana. ¶

41. *capitatus*, hispida, fol. cordato-ovatis, flor. cordatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Hab. in India orientali.

42. *hispida*, hirsutissimus, fol. cordato-ovatis, flor. umbellatis, pedunc. brevissimis. Vahl. Symb. p. 29. In India orientali.

43. *triflorus*, fol. cordato-lanceolatis attenuatis glabris obtusis, pedunc. triflor. Vahl. p. 30. Hab. in India orientali.

44. *verticillatus*, fol. cordatis oblongis

nudis, pedunc. umbellatis bifidis multiflor. L. ep. pl. 220. Ipomoea verticillata. Amoen. acad. 5. p. 394. Hab. in America. Flores caerulescentes, parvi.

45. *violaceus*, foliis foliolisque calycis duobus exterioribus cordato-ovatis acutis, pedunc. elongatis bifidis multifloris. Vahl. symb. 3. p. 29. Hab. in insula St. Crucis.

46. *umbellatus*, fol. cordatis, caule volubili, pedunc. umbellatis. Lin. Swartz. obs. 62. Pluck. alm. 114. t. 167. f. 1. Plum. amer. 88. t. 102. Hab. in Martinica, Domingo. Cor. lutea. Stigm. 2, globosa. Sw. T.

47. *tuguriorum*, fol. cordato-sagittatis acutis, caule anguloso, pedunc. tetragonis unis. Forst. n. 74. Hab. in Nova Zeelandia.

48. *cordifolius*, fol. cordatis hastatis dentatis, pedunc. bifido-umbellatis, caule volubili. Th. prod. 35. H. ad Cap. b. spei.

49. *bifidus*, fol. cordatis oblongis acuminatis sultis mollissimis, pedunc. bifidis multifloris. Vahl. symb. 3. p. 30. Hab. in Java et India orientali.

50. *malabaricus*, fol. cordatis glabris, caule perenni villosa. L. Rheed. 11. t. 51. Hab. in Malabarica arenosis. h

51. *coelestis*, fol. cordatis acuminatis pubescentibus, pedunc. elongatis umbellato-trifidis. Forst. prod. n. 77. Hab. in ins. Tanna.

52. *canariensis*, fol. cordatis pubescentibus, caule perenni villosa, pedunc. multifloris. L. Comm. hort. 2. p. 101. t. 51. Pluck. alm. t. 325. f. 1. Hab. in Canariensib. insulis. h

53. *ferrugineus*, ferrugineo-tomentosus, fol. cordato-ovatis acutis, pedunc. axillaribus quadrifloris. Vahl. eclog. 1. p. 17. Hab. in Amer. merid. h

54. *muricatus*, fol. cordatis, pedunculis incrassatis calycibusque laevibus, caule muricato. L. Hab. in Surate. Simillimus C. purpureo. ©

55. *triqueter*, fol. cordatis acutis subvillosis, pedunc. multifloris, caule tricarinato. Vahl. symb. 3. p. 30. Hab. in insula St. Crucis.

56. *anceps*, fol. cordatis, caule volubili utrinque carinato. L. H. in Zeylona, Java

57. *Turpeithum*, fol. cordatis angulatis. caule membranaceo quadrangulati. pedunc. multifl. L. Blackw. t. 397. Herm. Lugd. B. t. 178. 179. Turpeithum repens, fol. Althaeae teliodicum. Bauh. pin. 149. In Zeylona. T.

58. *grandiflorus*, foliis cordatis ovatis

obtusiusculis integerrimis, pedunc. subhifloris, cal. coriaceis, caule petiolisque pubescentibus. Lin. suppl. 116. Rheed. 11. t. 50. Hab. in India inter spinata ad littora fluminum. Caulis arboreus. Cal. di-s. triphyllus coriaceus. h

59. *trinervius*, fol. cordatis oblongis glabris trinerviis, caule volubili tereti, pedunc. unifloris. Thunb. jap. 85. encycl. bot. 3. p. 543. Hab. in Japonia. Folia opposita. An Ipomoea?

60. *peltatus*, fol. peltatis, pedunculis multifloris, L. Rumph. amb. 5. t. 159. Hab. in Amboina inque Societatis insulis.

61. ? *Jalapa*, caule volubili, fol. ovatis subcordatis obtusis, obsolete repandis subtus villosis, pedunc. unifloris. Ait. Kew. 1. p. 211. Hab. in Mexico, Vera cruce. Rad. magna, nigra. Sem. hirsuta. Ipomoea macrocarpa. Michaux. p. 141?

62. *macrosperrus*, fol. ellipticis acutis glabris, cor. planis, capsularum loculis monospermis, caule scandente. Willd. p. 860. Mouroucoa violacea. Aubl. Guj. 1. p. 142. t. 54. Hab. in Gujanae sylvis. h

63. *tenellus*, fol. ellipticis mucronatis, basi subcordatis, pedunc. bifloris fol. longioribus. Willd. Lam. enc. 3. p. 535. Pluck. alm. 114. t. 166. Hab. in Carolina.

64. *sericeus*, fol. lanceolato-ellipticis, subtus tomentoso-sericeis, pedunc. subumbellatis, cal. pilosis, caule volubili. Lin. C. mollis. Burm. ind. 44. t. 17. f. 1. Hab. in India. h

65. *tomentosus*, fol. trilobis tomentosis, caule lanuginoso. Lin. Sloan. jam. 55. hist. t. 98. f. 2. Pluck. t. 167. f. 4. In Jamaica.

66. *quinqueflorus*, fol. sagittato-ovatis attenuatis glabris crenato-subrepandis, pedunc. subquinquefloris. Vahl. symb. 3. p. 11. Hab. in insula Borbonia?

67. *arenarius*, fol. oblongis emarginatis basi lobatis integrisque, pedunc. unifloris, cor. tubulosis. Vahl. symb. 1. p. 18. Hab. in ins. Azoricis et ins. St. Crucis.

68. *althaeoides*, fol. cordatis sinuatis sericeis: lobis repandis, pedunc. bifloris. L. Barr. rar. 5. t. 312. Hab. in Europae meridionalis, Orientis et Africae collib. T.

69. *cairicus*, fol. palmatis glebris serrulatis, stipulis foliiformibus palmatis, axillaribus tomentosis, cal. pedunculatis laevibus. Vahl. symbol. 1. p. 15. Ipomoea palmata. Forsk. Hab. in Aegypto T.

70. *quinquelobus*, fol. palmato-quin-

quelobis serrulatis obtusis glabris, axillis tomentosis, pedunc. unifloris, caule glabro. Vahl. symb. 3. p. 32. In insula St. Crucis.

71. *vitifolius*, fol. palmatis quinquelobis glabris dentatis, caule piloso, pedunculis multifloris. L. Mant. 203. Burm. ind. 45. t. 18. f. 1. Pluck. alm. t. 25. f. 3. Hab. in India orientali.

72. *mucronatus*, fol. palmato-pedatis: lobis ciliatis apice mucronatis, pedunculis unifloris. Forst. prod. n.º 79. Habit. in insula Tanna.

73. *macrocarpus*, fol. palmato-pedatis quinquepartitis, pedunc. unifloris. L. Plum. spec. 1. ic. 31. f. 1. Hab. in Amer. Pedunc. articulati, incrassati. ☉

74. *paniculatus*, fol. palmatis lobis septenis ovatis acutis integerrimis, pedunc. paniculatis. Linn. Jacq. collect. 4. p. 216. Rheed. 11. t. 49. Hab. in Malabaricae arenosis. Var. fol. 3-lobis s. 5-lobis. ☞

75. *macrorrhizos*, fol. digitatis septenis integerrimis, caule glabro, pedunc. triflor. Lin. Plum. sp. 1. ic. 60. f. 1. Hab. in Amer. An Ipomoea?

76. *quinquefolius*, fol. digitatis glabris dentatis, pedunc. laevibus. Linn. Swartz. obs. 63. Pluck. alm. 116. t. 167. f. 6. Hab. in America, in Jamaicae sepibus. Stigm. a, subglobosa. Sw. Ipomoea?

77. *glaber*, fol. digitatis quinatis: foliol. ovato-lanceolatis integerrimis laevibus, pedunc. multifloris. Lam. enc. bot. 3. p. 566. Aubl. Guian. p. 138. t. 51. Willd. p. 86. Hab. in Cayenna. Lactescens.

78. *venosus*, glaber, fol. digitatis: foliolis petiolatis ovato-acuminatis venosis, petiolis communibus basi cirriformibus. Lam. l. c. Vahl. symb. 3. p. 32? Hab. in ins. Franc. et Bourbonicae. Ipomoea?

79. *eriospermus*, fol. digitatis: foliolis subobtusis linearibus, angustissimis, sem. hirsutis. Lam. l. c. p. 567. Cresc. in St. Domingo. Cap. 4-valvis, 2-locul. loculis 2-spermis. Sem. sericea.

80. *macrocalyx*, fol. quinatis oblongo-lanceolatis integerrimis, pedunc. longissimis racemoso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 10. t. 98. In Peruv. nemorosis. Petioli contorti.

81. *chilensis*, pedunc. 1-floris, fol. profundissime 5-partitis: lacinis linearibus, media productiore. Cav. ic. 5. p. 54. t. 480. f. 1. (C. dissectus.) Cresc. in Regno chilensi.

82. *tenuifolius*, foliis digitatis quinatis, foliolis linearibus, pedunc. subquadrifloris.

Vahl. symbol. 3. p. 33. Habit. in India orientali.

* * *Caule prostrato et non volubili.*

83. *siculus*, fol. cordato-ovatis, pedunc. unifloris: bracteis lanceolatis, flor. sessilib. L. Moench. sic. t. 48. Moris. s. 1. t. 7. f. 5. Hab. in Sicilia. Caul. vix, vel parum volubilis. Linn.

84. *ebracteatus*, fol. cordato-sagittatis postice obtusis, pedunc. petiolo brevioribus ebracteis. Lam. enc. bot. 3. p. 541. Hab. . . . Primo intuitu antecedenti similis dicitur, verum bractearum defectu distinguitur. Stigmata aglobulosa, an hinc Ipomoea?

85. *trichosanthes*, pubescens diffusus, fol. lanceolatis oblongis cum acumine, pedunc. longis 1-5-floris, cor. pilosa indivisa. Michaux p. 137. C. humistratus et aquaticus. Walt. Cor. alba, margine subro-denticulata. Styl. profunde 2-partitus. Caps. pubescens. Mich.

86. *stans*, erectus, tomentoso-incanus, fol. subcordatis, pedunc. 1-floris, calyc. bracteis obiectis: lacinis lanceolatis muc-ticis. Michaux Flor. 1. p. 136. In Canada juxta Lacum Champlain. Affinis C. spithameo. Walt.

87. *pentapetaloides*, fol. lanceolatis obtusis nudis lineatis, ramis declinatis, flor. solitariis semiquinquefidis. L. Vahl. symb. 2. p. 36. C. humilis. Jacq. collect. 4. p. 209. t. 22. ♂? C. prostratus, fol. radicalibus ovatis obtusis emarginatis longe petiolatis, pedunc. unifloris, caule prostrato. Roth. Abh. p. 11. t. 3. Habit. in Majorca. ☉

88. *ciliatus*, fol. oblongis cuneiformib. obtusis emarginatis ciliatis, caule prostrato, caps. pilosissimis. Roth. catal. 2. p. 22. Priori affinis. Hab. . . .

89. *lineatus*, fol. lanceolatis sericeis lineatis petiolatis, pedunc. bifloris, calycib. sericeis subfoliaceis. L. C. spicaefolius, fol. lineari-lanceolatis basi angustatis, caule simplici, pedunc. folio brevioribus. Lam. enc. 3. p. 527. C. serpens maritimus, spicae foliis. Triumf. obs. 31. t. 91. f. 2. Munt. 29. t. 140. Hab. in Hispaniae, Siciliae, Mediterranei maritimis et montosis. Cor. extus hirtae.

90. *evolvuloides*, caule prostrato, fol. spatulatis villosis obtusis integerrimis, flor. sessilibus. Desf. Atl. p. 176. t. 49. In regno Tunetano prope Shibam. Cor. parva, caerulea. Caps. villosa. D.

91. *suffruticosus*, caule villosa suffruticosa, fol. angusto-lanceolatis, pedunc.

1-floris folio longioribus. Desf. Atl. 1. p. 175. t. 48. Hab. in Atlante prope Tlemsen. Cor. pallide rosea aut alba. *h*

92. *saxatilis*, hirsutissimus, fol. linearibus, flor. capitatis, calycib. acuminatis. Vahl. symbol. 3. p. 33. C. lanuginosus, tomentoso - incanus, fol. linearibus, flor. capitatis terminalibus. Lam. enc. 3. p. 551. Bocc. mus. 2. p. 70. t. 70. Hab. in Hispania, Italia, Tauria. *h*

93. *Cne* fol. lanceolatis tomentosis, flor. capitatis, calycib. hirsutis, caul. erectiusculis. D. C. argenteus. Lam. 1. c. p. 552. Cnegrum album, folio argenteo molli. Baub. pin. 463. Hab. in Hispania, Creta, Syria. *h*

94. *linearis*, caulibus erectis fruticosis, fol. linearib. acutis piloso - sericeis, flor. terminalibus umbellato-paniculatis, calycib. pilosis. Curt. bot. mag. t. 299. Hab. .. *h*

95. *Cantabrica*, fol. lineari-lanceolatis acutis, caule ramoso erectiusculo, calycib. pilosis, pedunc. subfifloris. Lin. Jacq. Fl. austr. t. 296. Moris. 2. s. 1. t. 4. f. 3. Cantabrica quorundam. Clus. hist. 2. p. 49. *β. terrestris*, fol. linearibus sericeis, pedunc. subtrifloris, cal. hirsutis mucronatis. L. spec. 2. p. 224. Hab. in Europa australi, Tauria, Africa. Molliis incana. *h*

96. *palustris*, caule erecto ramoso, fol. lanceolatis pilosis, flor. axillaribus solitariis minutis subtomentosis. Cav. ic. 6. p. 80. t. 600. f. 2. Cresc. in paludosis in Acapulco viciniis. Pedunc. bistipulati. C.

97. *Ammanni*, sericeus, procumbens, fol. linearibus, pedunc. unifloris axillarib. longe bracteatis, cal. acuto. Lam. encyc. 3. p. 526. Willd. sp. p. 870. In Sibiria ad Jenisam et ad lacum Baikal. *h* Cor. minuta calyce paulo major, pilis externe sericeo-villosis. W.

98. *pilosellaefolius*, villosus, fol. lanceolatis, pedunculis racemosis paucifloris. Willd. 1. c. Lam. enc. p. 528. C. orientalis humifusus Pilosellae fol. Tournef. Hab. in Oriente. Rami axillares floriferi. *h*

99. *Dorycnium*, fol. sublinearibus sericeis, caule fruticuloso paniculato, calicibus undiusculis obtusis. Linn. Habit. in Oriente. *h*

100. *proliferus*, fol. linearibus subtus sericeis, capitulis terminalibus, inque dichotomiis bracteis ovatis extus hirsutissimis. Vahl. eclog. 1. p. 18. Habit. in America meridionali. Facies C. Cantabricae. *h*

101. *lunatus*, fol. lanceolatis linearib. tomentosis, ramis senescentibus spinosis,

flor. capitatis involucreatis. Vahl. 1. c. p. 16. Hab. in Aegypto inferiori et in monte Sinai. *h*

102. *Histrix*, fruticosus, fol. oblongis flor. sessilibus subsolitariis, ramis spinascentibus. Vahl. Hab. in Arabia. *h*

103. *spinosis*, fruticosus, fol. lanceolatis, pedunc. unifloris, ramis floriferis spinosis. Willd. p. 871. Lin. suppl. 137. C. fruticosus. Pall. it. 2. p. 734. t. M. Hab. in Sibiria arenosis collibus ad fluvium Irin. Rudimenta ramulorum in axillis foliorum rameorum in spinas breves mutantur. Habitus C. Cneori. L. *h*

104. *scoparius*, fol. linearibus pilosiusculis, pedunc. subtrifloris, calyc. sericeis ovatis acutis, caule fruticoso, ramis virgatis. Ait. Kew. 1. p. 213. Lin. suppl. 135. Habit. in Teneriffa circa oppidum St. Cruz. Facies Spartii s. Genistae et non Convolvuli. Cor. extus hirsutae albae. Rasura huius ligni, quod durum album: striis radiantibus, spargit odorem rosaceum. *h*

105. *Oenotheroides*, fruticosus erectus, fol. linearibus canescentibus, pedunc. axillaribus solitariis erectis unifloris bracteatis, calycib. lanceolatis glabris. Lin. suppl. 137. Hab. ad Cap. b. spei. Habitus Oenotherae mollissimae. Cor. magna fulva.

106. *floridus*, fol. oblongo - lanceolatis basi attenuatis subpilosis, ramis floriferis pedunculisque paniculatis. Ait. Kew. 1. p. 214. C. fruticosus prostratus canus, fol. lineari-lanceolatis glabris, thyrsis terminali pyramidalis composito. L. suppl. 136. Jacq. ic. 1. t. 34. Collect. 1. p. 62. Habit. in rupibus Teneriffae. Copia florum omnium pulcherrimus. Lin.

107. *conceatus*, caule fruticoso erecto, fol. cuneiformibus obtusis mucronatis glabris, corollis axillaribus fol. brevioribus. Willd. 1. c. p. 873. Hab. in India orientali. *h*

108. *corymbosus*, fol. cordatis, pedunc. umbellatis, caule repente. L. Plun. spec. 1. ic. 89. f. 2. Hab. in America.

109. *secundus*, fol. cordatis acuminatis integerrimis, pedunc. secundis longissimis, flor. umbellatis. Flor. Per. 2. p. 10. t. 117. f. a. In Peruv. collibus arenosis.

110. *spithameus*, fol. cordatis pubescentibus, caule recto, pedunc. unifloris. Lin. Hab. in Virginia.

111. *persicus*, fol. ovalibus tomentosis pedunc. unifloris. Amoen. acad. 2. p. 347. Gmel. it. 3. p. 36. t. 7. Hab. in Persia ad maris Caspici littus. *h*

112. *tricolor*, fol. lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, flor. solitariis. Lin. Moris. s. 1. t. 4. f. 4. Hab. in Africa, Mauritania, Hispania, Italia et Peruvia. Fol. obovata. ☉

113. *acetosaeifolius*, fol. oblongo-lanceolatis subhastatisque, pedunc. elongatis unifloris, caule repente. Vahl. eclog. 1. p. 18. Plum. amer. 91. t. 105. Hab. in Amer. merid. ☿

114. *repens*, fol. sagittatis postice obtusis, caule repente, pedunc. unifloris. L. Michaux 1. p. 137. Cor. alb. a, colore roseo ad ambitum suffusa. Cal. hibracteatus. M. Hab. in India utraque ad ripas, in arenosis maritimis. Caul. geniculatus ☿

115. *reptans*, fol. hastato-lanceolatis: auriculis rotundis, caule filiformi repente, pedunc. unifloris. L. Rumph. 5. t. 155. f. 1. Hab. in India. An a priore diversus?

116. *edulis*, fol. cordatis integris trilobisque glabris, caule repente angulato. Thunb. jap. p. 84. Hab. in Japonia ☿ +

117. *hirtus*, fol. cordatis subhastatisque villosis, caule petiolisque pilosis, pedunc. multifloris. Mill. dict. n. 10. Hab. in India.

118. *Soldanella*, fol. reniformibus, pedunc. unifloris. Moris. s. 1. t. 3. f. 2. *Soldanella maritima minor*. Bauh. pin. 295. Hab. in Angliae, Hispaniae, Belgii, Italiae, Frisiae littoribus maris et in Carnioliā. ☉

119. *Imperati*, foliis panduriformibus integris emarginatis basi cordatis, pedunc. unifloris, caule repente. Vahl. symbol. 1. p. 17. C. stoloniferus. Lam. enc. 3. p. 527. Cyrill. pl. rar. fasc. 1. p. 14. t. 5. Moris. s. 1. p. 15. t. 7. *Soldanellae* congener *Imperati*. Barr. obs. 33. ic. 856. Hab. ad littora maris Neapoli.

120. *obtusilobus*, glaber, foliis crassis sinuato-lobatis: lobo impari majore emarginato, pedunc. 1-floris, cor. brevi campanulata. Michaux. Flor. 1. p. 139. Hab. in Amer. boreal. littoribus.

121. *Pes caprae*, fol. bilobis, pedunculis unifloris. Linn. Herm. Lugd. B. 174. t. 175. Rumph. 5. t. 159. f. 1. Hab. in India.

122. *Lasianthus*, flor. solitariis, fol. palmato-lacinatis tomentosis: lacinia media enpiore pinnatifida. Cav. ic. 5. p. 53. t. 479. f. 1. Hab. in Regno chilensi.

123. *laciniatus*, flor. solitariis, foliis laciniatis: lacinii capillaribus 2-3-fidis. Cav. l. c. Lam. enc. 3. p. 545. t. 479. f. 2. Cresc. prope Montevideo. Cor. et cal. extus villosi, uti in priore, cui affinis.

124. *platycarpus*, flor. racemosis, fol. pinnatis, caps. compressis. Cav. l. c. p. 55. t. 482. In Mexico. An hujus generis?

125. *venosus*, glaber, fol. digitatis foliolis petiolatis ovato-acuminatis, petiolis basi cirrhosis. Enc. l. c. Hab. in Ins. Mauritica.

126. *brasiliensis*, fol. emarginatis basi biglandulosis, pedunc. trifloris. L. Hab. in Brasilia, Domingo marit.

127. *multifidus*, foliis palmatis, foliis septenis linearibus integris, pedunc. unifloris, caule decumbente. Thunb. prodr. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

128. *sublobatus*, procumbens, fol. superioribus apice dentato-repandis, floribus capitatis. Lin. suppl. 135. Hab. in India. Involucrum hexaphyllum. Cor. magna. ☉

129. *capensis*, fol. hastatis, lobis semibifidis, pedunc. subbifloris, caule decumbente villosi. Willd. p. 877. catusatus. Th. prod. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

130. *sagittatus*, fol. hastatis sagittatisque, pedunc. unifloris, caulib. prostratis. Thunb. prod. 35. Cum priore.

131. *littoralis* foliis oblongis lobato-palmatis, pedunc. unifloris, caule repente. L. Plum. sp. 1. ic. 50. f. 2. Hab. in Amer.

132. *martinicensis*, fol. ellipticis, glabris, pedunc. unifloris folio longioribus, caule repente. Jacq. amer. 26. t. 17. Hab. in Martinicae umbrosis, inundatis.

Obs. Plures *Convolvuli* species ob stigma capitato - didymum ad *Ipomoeas* relatae sunt, et nonnullae examinandae adhuc restant, numne potius ad idem pertineant genus.

417. **IPOMOEAE.** Cor. infundibuliformis, aut campanulata, 5-plicata. *Stigmata* capitato-globosa, papillosa. *Caps.* 2-3-localaris, polysperma.

1. *Quamoclit*, fol. pinnatifidis linearib. flor. subsolitariis. Lin. Willd. sp. 2 p. 879. *Quamoclit* s. *Isaminum americanum*. Clus. posth. 9. Rumph. 5. t. 155. f. 2. Hab. in India. Conv. pennatus. Lam. enc. 3. p. 567.

2. *dissecta*, fol. palmatis, lacinii angustatis pinnatifidis dentatis, pedunc. subbifloris. Willd. phytog. 1. p. 5. n. 19. t. 2. f. 3. Hab. in Guinea.

3. *umbellata*, foliis digitatis septenis, pedunc. umbellatis brevissimis. L. suppl. Plum. spec. 3. ic. 92. f. 2. Hab. in Amer.

4. *carolina*, fol. digitatis: foliolis petiolatis, pedunc. unifloris. Lin. Catesb. Car. 2. p. 19. t. 19. Hab. in Carolina.

5. *coccinea*, fol. cordatis acuminatis, basi angulatis, pedunc. 2-fidis. L. Comm. rar. 21. t. 11. *β. luteola*, fol. cordatis acuminatis subangulatis, pedunc. primum dichotomis, dein racemosis. Jacq. ic. rar. 1. t. 35. Collect. 2. p. 266. Hab. in Domingo. ☉

Obs. An Ip. angulata. Ortega. Dec. p. 83. Flor. Per. 2. p. 11. t. 119. Varietas?

6. *lacunosa*, foliis cordatis acuminatis acrobiculatis basi angulatis, pedunc. sub-unifloris flore brevioribus. Lin. Dill. elh. 103. t. 87. f. 102. Hab. in Virginia, Carol. Simillima I. coccineae. Flor. tubo crassiore albi, ore purpurascens. ☉

7. *lescantha*, fol. cordatis acuminatis integerrimis, pedunculis unifloris solitariis folio brevioribus. Willd. p. 881. Jacq. ic. t. 318. Collect. 2. p. 280. Hab. in Amer. torrida. ☉

8. *solanifolia*, fol. cordatis acutis integerrimis, pedunc. unifloris solitariis fol. aequalibus. Willd. l. c. Plum. sp. 3. ic. 94. f. 3. Hab. in Amer.

9. *bona nox*, fol. cordatis acutis integerrimis, caule aculeato, flor. ternis, cor. indivisis. L. Cav. ic. 3. p. 52. t. 300. Sloan. hist. 151. t. 96. f. 1. Hab. in Indiae arenosis, arborescens. Cor. tubus lutescens: limbo albo, radiis 5 lutescentibus. ☉

10. *campanulata*, fol. cordatis, pedunc. multifloris, perianthio exteriori orbiculari, cor. campanulatis lobatis. Lin. Rheed. 11. p. 175. t. 56. Hab. in India. Sub. perianthio quinquepartito, aliud perianthium minus orbiculatum integerrimum. L.

11. *violacea*, fol. cordatis integerrimis, flor. confertis, cor. indivisis. Lin. Plum. spec. 3. ic. 93. f. 1. Sloan. hist. 1. p. 155. t. 98. f. 1. Habit. in Amer. merid. †

12. *verticillata*, fol. cordatis, pedunc. axillaribus ternis reflexis, calycib. hispidis. Vahl. symb. 3. p. 33. Habit. in Arabia felici.

13. *carnea*, fol. cordatis glabris, pedunc. multifloris, cor. marginatis. Jacq. amer. 26. t. 18. Hab. in America. ♀

14. *repanda*, fol. cordatis oblongis repandis, pedunculis ramosis cymosis. Jacq. amer. 28. t. 20. Hab. in America. ☉

15. *filiformis*, fol. oblongo-cordatis obtusis integerrimis mucronatis, pedunculis cymosis. Willd. Murr. syst. veg. 205. Jacq. am. pict. 20. t. 26. Jacq. amer. 27. t. 19. Hab. in Martinicae sylvaticis. ♀

16. *biflora*, caule volubili, fol. cordatis pubescentibus, pedunc. geminis, cor. lobis trifidis. Lin. sub Convolv. Willd. p. 854. Hab. in China. Pistillum album, stigm. 2. capitata, purpurea. L.

17. *striata*, fol. cordatis attenuatis glabris, pedunc. fol. longioribus subquadri-floris, cor. glabris extus striatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Willd. l. c. sub Convolv. In India. Cor. alba: fundo fusco - purpurascens. Stigma capitatum. V.

18. *parviflora*, fol. cordatis acuminatis glabris, pedunc. multifloris, calycibusque acuminatis villosis. Vahl. l. c. Ip. *paniculata*, caule volubili, fol. ovatis acuminatis, pedunc. paniculatis. Burm. ind. t. 21. f. 3. Hab. in Java.

19. *sibirica*, foliis cordatis acuminatis laevibus, pedunc. incrassatis 1-floris. Lin. sub Convolv. Hab. in Sibiria. Stigma 2-lobum.

20. *speciosa*, fol. cordatis subtus tomentoso-sericeis, pedunc. petiolo longioribus, umbelliferis. Ait. Kew. 1. p. 211. Smith. ic. pict. t. 17. sub Conv. C. *nervosus*. Burm. ind. t. 20. f. 1. In India orient. Caul. volub. arboreus. Fol. subius argentea. ♀

21. *purpurea*, foliis cordatis indivisis fruct. cernuis, pedicellis incrassatis. Roth. Cat. bot. 1. p. 37. Conv. purpureus. Lin. Ehr. pict. t. 7. ♀. H. in Amer. Cor. colore variat.

22. *ciliolata*, volubilis glaber, fol. cordatis subciliatis, pedunc. longiusculis 1-floris, cal. laciniis lato-ovalibus obtusis. Michaux. 1. p. 137. sub Conv. Hab. circa urbem Knoxville in Tennessee. Cor. ampla, tubulato-campanulata, alba. Stigmata subglobosa. M.

23. *tricolor*, fol. cordatis acuminatis flor. axillaribus subumbellatis, peduncul. caul. crassiore. Cav. l. c. p. 5. t. 208. Hab. Cor. tricolor, crenulata. Cal. violaceo-niger. C.

24. *glandulifera*, caul. volubili hirsuto, fol. cordato - subrotundis acuminatis, pedunc. subquadridoris incrassatis, calycib. glanduliferis. Flor. Peruv. 2. t. 121. f. a. in Lima etc. segetibus. Flor. mane explicantur, hinc ab incolis *Auroras* denominatur haec planta.

25. *tannifolia*, fol. cordatis acuminatis

M 4

pilosis, flor. aggregatis. Lin. Willd. p. 886. Dill. elth. t. 318. f. 414. Habit. in Carolina.

26. *sagittata*, fol. glaberrimis inferiorib. cordatis, superioribus sagittatis, pedunc. subunifloris. Desf. atl. 1. p. 177. Poir. it. p. 122. Cav. ic. 2. t. 107. Conv. Wehleri. W. sp. p. 845. In Barbaria et Hispania (prope oppidum Castulo) ad lacuum et maris ripas. Sem. lanata. ♀

27. *hastata*, fol. sagittato-hastatis, pedunc. bifloris. L. Burm. ind. 50. t. 18. f. 2. Hab. in Java. Flor. lutei.

28. *glaucofolia*, foliis sagittatis postice truncatis, pedunc. bifloris. Linn. Dill. elth. t. 87. f. 101. Hab. in Mexicae arvis.

29. *acutangula*, fol. sagittato-triangularibus, angulis posticis dentatis, caule tereti, pedunc. 3-5-floris fol. longitudine. Fl. Per. 2. p. 11. t. 119. f. b. (I. angulata.) Hab. in Pozuzo. nemoribus. Cor. coccinea. ☉

30. *angustifolia*, fol. hastato-linearibus, pedunc. 1-floris. Jacq. coll. 2. p. 367. ic. rar. t. 317. Vahl. symb. 3. p. 25. In India.

31. *japonica*, fol. lanceolatis hastatis acutis: auriculis postice 1-dentatis, caule simplicibus. Vahl. l. c. Thunb. jap. p. 85. W. p. 849. In Japonia juxta Jedo et Nagasaki.

32. *simplex*, fol. lanceolatis integris, floribus solitariis. Thunb. prod. 36. Hab. in Cap. b. speci.

33. *hederacea*, fol. trilobis quinquelobisve cordatis, pedunc. unifloris, calycib. villosis. Willd. 2. p. 884. Jacq. ic. t. 36. Stigm. 3-lobum. Jacq. Habit. in America torrida. ☉

34. *triloba*, fol. trilobis cordatis, pedunculis trifloris L. Hab. in Amer. Cor. cylindricae, violaceae. ☉

35. *sanguinea*, fol. cordatis trilobis, lobis lateralibus postice angulato-sublobatis, pedunc. trifloris, calycibus glabris. Vahl. symb. 3. p. 33. Hab. in insula St. Crucis. ☉

36. *hederifolia*, fol. trilobis cordatis, pedunc. multifloris racemosis. Lin. Plum. spec. 3. t. 93. f. 2. Hab. in Amer. ☉

37. *hepaticifolia*, fol. trilobis, florib. aggregatis. Lin. Burm. ind. 50. t. 20. f. 2. Fol. superiora 5-loba. Lam. ill. p. 461. Sub Convolv. Hab. in Zeylona.

38. *punctata*, fol. cordatis trilobisque, cor. indivisib. fruct. erectis. Lin. sub Conv. hederaceo. Willd. p. 851. C. flore purpureo, cal. punctato. Dill. elth. p. 99. t. 83. f. 96. Hab. in utraque India et Africa. Stigm. 3-lobum. Jacq. ☉

39. *carolina*, fol. cordatis trilobisque villosis, cal. laevibus, caps. hirtis, pedunc. subbifloris. Lin. sub Conv. fol. profunde sublanceolato-3-lobis. Michaux. Flor. 1. p. 139. Hab. in Carolinae sepibus. ☉

40. *cuspidata*, fol. cordatis trilobis: lobis cuspidatis, pedunc. 1-floris, cal. laciniis linearibus basi hirsutis. Flor. Peruv. 2. p. 13. t. 119. f. a. Hab. in Peruviae petrosis. Petioli longi. ☉

41. *villosa*, fol. cordatis trilobis: lobis acuminatis lateralibus extrorsum excavatis, pedunc. trifloris involucreatis. Fl. Per. 2. p. 12. t. 121. f. 1. In Per. nemoribus et ad agrorum margines. Cor. caerulea. Caps. glabra.

42. *macrorrhiza*, fol. cordatis lobatisque plicatis subtus tomentosis, pedunc. subunifloris, rad. crassissima. Michaux. Flor. 1. p. 141. In Georgiae et Floridae maritimis. Cor. magna, alba. Sem. lanuginosa. †

43. *crassifolia*, caule erecto ramoso, fol. reniformibus emarginatis subplicatis, pedunc. axillaribus subtrifloris petiolo brevioribus. Cav. Descr. p. 100. Habit. in Guayaquil.

44. *stans*, caule erecto suffruticoso ramoso, fol. cordatis truncatis sinuato-dentatis. Cav. ic. 3. p. 26. t. 250. Hab. .

45. *Nil*, foliis cordatis trilobis, coroll. semiquinquefidis, pedunc. petiolo brevioribus. Linn. Willd. sp. 2. p. 85: sub Ipomoea. Cur. mag. t. 188. Hab. in Amer.

46. *barbata*, cordatis trilobis, pedunc. subunifloris retortis, cal. barbatis. Roth. Cat. 1. p. 37. Dill. elth. t. 88. f. 92.

47. *varia*, fol. cordatis lobatisque, pedunc. unifloris erectis, cal. laciniis dorso barbatis: 3 exterioribus cordato-lanceolatis. Roth. Cat. p. 17. Convolv. pilosus. Moench. meth. p. 432. Rad. fusiformis. An eadem ac I. hederacea? ☉

48. *tridentata*, fol. oblongis tricuspidatis: basi dilatato-dentatis, pedunc. 1-flor. incrassatis 4-gonis. Roth l. c. p. 19. Conv. tridentatus. Lin. W. Sp. 1. p. 848. Rheede 11. t. 65. In Indiae aridis. Caps. 2-locularis, 4-sperma. Stigm. 2, globosa. ☉

49. *pentaphylla*, caule fruticoso filiformi volubili, fol. quinatis glabris, flor. axillaribus, pedunc. solitario. Cav. ic. 3. p. 29. t. 256. Hab. Pedunc. axillares 1-3-flori. Cor. limb. crenulatus.

50. *pilosa*, caule scandente piloso, fol. quinatis pilosis integerrimis. Cav. ic. 4. p. 11. t. 323. Conv. 5-phyllus. Linn. Ipomoea.

Jacq. pl. rar. v. 2. Hab. in Amer. calidiore. Caul. et petioli longi valde pilosi. ☉

51. *muricata*, foliis quinatis linearibus angustis sessilibus, cal. muricatis. Cav. ic. 1. c. f. 2. Hab. in Huanajuato. Caps. 2-locularis.

52. *ternifolia*, fol. ternis linearibus angustis petiolo communi longioribus. Cav. 5. p. 52. t. 478. Hab. in Apulco viciniis Flor. axillares.

53. *parviflora*, fol. cordatis quinquelobato-palmatis, umb. axillaribus pedunculatis, cal. capsulisque pilosis. Vahl. symb. 3. p. 34. Sloan. hist. 1. t. 97. f. 1. Hab. in ins. St. Crucis. Affinis. 1. trilobae. ☉

54. *heterophylla*, foliis palmatis: lobis lateralibus superne lobulo erectiusculo auctis. Orteg. Dec. plant. p. 9. Habit. in Nova Hispania et in ins. Cuba.

55. *sinuata*, fol. palmato-pedatis septemlobis: lobis lanceolatis inaequaliter sinuatis, pedunc. 1-floris. Ortega Dec. 7. p. 84. Conv. dissectus. Jacq. hort. 2. t. 159. Cresc. cum priore.

56. *Papirin*, fol. palmatis cordatis: lobis quinis lanceolatis, pedunc. 1-floris, radice tuberosa. Flor. Peruv. 2. p. 11. t. 120. f. 2. Hab. in Tarmae collibus. Radix uti sequentis vi drastica gaudet.

♂ ? *subtriloba*, fol. cordatis subtrilobisque, pedunc. 1-floris, rad. tuberosa. Flor. Per. l. c. Cum priore. Cor. etiam purpurea. ☿

57. *tuberosa*, fol. palmatis, lobis septenis lanceolatis acutis integerrimis, pedunc. trifloris. Lin. Plum. am. t. 276. f. 6. Hab. in Jamaica. Cor. sulphurea. ☿

58. *digitata*, fol. palmatis: lobis septenis lanceolatis obtusis, pedunc. trifloris. Lin. Plum. Sp. 3. ic. 92. f. 1. In America. Cor. coccinea.

59. *Pes tigridis* (tigrida), villosa, fol. palmatis flor. aggregatis. Lin. Herm. Lugd. t. 187. Dill. Elth. t. 318. f. 411. Hab. in India. ☉

Obs. *Ipomoea bracteata*, bracteis latis venosis carneis plicatis distichis. Cav. ic. 4. p. 51. t. 477. ob corollae limbum integerrimum revolutum, filam. glabra, stigm. simpliciter ovatum distinctum genus efficere videtur. In opere botanico: *Encyclopédie méthodique*, vol. 3. p. 534-568. plures sub genere *Convolvuli* descriptae extant species, quae ob stigma capitato-dilidylum verae *Ipomoeae* videntur. Interea duo haec genera charactera nimis artifi-

ciali, quo affinitas inter quasdam species aliquando dilaceratur, inter se disjunguntur.

418. *DIAPENSIA*. Cal. 5-phyllus, imbricatus foliolis tribus. Cor. hypocrateriformis: limbo 5-fido plano. Stam. tubo cor. imposita. Caps. 3-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *Japonica*, floribus pedunc. Linn. Flor. dan. t. 47. Hab. in alpinis lapponicis. Sedi facie, *Arenis* affinis. ☿

419. *COBÆA*. Cal. inferus persistens, 5-gonus: angulis basi compresso-alatis. Cor. campanulata. Stam. declinata. Stigma 3-fidum. Germ. cinctum corpore glanduloso. Caps. obovata, 3-locularis, recept. 3-gono disticta. Sem. imbricata, marginata.

1. *scandens*. Cav. ic. 1. p. 11. t. 16 et 17. et vol. 5. p. 66. t. 500. bis. Habit. prope Mexico et in Acapulco. Caul. longissimus, scandens. Fol. pinnata cirrhosa: pinnulis ovatis. Cor. maxima, violacea. E *Bignoniacearum* familia. C.

420. *MACROSTEMA*. Cal. inferus persistens, semiquinque partitus. Cor. infundibuliformis: lacin. lanceolatis. Stam. longissima exerta, basi nuda. Caps. 4-locularis, 4-valvis: dissepimento valvulis parallelo cruciata. Sem. solitaria.

1. *vitifolia*. Calboa Cav. ic. 5. p. 51. t. 476. in honorem cujusdam medici seculi 16. *Calbo* sic dicti. Hab. in Amer. septenti. Caul. scandens. Pedunc. axillares multiflori.

~~~~~  
POLEMONIDÆÆ. Cal. inferus, persistens. Cor. regularis, quinqueloba. Stam. 5, in medio tubi inserta. Caps. 3-locularis, 3-valvis: valvis medio intus septiferis, receptac. centrali 3-gono. Caul. herbaceus aut frutescens. Fol. alterna aut opposita. Vid. Juss. gen. pl.

421. *POLEMONIUM*. Cor. 5-partita, fundo clauso valvis staminiferis. Stigma 3-fidum. Caps. 3-locularis, supra.

1. *caeruleum*, fol. pinnatis (17), florib.

erectis, calycib. cor. tubo longiorib. Lin. Flor. dan. 255. Willd. Sp. 2. p. 886.  $\beta$ . *alba*, flor. albis. In Europa et Asia.  $\mathcal{T}$

2. *reptans*, rad. repente, fol. pinnatis septenis, florib. terminalibus nutantibus. Lin. Lam. ill. t. 106. f. 2. Mill. dict. t. 209. Hab. in Virginiae montibus.  $\mathcal{T}$

3? *dubium*, fol. inferioribus hastatis, superioribus lanceolatis. Linn. Habit. in Virginia. Stylus semibifidus.  $\mathcal{T}$

4? *Roëllioides*, erectum, caule filiformi, fol. lanceolatis ciliatis, panic. pauciflora pedunc. nuda. Linn. suppl. p. 139. Hab. in Cap. b. speci.  $\mathcal{T}$

5. *Campanuloides*, erectum glabrum, fol. lineari-lanceolatis integris erectis, flor. terminalibus solitariis. Linn. suppl. 139. Hab. in Cap. b. speci. An potius Campanula?

Obs. Ambae hae posteriores species germinare infero a Polemonii recedunt. Lam. ill. p. 472; hinc hujus generis non sunt.

422. PHLOX. Cor. hypocrateriformis. *Filam.* inaequalia. *Stigma* 3-fidum *Cal.* prismaticus. *Caps.* 3-locularis, 1 sperma.

1. *paniculata*, caule alto laevi, foliis lanceolatis margine scabris, corymbis paniculatis, cor. laciniis rotundatis. Ait. Kew. 1. p. 205. Willd. Sp. 2. p. 839. Dill. elrh. 205. t. 166. f. 203. Fol. undulosa. *Cal.* aristati. Michaux. Hab. cum omnibus fere speciebus in Amer. septent.  $\mathcal{T}$

2. *undulata*, fol. oblongo-lanceolatis subundulatis margine scabris, caule laevi, corymbis paniculatis, cor. laciniis subretusis. Ait. Kew. 1. p. 205. Hab. in America boreali.  $\mathcal{T}$

3. *triflora*, caul. erectis subpubescentibus, fol. lanceolatis glabris, corymborum ramis subtrifloris, cal. dentibus linearibus. Michaux Flor. 1. p. 143. Hab. in Carolina superiore. Humilis.

4. *latifolia*, caule erecto laevi, foliis subcordato-ovalibus, flor. fastigiato-corymbosis. Michaux. In Carolinae sylvis sphagnosis. Cor. majusculae lacinae suborbiculatae.

5. *aristata*, caule debili pubescente, panic. e racemis laxis et subgeminifloris fastigiata, aristis calycin. longissimis. Mich. p. 144. Var. corol. roseo-purpureiscent.  $\beta$ . et cor. albedo-rosea. Hab. in Carolina ripas amnis Santee, et  $\beta$ . circa Knoxville.

6. *suaveolens*, (*candida*), fol. ovato-lanceolatis undique laevibus, caule glaberrimo, racemo paniculato. Ait. Kew. 1. p. 206. Hab. in America boreali. Flores albi leviter suaveolentes. Ait.  $\mathcal{T}$

Obs. Var. sequentis secundum Michaux. Flor. 1. p. 143.

7. *maculata*, fol. oblongo-lanceolatis glabris, caule maculato scabriusculo, racemo corymboso. Ait. Jacq. hort. t. 127. Hab. in Virginia.  $\mathcal{T}$

8. *pilosa*, fol. lanceolatis villosis, caule erecto, corymbo terminali. Hab. in Virginia.  $\mathcal{T}$

9. *carolina*, fol. lanceolatis laevibus, caule scabro, corymbis subfastigiatis. Lin. Mart. cent. 10. t. 10. Hab. in Carolina.  $\mathcal{T}$

10. *glaberrima*, fol. lineari-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. Lin. Hab. in Virginia.  $\mathcal{T}$

11. *divaricata*, fol. lato-lanceolatis: superioribus alternis, caule bifido, pedunc. geminis. Lin. Mill. dict. n.<sup>o</sup> 4. et ic. f. 1. Habit. in Virginia.  $\mathcal{T}$

12. *ovata*, fol. ovatis, florib. solitariis. Pluck. mant. 122. t. 348. f. 4. In Virginia.  $\mathcal{T}$

13. *reptans*, pubescens, caul. fertilibus erectis simplicibus, fol. radicalibus obovatis, caulinis ovali-lanceolatis, corymbo paucifloro. Michaux p. 145. Cresc. in excelsis montibus Carol. occidentalis. Habit. quodammodo Bellidis. Corolla maxima caerulea.

14. *linearis*, fol. alternis linearibus, flor. terminalibus confertis. Cav. ic. 6. p. 17. t. 527. In urbis chilensis Talcahuano vicinis. Fol. mollia subvillosa.  $\odot$ ?

15. *biflora*, pubescens, fol. lineari-lanceolatis: interioribus oppositis, pedunc. axillaribus geminis. Flor. Per. 2. p. 17. In R. chilensis arenosis. Pedalis.  $\odot$

16. *subulata*, fol. subulatis hirsutis, flor. oppositis. Lin. Pluck. alm. 233. t. 98 f. 2. Hab. in Virginia. Cor. lobi emarginati.

17. *sibirica*, fol. linearib. villosis, pedunc. ternis. Lin. Gmel. sib. 4. p. 87. t. 46. f. 2. H. in Asia boreali. Lobi cor. rotundati.  $\mathcal{T}$

18. *setacea*, fol. setaceis glabris, flor. solitariis. Lin. Pluck. alm. t. 98. f. 2. Hab. in Virginia.

19? *pinnata*, fol. pinnatis: pinnulis linearibus angustissimis, florib. axillaribus. Cav. l. c. t. 528. Habit. in Montevideo et in N. Hispania.  $\mathcal{h}$

423. **CANTUA**. *Cal.* 1-phyllus tubulosus. *Cor.* infundibulif. 5-partita : laciniis obcordatis s. emarginatis. *Germ.* corpori glanduloso insidens. *Stigm.* 3-partitum. *Caps.* subtrigona, 3-locularis, trivalvis. *Sem.* imbricata, margine membranaceo cincta.

1. *uniflora*, fol. glabris ovatis integris (nonnullis quadrifido - dentatis), florib. solitariis. Pegiphragmos uniflorus. Fl. Per. 2. p. 18. Cantua ovata. Cav. ic. 4. p. 43. s. 363. Hab. in Peruviae sepibus.

*Obs.* Nomen vernaculum *Cantu*, unde nomen genericum ortum. Auctores Flor. Per. et Chilensis hoc genus Periphragmos denominant.

2. *dependens*, fol. obovatis acuminatis, aveniis : ramis pendulis. Flor. Per. 2. l. c. t. 133. Cresc. in Peruviae versuris.

3. *buxifolia*, fol. ovato-lanceolatis subsessilibus inferne pubescentibus, flore tubuloso, stam. inclusis. Lam. ill. gen. t. 106. f. 2 Hab. in Peru. †

4. *tomentosa*, fol. sublancoelatis sessilibus utrinque tomentosis, stam. corollae subaequalibus. Cav. ic. 6. p. 43. t. 364. In Peru. Rami tomentosi. ‡

5. *flexuosa*, fol. lanceolatis acuminatis, flor. corymbosis. Flor. Per. 2. p. 17. t. 131. In Peruviae versuris. Fol. masticata colore luteo salivam imbuunt. C. pyrifolia Lam. ? h

6. *foetida*, fol. lanceolatis glabris, pedunc. subtrifloris. Flor. Peruv. l. c. t. 132. Cresc. in umbrosis et rudertis. Fol. amara et acidula, et, uti lignum, colorem luteum praebent. h

424. **HOITZIA**. *Cal.* duplex : interior 1 phyllus, tubulosus ; exterior polyphyllus : foliolis 4 - 8 polymorphis serratis (Bractea ?) *Cor.* infundibuliformis : laciniis ovatis. *Stigma*, caps. et semina uti in Cantua.

1. *coccinea*, caule fruticoso, fol. sessilib. ovato-acutis pubescentib. Cav. ic. 6. p. 44. t. 365. H. mexicana. L. ill. Cantua Hoitzia. Willd. Sp. p. 878. Hab. passim in regno Mexicano, copiose prope Guanajuato. h

2. *caerulea*, caule suffruticoso, foliis subsessilibus linearibus spinosis : Cav. l. c. t. 366. Cum priore. *Cal.* exterior translucidus. h

3. *glandulosa*, caule suffruticoso aspero, fol. ovato-lanceolatis petiolatis : ramis sublinearibus. Cav. l. c. p. 45. t. 367. Hab. inter Actopam et Salvatierra, oppida Mexicana. Caul. villosus : villis glanduliferis. C.

*Obs.* Praeter calyc. duplicem, folia hujus generis serrata et petala non emarginata sunt. Nomen vernaculum *Huitziltzin*, ex quo nomen Hoitzia Jussiaci.

425. **GHIA**. *Cor.* infundibuliformis. *Filam.* aequalia, incisuris cor. inserta prominula. *Stigmata* 3. *Caps.* 3-locularis, polysperma. *Sem.* nuda, nec marginata.

1. *laciniata*, fol. laciniato-pinnatifidis florib. capitatis. Fl. Per. 2. p. 17. t. 123. f. 6 Hab. in Peruviae collibus arenosis.

2. *coronopifolia*, fol. lineari-pinnatifidis, seminib. cubicis. Willd. Sp. p. 879. sublantua. Ipomopsis elegans. Michaux Flor. 1 p. 141. Ipomoea rubra. Lin. Hab. in Carolina.

426. **BONPLANDIA**. *Cal.* liber, tubulosus 5-dentatus. *Cor.* subbilabiata, 5-partita : lacin. emarginatis. *Stam.* declinata. *Stigma* trifidum. *Caps.* ovato-trigona, 3-locularis, 3-sperma. *Sem.* elliptica.

1. *geminiflora*, caule herbaceo, foliis alternis lanceolatis serratis, flor. axillarib. geminis. Cav. ic. 6. p. 21. t. 532. Hab. in Nova Hispania. *Cor.* violaceo rubra. *Stam.* filiformia. ©

427. **NAVARRETIA**. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* 2 - fidum. *Caps.* membranacea, 1-locularis, bivalvis.

1. *involutrata*, fol. pinnato-multifidis. Flor. Per. 2. p. 8 Hab. in Chile umbrosis et stagnosis. ©

**CAMPANULACEAE** (gen. 428-435) distinguuntur calyce supero aut seminifero, corol. regulari campanulata aut rotata, s. uno latere fissio sublabiata : limbo 5-fido. Stamina numero sunt varia : 4-10, basi saepius dilatata germen cingentia, antheris distinctis aut connatis. Fructus inferus est aut bacca, aut drupa, aut capsula, haec 2-3-5-6-locularis. Caeterum sunt

autherhae aut passim frutices lactescentes. (Hic enumerantur genera pentandra monogyna, staminibus liberis.)

428. **CAMPANULA**. *Cor.* campanulata, fundo clauso valvis staminiferis. *Stigma* 3-5-fidum. *Caps.* infera, peris lateralibus dehiscens.

\* *Foliis laevioribus.*

1. *cenisia*, minuta, caul. unifloris, fol. ovatis glabris integerrimis sulcatis. Linn. Allion. ped. n. 9. f. 5. t. 9. f. 2. Willd. Sp. 2. p. 880. Hab. in alpinis Helvetiis inque Cenisii alpinis. Radix repens, alternatim emittens ramos terminatos fol. radicalibus. Caul. pollicares.

2. *uniflora*, caule unifloro, calyce cor. aequante. Fl. lapp. 85. t. 9. f. 5. 6. Hab. in alpinis Lapponicis.  $\mathcal{T}$

3. *Bellardi*, caule nudo unifloro, foliis petiolatis elliptico-lanceolatis dentatis. Allion. pedem. n. 9. 36. t. 85. f. 5. Hab. in alpinis Italiae.  $\mathcal{T}$

4. *pulla*, caule unifloro, foliis caulinis ovatis crenatis, cal. cernuis. Jacq. Fl. austr. 3. t. 285. Hab. in Austriae et Styriae alpinis.  $\mathcal{T}$

5. *Zoysii*, caule subtrifloro, cor. ovato-campanulatis, fol. integerrimis: radicalibus ellipticis petiolatis, caulinis sessilibus oblongis obtusis. Will. Jacq. ic. 2. t. 334. Coll. 2. p. 122. Hab. in alpinis Carniolae.  $\mathcal{T}$

6. *glauca*, fol. sessilibus ovatis serratis subtus glaucis, caule angulato paniculato, pedunc. unidioris. Thunb. jap. 88. Hab. in Japonia.  $\mathcal{T}$

7. *grandiflora*, fol. ternis oblongis serratis, caule unifloro, flore patulo. Linn. suppl. 140. Jacq. hort. 3. p. 4. t. 3. C. gentianoides, flor. turbinatis patulis, stigmatibus quinquefidis. Lam. encyc. 1. p. 524. Hab. in Sibiria, Tartaria. Caul. tener.  $\mathcal{T}$

8. *tetraphylla*, fol. quaternis oblongis serratis. Thunb. jap. 87. Habit. in Japonia. Flor. in ramis racemosi cernui.

9. *triphylla*, fol. ternis linearibus, flor. verticillato-ternis. Thunb. jap. 87. Hab. in Japonia. Radix fusiformis.  $\mathcal{T}$

10. *verticillata*, fol. floribusque verticillatis. Linn. suppl. p. 141. Pall. it. 3. p. 719. t. G. f. 1. Hab. in Davuria.  $\mathcal{T}$

11. *hederacea*, glabra, foliis cordatis quinquelobis petiolatis, caul. laxo. Linn. Flor. dan. t. 330. Engl. bot. t. 73. Hab. in An-

gliae, Galliae, Hispaniae et Daniae umbrosis, humidis. Caps. hemisphaerica.

12. *cochlearifolia*, caulibus simplicibus unifloris, fol. radicalibus cor. lato-subrotundis crenatis longissime petiolatis, caul. subpatulis, flor. cernuis. Lam. enc. 3. p. 578. W. p. 914. *C. fragilis*. Cyrilli. Borel. ic. 434. Hab. in Alpibus et Italiae montosis. Petioli apice subdilata.

13. *rotundifolia*, (decipiens) ramosissima diffusa, fol. radicalibus (cito pereuntibus) subrotundis profunde crenatis, caulinis confertis angusto-linearibus. Flor. dan. t. 855. Curt. Lond. ic. Cresc. frequens in muris, ad saxa, in versuris agrorum.

$\beta$ . *reniformis*, major, fol. radicalibus pluribus reniformibus persistentibus, caul. sparsis oblongo-lanceolatis in petiolum decurrentibus. C. rotundifolia.  $\beta$ . Lam. enc. 1. p. 578. H. in monte Cantal in Auvergne.

$\gamma$ ? *caespitosa*, ascendens late caespitosa, fol. omnibus acute serratis, inferioribus pluribus ovato-acuminatis, caulinis linearibus subsparsis. C. *caespitosa*. Scop. Lam. C. *pusilla*. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 59. Hab. frequens in Europa australi et subalpinis ad saxa, truncos putrescentes.

$\delta$ . *tenuifolia*, fol. radicalibus oblongis, caul. linearibus, caul. elongato gracilibus. Hoffm. Fl. germ. p. 100. In pratis, arvis.

14. *linifolia*, pubescens, fol. radicalibus obovato-subrotundis, caulinis linearilanceolatis subdentatis, caule subunifloro. W. p. 811. Jacq. Coll. 2. p. 81. C. uniflora, fol. integerrimis hirsutis subrotundis lanceolatis et linearibus, caule unifloro. Vill. Delph. 2. p. 500. t. 10.  $\beta$ ? C. Schreuchzeri, fol. subfalcatis lanceolato-linearibus, flore (unico) pendulo. Vill. 2. p. 503. t. 16. H. in pratis subalpinis et montosis Europae.

15. *flexuosa*, glabra, caule erecto flexuoso, ramulis confertis foliosis, fol. lanceolatis subremote serratis, flor. (parvulis) breviter paniculatis nutantibus. Michaux, Flor. 1. p. 109. Hab. in montibus altis Carolinae. Subpetalis.

16. *divaricata*, subnitens erecta, foliis membranaceis remote serratis, panicula ramulis subaphyllis divaricatis. flor. (parvulis) nutantibus. Mich. l. c. Cum priore.

17. *filiformis*, caps. bilocularibus apice dehiscens, fol. linearibus, inferioribus denticulatis, floribus terminalibus ternatis. Flor. Per. 2. p. 55. t. 200. f. 5. Hab. in aridis Concept. Chile. Flor. distantia.

18. *gracilis*, fol. linearilanceolatis ob-



saepe serratis, caule dichotomo, pedunc. terminalibus elongatis 1-floris. Forst. prol. n. 87. C. vincaeflora. Jardin de Malmaison. ic. Hab. in N. Zeelandia.

19. *pubescens*, caule hirsuto, fol. glabris: radicalibus cordatis; caulinis oblongis dentatis petiolatis. Willd. p. 894. Schum. bohem. n. 167. Habit. in rupibus sylvae Bohemicae. Facies fere C. rotundifoliae. Y. Willd. ¶

20. *Linarioides*, caul. virgatis, apice ramoso-paniculatis, fol. linearibus sparsis exiguis, flor. erectis terminalibus. Lam. enc. 1. p. 573. Hab. in Bonaria in Monte Video. Facies Antirrhini Linariae. Lin.

21. *carpathica*, foliis omnibus cordatis serratis petiolatis glabris, ramis filiformib. unifloris. Ait. Kew. 1. p. 219. Jacq. hort 1. p. 22. t. 57. Hab. in montib. Carpathicis. ¶

22. *Lobelioides*, caul. teretibus strictis glabris, fol. lineari-lanceolatis denticulatis, cor. infundibuliformibus trifidis quadrifidisque. Ait. Kew. 1. p. 219. Hab. in locis latebrosis Maderae. Cor. minutissimae albo-purpurascens. ☉

Obs. Var. cal. tripartito et quinquepartito, corol. limbo tripartito et quinquepartito, etiam stam. 3-5. Lin.

23. *porosa*, fol. radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis, caule punctato-scabro, flor. racemosis. Thunb. prod. p. 39. C. fol. lanceolatis laevibus, caule erecto sursum punctis porosis. Lin. suppl. 142. Hab. in Cap. b. spei.

24. *undulata*, fol. lanceolatis undulatis glabris, floribus racemosis, caule calycibusque glabris. Thunb. prod. 39. Hab. ad Cap. b. spei.

25. *linearis*, herbacea erecta, fol. linearibus integris glabris, flor. cernuis, caps. hispidis. Lin. suppl. 140. Hab. ad Cap. b. spei.

26. *sessiliflora*, prostrata, fol. linearibus subulatis integris, flor. axillaribus solitariis sessilibus. Lin. suppl. 139. Cum priore.

27. *patula*, foliis strictis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula, cal. denticulato. Smith brit. 1. p. 235. Engl. bot. t. 42. Flor. dan. t. 371. β. C. decurrens, fol. caulinis lanceolatis serratis decurrentibus. Lin. Fl. suec. 1. n. 178. Hab. in sylvis, arvis, pascuis, ad sepes. Fol. lactescentia, amara, subcrenata. Fl. termi. ☉

28. *Rapunculus*, radice fusiformi, fol. undulatis pilosis, radicalibus lanceolato-

ovalibus, panicula coarctata. Linn. Engl. bot. t. 281. Rapunculus esculentus. Bauh. pin. 92. In sylva, graminosis, arvis. Caul. multangulus, strictus, basi hirsutus. Cor. subparva. ☉

29. *alata*, caule simplici, foliis glabris lato-lanceolatis decurrentibus, flor. sessilib. terminalib. Desf. atl. 1. p. 178. t. 50. Hab. in Atlante prope Macane. Fol. profunde serrata.

30. *unidentata*, erecta glabra, fol. lanceolatis acutis utrinque unidentatis, panicula divaricata foliosa. Lin. suppl. 139. Hab. in Cap. b. spei. Caul. simplicissimi.

31. *fasciculata*, fruticosa erecta, fol. ovatis subunidentatis recurvis, flor. glomeratis terminalibus. Lin. suppl. 139. Thunb. prod. 39. Cum priore. ¶

32. *persicifolia*, glabra, fol. radicalib. obovatis: caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. Linn. Bull. t. 167. β. Rap. nemorosus angustifolius, magno flore. Bauh. pin. 93. Hab. in asperis, sylvaticis. ¶

33. *pyramidalis*, foliis laevibus serratis cordatis: caulinis lanceolatis, caul. junceis simplicibus, umbellis sessilibus lateralibus. Lin. Pyramidalis laevis. J. Bauh. hist. p. 808. Hab. circa Idriam et in Carniolia. Caul. ab imo ad apicem ramulos florigeros profert.

34. *americana*, fol. cordatis lanceolatisque, petioli inferioribus ciliatis, flor. secundis, corol. quinquepartitis planis. Lin. Ait. Kew. 1. p. 220. C. planiflora. Lam? Hab. in Pennsylvania. Stylus corolla longior. ☉

35. *nitida*, fol. oblongis crenatis laevigatis, caulinis lanceolatis subiniegriis, cor. campanulato-rotatis. Ait. Kew. 1. p. 221. Dodart. mem. 4. p. 119. t. 118. Habit. in America boreali. ¶

36. *lilifolia*, fol. lanceolatis: caulinis acute serratis, flor. paniculatis nutantibus. Lin. Gmel. 2b. 3. t. 26. Hab. in Sibiria, Tartaria. ¶

37. *styliflora*, fol. petiolatis subcordatis acute serratis, flor. (parvis) nutantibus, stylo longe exerto. Lam. enc. 1. p. 580. Gmel. sib. 3. t. 27. In Sibiria et Tartaria. Diversa a priore?

β? *periplocifolia*, fol. cordatis serratis longe petiolatis, caul. ascenduntibus multifloris. Lam. l. c. Cresc. cum priore, cujus varietas?

38. *limonifolia*, ramis patentibus simplicibus, fol. radicalibus ellipticis laevibus integerrimis, caulinis linearibus subulatis, flor. sessilibus ternis. Lin. Willd. 2. p. 914. Hab. in Oriente. ☉

39. *virgata*, ramis virgatis, fol. lanceolatis utrinque acutis dentatis scabriusculis, cor. profunde partitiis, flor. subspicatis sessilibus. Billard. pl. Syriac. 2. p. 11. t. 6. *Phyteuma virgata*. Willd. Sp. 2. p. 924. Habit. in Libano. ☿

40. *acuminata*, glabriuscula, caule stricto, fol. ovato-lanceolatis in longum acumen desinentibus subserratis, spica fasciculato-multiflora, cor. subulatis. Mich. Fl. 1. p. 108. Dodart mem. 4. p. 119. t. 18. In remotis occidentalis, Pensylv. et Virgin.

41. *ensifolia*, fruticosa, fol. ensiformibus serratis glabris, florib. paniculatis nutantibus. Lam. enc. 1. p. 575. Hab. in monte ignivomo insulae Borboniae. E medio rosulae foliorum assurgit caulis paniculatus sexcualis fol. sessilibus distantib. minoribus instructus. Lin. h

42. *rhomboidea*, fol. rhomboideis serratis, caulinis ovatis serratis, spica secunda, calyc. dentatis. Habit. in alpinis. ☿

43. *Alpini*, foliis lanceolatis serratis, inferioribus petiolatis, summis sessilibus, flor. nutantibus, stylo exerto. Lam. enc. 1. p. 681. Lin. Sp. 2. p. 1669. Habit. in umbrosis, humilis Italiae prope Bassano.

44. *crispa*, fol. laevibus petiolatis subcordatis duplicato - serratis incisiss, caule simplici, flor. lateralibus et terminalibus patulis. Lam. 1. c. Tournef. Cor. 3. Hab. in Armenia.

\*\*\* *Foliis scabris.*

45. *latifolia*, foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, flor. solitariis pedunculatis, fructibus cernuis. Lin. Engl. bot. t. 302. Flor. dan. t. 85. Hab. in montosis, sepibus. ☿

\* *urticifolia*, caule angulato hispido, fol. ovato-lanceolatis grosse serratis, pedunc. unifloris axillaribus cernuis, calyc. hispidis. Schmid. bohem. n.º 173. Willd. Sp. 2. p. 600. Hab. in Germaniae et Bohemiae nemoribus umbrosis. ☿

46. *Rapunculoideis*, rad. repente, fol. cordat - lanceolatis, caule ramoso, flor. secundis, sparsis, corymbis reflexis. Lin. Moris. 6. 5. t. 3. f. 32. Habit. in Helvetiae, Galliae, Angliae, Germaniae scississimis. Cal. scaber. Cor. G. Rapunculi. ☿

47. *bononiensis*, fol. ovato-lanceolatis subtus scabris sessilibus, caule paniculato. Moris. 6. 5. t. 4. f. 38. Habit. in Baldi, Lessinensium jugis, Bononia, Carniolia. Caul. halitu Verbasci nigri. ☿

48. *Vesula*, pubescens, foliis oblongis obtusis crenatis, caule unifloro. Willd. C. uniflora, fol. glabris ovalibus dentatis, caul. subnudo, cal. glabro. Allion. ped. n.º 397. t. 7. f. 1. In Italia ad radicem montis Vesu. ☿

49. *bicaulis*, hispida, caule gemino 1-floro, radice crassiuscula. Lapeyrouse Fl. Pyren. ic. In Pyreneis in monte Rancie.

50. *ptarmicaefolia*, fol. linearibus margine ciliato-serratis, flor. sessilibus erectis. Willd. p. 602. Lam. enc. 1. p. 573. Hab. in Armenia.

51. *graminifolia*, fol. lineari-subulatis, capitulo terminali. Lin. Col. phyt. 2. t. 54. Barr. ic. 332. In Italiae, Carnioliae montibus, Aprutii Salmone vicinis. Similis *Phyteumae hemisphaericae*. Caul. simplicissimi, vix foliis longiores. Linn. ☿

52. *Trachelium*, caule angulato, foliis petiolatis cordato-lanceolatis acute serratis, cal. ciliatis, pedunc. trifidis. Engl. bot. t. 12. Flor. dan. t. 1026. Hab. in sepibus et nemorosis. Fructus lacunoso-torulosus. ☿

53. *glomerata*, caule angulato simplici glabriusculo, fol. scabris oblongo-lanceolatis cordatis sessilibus, capitulo glomerato. Willd. Habit. in agris et pratis aridis, et in collibus calcareis.

\* *petraea*, caule angulato simplici, flor. sessilibus capitato-glomeratis, fol. subtus tomentosis. Lin. Allioni. t. 39. f. 1. Hab. in Baldo.

54. *Cervicaria*, hispida, flor. sessilibus, capitulo terminali hemisphaerico, fol. lanceolato-linearibus undulatis. Lin. C. caule simplici aspero, fol. lingulatis asperis, flor. capitatis. Hall. helv. n.º 636. H. in Helvetiae, Germ., Sueciae asperis sylvaticis. ☿

55. *marginata*, fol. lanceolatis undulatis serratis marginatis, ramis debilibus, flor. terminalibus solitariis. Thunb. jap. p. 89. et Ejusd. Ic. pl. jap. Dec. 3. Hab. in Japonia ad margines viarum. Caulis basi crassus, subliguosus, decumbens. Th. ☿

56. *lanuginosa*, hispida - lanuginosa, fol. ovatis rugosis crenatis in petiolum attenuatis, caule simplici, flor. subsessilibus erectis patulis. Lam. enc. 1. p. 584. An C.

peregrinalis? L. Baulh. pin. p. 4. Cervicaria  
anedia. Thal. p. 32. Hab. in Tartaria.

57. *tomentosa*, fol. radicalibus longis  
spathulatis crenatis, summis cuneiformibus,  
flor. pedunculatis subspicatis, calyce  
tomentoso. Lam. l. c. In Oriente. †

58. *argentea*, fol. oblongis angustis to-  
mentoso-argenteis, caule paniculato, ram.  
unifloris. Lam. l. c. Tourn. Cor. 3. Hab. in  
Armenia. Caps. turbinatae.

59. *thyrsioides*, hispida, racemo ovato  
oblongo terminali, caule simplicissimo,  
fol. lanceolato-linearibus. Jacq. vind. 211.  
obs. 1. p. 33. t. 21. Roth. gerin. 1. 100. Hall.  
helv. n.º 688. Hab. in alpihus et montibus  
Helvetiae, Carnioliae. Cor. favescent. ♂

60. *adpressa*, fol. lanceolatis dentatis  
tiliatis, caule erecto, panicula decompo-  
sita. Thunb. prod. 38. Lin. suppl. p. 140.  
Hab. ad Cap. b. spei.

61. *subulata*, fol. lanceolatis trigonis  
ciliatis, florib. paniculatis, caule erecto.  
Thunb. prod. 38. Ad Cap. b. spei. †

62. *hispidula*, hispida, florib. erectis,  
calyc. longitudine cor. Linn. suppl. 142.  
Hab. in Cap. b. spei. Folia linearia acu-  
minata ciliata imprimis carina. Cor. in-  
fundibuliformis. Stigma trifidum. Lin. †

63. *paniculata*, foliis lanceolatis undatis  
hirsitis, caule angulato hispido, flor. racem-  
osis. Thunb. prod. 38. Ad Cap. b. spei. †

64. *cinerea*, foliis lanceolatis integris  
glabris, caule lanato, flor. terminalibus  
solitariis. Thunb. Cum prioribus.

65. *cernua*, fol. oblongis undatis hir-  
tis, flor. terminalibus cernuis, calycibus  
glabris. Th. prod. 39. In Cap. bonae spei. †

\*\*\* *Capsulis obtectis calycis sinibus  
reflexis.*

66. *Elatines*, fol. cordatis dentatis pu-  
bescentibus, caul. prostratis, pedunculis  
capillaribus multifloris. L. Allioni. Pedem.  
t. 7. f. 1. (Fig. justo major.) Habit. in  
Europae australis alpinis. ☉

67. *velutina*, caule ascendente, fol.  
obovatis incanis mollissimis, flor. panicu-  
latis, lacin. calicis sagittatis. Desf. Atl.  
1. p. 180. t. 51. Cresc. in rupium fissuris  
prope Flemsen. Stigm. 5.

68. *capensis*, foliis lanceolatis dentatis  
hispidis, pedunc. longissimis, caps. stri-  
gosis. Lin. Com. hort. 2. p. 69. t. 35. An-  
cum sequente hujus divisionis?

69. *procumbens*, caule dichotomo dif-

fuso, fol. obovatis crenatis obtusis, flor.  
solitariis axillaribus. Linn. suppl. p. 141.  
Cresc. in Cap. b. spei humidis.

70. *Erinus*, caule dichotomo, fol. sessi-  
libus: superioribus oppositis tridentatis. L.  
Willd. Sp. 2. p. 917. Moris. S. 5. t. 3. f. 25.  
Hab. in Europa australi. Veronicam arven-  
sem refert. ☉

71. *Erinoides*, caul. diffusis, fol. lan-  
ceolatis subserratis decurrentibus linea sca-  
bra, flor. pedunculatis solitariis. Lin. Herm.  
Lugd. Bat. t. 111? In Africa. Similis Lo-  
beliae erinoidi. †

72. *diffusa*, caul. diffusis, fol. petio-  
latis serrato-dentatis lanceolatis, infe-  
rioribus cordatis, pedunc. 1-floris. Vahl.  
symb. 1. p. 18. Barr. ic. 453. In Calabria.

73. *Allionii*, capsulis obtectis, caule  
unifloro hispido, fol. lineari-lanceolatis  
undulatis hispidis. Willd. sp. p. 607. Vill.  
delph. 2. p. 512. t. 10. C. nana. Lam.  
C. alpestris. Allion. pedem. n.º 418. t. 6.  
f. 3. Hab. in alpihus Helvetiae, Galliae,  
Italiae. †

74. *caucasica*, pusilla, caps. obtectis  
3-locularibus cernuis, calic. erectis pau-  
cifloris, fol. obovatis crenatis scabris, ra-  
radice repente. Bieberstein Tableau etc.  
Cresc. in abruptis lapideis circa Kurt-  
Bulak. †

75. *ligulata*, (hungarica), fol. undu-  
latis hispidis: crenis callosis, caps. calicis  
sinibus obtectis, capitulo terminali. Ki-  
taib. Plant. rar. Hungar. p. 65. t. 64.  
Hab. in Hungariae sylvis. C. glomeratae  
similis dicitur.

76. *ligularis*, cal. sinibus reflexis, caule  
1-floro, foliis angustis lingulatis obtusis  
integerrimis. Lam. enc. 1. p. 585. In Alpib.

77. *punctata*, capsulis trilocularib. ob-  
tectis, caule simplici erecto folioso, fol.  
subpetiolatis, flor. nutantibus. Willd. flor.  
cernuis interne punctatis villosis. Lam.  
enc. 1. p. 599. Gmel. sib. 3. p. 155. t.  
30. Hab. in Siberia.

78. *Medium*, caps. quinquelocularibus  
obtectis, caule indiviso erecto folioso, flor.  
erectis. Lin. Habit. in Germaniae, Italiae  
sylvis apricis. ♂

79. *pelvisiformis*, caps. obtectis, fol. in-  
ferioribus ovatis serratis petiolatis: caul.  
subsessilibus, flore maximo pelvisiformi.  
Lam. l. c. p. 586. Tournel. Cor. 3. Hab.  
in ins. Candia. Fol. tomentosa.

80. *tubulosa*, caps. obtectis, fol. ra-  
dicalibus petiolatis ovatis inaequaliter den-

tatis basi incis, caul. oblongis serratis sessilibus, flore tubuloso. Lam. l. c.

81. *violae*, humilis, caps. obtectis, fol. radicalibus cordatis crenatis petiolatis, fl. amplis pedunculatis, cal. hispido. Lam. p. 587. (C. *violae*folia.) Hab. in Siliria?

82. *barbata*, caps. quinquelocularibus obtectis, caule simplicissimo subunifolio, fol. lanceolatis, cor. barbatis. Jacq. obs. 2. p. 14. t. 3. Hab. in alpihus Austriae, Helvetiae, Pedemontii. T.

83. *spicata*, hispida, spica laxa, flor. alternis, fol. linearib. integerrimis. C. caule simplici aspero. fol. linearib., flor. laxe et longissime spicatis. Hall. Hab. in Valesia inferiori. Tota pilis albis hispida. L. ♂

84. *strigosa*, caps. obtectis, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc. axillaribus unifloris, caule strigoso. Vahl. symb. 3. p. 34. Hab. in Oriente.

85. *alpina*, fol. ellipticis hirsutis, petiolis alaribus unifloris, flor. glabris. Hall. belv. n. 4. 665. Jacq. austr. 2. t. 1. 118. Hab. in alpihus Schneeberg, Helvetiae. Tota flavescens. Folia lineari-oblonga, integra. Linn. T.

\* *longifolia*, hispida, caule simplice, pedunc. axillaribus 1-floris: flor. erectis, fol. linearibus subcrenatis longissimis. Lapeyrouse. Flor. Pyren. ic. Hab. in monte Rancie in Pyreneis.

86. *mollis*, caps. 5-locularibus obtectis pedunculatis, caule prostrato, fol. suborbiculatis. Linn. Bocc. mus. t. 145. Barr. t. 759. Hab. in Italia, Hispania.

\* *dichotoma*, caps. 5-locularibus obtectis, caule dichotomo, flor. cernuis. Sp. p. 237. Willd. p. 910. Moris. s. 5. t. 3. f. 26. Desf. atl. t. p. Barr. ic. 759. Hab. in Syria et Barbaria.

87. *saxatilis*, caps. 5-carinatis obtectis, flor. alternis nutantibus, fol. obovatis crenatis. Bocc. mus. 2. p. 76. t. 64. Hab. in Cretae scopulis saxosis.

88. *alliariefolia*, caps. obtectis, flor. radicalibus reniformibus duplicato-dentatis, caulinis ovatis dentatis sessilibus. W. l. c. Hab. in Oriente. Fol. radicalia facie Erysimi Alliariae. W.

89. *heterophylla*, fol. subovatis glabris integerrimis, caul. diffusis. Linn. Lam. enc. t. p. 589. Camp. saxatilis, fol. inferioribus bellidis, caeteris Nummulariae. Tournef. iter. 1. p. 243. In insulis Archipelagi.

90. *parviflora*, cal. sinu reflexo, caule superne ramoso, foliis radicalibus longe petiolatis obovatis crenatis, caulinis ovato-lanceolatis incis, flor. paniculatis. Lam. l. c. Tourn. Cor. 4. In Oriente.

91. *lyrata*, hispida, caps. obtectis, fol. radicalibus longis petiolatis lyratis: lobo terminali cordato, flor. erectis subsessilib. Lam. l. c. Mor. s. 5. t. 3. f. 31. Vid. Camp. tomentosa. Vent. Hort. Cels. p. 18. t. 18. Cum priore.

92. *sibirica*, caps. 3-locularibus obtectis, caule paniculato. Gmel. sib. 3. p. 154. t. 29. Jacq. austr. t. 200. Hab. in Sibiria, Austria. Flor. oblongi, parvi. ♂

93. *tridentata*, caps. 5-loculari obtecta, caule unifloro, fol. radicalibus tridentatis. Schreb. dec. 3. t. 2. Habit. in Oriente. Fol. radicalia Statices reticulatae. Flos majusculos. T.

94. *laciniata*, caps. obtectis pedunculis, fol. serratis: radicalibus lyratis, caulinis lanceolatis. L. Hab. in Graecia, Libano. Similis Michauxiae. W.

95. *stricta*, caps. obtectis, fol. hirtis: caulinis lanceolatis serratis, caule simplicissimo, flor. sessilibus. L. Hab. in Syria, Palaestina.

96. *aurea*, frutescens, caps. 5-locularibus, stigmatibus quinquefidis, caule paniculato, fol. duplicato serratis. Lin. supp. 141. In insulae Maderae rupibus. Niüda. Flor. flavesc.

\* *LEGUMINA. Corol. subhypocrateriformis. Stig. 2-3-fidum. Caps. longissima, prismatocylindrica, 2-3-locularis, polysperma. Prismaticarpus. L'Herit. Scrt. angl. p. 1.*

97. *interrupta*, fol. subulatis ciliatis, ramis floriferis superne interruptis aphyllis. L'Her. sub Prismatico corpore cum sequentibus. Hab. ad Cap. b. spei.

98. *ericoides*, paniculata, fol. subulatis subciliatis, panic. longis pedunculatis. L'Her. l. am. ill. 2. p. 63. Polemonium Roeloides. Lin. suppl. 1. C. subulata. Th. Prodr. p. 38? C. hispida. Linn. suppl. Cum priore.

99. *altiflora*, fol. subulatis subciliatis confertissimis, pedunc. longissimo aphylo, germ. tomentosis. L'Her. l. c.

Obs. Tres hae enumeratae species Lepidium subulatum refert. L'Her.

100. *fruticosa*, fol. lineari-subulatis muticis, panic. terminali pedunculata, caule

caule fruticoso. L'Herit. Willd. Spec. 2. p. 912.

101. *plicata*, fol. linearibus undulatis, caule prolifero laxo ramoso, germ. longissimis. Prism. crispus. L'Her. Habitu C. undulatae.

102. *Prismatocarpus*, foliis lanceolatis glaberrimis, flor. terminalibus sessilibus, cor. cal. duplo longioribus. Prism. nitidus. L'Her. C. Prismatocarpus. Ait. W. p. 913.

103. *Speculum*, (arvensis) caule ramosissimo diffuso, fol. oblongis subcrenatis, florib. solitariis majusculis patulis. Curt. mag. t. 108. Willd. Spec. p. 912. Legousia arvensis. Durande Flor. de Bourgoigne t. p. 37. (qui primus hanc plantam sub nomine inditio ut diversum genus a Campanulis removit.) Habi in agris, ad versuras viarum. Cor. fundo squamulis destituta (?) Dur.

104. *hybrida*, caule stricto basi subramoso, fol. oblongis subundulatis crenatis, calycib. corol. subclandestina longioribus. Lin. Moris. s. 5. t. 2. f. 22. Cresc. minus frequens cum priore, in locis calcaris.

105. *Pentagonia*, caule ramosissimo, fol. linearibus acuminatis, cal. pilosis cor. breviorib. Lin. L'Her. l. c. Hab. in Thracia. Cor. rotata.

106. *biflora*, caps. 3-locularibus, fol. late ovatis crenatis sessilibus, flor. binis axillaribus sessilibus. Flor. Per. 2. p. 55.

t. 200. Hab. in Peruviae arenosis. Cal. 3-5-partitus. Sequentem refert.

107. *perfoliata*, (amplexicaulis), caule simplici, fol. cordatis crenatis amplexicaulis, florib. axillarib. sessilib. glomeratis. Lin. Moris. s. 5. t. 2. f. 23. C. amplexicaulis. Michaux Flor. 1. p. 108. Habit. in Amer. borealis cultis.

429. *LIGHTFOOTIA*. Cal. 5-phyl-lus. Cor. 5-petala, fundo clausa valvis staminiferis. *Stigma* 3-5-fidum. *Caps.* 3-5-locularis; 3-5-valvis semisupera.

1. *subulata*, fol. subulatis, petalis linearibus. L'Her. Sert. p. 4. t. 5. Willd. sp. p. 882. Campanula capillacea. Lin. suppl? Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *oxycoccoides*, fol. petalisque lanceolatis. L'Her. l. c. t. 4. Lobelia tenella. Lin. Mant. Hab. cum priore. Ram. filiformes prostrati. h

*Obs.* Hoc et sequens genus Campanulis nimis affinia, cum valvis staminiferis, caractere generi Campanulae aequae essentiali, ac nectarium Ranunculis, cum Campanulis conveniunt.

430. *ROELIA*. Cor. infundibuliformis: fundo clauso valvulis staminiferis. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* sub 2-locularis, cylindrica, infera. (Caps. 1-locularis apice pervia. Gärtn.)

1. *ciliata*, fol. lanceolatis ciliatis, flor. solitariis terminalibus. Thunb. prodr. 38. Willd. Sp. 1. p. 918. Lam. ill. t. 123. f. 1. Hort. cliff. 492. t. 35. Comm. hort. 2. p. 77. t. 39. Habit. in Mauritania, Aethiopia et Cap. b. spei.

2. *squarrosa*, fol. ovatis dentatis ciliatis, flor. terminalibus aggregatis. Th. R. filiformis. Lam. ill. p. 66. t. 123. f. 2. Habit. ad Cap. b. spei, cum sequentibus. h

3. *decurrentis*, foliis lanceolatis ciliatis decurrentibus, pedunc. longissimis axillarib. Ait. Kew. 1. p. 226. L'Her. sert. angl. p. 4. t. 6. Andrew. t. 238. ☉

4. *muscosa*, fol. ovatis dentatis reflexis glabris, flor. terminalibus solitariis. Thunb. Lin. suppl. 143. ☉

5. *spicata*, fruticosa erecta, fol. lanceolatis integris ciliatis, flor. terminalibus subspicatis. Lin. suppl. 143. h

431. *PHYTEUMA*. Cor. primo tetrati-conica, dein 5-partita: laciniis linearibus laxis. *Stigma* 2-s. 3-fidum. *Caps.* 2-6. 3-locularis infera.

\* *Floribus capitato-spicatis.*

1. *pauciflorum*, capitulo subfolioso, fol. omnibus lanceolatis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 919. Rapunculus fol. ovatis, obtuse dentatis, bracteis maximis obtusis. Hall. helv. n°. 680. Hab. in alpinis Helveticis, Syriacis. Stylus saepius bifidus. h

2. *Scheuchzeri*, capitulo subfolioso, bracteis linearibus capitulo longioribus, fol. lanceolatis dentatis. Willd. l. c. Allion. pedem. n°. 428. t. 39. f. 2.

β. Ph. *Scorsonerifolium*, fol. omnibus oblongis laeviter crenatis, supremis linearibus, spica oblonga. Vill. delph. 2. p. 519. t. 12. f. 2. Hab. in alpinis Helveticis et Pyrenaeis, et in Delphinatus. h

BIBLIOTECA

3. *Michellii*, capitulo subrotundo, bracteis oblongo-lanceolatis, fol. linearibus rigidis subintegerrimis. Willd. Ph. spica oblonga, fol. linearibus lanceolatis sub integerrimis. Allion. ped. n.º 427. t. 7. fig. 3. Habit. in monte Cenisio et in alpidibus Hetruriae et Valesiae. ¶

4. *hemisphaericum*, capitulo subrotundo, bracteis ovatis ciliatis, fol. linearibus subintegerrimis caule vix breviorib. Willd. Jacq. collect. 2. p. 6r. Ic. rar. vol. 2. Hab. in Helvetiae, Italiae, Austriae, Hassiae, Pyrenaeis montibus et pratis.

5. *comosum*, fasciculo terminali sessili, fol. dentatis: radicalibus cordatis. Linn. Barr. ic. 889. Jacq. austr. app. t. 50. Hab. in Baldi, Carniolae et Tyrolensibus montibus. ¶

6. *orbiculare*, capitulo subrotundo, fol. serratis: radicalibus cordatis. Linn. Engl. bot. t. 142. In alpidibus et pratis.

¶ *lanceolata*, fol. omnibus oblongo-lanceolatis. Willd. Vill. Dauph. 2. p. 517. t. 12. f. 1.

¶ *ellipticum*, fol. omnibus oblongo-ellipticobus. Willd. Vill. p. 922. t. 11. f. 2.

\* *Charmelii*, capitulo rotundo, fol. radicalibus cordatis subdentatis, caulinis linearibus integerrimis. Vill. l. c. t. 11. fig. 3. In rupestribus calcareis. Planta antisyphilitica.

7. *nigrum*, capitulo ovato, bracteis serratis, fol. simpliciter dentatis, radicalibus cordatis, caulinis lanceolatis amplexicaulis. Willd. Schmidt. bohem. t. n.º 189. Hab. in pratis nemoribusque circa thermas Carolinas. ¶

8. *betonicaefolium*, spica oblonga, fol. simpliciter crenatis, radicalibus lanceolato-cordatis, caulinis lanceolatis. Willd. fol. cordatis oblongis crenatis, spica oblonga. Vill. 518. t. 12. f. 3. Hab. in montibus Delphinatus. ¶

9. *spicatum*, spica elongata, stylis pilosiusculis trifidis, fol. radicalibus cordatis duplicato-dentatis. Willd. Flor. dan. 362. Hab. frequens in sylvaticis. Flores albi.

¶ ? *Rapunculus*, rad. repente crassiuscula, fol. radical. cordatis petiolatis, caulinis oblongis sessilibus, spica ovata. Ph. ovalis. Hoppe. Cresc. vere in sylvis. Fl. violacei.

10. *ovatum*, spica ovata, stylis hirsutis flore longioribus emarginato-bifidis, fol. radicalibus cordatis duplicato-dentatis,

W. Schmidt. Fl. bohem. t. n.º 190. Ph. Halleri. Allion. Hab. in pratis subalpinis Sudetorum, Bohemiae, Helvetiae et Pedemontii. ¶

### \* Flor. axillaribus sparsis.

11. *Lobelioides*, fol. linearibus lanceolatis denticulatis hispidis, caule paniculato flor. geminis pedunculatis sparsis. Willd. phytog. t. n.º 20. t. 4. f. 2. Hab. in Armenia.

12. *lanceolatum*, fol. linearibus lanceolatis tenuissime denticulatis scabris, caule basi ramoso, ramis simplicissimis foliosis, flor. sparsis geminatis sessilibus. Willd. l. c.

¶ ? *canescens*, fol. sessilibus inferioribus obovatis serratis, superioribus lanceolatis integerrimis, flor. axillaribus racemosis. Plant. rar. Hungar. p. 12. t. 14. In Hungariae montibus apricis.

13. *rigidum*, foliis linearibus lanceolatis obsolete denticulatis glabriusculis, caule simplicissimo folioso, flor. sparsis, pedunc. trifloris. W. Hab. in Oriente.

14. *amplexicaule*, fol. amplexicaulis cordatis ovatis, duplicato-serratis, floribus sparsis. W. Hab. in Oriente.

PETROMARULA. Cal. 5-fidus. Cor. primo ovata, dein 5-partita: laciniis reflexis. Filum. basi dilatata. Stig. capitatum simplex. Germ. gloiosum. Caps.

15. *pinnata*, foliis pinnatis, racemo composito. Vent. Hort. Cels. p. 52. t. 52. Linn. Willd. Sp. p. 925. Rapunculus creticus, Petromarula. Bauh. hist. 2. p. 811. t. 812. Hab. in Creta, Oriente, ubi ad muros et rupes frequens crescit.

Obs. Habitu et filamentis cum Campanulae genere, cor. rotata, quamvis facie aliena, cum Phyteumate convenit; sed ab utroque stylo crasso et stigm. simplice capitulo differt, quare non male ut diversum genus constitui posset.

432. FORGESIA. Cal. turbinatus, 5-fidus. Petala 5. Stigma 2-lobum. Caps. seminifera, stylo 2-partito acuminata. Caps. 2-locularis, polysperma.

1. *borbonica*. Desforgia. Lam. ill. p. 69. t. 125. Forgesia. Juss. gen. p. 183. Habit. in ins. Borbonia. Arbor. Fol. lanceolato-ovata, serrata. Escalloniae Smish affinis. Lam.

433. TRACHELIUM. Cor. infundibuliformis. Styl. longus. Stigma

*globosum. Caps. trilocularis, infera.*

1. *caeruleum*, ramosum erectum, fol. ovatis serratis planis, flor. corymbosis. L. Willd. Sp. p. 926. Barr. ic. 683. 684. Hab. in Italiae et Orientis umbrosis. ♂

2. *diffusum*, ramosissimum diffusum, ramis divaricatis recurvis, foliis subulatis. Linn. suppl. 143. Habit. ad Cap. bon. spei.

3. *angustifolium*, erectum, fol. linearibus sessilibus integerrimis glabris. Schousb. maroc. 1. p. 85. in montosis aridis prope Tezzam.

4. *tenuifolium*, erectiusculum, foliis linearibus ciliatis hispidis. L. Hab. ad Cap. b. spei.

434. *GOODENIA. Cor. labiata, 5-fida, undulata, longitudinaliter fissa, genitalia exserens. Anth. lineares. Stigma urceolatum ciliatum. Caps. 1-2-locul. 2-valv. polysperma, dissepimento parallelo. Sem. imbricata.*

1. *ovata*, fol. ovatis denticulato-serratis glabris, pedunc. 3-floris, caps. lineari. Smith. Act. Soc. Linn. Lond. 2. p. 347. Willd. Sp. 2. p. 954. Vent. Hort. Cels. 1. 3. Andrew. t. 68. Hab. in Nova Hollandia cum omnibus sequentibus.

2. *paniculata*, fol. obovato-lanceolatis dentatis corollisque pilosis, caule nudiusculo paniculato. Smith. Act. Soc. Lin. p. 348. Cav. ic. 6. p. 5. t. 507?

3. *bellidifolia*, fol. obovatis denticulatis carnosis, caule nudiusculo spicato, cor. extus hirsuta, fructu quadrivalvi. Smith. l. c. p. 349. Flor. flavi.

4. *calendulacea*, fol. integerrimis obovatis crassis scabris, flor. axillaribus caeruleis. Andrew. Repos. t. 22. Var. sequentis?

5. *stricta*, fol. lanceolatis integris dentatis carnosis glabris, cor. extus hirsuta, stigmate ore contracto. Smith. l. c. Hab. in Novae Hollandiae locis humidis. Flores caerulei.

6. *heterophylla*, fol. integris dentatis lobatisque pilosis, fructu subrotundo, cor. nudiuscula. Smith. l. c. Cav. ic. 6. t. 508.

7. *hederacea*, fol. subrotundis integris quinquelobisve, cor. extus lanata, caule prostrato. Smith. l. c.

8? *radicans*, caule repente, fol. spatulatis. Selliera radicans. Cav. ic. 5. p. 49. t. 474. f. 2. Habit. in humidis maritimis Chiloe et in valle Chilensi prope Coquimbo.

Obs! Ob semina imbricata marginata, uti in quibusdam Goodeniis, hanc plantam, sed dubitanter, huc retuli, cum auctor de natura pericarpium adhuc incertus sit.

435. *SCAEVOLA. Cor. 1-petala: tubo longitudinaliter fissis. Limbo 5-fido laterali. Drupa infera, 1-sperma. Nux 2-locularis.*

1. *Lobelia*, fol. obovatis glabris integerrimis. Vahl. symb. 2. Lam. encycl. t. 124. f. 1. Willd. Sp. 2. p. 955. Lobelia Plumieri. Lin. Jacq. amer. Catesb. car. 1. p. 79. t. 79. Hab. in Indiis. h

2. *Koenigii*, fol. obovatis glabris superne dentato-subrepandis, calyce quinque-dentato. Vahl. symb. 3. p. 36. Lam. ill. t. 124. f. 2. Hab. in India orientali. h

3. *sericea*, fol. obovatis villosis mollissimis, superne dentatis. Vahl. symb. 2. p. 37. Habit. in Sauvage Island.

4. *laevigata*, fol. alternis obovatis dentatis glabris, fructu minimo. S. microcarpa. Cav. ic. 6. p. 4. t. 509. Goodenia laevigata. Curt. Mag. t. 287. Cor. dilute violacea.

5? *albida*, stylo cauleque piloso. Sm. Act. Lin. 2. p. 348. Willd. Sp. p. 954. sub Goodenia. Hab. ad portum Jackson in N. Hollandia.

6. *hispida*, fol. lineari-lanceolatis hispidis, inferioribus dentatis, stylo apice hirsuto, cor. extus pilosa. Cav. l. c. p. 7. t. 510. Goodenia ramosissima. Smith. l. c. Cum priore. Cor. pariter dilute violacea.

RUBIACEAE ( Gen. 436-474 ) constituent ordinem plantarum valde naturalem et generum ditissimum. Plurimae sunt fruticosae aut etiam herbaceae; folia in his verticillata, in illis opposita, integerrima, stipulis aut vagina ciliari distincta. Flor. plurimum fragrantis, nonnullae odore sunt ingrato. Cor. tubulosa s. infundibuliformis. Staminum numerus valde variat, maxima parte 5 sunt, plura 4 ( talia genera in antecedente classi occurrunt ), rarius 6 aut plura. Fructus inferus, natura varius: nunc dicoccus s. semina nuda referens, nunc capsularis, plerumque baccatus, passim drupaceus, limbo calycis in plurimis coronatus, 1-2-aut multilocularis. Embryo

(*Corculum* Juss.) oblongus, tenuis, perispermio (albumine. G.) magno corneo involutus. Plura rubiacea genera (quod etiam in omni ordine valde naturali locum habet) inter se nimis affinis aegre distinguuntur.

436. *CINCHONA*. *Cal.* campanulatus, 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5-partito ut plurimum hirtio. *Caps.* oblongo-teres, 2-locularis, 2-partibilis: dissepimento parallelo. *Sem.* numerosa, compressa margine membranaceo cincta.

\* *Staminibus inclusis.*

1. *officinalis*, fol. ovato-lanceolatis glabris, caps. oblongis. Vahl. in Act. Soc. Hist. nat. Haf. 1. p. 17. t. 1. Willd. Sp. 2. p. 957. Lam. enc. t. 64. f. 1. Habit. in Loxa Peruviae. Panicula terminalis; patens trichotoma. Caps. semipollicaris, lineis obcuris elevatis. Vahl. h

2. *pubescens*, fol. ovatis basi elongatis subius pubescentibus, caps. cylindricis. Vahl. l. c. p. 19. t. 2. Hab. in Peru. h +

3. *macrocarpa*, foliis obovatis subius pubescentibus costatis. Vahl. l. c. p. 20. t. 3. C. *officinalis*. Linn. suppl. 144. Hab. in regno Santa-Fé. Rami villosi-tomentosi. *Cal.* campanulatus pubescens. *Cor.* coriacea pilis adpressis tomentosa. Caps. bipollicaris. h

\* *nitida*, fol. obovatis nitidis, panic. brachiata, cor. albo-purpureis, limbo parum hirsuto. Flor. Per. 2. p. 50. t. 191. Ruiz. quinol. art. 2. p. 56. Hab. in Andium montibus altis, nemorosis, frigidis et in pluribus aliis locis in Peruvia. Fol. glabra, subius venosa.

*Obs.* Antifebrilis, tonica et antiseptica est. In provincia Huanac Tarmae, Huamalis et Xauxae pro genuino cortice Peruviano, majorique pretio quam reliquae species venditur. An peculiaris species?

4. *hirsuta*, fol. ovalibus crassis margine reflexis, supra nitidis venosis, subius pubescentibus: terminalibus subcordatis, flor. corymbosis (purpurascensibus.) Fl. Per. 2. p. 57. t. 192. Cresc. cum priore, cum qua eodem pretio aestimatur. Caps. obscure purpurea, exsiccatione atra. h

5. *purpurea*, fol. oblongo-ovalib. ovatisq. (purpurascensib.) panic. brachiata magna, fl. subcorymbosis, cor. albo-purpureis, limbo hirsuto albo. Flor. Per. 2. p. 52. t. 193.

In Andium montibus imis nemorosis. Caps. oblonga angusta.

6. *ovata*, fol. ovatis subius tomentosis, panic. brachiata, florib. subcorymbosis. Flor. Per. l. c. t. 195. Cresc. in Andium montibus imis nemorosis calidis versus Pozuzo et Pano. Fol. subius venis purpurascensibus. Cor. pubescens limbo patente albo. h

7. *lanceolata*, fol. lanceolato-oblongis glabris, panic. brachiata magna, flor. subcorymbosis. Fl. Per. 2. p. 51. In Andium montib. frigidis et nemorosis. Cor. roseo-purpurea, limbo hirsuto. Cort. extus fuscus, intus lutescens.

8. *magnifolia*, fol. oblongis ovalibusque glabris, panic. brachiata, flor. subcorymbosis, cor. albae limbo villosiusculo. Flor. Per. 2. p. 53. t. 196. Cresc. in Andium nemorib. calidissimis prope torrentes. Cor. odorata uti Citrus Aurantium. Arbor fere 40-ulnaris, coma valde frondosa, erecto patens. Caps. oblonga magna.

9. *acutifolia*, fol. ovatis acutis, panic. terminalibus brachiatis, cor. candidis glabris. Flor. Per. 3. p. 1. t. 225. Hab. in Peruvia Andium nemorosis. Filam. medio tubi inserta; Anth. inclusae. Capsula turbinata.

10. *micrantha*, fol. ovalibus obtusis, panic. maxima, flor. nemorosis parvis, cor. albae limbo lanato. Flor. Per. 2. p. 52. t. 194. Cum priore in montibus altis frigidis. Arbor 23-ulnaris.

11. *glandulifera*, fol. ovato-lanceolatis supra glandulosis, panic. subcorymbosis, cor. albedo-roseis limbo lanuginoso. Flor. Per. 3. p. 1. t. 224. Cresc. in locis saepe memoratis. Frutex 2-orgialis.

12. *dichotoma*, fol. oblongo-lanceolatis, pedunculis terminalibus dichotomis paucifloris, caps. angustis linearib. longis. Flor. Per. 2. p. 53. t. 197. Cort. fuscus, maculis albis variegatus, amarissimus.

13. *rosea*, fol. oblongis obtuse acuminatis, panic. brachiata, flor. corymbosis, cor. fauce glabra, limbo margine tomentoso. Flor. Per. 2. p. 54. t. 199. In Andium nemoribus imis, copiose ad Pozuzo etc. tractus. Filam. basi hirsuta, infra medium tubi inserta. Anth. parum exsertae. Fol. palmaria, nitida, a formicis quibusd. exiguis avide appetuntur.

\*\* *EXOTEXA. Staminibus exsertis.*

14. *philippica*, fol. ovatis glabris, flor. corymbosis, pedunc. trifidis, anth. exer-



*tis.* Cav. ic. 4. p. 15. t. 329. Hab. prope Manila in St. Cruz. Née. Arbor humilis.

15. *longiflora*, pedunc. axillaribus 1-floris, fol. lineari-lanceolatis glabris, cor. tubo longissimo. Lambert de Cinchona. p. 38. t. 12. C. caribaea. Journ. de Phys. Oct. 1790. p. 243. l. 1.

*Obs.* Cinchona *spinosa* ejusdem auctoris hoc ad genus non pertinere videtur.

16. *caribaea*, foliis ovato-lanceolatis, pedunc. axillaribus terminalibusque unifloris, stamin. exertis. Swartz. obs. 72. Jacq. amer. Cinchona jamaicensis. Wright. in Act. angl. vol. 67. p. 504. t. 10. H&K. in Caribaeis. h

17. *corymbifera*, fol. oblongo-lanceolatis, corymbis axillaribus. Linn. suppl. 144. Forst. in Act. ups. nov. 3. p. 176. Habit. in ins. Tongatabu et Eaove maris pacifici. Folia palmaria saturate viridia, nervo subtus purpureo. Corymb. trichotomus magnus. h

18. *lineata*, panic. terminali, fol. ovatis acuminatis glabris lineatis, caps. pentagonis. Vahl. l. c. p. 22. t. 4. Habit. in St. Dominica. h

19. *floribunda*, panic. terminali, caps. turbinatis laevibus, fol. ellipticis acuminatis. Vahl. p. 23. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 375. Lam. enc. t. 164. f. 2. Cinchona montana. Badier. Roz. Journ. de Phys. Feb. 1789. p. 129. Ust. et Roem. Mag. de Bot. 6. p. 98. t. 3. Hab. in Jamaica, Hispaniola, St. Lucis, Dominica et Guadeloupe locis montosis et ad torrentum ripas. h

20. *brachycarpa*, panic. terminali, caps. obovatis costatis, foliis ellipticis obtusis. Vahl. p. 24. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 378. Hab. in montibus umbrosis Jamaicae occidentalis. Caps. obovata lincis 10 elevatis costata. Vahl.

21. *angustifolia*, flor. paniculatis glabris, caps. oblongis pentagonis, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 380. et in Act. holm. 1787. p. 117. t. 3. Lam. t. 164. f. 3. Hab. in Hispaniola ad ripas petrosas fluviorum. h

*Obs.* Auctores Florae Peruvianae, vol. 2. p. 49. de speciebus hujus subdivisionis censent, eas ad genus, *Portlandia* referri debere.

437. COSMIBUENA. *Cal.* deciduus, 5-dentatus. *Cor.* tubus longissimus: limbo reflexo obliquo glabro. *Stam.* infra faucem inserta.

*Caps.* apice bivalvis; valvulis involutis subbilocularis. Recept. lamellata hinc valvulis adpressa, inde seminifera. *Sem.* ovalia, cincta ala lineari reticulata.

1. *obtusifolia*, fol. ovalibus obovatisque obtusis, flor. corymbosis. Flor. Per. 3. p. 3. t. 198. Cinchona grandiflora. Flor. Per. 2. p. 53. Cresc. ad Pozuzo ripas. *Cor.* candida, fragrantissima. Arb. 3-orgyalis.

2. *acuminata*, fol. ovalibus acuminatis, flor. solitariis sessilibus. Flor. Per. l. c. p. 4. t. 226. Hab. in Peruviae Andium nemorosis imis. Arbor 5-ulnaris.

438. PINKNEA. *Cal.* laciniae inaequales: 1-2 bractaeformibus magnis. *Cor.* longe tubulosa. *Filam.* basi tubi inserta. *Caps.* superne 2-valvis: valv. medio septiferis. *Sem.* alata, transverse invicem superposita.

1. *pubescens*, fol. ovalibus subtus subtomentosis, flor. fasciculato-paniculatis. Michaux Flor. 1. p. 105. Hab. ad Georgiae ripas fluvii St. Mariae. Subarborescens. Cinchonae affinis.

439. PORTLANDIA. *Cal.* 5-phyl-lus. *Cor.* clavato-infundibuliformis: laciniiis patenti-deflexis. *Caps.* 5-gona, retusa, coronata, 2-locularis, 2-valvis: valv. duplicatis 2-fidis, polysperma.

1. *tetrandra*, flor. tetrandris. fol. obovatis. Forst. prod. n.º 86. Willd. Sp. 2. p. 935. Lin. suppl. 143. In insula Savage Island maris pacifici. *Cor.* tetragona. h

2. *graniflora*, flor. pentandris, foliis lanceolato-ellipticis. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 385. Smith. ic. pict. l. p. 6. t. 6. Brown. jam. 164. t. 11. f. 1. Habit. in Jamaicae rupibus calcareis. *Cor.* Datu-rac. h

3. *coccinea*, florib. pentandris, foliis ovatis coriaceis. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 384. Hab. rarius in Jamaicae occident. praecipitiis montium. h

4. *corymbosa*, flor. corymbosis, fol. ovatis acutis lanceolatisque, stipulis subovatis, flor. pentandris. Flor. Peruv. 2. p. 49. t. 100. f. 2. Habit. in Andium praeruptis, locis calidis. *Cor.* calyce 4-pto longior. h

440. *DANAIS*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: fauce villosa. *Stylus* apice bifidus. *Caps.* globosa, umbilicata, 2-locularis, apice 2-valvis, polysperma. *Sem.* margine membranaceo. (Genitalia exerta.)

1. *fragens*, (denudata), fol. lanceolatis, flor. dioicis, caps. calyce deciduo denudatis. *Paederia fragrans*. Lam. enc. 2. p. 257. t. 166. f. 2. Willd. Sp. 2. p. 1219. Hab. in ins. Madagascaria, Mauritania et Borbonia. Planta scandens, uti sequentes. Rad. rubra.

2. *coronata*, capsul. laevibus calyce persistente coronatis. An distincta species?

3. *sulcata*, fol. ovatis, caps. sulcatis cal. subfoliaceo coronatis. In ins. Mauritania, ubi altissimas arbores scandit. h

*Obs.* Vidi has species in Herbario dom. Aubert du Petit Thouars, qui eorum characteres ex observationibus in locis natalibus institutis mecum communicare voluit. Hoc genus *Cinchonis* affine et ab iis caps. globosis praecipue differt.

441. *GENIPA*. *Cal.* tubulosus aut turbatinatus subinteger. *Cor.* hypocrateriformis, limbo magno 5-partito. *Anth.* in fauce sessiles exertae. *Stigma* clavatum, integrum s. simplex. *Bacca* (magna) carnosa, apice attenuato-truncata, 2-locularis, polysperma.

1. *oblongifolia*, fol. oblongo-ovatis subsessilibus, racemis terminalibus. Flor. Per. 2. p. 67. t. 220. f. 2. Hab. in Peruv. Andium nemorib. imis calidis. Bacca mali persici magnitudine, ex cujus pulpa et seminibus Indi colore nigro persistente faciem manusque inficiunt. Etiam lignum, colore roseum, utilissimum est.

2. *americana*, (grandifolia), foliis lanceolatis subsessilibus integris Lin. *Gardenia Genipa*. Swartz. obs. p. 84. Willd. Sp. 2. p. 1228. Plum. Sp. ic. 136. Hab. in Amer. meridionali. Arbor, florens Junio. Fruct. citri magnitudine, edulis.

*Obs.* Hoc genus a *Gardeniis* inter alia stigmate clavato nec bilamellato distinguendum, hinc omnes *Gardeniae* tali gaudent stigmate, huc referri debent. An hujus generis *stylocoryna*. Cav. ic. 6. p. 21. t. 436?

3. *Merianae*, tota hirsuta, fol. oblongo-

obovatis, florib. in summitate congestis, fructu depresso-globoso. Richard in Act. Soc. Nat. Paris. p. 107. Huc *Duroia Ericipila*. Lin. suppl. Hab. in Cayenna.

4. *edulis*, glaberrima, foliis oblongis, flor. in summitate congestis, plurimumque 4-fidis; fructu globoso laevi. Richard l. c. Cum priore.

442. *GARDENIA*. *Cal.* laciniae verticales aut obliquae. *Cor.* primo contorta, infundibuliformis 5-quadrida: tubo saepius longo. *Stylus* elevatus. *Stigma* bilobum. *Bacca* 2-locularis, polysperma. *Sem.* duplici serie disposita. *Antherae* ori tubi insertae.

\* *Inermes.*

1. *radicans*, inermis, fol. lanceolatis, cor. hypocrateriformibus obtusis, calyce angulato, caule radicante. Willd., Sp. 2. p. 1225. Thunb. Diss. de *Gardenia* n.º 1. t. f. 1. et ejusd. Diss. acad. 2. p. 4. Hab. in Japonia. h

2. *Florida*, inermis, fol. ellipticis, cor. hypocrateriformibus, calycinis laciniiis verticalibus lanceolato-subulatis. Ait. Kew. 1. p. 293. Lin. suppl. 163. Ehret. pict. t. 15. Rumph. 7. t. 14. f. 2. Habit. in India orientali, Surate, Amboina et Cap. bonae spei. Flor. solitarii, magni, odori. h

3. *longiflora*, inermis, fol. lanceolatis, cor. longissimis hirsutis acutis, bacca cylindrica. For. Peruv. 2. p. 67. t. 210. f. 2. Hab. in Andium nemoribus imis calidis ad Pozo. Frut. 2. orgyalis, valde ramosus. Bacca lutea, 1 1/2 palmaris, pulpa dulci eduli.

4. *tubiflora*, inermis, fol. ellipticis undulatis, flor. ternis, cor. lacinis linearibus reflexis: tubo filiformi longissimo. Andr. t. 183. Hab. in Sierra Leone. Odor fragrantissimus.

5? *Thunbergia*, inermis, foliis ellipticis utrinque acuminatis, cor. hypocrateriformibus, cal. latere rumpentibus, laciniiis apice dilatatis cucullatis. Ait. Kew. 1. p. 294. Thunb. Diss. de *Garden*. n. 3. *Thunbergia capensis*. Mont. Act. holm. 1773. p. 282. t. 11. Habit. ad Cap. b. spei et in Manilla. Cal. appendiculatus laciniiis cucullatis. Cor. limbus planus decempartitus. Filam. 6. Anther. 9. s. 10. Stigma oblique truncatum, 5-sulcatum, sulcis reflexis emarginatis. An potius peculiare genus?

6. *fatifolia*, inermis, fol. obovato-sub-

rotundis, cor. hypocrateriformibus, laciniis calycinis subulatis obtuse carinatis. Ait. Kew. 1. p. 234. H. in montibus Indiae orientalis. h

7. *clusinaefolia*, inermis, caule erecto, fol. obovatis emarginatis, panic. terminali, laciniis corol. cuspidatis. Willd. p. 1227. Jacq. collect. append. p. 37, t. 4. f. 3. Catesb. carol. 1. p. 59. t. 59. Habit. in insulis Bahamensibus. h

8. *gummifera*, inermis, foliis oblongis obtusis hirtis, stipulis subulatis, laciniis calycinis ovatis brevissimis, tubo recto. Lin. suppl. 164. Thunb. Diss. de Gard. n. 4. t. 2. f. 3. Hab. in Zeylona. Ex rimis corticis et foliis sudat Gummi. - resina, Gummi Elemi similima. h

9. *Mussaenda*, inermis, foliis ovatis acutis, stipulis macronatis, laciniis calycinis subulatis compressis, tubo incurvato h. rto. Lin. suppl. 163. *Mussaenda formosa* Jacq. amer. 70. t. 48. Ed. picta t. 70. Hab. in Carthagenae sylvis. Fol. subpubescentia. h

\* *madagascariensis*, inermis, foliis ovatis utrinque glabris, flor. axillaribus sessilibus solitariis longe tubulosis externe tomentosis. Lam. enc. 2. p. 608. Hab. in Madagasc. Antecedenti affinis.

10. *Rothmannia*, inermis, fol. oblongis, stipulis subulatis, laciniis calycinis subulatis teretibus longiundine tubi, tubo glabro ampliato brevi. Lin. suppl. 165. Th. in Act. holm. 1776. p. 65. t. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Flores saepevolentes, imprimis nocte. h

#### \*\* Spinosae.

11. *uliginosa*, spinosa, ramis apice spinosis, cor. intus tubo hirsutis. Retz. obs. 2. p. 14. Hab. in paludosis Indiae. h

12. *armata*, spinosa, spinis ramulorum terminalibus quaternis, laciniis calycinis linearibus cuneiformibus, flor. aggregatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 524. Jacq. amer. 70. Hab. in Martinicae et Carthagenae sylvis. h

13. *micranthus*, spinosa, fol. ellipticis utrinque acutis spinis longioribus, florib. sessilibus, corol. glabris. Willd. Thunb. Diss. 1. t. 1. f. 2. Hab. in China et Zeylona. h

14. *multiflora*, spinosa, spinis fol. brevioribus uncinatis, fol. ovalibus acuminatis, flor. cymoso-umbellatis. Willd. Sp. 2. p. 1231. *Randia longiflora*. Lam. enc. 3. p. 25. ill. t. 156. f. 3. Hab. in India orientali. Tubo longo, stigmate et atheris

ad faucem corol. eum Gardenii magis convenit.

443. *MUSSÆNDA*. Cor. infundibulif. *Stigmata* 2, crassiuscula. *Bacca* oblonga, 2-locularis, polysperma. Sem. quadrifariam disposita. Stam. tubo interne inserta.

1. *frondosa*, ramis foliisque ramorum et paniculae villosis. Vahl. symbol. 3. p. 37. Willd. Sp. 2. p. 997. Burm. zeylan. 165. t. 76. Rumph. 4. t. 51. Rheed. 2. t. 18. Hab. in India. Bractea altera enata in folium album, ellipticum, nervosum, panicula longius. L. h

2. *glabra*, ramis foliisque ramorum et paniculae glaberrimis. Vahl. l. c. p. 38. In India orientali. Rumphii folium principissae huc pertinere videtur. Vahl. h

444. *RANDIA*. Cal. 5-partitus: lacin. lineari-lanceolatis contortis. Cor. hypocrateriformis: tubo cal. vix longior. *Stigma* bilobum: lobis oblongis, inaequalibus. *Bacca* dissepimento incompleto, semibilocularis, cal. tubuloso coronata. Sem. plurima, per 4 series alternatim superimposita.

1. *obovata*, spinis oppositis, fol. obovatis acutis. Flor. Per. 2. p. 68. t. 220. f. b. Habit. in Peruviae Andium praeruptis calidis. Bractee 7 sub singulo flore.

2. *rotundifolia*, spinis ramisque subverticillatis foliis subrotundis ovatisque rugosis. Flor. Per. 1. c. Cresc. in Peruv. nemoribus. Stipul. intrasfoliaceae membranaceae fulvae.

3. *latifolia*, fol. spathulato-ovalibus, spinis in apice fol. multo breviorib. Lam. enc. 3. p. 25. *Randia aculeata*. Lin. *Gardenia Randia*. Willd. Sp. p. 1230. Brown. Jam. t. 85. f. 1. Habit. in Antillis, Jamaica etc.

β ? *mitis*, subinermis, fol. subovalib. Lin. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 528. Sloan. Jam. hist. 2. p. 18. t. 161. f. 1. Cum priore.

4. *parvifolia*, fol. obovatis fasciculatis spinis subbrevioribus. Lam. l. c. p. 25. Sloan. l. c. 2. p. 100. t. 207. f. 1. Cresc. in Jamaica, St. Domingo. Magis spinosa.

5. *parviflora*, fol. ovatis petiolatis spinis

nis arcuatis brevissimis, flor. pedicellatis subs fasciculatis axillaribus. Lam. l. c. *Gardenia micranthus*. Thunb. Willd. Spec. 2. p. 1230?

445. *CANTHIUM*. *Cal.* 5-fida. *Cor.* 5-fida, patens. *Stylus* elevatus. *Stigma* capitatum aut clavatum. *Bacca* corticosa, 2-locularis, 2-sperma. *Sem.* hinc convexa, inde plana: sulco longitudinali.

\* *Spinosa, stigma capitato.*

1. *chinense*, spinosa, floribus sessilibus hirsutis. *Gardenia spinosa*. Thunb. Willd. Sp. 2. p. 1229. In China.

2. *coronatum*, spinosum, fol. ovato-cuneiformibus obtusis, lacin. calycinis foliaceis, baccis coronatis. Lam. enc. 1. p. 602. *Gardenia spinosa*. Lin. suppl. Pluck. alm. t. 98. *Gard. dumetorum*. Ait. Willd. l. c. f. 6. Habit. in India. Horride spinosa.

3. *parviflorum*, foliis ovatis petiolatis apicis vix longioribus, dentibus calycinis apicis brevissimis laccis nudis umbilicatis. Lam. l. c. Roxb. *Corom.* 1. p. 39. t. 51.  $\beta$ . fol. majoribus et acutioribus. Pluck. l. c. f. 3. *Webera tetrandra*. Willd. Sp. 2. p. 1224. Habit. in India orient. Radix dicitur amara, rubra, odore grato.

4. *pedunculare*, spinosum, fol. ovato-acutis subsessilibus, peduncul. folio longioribus. Cav. ic. 6. p. 21. t. 436. In Insul. philippices.

\*\* *CURIA, inermis, stigma clavato.*

5. *corymbosum*, inerme, fol. oblongis acutis, corymbo terminali. Willd. l. c. sub *Webera*. *Rondeletia asiatica*. L. Cupi. Rheed. mal. 2. t. 23. In Malabar et Zeylona.  $\eta$

6. *cymosum*, inerme, fol. ovatis acuminatis, cymis multifloris axillaribus. *Webera cymosa*. W. Hab. in India orientali. Arb. ramis pubescentibus. *Stigm. capitato-bilobum*. W.

*Obs.* An posteriores duae hae species revera hujus generis? Nomen *Webera* caeterum inter muscos, a pluribus jam adoptatum, conservandum est.

446. *ERITHALIS*. *Cal.* urceolatus. *Cor.* 5-partita; laciniis recurvis. *Bacca* 10-locularis, 10-sperma.

1. *fruticosa*, (odorata), fol. obovatis,

cymis compositis pedunculatis. Willd. Sp. 2. p. 996. *E. odorifera*, arborea erecta, Jacq. amer. pict. t. 260. f. 20. Plum. ic. t. 249. f. 2.  $\beta$ . *inodora*, fruticosa procumbens. Jacq. Hab. in Jamaica, Martinica.  $\beta$ . in Curacao.

2. *polygama*, fol. obovatis, flor. axillaribus; masculis cymosis, hermaphroditis solitariis. Forst. prod. n.º 101.  $\beta$ . Rumph. 3. t. 140. Hab. in insula Sateatis.

447. *GUETTARDA*. *Cal.* integer, obsolete dentatus, aut crenatus. *Cor.* tubulosa, limbo 5-g-fida. *Stigma* capitatum. *Drupa* nuce sulcata 5-passim 2-locularis. (Stam. 4, 5, 6, 7 et 9.)

1. *speciosa*, fol. ovatis utrinque nudis, cor. subnovemfidis. Lam. enc. 3. p. 53. t. 154. f. 2. Lin. syst. veg. p. 899. Rheede 4. t. 47 et 48. Hab. in India, Malabar et ins. Java. Flores Nyctheut, longe pedunculati. *Cor.* 7-9-fida. Stam. eodem quoque numero variat. Arbor mediocri. Fol. laeviuscula.

2. *argentea*, fol. ovatis subtus argenteis pubescentibus, venis transversis, cor. subsexfidis. Lam. l. c. t. 154. f. 1. *Halesia arborescens*. Brown. jam. t. 20. f. 1. Hab. in Jamaica et Cayenna. Flores externe tomentosi. *Drupa* pubescens, 6-locular.  $\eta$

3. *Mathiola*, fol. obovatis mucronatis scabris, subtus venosis pubescentibus; flor. sub-6-andris. *Guettarda scabra* Vent. Chpiz de Plant. 1. t. 1. Lam. l. c. f. 3. *Mathiola scabra*. Lin. Habit. in America.

*Obs.* Linnæus secundum figuram Plumeri, naturae incongruam, corol. dicit 1-petulam. *Cor.* 5-6-fida. Stam. 5, 6, 7.

4. *rugosa*, fol. subcordatis ovatis acutis scabris subtus tomentosis; flor. 6-andris. Swartz. prodr. p. 59. Flor. ind. occ. 2. p. 632. Vahl. symb. 3. p. 50. Habit. in ins. Antigua, Dominica etc. Flor. parvi. Fol. superne aspera. *Drupa* coccinea.

5. *elliptica*, fol. ellipticis, flor. 4-andris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 634. Cresc. in Jamaicae campesibus siccis. *Drupa* umbilicata, 4-sperma. Pedunculi axillares.  $\eta$

6. *membranacea*, fol. ovatis acuminatis membranaceis hispido-scabris, flor. tetraandris. Swartz. l. c. p. 635. In Hispaniolae fruticetis montosis. Racemi terminales. *Drupa* oblonga, 4-sperma. *Cal.* tubulato-coronata.

7. *parviflora*, fol. oblongis glabris laevibus, pedunc. trifloris subpentandris. Vahl. Eclog. 2. Lam. ill. t. 154. f. 4. Hab. in ins. St. Crucis et in Monserrat.

*Obs.* Secundum v. Rohrap. Vahl. *Edechi* Loefl. huic pertinet.

8. *odorata*, fol. confertis parvulis subovatis acutis glabris, floribus lateralibus subracemosis. *Laugeria odorata*. Swartz. Willd. Sp. 2. p. 1081. *Laugeria odorata*. Jacq. amer. t. 177. f. 21 et Edl. picta t. 259. f. 16. Hab. in Carthagenae et Havanae arbutis apricis maritimis.

9. *hirsuta*, fol. oblongis acutis, spicis longis multifloris revolutis, cor. laciniis embriato-plicatis, fructibus pentagonis, *Laugeria hirsuta*. Flor. Per. 2. p. 22. t. 145 f. 2. Hab. in Peruv. nemorib. Arb. 30-ufnarius. Bract. magnae. Fol. subtus pubescentia venosa venosissima.

10. *crispiflora*, fol. ovatis acuminatis nervosis, subtus villosis, lacin. corol. crispatis. Vahl. Eclog. amer. Fasc. 2. t. 6. Habit. versus summities montium in ins. Montserrat. h

β? *dependens*, fruct. 3-gonis. Flor. Per. 1. c. sup. Laug.

\* *LAUGERIA. Drupa subrotunda, 2-sperma.*

11. *lucida*, fol. oblongis obtusis integris membranaceis nitidis, racemis dichotomis, drupis nucibus bilocularibus. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 475. Vahl. symb. 3, p. 40. t. 57. Habit. in fruticetis Jamaicae calidioris, ins. St. Luciae et St. Crucis. h

12. *tomentosa*, fol. ovatis acutis integris subtus tomentosis, racemis dichotomis, drupis nuce biloculari. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 477. Facie Tournefortii similis. Hab. in fruticetis Jamaicae occid. h

13. *coriacea*, fol. elliptico-ovatis subcoriaceis utrinque glabris obtusiusculis, spicis bisbifidis, flor. tetrandris. Vahl. ecl. 1. p. 26. Habit. in insula Montserrat ad summities montium. h

14. *resinosa*, fol. lato-lanceolatis glabris, subtus glaucis, spicis axillaribus bifidis, ramis apice resinosis. Vahl. l. c. p. 27. Hab. in altis montibus insulae Montserrat. h

*Obs.* Variant species *Laugeriae* quoad numerum loculamentorum putaminis, saepe maturitate unum vel alterum quoque evanescit. Genus a Guettardis parum diversum, et forte non absonum foret cum eo conjungere. Vahl.

448. *SCHRADERA. Involucr. universale multiflorum. Cal. superus urceolatus. Cor. 5-6 lida, campanulata, fauce hirsuta. Bacca polysperma. (Stam. 5-6.)*

1. *capitata*, involucro dentato, calyce integerrimo, fol. obtusis. Willd. Sp. 11. p. 238. Vahl. ecl. 1. p. 35. t. 5. *Urceolaria exotica*. Gmel. syst. 2. p. 350. Habit. in ins. Montserrat. Frutex scandens parasiticus. Involucrum coriaceum circiter 15-florum. Numerus partium floris a 5-6. h

2. *cephalotes*, (jamaicensis), involucro integerrimo, cal. dentato, fol. acuminatis. Willd. l. c. *Fuchsia involucreta*, Swartz. Fl. ind. occ. 2. p. 674. Hab. in sylvis et montibus Jamaicae interioris. Involucrum 8-florum. Numerus octonarius frequentissimus est, rarius 5-7-9-10-rius. W. h

449. *MORINDA. Flores in globum collecti supra receptac. sphaericum. Cal. sub-5-dentatus. Cor. subinfundibuliformis, 5-lida, patens. Baccae aggregatae, ob mutuum compressionem angulatae, apice retusae, 2-spermae.*

1. *umbellata*, erecta, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. confertis. Linn. Willd. Sp. 2. p. 991. Hab. in India. h

2. *citrifolia*, arborea, pedunc. solitariis. Linn. Rumph. amb. 2. p. 158. t. 99. Rheede. 1. t. 52. Cum priore.

β? *angustifolia*. Baderus angustifolia. Rumph. 3. p. 157. t. 98. h

3. *Royoc*, procumbens. L. Jacq. hort. 1. t. 16. *Royoc humifusum*, fructu compresso. Plum. Spec. 2. t. 26. Hab. in Amer. calidiore. h

450. *NAUCLEA. Cal. sub-5-dentatus. Cor. infundibuliformis. Caps. subtrigona bilocularis, polysperma. Flor. in globum collecti supra Recept. commune globosum pilosum.*

1. *orientalis*, fol. oblongis acutis, pedunc. aequalibus, stam. longitudine cor. Willd. Sp. 2. p. 928. *Cephalanthus* fol. oppositis. Linn. Flor. zeylan. 53. Rheede. mal. 3. p. 29. t. 33. Hab. in India orient. Capitula florum magnitudine pomi minoris, flava. Stigma pyramidatum. W. h

2. *purpurea*, fol. oblongis utrinque attenuatis, pedunc. incrassatis, staminibus

inclusis. Willd. l. c. Roxb. coromand. t. p. 41. t. 54. *Cephalanthus chinensis*. Lam. enc. 1. p. 671. Rumph. amb. 3. p. 84. t. 55. Hab. in India orientali. Similis praecedenti. Stigm. capitatum. W. h

3. *parviflora*, fol. ellipticis obtusiusculis, staminibus longitudine tubi cor. dentibus calycinis brevissimis acutiusculis. Willd. p. 929. Roxb. corom. t. p. 40. t. 52. Hab. in India orientali. Stigma cylindraceo-capitatum. W. h

4. *africana*, fol. oblongo-ovatis acuminatis, stam. tubo cor. longioribus reflexis, dentibus calycinis brevissimis subrotundis. Willd. *Uncaria inermis*. Willd. in *Usteri* delect. 2. p. 199. t. 3. Hab. in Guinea. h

5. *aculeata*, fol. ovatis acutis, caule aculeato. Willd. *Uncaria aculeata*. Willd. in *Usteri* delect. 2. p. 200. N. *guyanensis*, spinis aduncis, capit. subternatis. Enc. bot. 4. p. 436. t. 153. f. 2. *Ouroparia gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 177. t. 68. Hab. in sylvis Gujanae. Caulis tetragonus aculeis magnis oppositis recurvato-uncinatis obsitus. W. h

6. *cordifolia*, fol. subrotundo-cordatis, capitulis pedunculatis axillaribus. Willd. Roxb. corom. I. p. 40. t. 53. Habit. in montosis Indiae orientalis. Stigma clavatum. h

Obs. Totum genus a *Cephalantho* vix nisi numero diversum. W.

451. *CANEPHORA*. Cal. communis tubulosus, multiflorus: *Proprius* 5-fidus. Cor. campanulata subaequalis. Caps. coronata, 2-locularis.

1. *axillaris*, fol. subrotundo-ovatis, flor. solitariis axillaribus. Willd. Sp. pl. 2. p. 976. Lam. ill. gen. t. 151. f. 1. Hab. in Madagascaria.

2. *capitata*, fol. lanceolatis, floribus terminalibus aggregatis. Willd. l. c. Lam. t. 151. f. 2. Cum priore.

452. *CEPHÆLIS*. Flor. capitati involucrati. Cal. 5-dentatus. Cor. tubulosa. Stigma 2-partitum. Bacca disperma. Receptaculum paleaceum. Invol. 1-5-polyphyllum.

1. *violacea*, capitulis globosis terminalibus, involuero pentaphyllo, fol. nervosis glabris. Swartz. Flor. ind. occ. 1. p. 439. Willd. p. 977. Aubl. t. 60. Hab. in Gujana et India occident. h

2. *tomentosa*, hirsuta, capitulis pedunculatis axillaribus terminalibusque, involucri diphyllic cordatis acuminatis. Vahl. eclog. 1. p. 19. *Tapogomea*. Aubl. guj. 1. p. 160. t. 6. Hab. in sylvis Gujanae, inque insula Trinitatis. h

3. *punica*, glaberrima, capitulis terminalibus erectis, involucri diphyllic. Vahl. eclog. 1. p. 19. Hab. in Jamaica. h

4. *elata*, capit. globosis terminalibus, pedunc. elongatis, involuero diphyllo, fol. glabris. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 437. In montibus Jamaicae australis. Involucrum 2-phyllum: foliol. magnis. h

5. *axillaris*, capit. axillarib. sessilibus. Swartz. l. c. p. 441. Hab. in insula St. Christophori. h

6. *purpurea*, capit. terminalibus nudis, fol. oblongis pictis subtus villosis, caule repente tomentoso Willd. p. 978. *Tapogomea purpurea*. Aubl. guj. 1. p. 162. t. 63. f. 3. Habit. in sylvis remotis Gujanae. T

7. *alba*, capitulis terminalibus nudis, foliis ovatis subtus pubescentibus, caule repente glabro. Willd. Aubl. l. c. t. 62. f. 4. Hab. in sylvis remotis Gujanae.

8. *glabra*, capitulis terminalibus nudis, fol. oblongis glabris, caul. erectis, ramulis villosis. Willd. p. 979. Aubl. p. 168. t. 63. Hab. in Gujana. h

9? *involucrata*, (*carapichea*), capit. terminalibus globosis, involuero tetraphyllo inaequali, fol. oblongis acuminatis. Willd. *Carapichea gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 168. t. 64. Hab. in sylvis ad ripas Gujanae. Stam. exserta et fruct. capsularis. An distincti generis?

10. *sessiliflora*, (*Patabea*), capitulis terminalibus globosis sessilibus nudis, flor. tetrandris. Willd. l. c. *Patabea coccinea*. Aubl. guj. 1. p. 110. t. 43.

11. *muscosa*, capitulis subrotundis sessilib. terminalib., paleis dentatis. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 442. *Morinda muscosa*. Jacq. amer. p. 65. t. 45. Habit. in Martinicae sylvis montium et ad fluviorum ripas. h

12. *bubalina*, capitulis terminalib. pedunculatis, fol. oblongis glabris. Linn. suppl. sub *Lonicera*. Hab. ad Cap. b. spei. Cal. hirtus dentibus recurvis. Cor. hirta Symphyti.

Obs. Ob affinitatem, quae secundum ill. Jussieu, (vid. Ej. gen. pl.), extat inter hanc et antecedentem plantam, forte genere a

*Cephaelibus separandam*, sub hoc genere militet, donec accuratius inquisita sit; saltem non *Lonicera* est.

13. *emetica*, herbacea procumbens, fol. lanceolatis glabris capitulis axillarib. pedunculatis paucifloris. Lin. suppl. p. 144. sub *Psychotria*. Willd. Sp. pl. 2. p. 968.

*Obs.* Haec species in Act. Soc. Linn. Lond. v. 6. p. 137. t. VI. sub peculiari genere: *Callicocca* proposita, secundum observationes cl. Richardi huc potius pertinet.

453. *BERTIERA*. *Cor.* 5-fida. *Stigma* 2-lamellatum. *Bacca* 2-locularis polysperma.

1. *guyanensis*. Vahl. symb. 3. p. 33. Aubl. guj. 1. p. 180. t. 6g. Lam. ill. t. 165. Hab. in sylvis Gujanæ et Cajennæ. Fructus ramis tomentosis. Flor. paniculati. h

454. *DUHAMELIA*. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 5-locularis, infera, polysperma. (Racemi partiti: flor. secundis.)

1. *patens*, ramis sulcatis, fol. 3-4-oblongo-lanceolatis pubescentibus, floribus cymosis secundis. Flor. Per. 2. p. 68. t. 221. f. a. Jacq. amer. pict. p. 39. t. 72. Lam. enc. 3. p. 65. Willd. Sp. 2. p. 980. Hab. in sepibus montosis Hispaniolæ et in Peruviae Andium nemoribus ac in Pozuzo versuris. Cal. ruber. h

2. *sphaerocarpa*, ramis teretibus, fol. ternis oblongis utrinque hirsutis, florib. subcorymbosis. Flor. Per. l. c. t. 221. f. b. Cresc. in Peruviae nemoribus. Corolla croceo-punicea. h

3. *axillaris*, subherbacea, racemis axillaribus, flor. subsecundis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 443. Hab. in Jamaicae, Hispaniolæ fruticetis saxosis juxta rivos. h

4. *Chrysantha*, racemis terminalibus, fol. oblongis cuneatis acuminatis glaberrimis, flor. pedicellatis. Swartz. l. c. p. 444. Jacq. ic. rar. 2. t. 335. Plum. amer. 212. t. 218. f. 1. In fruticetis montosis Jamaicae occid. et ad Caracas.

5. *ventricosa*, racemis terminalibus axillaribusque, cor. campanulatis ventricosis, fol. ternis. Swartz. p. 446. Ham. grandiflora. L'Her. sert. angl. 4. t. 7. Hab. in Jamaicae collibus et fruticetis aridis. h

6. *glabra*, fol. utrinque glabris, fructibus congestis sessilibus. Lam. enc. 3. p.

65. *Amajoua gujanensis*. Aubl. guj. 2. sup. 13. t. 375. Hab. in sylvis Gujanæ. h

455. *SABICEA*. *Involucrum* 2-4-phyllum. *Cor.* hypocraterif. 5-infundibulif. *Stigma* 5-partitum. *Bacca* 5-locularis, polysperma. (Numerus partium passim quaternarius.)

1. *hirta*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, flor. pedunculatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 450. Schwenkfeldia. Willd. Sp. 2. p. 982. Hab. in Jamaica. h

2. *cinerea*, fol. oblongis acutis tomentosis, subtus incanis, flor. subsessilibus. Swartz. p. 452. Aubl. guj. 1. p. 192. t. 75. Habit. in sepibus Cajennæ, Gujanæ. h

3. *aspera*, caule volubili, fol. ovatis acutis asperis subtus villosis. Aubl. guj. 1. p. 197. t. 76. Hab. in Gujana ad fluviorum ripas. h

4. *umbellata*, fol. ovatis acutis, pedunc. axillaribus umbellatis. Flor. Per. 2. p. 55. t. 200. f. a. sub Schwenkfeldia. Hab. in Andium nemoribus. Suffruticosa volubilis, subhispida. *Bacca* hirsuta, albicans.

5. *diversifolia*, fol. altero minimo, flor. axillaribus conglomeratis. Peculiaris haec species detecta in insula Mauritia a Dom. Aubert. Fol. majus late ovatum obtusum minus primo obtutu bracteaeforme, ita ut folia alterna videantur.

456. *RONDELETIA*. *Cor.* infundibuliformis, tubo apice subventricosus, laciniis subrotundis planiusculis. *Caps.* subrotunda, coronata, 2-locularis. *Sem.* plura aut solitaria.

\* *Seminibus pluribus.*

1. *americana*, (*dichotoma*), foliis sessilibus, panic. dichotoma. Lin. Willd. Sp. 2. p. 930. Plum. gen. ic. 142. f. 1. Lam. ill. t. 162. f. 1. Hab. ut omnes fere sequentes in Amer. merid.

2. *odorata*, foliis petiolatis subovatis obtusis. L. Jam. amer. edit. picta. t. 61. Hab. in Amer. rupestribus ventricosis, maritimis. Flor. pulchri miniat, violam redolentes. In quibusdam Linnæi operib. haec species errore typographico *obovata* audit.

3. *trifoliata*, fol. ternis, subtus to-

mentosis Jacq. amer. 6o. t. 43. ed. picta. t. 62. Ehret. pict. t. 15. Hab. in Amer. Fruct. adhuc observandus.

4. *virgata*, foliis subrotundis, ramis filiformibus patentibus, pedunc. trifidis, flor. ternis confertis tetrandris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 354. Hab. in fruticetis maritimis Hispaniolae. h

5. *pilosa*, fol. ovatis utrinque pilosis, pedunc. axillaribus fol. brevioribus trifidis, floribus tetrandris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 356. R. triflora. Vahl. symb. 3. p. 34. t. 54. Hab. in ins. St. Crucis et Montserrat. h

6. *buxifolia*, fol. obovatis glabris, flor. tetrandris axillaribus solitariis. Vahl. eclog. amer. Fasc. 2. t. 12. Hab. in ins. Montserrat.

\* *Seminibus subsolitariis.*

7. *thyrsoides*, fol. oblongis acutis membranaceis subtus pubescentibus, thyrsis axillaribus. Swartz. l. c. p. 358. Hab. in collibus aridissimis Jamaicae. h

8. *racemosa*, fol. lanceolato-ovatis acuminatis utrinque glabris, stipulis ellipticis acumine brevi, racemis axillaribus dichotomis patulis. Swartz. Fl. p. 360. Brown. jam. 143. t. 2. f. 3. Hab. in Jamaicae sylvestrib. montium. R. thyrsoides et laurifoliae proxima. Sw. h

9. *laurifolia*, fol. lanceolato-oblongis acutis utrinque glabris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. Brown. jam. 143. t. 2. f. 2. Hab. in fruticetis Jamaicae. h

10. *tomentosa*, fol. ovatis acuminatis tomentosis, pedunc. tripartitis axillaribus brevibus. Swartz. l. c. Petesia stipularis. Lin? Hab. in Jamaicae collibus petrosis umbrosis. h

11. *umbellulata*, fol. lanceolato-ovatis acutis subhirsutis, pedunc. axillar. apice trichotomis, flor. subumbellatis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 367. Hab. in Jamaicae rupibus petrosis juxta fluvios. h

12. *incana*, fol. ovato-lanceolatis subto-mentosis scabris, pedunc. axillar. simplicibus trifloris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 369. Hab. rarius in Jamaicae montibus petrosis calcareis. h

13. *hirsuta*, fol. oblongis acutis hirsutis, pedunc. axillar. dichotomis laxis, flor. hirsutis. Swartz. Hab. in fruticetis montium Jam. austr. h

14. *hirta*, fol. oblongis acuminatis hirtis

rigidis subtus nervosis, pedunc. axillaribus trichotomis erectis. Swartz. Ait. Kew. 1. p. 227. Hab. in fruticetis montosis Jam. cum priore. h

*Obs.* Quae in hac subdivisione enumeratae sunt species, ulterius examinandae sunt, quarum nonnullae hujus generis haud videntur.

457. **MACROCNEUM**. *Cal.* campanulato-cyathiformis. *Cor.* campanul. aut infundibuliformis. *Caps.* 2-locularis. *Sein.* imbricata.

1. *jamaicense*, corymbis axillaribus elongatis nudis. Willd. Spec. 2. p. 933. Swartz. obs. 68. t. 3. f. 1. Hab. in Jamaicae austr. locis umbrosis ad rivulorum ripas. h

2. *candidissimum*, corymbis terminalibus brevibus paucifloris bracteatis, bracteis coloratis subrotundis. Willd. p. 934. Vahl. symb. 2. p. 38. t. 30. Habit. in vicinia St. Marthae. h

3. *coccineum*, panicula terminali elongata bracteata, bracteis longissimis coloratis. Willd. Vahl. symbol. 2. p. 38. t. 29. Hab. in ins. Trinitatis Americae. h

4. *corymbosum*, fol. ovato-oblongis basi excavatis carinatis rugosis sessilibus corymb. magnis. Flor. Peruv. 2. p. 48. t. 189. Hab. in Andium collib. Cor. crassa. Caps. fusco-purpureae. tandem atra.

*Obs.* Quamvis cortex hujus speciei parum amarus sit, collectores tamen Cinchonarum cortici illum admiscere solent, quae fraus facile dignosci potest, cum cortex Macrocnemi intus albus sit, et sapore amariuscule viscido gaudeat. Flor. Per. p. 48.

5. *microcarpon*, foliis oblongis obtuse acuminatis subtus pubescentibus, racemis terminalibus, flor. congestis sessilibus. Fl. Per. 2. p. 48. t. 188. Habit. in Chincho et Cuchero nemoribus imis, calidis. Cor. laciniae reflexae.

6. *venosum*, fol. oblongis acuminatis venosis lineatis, nervo venisque pubescentibus, racemis terminalibus. Flor. Per. l. c. t. 119. f. 6. In Peruv. nemoribus calidis. Stipulae strictae rubescent.

*Obs.* Tres haec Peruviae species a characteribus generico parum differre videntur.

458. **NONATELIA**. *Cal.* 5-dentatus.



*Cor. tubulosa. Bacca striata, 5-locularis, 5-sperma.*

1. *racemosa*. Aubl. guj. p. 186. t. 72. Oribasia. Schreb. Psychotria. Willd. Spec. 2. p. 666. Hab. in sylvis Gujanæ. Ceteræ Nonatellæ Aubletii alius sunt generis. h

459. YANG UIERA. *Cor. campanulato-globosa, fauce pilosa. Stigma 2-lamellatum. Bacca pomiformis, 4-5-locularis, 4-5-sperma.*

1. *edulis*. Vahl. symb. 3. p. 36. et in Act. Soc. Hafn. 1. p. 208. t. 7. Juss. gen. pl. 229. Lam. ill. t. 159. Willd. Sp. 2. p. 976. Hab. in India. Arb. Flor. corymboso-cymosi. Sem. amygdalina. J.

460. DENTELLA. *Cal. 5-partitus, superus. Cor. infundibuliformis laciniis tridentatis. Caps. 2-locularis polysperma.*

1. *repens*. Forst. prod. n.º 98. Lam. ill. t. 118. Oldenlandia repens, caps. subsessilib. hispidis, fol. lanceolatis. Lam. mant. 40. Burm. ind. 38. t. 15. f. 2. Rumph. pl. 170. f. 4. Hab. in India orientali et Nova Caledonia. Caps. undique pilis obtusis cavis pellucidis oblecta. Lin.

461. SERISSA. *Cor. infundibuliformis, fauce ciliata, limbi laciniis subtrilobis. Bacca 2-sperma.*

1. *foetida*. Willd. Sp. 2. p. 1061. Lycium japonicum. Thunb. t. 17. L. foetidum. Lin. suppl. p. 150. Hab. in India, Japonia. Fol. venosa. Cor. alba. In India in hortis Buxi ad instar adhibetur.

462. SIPANEA. *Cal. 5-partitus. Cor. infundibuliformis, 5-loba. Caps. coronata, 2-locularis, 2-partibilis, polysperma.*

1. *pratensis*. Aubl. guj. 1. p. 148. t. 56. Lam. ill. t. 151. Virecta pratensis. Vahl. Eclog. Amer. 2. Hab. in Guiana.

463. VIRECTA. *Cal. 5-dentatus: dentibus interjectis. Cor. infundibuliformis. Stigma bipartitum. Caps. 1-locularis, polysperma.*

1. *biflora*, fol. ovatis, pedunc. bifloris. Lin. suppl. 134. Vahl. symb. 2. p. 38. Ejusd. ecl. 2. W. Sp. 2. p. 972. Rondeletia biflora, caule filiformi repente, pedunc. biflor. Roth. Descr. pl. rar. Surinam. p. 7. t. 2. f. 2. Hab. in Surinami subhumidis, Herba te-

nera Mercurialis annuae. Corolla rubescens: ore albo. Lin. ☉

464. SOLENA. *Cal. 5-fidus superus. Cor. hypocrateriformis, tubo longissimo, fauce pilosa. Style filiformis. Stigma trifidum. Bacca unilocularis, polysperma. (Cyrtanthus. Schreb.)*

1. *longiflora*. Willd. Sp. 2. p. 961. Posoqueria longiflora. Aubl. guj. 1. p. 134. t. 51. Lam. ill. t. 161. Hab. ad ripas fluviorum Gujanæ. Flor. corymbosi. Cor. albae nutantes. h

465. UCRIANA. *Cal. 5-dentatus superus. Cor. hypocrateriformis: tubo longissimo, fauce ventricosa nuda. Antheræ sessiles. Styl. clavatus pilosus. Stigma 2-lamellatum. Bacca 2-locularis, polysperma.*

1. *speciosa*. Willd. l. c. Tocoyena longiflora. Aubl. guj. 1. p. 131. t. 50. Hab. in sylvis Gujanæ. Fl. terminales capitati. h

466. PSYCHOTRIA. *Cal. 5-dentatus, coronans. Cor. infundibuliformis. Bacca? globosa aut ovalis. Sem. 2, sulcata, ossea.*

\* *Cor. tubo tereti recto.*

1. *asiatica*, stipulis emarginatis, fol. lanceolatis ovatis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 961. Jacq. amer. Hab. in India. h

2. *glabrata*, stipulis acutis indivisis deciduis, fol. ovatis glaberrimis nitidis, flor. paniculatis erectis. Swartz. flor. ind. occ. 1. p. 390. Hab. in Jamaicae rupibus. h

3? *axillaris*, stipulis acutis indivisis, fol. ovatis acutis, flor. axillaribus. Willd. l. c. p. 962. Ronabea latifolia, caul. flexuosis, fol. ovatis acutis viridibus e caeruleo variegatis, fructu nigricante striato. Aubl. guj. 1. p. 154. t. 59. Lam. ill. t. 166.

β. R. erecta, caul. tenuiorib. fol. ovatis acutis tenuioribus, fol. minoribus e luteo virentibus. Hab. in sylvis Gujanæ. A reliquis habitu diversa, et florib. axillaribus distincta. Willd. Sem. hinc plana, inde convexa. Anbl. h

4. *laurifolia*, stipulis ovatis acuminatis deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis crassiusculis glabris, panic. erectis, baccis subrotundis. Swartz. fl. ind. occid. 1. p. 392. Hab. in Jamaicae, Hispaniolæ fruticetis aridis. h

5. *parviflora*, stipulis ovatis cuspidatis deciduis, fol. elliptico-ovatis acuminatis parallelo-venosis, panic. erectis, baccis ovalib. Willd. l. c. Smirna tinctoria. Aubl. guj. 1. p. 170. t. 65. Hab. in sylvis Gujanæ. Cortex ad pannos sericeos et gossypinos rubro colore tingendos adhibetur. h

6. *hirsuta*, stipulis lanceolatis integris deciduis. fol. lanceolato-ovatis acutis hirtis, caule hirsutissimo, panic. patente. Sw. l. c. p. 394. Hab. in australis Jamaicae sylvis vetustis. h

7. *foetens*, stipulis acuminatis integris deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis glabris, panic. patentissima, ramis reflexis filiformibus. Swartz. l. c. p. 398. Cum priore. Odore foetido subacido ex ramis fractis, folisque contusis distinguitur. Sw.

8. *citrifolia*, stipulis ovatis persistentibus, fol. ellipticis acuminatis subcoriaceis, panic. brevibus, baccis oblongis costatis. Swartz. p. 398. Hab. in Ind. occid. h

9. *nitida*, stipulis subrotundis deciduis, fol. subrotundo-ovatis acuminatis, panic. terminali, cor. limbo tubo longiore. W. Mapouria gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 175. t. 67. Hab. in ripis fluviorum Gujan. h

10. *marginata*, stipulis integris acuminatis deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis margine cartilagineo-setosis, panic. laxa. Swartz. l. c. p. 400. Brown. jam. 161. n°. 6. Hab. in sylvestribus Jamaicae australis. h

11. *tenuifolia*, stipulis ovatis emarginatis deciduis, fol. oblongis acutis tenuioribus glabris, pan. erectis subsessilibus. Swartz. p. 402. Hab. in fruticetis Hispaniolæ. h

12. *nervosa*, stipulis oblongis emarginatis deciduis, fol. ovatis utrinque acuminatis nervosis (venosis) subundulatis, panic. sessilibus erectisculis. Swartz. p. 403. Hab. in fruticetis Jamaicae. Fol. non sunt nervosa, sed venosa, venis prominentibus. Willd. p. 964. h

13. *carthaginensis*, stipulis emarginatis, fol. obovatis acuminatis, panic. terminali. Willd. p. 964. Jacq. amer. p. 65. t. 174. f. 22. Ed. picta. t. 260. Hab. in Carthagenæ fruticetis. h +

14. *Myrtiphyllum*, stipulis ovatis deciduis, fol. lanceolato-ovatis enerviis nitidis rigidis, ramis secundis, racemis compositis terminalibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 405. et 406. Brown. jam. 152. Hab. in Jamaicae fruticetis aridis. Vere. Facie a ceteris diversa. Bacca immatura dura

2-locularis est, demum succosa. dissepimento evanescente. Sw. An potius Myrtiphyllum dicendum?

15. *laxa*, stipulis ovatis acutis deciduis, fol. ovatis acuminatis, racemis terminalibus trichotomis, ramis pedicellisq. subcapillaribus laxis. Swartz. p. 407. Hab. in fruticetis montium Jamaicae. h

16. *parasitica*, stipulis amplexicaulib. retusis, fol. ovatis acuminatis aveniis subsucculentis, racemis terminalibus axillaribusve compositis. Swartz. p. 408. Viscoides pendulum. Jacq. amer. 73. t. 51. f. 1. An hujus generis? Hab. in Martinica, Dominica, Guadeloupe, etc. h

17. *horizontalis*, stipulis ovatis, foliis lanceolato-ovatis acutis, ramis fol. ramulisq. panicularum horizontalibus. Swartz. p. 410. Hab. in Hispaniolæ locis apricis cretae. h

18. *nutans*, stipulis bidentatis, fol. lanceolatis acutis nervosis, racemis tripartitis erectis, fructiferis nutantibus. Swartz. p. 411. Hab. in Hispaniolæ collibus aridis solo cretaceo. h

19. *speciosa*, arborea, fol. oblongo-lanceolatis, involucri terminali subtrifloro. Forst. prod. n°. 89. Hab. in ins. Taheiti. h

20. *flexuosa*, stipulis bidentatis, foliis ovatis utrinque attenuatis, panic. divaricata flexuosa. Willd. p. 966. Nonatelia paniculata. Aubl. guj. 1. p. 184. t. 70. f. 2. Hab. in Cajennæ locis sterilibus. h

21. *racemosa*, stipulis bilobis, fol. oblongis acuminatis, racemo terminali simplici, flor. involucri. Willd. l. c. Aubl. guj. 1. p. 186. t. 72. sub Nonatelia. Hab. in sylvis Gujanæ. h

22. *violacea*, stipulis oblongis obtusis deciduis, fol. oblongis acuminatis, flor. paniculato-corymbosis involucri. Willd. Nonatelia. Aubl. guj. 1. p. 188. t. 73. H. in sylvis Gujanæ. h

23. *capitata*, fol. oblongis acuminatis, stipulis bifidis, florib. capitatis sessilibus bracteis obvallatis. Flor. Per. 2. p. 59. t. 206. f. a. Hab. uti omnes sequentes spec. Peruvianæ in Andium nemoribus.

24. *pilosa*, fol. oblongo-ovatis acutis pilosis, flor. terminalibus verticillato-cymosis, bracteis pilosis cinctis. Flor. Per. p. 60. t. 208. f. a. Bac. caerulea. Inflorescentia Asperulam quandam refert.

25. *subtomentosa*, fol. lanceolato-oblongis, stipul. liffidis acutis, pedunc. ter-

minilibus trifidis, flor. capitatis bracteis cinctis. Flor. Per. 2. p. 61. t. 210. Flor. sessiles caerulei.

26. *brachiata*, stipul. ovatis bifidis, racemo terminali composito, ramis brachiatis, flor. aggregatis sessilibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 415. Hab. in montibus altis Jamaicae australis. h

27. *grandis*, stipul. deltoideis margine revolutis apice subulatis, fol. cuneiformib. obovatis, caule angulato. Swartz. p. Flor. ind. occ. 417. Hab. in fruticetis montosis Jamaicae interioris occidentalis. h

28. *patens*, stipul. bidentatis, fol. distichis lanceolato-ovatis membranaceis, ramis patentibus, panic. secundis. Swartz. p. 419. Hab. in montibus altis Jamaicae praesertim in montibus caeruleis. An diversa a n°. 21? h

29. *uliginosa*, stipul. connatis acutis convexis, fol. lanceolato-oblongis, semin. compressis cristatis, caule subherbaceo simpliciter erecto. Swartz. p. 421. Hab. in Jam. depressis subhumidis montium. h

30. *serpens*, caule subherbaceo repente, fol. ovatis utrinque acutis. Lin. Mant. 204. Hab. in India orient. Similis Ps. herbaceae. Stipulae subrotundae. h

31. *herbacea (sylvana)*, caule herbaceo repente, fol. cordatis petiolatis, pedunc. axillaribus 3-4-floris. Lin. Willd. Sp. 2. p. 967. Jacq. amer. t. 46. Ed. pict. t. 67. Hab. copiose in umbrosis uliginosis. Per stolonem plures proferens plantulas, ita ut tandem earumdam sylvulae quasi exsurgat. Bacca rupea. Jacq.

32. *macropoda*, caule herbaceo repente, fol. cordatis acutis glabris, stipul. ovatis, umbellulis 3-6-floris, seminib. laevib. Flor. Per. 2. p. 63. t. 211. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. Priori valde affinis. Bacca atro-purpurea.

33. *gracilis*, fol. cordatis acutis supra pilosiusculis, stipulis ovatis, umb. 6-9-floris, seminib. sulcatis. Flor. Per. 1. c. f. a. Cum priore. Cor. dilate violacea. P. violaceae. Aubl. affinis dicitur.

*Obs.* Species illae herbaceae, repentes, habitu nimis a ceteris recedunt, fors hinc ut peculiare genus sejungendae.

34. *corymbosa*, stipulis bidentatis, fol. lanceolato-ovatis acutis subrigidis nitidis, flor. subcorymbosis, pedunc. pedicellisque coloratis. Swartz. p. 423. Hab. in montib. excelis Jamaicae. h

35. *pubescens*, stipul. bidentatis, fol.

lanceolato-ovatis acuminatis pubescentib. panic. cymosis patentibus. Swartz. p. 425. Hab. in sepibus rudertatis Jamaicae vulgaris. h

36. *pedunculata*, stipul. bidentatis, fol. ovato-lanceolatis rugosisculis, flor. subeymiosis, pedunc. communi elongato. Swartz. p. 427. Brown. jam. p. 160 n°. 4. Hab. in sylvis montosis Jamaicae. h

37. *alpina*, stipul. bidentatis, fol. lanceolato-ovatis membranaceis reticulato-venosis, panic. erectis, cor. elongatis diaphanis. Swartz. p. 431. Hab. in montib. caeruleis Jamaicae australis. h

38. *paniculata*, stipulis bidentatis, fol. ovatis, panic. erecta, caule arboresc. W. Sp. p. 970. Chiococca paniculata. Linn. suppl. 135. Hab. in Surinamo et Amer. merid. h

39. *macrophylla*, fol. oblongo-lanceolatis amplis, stipul. unidentatis, racemis axillarib. subdichotomis. Flor. Per. 2. p. 56. t. 202. Stipulae semialexicaules, internodi ad basin glandulis minimis oblectae.

40. *reticulata*, fol. oblongo-lanceolatis venoso-reticulatis, stipulis bidentatis, dentibus subulatis, racem. terminalib. brachiatis. Fl. Per. 1. c. Corol. lutea extus pubescens.

41. *amethystina*, fol. oblongis acuminatis, stipul. vaginantib. quadridentatis, racemis terminalibus, cor. baccisque amethystinis. 1. c. p. 57. t. 203. Stipul. ad basin singuli denticuli glandulae 7.

42. *macrobotrys*, fol. lanceolatis pubesc. longis, stipul. bidentatis racemis terminalib. longissimis. p. 57. t. 203. f. a. Stipulis interius ad basin denticulorum glandulis numerosis. Cor. lutea pubescens.

43. *thyrsiflora*, fol. lanceolatis glabris, stipulis vaginantibus sexidentatis, thyrsis terminalib. Flor. Per. p. 57. t. 214. Stipulae denticulus intermedius ovatus ciliatus. Cor. lutea, tubulosa.

44. *obovata*, fol. obovatis acuminatis amplis, stipul. emarginatis, thyrsis terminalibus, cor. tubulosis. 1. c. p. 58. t. 204. f. a. Cor. purpurea, intus villosa. Pedunc. bracteae reflexis stipati.

45. *sulphurea*, fol. obovato-cuneiformibus acuminatis, stipul. emarginatis, racemo paniculato, cor. infundibuliformib. 1. c. t. 205. f. a. Planta amarissima, tincturam luteam praestantissimam praestat ideoque ab incolis hunc in finem adhibetur. An Paleocouria?

46. *alba*, fol. lanceolatis, stipulis ob-  
ovatis inegerrimis striatis deciduis, racemo  
paniculato, cor. baccisque albis. Fl. Peruv.  
3. t. 205. f. a.

47. *cymosa*, fol. oblongo-lanceolatis  
acutis utrinque bilentatis, cymis termi-  
nalibus, cal. 5-partitis longis. l. c. t. 206.  
f. a. Cor. violaceo-purpurea. Tub. prope  
basin villosus.

48. *villosa*, fol. oblongo-ovatis hirsutis  
stipul. ovatis acutis deciduis, panic. racem-  
osa brachiata. p. 59. t. 207. f. a. Bacca  
rubra, globosa. An eadem ac *P. hirsuta*.

49. *foveolata*, fol. lanceolatis subtus  
ad apicem nervi foveolis quatuor, stipul.  
ovatis caducis, panicul. fructus cernua.  
t. 207. f. b. Flor. sessilibus 3-5-approxi-  
mati. Cor. parva, albo-lutea.

50. *mitis*, fol. lanceolatis supra miti-  
bus (?) subtus glabris, stipul. annula-  
ribus emarginatis, racemis subpaniculatis  
terminalibus. Fl. Per. p. 60. t. 208. Cor.  
infundibuliformibus lutea.

51. *virgata*, foliis oblongis acuminatis  
coriaceis venosis, stipul. bilobis pro-  
funde emarginatis, corymb. terminalibus,  
flor. sessilibus congestis. Tab. 209. Cor.  
infundibuliformis, sulphurea.

52. *trifida*, fol. lanceolatis acuminatis,  
stipul. bifidis acutis, pedunc. axillaribus  
terminalibusque trifidis trifloris. Tab. 209.  
f. b. Bacca nigra, umbilicata, subrotundo-  
turbinata.

53. *repanda*, fol. lanceolatis repandis,  
stipul. lanceolatis ciliatis, pedunc. panicu-  
lato-racemosis, flor. sessilib. Pag. 61. Cor.  
minima, lutea. Bacca purpurea.

*PALICURIAE*. Cor. tubo basi hinc gibbo  
obliquo aut subincurvo. Flor. colore  
ut plurimum lutei, passim cae-  
rescentes.

54. *crocea*, fol. ovatis acutis nervosis,  
panic. erectis pedunculisque croceo-colo-  
ratis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 429.  
Willd. Sp. 2. p. 669. Brown. jam. t. 23.  
f. 1. 2. quoad flores. Hab. in Americae  
fruticetis submontosis.

55. *Palicourea*, stipul. bilobis, fol. lato-  
ovatis utrinque acuminatis, panic. erectis,  
cor. cylindraceis ventricosis subcurvis extus  
furniosis. Swartz. l. c. p. 433. *Palicourea*  
guyanensis. Aubl. 1. p. 173. t. 66. *Stepha-  
nium* Schreber. Hab. in sylvis.

56. *lutea*, fol. lato-ovatis acuminatis,  
cor. tubo longo, lacinii acutis, Willd.

p. 97. *Nonatelia* Aubl. p. 190. t. 79. Cum  
priori in Gujana.

57. *longiflora*, fol. ovato-lanceolatis,  
stipul. bilobis, cor. tubi incurvo, lacin.  
obtusiusculis. Willd. Aubl. t. 71. sub *Non-  
atelia*. Hab. in Gujanae sylvis.

58. *hyacinthoides*, fol. obovatis acumina-  
tis amplis, stipul. bifidis, racem. com-  
positis purpureis. Flor. Peruv. 2. p. 62. t.  
213. f. a. *P. hyacinthiflora*. Pedunc. patulo-  
reflexi.

59. *caerulea*, fol. lanceolatis acumina-  
tis, stipul. ovatis, racem. terminalibus,  
flor. aggregatis. Flor. Per. l. c. Cor. lutes-  
cens: limbo revoluta. Bacca caerulea.

60. *tinctoria*, fol. oblongis acuminatis,  
foveolis ad basin venarum, stipul. lanceo-  
lais, racem. brevib. brachiatis. Fl. Per. 2.  
p. 62. t. 211. Cor. albo-luteo-rubescens.

61. *luteo-virescens*, fol. oblongis acu-  
minatis, stipul. bifidis, paniculis laxis,  
bract. longis reflexis. *P. lutea*. Flor. Per. 2.  
p. 61. t. 212. f. b. Cor. tenuis, luteo-vi-  
rescens. Bacca subdityma.

62. *viridis*, fol. oblongis acuminatis  
dorso foveolatis, stipul. lanceolatis, racem.  
subpaniculatis. Flor. Per. l. c. t. 210. f. b.  
Cor. parva viridis. Sem. hinc convexa 5-  
sulca, inde plana laevia.

*Obs.* Quamvis auctores operis allegati  
cor. oblique aut incurvae nullam in des-  
criptionibus fecerint mentionem, tamen  
ex iconibus hoc divinare potest.

467. *COFFEA*. Cal. crescens, 5-  
dentatus: dentibus deciduis. Cor.  
hypocrateriformis. Stam. supra  
tubum. Anth. sagittatae. Bacca  
infera, disperma. Sem. arillata,  
hinc convexa, inde plana.

1. *sambucina*, fol. oblongo-lanceolatis  
acutis, cymis corymbosis terminalibus.  
Forst. prod. n. 92. Willd. Sp. 2. p. 973.  
Hab. in ins. Amicorum. h

2. *opulina*, fol. ovato-lanceolatis, co-  
rymb. coarctatis globosis terminalib. Forst.  
prod. n. 93. In N. Caledonia. h

3. *odorata*, fol. ovatis acutis, cymis  
corymbosis axillaribus. Forst. l. c. Hab.  
in ins. Tanna et in ins. Amicorum. h

4. *arabica*, fol. oblongo-ovatis acu-  
minatis, pedunc. axillarib. aggregatis, cor.  
quinquefoliis. W. l. c. Blackw. t. 337. Juss.  
act. 1713. p. 388. t. 7. Hab. in Arabia  
felic.

5. *mauritiana*

5. *mauritiana*, baccis oblongis basi acutis dispermis. Lam. enc. l. p. 5. t. 160. f. 2. Hab. in ins. Bourbonia.

6. *riflora*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, pedunc. terminalib. ternis unifloris. Forst. prod. n<sup>o</sup>. 95. Hab. in insula Tahiti. h

7. *guyanensis*, fol. lanceolatis, pedunc. axillaribus aggregatis, corol. quadrifidis. Willd. baccis exiguis. Aubl. guj. p. 150. t. 57. Hab. in sylv. Gujanæ. h

8. *paniculata*, fol. oblongis acuminatis, panic. terminali divaricata, cor. quadrifidis, ramis tetragonis. Willd. Aubl. t. 58. Hab. in sylv. Gujanæ. h

9. *racemosa*, fol. oblongo-ovalib. acuminatis, stipul. bifidis, racemis axillarib. terminalibusque (sub anthesi) nutantibus. Flor. Peruv. 2. p. 64. t. 213. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus Pati et Macora.

10. *umbellata*, fol. oblongis acuminatis, venistransversalibus (nervosis), stipul. subrotundis, florib. congestis umbellatis. Flor. Per. 2. p. 66. t. 215. f. a. Cresc. in Andium nemoribus. Involucr. universale 4-phyllum, parziale 7-phyllum.

11. *ciliata*, fol. oblongis acuminatis, stipul. truncatis ciliis obvallatis, racemis terminalibus. Fl. Per. l. c. t. 216. f. a. Hab. in Peruviae Andium nemoribus.

Obs. Plures flores, huic quadrifidi, tetrandri sunt.

12. *verticillata*, fol. oblongo-lanceolatis obovatisque acuminatis, stipul. ovatis ciliatis, racemis terminalibus verticillatis. Flor. Per. 2. p. 66. t. 217. f. b. Cor. fau villosa. Cal. ciliatus.

13. *nitida*, fol. oblongis, obtuse acuminatis nitidis, stipul. truncatis ciliatis, racemis terminalibus. Flor. Peruv. 2. p. 66. t. 217. f. a.

14. *foveolata*, fol. oblongo-ovalibus acute acuminatis, foveolis ad basin venarum, stipul. ovatis, racem. terminalib. Flor. Per. l. c. t. 216. Pedunc. brachiato-decussati. Cor. fau hirsuta.

15. *longifolia*, fol. lanceolato-oblongis undulato-repandis, stipulis ovatis, racem. terminalibus ternis. Flor. Per. 2. p. 66. t. 218. f. a. Stipul. in vaginae formam constatae. Cor. lacin. reflexae.

16. *microcarpa*, fol. lanceolatis acutis, stipul. utrinque bidentatis, cymis axillaribus terminalibusque patulis. Fl. Per. l. c.

f. b. Hab. uti antecedentes in Andium nemoribus.

†† P O T I M A. *Bacca monosperma* : sem. 1 nempe abortivo.

17. *occidentalis*, fol. ovato-lanceolatis glabris, pedunc. trifidis subaxillaribus, cor. 4-fidis, 4-andris, baccis 1 - spermis. Jacq. amer. pict. t. 68. Plum. Sp. ic. 156. f. 2. Hab. in Amer. merid., St. Domingo, etc. Cor. laciniae acuminatae deflexae.

Obs. Praeter Baccam monospermam a *Cof. arabica* differt : perispermio basi in 4 lobos diviso et emyrgone in ejus substantia immerso : hae partes enim in *C. arabica* convolutae sunt.

18. *acuminata*, fol. ovalibus acuminatis ad axillas venarum villosis, stipul. caudatis, racem. paniculatis. Flor. Per. 2. p. 64. t. 214. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. Bacca 1-sperma.

Obs. Haec species ab antecedente, in qua axillas venarum non villosas inveniri, omnino diversa videtur. Fol. etiam multo minora et magis venosa sunt. Differentia specifica *C. occidentalis* a cl. Willdenovio forte de *C. acuminata* desumta.

19. *sessilis*, fol. sessilib. oblongo-lanceolatis acuminatis basi excavatis stipulis ovatis, racemis axillaribus. Flor. Per. 64. t. 215. f. b. (non f. a.) Hab. in Andium nemoribus. Fol. magna, ovata, fere sessilia. Pedunc. trifidi.

468. *CHICCOCCA*. Cor. infundibuliformis, aequalis. *Bacca* compressa, didyma, 2-sperma, infersa. Sem. oblonga, compressa.

1. *racemosa*, fol. ovatis acuminatis, racem. subdivisis axillaribus, secundis subnutantibus. Willd. Sp. p. 975. Lin. suppl. 145. Jacq. Dill. elth. 306. t. 228. f. 295. Sloan. hist. 2. p. 97. t. 188. f. 3.

β. *Chicocco scandens* sarmentis tenuissimis et fere indivisis. Brown. Jam. 164. Swartz. obs. p. 76. Habit. in Jamaicae, Barbados, locis contragosis. h

2. *brachiata*, scandens, fol. ovatis deflexis, ramis brachiatis horizontalib. Flor. Per. 2. p. 67. t. 219. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus. Cor. luteo-viridis.

3. *barbata*, erecta, fol. ovatis, pedunc. axillaribus unifloris, cor. fauce barbata. Forst. prod. n<sup>o</sup>. 96. Hab. in ins. Marchionis, Societatis et Amicorum. h

469. *PÆDERIA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis, 5-loba, intus hirsuta. *Stylus* bipartitus. *Bacca* fragilis (nitida) disperma.

1. *foetida*. Lin. Willd. *Sp.* 2. p. 1219. Lam. enc. 2. p. 257. t. 166. f. 1. Rumph. 5. t. 160. Hab. in India. *h*

470. *DISODEA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* compressa, 1-locularis, basi 2-valvis, 2-sperma. *Recept.* filiforme. *Sem.* orbiculata, membrana cincta.

1. *foetida*. *Lygodisodea foetida*, fol. cordatis acutiusculis, caule volubili. Flor. Peruv. 2. p. 48. t. 188. f. a. Habit. in Peruviae nemoribus. Ad trahes ligandas loco funium sumitur.

471. *PLACOMA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* campanulata, 5-fida. *Bacca* 3-locularis: loculis monospermis.

1. *pendula*. Alt. Kew. 1. p. 292. Gmel. syst. pl. p. 390. Willd. *Sp.* 2. p. 1210. Hab. in Canariis. Caul. tenuis articulatus. Fol. linearia, internodiis longiora.

472. *CHIMARRHIS*. *Cal.* margo integer. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* infera, 2-locularis: loculis 1-spermis. *Stigma* 2-partitum.

1. *cymosa*. Jacq. amer. p. 61. Willd. *Sp.* 2. p. 971. Hab. in Martinica. Arb. procera, elegans. Flor. parvi in racemis cymosis. Gallice: *Bois de rivière*, quod nomen genericum graece datum idem significat.

473. *HIPPOTIS*. *Cor.* infundibuliformis curvata. *Nec ar.* germen ambiens. *Bacca* 2-locularis, calyce magn. auriculiformi coronata.

1. *triflora*, fol. ovato-oblongis acuminiatis, pedunc. trifloris. Flor. Per. 2. p. 56. t. 20. Hab. in Peruv. nemoribus. An vera genus rubiaceum?

474. *VOGELIA*. *Cal.* 5-phyllus: foliolis complicatis magnis transversim undulato-sulcatis. *Cor.*

tubulosa, plicata. *Stigma* 5-fidum.

1. *africana*. Lam. ill. gen. p. 376. t. 149. Cresc. in interiore Africa, ubi detecta a cl. Vaillant. Spica strobiliformi, bracteis plicatis, fol. obcordatis cum mucrone facile distinguenda planta.

475. *TRICYCLA*. *Cal.* 3-phyllus: foliolis magnis subrotundis venosis, persistens. *Cor.* infundibuliformis, 5-fida: laciniis tricrenatis. *Filam.* infra germen inserta. *Samara* ovata, cor. tubo ampliato cincta. (Stamina aliquando 7.)

1. *spinosa*, caule arboreo; ramis alternis spinosis, fol. fasciculatis sublineariibus, basi angustioribus. Cav. ic. 6. p. 79. t. 598. Habit. in Pampas de Buenos-Ayres. Aprilis.

476. *BELLONIA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata. *Caps.* infera, laciniis corollinis conniventibus rostrata, 1-locularis, polysperma.

1. *aspera*, fol. ovatis serratis, florib. corymbosis terminalibus. Swartz. prodr. p. 42. Willd. *Sp.* 2. p. 934. Lam. ill. t. 149. Hab. in Amer. Fol. subius aspera.

2. *spinosa*, fol. ovatis angulatis dentato-serratis, pedunc. axillarib. 1-floris. Swartz. Flor. ind. occ. 1. p. 382. Cresc. ad ripas, locis desertis et sylvaticis in St.-Domingo et Hispaniola. Caul. spinosus. Flor. vere. Numerus quaternarius in flor. saepius observatur. Sw.

477. *WIBELIA*. *Cal.* inferus, 5-partitus. *Petala* 5, in tubum conniventia, apice reflexa. *Stigma* 2-lobum. *Pericarp.* 2-loculare.

1. *guyanensis*. Payson. Lam. ill. t. 124. Paypayrola gujanensis. Gmel. syst. veg. p. 419. Aubl. p. 249. t. 99. Hab. in Gujana. Racem. axillares.

Obs. Nomen Aubletii nimis barbarum et illud Lamarkii cum Payrola fere consonum repudiari duxi. Dr. Wibel est auctor Florae Wertheimienensis nec non alius libri botanici argumenti germanice conscripti.

478. *STROEMIA*. *Cor.* 4-petala aut 0. *Cal.* 4-phyllus. *Nectar.*

ligulatum. *Bacca* corticosa, pedicellata.

1. *farinosa*, fol. oblongis farinosis, flor. petaloideis pentandris. Vahl. symb. 1. p. 20. Willd. Sp. 2. p. 993. *Cadaba* farinosa, fol. ovatis oblongis farinosis. Forsk. desc. p. 68. Lam. encycl. 1. p. 544. Hab. in Arabia felici.  $\bar{h}$

2. *tetrandra*, fol. oblongis mucronatis nudis, florib. petaloideis tetrandris. Vahl. symb. 1. p. 20. Cleome fruticosa. Lin. Burm. ind. 40. t. 46. f. 3. Hab. in India. Filam. saepe duo inferiora basi coealit.  $\bar{h}$

3. *glandulosa*, piloso - viscosa, fol. subrotundis, flor. apetalis. Vahl. symb. 1. p. 20. *Cadaba* glandulosa. Forsk. Hab. in Arabia felici. Capsula oblonga hirsutissima.  $\bar{h}$

4. *rotundifolia*, fol. orbiculatis glabris, flor. apetalis. Vahl. symb. 1. p. 20. *Cadaba* rotundifolia. Forsk. Hab. in Arabia felici. Caps. pendula glabra.  $\bar{h}$

479. CONOCARPUS. Cor. 5-petala, aut nulla. Sem. nuda, solitaria, infera. Flores aggregati.

1. *erecta*, erecta, fol. lanceolatis. L. Willd. Sp. 2. p. 994. Jacq. amer. 78. t. 52. f. 1. Ed. picta t. 78. Plum. ic. 135. t. 144. f. 2. Hab. in Jamaicae, Bermudensium, Brasiliae maritimis.  $\bar{h}$

2. *procumbens*, procumbens, fol. obovatis. Jacq. amer. 79. t. 52. f. 2. Mill. dict. n°. 2. Ed. picta, t. 260. f. 22. Hab. in montibus maritimis Cubae. Var. flor. 5-6-andris.  $\bar{h}$

3. *racemosa*, fol. lanceolato-ovatis obtusiusculis, fructibus segregatis. Lin. Sw. obs. 79. Jacq. amer. 80. t. 53. et pict. t. 79. Sloan. jem. 156. hist. 2. p. 66. t. 187. f. 1. Hab. in maritimis arenosis et limosis Caribaearum vicinaeque Continentis. Rami juniores rubent. Stamina huic decem. Jacq.  $\bar{h}$

480. THESIUM. Cal. 1-phyllus, cui stamina inserta. Nux infera, monosperma, cal. persistente tecta.

1. *Linophyllum*, caule erecto subramoso panicula foliacea, flor. pedicellatis, bract. ternis, fol. linearibus. Willd. Spec. 2. p. 1211. Hayne in Schrad. bot. Journ. 1800. p. 32.

$\beta$ . *intermedium*, caule stricto elongato, fol. lineari - lanceolatis trinerviis, panic. foliacea. Schrad. spicil. Flor. germ. 1. p. 27.

$\gamma$ . *montanum*, caule flaccido, fol. lanceolatis trinerviis, panic. foliacea. Sch. l. c. Ia Europae siccis montosis cretaceis, etiam Oriente. Nux subrotunda.  $\bar{h}$

\* *ramosum*, caule erecto ramoso, racemis foliatis elongatis, flor. sessilibus, bract. nemorib. obvallatis. Hayne l. c. p. 30. t. 7. Th. alpinum. Pollich. Th. palatinum. Roth. Hab. in Palatinatu. Nux oblonga.

2. *alpinum*, caul. prostratis simplicib. racemo foliato secundo, florib. sessilibus, bract. obvallatis. Hayne l. c. p. 32. t. 6. Jacq. austr. 5. t. 416. Hab. in montosis et vix subalpinis. An cum Th. *ramoso* constanter a Th. *Linophyllo* diversum?

3. *ebracteatum*, caule erecto simplice, racemo foliato, flor. pedicellatis ebracteatis. Hayne l. t. p. 33. t. 7. Habit. in pascuis nemorosis prope Berolinum. Fol. obtusa concava. Racem. apicem versus sterilis.

4. *humile*, fol. linearibus subcarnosis, flor. axillarib. sessilib. quinquefidis. Vahl. symb. 3. p. 43. Nuccs globosae rugosae.

5. *lineatum*, fol. linearibus, caule tereti angulato inferne aphylo, ram. erect. divaricatis, flor. axillaribus pedunculatis. Lin. suppl. 162. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *squarrosus*, fol. lineari - subulatis, recurvato - reflexis, caule tereti, florib. axillaribus sessilib. Lin. suppl. 162. flor. axillaribus pedunculatis. Thunb. prod. 46. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *Frisea*, flor. subspicatis secundis ciliato-lanatis, fol. subulatis. L. Habit. ad Cap. b. spei. Caul. simplices, palmates. Fructus ovatus, rugosus.

8. *funale*, flor. spicatis, cor. ciliatis, caule flexili suffrutesco, foliis subulatis brevissimis. Hab. ad Cap. bon. spei. Facie Restionis capensis.  $\bar{h}$

9. *spicatum*, flor. spicatis laevibus, fol. subulatis brevissimis remotissimis. Ann. Habit. in Cap. b. spei montibus. Flores distincti bracteis tribus, margine membranaceis.

10. *capitatum*, flor. capitatis sessilibus terminalib., fol. triquetris laevib., bract. ovatis ciliatis. Hab. in Aethiopia.  $\bar{h}$

11. *strictum*, flor. umbellatis, fol. lan-

ceolatis decurrentibus. Lin. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

12. *umbellatum*, flor. umbellatis, fol. oblongis. Lin. Pluck. mant. 43. t. 342. f. 1. Hab. in Virginiae, Pennsylvaniae pasculis siccis. Umbellulae racemosae, involucrio tetraphyllo.

13. *fragile*, fol. ovato-triangularibus, caule angulato, flor. axillaribus sessilibus. Lin. suppl. Hab. ad Cap. b. spei. Habitus Solsoleae.

14. *scabrum*, capitulis pedunculatis, fol. triquetris, margine carinaeque scaberrimis. Lin. Hab. ad Cap. b. spei. Simillimum T. capitato. *h*

15. *paniculatum*, fol. lanceolatis remotis, ramis angularibus diffusis, flor. terminalibus. Thunb. prod. 45. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. subligulosus, pedalis, totus quantus in panic. floriferam effusus, more Galii. Lin. *h*

16. *amplexicaule*, flor. subspectatis secundis ciliato-lanatis. Lin. Mant. p. 213. Hab. in Cap. b. spei montib. altis. *h*

17. *triflorum*, foliis lanceolatis, caule angulato, pedunc. axillaribus trichotomis compositis. Lin. suppl. 162. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

18. *euphorbioides*, pedunculis trifloris terminalibus, fol. subovatis carnosis. Lin. Mant. 214. Hab. ad Cap. bon. spei. Rami superne dichotomi. *h*

19. *spinosa*, fol. subulatis mucronato-spinosis, flor. axillaribus solitariis. Linn. suppl. p. 161. Ad Cap. b. spei.

481. *QUINCHAMALIUM*. *Cal.* inaequalis 3-4-dentatus. *Cor.* tubo longo, 5-partita. *Stam.* basi laciniarum cor. inserta. *Stigma* truncatum. *Sem.* 1.

1. *chilense*. Molin. chil. p. 159. Lam. ill. t. 142. *Q. procumbens*, fol. linearibus sparsis, flor. terminalibus ciliatis sessilibus. Flor. Per. 2. p. 1. t. 107. f. b. Hab. in Per. collib. arenosis. Rad. fusiformis. Cor. extus purpureo-rubra, intus lutea.

482. *ARIONA*. *Cal.* diphyllus. *Stigma* 2, lamellata. *Bacca*? bilocularis?

1. *tuberosa*, tomentosa, fol. sparsis vaginantibus apice subulatis patulis, corymbo terminali. Cav. io. 4. p. 57-58. Cresc. in

Amer. meridion. partis, vulgo Descado, in siccis et aridis. Fol. tomentosa. Cor. extus tomentosa lutescens, intus luteo-albicans. Rad. fibris divergentib. tuberculiferis. C.

*Obs.* Quoad altum haec planta a priore non diversa, sed quibusd. fructificationis partibus tamen differt, hinc praesertim quoad fructum accuratiori subijcienda examini.

483. *FAGREA*. *Cor.* infundibuliformis, tubo longissimo. *Stigma* peltatum. *Bacca* 2-locularis, carnosa. *Sem.* globosa.

1. *Zeylanica*. Thunb. in Act. holm. 1782. p. 125. t. 4. Willd. Sp. 2. p. 830. Hab. in Zeylona. Frutex ramis crassis, 4-gonis. Folia opposita, coriacea. Flor. magni.

484. *AZALEA*. *Cor.* campanulata, aut infundibuliformis subobliqua. *Stam.* receptaculo inserta. *Stigma* obtusum. *Caps.* 5-locularis.

\* *Cor. campanulatis.*

1. *indica*, flor. subsolitariis, calycibus pilosis. Linn. Herm. Lugd. t. 163. Var. fol. angustioribus. Kaempfer. Reliq. t. 55. In India orient.

2. *lapponica*, fol. ellipticis, punctis excavatis asperis. Lin. Flor. dan. t. 966. Flor. Lapp. t. 6. f. 1. Hab. in alpeb. Lapponicis. *h*

3. *procumbens*, ramis diffuso-procumbentibus, fol. ellipticis (minutis) glabris, margine revolutis. Flor. dan. t. 9. Fl. Lapp. t. 6. f. 2. Cresc. in Europ. alpeb. Habitus recedit.

4. *rosmarinifolia*, flor. solitariis, fol. lineari-lanceolatis margine reflexis hirsutis. Lam. ill. p. 493. Burma. Fl. ind. p. 42. t. 3. f. 1. Hab. in Japonia.

\* \* *Cor. infundibuliformibus.*

5. *pontica*, fol. ovato-oblongis pilosis ciliatis, stam. longissimis declinatis. Andr. t. 16. Pall. Ross. t. 69. Hab. ad Pontem-Euxinum in Eur. et in Amer. ? Cor. pulchra lutea

6. *A. calendulacea*. Michaux. p. 151.

*Obs.* Linnaeus dicit de Az. *Pontica*: fol. nitidis utrinque glabris.

6. *nudiflora*, fol. ovatis, cor. pilosis, stam. longissimis. Lin. Curt. mag. t. 180. Var. cor. coccineis, caracis et albis. Vid. Ait. Kew. p. 202. Hab. in Virginia.



7. *viscosa*, ramis hispidis, fol. ovato-lanceolatis utrinque viridibus, margine scabris, stam. cor. piloso-glutinoso sublongioribus. Lin. Cum priore.

\* *glauca*, fol. lanceolato-ovatis subtus glaucis, stam. cor. vix longiorib. Lam. ill. t. 110. f. 2. Prioris var. secundum Aiton. Huc *A. scabra* quorundam. Cor. alba.

8. *periclymena*, fol. glabriusculis nervo supra lanuginoso subtus setigero, florib. non viscosis (roseis) limbo ampliore tubo hirsuto, stam. longissime exsertis. Mich. Flor. t. p. 151. Hab. in New-Jersey. Fol. utrinque viridia.

9. *canescens*, fol. subtus canescentib., cor. nuda non viscosa (rosea), cal. minutissimi dentib. rotundatis. Michaux, p. 150. Hab. in Carol. inferiore juxta rivulos. Stam. exserta.

CAPRIFOLIÆ. 5-andræ (gen. 485-499).  
Cal. monophyllus, superus sæpius bracteatus. Cor. monopetala (passim poly-petala), subirregularis. Stam. 4, 5, 6, 10. Styl. 1. Stigm. 1-3. Fruct. inferus baccatus, nonnunquam capsularis. Embryo in cavitate superna perispermii solidi magni situs. Caul. ut plurimum frutescens. Fol. in plurimis opposita, sed stipulis destituta, quo hæc familia a rubiaceis quoque differt.

485. LONICERA. Cal. 5-dentatus.  
Cor. tubulosa, 5-fida irregularis.  
Bacca infera, 2-3-4-locularis, polysperma.

\* CAPRIFOLIUM. Florib. in pedicello solitariis, tubo ut plurimum longo. Bacca distincta, 3-loculari.

1. *Caprifolium*, flor. ringentibus terminalibus sessilibus, fol. summis connato-perfoliatis. Linn. Willd. Spec. 2. p. 982. Jacq. Flor. austr. t. 357. Hab. in nemorosis et dumetis Europæ. præsertim aust. Cal. subintegerrimus. h

2. *Periclymenum*, capitulis ovatis imbricatis terminalibus, fol. omnib. distinctis ringentibus. Smith brit. t. p. 260. Flor. dan. t. 608. *P. quercifolia*, fol. sinuatis. Hab. in nemorosis. Cal. 5-dentatus.

3. *parviflora*, fol. summis connato-perfoliatis subtus glaucis, cor. breviusculis gibbis, filam. barbatis. Enc. botan. t. p. 728. L. media et L. dioica. L. Syst. veg. huc pertinent. Caprifolium bracteosum. Mich. Flor. t. p. 105. Hab. in Carolinæ montib.

Fl. flavescentes aut etiam secundum Mich. violaceo-purpurei, in axillis bractearum sessiles, rarius pedunculati.

4. *sempervirens* (coccinea), fol. summis connato-perfoliatis, cor. infundibuliformi subregulari. Caprifolium *sempervirens*, spicæ verticillis distantibus, corol. subregulari rutilo-coccinea. Mich. l. c. Herm. Lugd. t. 481. Hab. in Carolinæ sylvis. Fl. per totam æstatem. Frut. tener.

5. *grata*, flor. verticillatis terminalibus, fol. perennantibus obovatis subtus glaucis, summis connato-subperfoliatis, cor. ringentibus. Ait. Kew. t. p. 231. Habit. in Amer. bor. Fol. plerumque terna. Willd.

6. *japonica*, flor. binis terminalib. sessilibus, fol. omnibus distinctis, caule volubili. Thunb. jap. p. 89. Hab. in Japonia. L.

\* \* Xylosteon, pedunc. bifloris, baccis 2, basi connatis, 2-locularibus, aut in unam coadunatis.

7. *canescens*, pedunc. bifloris, baccis distinctis, caule volubili, fol. cordato-ovatis petiolatis. Schousb. maroc. t. p. 88. L. *biflora*, Desf. Atl. t. p. 184. t. 52. Hab. in sepibus ad Magadore et in monte Trara. h

8. *nigra*, pedunc. bifloris baccis distinctis, fol. ellipticis integerrimis. Linn. Jacq. Flor. austr. 4. t. 314. Hab. in Eur. austr. Fol. juniora hirsuta. Pedicelli fol. incumbentes. Bract. fructib. adpressæ.

9. *Xylosteum* (dumetorum), pedunc. bifloris baccis distinctis, fol. integerrim. pubescentibus. Linn. Flor. dan. t. 808. Hab. in sylvaticis. Pedicelli perpendiculares. Bract. lineares, patentes.

10. *tartarica*, pedunc. bifloris, baccis distinctis fol. cordatis obtusis. Jacq. ic. pl. rar. t. 37. Pallas. Flor. rossica. t. 36. Hab. in Tartaria. Bract. 2, lineares.

*P. sibirica*, flor. rubris.

11. *pyrenaica*, pedunc. bifloris, bacc. distinctis, fol. obovato-lanceolatis glabris. Willd. Sp. 2. p. 987. Hab. in Pyrenæ. Flor. primo vere. Cor. regulares. Bract. lanceolatae.

12. *alpigena*, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis didymis, fol. ovali lanceol. L. Caprifolium foliis ovato-lanceolatis subhirsutis, bacc. bicolla biflora. Hall. helv. Hab. in alpinis. Fol. glabra. Cor. fusco-rubra. Vere.

13. *caerulea*, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis globosis, stylis indivisis, fol. ovat.

Lin. Pall. ross. 1. p. 58. t. 37. Hab. in Helvetia. Cor. flava.

14. *orientalis*, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis, fol. petiolatis ovatis acutis, subtus pubescentibus. Lain. enc. 1. p. 724. Tournef. cor. 42. Hab. in Asia minori.

15. *flexuosa*, flor. subsessilibus, basi distinctis, fol. ovatis integris glabris, caul. flexuoso. Thunb. in Act. Soc. Lin. 2. p. 330. L. nigra. Flor. jap. p. 89. Hab. in Japonia.

\*\*\* SYMPHORICARPOS (*Symphoria*.) Cal. 4 - dentatus. Cor. 3 - fida, subaequalis. *Bacca* coronata, 4-locularis, 4-sperma; loculis 2 interdum abortivis.

16. *Symphoricarpos* (*S. conglomerata*), flor. axillarib. subcapitato-glomeratis. *Symphoricarpos vulgaris*. Michaux, Flor. 1. p. 106. Lin. Willd. Spec. 2. p. 986. Dill. elth. t. 278. f. 360. Habit. in Virginia et Carolina.

17. *racemosa*, racemo terminali, cor. intus barbata. *Symph.* racemosus. Mich. l. c. p. 107. Hab. in montosis, ad lacus Mistassin. Cum priore a *Loniceris* potius separari debet.

485. *DIERVILLA*. Cal. oblongus, 5-fidus. Cor. duplo longior, infundibuliformis, 5-fida, patens. *Caps.* oblonga, 4-locularis, polysperma.

1. *humilis*. D. *Tourneforti*, racemis terminalibus, fol. serratis. Michaux, 1. p. 107. *Lonicera Diervilla*. Lin. Tournef. in Act. Soc. reg. 1706. t. 7. f. 1. Habit. in Acadia, Noveboraco, Canada et in Carolinae alpestribus. Frutex elegans. Flor. lutei.

*Obs.* *Lonicera dubalina* et *corymbosa*. Lin. nec hujus nec *Lonicerae* genus.

487. *TRIOSTEUM*. Cal. 5 - fidus. Cor. vix longior, tubulosa, 5-loba. *Bacca* 3-locularis, 3-sperma, infera.

1. *perfoliatum* (majus), fol. connatis flor. sessilibus perfoliatis. Willd. 2. p. 990. Dill. elth. t. 293 f. 378. Hab. in Amer.

2. *angustifolium*, caule hispido, fol. connatis, pedunc. oppositis unifloris. Vahl. symb. 3. p. 37. T. *minus*. Michaux, Flor. 1. p. 107. *Lonicera humilis* hirsuta, caule obsolete rubente quadrato, fol. lanceolatis adversis, flore luteo ad alas unico. Gron.

virg. 143. Pluck. alm. 287. t. 104. f. 2. Hab. in Virginia. Cor. lutea. T.

3. *triflorum*, caule subpubescente, pedunculis oppositis trifloris, fol. petiolatis Vahl. symb. 3. p. 37. Hab. in Madagascar? Caul. tenuissime pubescens.

488. *HELICIA*. Cal. oblongus, truncatus, suffultus bractea carnosa. Cor. 5 - partita. *Anthera* spirales. *Bacca* calycina, 1-sperma.

1. *parasitica*. *Helitanthera parasitica*, Loureiro Flor. Cochinchin. ed. Willd. 1. p. 176. Fol. lanceolata. Spicae axillares, flor. coccinei Adreptis arboribus cultis in Cochinchina.

489. *AIDIA*. Cal. tubulosus, 5-dentatus. Cor. hypocrateriformis, fauce lanosa. *Anth.* lineares, cor. incisuris insertae. *Bacca* 1-sperma.

1. *cochinchinensis*. Loureiro, l. c. p. 177. Fol. lanceolata. Racemi axillares. Arb. magna; lignum album, grave.

*Obs.* Duo haecce b. Loureiro genera ab ill. Jussieu confirmata sunt; vid. les Genres des Plantes par O. F. Brisseau - Mirbel, tome 4. p. 407-408.

SOLANACEAE. *Luridae*. Lin. (Gen. 490-508.) Cor. his monopetala, campanulata aut rotata: limbo 5-lobo, paululum irregulari. *Stamin.* nonnunquam didynamia. *Styl.* omnibus unicus, stigmatum plerumque simplicis. Fruct. in plurimis *bacca* 2-5-locularis, aut *capsula* 2-locularis, 2-sperma. Caulis herbaceus aut frutescens. Folia alterna, in multis plus minusve tomentosa, in quibusdam per paria aut fasciculata approximata. Plantae hujus familiae quoad fructum aliasque partes in universum suspectae imo nonnullae venenatae, quod earum habitus luridus etiam ostendit. Nonnullae interea tam ad usum medicum quam oeconomicum utilissimae reperiuntur

† *Fructus capsularis*.

490. *VERBASCUM*. Cor. rotata, subinaequalis. *Filam.* barbata. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis: valvul. inflexis, polysperma.

1. *Thapsus*, fol. decurrentibus utrinque

tomentosis, caule spicato simplici. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1001. Flor. dan. t. 631. Engl. bot. t. 549. Hab. in Europae glareosis sterilibus. Flores flavi. Anth. miniatæ. ♂

2. *Thapsoides*, fol. decurrentib., caul. ramoso. Lin. Habit. in Europa rarius. ♂

3. *Boërhaavii*, fol. sublyratis, florib. sessilibus. Lin. V. fol. radicalibus ovatis petiolatis, caulinis oblongis sessilibus, subtus tomentosis serratis. Mill. t. ic. 273. Hab. in Europa australi. ☉

4. *haemorrhoidale*, fol. ovato-oblongis basi attenuatis tomentosis obsolete crenulatis, racemis spiciformibus elongatis, fasciculis flor. ebracteatis. Aiton. Kew. t. p. 236. Hab. in Madera. ♂

5. *phlomoides*, fol. ovatis utrinque tomentosis: inferioribus petiolatis. Linn. II. 239. V. fol. obovatis sessilibus tomentosis, spica composita interrupta, bract. cordato-lanceolatis. Moench. Flor. hass. n. 170. t. 4. Hab. in Italia et Germania. ♂

6. *floccosum*, tomentoso-candicans, fol. ovatis subintegerrimis, glomerulis multifloris, caps. rotundis. Plant. Hungaricæ, p. 81. t. 79. Cresc. in Hungaria inter arbor. et frutices. Caul. 3-4 - pedalis, tomento detergo, elegant purpurascens. Filam. pilis albis. An satis a sequente diversum?

7. *Lychnitis*, fol. cuneiformi - oblongis supra denudatis, caule angulato paniculato. Smith. brit. 1. p. 250. V. album. Moench. meth. p. 447. Engl. bot. t. 58. Hab. in pascuis et ad vias, solo calcareo. Flor. pedicellati, lactei. Filam. flavescentia. Anth. croceæ. Smith.

8. *pulverulentum*, fol. ovato - oblongis subserratis utrinque pulverulentis, caule tereti paniculato. Smith. l. c. V. *pulverulentum*, caule ramoso, calyc. farinosi fasciculatis farinosi, flore luteo. Villars. Delph. 2. p. 490. Engl. bot. t. 487. Cresc. in ruderalis, sepih. ad margines agrorum. Flor. majores aurei, filam. villo albo et anth. miniatæ distincti. Sm.

9. *nigrum*, fol. oblongo-cordatis petiolatis undulato-crenatis subpubescentib. Sm. l. c. Engl. bot. t. 95. Flor. dan. t. 1088. Hab. in sylvaticis. Flor. aurei. Filam. villus violaceus.

10. *virgatum*, fol. oblongo - lanceolatis dentatis sessilibus, radicalibus sublyratis pubescentibus, caule ramoso, flor. aggregatis subsessilibus. Sm. p. 252. Engl. bot. t. 550. Lob. ic. 564. Verbasz. Chaici. Vill. 2. p. 491. t. 13. V. gallicum. Willd. Sp. 2. p. 1005. eadem videtur planta. Hab. in

Angliæ arvis, et ad vias et inter rupes in Delphinatu. Filam. purpurea. V.

\* *Alopecurus*, fol. ovatis subtus incanis crenatis spica laxa rarius ramosa (simpliciuscula). V. nigrum. β. Lin. Hort. Cliff. 54. Thuill. l. c. p. 110. Hab. in locis aridis,

11. *parisiense*, fol. caulini obverse ovatis cum acumine: floralibus (bracteis) lanceolatis, caule ramoso. Thuill. Flor. Par. p. 110. Hab. circa Parisios in locis glareosis. Flor. lutei.

12. *ferrugineum*, fol. subvillosis rugosis, caulinis subsessilibus aequaliter crenatis, radicalibus oblongis cordatis duplicato-crenatis. Aiton. Kew. 1. p. 237. Andrew. t. 162. Hab. in Europa austr. Filam. incrassata.

13. *phoeniceum*, fol. ovatis nudis crenatis radicalibus, caule subnudo racemoso. Lin. Jacq. austr. t. 125. Blatteria purpurea. Baul. pin. Hab. in Europa orientali, Germania, Carniolia. Cor. rotata, saturate purpurea. Filamenta purpurea, horum superiora 3 barba alba. Anth. nigricantes b. ♂

14. *Blatteria*, caule ramoso, fol. amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis. Lin. Hab. in Europ. australioris argillaceis. Var. flor. albis. ♂

15. *viscidulum*, fol. oblongis amplexicaulibus nudiusculis, radicalib. sinuato-crenatis, scapo pedicellisque subbifloris glanduloso-viscidulis. V. Blatterioideis. Enc. bot. 4. p. 225. Thuill. Paris. Hab. circa Parisios.

16. *Claytoni*, glabrum, caule simpliciusculo, fol. caulinis oblongis sublanceolatis incisus duplicato-crenatis. Mich. Fl. 1. p. 148. Hab. in Carolina.

17. *monspessulanum*, fol. ovato - lanceolatis petiolatis profunde dentatis, flor. spicatis. Hab. prope Montpellier. Vidi in herbario cl. Richardi. Folia quasi sinuato-dentata, parvula.

18. *sinuatum*, fol. radicalibus pinnatifido - repandis tomentosis: caulinis amplexicaulibus nudiusculis, ramis primi oppositis. Lam. encyc. 4. p. 221. Willd. Sp. 2. p. 1006. Habit. in Europa austr Italia et Gallia merid.

19. *undulatum*, fol. incano-tomentosis, radicalibus sinuato-crispis, caulinis sessilib. indevisis, caule virgato, flor. sessilib. Lam. l. c. V. graecum fruticosum, fol.

sinuato candidissimo. Tournes. it. 1. p. 335. Hab. in Oriente.

20. *parviflorum*, fol. pinnatifido-runcinatis utrinque tomentosis radicalibus, caule ramoso nudiusculo, flor. minimis. Lam. 1. c. in Oriente? Fol. Toxicici. Fl. parvulate Scopariae dulcis similes. L.

21. *lyratum*, hirsutum, fol. radicalib. lyrato - pinnatifidis : caulinis inaequaliter dentatis, subsessilibus, cal. 5-phylo serrato. Lam. enc. 4. p. 222. Hab. in Hispania?

22. *pinnatifidum*, fol. lineari - lanceol. pinnatifidis, lacinii obtusis dentatis, flor. sessilibus glomeratis. Vahl. symb. 2. p. 39. Hab. in ins. Archipelagi.

23. *Barnadesii*, caule subnudo, fol. lanceolatis dentato - sinuatis glabris, pedunc. unifloris. Vahl. symb. 2. p. 39. Hab. in Hispaniae collibus versus oppidum Ortales.

24. *Osbeckii*, fol. incisus nudis, caule folioso, cal. lanatis, pedunc. bifloris. Osb. it. 2. Blattaria orientalis, Bugulae folio, flore maximo virescente lituris luteis in semicirculum striato. Tournes. cor. 8. it. 2. p. 83. t. 83. Buxb. cent. 5. p. 17. t. 32. Hab. in Hispania et circa Bosphorum. ♂

25. *spinosum*, caule folioso frutescente. Lin. Moen. acad. 4. p. 307. Vahl. symb. 2. p. 39. Leucoium spinosum. Alp. exot. 37. t. 36. Hab. t. in Creta. ♀

491. **RAMONDA**. Scapi radicales. *Cor.* rotata, 5 - partita. *Stam.* approximata : antheris apice perforatis. *Caps.* 1 - locularis ; recept. 2, parietalia, polysperma. *Richard.*

1. *pyrenaica*, fol. ovalibus tomentosis arenatis. Verbascum Myconi. Lin. Ehrh. pl. select. t. 57. Mill. ic. t. 277. Hab. in Pyrenaeis. Hoc genus in memoriam cl. Ramond ob merita in plantas pyrenaeas observandas sic appellatur.

492. **DATURA**. *Cor.* infundibuliformis, plicata. *Cal.* tubulosus, angulatus, deciduus : basi orbiculata persistente. *Caps.* 4 - valvis, 4 - locularis, laevis, aut spinosa.

1. *ferox*, pericarpis spinosis erectis ovatis : spinis summis maximis convergentibus. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1007. Moris. 3. s. 15. t. 2. f. 4. Hab. in China. Flores parvuli. Fol. plicata. ♂

2. *Stramonium*, pericarp. spinosis erectis ovatis, foliis ovatis sinuatis glabris basi in petiolum attenuatis. Flor. dan. t. 436. Blackw. t. 3. f. Curt. Lond. ic. Habit. in America, nunc vulgaris in ruderatis per Europam. In loco natali cor. etiam violaceo-caerulea. Flor. Per. c. p. 15. ☉

3. *Tatula*, pericarpis spinosis erectis ovatis, fol. cordatis glabris dentatis. Lin. Hab. ... Fol. basi quasi truncata. Caul. purpurascens, punctis albis adpersus. Cor. pallide caeruleae ☉

\* *dubia*, fol. ovato - lanceolatis indivisis petiolatis. Hab. ... Ex herb. cl. Richardi. An var. sequentis cultura ortae?

4. *fastuosa*, pericarpis tuberculatis nutantibus globosis, fol. ovatis angulatis. Rumph. 5. t. 243. f. 2. Hab. in Aegypto. Cor. violacea, intus alba, passim duplicata c. plena. ☉

5. *Metel*, cal. tereti subtumido, pericarpis spinosis nutantibus globosis, foliis cordatis subintegris pubescentibus. Linn. Kniph. cent. 1. t. 24. Rumph. 5. t. 87. Habit. in Asia, Africa et in insulis Canariis. Omnium foetidissima. ☉

6. *laevis*, pericarpis glabris inermibus erectis, fol. glabris, caule fistuloso herbaceo. Ait. Kew. 1. p. 239. Jacq. hort. 3. p. 44. t. 82. Hab. in Abyssinia. ☉

7. *ceratacaula*, pericarp. obovatis inermibus pendulis, fol. ovato - lanceolatis undulatis subtus tomentosis, caul. dichotomis corniformibus. Ortega, Decad. p. 11. D. *macro-caulis*, fol. oblongis repandis subtus sericeis, caule herbaceo inferne piloso superne globo subinflato. Roth. N. Bot. Beyträge, p. 159. Cresc. in ins. Cuba. Cor. speciosa alba : angulis purpureo-nitibus, circa vesperam explicatur. ☉

493. **BRUGMANSIA**. *Cal.* latere ruptilis, persistens. *Cor.* infundibuliformis, plicata. *Antherae* conglutinatae. *Stigma* utrinque lineatum decurrens. *Caps.* 2 - locularis (inermis.)

1. *candida*, floribus pendulis. *Datura arborea*, pericarp. glabris inermibus oblongis pendulis, fol. ovato-lanceolatis oblongisque geminis, caule fruticoso. Flor. Per. 2. p. 15. t. 128. cfr. Willd. Spec. 2. p. 1010. Hab. in Peruvia. Flores vespertino tempore fragrant, maximi, albi, penduli. ♀

2 ? *bicolor*, fol. congestis, cor. versicolore. *Datura sanguinea*, pericarp. inermibus

mibus oblongo-cylindricis pendulis, fol. lanceolatis angulatis congestis, caule fruticoso. Flor. Per. 2. p. 15. Cresc. in Peruv. in altis, frigidis et ruderatis. Cor. e medio ad basin lutescens, superne rubra, lineis r5 sanguineis maculata.

*Obs.* Ex analogia cum priore, nec ex autopsia, hanc speciem huc retuli. Cl. Moench. in Meth. plant. suppl. p. 37. aliam adhuc speciem capsulis muricatis instructam descripsit, quae forte etiam hujus generis est. Speciosum hoc genus, cum Daturis habitu tantum conveniens, memoriae Cl. Brügmans, Professoris Historiae naturalis et Botanices Lugduni Batavorum meritiissimi et dignissimi dicari velim.

494. *HYOSCYAMUS*. Cor. infundibuliformis, obtusa, irregularis. Stam. inclinata. Caps. operculata, 2-locularis.

1. *niger*, fol. amplexicaulibus sinuatis, flor. venosis sessilibus. Lin. Willd. Spec. 2. p. 1010. Engl. botan. t. 52. Hab. in Europ. ruderatis pinguibus. Planta venenata. Cor. ochroleuca. ♂

2. *reticulatus*, fol. caulinis petiolatis cordatis sinuatis acutis : floralibus integerrimis, corol. ventricosis. Linn. Cam. hort. 77. t. 22. Habit. in Creta, Syria, Aegypto. Cor. campanulatae, rubrae, venis obscuris pulchre reticulatae. L. ♂

3. *albus*, fol. petiolatis sinuatis obtusis, flor. sessilibus. Lin. Blackw. t. 112. Hab. in Europa australi. ⊙

4. *aureus*, fol. petiolatis dentatis acutis, flor. pedunculatis, fructibus pendulis. Lin. Hab. in Creta, Oriente. Cor. aurea, fauce atro-purpurea striata. ♂

5. *muticus*, fol. petiolatis ovatis acutangulis, calycibus muticis, bract. indivisis. Lin. Mant. 45. H. betaeifolius. Lam. Hab. in Aegypto, Arabia. Racemus secundus apice incurvato. ♂

6. *pusillus*, fol. lanceolatis dentatis : flor. inferioribus binis, calycibus spinosis. Pluck. alim. 188. t. 37. f. 5. Habit. in Persia. Cor. flava fauce nigra. ⊙

7. *physaloides*, fol. ovatis integerrimis, calycibus inflatis subglobosis. L. Amoën. acad. 7. t. 6. f. 1. Hab. in Sibiria. Cor. purpurascens. Stam. conniventia. Stigma capitatum : albidum. Floret primo vere. ♀

8. *Scopolia*, fol. ovatis integris, calyc. inflatis campanulatis laevibus. Scop. carn.

ed. 2. n.º 254. *Scopolia carnolica*. Jacq. obs. 1. p. 32. t. 20. Hab. circa Idriam in sylvis. Cor. Atropae. Caps. operculata Hyoscyami.

495. *NICOTIANA*. Cor. infundibuliformis, limbo plicato. Stam. inclinata. Caps. 2-valvis, 2-locularis.

1. *Tabacum*, fol. lanceolato-ovatis sessilibus decurrentibus, flor. acutis. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1014. Blackw. t. 146. Hab. in America; nota Europaeis ab a. 1560.

2. *fruticosa*, fol. lanceolatis subpetiolatis amplexicaulibus, flor. acutis, caule frutescente. Lin. Hab. ad Cap. b. spei et in China.

3. *rustica*, fol. petiolatis ovatis integerrimis, flor. obtusis. Blackw. t. 437. In America.

4. *paniculata*, fol. petiolatis cordatis integerrimis, flor. (parvis) paniculatis obtusis clavatis. Flor. Per. 2. p. 16. t. 129. Habit. in Peru.

5. *urens*, fol. cor. latis crenatis, racem. recurvatis, caule hispido pruriginoso. L. Plum. Spec. 3. ic. 211. Hab. in America meridionali. Caps. Acanthi more dehiscit. Juss. h

6. *glutinosa*, foliis petiolatis cordatis integerrimis, flor. racemosis secundis subringentibus. Lin. Flor. Per. 2. p. 16. Act. holm. 1753. p. 41. t. 2. In Peru et petrosis Limaec. Calycis una lacinia reliquis duplo major. ⊙

7. *undulata*, fol. radicalibus subsaputatis : caulin. petiolatis ovatis undulatis, flor. nutantibus : tubo longo cylindrico. Vent. Jard. de Malmaison. p. 10. t. 10. Hab. prope oppidum Jackson in N. Holl. Silenem refert. Cor. lactea : limbo plano.

8. *crispa*, caule tuberculato ramoso, ramis attenuatis, fol. lanceolatis acutis undulato-crispis. N. plumbaginifolia. Viviani Elench. Plant. Hort. Dinegro. p. 26. N. crispa. H. P. Flor. albid. Cor. laciniis acutis, plicatis.

9. *tomentosa*, fol. lanceolatis decurrentibus subtus tomentosis, panic. maxima diffusa, cor. subringentibus acutis. Flor. Per. 2. p. 16. t. 129. f. a. Hab. in ruderatis et arvis in Peruvia. h

10. *undulata*, fol. lanceolatis petiolatis undulatis, racemis terminalibus, calice bilabiato, cor. brevibus acutis. Flor. Per. t. 130. f. b. Cresc. in frigidis locis Tar-

mae. Cal. denticulus supremus longissim.  
Cor. lutea. ☉

11. *angustifolia*, fol. lanceolatis: superioribus linearibus acutis, panic. diffusa, cor. angustissimis: limbo plicato. Fl. Per. t. 130. f. a. In Conceptionis Chile versuris. Cor. tubus viridis, limbus albus. ☉

12. *pusilla*, fol. oblongo-ovalibus radicalibus, flor. racemosis acutis, fol. ovato-lanceolatis obtusis rugosis, cal. brevissimis. Mill. ic. 185. f. 2. Hab. in Vera Cruce.

496. PETUNIA. Cal. profunde 5-fidus: laciniis subspathulatis. Cor. tubulosa: limbo dilatato subquinelobo. *Stigma* capitatum, bilobum. *Caps.* 2-valvis, 2-locularis, polysperma.

1. *parviflora*, caulibus prostratis, cor. vix calyce longioribus. Jussieu in Annal. du Mus. d'Hist. Natur. Fasc. 9. p. 214. 216. t. 47. f. 1. Hab. in America ad flum. Plata, uti et sequens species. Fol. Cerastii.

2. *nyctaginiflora*, caule hirsuto, foliis ovato-oblongis pubescentibus, cor. calyce 4-plo longiorib. Juss. l. c. f. 2. Fol. Heliotropii. Cor. magna Mirabilis. J.

497. LAMARCKEA. Cal. longus, 5-gonus, 5-fidus. Cor. hypocrateriformis, 5-partita: limbo subæquali obtuso. *Caps.* teres, 2-locularis, polysperma.

1. *coccinea*, glaberrima, fol. obovatis nitidis. Richard in Act. Soc. Lin. p. 107. Hab. in Cayenna.

++ *Fructus baccatus.*

498. ULLOA. Cal. ovatus, inflatus, 5-partitus. Cor. tubulosa: fance gibbosa. *Stigma* oblongum. *Bacca* bilocularis calyce magno obvoluta. *Sem.* reniformia.

1. *parasitica*. Juanulloa parasitica, fol. oblongis acuminatis, racemis dependentib. dichotomis. Flor. Peruv. 2. p. 47. t. 185. Hab. in Peruv. nemoribus. Flor. et fruct. colore puniceo. h

499. JABOROSA. Cor. tubulosa. Cal. 5-fidus, brevis. *Stam.* fandi inserta. *Stigma* capitatum. *Bacca*?

1. *integrifolia*, fol. ovatis subintegerrimis, flore longo tubuloso. Lam. enc. 3. p. 181. t. 114. Willd. Sp. 2. p. 1016. Hab. in Bonaria. ☿

2. *runcinata*, fol. sinuato-lyratis dentatis, flore brevi subcampanulato. l. c. Cum priore. Scapus in his speciebus est uniflorus. Willd. ☿

500. TRIGUERA. Cor. campanulata: limbo inæquali. *Nect.* breve, germen cingens, 5-dentatum. *Filam.* nectario inserta. *Bacca* 4-locularis: loculis 2-spermis.

1. *ambrosiaca*, caule sulcato-alato, fol. superioribus obovatis dentatis pubescentibus. Willd. Sp. 2. p. 819. Cav. Diss. 2. app. 2. t. a. Hab. in Boëtia. ☉

2. *inodora*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis glabris. Cav. l. c. app. 3. Cresc. cum priore.

501. SOLANDRA. Cal. rumpens. Cor. clavato-infundibuliformis maxima. *Bacca* 4-locularis, polysperma.

1. *grandiflora*. Swartz. Flor. p. 387. t. 9. Willd. Sp. 2. p. 936. In Jamaic. arborib. maximis et rupium fissuris subparasitica. Cor. lutea. Datura sarmentosa. Lam. ill. 2. p. 9.

502. ATROPA. Cor. campanulata. *Stam.* distantia. *Bacca* globosa, 2-locularis, calyci insidens.

1. *Mandragora*, acaulis, scapis uniflor. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1016. Bull. herb. t. 145. *Mandragora* acaulis. Gaertn. de sem. 2. p. 237. Blackw. t. 364. *Mandragora* mas. Lobel. ic. 267. Flor. vere. Cor. albidula.

β. A. fol. minoribus angustioribus et magis undulatis. Lam. encycl. 1. p. 391. *Mandragora* flore subcaeruleo purpurasc. Bauh. pin. Hab. in Hispaniae, Helvetiae, Italiae, Sibiriae, Cretae, Cycladum spicis. An distinctum genus?

2. *Belladonna*, caule herbaceo brachiato, fol. ovatis integris. L. Jacq. austr. 4. t. 309. Hab. in Austriae, Angliae, Germaniae, Italiae montibus sylvestribus. Corol. parum ringens, fusca. *Bacca* nigra, venenata. ☿

3. *umbellata*, caule frutescente, fol. ovatis cordatisque integerrimis angulatisque, flor. umbellatis, cor. revolutis. Flor. Per. 2. p. 44. t. 181. f. a. Hab. in Peruviae collibus. Cor. mellifera. *Stigm.* capitatum.

4. *biflora*, -caule fruticoso, fol. ovatis acutis integerrimis, pedunc. bifloris, stam. cor. longioribus. Flor. Per. t. 181. f. 3. b. Cresc. in praeruptis locisque humidis. Cor. suburceolata, extus villosa. Stigmat. 2-lobum.

5. *bicolor*, caule fruticoso, fol. ovatis angulatis glabris, pedunc. 3-4-floris. Flor. Per. 2. p. 45. Habit. in Peruviae umbris. Corol. tubulosa, rubro-viridis. Fol. subgemma.

6. *aspera*, caule herbaceo, fol. ovatis geminis: altero minori, flor. solitariis cernuis, cor. subdecemfidis. Flor. Per. l. c. Cor. luteo - caerulea, centro violacea: lacin. 5 - acutis, 5-alternis emarginatis. Filam. hirsuta.

7. *procumbens*, caule herbaceo procumbente, fol. geminis ovatis integerrimis (tenerioribus dorso et margine villosis) flor. umbellatis plicatis glan. glabris. Cav. ic. 1. p. 53. t. 72. A. plicata. Roth. Cat. 2. p. 24. *Saracha procumbens*. Flor. Per. 2. p. 43. t. 180. f. b. Hab. in Peruvia et Mexico. Cor. pubescens. Bacca depressoglobosa, lutea, 2-locularis. Roth. 1-locularis. Fl. Per.

8. *umbellata*, caule erecto herbaceo hirsuto, umbellis axillaribus pedunculatis cernuis, fol. plicatis, filam. basi barbatis, fol. ovatis scabris, floralib. geminis. Roth. l. c. p. 26. Hab. ... Bacca globosa nitida atra, lincis 4-cruciatis notata, 2-locular. Priori affinis.

\* *SARACHA*. Cor. rotato-campanulata. Bacca (per abortum) 1-locularis. Recept. carnosum.

9. *punctata*, suffruticosa, fol. ovato-oblongis, cor. punctatis. Flor. Per. 2. p. 42. t. 178. In Peruv. altis. Flor. majusculi nutantes.

10. *dentata*, caule procumbente, fol. geminis ovatis integris dentatisque, pedunc. subquadrifloris. Flor. Per. 2. l. c. t. 179. f. b. sub *Saracha*, uti antecedens et aequalea species. Corol. albo - violacea, utrinque villosa. Cresc. cum priore.

11. *contorta*, fol. ovatis angulato-dentatis integrisque, pedunc. multifloris umbellatis. Flor. Peruv. 2. p. 43. t. 180. f. a. In praeruptis Cantac. Stamina basi hirta. ☉

12. *biflora*, pubescens, fol. ovatis subgeminis, pedunc. bifloris. Flor. Peruv. 2. p. 42. t. 139. Hab. in Peruvia inter segetes et ad saepes. Corol. luteo - viridis. Bacca alba. ☿

13. *solanacea*, caule fruticoso, pedunc. solitar., cor. campanulatis, fol. subovatis. Linn. Mant. 205. *Solanum aggregatum*. Jacq. ic. rar. 2. t. 323. Collect. 4. p. 124. *Solanum guineense*. Lin. Spec. plant. 2. p. 203. Hab. ad Cap. b. spei littora maritima. ♀

Obs. An potius *Solanum*? vide Roth N. Bot. Beyträge, p. 162.

14. *arborescens*, caule frutescente, peduncul. confertis, corol. revolutis, fol. oblongis. Linn. Habit. in locis montosis frigidis Jamaicae. Cor. alba. ♀

15. *frutescens*, caule fruticoso, pedunc. confertis (subsolitariis), fol. cordato-ovatis obtusis. Linn. Lam. ill. t. 114. *Physalis suberosa*, cortice suberoso, fol. orbiculatis nitidis integerrimis. Cavan. ic. 2. p. 1. t. 102. Barr. ic. 1173. Hab. in Hispania. ♀

503. *NICANDRA*. Cal. 5-partitus, 5-angulatus: angulis compressis lacinisque sagittatis. Cor. campanulata. Stam. incurva. Bacca carnosa (exsucca 3-5-locularis, cal. tecta.)

1. *Physolodes*. Gaertn. de fruct. 2. p. 237. t. 131. Atro, a *Physolodes*. Lin. *Calydermos erosus*. Flor. Per. 2. p. 44. Hab. sponte in segetibus, ruderalis et versuris Limae etc., ubi per totum annum floret. Caulis subaltus ramosissimus. Cal. membranaceus venoso-reticulatus. Cor. albo-caerulea. ☉

504. *LINKIA*. Cal. 5-partitus: lacinis linearilanceolatis erectis. Cor. campanulata: tubo pentagono. Anih. sagittatae.

1. *peruviana*. Desfontainia *spinosa*, fol. ovatis dentato-spinosis, flor. solitariis. Flor. Per. 2. p. 47. t. 186. Hab. in Peruv. nemoribus ad Churupallana praedium in Provinc. Tarma et inter Munna et Pozuzo. Fol. sapore amara, eaque masticata pappum luteo colore tingunt. Frutex ad sepes conficiendas utilis et ob flor. coccineorum pulchritudinem coli meretur.

Obs. Cum jam genus *Fontanesia* existat, nomen mutandum erat. Plantam dicavi memoriae Cl. Link, viri amicissimi, Professor. apud Rostockienses, ob opuscula botanica varia bene meriti.

505. *PHYSALIS*. Cor. campanulato-rotata. Stam. conniventia.

*Bacca* intra calycem inflatum, bilocularis.

\* *Perennes.*

1. *somnifera*, caule fruticoso, ramis rectis, flor. confertis. Willd. Spec. 2. p. 1019. Cavan. ic. 2. p. 2. t. 103. Habit. in Mexico, Creta, Hispania. Fructus Phyalidis, Flos Atropae.  $\mathcal{H}$

2. *aristata*, caule fruticoso, fol. oblongis integris glabris, ramis petiolis pedunculisque lanuginosis, denticulis calycin. aristatis. Ait. Kew. 1. p. 244. Habit. in ins. Canariis.  $\mathcal{H}$

3. *flexuosa*, caule fruticoso, ramis flexuosis, flor. confertis. L. Hab. in India. Habitus P. *somniferæ*.  $\mathcal{H}$

4. *arborescens*, caule fruticoso, fol. ovatis pilosis, flor. solitariis, cor. revolut. Lin. Mill. dict. t. 206. f. 2. Hab. in Campechia.

5. *curassavica*, caul. fruticoso, fol. ovatis tomentosis. Lin. Pluck. alm. 352. t. 111. f. 5. Hab. in Curassao.

6. *tomentosa*, caule fruticoso tomentoso, fol. elliptico-oblongis tomentosis, fl. lueratilib. aggregatis. Thunb. prodr. p. 37. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{H}$

7. *viscosa*, fol. geminis repandis obtusis subtomentosis, caule herbaceo superne paniculato. Jacq. hort. t. 136. Alkekengi bonariense repens, bacca turbinata viscosa. Dill. elth. 11. t. 10. f. 8. Hab. in Virginia, Bonaria. Tomentosa et subscabra, sed non viscosa. Jacq.  $\dagger$   $\mathcal{H}$

8. *obscura*, herbacea divaricato - ramosissima, foliis suborbiculatis acuminatis inaequaliter dentatis. Michaux Flor. 1. p. 149. Habit. in Carolina. Cor. flava, maculis fuscis, anth. caerulecentes. Var. viscido-pubescent, et  $\beta$ . glabra.

9. *lanceolata*, pumila pubescens, fol. subsessilibus ovali-lanceolatis subintegris, cal. villosa, caule dichotomo. Mich. l. c. In Carolina.  $\mathcal{H}$

10. *pensylvanica*, fol. ovatis subrepandis obtusis nudiusculis, flor. geminis, caule herbaceo. Hab. in Virginia. Flor. unicolores.  $\mathcal{H}$

11. *Alkekengi*, foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso. Hab. in Italiae, Germaniae, Japoniae scrobilibus. Calyces fructus sanguinei.  $\mathcal{H}$

12. *peruviana*, pubescens, fol. cordatis integerrimis. Spec. pl. 1670. Hab. Lima.

Simillima *Daturae* Metel. Flor. penduli, lutei, umbilico cor. maculi quinque fuscis utrinque conspicuis, fauceque hirsuta. L.

\*\* *Annuae.*

13. *angulata*, ramosissima, ramis angulatis glabris, fol. ovatis dentatis. P. fol. oblongo-lanceolatis dentatis integerrimisque, flor. pendulis. Flor. Per. 2. p. 42. Dill. elth. 13. t. 12. f. 12. Hab. in India utraque.  $\odot$

14. *pubescens*, ramosissima, fol. villosa-viscosis cordatis, flor. pendulis, cal. fructiferis subrotundo-globosis angulatis. Willd. p. 1023. Flor. Per. 2. p. 41. Moris. 5. 13. t. 3. l. 24. Hab. in India utraque. Corollae maculae fuscae. Baccæ globosae, luteae.

15. *nodosa*, herbacea ramosa, foliis ovato-oblongis suberosis pubescentibus, flor. pendulis. Lam. ill. p. 29. Hab. in America.

\* *latifolia*, erecta ramosa villosa pubescens, fol. cordatis subintegerrimis, pedunc. brevibus nutantibus 1-floris. Lam. ill. l. c. Ph. barbadensis. Enc. bot. 2. p. 11. In Amer. Sequenti affinis.

16. *barbadensis*, ramosissima, foliis ovato-cordatis pubescentibus, flor. pendulis, cal. fructiferis ovato-acuminatis angulatis. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 39. Hab. in Barbados.

17. *chenopodifolia*, ramosissima, fol. glabris ovatis acuminatis angulato-dentatis, cal. laevibus, magnitudine fructus, globosis. Willd. l. c. Hab.  $\odot$

18. *minima*, ramosissima, pedunculis fructiferis fol. villosa longioribus. Herm. Lugd. B. t. 571. Rheed. 10. t. 140. f. 71. In Indiae aridis sordidulis.  $\odot$

19. *pruinosa*, ramosissima, fol. villosis, pedunc. strictis. Lin. Alkekengi barbadense, nanum, Alliarie fol. Dill. elth. 12. t. 9. f. 9. Hab. in America. Antherae flavae. Baccæ subrotundae. L.  $\odot$

20. *prostrata*, ramosissima diffusa prostrata, fol. ovatis repandis, caule ramisque teretibus hirsutis. Jacq. ic. rar. 1. t. 38. Collect. 1. p. 99. L'Her. Stirp. p. 43. t. 22. Hab. in Peruviae arenosis et collibus. Cor. flagrans, caerulea, lineis purpureis maculata. Flor. Per. 2. p. 41. Audr. t. 75.

506. SOLANUM. Cal. persistens.

Cor. rotata, aut campanulata 5-loba, plicata. Anthera sub-



coalitæ, apice porogemino dehiscentes. *Bacca* 2-locularis, polysperma. (*Anth.* passim libera præsertim in corol. basi hyalina.)

† *Inermia.*

\* *Foliis integris, aut sinuatis.*

1. *laurifolium*, caule inermi arboreo, fol. petiolatis ovato-oblongis subtus tomentosis, panicula terminali dichotoma divaricata. Lin. suppl. 148. Hab. in America australi. Arb. *Bacca* nigrae.

2. *verbascifolium*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis tomentosis integerrimis, corymbis bifidis terminalibus. Willd. phyt. 1. p. 5. n. 17. Jacq. hort. 4. 13. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 1. Hab. in Amer. h.

*auriculatum*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis acuminatis tomentosis integerrimis, stipulis cordatis, corymbis bifidis terminalibus. Willd. Ait. Kew. 1. p. 246. Hab. in ins. Madagascar, Mauritiæ et Bourboniæ. An Var. præcedentis? Stipulis nonnunquam deciduis.

4. *pubescens*, caule inermi tomentoso fruticoso, fol. ovatis, basi decrescentibus integerrimis pubescentibus, racemis subumbellatis axillaribus. Willd. phyt. 1. p. 5. t. 3. Habit. in Indiae orientalis hortis. Simile *S. verbascifolio*, flor. racemoso-umbellatis, oppositifoliis.

\* *lateo-album*, caule fruticoso, foliis ovatis acutis, racemis lateralibus, flor. secundis. Fl. Per. 2. p. 36. t. 169. f. b. (*S. pubescens.*) Hab. in Per. nemoribus ad Cuchero tractus. Fol. utrinque pubescentia. Cor. albo-lutescens. An prioris varietas?

5. *virgatum*, caule inermi frutescente, ramis virgatis, fol. ovato-acutis, subtus tomentosis, umbellis (in ramorum dichotomia) sessilibus. Lam. ill. 2310. encycl. p. 280. In Canariis. h.

6. *riparium*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis incanis, corymb. terminalibus dichotomis multifloris. Fl. Per. 2. p. 34. t. 166. f. b. (*S. dichotomum*). Hab. in Huancu provincia ad torrentium margines. Rami tomentoso-pulverulenti. Flor. parvi. Cor. calyce duplo major, violacea. *Bacca* lutea.

7. *nutans*, caule inermi fruticoso, fol. oblongo-ovatis acuminatis, racemis brevissimis oppositifoliis, flor. secundis nutantibus. Flor. Peruv. 2. p. 34. t. 166. f. a. Habit. in Peruviae ruderalis passim in Püla circuitu. Frutex ferrugineus. Folia

integerrima, venosissima. Corolla alba brevis,

8. *grandiflorum*, caule arboreo, fol. ovatis sinuatis integerrimisque, racemis ramis recurvis, flor. secundis magnis. Fl. Per. 2. p. 35. t. 168. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus imis et calidis ad Pozuzo. Arb. sexorgyalis. Fol. subtus lanuginosa, supra hispida. Cor. violacea, zonis extus lanuginosis. *Bacca* magna lanuginosa.

9. *viridiflorum*, caule fruticoso, fol. cordatis simplicibus, racemis dependentibus. Flor. Peruv. 2. p. 38. t. 173. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus. Planta orgyalis, villosa. Cor. viridis. *Bacca* magna, turbinate, villosa.

10. *sessile*, caule inermi fruticoso, fol. spatulatis sessilib. pedunc. terminalibus recurvo-pendulis, flor. capitato-umbellatis. Flor. Peruv. 2. p. 35. t. 167. f. a. Hab. in Peruv. ruderalis ad Munna vicum. Frutex biorgyalis, alaber. Fol. conferta, ad basin crispa, petalia. Flor. parvi. Corol. alba. *Bacca* alba.

11. *Melongena*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis tomentosis, pedunc. pendulis incrassatis, calyc. inermib. Syst. veg. 188. Willd. s. p. 1036. *S. pomiferum* fructu oblongo. Baub. pin. 167. Pluck. phyt. 226. f. 2. Fructus magnus violaceus.

β. *ovigera*, fructu ovato albo. Mill. Tournef. inst. 151. Lam. enc. p. 294. In Asia, Africa, America. An var. *S. insani*, cui aculeis exceptis, similis?

12. *muricatum*, caule subinermi suffruticoso radicante, turionibus muricatis, fol. oblongo-lanceolatis integris pubescentibus. Ait. Kew 1. p. 250. Willd. Sp. pl. p. 1037. Few. Pera. 2. p. 735. t. 26. *S. scabrum*. Lam. enc. p. 291. *S. variegatum*, fol. lanceolatis basi inaequalibus excavatis, fl. cymosis, fructu maximo ovato. Fl. Per. 2. p. 32. t. 162. f. a. Hab. copiose in Peruv. cultis. Caulis radicans. *Bacca* ovata alba, purpureo colore variegata, pendula. 1-2 palmaris, edulis. h.

13. *salvisfolium*, caule inermi fruticoso, fol. ovato-lanceolatis subtus tomentosis, calycibus corollisque tomentosis. Lam. ill. n. 4. 2108. enc. p. 280. An *S. subinermis*. Jacq. Willd. Sp. 2. p. 1037. *S. Hab.* in Gujana et Jamaica. h.

β 2. *longiflorum*, inermis, fol. ellipticis integris attenuatis infra subtomentosis, racemis lateralibus, cor. 5-partitis. Vahl. eclog. amer. 1. p. 20. Hab. in Cajenna.

14. *terminale*, inermis frutescens, fol. ?

lanceolato-ovatis subintegerrimis pilosis, umbellis terminalibus. Vahl. l. c. Forsk. descr. p. 45. Hab. in Arabia felici. h

15. *pauciflorum*, fol. ovatis integerrimis, ramis calycibusque decemdentatis tomentosis, pedunc. axillaribus geminis unifloris. Vahl. eclog. 1. p. 20. Hab. in Martinica.

16. *diphyllum*, caule inermi fruticoso, fol. geminis: altero minore, flor. cymosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 322. Collect. 2. p. 331. Hab. in Amer. Pedunc. subsolitariis. Bacca flava. h

17. *fugax*, caule inermi fruticoso dichotomo divaricato, fol. lanceolatis integerrimis glabris, pedunculis longissimis solitariis axillaribus unifloris, cal. decemdentato. Willd. p. 1027. Jacq. ic. rar. 2. t. 324. Collect. 4. p. 123. Lam. enc. 4. p. 282. Hab. circa Caracas. Cor. stellaris: angulis flavescentibus. h

18. *geminatum*, fol. ovatis integerrimis calycibusque decemdentatis glabris, pedunc. axillaribus geminis unifloris, caule scandente. Vahl. eclog. 1. p. 21. Hab. in Cajenna. h

19. *retrofractum*, fol. ovatis glabris, ramulis axillaribus retrofractis, umbellis axillaribus terminalibusque sessilibus, cal. truncatis. Vahl. eclog. 1. p. 21. Hab. in Amer. merid. Affine S. geminato. h

20. *stellatum*, caule inermi fruticoso scandente flexuoso, fol. ovatis glabris acuminatis, pedunc. subgeminatis unifloris axillaribus, calycib. inaequaliter dentatis. Willd. p. 1028. Jacq. ic. rar. 2. t. 325. Coll. 3. p. 254. Hab. Calyx est quadri-quinque- et sex-dentatus: dentibus inaequalibus. Willd. h

21. *scandens*, caule inermi volubili, fol. cordatis ovatis dependentibus subtus mollissimis, panic. terminalib. Lin. suppl. 147. Enc. p. 292. Hab. in Surinamo. Caul. herbaceus. Cor. lacini. recurvis.

22. *glandulosum*, caule suffruticoso scandente, fol. geminis ovato-cordatis, pedunc. 3-quinis interfoliaceis, denticul. calycinis glandulaeformibus. Flor. Peruv. 2. p. 35. t. 167. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. Fol. opposita? Cal. turbinatus, angulato-striatus, carnosus. Lacini. 10, rarius 12-14, glandulaeformibus!

23. *lentum*, fruticosum inermi decumbens, ramis sulcandentib., fol. petiolatis ovatis, flor. terminalib. subumbellatis sessi-

lib., cal. 10-dentato. Hab. in Mexico. Stam. 4 sessilia, unicum longius pedicellatum. Cor. violacea: limbo 5-gono.

24. *obliquum*, caule inermi suffruticoso, fol. cordatis obliquis acutis, pedunc. lateralib. recurvis, flor. secundis. Flor. Per. 2. p. 35. t. 165. f. a. Habit. in Peruviae nemoribus ad Chinca vicum, biorguale. Cor. purpureo-violacea. Bacca oblonga.

25. *oblongum*, caule inermi suffruticoso, fol. geminis oblongis acuminatis altero maximo, racemis lateralibus brevissimis, flor. secundis. Flor. Per. 2. p. 34. t. 165. f. b. Habit. in Peruv. nemorib. ad Pilleo tractus. Planta glaberrima. Fol. majora tripalmaria, parva quadruplo minora. Bacca lucescens.

26. *biformifolium*, caule inermi suffruticoso flexuoso, fol. geminis oblongo-lanceolatis: altero minimo orbiculato, pedunc. 1-floris interfoliaceis, cal. 10-partito. Flor. Per. 2. p. 32. t. 161. f. a. Hab. in Peruv. nemoribus ad Chinca runcationes. Corol. purpureo-violacea, patens. Calyx multipartitus, lacini. linearib. Bacca luteo-rubra, cal. incarcerationa.

Obs. Haec et frequens species tam cal. multipartito, quam flor. situ axillari a ceteris differt Solanis, an ab iis genere disjungendae?

27. *lineatum*, caule inermi fruticoso, fol. geminis ovatis acuminatis lineatis subtus villosis, pedunc. interfoliaceis 1-floris, cal. 10-fido. Flor. Per. 2. p. 31. t. 158. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus ad Munna vicum. Cal. multipartitus: lacini. linearib. Cor. alba, longitudine calycis. Bacca cal. incarcerationa, fusca.

28. *acuminatum*, caule inermi fruticoso, fol. geminis ovatis oblongisque acumine stricto, racemis lateralibus, flor. secundis. Fl. Per. 2. p. 34. t. 159. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus ad Chinca vicum. Planta glabra, caulis erectus, ramosus. Cor. parva, alba.

29. *filiforme*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis cordatisque obtusis, pedunculis lateralibus filiformibus bifidis subumbellatis. Flor. Peruv. 2. p. 31. t. 159. f. b. In Peruviae collib. Planta habitu Salviae. Caulis granulosis. Corolla albo-caerule

30. *triquetrum*, caule inermi frutescente triquetro, fol. cordatis acuminatis glabris, umbellis oppositifoliis subpedunculatis. Willd. Sp. p. 1029. S. caule triquetro, fol. cordatis in lanceae ferrum

productis. Cav. ic. 3. p. 30. t. 259. Hab. in N. Hispania. Caulis humifusus ramosus. Umb. 4-flora. Cor. alba. h

31. *foetidum*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis dependentibus, umbel. oppositifol. nutantibus. Flor. Peruv. 2. p. 39. Hab. in Tarmae oppidi versuris et rudertis. Planta foetidissima. Cor. albo-caerulea. Bacca aurca.

32. *urceolatum*, caule fruticoso, fol. oblongis acuminatis, pedunc. oppositifol. 2-4-floris. Flor. Per. 2. p. 35. t. 168. f. a. (S. oppositifolium.) Hab. in Peruviae nemorib. ad Vitoc vicum. Planta orgyalis. Fol. undulato-repanda, utrinque glabra. Cal. in flore parvus, in fructu magnus, fere urceolatus. Dantur plures species ubi flores fol. sunt oppositi, hinc nomen minus congruum mutavi.

33. *pulverulentum*, caule inermi fruticoso, ramis pulverulentis, fol. lanceolato-linearibus, racemis ramis subcorymbos. Flor. Peruv. 2. p. 33. t. 163. f. b. (S. angustifolium.) Hab. in nemorib. Huancu ad Acamayo tractus. Caulis ramosissimus. Fol. undulata longa venosa. Cor. albo-violacea.

34. *nitidum*, caule inermi fruticoso, ramis glabris nitidis, fol. ovato-lanceolatis acutis, racem. terminalib. subcymosis. Fl. Peruv. 2. p. 33. t. 163. f. a. Hab. in Peruv. nemorib. ad Tarmae provinciam. Fol. leviter repanda, venosa. Cor. albo-violacea, pulverulenta. Bacca nigra.

35. *corymbosum*, caule inermi suffruticoso, fol. ovato-lanceolatis acutis, pedunc. florentib. corymbosis. Jacq. ic. rar. t. t. 40. Collect. t. p. 78. S. fol. ovatis integris subtrilobisque, flor. cymosis. Retz. obs. 5. p. 22.

β. S. *cymosum*. Fl. Per. p. 31. t. 160. f. a. Hab. in Peruv. cultis, versuris et subhumidis lucis. T

36. *nodiflorum*, caule inermi fruticoso, foliis glabris ovatis utrinque acuminatis, umbellis pedunculatis extrafoliaceis (e caulis nodis prodeuntibus.) Willd. Spec. p. 1035. S. fol. per petiolum decurrentibus, pedunc. filiformib. umbelliferis intrafoliaceis. Jacq. ic. rar. 2. t. 326. Collect. 2. p. 288. Hab. in ins. Mauriti. Pedunc. ex caul. nodis incrassatis rubescentibus proveniunt. h

37. *incurvum*, pubescens, caule herbaceo, fol. ovatis acuminatis, racemis geminis, altero breviori, pelicel. incurvis secundis. Flor. Per. 2. p. 34. t. 164. f. b.

Hab. in Peruv. nemorib. ad Munna vicum. Planta bipedalis. Caulis articulationibus incrassatus. Cor. albo-violacea.

38. *patulum*, caule inermi fruticoso, ramis pulverulentis, fol. lanceolatis acutis, racemis terminalib. patulis. Fl. Per. 2. p. 33. t. 164. f. a. (S. lanceolatum.) Hab. in Peruviae nemorib. Fol. sesquipalmaria. Cor. violacea magna. Bacca nigra. Pedunc. elongati, gemini, glabri.

39. *kavanense*, caule inermi frutescente, fol. lanceolatis nitidis integerrimis, pedunc. subbiflor. L. Mant. 47. Swartz. obs. 82. Jacq. amer. 49. t. 35. Ed. picta. t. 48. Fl. Per. 2. p. 39. Hab. in Martinicae, Jamaicae, Peruv. umbrosis locis. Fol. aliquando gemina. Pedunc. solitarii 2-ternique.

40. *anceps*, caule herbaceo, fol. oblongo-lanceolatis, pedunc. axillaribus bi-ternis brevissimis, fructibus conicis ancipitib. Fl. Per. 2. p. 36. t. 169. f. a. Hab. in Peruv. nemorib. ad Cuchero tractus. Planta herbacea, tripedalis. Fol. integrissima. Flores secundi, parvi, virescentes. Bacca versus apicem multiangularis.

41. *Gnaphaloides*, caule inermi fruticoso, fol. lanceolatis repandis nitidis, umbellis oppositifoliis tomentosis, laccis nutantib. Flor. Peruv. 2. p. 31. (S. calygnaphalium.) Habit. in Peruv. umbrosis. Frutex bi-orgyalis. Cor. violacea. Baccae atrorubrae, saponaceae.

42. *acutifolium*, caule inermi suffruticoso flexuoso, foliis geminis ternisque lanceolatis integerrimis, pedunc. 1-floris interfoliaceis. Fl. Per. 2. p. 33. t. 162. f. b. Hab. in Munna nemorib. calidis hirsuta. Fol. utrinque hispidula, deflexa. Cor. alba.

43. *sericeum*, caule inermi fruticoso, ramis gracilibus, fol. (parvulis) ovatis lanceolatis sericeis integerrimis, pedunc. lateralib. 2-flor. Flor. Peruv. 2. p. 33. t. 161. f. b. Hab. in Huassenshuassi nemoribus imis, calidis. Planta triularis. Fol. parva, incana. Cor. violaceo-caerulea, extus sericea. Bacca rubra.

44. *Pseudo-capsicum*, caule inermi fruticoso, fol. lanceol. repandis, umbel. sessilib. Lin. S. fruticosum bacciferum. Bauh. pin. 61. Pseudo-capsicum. Dod. pempt. 718. meth. p. 476. Hab. sponte in Madra, nunc ubique in Anthophylorum hortis colitur; autumnio in hyemem usque baccis cerasiformibus rubris copiosis onustus est pulcher hieco frutex.

\* *microcarpum*, caule inermi fruticoso, fol. ovato-lanceolatis, umbellis lateralib. pedunculatis. Vahl. symb. 2. p. 30. Willd. Spec. pl. p. 1026. S. diphyllum. Forsk. Hab. in Aegypto. Fol. laevis integerrimis, umbel. pedunculatis, fructu triplo minore videtur diversum a S. Pseudo-capsico. Vahl. h.

45. *Dulcamara*, caule inermi fruticoso scandente, fol. cordatis glabris, superiorib. auriculatis, corymbis oppositifol. L. Flor. dan. t. 607. Black. t. 34. S. Scandens s. Dulcamara. Bauh. pin. Hab. in Europae humentibus. Var. fol. omnibus uniformibus et β. pubescentibus, quae forte est S. lignosum, s. Dulcamara marina. Rafi. Syn. p. 265, cujus fol. secundum Hudson hirsuta sunt.

46. *crassifolium*, caule inermi frutescente subsarmentoso, fol. ovatis integris vel sinuato-angulosis obtusiusculis, flor. pendulis. Lam. enc. p. 284. S. Dulcamarum africanum, fol. crassis hirsutis. Dill. elth. 365. t. 273. f. 252. Willd. Sp. p. 1029. Hab. ad Cap. b. spec. h.

47. *betaceum*, caule fruticoso inermi, fol. ovato-acutis crassis: limbo crispo, racemis pendulis. Cav. ic. 6. p. 15. t. 523. S. crassifolium. Ortega Dec. p. 117. In N. Hispania. Bacca ovata, magna, luteo-viridis: 3 zonis longitudinalibus fuscis, tandem rubens. C.

48. *crispum*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis subcordatisque undulato-crispis acuminatis, flor. corymbosis. Flor. Per. 2. p. 31. t. 158. f. a. Hab. in Chile ruderat. Subtriogyale, amarissimum. Cor. dilute violacea. Bacca albo-lutescens. Incolae, quibus *Natre* dicitur, decoctum vel infusum ad febres inflammatorias in frequenti usu habent.

49. *Ieprosium*, caule erecto, fol. oblong. sinuatis subtus incanis, pedunc. solitariis bifloris. Ortega Dec. p. 115. Bacca lutescens, cerasi magnitudine.

50. *scifolium*, caule fruticoso erecto, fol. cordatis sinuatis, racemis lateralibus 2-3-fidis subcymosis. Ortega Dec. p. 116. Hab. in insula Cuba. Cor. alba, cal. quadruplo longior.

51. *Chenopodioides*, caule inermi subherbaceo, fol. ovato-oblongis repando-sinuatis subhirsutis, junioribus subtus tomentosis. Lam. enc. p. 260. S. chenopodioides acinis albescentibus. Few. obs. 2. t. 14. Hab. in ins. Mauritiu.

52. *Phyllanthum*, caule inermi herbaceo alato, fol. sinuato-lobatis floriferis. Cav. ic. 4. p. 35. t. 359. f. 1. S. caule alato, foliis decurrentibus ovatis subtriangularibusque, racemis oppositifol. flor. pendulis. Fl. Per. 2. p. 52. Ha'it. in Linnæ, Chancaay et Lurin arenosis locis. Pedunc. oppositifolii, usque ad foliorum discum decurrentes. Spec. singularis ob fol. ad medium pedunculis adnata. Folia cuneata, 5-loba. ☉

53. *pygmaeum*, caule herbaceo inermi pollicari, fol. ovatis trilobis. Cav. ic. 5. p. 23. t. 439. f. 2. Hab. in planitie vulgo Pampas de Buenos-Ayres. Caul. simplex, terminatus florib. ut plurimum binis. Fol. minima. Bacca minuta, villosa, globosa. ☉

54. *nigrum*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis dentato-angulatis, racemis distichis nutantib. Lin. Flor. Dau. t. 460. ☉

\* *patulum*, ramis teretibus glabris, fol. integerrimis glabris. Dill. elth. 367. t. 275. f. 355. Hab. in India.

\* *villosum*, ( *moschatum* ), ramis teretibus villosis, fol. angulatis subvillosis, bac. luteis. Dill. elth. 366. t. 274. f. 353.

\* *guineense*, ramis angulatis dentatis, fol. integerrimis glabris. Dill. t. 274. f. 354. Lam. enc. 4. p. 289.

\* *virginicum*, ramis angulatis dentatis, fol. repandis glabris. Dill. t. 275. f. 256. S. alatum. Moench. meth. p. 474. Sw. obs. 83. Hab. in Amer.

β. *judaicum*, ramis aculeis incurvis, fol. repandis nudis. Cum priore.

\* *hirsutum*, ramis teretibus foliisque integerrimis hirsutis. Vahl. symb. 2. p. 40. S. aegyptiacum. Lam. l. c.

Obs. Varietates sic dictae Sol. nigri revera species sunt et cultura non mutantur, excepto S. judaico, quod a virginici varietas est. Willd. p. 1014. Ob conformitatem, quae inter eas obinet, ut subspecies hic enumeratae sunt.

55. *aethiopicum*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis repando-angulatis, pedunc. fertilibus unifloris cernuis, fruct. torulosus. Jacq. hort. t. 12. S. torulosum. Moench. Hab. in Aethiopia. Fruct. ruber, magnus, profunde torulosus s. sulcatus.

56. *triste*, caule inermi frutescente, fol. lanceolato-oblongis subrepandis glabris, racemis subcymosis. Jacq. amer. 50. t. 40. t. 2. Ed. pict. t. 49. Hab. in Martinica. h

57. *racemosum*,

57. *racemosum*, caule inermi frutescente, fol. lanceolatis repandis undulatis, racemis longis rectis. Lin. Jacq. amer. 50. t. 36. Ed. pict. t. 50. Hab. in Martinica, Surinami. Flor. albi. Pedunc. apice crassiores. h

58. *quadrangulare*, caule inermi frutescente tetragono, fol. ovatis integris angulatisque, flor. paniculatis. Thunb. prod. 36. Lin. suppl. 147. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. saepe decurrunt et caules angulos crispas formant. L. h

β? *triangulare*, caule inermi herbaceo trigono fol. oblongo-ovatis integerrimis nudis, cor. pallide violaceis. Lam. enc. 4. p. 290. Rumph. G. t. 26. f. 2. Hab. in Ind. orient. ☉

59. *repandum*, caule inermi subherbaceo flexuoso laevi, fol. ovatis repandis tomentosis, pedunc. axillaribus cymosis. Forst. procl. n.º 105. Hab. in Marchionis et Societatis insulis.

60. *bonariense*, caule subinermi fruticoso, fol. ovato-oblongis sinuato-repandis scabris. L. Diel. elth. t. 272. f. 351. Hab. in agro Bonariensi. Aculei aliquot in tenello caule. Flor. albi, magni, nutantes. Planta coronaria. h

61. *macrocarpon*, caule inermi suffruticoso, fol. cuneatis repandis glabris. L. excl. Fœuilli synonymo. Habit. in Peru. Caul. rigens. Bacc. pomiformes, flavac.

62. *angulatum*, caule bienni, fol. cordatis sinuato-angulatis, racem. lateralib. brevissim. pauciflor. recurvis. Flor. Peruv. 2. p. 36. ic. 170. f. a. S. amplissimo anguloso hirsutoque folio, fructu aureo maximo. Few. obs. 3. p. 61. t. 46. Hab. in Peruv. hortis. S. *quitoense*. Lam. enc. 4. p. 285. Ulnaris, hirsutissima. Corolla albo-violacea. Bacca globosa, parvi citri aurantii magnitudine et colore.

\* \* *Foliis laciniatis et pinnatis.*

63. *lyratum*, caule inermi herbaceo erecto, fol. lyrato-hastat. tomentosis. Th. jap. p. 92. Hab. juxta Nagasaki in Japonia. Totum tomentosum. Fol. inferiora lyratopinnatifida, superiora hastata.

64. *Tegore*, caule inermi fruticoso hirsutissimo, fol. petiol. inferiorib. pinnatifido-sinuatis, superiorib. cordatis, racemis simplicib. axillarib. Willd. Auhl. guj. t. p. 212. t. 84. Hab. ad ripas fluvii Sinemari Gujan. h

65. *aviculare*, caule fruticoso inermi glaberrimo, fol. pinnatifidis, lacin. lanceolatis acutis, panic. axillaribus binis

ternisve. Ait. Kew. t. p. 247. Curt. mag. t. 348. (S. laciniatum. Willd. p. 1010.) S. *aviculare*. Forst. prod. n.º 107. Lam. enc. 4. p. 292. Hab. in N. Zelandia. Fl. Geranii pratensis, lacinii corol. emarginatis. Anth. separatae. Willd. h

66. *quercifolium*, caule inermi subherbaceo angulato flexuoso scabro, fol. pinnatifidis, racem. cymosis. L. Sp. pl. 264. Fl. Per. 2. p. 36. Few. Peruv. 772. t. 15. In Peruv. versuris. Cor. violaceae; maculis duabus viridibus ad basin singuli lobii. Similis S. sequenti, differt: fol. scabris, floribusq. paniculato-corymbosis majoribus. Willd.

67. *radicans*, caule inermi herbaceo laevi teretiusculo prostrato radicante, fol. pinnatifidis, racemis cymosis oppositifol. Lin. Dec. t. t. 10. Hab. in Peru. In Flor. Peruv. non occurrit. ☿


68. *reclinatum*, caule inermi sulcato ramoso, fol. pinnatifidis: pinnulis longis sublinearib. decurrentibus, pedunc. racemosis axillarib. Colitur in hortis. Vill. le Botaniste-Cultivateur, 2. p. 134. Tot. glabr. Flor. magni, caerulei.

69. *uncinatum*, caule herbaceo procumbente anguloso, fol. laciniato-pinnatifidis, corymb. terminalibus, dichotomis. Flor. Per. 2. p. 36. Hab. in Peruviae et Chilensis regni ruderatis et versuris. Pl. succosa, fragilis, tripetalis. Fol. subruncinata. Cor. violacea, revoluta. Bacca parva, lutea.

70. *pinnatifidum*, caule herbaceo alato fol. decurrentib. pinnatifidis, flor. paniculat. Fl. Per. 2. p. 37. t. 170. f. b. S. caule herbaceo erecto laevi, fol. ampl. profunde pinnatifidis glaberrimis, flore plano. Lam. ill. n.º 2133. t. 115. f. 4. enc. 4. p. 287. Hab. in Peruv. arenosis. Planta succosa. Caul. fragilis. Corolla dilute caerulea. Bacca lutea.

71. *multifidum*, caule herbaceo nudo, fol. multifid. in petiolum decurrentibus, pedunc. dichotomo-paniculatis. Fl. Per. 2. p. 37. t. 171. f. a. Lam. enc. 4. p. 287. Hab. in Peruv. collibus ad Pongo prov. Camanae vicum. S. pinnatifido affine, sed caul. teres non alatus. Fol. semi-amplexicaulia. Corolla obscure caerulea.

72. *pinnatum*, caule inermi herbaceo sulcato, fol. pinnatis, flor. corymbosis. Cav. ic. 5. p. 23. t. 435. f. r. Hab. prope Coquimbo in Chile. Caulis est fere elatus ex decursu foliorum. Corolla saturate lutea. Bacca globosa, nigra. Fol. potius pinnatifida



73. *pomiferum*, caule herbaceo villosa, fol. interrupte pinnatis, fructu oblongo inverse conico. Cav. Descr. p. 112. Flores racemosi. Baccæ obconicæ.

74. *peruvianum*, caule inermi herbaceo, fol. pinnatis incisus tomentosis (incanis), racem. bipartit. foliosis, baccis subpilosiss. Lin. Jacq. ic. rar. 2. t. 327. Collect. 2. p. 284. Fl. Per. 2. p. 37. Hab. in Peruv. aridis locis, versur. et ruderat. Fl. longe pedicellati. Corolla lutea; laciniis acutis reflexis.  $\overline{f}$

75. *Lycopersicum*, caule inermi herbaceo, fol. pinnat. incisus, racem. bipart. aphyllis, fructib. glabris torulosiss. Murr. syst. veg. 224. S. pomiferum fructu rotundo striato molli. Bauh. pin. 167. Pomum amoris. Rumph. amb. 5. p. 417. t. 151. f. 1. Flor. Per. 2. p. 37. Habit. in Amer. calidiore.  $\odot$

*Obs.* Secundum auctores Fl. Peruv. 1. c. in ruderatis maritimis regni peruviani abundat S. Lycopersici varietas illa, quam C. Bauhinus "Solanum racemosum cera-ornum" forma nuncupat. Pin. p. 167, quæ hirsuta procumbens est, an distincta?

76. *Pseudo-Lycopersicum*, caul. inermi herbaceo, fol. pinnat. incisus, racem. simplicibus, fructibus subvillos. laevibus. Jacq. hort. 1. t. 11. Hab. . . Var. prioris? cui simillimum.  $\odot$

77. *tuberosum*, caule inermi herbaceo, fol. interrupte subcorymbosis pinnatis integerrimis, pedunc. S. tuberosum esculentum. Bauh. prod. 89. t. 89. Flor. Peruv. 2. p. 38. Hab. sponte in collib. et prædiis in Peru. Innotuit 1590. C. Bauhino.  $\overline{f}$

78. *ptinipinellifolium*, caule inermi herbaceo, fol. pinnat. integerrimis, racemiss simplicibus. L. Amoen. acad. 4. p. 268. Hab. in Peru.  $\overline{f}$

79. *montanum*, rad. tuberosa, caule inermi herbaceo, fol. subcordatis repand. L. fol. ovat. integr. laciniatisque. Fl. Per. 2. p. 32. t. 160. f. a. Hab. in Peru, in collib. arenosis et saxosis.

80. *mite*, caule herbaceo radicante, fol. impari-pinnatis, foliol. oblongis, racemiss axillarib. aggregatis, baccis globosis. Flor. Per. 2. p. 38. t. 171. f. a. Hab. in Chinceno vicis in locis humidis et umbris in Peruvia. Caul. nitidus, flexuosus. Fol. minutissima. Flor. minimi, albi.

81. *diffusum*, caule suffruticoso, ramis virgat. diffusis, fol. impari-pinnat. foliol. oblongis, pedunc. axillarib. 2-5-flor. Flor.

Per. 2. p. 37. t. 171. f. b. Hab. in Peruviae nemorib. ad Huanucui provinciam. Jasmini facie. Cor. violacea, patens.

82. *pendulum*, caule fruticoso, foliis pinnatis; foliol. 2-6-nis oblique cordatis, racem. dependitib. furcat. Fl. Per. 2. p. 39. t. 174. f. a. Hab. in *Panathaurum* provinciae nemoribus. Cor. elongata profunde 5-fida; lacin. acutis, subpubescens, purpurea.

83. *conicum*, caule herbaceo, fol. impari-pinnatis; foliol. oblongo-lanceolatis, pedunc. axillarib. subtern. spicatis, fructu conico. Flor. Per. 2. p. 38. t. 172. f. b. Hab. in Peruv. nemorib. ad Chincæ et Cuchero tractus. Cor. albo-caerulea. Bacc. conica, alba.

84. *ternatum*, caule suffruticoso tetragono scandenti radicante, fol. ternatis, pedunc. axillarib. Flor. Per. 2. p. 38. t. 172. f. a. Hab. in Peruviae nemor. humidis. Planta glabra. Fol. longe petiolata. Baccæ ovato-conica albicans.

†† *Aculeata* (Folia in plurimis sinuato-lobata.)

85. *insanum*, caule aculeato herbaceo, fol. ovat. tomentosis, pedunc. pendul. in-crassatis, cal. aculeatis. Pluck. alm. 550. t. 226. f. 3. Moris. s. 13. t. 2. f. 2. Troncum hortense. Rumph. anth. 5. p. 239. t. 85. In Indiis. Affinis S. Melongenæ, Differt caule, et fol. aculeatis.  $\odot$

\* *zeylanicum*, caule aculeato fruticoso, fol. ovat. sinuat. subtomentosis, calycibus aculeatis, fructu oviformi. Scop. delic. insubr. 1. t. 1. Lam. enc. p. 295. Habit. in Zeylona.

86. *torvum*, caule aculeato fruticoso, aculeis curvis, fol. subcordatis ovatis sinuat. tomentosis, rachibus aculeatis, cal. inermibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 456. S. indicum. L. Sp. pl. 1. p. 187. Pluck. alm. 350. t. 225. f. 67. Hab. in sepibus Jamaicæ et insularum Bermudensium. Var. fol. inermibus; petiol. solis hinc inde aculeatis. S.  $\overline{f}$

87. *volabile*, caule aculeato fruticoso scandente, fol. angulatis, petiol. rachibus calycibusque aculeatis. Swartz. l. c. p. 458. S. sarmentosum. Lam. enc. 4. p. 308. S. lanceafolium. Jacq. ic. ? Habit. in sylvis Hispaniolæ.  $\overline{f}$

88. *ferox*, caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulat. tomentosis, aculeatis, lacc. hirtis cal. obtectis. Hab. in Malabar. Statura S. Melongenæ. Cal. aculeati, obtegentes totas baccas hirtas.

89. *campechiense*, caul. fruticoso aculeato hirtio, fol. cordato-oblong. quinquelobis dentatis; cal. aculeatissimis. Willd. p. 1039. Dill. elth. 361. t. 268. f. 367. Lam. enc. 4. p. 227. Hab. in America. Fol. setis stellatis divergentibus. An a sequente diversum? h

90. *fuscatum*, caule herbaceo aculeato, fol. cordato-ovatis sinuato-lobatis obtusis lob. subangulatis, aculeis superiorib. coloratis. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 42. Collect. 1. p. 51. Lam. l. c. t. 296. Habit. in Amer. Rami varie spinosi, latere solari fusciscentes. ©

91. *mammosum*, caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulato-lobatis: utrinque villosis aculeat. Lin. Pluck. alm. 350. t. 226. f. 1. Merian. surin. 27. t. 27. Hab. in Virginia, Barbados. ©

92. *hirtum*, fruticosum aculeatum, fol. cordato-angulatis tomentosis aculeatis, peduncul. lateralibus aggregatis calycibusque hirsutissimis. Vahl. symb. 2. p. 40. Hab. in ins. Trinitatis. h

93. *paniculatum*, caule petiolisque aculeatis, fol. sinuato-angulatis supra glabris, flor. paniculatis. L. Hab. in Brasilia. Caul. et petioli albo-tomentosi aculeis rectis.

94. *crinitum*, fruticosum aculeatum, fol. ovat. sinuato-angulat. tomentosis, petiolis, pedunc. calycibusque echinatissimis. subcrinitis. Lam. encyc. p. 297. Hab. in Cajenna. Le Blond. h

95. *aculeatissimum*, caul. fruticoso aculeatissimo, fol. cordatis quinquelobo-sinuato-pilo-iusculis, calyc. subaculeatis. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 41. Collect. 1. p. 100. Hab. in Amer. Affine S. campechiensi. h

96. *virginianum*, caule erecto aculeato, fol. pinnatifid. undique aculeatis, laciniiis sinuatis obtusis, margine ciliatis, calycibus aculeatis. Willd. p. 1041. Dill. elth. 360. t. 267. f. 346. Pluck. alm. 351. s. 62. f. 3. Hab. in Amer. ©

97. *Jacquini*, caule decumbente diffuso aculeato, fol. pinnatifid. undique aculeatis: lacin. sinuat. obtusis, margine nudis, cal. aculeatis. Willd. S. virginianum. Jacq. ic. rar. 2. t. 332. Coll. 2. p. 285. Hab. in India orient. ©

98. *xanthocarpum*, caule decumbente diffuso aculeato, fol. pinnatifidis aculeatis stellato-pubescentibus: lacin. sinuat. acutis margine nudis, calycibus aculeatis. Willd. Schrad. et Wendl. sert. Hannov. 1. p. 8. t. 2. Hab. in Aethiopia. S. Jacquini simile. ©

99. *coagulans*, caule aculeato fruticoso, fol. oblongis repando-sinuatis tomentosis aculeatis: lobis rotundatis in egris. Vahl. symb. 2. p. 41. Forsk. descrip. 47. Hab. in Arabia felici. h

100. *jamaicense*, caule aculeato fruticoso, fol. cu. cati medio laticioribus obtusangulatis utrinque tomentosis, rachibus calycibusque aculeatis: aculeis reflexis. Sw. flor. ind. occid. 1. p. 454. Hab. in ruderatis Jamaicae, Hispaniolae. S. tomentosum refert. h

101. *indicum*, caule aculeato fruticoso fol. cuneiformib. angulat. subvillosis integerrimis: aculeis utrinque rectis. L. Burm. zeyl. 220. t. 102. Dill. elth. 362. t. 270. f. 349. S. cuneatum Moench. meth. p. 476. Hab. in India. h

102. *undatum*, fruticosum aculeatum, fol. ovatis repand. subtus tomentosisculis, aculeis nudis. Lam. enc. 4. p. 301. Rheed. malab. 2. t. 37. Hab. in ins. Mauriti. Flor. corymbosi, interdum 1-flori. Bacc. a magna, ovata.

103. *heterophyllum*, fruticosum aculeatum, fol. ovat. sinuato-repandis subtus tomentosisculis, aliis minoribus obovatis integerrimis. Lam. enc. p. 301. Hab. in Gujana. Fl. racemosi. Fol. magna.

104. *ciliatum*, caule aculeato herbaceo, fol. cordatis sinuato-angulatis aculeatis ciliatis pedunculis brevibus paucifloris. Lam. ill. n°. 2360. encyc. 4. p. 298. Hab. ... Flores parvi, subcaerulei.

105. *anguini*, aculeatum fruticosum, fol. ovat. sinuato-angulosis subtus tomentosis, cal. intermibus. Lam. enc. 4. p. 304. Ill. n°. 2375. Habit. in insula Madagascar. Flor. racemosi. Fructus parvi, rubri, esculenti.

106. *carolinense*, caule aculeato annuo, foliis hastato-angulatis: aculeis utrinque tectis, racemis laxis. L. Jacq. ic. rar. 2. t. 331. Coll. 2. p. 287. Dill. elth. 362. t. 269. f. 348. Michaux. Flor. 1. p. 150. In Carolina. Caulis pumilus. Folia ovali-oblonga basi acuta. Michaux. Caulis quasi fruticosus, sed annuus.

107. *sinuatum* (villosum), caule fruticoso tereti aculeato, fol. bipinnatifido-sinuatis villos. utrinque aculeatis, calycibus villosis aculeatis. Willd. p. 1043. Hab. ... Differt a S. Sodomeo: fol. villosis bipinnatifidis, corol. flavis, baccis calyce tectis. Willd. h

108. *sodomeum*, caule aculeato fruticoso tereti, fol. pinnatifido-sinuatis sparse aculeat. nudis, calycib. aculeatis. Moris. s. 3.

t. 1. f. 15. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 4 ? In Africa. *h*

109. *capense*, caule aculeato fruticoso tereti, fol. sinuato - pinnatifidis aculeatis nudis, lacin. altern. integr. obtusis. Linn. suppl. 147. Hab. in Cap. b. s. ei. Planta copia aculeorum horrida. *h*

110. *marginatum*, aculeatum, fol. cordat. repand. margine albis. Linn. suppl. 147. Jacq. ic. rar. t. 45. Collect. 1. p. 50. Habit. in Abyssinia. Caulis albo-tomentosus. Cal. inermes, fructiferi aculeati.  $\beta$  ? S. arzyr-cantha. Courset Botan. cultivateur, 4. p. 48. Cal. 6 - 7 - fidus. Stam. saepe 6. *h*

111. *stramonifolium*, caule aculeato-fruticoso, fol. cor-lat. angulato-lobat. integris subinermib. subtus tomentosiusculis. Ait. Kew. 1. p. 252. Jacq. ic. rar. 1. t. 44. In India occident. *h*

112. *toxicarium*, fruticosum aculeatum, fol. lobato-angulosis tomentosis basi oblique emarginatis, aculeis utrinque sparsis, racemis sessilibus, lacin. corollae sublanco-latis. Rich. in Act. Soc. Paris. Lam. encycl. p. 309. Hab. in Gujana.

113. *hispidum*, caule aculeato fruticoso hispidissimo, setis apice stellatis, fol. lobatis, corymb. magn. dichotomis. Flor. Per. 2. p. 40. t. 176. f. b. In Peruviae ruderatis. (S. stellatum.) Folia superiora nonnulla ovata, integerrima, acuta; pauca subrepanda, reliqua cor-lat. 7-11-lobata subspithamea, subtus valde hirsuta, supra aspera setis minimis in stellarum formam dispositis.

114. *incanum*, caule arboreo aculeato, fol. juniorib. 7-9-lobatis; adultis sinuatis, racemis 2-3-nis subcorymbosis, fl. secundis. Flor. Per. 2. p. 40. t. 175. f. b. Hab. in Peruv. praeruptis, ad torrentium margines Arbor 4-orgyalis et ultra Fol. supra nitida, subtus tomentosa, alba. Cor. alba. Fol. ad ulcera canerosa adhibentur.

115. *Milleri*, caule fruticoso aculeato, fol. glabris subquinguelobo - pinnatifidis integerrimis, aculeatis, pedunc. 1-flor. subgeminatis. Willd. Sp. 1. p. 1049. Jacq. ic. rar. 2. t. 330. Collect. 4. p. 209. Linn. suppl. p. 270. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

116. *tegilobatum*, caule aculeato fruticoso, fol. cuneiformi-angulatis subtrilobis obtus. glabris, flor. racemosis. Willd. l. c. Burm. ind. p. 27. t. 22. f. 2. S. acetosae-folium. Lam. encyc. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 5. p. 300. Hab. in Jam. et India orient. Caulis alatus. Fol. parva glabra. *h*

*Obs.* Hoc cum praecedente conjunxit Linnaeus, ab illo vero diversum fol. nunquam pinnatifidis, cor. quadruplo et ultra majorib. violaceis. Willd.

117. *laciniatum*, caule aculeato fruticoso scandenti, fol. geminis laciniatis: altero lanceolato-integerrimo, racem. filiformibus longissimis. Fl. Per. 2. p. 40. t. 177. f. a. Hab. in nemorib. Chincae et Cuchero. Cor. caerulea. Bac. globoso-ovata, magnitudine parvi pyri, aurea.

118. *tectum*, aculeatum, fol. bipinnato-sinuatis, fructu tecto. S. fructu - tecto. Cav. ic. 4. p. 5. t. 109. Hab. in Imperio Mexico. Caulis, foliorum nervi et calyces aculeati. Fl. racemosi. Cor. lutea, extus tomentosa. Bac. calice aucto tecta.

119. *sisymbriifolium*, aculeatum, fol. subbipinnatifidis villosis aculeatis; lobis dentatis, stigmatibus bilobis. Lam. ill. 2286. enc. p. 307. Hab. circa Buenos-Ayres. Commerson.

120. *cornutum*, aculeatum, fol. pinnato-pinnatifidis aculeatis, antheris declinatis corniformibus: infra maxima productissima. Lam. enc. p. 308. Juss. in Annal. d. Museum. 14. p. 120. t. 9. Habit. in Mexico Fl. lutei, subinaequales. Cal. spinosus.

121. *Vespertilio*, caule aculeato fruticoso, fol. cordat. integris, cor. subirregularibus, anthera ima productiore. Ait. Kew. 1. p. 252. Wendl. hort. Herrenh. p. 5. t. 21. Hab. in insulis Canariis. Una ex antheris imis longissima arcuata. *h*

122. *sanctum*, caule aculeato fruticoso, aculeis tomentosis foliisque oblique ovatis repandis. Linn. Vahl. symb. 2. p. 41. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 2. Hab. in Palaestina. Caul. tomentosus, cinereus, aculeis crassis, flavescentibus. *h*

123. *hybridum*, caule aculeato fruticoso, fol. ovatis subinermibus acutis repandis: tenellis dorso et ad oras violaceo - pulverulentis. Linn. Jacq. hort. 2. t. 113. Habit. in Guinea. *h*

124. *tomentosum*, caule aculeato fruticoso, aculeis acerosis rectis, fol. cordatis inermib. subrepandis: tenellis purpureo-pulverulentis. Rocc. sic. 8. t. 5.

$\beta$  ? *coccineum*, caule aculeato fruticoso, fol. ovatis subrepandis, uno alterove aculeo armatis submento-is. Jacq. ic. rar. 1. t. 43. Habit. in Aethiopia. *h*

125. *rigidum*, aculeatum frutescens humile, fol. ovatis sinuato-angulosis aculeatis nudiusculis, aculeis rectis albid. Lam. enc. p. 303. Hab. . . . *h*



126. *polygamum*, caule aculeato, foliis ovato-oblongis subintegris supra scabriusculis, subtus tomentosis. Vahl. symb. 3. p. 39. t. 55. Hab. in ins. St. Crucis. h

127. *bahamense*, caule aculeato fruticoso, fol. lanceol. repandis obtusis margine reflexis, racem. simplicib. Linn. Dill. elth. 253. t. 271. f. 250. Sloan. jam. 108. hist. 1. p. 38. t. 11. f. 3. Habit. in Americae insula Providentia. h

128. *obscurum*, fol. elliptico-lanceolatis planis subtus villosis, racemis lateralibus, caule petiolisque aculeatis. Vahl. symbol. 2. p. 41. S. crotonoides. Lam? Habit. in Cajenna. h

129. *giganteum*, caule aculeato fruticoso: aculeis tomentosis, fol. lanceol. acutis inermibus, supra glabris, subtus tomentosis, et incanis, racem. dichotom. cymosis terminalibus, Jacq. ic. rar. 2. t. 328. Coll. 4. p. 125. S. niveum. Vahl. symb. 2. p. 41. Th. pr. 36. Hab. ad Cap. b. spei. h

130. *scabrum*, caul. aculeato fruticoso, fol. sinuato-angulat. scabris, corymb. dichotomis, flor. intus secundis. Fl. 2. Per. p. 39. t. 125. f. a. Habit. in Peruviae versuris et ruderalis. Fol. subtus valde venosa, utrinque minutis in stellarum formam digestis scabra. Bacca aurantiae loco saponis ad crines et vestimenta abluenda inserviunt.

131. *incarceratum*, caule aculeato suffruticoso, fol. geminis cordatis aculeatis, flor. secundis, bac. glabr. cancellatis. Flor. Per. 2. p. 40. t. 176. f. a. Hab. in Peruv. nemoribus, ad Chincos runcationes. Calyx inermis, in flore reflexus, infructu erectus. Cor. albo-violacea. Bacca alba, oblonga, venosa, glaberrima.

132. *flexuosum*, fol. geminatis elliptico-lanceolat. scabriusculis integris, subtus petiolisque aculeatis, florib. tetrandris. Vahl. eclog. 1. p. 22. Habit. in Cajenna. Valde affine S. obscuro. h

133. *lanceolatum*, caule fruticoso tomentoso aculeato, fol. angusto-lanceolatis integerrimis, subtus tomentosis inermibus, panicula terminali. Willd. Cav. ic. 3. p. 23. t. 245. S. cymosum. Ottega Decad. 1. p. 12. Hab. in Mexico. Flor. caerulei terminales magni. h

134. *eleagnifolium*, caule fruticoso petiolis foliisque lanceolatis obtusis inferne tomentosis subaculeatis, racem. lateralibus. Willd. Cav. ic. 3. p. 22. t. 243. Habit. in Amer. calidiore. Aculei capillacei. h

135. *polyacanthos*, aculeatissimum, fol.

linearilanceolatis subrepandis subsessilibus obtusis, pedunc. axillarib. unifloris, aculeis acicularib. Vahl. eclog. 1. p. 24. Lam. enc. 2. p. 23. S. (*parviflorum*.) Cavan. ic. 3. p. 19. t. 236. Plum. ic. 218. t. 224. f. 1. Hab. in ins. Dominica. Corol. alba. Bacc. minima. h

136. *igneum*, caule aculeato fruticoso, fol. lanceolatis acuminatis basi utrinque revolutis, racem. simplicibus. Linn. Jacq. hort. t. 14. Pluck. alm. 350. t. 225. f. 5.

♂. S. parvifolium. Vahl. eclog. 1. p. 23. Hab. in Amer. Flor. albi. Spinæ rubro-igneæ.

137. *pyracanthos*, caule aculeato suffruticoso, fol. oblongis acutis sinuatis tomentosis: utrinque aculeis rectis subcoarctatis. Lam. encyclop. 4. p. 299. Hab. in ins. Madagasc. Caul. obscure fuscus, apice et in juniorib. tomentosis.

138. *asperum*, caule aculeato arboreo, fol. oblongis solitar. geminisque, corymbis rameis subdichotomis. Flor. Peruv. 2. p. 39. t. 174. f. b. (S. aspero-lanatum.) Hab. in Peruv. præruptis ad Huassacsi arcem. Frutex aspero-lanatus: lanugo lucida in stellæ formam digesta. Caulis erectus superne ramosissimus, vix aculeatus. Cor. alba. Bacca lutea.

### +++ Spinosa.

139. *lycioides*, caule fruticoso spinoso, fol. ellipticis, pedunc. aggregatis unifloris. Jacq. ic. rar. 1. t. 46. Collect. 1. p. 96. Flor. Per. 2. p. 41. t. 177. f. b. Habit. in Peruv. locis argillosis et petrosis, passim ad Huancu et Tarmae provincias. Caul. ramosissimus, ramis in spinam foliosam floriferam desinentib. Cal. lacin. appendiculatæ. Anth. liberæ. Corol. in hortis nivea, in Peruv. caerulea, fundo lutescens. Bacca globosa, rubro-crocea. Sem. ossea. An diversum genus? h

507. CAPSICUM. Cor. rotata.  
Bacca ex ucca.

1. *annuum*, caule herbaceo, peduncul. solitariis. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1050. Rheed. 2. t. 35. Hab. in America meridionali. ☉

2. *baccatum*, caule fruticoso laevi, pedunc. geminis. Lin. Rumph. 5. t. 88. f. 2.

3. *sinense*, caule fruticoso, pedunculis geminatis, fructib. ovatis pendulis, foliorum petiol. subpubescentib. Willd. Jacq. hort. v. 3. t. 67. Habit. in China. Fructus ovatus magnitudinæ cerasi. h

4. *grossum*, caule suffrutescente, fructib. incrassat. variis. Ment. 47. Besl. syst. aut. 2. t. 2. f. 1. Hab. in India. Fructus maximus.

5. *frutescens*, caule fruticoso, pedunc. solitariis, fructibus oblongis. Willd. Clus. exot. 340. f. 2. Rumph. 5. t. 88. f. 1. 3. 4. Hab. in Indiis. *h*

6. *cerasiforme*, caule fruticoso, pedunc. solitariis, fructibus globosis. Willd. Hab. .... Simile antecedenti, sed fructus globosus. W.

508. **CESTRUM**. *Cor.* infundibuliformis: lac. acutis marginatis. *Stam.* denticulo in medio, aut edentula. *Anth.* 4-gonae. *Bacca* 1-2-locularis. *Sem.* pauca, angulata.

1. *laurifolium*, filamentis denticulatis nudisve, fol. elliptic. coriaceis nitidissim., pedunc. petiolo breviorib. L'Herit. stirp. 1. p. 69. t. 34. Willd. Sp. 2. p. 1054. *C. venenatum*. Lam. encyc. 1. p. 680. Pluck. phyt. t. 95. f. 1. Hab. in America. *h*

2. *macrophyllum*, filam. denticulatis, fol. ovato-oblongis acuminatis glaberrimis, flor. fasciculatis sessilib. Vent. Choix de Pl. p. 18. t. 18. Hab. in ins. Antillanis, Portorico. Riedel. Priori affine. *Cor.* alba.

3. *nocturnum*, filamentis dentatis, pedunc. subracemosis folio aequalib. L'Herit. stirp. 1. p. 70. Dill. elth. 183. t. 153. f. 185. Pluck. alm. 35. t. 64. f. 3. Hab. in Jamaica. Chili. *h*

4. *Parqui*, filamentis denticulatis nudisve, caule florifero paniculato, stipulis linearib. L'Her. l. c. 1. t. 36. Parqui. Feuil. Peruv. 2. p. 72. t. 32. f. 1. *C. virgatum*, fol. lanceolatis acutis, ramis floriferis paniculatis, pedunc. corymboso-racemosis. Flor. Peruv. 2. p. 27. Hab. in Chili locis humidis. *h*

*Obs.* In Flor. Peruv. l. c. p. 28. de hac specie sequentia prolata sunt. L'Heritierus folia ramulorum inferiorum perperam *stipulas* appellavit, et Filam., contra ejus assertionem, in loco natali *edentula* sunt, nec non ad basin solummodo tumida ac villosa.

5. *auriculatum*, filamentis edentatis, stipul. amplexicaulib. lunatis, fol. ovatis, flor. paniculat. terminalib. Willd. C. Hediunda. Lam. enc. 1. p. 680. Hediunda Jasmini flor. Feuil. Peruv. 2. p. 25. t. 20. f. 3. Habit. in Lima humidis.

6. *auriculatum (affine)*, foliis ovatis oblongo-lanceolatisque, auricul. (stipulis) oblique cordatis, ram. florifer. divergentib., pedunc. corymboso-paniculatis. Flor. Per. 2. p. 28. t. 155. f. 2. Hab. in Per. versuris, ruderatis, sepibus.

*Obs.* An ob stipulae formam diversa ab *C. auriculato*. L'Her. cujus stipulas etiam reniformes, amplexicaules observavi sed saepius tantum in ram. juniorib. *h*. expertis.

6. *scandens*, filamentis edentulis, fol. ovatis attenuatis glabris, racem. axillaribus subcompositis, ramis scandentibus. Vahl. eclog. 1. p. 24. Hab. prope St. Martham. *h*

7. *undulatum*, filam. dentatis, fol. ovatis acutis undulatis, pedunc. axillaribus terminalibusque paucifloris. Fl. Per. 2. p. 28. t. 155. Hab. in Peruv. ruderatis praesertim ad Huanuci urbem.

8. *confertum*, fol. ovato-ovalibus acuminatis coriaceis confertissimis, flor. axillaribus congestis sessilib. Flor. Per. p. 29. t. 153. In Peruv. sylvis, Cal. ciliatus. *Cor.* lutescens: limbo externe atro. Filam. edentula.

9. *conglomeratum*, fol. lanceol. acutis, flor. axillarib. numerosissim. conglomeratis sessilib. Flor. Per. t. 156. Cresc. in Peruviae praeruptis locisque altis frigidis. Flor. nonnulli limbo 6-7-fido. Stigm. concavum.

10. *vespertinum*, filamentis edentatis, tubo filiformi (longo), pedunc. brevissimis. L'Herit. stirp. 1. p. 72. *C. confertum*. Miller. Jasminum laurinis foliis, flore pallido luteo, fructu atro-caeruleo. Sloan. hist. 2. p. 96. t. 204. f. 2. Hab. in America. Cortex et fructus foetentes. Sw. *h*

11. *diurnum*, filament. edentatis, lacinae cor. subrotundis reflexis, fol. lanceolatis. L'Her. stirp. 1. p. 74. Dill. elth. 180. t. 154. f. 186. Habit. in Chili, Havana. *h*

12. *venenatum*, fol. lanceolato-oblong. coriaceis, flor. sessilib. Thunb. prodr. 36. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

13. *tomentosum*, flor. confertis sessilib. terminalib. ramis fol. calycibusque tomentosis. L. suppl. 150. Hab. in Amer. merid. Mutis. *h*

14. *hirtum*, flor. subspicatis axillaribus, fol. cordatis acutis subtus ramulisque hirtis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 478. Hab. in sylvis Jamaicae. *h*

15. *latifolium*, filamentis edentulis, ramis superne foliisque ellipticis subtus pul-

verulento - subvillosis, racemis axillaribus breviorib. Vahl. eclog. 1. p. 25. Lam. Hab. in ins. Trinitatis. Stigma capitatum. W. h

16. *racemosum*, fol. lanceolato - ovatis acutis, racemis brevibus compositis 1-3-nisque intermedio productiore. Flor. Per. 2. p. 29. t. 154. f. b. In Peruviae nemorib. Petioli subtoriti. h

17. *longiflorum*, fol. ovato - oblongis acutis, peduncul. terminalibus paniculato-racemosis, corol. tubo longissimo curvato. Flor. Per. 1. c. p. 28. t. 154. Cor. 1. 12a-pollicaris, purpurascens: limbo margine lanato.

18. *strigilatum*, fol. cordatis acutis, pedunc. geminis racemoso-paniculatis, altero brevior. Flor. Peruv. p. 29. t. 156. Cum priore in nemorib. Cor. magna tubo longo curvato, Jasminum refert. Frutex lanugine brevi, strigiliformi adpersus. Bacca ovata.

509. *SESSEA*. Cor. infundibuliformis. Stigma 2-lobum: lobo altero breviori. Caps. teres, curvata; 1-locularis, 2-valvis: valvul. 2-fidis.

1. *stipulata*, fol. lanceolatis cordatisque, racem. paniculatis. Flor. Per. 2. p. 9. t. 115. Habit. in Peruviae montibus. Frutex foetidus.

2. *dependens*, fol. cordate - oblongis, racem. longissim. pendulis. Fl. r. Per. 1. c. t. 116. In Peruviae rupis. Arbor. 5 - orgyalis.

510. *LYCIUM*. Cor. tubulosa, fauce clausa. Filam. barba. Bacca 2-locularis, polysperma.

\* *Spinosa*.

1. *asrum*, caul. strictis spinosis, foliis fasciculatis linearibus, bacc. globosis. Duham. N. ed. p. 107-110. Trew-Ehret. Pl. select. t. 24. Lam. ill. t. 112. f. t. Willd. Sp. 2. p. 1057. Hab. in Barbaria, Aegypto, Arabia, Palestina, Hispania et Medina. Flor. fusco-purpurei. Var. fol. plus minusve longiorib. et subulatis. h

2. *carnosum*, caule ramisve erectis spinascentibus, fol. lineari - lanceolatis fasciculatis carnosis, bacc. sphaericis. Duham. 1. c. p. 111. L. italicum. Mill. dict. rar. 2. L. rigidum. Thunb. 1. prod. p. 37. Trew-Ehr. t. 24. f. 1. Ad Cap. bonae spei. Priori simile, sed multo minus, 3 - 4 - pedes altum. h

3. *microphyllum*, caul. strictis rigidis divaricatis laevissimis, ramulis reflexis spinascentibus. fol. fasciculatis alternisve parabolicis. Duham. 1. c. p. 112. Habit. in India et in Africa orient. Fol. glauca. †

4. *ruthenicum*, fol. linearibus fasciculatis, geminis spinascentibus, ramis laxis. Willd. Murr. Comm. goett. 1779. p. 2. t. 2. L. tataricum. Pall. ross. 1. p. 78. t. 49.

β. *caspicum*, fol. breviorib. ram. spinosissimis, flor. minorib. Pall. ross. 1. t. 49. f. A. Hab. in Sibiriae nitrosis ad Volgam, in desertis Turcomannorum iuque Hircania; β. ad mare Caspium.

5. *tetrandrum*, spinosum, foliis ovatis obtusis, ramis angulatis, cor. quadrifidis. Thunb. prod. 37. L. suppl. 150. Hab. in Cap. b. spei. Simillimum L. afro. h

6. *barbarum*, caulib. procumbentibus angulatis simplicib. raro spinosis, fol. petiolatis ellipticis, cal. bifido, lacin. bidentatis, cor. margine villosa, bacca elliptica. Duham. p. 120. L. *barbarum*, fol. lanceolatis crassiusculis, cal. bifidis Linn. Sloan. afric. spec. n°. 349. f. 349. Hab. in Africa, Barbaria, ubi detectum a Shaw. ; vid. iter. vol. 2. Cor. pallide rubra post anthesin livida s. pallens. Filam. primo recta, dein incurvata inter cor. divisuras, supra basin villosa.

\* *turbinatum*, caul. erectis fasciculatis, ramulis dependentibus spinosis teretibus, fol. sessilib. lanceol. acuminaatis, cal. trifido, bacca turbinata ante maturitatem bursiformi. Duham. ed. nov. p. 119. t. 31. L. halimifolium. Mill. L. *barbarum*. L. Sp. pl. 1. p. 192. Lam. encycl. n°. 3. Hab. in China meridionali. Fol. nonnunquam quasi pulverulenta. Cal. rarius bifidus. Ad sepes etc. adhibetur. Filam. basi villosa. 1. c.

7. *europaeum*, caul. ramisve erectis teretibus spinosis, fol. spatulatis, filam. imberbibus, bacca subrotunda. Duham. p. 124. L. fol. obliquis, ramulis flexuosis teretibus. Linn. Willd. p. 1059. Mich. N. Gen. Pl. t. 105. f. 1. Habit. in Europa meridionali, in Gallia, Italia, Lusitania, Graecia et in Barbaria. Rami longis et fortibus induti spinis. Cor. albedo-rubra. Var. bac. rubris et flavis.

8. *lanceolatum*, caul. erectis apice flexuosis recurvis teretibus, ram. patentissim. spinosis, fol. subsessilib. lanceolatis acutis, cal. inaequaliter dentato, bacca oblonga. Duham. p. 123. L. *europaeum*. Lam. excl. synonym. Hab. in regno Neapolitano, Graecia. Cor. violacea.

9. *chinense*, erectum spinosum, ramis

diffusus angulatis, fol. petiolatis lanceolatis acutis, cal. 2-3-fidis, stylo staminibus vix longiore; bac. ovatis. Duham. N. ed. p. 116. t. 30. Trew-Ehr. t. 68. excl. synonymi. Hab. in China temperiore. Corol. infundibuliformis, violacea.

10. *oratum*, caul. ramisque dependentibus striatis raro spinosis, foliis petiolatis ovatis obtusis, cal. 5-dentatis, stylo staminibus longiore, bac. oblongis. Duham. l. c. p. 117. L. chinense. Lam. ill. t. 112. f. 2. L. barbarum. β. Willd. Sp. 2. p. 1059.

11. *cinerum*, spinosum, fol. lanceolatis glabris, ramis spinascentibus, pedunculis brevissimis. Thunb. prod. Hab. ad Cap. b. spei. h +

12. *horridum*, spinosum, fol. obovatis carnosius glabris, ramis spinascentibus, pedunc. brevissimis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *boerhaviaefolium*, spinosum, fol. ovatis integerrimis acutis glaucis, floribus paniculatis. Lin. suppl. 150. Eheretia halmifolia. L'Her. stirp. 1. p. 45. t. 23. Hab. in Peru. Var. fol. undulatis. h

14. *obovatum*, spinosum, fol. obovatis obtusissimis, spinis foliosis: vetustioribus nudis, flor. paucis nutantibus. Flor. Per. 2. p. 40. t. 193. f. c. Hab. in circuitu et sepius Tarmae oppidi. Corol. purpureo-violacea.

15. *salsum*, spinosum, ram. gracilibus, spinis foliosis, fol. obovato-oblongis sessilibus, flor. solitariis. Flor. Peruv. 2. l. c. p. 193. f. a. Cor. albo-purpurea: tubo angusto.

#### \*\* Inermia.

16. *barbatum*, inermis, fol. ovatis glabris, ram. flexuosis, flor. paniculatis. Th. L. inermis. Lin. suppl. 150. Habit. ad Cap. b. spei. h

17. *spathulatum*, inermis, fol. obovato-spathulatis, florib. fasciculatis axillaribus. Flor. Per. t. 183. f. b. Cresc. ad sepes urbis Huanuci. Cor. violacea, limbo pubescente. Cal. truncatus. +

18. *umbellatum*, inermis, fol. oblongo-lanceolatis, pedunc. rameis, flor. umbellatis, cal. pentagonis. Flor. Peruv. 2. p. 45. t. 182. f. b. Habit. in sepiis et versuris in prov. Canta in Peru. Filam. glabra. Bacca aurantia, 1-locularis. h

19. *aggregatum*, inermis, fol. oblongis acutis undulatis subtus tomentosis, florib. axillaribus numerosissimis. Flor. Per. l. c. f. a. Hab. passim in Lima etc. vallibus et

praeruptis, etiam ad sepes. Cor. alba. Filam. imberbia. Bacca globosa aurantia, 2-locularis.

*Obs.* Tres hae species, quarum habitus etiam recedit, vix ad Lycia pertinent, sed *Atropae arborescenti* Lin. affines, quacum non male peculiare genus efficere possent. L. *capsulare*. Lin. Willd. Spec. p. 1061. planta dubia et ob fructus forte non hujus generis est.

511. **POGONIA.** Cal. 5-phyllus, persistens. Car. infundibuliformis: ore villis clauso; limbo semiquinquefido. Styl. sursum parum subcurvatus; Stigma concavum. Drupa compressa, quadrilocularis.

1. *debilis*, fol. lanceolatis apicib. subserrulatis distichis, flor. solitar. axillaribus caeruleis, cortice scabroso. Andrew Repos. t. 212. Hab. in N. Hollandia, ad oppidum Jackson. Planta sarmentosa. E. Fam. campanulacea?

512. **CRYPTOSTOMUM.** Cor. infundibuliformis, calyci inserta. Nectar. monophyllum, corollam claudens. Bacca exsucca, 3-locularis: loculis monospermis. Sem. arillata?

1. *laurifolium*. Willd. Spec. 2. p. 1061. Moutabea gujanensis. Aubl. guj. 2. p. 680. t. 274. Hab. in campis cultis Cajennae et Gujanae. Frutex sarmentosus. Folia alternata. h

513. **ARDISIA.** Cal. 5-partitus. Cor. hypocrateriformis: limbo reflexo. Anth. magnae, erectae. Stigma simplex. Drupa carnosa, supera, 1-sperma.

1. *tinifolia*, flor. paniculatis, fol. ellipticis integris nervosis, caule arboresco. Sw. Fl. Ind. occid. 1. p. 468. Willd. Sp. 2. p. 1062. Sloan. hist. 2. p. 98. t. 105. Hab. in aridis submontosis Jamaicae. h

2. *coriacea*, flor. paniculatis, fol. oblongis integris aveniis coriaceis. Swartz. l. c. p. 470. Hab. in Antillis. h

3. *serrulata*, florib. paniculatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis rugosis, caule fruticoso pubescente. Swartz. p. 471. Plum. cat. 18. ic. 80. Hab. in Hispaniola ad fluviorum ripas graminosas. h

4. *acuminata*, panic. axillaribus terminalibusque, fol. oblongis acuminatis basi attenuat. Willd. *Isacorea gujanensis*. Aubl. 2. suppl. p. 1. t. 368. Hab. in campis cultis Gujanæ. h

5. *crenulata*, panic. terminali, fol. lanceolato-ovatis repando - crenatis acuminatis, basi attenuatis. Ven. Choix de pl. p. 5. 28. Hab. in Antillis.

6. *pyramidalis*, fol. lanceolato - ovatis glabris, racemis terminalibus, pedunc. umbelliferis compressis. Cav. ic. 6. p. 1. t. 502. Hab. prope Santa Cruz. Cor. rubra. Arbor.

7. *serrata*, fol. sparsis lanceolatis serratis, flor. racemis terminalibus compositis. Cav. l. c. p. 2. t. 503. sub *Anguillaria* uti antecedens. Arb. 15-20-pedalis.

8. *humilis*, racem. terminalibus compositis, pedicellis umbellatis, fol. lanceolato-ellipticis integerrimis coriaceis venosis. Vahl. symb. 3. p. 40. *Tinus humilis zeylanica*, fol. crassis venosis. Burm. zeyl. 222. t. 103. Hab. in ins. Haiman, in paludosis salsis ad Siam, Malaccam et in Zeylona. h

9. *solanacea*, corymbis axillaribus tripartitis, fol. oblongis utrinque attenuatis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 27. t. 27. Hab. in montosis Indis orient. h

10. *lateriflora*, racem. lateralibus axillaribusve compositis, floribus umbellatis, fol. oblongis acuminatis integerrimis, caule fruticoso. Swartz. l. c. p. 473. Hab. in Ind. occident. h

11. *excelsa*, racem. axillaribus simplicibus, fol. obovatis margine cartilagineo-serratis. Ait. Kew. 1. p. 261. Gaertn. sem. 1. t. 77. f. 1. Hab. in Madera. h

12. *parasitica*, racemis axillaribus simplicibus, fol. sessilibus lanceolato - ovatis lineatis, caule fruticoso. Swartz. Hab. in truncis arborum versus juga montium ins. Dominicae. h

Obs. Hoc genus idem est ac *Anguillaria*. Gaertn. et *Badula*. Juss.

514. **BLADHIA**. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* rotata, quinquesida. *Bacca* 1-sperma. *Semen* arillatum.

1. *japonica*, fol. ternis serratis glabris, caule basi decumbente. Thunb. Flor. jap. 95. t. 19. Willd. Sp. 2. p. 1122. Hab. in fruticetis montium Japoniae. h

2. *glabra*, fol. oppositis serratis glabris, caule erecto. Thunb. in Act. Soc. Linn. 2. p. 331. et jap. p. 350. Hab. in Japonia. h

3. *villosa*, fol. serratis villosis. Thunb. jap. p. 96. t. 19. Hab. in Japonia. h

4. *crispa*, fol. oblongis crispis glabris. Thunb. l. c. p. 97. Kaempff. amoen. Fasc. 5. p. 776. Cum priore.

515. **MYRSINE**. *Cor.* semiquinquesida connivens. *Germen.* cor. replens. *Stigma* magnum, lanigerum, (exertum). *Drupa* 1-sperma: nuce 5-loculari. (*Bacca* immatura 5-sperma, matura 1-sperma. Gaertn.)

1. *africana*, sempervirens, fol. ovatis acutis superne serratis. Lam. ill. t. 121. Willd. Sp. p. 1121. Pluck. alm. t. 80. f. 5. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei. h

Obs. Planta videtur Polygamo - monoica, cum individua occurrunt flor. masculis tantum instructa, qui 4-andri fuerunt. Fol. serraturae spinulosae.

2. *retusa*, fol. obovatis obtusis, apice emarginato-denticulatis. Ait. hort. 1. p. 271. Hab. in ins. Azoris. Flor. subcorymbosi. Willd. Stigm. inclusum? cfr. Vent. Hort. Cels. p. 86-87. h

516. **LEEA**. *Cor.* 1-petala. *Nect.* 1-phyllum, tubo corollae impositum, 5-fidum, erectum. *Bacca* 5-sperma, infera. (Monoica. Juss.)

1. *sambucina*, canle sulcato-angulato glabro, fol. subbipinnatis. Willd. Sp. p. 1177. *Aquilicia*. Caven. diss. 7. p. 372. t. 218. *Staphylea indica*. Burm. ind. 722. t. 24 f. 2. Rumph. 4. t. 45. Hab. in India orientali. Arbuscula facie Sambuci. h

2. *aequata*, caule tereti pubescente, fol. pinnatis. Willd. l. c. Mant. p. 124. In India orient. Corymbi trichotomi. h

Obs. An *Aquilicia* congener? vid. Juss. gen. p. 170.

3. *crispa*, caule angulato limbrato, fol. pinnatis. Hab. ad Cap. b. spei. Radix tuberosa. Flor. nivei. h

517. **CORYNOCARPUS**. *Cal.* 5-phyllus inferus. *Cor.* 5-petala. *Nect.* 5-petaliformia, cum petalis alternantia, basi glandulifera. *Nux* 1-sperma, clavata.

1. *laevigata*. Lin. suppl. 156. Fors. gen. p. 31. t. 16. Willd. Sp. 2. p. 1178. Hab. in

N. Zealandia Fol. obovata integra. Panic. terminalis magna rugosa. h

518. JACQUINIA *Cor.* 10-fida. *Stamina* receptaculo inserta. *Bacca* 1-sperma.

1. *arborea*, fol. cuneiformibus, ramis ad ramificationes aequalibus, inferioribus verticillato-quaternis, superioribus dichotomis. Vahl. eclog. 1. p. 26. Willd. Spec. 2. p. 1064. Hab. in ins. Montserrat prope New-Windward. Arb. truncato erecto, quatuor, sex, decem, viginti, vel triginta pedes alto, diametro sex vel octopollicari.

2. *armillaris*, fol. cuneiformibus, ramis ad ramificationes nodosis verticillatis. Vahl. eclog. 1. p. 26. Jacq. amer. 53. t. 39. Ed. pict. Sloan. hist. 2. p. 89. t. 190. f. 2. Hab. in America. Frutex humilis 4-6-pedalis. h

3. *venosa*, fol. ovato-lanceolat. venosis submembranaceis. Swartz. prod. 47. Habit. in India occident. h

4? *macrocarpa*, fol. rigidis lanceolatis mucronatis, flor. aurantiis, ba c. cerasiformibus. Cav. ic. 5. p. 55. t. 481. Habit. non procul a mare Panamaitis et Acapulci. Bacc. continet corpus cartilagineo-carnosum, cui adherent 12 fere corpuscula plana ovata, an semina? C.

5. *ruscifolia*, fol. lanceolatis acuminat. Jacq. amer. pict. t. 57. Meleola aculeata. Linn. Spec. pl. 1. p. 339. Dill. elth. t. 123. f. 149. Hab. in Amer. merid. in Havanæ sylvis montosis. h

6. *linearis*, fol. linearibus acuminatis. Jacq. amer. t. 40. f. 1. Ed. picta. t. 58. Cresc. ad St. Domingo in litoribus maritimis. Pedunc. in hac et precedente 1-flori. h

519. SICKINGIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* campan. lata. *Caps.* lignosa.

2-locularis, 2-valvis. *Sem.* alata.

1. *Erythroxylon*, fol. rhombo-oblongis, apice dentatis subtus pubescentib. Willd. in Nov. Act. Berol. v. 2. vii. Schrad. Bot. Journ. 1800. p. 291. Arb. 30-40 pedib. lignoque duro.

2. *longifolia*, fol. oblongo-obovatis integerrimis glabris. Willd. l. c. Cresc. cum priore in montosis sylvis ad Caracas. h

520. BECKEA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Caps.* 3-4-locularis, polysperma, cal. tecta. (*Sem.* pauca. Gærtn.)

1. *frutescens*, fol. oppositis muticis,

dentibus calycinis membranaceis coloratis. Smith in Act. Soc. Lin. 3. p. 259. L. suppl. p. 514. Willd. Sp. 2. p. 1. Beckea chinensis. Gærtn. de fruct. 1. p. 157. t. 31. f. 7. Osb. iter. t. 1. Hab. in China.

2. *densifolia*, fol. 4-fariam imbricatis obtusis mucronatis reflexis dentib. calycin. foliaceis. Smith l. c. Hab. ad portum Jackson, N. South-Wales.

521. IMBRICARIA. *Petala* 5. *Stigma* capitatum. *Caps.* calyce tecta, 2-locularis, polysperma. Sm. (*Cap.* 1-locularis evalvis, apice amplo foramine dehiscens. Gærtn.) Conf. Juss. gen.

1. *crenulata*, fol. obovato-cuneiformib. sursum crenulatis, cal. denticulatis. Smith in Act. Soc. Lin. 3. p. 259. Jungia imbricata. Gærtn. de fr. 1. p. 175. t. 35. f. 5. Philadelphus imbricatus. Sol. Aud. Molliæ, Gmel. syst. p. 420.

2. *ciliata*, fol. triquetro-linearibus, calycin. ciliatis, germine 5-gono. Smith l. c. p. 176. Jungia tenella. Gærtn. l. c. p. 176a. Hab. in N. Hollandia.

522. ESCALLONIA. *Cal.* 5-dentatus, persistens. *Petala* 5, lingulata. *Stigma* capitato-depressum. *Bacca* seminifera, 2-locularis, polysperma. (*Caps.* 2-locularis calyce coronata, basirimis 2-4-dehiscens. *Recept.* 2, in singulo loco. *Dissepimentum* interruptum. Syst. veg. Flor. Per. p. 66. sub Stereoxylon.)

1. *serrata*, fol. serratis subretusis subtus aveniis. Smith. ic. p. 31. t. 31. Hab. ad fretum Magellanicum.

2. *myrtilloides*, fol. obovatis venosis denticulato-glandulosis, pedunc. 1-floris, petalis spathulatis. Stereoxylon patens. Fl. Peruv. 3. p. 13. t. 234. Escal. myrtilloides. Smith. pl. ic. fasc. 2. p. 30. t. 30. Willd. Spec. 2. p. 1149. Habit. in Amer. merid. collibus frigidis montosis. Lignum durissimum ad varia utensilia utilissimum.

3. *corymbosa*, foliis oblongis serrulatis, pedunc. 1-floris, calycibus denticulatis, petalis oblongis. Flor. Per. 3. p. 14. t. 234. Arb. tristis, Myrti facie.

4. *virgata*, fol. obovato-spathulatis serrulatis, pedunc. 1-floris calycin. dentatis, petalis obovatis. Flor. Per. t. 235. sub Ste-

*reoxylon*. Hab. in montibus et sylvis humidis. Ramuli seniores post defoliationem spinas acemulantur.

5. *resinosa*, fol. oblongo-obovatis serrulatis, pedunc. racemosis, petalis obovato-oblongis. Flor. Per. l. c. f. a. sub *Stereoxylon*. Hab. in Peruv. collib. frigidis. Ramuli purpurascens, resina illiti, Lignum durissimum.

6. *rubra*, fol. ovato-oblong. acuminat. serratis, pedunc. 2-7-floris, petalis spathulatis. Flor. Peruv. p. 15. t. 236. *Stereoxylon rubrum*. In R. Chilensis montibus, inter saxorum fissuras. Nect. conicum, 10-angulare, denticulatum.

7. *revoluta*, foliis obovatis denticulatis revolutis, racemis thyrsoides; petalis linearispathulatis. Flor. Per. l. c. f. a. Cum priore in umbrosis et scaturiginibus prope Conceptionis urbem et ad littora. Folia amara.

8. *pulverulenta*, fol. oblongo-ellipticis serrulatis, pedunculis racemoso-spicatis, petal. obovatis. Fl. Per. 3. p. 15. t. 237. f. a. Cresc. in R. Chilensis sylvis. Rami juniores pulverulenti, pubescentes.

9. *pendula*, fol. lanceolatis acutissimis integris obsoleteque serrulatis, racem. pendulis longissimis, petalis linearibus. Flor. Per. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus. Lign. durum.

523. *CERVANTESIA*. *Cal.* minimus, crescens. *Cor.* o. *Squamæ* nectariferæ 5, ovales crenatæ, infra lacinias calycis insidentes. *Stam.* plana, basi calycis inserta. *Nux* calyce carnosio 5-gono, colorato involuta, 1-locularis.

1. *tomentosa*, fol. linearibus oblongis, flor. racemosis subsessilibus. Flor. Peruv. 3. p. 19-20. t. 241. f. b. Habit. in Peruviae præruptis circa Acobamba vicum, etiam in Cantae provinc. locis imis calidis. Stigm. simplex, obtusum, obsolete umbilicatum.

*Obs.* An hujus quoque loci *Cervantesia bicolor*, caule arboreo, fol. oblongis ferrugineo-tomentosis, flor. racemosis. Cav. ic. 5. p. 49-50. t. 475? Secundum quem stigm. emarginatum et veluti bicornæ est. Conf. quoque Fl. Per. l. c. *Obs.* 1.

524. *ALZATEA*. *Cal.* 5-fidus, 5-gonus. *Cor.* o. *Stam.* receptaculo inserta. *Caps.* obcordata 2-lo-

cularis, 2-valvis: valvulis medio septiferis. *Dissepimentum* contrarium. *Sem.* super-imposita, membrana cincta.

1. *verticillata*, fol. obovatis emarginatis, flor. corymbosis. Flor. Peruv. 3. p. 20. t. 241. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus, prope Messapata prælium.

*Obs.* Arbor bæcce primo ex truncis distinctis postea ad 4 ulnarum altitudinem in unicum truncum connexis, constabat. vid. l. c.

525. *MYOSCHILLOS*. *Cal.* 5-phyl-lus, coloratus. *Cor.* o. *Stam.* receptaculo inserta. *Stigma* 2-3-fidum. *Drupa* 1-sperma, cal. coronata. *Nux* 1-locularis.

1. *oblonga*, fol. oblongis acuminatis repandis, flor. spicatis. Flor. Peruv. 3. p. 20. t. 242. f. a. Cresc. in R. Chilensis collib. et ripis arenosis prope Conceptionis urbem, etc. *Cal.* purpureus. *Drupa*, atropurpurea. *Incolae* fol. infuso, instar *Sennæ*, frequens utuntur.

526. *ACHRAS*. *Cal.* 5-6-partitus: laciniiis ovatis concavis incurvatis. *Cor.* ovata, 5-fida: laciniiis rotundatis: squamis totidem alternis ad faucem. *Pomum* mammosum 1-loculare. *Sem.* solitaria, hilo marginali, apiceque unguiculato. *Stigma* obtusum, striatum. (*Stam.* 4-6.)

1. *Lucuma*, florib. solitariis 2-3, foliis oblongo-obovatis, pomis mammosis. Flor. Peruv. 3. p. 17. t. 239. *Lucuma*, Juss. Gen. Hab. in Peruv. hortis et in R. Chilensis mariitimis. *Pomum* mammosum sæpe ovatum, acuminatum. Semina castaneæ acemulantur. Arbor est procera, supra quam in ejus sæpius detrimentum copiose vegetat *Tillandsia Usneoides*.

2. *Caimito*, flor. aggregatis tetrandris, fol. obovato-lanceolatis, pomis ovalib. Fl. Per. 3. p. 18. t. 240. Hab. in Andium montibus. Arbor frondosissima lactifera. Fruct. edules et in hac specie molliores et sapidiore.

3. *mammosa*, flor. solitariis, fol. cuneiformi-lanceolatis, flor. pentandris. Linn. A. Sapota major. Jacq. amer. t. 182. f. 19. Ed. picta. t. 59. Willd. Sp. tom. 2. p. 224. Pluck. alm. t. 268. f. 2. Hab. in America meridionali.

4. *Sapota*, flor. solitariis, fol. lanceolato-ovatis, florib. hexandris. Jacq. amer. t. 41. Ed. pict. t. 41. Brown. Jam. a. p. 200. t. 19. f. 3.

β. *Zapotilla*, brachiat. diffusus. Brown. Hab. cum priore.

5. *dissecta*, flor. confertis, cor. octodecemfidis, fol. obovatis emarginato-retusis. Forst. pl. excul. n. 13. Linn. suppl. p. 210. A. *Ba'ata*, foliis ovato-oblongis subtus cinereis, fructu viridi olivaceiformi. Auhl. guj. t. p. 308. Willd. l. c. p. 223. Hab. in ins. Philippinis et Americorum, etiam in Gujana et Malabaria. Pedunculi axillares penduli, uniflori.

527. CHRYSOPHYLLUM. Cor. campanulata, 5-fida: laciniis alternis patulis. *Bacca* (magna 10-sperma, (etiam 1-2-sperma.)

1. *Cainito*, fol. ovatis parallele striatis, subus tomentoso-nitidis, bac. subrotundis. Linn. Jacq. amer. 51. t. 37. f. 1. pict. t. 51. Willd. Sp. a. p. 1083. Lam. ill. a. p. 44. t. 120. Cainito folio subtus aureo. Plum. gen. 10. ic. 69.

β. *jamaicense*, fructu purpureo subovato. Jacq. l. c. Sloan. jam. 205. hist. 3. p. 170. t. 229.

γ. *caeruleum*, fructu caeruleo globoso. Jacq. amer. t. 37. Ed. pict. t. 5a. Hab. in Martinica. h

Obs. Eadem planta aut saltem huic valde affine videtur *Nycerisium ferrugineum*. Flor. Per. a. p. 46. t. 187. cujus fructus auctoribus hucusque ignotus est.

2. *monopyrenum*, fol. oblongis acuminatis subtus tomentoso-aureis, fructu ovato monopyreno. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 480. Hab. in fruticetis et collibus Jamaicae et Hispaniolae. h

3. *microcarpum*, foliis ovatis glabris subtus pubescentibus, bac. oblongis obliquis monospermis. Swartz. prod. Fl. ind. occ. 1. p. 482. Hab. in Hispaniola ad fluviorum ripas. Sapor fructus dulcissimus. h

4. *angustifolium*, fol. lanceolatis parallele striatis nitidis subtus tomentoso-ferrugineis, baccis olivaceiformibus. Lam. ill. a. p. 44. Hab. in St. Dominica. Baccae subdispermae. h

5. *oliviforme*, foliis ovato-oblongis, subtus tomentoso-nitidis, fructu monospermo olivaceiformi. Lam. l. c. Burm. amer. t. 69. Hab. in Martinica. h

6. *argenteum*, fol. falcato-ovatis, subtus tomentoso-nitidis, Jacq. amer. 53. t. 38. f. 1. Ed. picta. t. 54. Habit. in Martinica. h

7. *rugosum*, foliis oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu acuminato rugoso. Swartz. l. c. p. 484. Hab. in sylvis montium Jamaicae occident. h

8. *pyriforme*, fol. oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu pyriformi laevi. Willd. p. 1084. C. Maccoucon. Aubl. p. 233. t. 9a. Hab. ad ripas omnis Galibiensis Gujanae. h

9. *glabrum*, fol. ovato-oblongis acutis utrinque glabris, fructu elliptico laevi. Willd. Jacq. amer. 53. t. 38. f. 2. Ed. picta t. 55. Habit. in sylvis Martinicae. h

β. *pauciflorum*, fol. ovatis acuminatis utrinque subglabris, axillis paucifloris. Lam. l. c. Hab. in Martinica.

528. SIDEROXYLON. Cor. subrotata 5-fida. Squamæ 5, petalis alternæ serratæ. (Nect. in ple-risque 5-phyllum. L.) *Drupa* 5-sperma.

#### \* *Inermia*.

1. *mitis*, inermis, flor. sessilibus. Linn. Jacq. collect. a. p. 249. Willd. Sp. p. 1089. Hab. in Africa. h

2. *inermis*, inermis, fol. perennantibus obovatis, pedunc. teretibus. Lin. Jacq. coll. a. p. 250. Lam. ill. a. p. 41. t. 120. f. 1. Dill. elub. t. 265. f. 344. Hab. in Aethiopia. Fol. crassa rigida.

3. *cymosum*, inermis, fol. oppositis petiolatis, cymis compositis et decompositis. L. suppl. 152. Hab. in monte tabulari Cap. b. spei. h

4. *sericeum*, inermis, fol. ovatis subtus tomentoso-sericeis. Ait. Kew. 1. p. 262. In N. Hollandia. h

5. *argenteum*, inermis, fol. ovatis retusis tomentosis, flor. pedunculatis. Thunb. prod. 36. et Rohmeria. Hab. ad Cap. bon. spei. h

6. *tomentosum*, inermis, foliis oblongis acuminatis obtusis, junioribus tomentosis, pedunc. aggregatis axillaribus. Willd. p. 1090. Roxb. corom. 1. p. 28. t. 28. Hab. in Ind. orientali. h

7. *nitidum*, inermis, fol. ovato-oblong. glabris nitidis petiolatis, pedunc. confertis axillaribus. Lam. l. c. p. 42. Habit. in St. Domingo.



\*\* *Spinosa.*

8. *decandrum*, spinosum, fol. deciduis ellipticis. L. Willd. p. 1091. Hab. in Amer. septentrionali. Stam. 10. Bac. nigra.

9. *multiflorum*, spinosum, fol. obovato-cuneatis coriaceis glabris, pedunc. divisim fasciculatis lateralib. Lam. ill. 2. p. 43. Hab. ad Cap. b. spei. †

529. *BUMELIA. Cor.* 5-fida. *Nect.* 5-phyllum. *Drupa* monosperma.

1. *nigra*, fol. terminalibus oblongo-lanceolatis glabris margine undulatis, ramis laxis, ramulis virgatis floriferis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 487. Willd. Sp. p. 1085. Hab. in sylvis et locis montosis Jamaica. h

2. *pallida*, fol. terminalibus ellipticis obtusis, pedunc. confertis lateralibus, ram. erectis. Swartz. p. 489. Hab. in campestris. Jamaica. Distinguitur a B. nigra, quod arb. minor cortice albescente et flor. majores sint. Swartz. h

3. *retusa*, fol. cuneato-ovatis retusis rigidis, pedunc. confertis axillaribus. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 490. Habit. in montosis Jamaica. occid. h

4. *foetidissima*, fol. lanceolato-oblong. obtusis submarginatis, pedunc. confertis axillarib. Willd. p. 1086. S. inerme, fol. suboppositis, florib. patentissimis. Linn. Mant. 49. Habit. in S. Domingo in sylvis montosis. h

5. *salicifolia*, foliis lanceolato-ovatis acuminatis, pedunc. confertis axillaribus et lateralib. Swartz. l. c. Fl. ind. occid. 1. p. 491. sub Bumelia. *Achras salicifolia*. L. Sp. pl. 470. S. *Mastichodendrum*. Jacq. coll. 2. p. 251. t. 17. f. 5. Lam. ill. 2. p. 41. *Cornus*. Catesb. carol. 2. p. 75. t. 75. Habit. in collib. aridis Jamaicae, insul. St. Crucis, et in ins. Bahamensib. h

6. *montana*, foliis oblongis obtusis, pedunc. longioribus axillaribus distinctis. Sw. Fl. ind. occid. 1. p. 493. Hab. in montibus altiorib. Jam. austr. h

7. *nervosa*, fol. alternis ellipticis subtus discoloribus, florib. aggregatis lateralibus axillaribusque tomentosis pedunculat. Vahl. ecl. 1. p. 28. *Chrysophyllum* Canito. Aubl. Ch. macrophyllum. Lam. enc. 2. p. 44. Hab. in Cajenna. h

8. *Lycioides*, spinosa erecta, fol. lato-lanceolatis utrinque glabris. Michaux, Flor. 1. p. 122. Duham. 2. t. 68. S. laeve. Walter. Hab. in Canada, Carolina.

9. *reclinata*, spinosa liffusa, ram. sterilibus divaricatis, fol. parvulis obovalibus glaberrimis. Michaux, l. c. Vent. Choix de Pl. t. 22. In dumetosis Georgiae rupibus.

10. *tenax* (chrysophylloides), spinosa fol. caneco-lanceolatis, plerumque obovalibus subtus sericeo-nitentibus. Michaux, p. 123. Jacq. collect. 2. p. 252. Ej. obs. 3. t. 54. sub *Sideroxylo*. Willd. Sp. 2. p. 1085. Habit. in dumetis litoralib. Carolinae. Fol. Chrysophylli. Arb. 20-pedalis. M.

11. *lanuginosa*, spinosa, ramulis patentissimis pubescentibus, fol. ovali-lanceol. subtus lanuginosis. Michaux, p. 122. In Georgiae humidis. Antecedenti affinis dicitur, quare eam huc reuli.

12. *pentagona*, fol. lanceolatis acuminatis, pedunc. axillaribus, drupis pentagonis. Swartz. l. c. p. 494. Habit. in monte Josephi insulae Dominicae. h

13. *rotundifolia*, foliis suborbiculatis marginatis venosis coriaceis utrinque glabris. Swartz. p. 495. In fruticetis montium Jamaicae. h

14. *cuneata*, fol. cuneatis obovatis. Sw. l. c. p. 496. Hab. in fruticetis montium Jamaicae.

*Obs.* Hujus et praecedentis fructus nondum observatus est.

530. *MANGLIHA. Cal.* minimus, 5-partitus. *Cor.* rotata, 5-partita. *Nect.* squamulae o. *Drupa* 1-locularis, 1-sperma. Juss. Gen. pl.

1. *Jussieu*, fol. perennantibus oblongis glaberrimis, pedunc. fasciculatis brevibus. Chrysophyllum Mangnillo. Lam. ill. 2. p. 45. Bumelia. Willd. Sp. 2. p. 1087. n.º 7. Hab. in Peru. h

2. *Milleriana*, fol. perennantibus lanceolato-ovatis acuminatis nitidis, cal. subrotundis. Lam. l. c. sub Chrysophyllo. Mill. ic. t. 299. *Sideroxyton* mite. Jacq. coll. 2. p. 249. Hab. ad Cap. b. spei. Pedunc. axillares, aggregati, albi. h

3. *metanophleos*, foliis perennantibus lanceolatis undulatis glabris, pedunc. brevissimis (purpureis), cal. subcutis. Lam. l. c. sub Chrysophyllo. *Sideroxyton* laurifolium. Lam. enc. bot. 1. p. 244. S. *metanophleum*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1085. Jacq. hort. 2. 71. Hab. in Aethiopia.

*Obs.* Praeunte Lamarkio 2. posteriores species ad hoc genus amandavi, quod fructu a Chrysophyllo et Nectarii defectu a Sideroxylo.

oxylo differt. Huc etiam pertinet *Caballeria*. Flor. Per. prod. p. 141. t. 30. et syst. veget. Flor. Peruv. et Chilens., ubi p. 279-282. plures hujus generis enumeratae sunt species, quarum descriptiones et Icones in posterum expectari debent. An *Roemeria*. Thunb. idem genus?

531. **TECTONA**. *Cor.* 5-fida. *Stigma* dentatum. *Drupa* sicca, spongiosa, intra calycem inflatum. *Nux* trilocularis.

1. *grandis*. Lin. suppl. 151. Roxb. corom. 1. p. 10. t. 6. Willd. Sp. 1088. Theka. Rheed. mal. 4. t. 20. Juss. gen. Lam. ill. t. 136. Habit. in vastis sylvis insularum Javae et Zeylonae, et in Malabar et Coromandel. Arbor.



**RHAMNUS** (gen. 532-533.) cal. habent 1-phyllum, petala ut plurimum 5, aut 4-6, rarius 0, calyci inserta ejusdem laciniae alterna, squamiformis. Stam. cal. quoque inserta, petal. alterna aut opposita, plerumque 5, in quibusdam 4, rarissime 6 (Prinos). *Stigma* simplex aut 2-3 et 5, quo nonnulla hujus familiae genera in sequentibus ordinibus occurrunt. Discus glandulosus in multis. Fructus superus (rarius inferus) baccatus, drupaceus et capsularis. Embryo planus et rectus, perispermio carnoso cinctus. Arbores aut frutices fol. opposita s. alterna, stipulis saepe minimis distincta.

† *Stamina petalis opposita. Fructus baccatus aut drupaceus.*

532. **RHAMNUS**. *Cal.* campanulatus, 4-5-fidus. *Cor.* squamæ stamina munientes, calyci insertæ, (passim 0.) *Stigma* 1-2-4-fidum. *Bacca* 3-4-sperma. (Flor. passim polygami, et dioici.)

\* *Spinosi.*

1. *catharticus*, spinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis, fol. ovatis serratis. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1092. Flor. dan. t. 850. Duham. arb. 1. t. 50. Hab. in sylvaticis. *Stigm.* 4-fidum.

2. *infectarius*, spinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis, caulibus procumbentibus. Jacq. coll. 3. p. 17. Spina infectoria pumila L. Clus. hist. 1. p. 111. Habit. in Hispania, Gallia, Carnioli, Italia. Fol. subtus villosa. Calyx cyathiformis dentatus, L. In hortis caule erectum vid. h.

3. *lycioides*, spinis terminalibus, fol. linearibus integerrimis obtusis. Willd. Sp. 1093. Cav. ic. 2. p. 56. t. 182. Hab. in Hispania. h.

4. *Erythroxyton*, spinis terminalibus, fol. lineari-lanceolatis serratis acutiusculis. Willd. l. c. Pall. ross. 2. p. 26. t. 62. et ejusdem. itin. 3. app. n°. 78. t. 1. f. 1. Hab. in Sibiria rupibus apricis. h.

5. *oleoides*, spinis terminalibus, foliis oblongis integerrimis. Linn. Hab. in Hispania. Similis *h.* cathartico, sed minor. Fol. ad gemmas 2. s. 3. Oleae similia.

6. *crenulatus*, ramulis spinescentibus, flor. quadrifidis trifidive dioicis, fol. oblongis obtusis serratis sempervirentibus. Ait. Kew. 1. p. 263. Hab. in ins. Teneriffa. h.

7. *saxatilis*, fol. ovato-lanceolatis serratis, spinis terminalibus, flor. quadrifidis hermaphroditis. Jacq. Fl. Austr. 1. t. 53. Hab. in montib. Badensibus, Italicis, Helveticis.

*Obs.* Squamæ petaloideae 0. *Stigm.* 4-fidum. *Drupa* infera, sub 4-sperma: *Frangula saxatilis*. Cramer. enumer. pl. etc. Marburgi. 1803. p. 41.

8. *theezans*, spinis terminalibus, fol. ovatis serrulatis, ramis divaricatis. L. Mant. 207. Hab. in China, pauperibus Theae succellaneum. Samentosus. Ramis triati. Fl. in spica interrupto-glomerati. *Sügma* triplex. h.

\* \* *Inermes.*

9. *Sarcomphalus*, inermis, fol. ovalibus coccis integerrimis emarginatis. L. Amoen. acad. 5. p. 395. *Sarcomphalus*. Brown. jam. 179. Hab. in America. h.

10. *ferreus*, inermis, flor. hermaphroditis umbellatis axillaribus, fol. oblongo-ovatis emarginatis integerrimis glabris membranaceis. Vahl. symb. 3. p. 41. t. 58. Hab. in ins. St. Crucis. h.

11. *laevigatus*, inermis, flor. hermaphroditis axillaribus subgeminis, fol. oblongis integerrimis coriaceis glabris. Vahl. l. c. p. 41. Cum priore. h.

12. *tetragonus*, inermis, foliis ovatis integris glabris sessilibus, ramis tetragonis. Lin. suppl. 153. Habit. in Cap. b. spec. h.

13. *polifolius*, inermis, flor. hermaphroditis axillaribus subsessilibus, fol. lanceolatis integerrimis subtus tomentoso-niveis. Vahl. In N. Zeelandia. h.

14. *valentinus*, inermis, flor. hermaphroditis quadrifidis trigynis, capsul. trilob-

ularibus, fol. subrotundo-ovatis subrenatis. Willd. p. 1096. Rh. pumilus. Cav. ic. 2. p. 65. t. 181. excl. syn. Hab. in regni Valentini montibus Meca et Palomera. *h*

15. *cubensis*, inermis, fol. hermaphroditis, caps. trilocularibus, foliis rugosis integerrimis tomentosis. Lin. Jacq. hort. 3. t. 49. et ejusd. Am. pict. t. 75. Hab. in fruticetis maritim. Cubae. Habitus Viburni Lantanae. Fructus capsularis? Ceanothus?

16. *carolinianus*, inermis, fol. ovali-oblongis integrisculis glabris, umbell. pedunculatis, flor. hermaphroditis 4 - andris 1-gynis. Michaux, Flor. 1. p. 153. Hab. in Carolina.

17. *minutiflorus*, fol. suboppositis ovalibus serratis, flor. minutissimis dioicis spicatis, stylo 3-fido. Michaux l. c. Hab. in Carolinae maritimis. Bacca 3-sperma.

18. *davuricus*, inermis, flor. quadrifidis dioicis, fol. oblongo-ovatis serratis venosis. Pall. ross. 2. p. 24. t. 61. Amman. ruth. t. 33. Hab. ad Argunum fluvium Davuriae. Simillimus R. cathartico, sed defectu spinarum distinctissimus. Willd. *h*

19. *alpinus*, inermis, florib. dioicis, fol. ovali-lanceolatis glanduloso-crenulatis. Jacq. Coll. 3. p. 15. Duham. ed. nova. p. 37. t. 13. Hall. helv. n.º. 823. t. 40. Habit. in Alpib. Dioicis calyce 4-fido, stig. 4 - fido, ut R. cathartici.

20. *pumilus*, inermis repens, flor. hermaphroditis, fol. petiolatis ovatis crenatis. Jacq. Collect. 2. p. 141. t. 11. Rh. rupestris. Scop. carn. n.º. 262. t. 5. Hab. in monte Baldo, Carniolia. Differt a Frangula caulibus saxis adhaerentibus.

21. *Frangula*, inermis, flor. monogynis hermaphroditis, fol. integerrimis. L. Flor. dan. t. 278. Duham. arb. t. 100. Hab. in Europae borealis nemorosis humidiusculis. *h*

22. *latifolius*, inermis, flor. monogynis hermaphroditis, calycib. villosis, fol. ellipticis integerrimis. L'Herit. sert. p. 5. t. 8. Habit. in Azoribus in montib. St. Miguel R. Frangulae simillimus, sed calyces in R. Frangula glaber. L'Herit. *h*

23. *glandulosus*, inermis, flor. hermaphroditis racemosis, fol. ovatis obtuse serratis glabris basi glandulosis. Ait. Kew. 1. p. 265. Jard. de Malmaison. t. 34. Hab. in Madera et ins. Canariensibus. *h*

24. *racemosus*, inermis. fol. ovato - rotundis laevib. subtus tomentosis ciliaribus,

petiolis foliisque ferrugineis. Duhamel. ed. nov. p. 48. Hab. ... Herb. Juss.

25. *cassinoides*, inermis, fol. ovatis coriaceis glaucis obsolete dentatis, ramulis angulatis, flor. axillaribus subsessilib. Lam. enc. 4. p. 474. Hab. ad St. Dominicam. Fol. albido - glauca, margine subrevoluta. Habitus Cassines, cujus forte species. Loc. cit. *h*

26. *Prinoides*, inermis, flor. polygamis, stylo subtriplici, fol. ovatis serratis. L'Her. sert. p. 6. t. 9. Celtis. Burm. afr. 242. t. 88. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

27. *mystacinus*, inermis, flor. hermaphroditis, stigmatibus triplici, foliis cordatis, ramis cirrhisferis. Ait. 1. p. 266. Habit. in Abyssinia. Caulis fruticosus, cirrhosis scandens. Folia brevissime petiolata cordata. Ait. *h*

28. *alnifolius*, inermis, flor. hermaphroditis, fol. ovalibus acuminatis serratis subtus reticulatis. L'Her. sert. p. 5. cfr. Rh. franguloides. Michaux, 1. p. 152. Habit. in Amer. septentr. ? Affin. R. alpino.

29. *sphaerospermus*, inermis, floribus hermaphroditis racemosis, baccis subrotundis trilocularib. pellucidis, fol. oblongis serratis glabris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 499. Hab. in fruticetis montosis Jamaicae. temperioris. *h*

30. *hybridus*, inermis, flor. androgynis, fol. alternis oblongis acuminatis vix perennantibus. L'Herit. sert. R. Burgundicus. H. P. Hab. in hortis. *+*

31. *Alaternus*, inermis, floribus dioicis, stig. triplici, fol. serratis sempervirentib. *α. latifolius*, fol. ovato-oblongis aequaliter serratis. (R. Hispanicus.). *β. balearicus*, foliis rotundis spinoso-dentatis ramis subspinosis. Duham. ed. nov. p. 42. *γ. angustifolius*, fol. lanceolatis profunde serratis glabris. Ait. Kew. 1. p. 267. Habit. in Europa austr. *h*

32. *umbellatus*, caul. inermi, fol. oppositis ovato-acutis lineatis, flor. umbellatis. Cavan. ic. 6. p. 2. t. 504. Habit. in N. Hisp. Fol. obscure cordata. Cal. crassus, 5-partitus: lacin. interne bifoveolatis.

33. *trinervis*, inermis, foliis alternis ovatis serrulatis trinerviis, subtus tomentosis, flor. hermaphroditis axillarib. Cav. l. c. t. 505. f. 1. Habit. in ins. Luzon, prope Manillam. Germ. cinctum forcolis 10. Stigma incrassata, 2. C.

34. *sanguineus*, fol. ovatis oblongisque lineatis integerrimis, caule erecto, floribus

axillaribus fasciculatis hermaphroditis. Orteg. Dec. pl. p. 87. Hab. in Gallicia prope St. Jacob. urbem ad ripas etc. - Vernacule Sanguino a caule et ramorum colore sanguineo sic nuncupatus. Cort. cum lacte decoctus optimum remedium contra scabiem.

35. *cubensis*, fol. ovatis dentatis lineatis, racem. axillaribus, lac. striatis. Rh. *lineatifolius*. Orteg. l. c. p. 89. Habit. in insul. Cuba. Fruct. 2-pedalis.

36. *lineatus*, inermis, flor. hermaphroditis, fol. ovatis lineatis repandis subtus reticulatis. Lin. Obs. it. t. 7. Zizyphus lineatus. Willd. Spec. p. 1102. Pluck. phyt. t. 129. f. 4? Encycl. bot. 4. p. 473. Hab. in India orient., China. Fol. subtus subvelutina: venis nigrescentibus. Stigm. simplex. Fruct. bacca!

\*\*\* *Aculeati*.

37. *capensis*, aculeis solitariis, fol. ovatis excisis integris glabris, umbellis axillaribus. Thunb. prod. 44. Hab. ad Cap. bon. spei. h +

† *OENOPHIA*. *Cal.* urceolatus, 5 - fidus. *Petala* 5. *Discus* carnosus o. *Drupe* succosa, 2-locularis, altero loco saepius abortiente, 1-sperma.

38. *volubilis*, inermis, caule volubili, fol. ovatis repando-subcrenatis (integerrim. Lin.) striatis. Michaux. p. 153-154. Linn. suppl. p. 132. Jacq. ic. rar. 2. t. 336. Zizyphus volubilis. Willd. Sp. p. 1102. Hab. in Carolina et Ludoviscana.

*Obs.* Frutex flore Rhamni fructu Zizyphi. - Umbellae axillares. Willd. Racemi subterminales. Michaux. Flor. hermaphroditi. Aiton, flor. dioici. Mich. Fol. integerrima. Linn. Willd. repando - subcrenata. Mich. undulato-serrata. Walter!

†† *ZIZYPHUS*. *Cal.* patens, 5-fidus. *Petala* 5. *Discus* carnosus orbicularis, istillum ambiens. Styl. 2. *Drupe* nucē 1-2-sperma. Fol. alternis. Flor. axillares.

39. *Lotus*, aculeis geminis, altero-recurvo, fol. ovato-oblongis obsolete crenatis. Willd. Z. *Lotus*, aculeis geminatis, foliis ovalibus glabris obsolete dentatis, fructu rotundiore. Lam. encycl. 3. p. 304. Desfontaines in Acad. Scient. 1788, p. 443. t. 21. et Flor. t. p. 200. Rhamnus *Lotus*. Lin. Shaw. afr. 631. l. 631. β? Mungo Parker iter. p. 85. vers. germ. Habitat in regno Functano et in interiore Africae. Fruct. edules. h

40. *Napaea*, aculeis subgeminis recurvis, pedunc. corymbosis, flor. semidigynis, fol. ovatis obliquis subcrenatis utrinque lacrib.

Willd. p. 1104. Rhamnus *Napaea*. Linn. Pluck. alm. 199. t. 216. f. 6. Rumph. 2. t. 37. Hab. in Zeylona. h

41. *Jajuba*, aculeis solitariis recurvis, fol. subrotundo-ovatis obtusis subtus tomentosis, pedunc. aggregatis, flor. semidigynis. Willd. Sonnerat. it. t. 34. Rumph. 2. t. 36. Hab. in India. Fruct. ovato-subrotundus. h

42. *Xylopyrus*, caul. aculeato, aculeis recurvis, fol. ovatis subtus tomentosis, flor. corymbosis. Retz. obs. 2. p. 11. Zizyphus *rugosa*, acul. subgeminatis recurvis, fol. lato-ovalib. rugosis serrulatis, corymbis tomentosis pedunculatis dichotom. Lam. enc. 3. p. 319? Habit. in Ind. orient. ad radices montium. h

43. *sinensis*, ramulis annuinis aculeatis, pubescentibus: vetustiorib. inermibus, fol. ovato-oblongis acute serratis. Lam. enc. 3. p. 318. Hab. in China? Petal. sub calyce reflexa.

44. *Ignaneus*, acul. subgeminatis, fol. ovatis acuminatis serratis nudis, racemulis axillarib. Lam. l. c. Rhamnus. Lin. Jacq. amer. p. 74. Ed. pict. p. 40. Hab. in insulis Antillicis et ad Curaco. Lacerta ignana sub hoc frutice communiter degit.

45. *Oenophia*, aculeis solitariis recurvis, fol. obliquis dimidiato-cordatis acuminatis subtus tomentosis, pedunc. aggregat. Willd. p. 1105. Burm. zeyl. 131. t. 61. Hab. in Zeylona. h

46. *Zizyphus* (vulgaris), acul. geminis, altero recurvo, fol. ovatis reusis dentatis glabris. Willd. Rh. *Zizyphus*. Linn. Pall. ross. 2. p. 24. t. 59. Hab. in Europa australi. h

47. *mauritiana*, acul. geminatis: altero recurvo, fol. oblong. obtusis subtus tomentosis, fructu oblongo. Lam. l. c. p. 319. Hab. in ins. Mauritiana. Antecedenti affinis, sed fol. minus latiora et fruct. oblongus acuminatus. h

48. *rotundifolius*, acul. geminatis: altero recurvo, fol. subrotundo-ovalibus subtus tomentosis. Zizyphus. Lam. l. c. n.º. 9. Pluck. alm. 199. t. 197. f. 2. Burm. Zeyl. p. 132. In India, Zeylona. h

49. *angulatus*, acul. geminatis rectis, fol. subrotundo-ovalib. subidentatis utrinque glabris ramis aculeatis. Lam. l. c. p. 320. sub Zizypho. Hab. ... Romi flexuosi, 4-goni: angulis prominentibus.

50. *Spina Christi*, acul. geminis rectis, fol. ovatis acutis dentatis glabris. Willd. + Alp.

Alp. aegypt. 16. t. 19. Pluck. 199. t. 197. f. 3.  
Hab. in Aethiopia, Palaestina. h

\* \* *Inermes*.

51. *peruvianus*, inermis, fol. ovato-rotundat. rariter dentatis subangulosis, petal. stellatis calyce majorib. Lam. enc. 3. p. 320. Hort. Par. Hab. in Peruv. Sempervirens.

† † † *Paliurus*. Flor. Zizyphi. Styli 3. *Drupa* exsucca, 3-locularis ala membranacea orbiculati cincta.

52. *Paliurus* (*australis*), acul. geminatis: inferiore reflexo, flor. trigynis, drupa coriacea margine alata. Willd. Spec. 2. p. 1103. sub Zizypho. Pall. Fl. ross. 2. p. 27. t. 64. *Paliurus aculeatus*. Lem. ill. t. 210. P. australis. Gaertn. t. 43. f. 5. Hab. in Europa austr. et ad Caucasum.

*Obs.* Tam ob fructus naturam, quam ob floris structuram Zizyphi et Paliuri ut distincta genera separari omnino merentur; verum cum magna inter 3. hoc genera (characterem artificialem solummodo distinguenda) extet affinitas, potius ea hic conjuncta maneant, quam, in mentem system. veget., in diversis ordinibus collocanda, quod ob stylum 1. in *Rhamno* 2. in *Zizypho* et 3. in *Paliuro*, flor. dioicos in *Oenoplia* necessarium omnino esset.

533. *CONDALIA*. Cal. urceolatus, 5-fidus, persistens. Cor. o. *Discus* glandulosus. *Stylus* 1. *Drupa* ovata, nuce monosperma.

1. *microphylla*, spiv's terminalibus et axillaribus, fol. ovatis subsessilib. Cav. ic. 6. p. 16. t. 525. *Zizyphus myrtoides*. Ortega Decas plant. p. 119. Habit. in R. Chilensi. Flor. saepe 4-partiū, 4-andri. O. h

*Obs.* *Rhamno* aut potius *Zizypho* omnino affinis, et forte ejus solum species, sed stylo unico et petalis nullis differt. An hoc sufficit?

534. *OPELIA*. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala. *Nectaria* 5, staminibus alternantia. *Bacca* 1-sperma.

1. *amentacea*. Roxb. Corom. n°. 158. t. 158. Hab. in montibus Carassiensibus in Coromandelia. Fol. ovata, alterna. Racem. axillares.

535. *ELÆODENDRUM*. Cal. 5-10-phyllus: foliolis 5, squamis subrotundis concavis. Cor. 5-partita: laciniis ovato-lanceolatis concavis. *Nect.* linearis-subulata

petaliformia. *Drupa* exsucca, nuce 2-3-loculari. *Putamen* crassum, durum, 2-3-sulcatum.

1. *Argam*, spinosum, fol. lanceolatis obtusis. Schousb. Maroc. Ed. germ. p. 89. Willd. p. 1148. *Rhamnus sicalus*. Lin. Commel. Hort. 1. t. 83. *Sideroxylon spinosum*. Lin. Cresc. copiose in sylvis in Barbariae provinc. austr. inter flumina Tausif et Suz. Ex nuculis oleum praeparatur oleo olivarum simile.

*Obs.* Cl. Schousboe loc. cit. ample et docte de hac arbore disseruit, et ad ejus observationes characterem genericum emendavi.

2. *orientale*, inermis, fol. lanceolatis acutis: venis rubris. Jacq. ic. rar. 1. t. 32. Willd. l. c. Habit. .. An congener *Rubentia*. Juss. gen. pl.?

3. *glaucum*, inermis, ellipticis subserratis acutis, cymis axillaribus dichotomis folia aequantib. Vahl. symb. 2. p. 42. sub *Celastro*. *Schrebera albens*. Retz. obs. 6. p. 25. t. 3. Willd. Sp. 2. p. 1092. Hab. in Zeylona et Coromandelia. Vid. Roxb. Corom. v. 2. p. 2.

536. *HENKEA*. Cal. 2-phyllus: altera biloba. Cor. urceolata. *Stigma* 3-gonum. *Drupa* 1-sperma. *Nux* trilocularis.

1. *flexuosa*, ramis flexuosis, fol. ovato-lanceolatis, racemis axillaribus. Flor. Per. 3. p. 8. 331. Hab. in Andium montibus.

† † *Stamina petalis alterna. Fructus capsularis.*

537. *SENACIA*. Cal. minimus, 5-dentatus. Cor. 5-petala. *Caps.* sphaerica, pedunculata, 2-valvis, 4-sperma. *Sem.* angulata, nuda.

1. *undulata*. *Celastrus undulatus*. Lam. Willd. 2. p. 1124. Hab. in Borbonia. A. d. Petit-Thouars.

538. *CELASTRUS*. Cor. 5-petala, patens. *Caps.* 3-angularis, 3-locularis. *Sem.* calyptata.

\* *Inermes, foliis integerrimis.*

1. *lucidus*, inermis, fol. ovalibus acutis nitidis marginatis, pedunc. axillaribus. Willd. Sp. 2. p. 1123. L'Herit. stirp. 1. p. 49. t. 25. Pluck. alm. 139. t. 280. f. 4. An Cassine concava. Lam. enc. 1. p. 652? Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *microphyllus*, inermis, fol. ovatis obtusis integerrimis, cymis terminalib. dichotomis. Lin. suppl. 154. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *bullatus*, inermis, fol. ovatis acutis integerrimis, panic. terminali. Willd. l. c. Mill. dict. n°. 1. Pluck. alm. 139. t. 28. f. 5. Hab. in Virginia. h

4. *laurinus*, inermis, fol. ovato-oblong. obtusis emarginatis integerrimis, cymis axillaribus. Willd. C. fol. oblongis integris, panic. axillarib. Thunb. prod. 42. Habit. ad Cap. b. spei. h

5. *rostratus*, inermis, fol. oblongo-ovatis inaequalib. integerrimis, corymbis dichotomis axillaribus, fructib. spinosis. W. Inermis, fol. oblongo-ovatis integris, panic. axillaribus, fructib. spinosis. Thunb. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *octogonus*, inermis, fol. ellipticis angulosis subnerviis, perennantibus, capsulis bivalvib. monospermis. L'Herit. sert. angl. 7. Hab. in Peru. Fol. glauca. Semen arilatum bisulcum. L'H. h

7. *filiformis*, inermis, fol. lanceolatis integerrimis, ramis filiformibus, pedunc. axillaribus unifloris. Lin. suppl. 153. Th. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

8. *macrocarpus*, inermis, fol. oblongo-lanceolatis integerrimis, acumine emarginato, flor. aggregatis. Flor. Peruv. 3. p. 8. t. 210. f. b. Haenke. Profr. Flor. Per. p. 65. Hab. in Munna memoribus: Fruct. polygamus, dioicus. Caps. magna, obovata, saepius 1-sperma. Sem. arillosa, oleaginosa.

**\*\* Inermis, fol. dentatis.**

9. *Maytenus* (uncinatus), inermis ramis dependentibus, fol. lanceolatis serratis, acumine uncinato, pedunc. congestis unifl. C. Maytenus. Willd. p. 1127. Molin. Chil. Juss. gen. p. 449. Mayten. Feuill. 3. p. 39. t. 27. Habit. in R. Chilensis campis et arvis. Arb. sempervirens. Caps. luteo-crocea, 2-3-locularis. Sem. arillo rubro involuta.

10. *scandens*, inermis, fol. oblongis acuminatis serratis, racemis terminalibus, caul. volubili. Willd. p. 1125. Duham. arb. 1. p. 223. t. 95. Hab. in Canada. h

11. *paniculatus*, inermis, fol. ovatis acuminatis obtusis serratis, panic. elongata terminali. Willd. l. c. Hab. in Ind. orient. Rami fusci punctati. Caps. trilobularis trilobis. Willd. h

12. *procumbens*, inermis procumbens, fol. ovatis serratis, flor. axillarib. subsolita-

riis. Lin. suppl. 153. Habit. ad Cap. bonae spei. h

13. *acuminatus*, inermis, fol. ovatis acuminatis serratis, pedunc. axillarib. uniflor., caul. erecto laxo. Lin. suppl. 154. Habit. ad Cap. b. spei. h

14. *cassinoides*, inermis, fol. ovatis acutis laxe dentatis perennantibus, flor. axillaribus. L'Her. sert. angl. p. 6. t. 10. Hab. in Canariis. h

15. *striatus*, inermis, ramulis erectis striatis, fol. ovatis acuminatis serratis, pedunc. sparsis uniflor. Thunb. jap. 98. Hab. in Japonia. Flor. sparsi pedunculati. Th. h

16. *cernuus*, inermis, fol. ovatis obtusis serratis, pedunc. axillarib. uniflor. cernuus. Thunb. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

17. *undatus*, inermis, fol. obovato-subcuneiformib. undato-dentatis, flor. axillaribus sessilibus. Thunb. Cum priore. h

18. *edulis*, inermis, fol. oppositis alternisque ellipticis serratis, cymis axillarib. dichotomis. Vahl. symb. 1. p. 21. Catia edulis. Forsk. descript. 63. Habit. in Arabia felici. h

19. *crenatus*, inermis, fol. ovatis crenulatis, cymis axillarib. Forst. prod. n. 113. Habit. in insulis Marchionis maris pacifici. h

20. *dilatatus*, inermis, fol. obovatis acuminatis apice serratis, florib. terminalibus. Willd. p. 1127. Thunb. in Act. Linn. Lond. 2. p. 332. Habit. in Japonia. h

21. *myrtifolius*, inermis, fol. ovatis serrulatis, flor. racemosis, caule erecto. L. Hab. in Virginia. h

22. *emarginatus*, inermis, fol. ovatis ovalibusque acuminatis apice emarginato, laeviter serrato-crenatis, pedunc. congestis 1-floris. Flor. Per. 3. p. 6. t. 229. Hab. in Andium memorib. Frut. 20 = ulnaris polygamo-dioicus. Caps. crocea, 1-3-locular.

23. *verticillatus*, inermis, ramis aggregato-verticillatis, fol. oblongo-lanceolatis serratis, flor. racemosis, pedunc. 1-5-flor. Flor. Per. 3. p. 6. t. 229. Hab. in memorib. Cuchero etc. Sempervirens, polygamo-dioicus. Caps. turbinata, 3-gona, 2-3-4-locular. Sem. arillo pulposo flavo subobroluta. Auctor. quaerunt, an C. *octogonus*. L'Her. eadem species sit?

24. *confertus*, inermis, ramis aggregato-verticillatis, fol. confertis ovalibus subrotundisque serrulatis, flor. congestis. Flor. Per. l. c. Hab. in Peruviae memorib.

altis. Caps. 2-3-locularis, 2-3-valvis, valvulis patentis - reflexis. Sem. 2-3, arillo croceo, involuta. *h*

25. *tetragonus*, inermis, fol. ovatis serratis, ramis tetragonis. Thunb. prodr. 42. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

26. *articulatus*, inermis, fol. rotundatis acuminatis, pedunc. axillaribus subtrifidis. Thunb. jap. 57. Hab. in Japonia. *h*

27. *alatus*, inermis, fol. oppositis brevissime petiolatis acuminatis serrulatis, ramis alatis. Willd. Thunb. jap. 98. Hab. in Japonia. *h*

\*\*\* *Spinosi, foliis integerrimis.*

28. *linearis*, spinosus, spinis foliosis, fol. linearibus integerrimis. Lin. suppl. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

29. *integrifolius*, spinosus, spinis foliosis, fol. ovatis obtusis integerrimis, cymis lateralibus. Lin. suppl. 153. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

30. *emarginatus*, spinosus, spinis foliosis, fol. obovatis emarginatis integerrimis, umbellis pedunculatis. Willd. Spec. p. 128. Habit. in India orient. Spini crassi juniores foliosi et floriferi. Pedunc. capillares. Caps. trilocularis trivalvis. Willd. *h*

\*\*\*\* *Spinosi, foliis dentatis.*

31. *phyllacanthus*, spinosus, spinis foliosis, fol. lanceolatis serratis perennantibus, flor. lateralibus. L'Her. sert. angl. 6. *C. senegalensis*. Lam. enc. 1. p. 654. Habit. in Senegal. *h*

32. *buxifolius*, spinis foliosis, ramis angulatis, fol. obtusis. Lin. R. ramis angulatis, fol. obovato-cuneiformibus obtusis, cymis lateralibus paucifloris. Lam. l. c. 661. Pluck. alm. t. 202. f. 3. Hab. in Aethiopia. Fol. obtusis. *h*

33. *multiflorus*, spinis inferioribus oblongissimis: ramis parvis subfoliosis, fol. obovato-rhomboides, cymis lateralibus multifloris. Lam. l. c. p. 671. *C. hispanicus*. H. P. Habit. in Africa?

34. *pyracanthus*, spinis nudis, ramis teretibus, fol. acutis. Lin. Pluck. phyt. t. 126. f. 2. 3. Comm. hort. 1. p. 163. t. 84. Hab. in Aethiopia. *h*

35. *rotundifolius*, spinosus, fol. petiolatis subrotundis dentatis. Thunb. Habit. ad Cap. b. spei. *h*

36. *parviflorus*, spinis nudis, fol. ovatis crenatis, pedunculisiformibus, fol. longio-

rib. Vahl. symb. 1. p. 21. Catha spinosa. Forsk. descr. 64. Habit. in Arab. felici. *h*

539. *EVONYMUS*. Cor. 5-petala. Caps. 5-gona, 3-locularis, 3-valvis, colorata. Sem. calyprata.

1. *Tobira*, flor. quinquefidis, fol. obovatis retusis integerrimis. Willd. Sp. 2. p. 1130. Kaempf. amoen. fasc. 5. t. 797. Hab. in Japonia. *h*

2. *japonicus*, florib. quadrifidis, fol. subrotundo-ovatis dentatis. Willd. l. c. Lin. suppl. 154. Banks. Ic. select. Kaempf. t. 8. Hab. in Japonia. Fol. bipollicaria fere. *h*

3. *europaeus (vulgaris)*, flor. plerisque tetrandris 4-fidis, petal. oblongis pedunc. compressis multifloris, stigmatibus subulatis, fol. glabris. Ait. Kew. 1. p. 273. Hab. in Europ. sepib. *h*

4. *verrucosus*, flor. tetrandris, cortice verrucoso, pedunc. filiformibus, teretibus, subtrifloris. Ait. Flor. austr. 3. p. 48. t. 289. Hab. in Carniolae montosis asperis. *h*

5. *latifolius*, flor. plerisque 5-fidis, petal. ovalibus, pentandris, cortice laevi, pedunc. filiformibus, teretibus, multifloris. Ait. 1. p. 273. Jacq. Flor. austr. 3. p. 48. t. 289. Hab. in Silesia, Bohemia, Austria, Pannonia, Helvetia. *h*

6. *atropurpureus*, flor. tetrandris, pedunc. compressis multifloris, stigmatibus tetragonis truncatis. Ait. 1. p. 274. Jacq. hort. 2. p. 55. t. 126. E. flor. quadrifidis et quinquefidis, fol. lanceolatis nitidulis petiolatis, ramis laevibus. Lam. enc. 2. p. 567. Hab. in Amer. boreali. *h*

7. *americanus*, pedunc. subtrifloris, fol. elliptico-lanceolatis serratis, ramis laevibus. Hellen. diss. in Usteri delect. opusc. bot. 1. p. 95. E. virginianus, caps. verrucarum instar exasperata. Pluck. alm. 139. t. 115. f. 5. Hab. in Virginia. *h*

540. *PILOCARPUS*. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. Stamina subgermine inserta. Caps. quinque, basi coalitae, 1-spermae, clasticae. Sem. arillata.

1. *racemosus*. Vahl. eclog. 1. p. 29. t. 10. Plum. Sp. p. 18. t. 127. Hab. in Montserrat, in altib. montib. Frut. ramis pendulis. Fol. elliptica. Priori generi affinis.

541. *POLYCARDIA*. Petala 5, rotundata. Cal. 5-lobus. Caps.

Q 2

coriaceæ, 3-5-locularis: valvulis totidem semi-septiferis. *Semina* ad hilum semiarillata. (Flor. 3-4, ex apice foliorum nonnullorum (pedunc. foliiformium?) provenientes!

1. *phyllanthoides*. Lam. ill. p. 373. t. 132. Enc. bot. 5. p. 481. *P. madagascariensis*. Willd. Sp. 1121. Hab. in Madagascar. Frutex. Fol. oblongo-ovata, in floriferis apice emarginata.

+++ *Stamina petalis opposita.*  
*Fructus triloccus.*

542. HOVENIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala convoluta. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis: loculis 1-spermis.

1. *dulcis*. Thunb. Flor. jap. p. 101. Lam. ill. t. 131. Kaempf. amoen. t. 809. Hab. in Japon. Arb. fol. ovatis serratis. Pedunculi carnosii, edules sapore dulci.

543. CEANOTHUS. *Petala* 5, succata formiata. *Bacca* (Caps.) sicca, 3-locularis, 3-sperma.

1. *americanus*, fol. ovalib. serratis subtus tomentosis, ramis axillari composito longe pedunculato. Lin. Michaux, Flor. 1. p. 154. Willd. Spec. 2. p. 1114. Mill. dict. t. 86. Pluck. alm. t. 28. f. b. Hab. in Amer. septent. h

2. *microphyllus*, subdecumbens, fol. minutis subfasciculatis integrisculis, corymbulis terminalib. Michaux, l. c. Hab. in sabulosis sylv. Georg. et Florid. Rad. uti præcedentis, tuberosa, rubra. M.

3. *macrocarpus*, fol. cordato-subrotundis obtusis triplinerviis, corymb. axillarib. Willd. l. c. Cav. ic. 3. p. 38. t. 276. Hab. in N. Hispan. h

4. *asiaticus*, fol. ovatis acuminatis basi rinerviis, flor. axillaribus nemorosis. Lin. Cav. ic. 5. p. 24. t. 440. f. 1. Lam. ill. p. 89. t. 129? Rhamnus asiaticus. Lam. enc. 4. p. 474. Hab. in Zeylona et prope Guinapatam in ins. Luzonensi. Petala cucullata, lutescentia.

5. *circumscissa*, aculeis solitar. recurvis, fol. oppositis bifariis obcordatis. Gaertn. de fr. 2. p. 110. t. 106. Rhamnus circumscissus. Lin. suppl. p. 152. Hab. in Ind. orient. dumetis et in ins. Mauritii.

Obs. Ambiguè inter Ceanothum et Rham-

num, priori tamen magis vicina videtur ob pericarpium exsuccum, pressione in valvulas regulares dehiscens. G.

6. *granulosus*, fol. ovato-oblongis acuminatis glabris nitidis medio subserratis, pedunc. brevib. dichotomis multifloris. Fl. Per. 3. p. 5. t. 228. f. a. Hab. in Peruv. nemorib. Nect. discus fungos. germen ambiens. Bac. subrotundo-turbinata. h

7. *pubescens*, fol. ovatis acuminatis pubescentib. acute serratis, pedunc. brevibus dichotomis multifloris. Flor. Peruv. l. c. p. 6. f. b. In Andium nemoribus. Bac. prioris, nigra.

8. *colubrinus*, fol. ovatis venosis petiolis ferrugineo-tomentosis caps. sphaericis. Rhamnus colubrinus. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1096. Com. hort. 1. p. 175. t. 90. Hab. in Amer. Callus nectariferus transversus inter basin staminum. Lin.

9. *reclinatus*, fol. ovatis integris multinerviis, ramis dependentib. L'Herit. sert. angl. p. 6. Rhamnus ellipticus. Ait. Swartz. Flor. 1. p. 497. Brown. jam. p. 172. t. 29. f. 2. In Jam. ic. montosis fruticetis, et in ins. St. Bartholomei. Antecedenti affinis, cum quo fructu 3-cocco a Rhamnis differt. h

10. *africanus*, fol. lanceolatis enerviis, panic. terminali. Lin. Pluck. phyt. p. 126. f. 1. Seb. thes. t. 22. f. b. Hab. in Aethiop. Habitus parum recedit. Styl. ex 3bus coadunati. h

11. *capsularis*, fol. ovato-cordatis acuminatis serratis, caps. 3-valvib. dehiscen- tibus. Forst. prodr. n°. 112. Cresc. in ins. Tahiti. h

544. COLLETIA. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, basi intus villosus v. plicatus. *Petala* 5, squamiformia, aut o. *Bacca* sicca, 3-cocca, 3-partibilis, 3-sperma.

\* *Flor. petalis instructis.*

1. *obcordata*, fol. obcordatis intergerimis 3-nerviis, ramis flexilib. virgatis, petal. squamiformib. Vent. Hort. Cels. p. 92. t. 92. Hab. in Peruv. Spartium refert. Vere fl. h

2. *Ephedra*, aphylla, ramis erectis implexis apice spinosis, flor. in ramulorum nodis conglomeratis. Vent. Choix de Pl. p. 16. t. 16. Cum priore, cui affinis. Ephedram mentitur.

\*\* *Flor. apetalis.*

3. *serratifolia*, fol. ellipticis argute ser-



ratis, flor. apetalis. Vent. l. c. p. 15. t. 15.  
Pariter in Peruv. Lycium sistit.  $\eta$

4. *horrida*, fol. integerrimis, flor. apetalis. Willd. Sp. 2. p. 1113. C. spinosa. Lam. ill. t. 129. Hab. in Brasilia. Pedunc. 1-flori, autantes.  $\eta$

545. PHYLICA. *Perianthium* 5-partitum, turbinatum, (villosum). *Petala* nulla. *Squamæ* 5, stamina munientes. *Caps.* tricoeca, infera.

1. *ericoides*, fol. lineari-lanceolatis glabris, ramis subumbellatis, capitulis terminalib. tomentosis. Thunb. prodr. 44. Willd. Sp. 2. p. 1108. Hab. in Aethiopia, et cum plerisque sequentibus, ad Caps. b. spei.

2. *parviflora*, fol. subulatis acutis scabris subpilosis, ramis paniculato-multiflor. Lin. Thunb. prodr. p. 44.

3. *lanceolata*, fol. sparsis lanceolatis subtus tomentosis, capitulis terminalibus hirsutis. Thunb. prodr. 44. Hab. ad Cap. b. spei.  $\eta$

4. *bicolor*, fol. linearibus pubescentibus, calyc. communib. corolla brevioribus. Lin. Ad Cap. b. spei, in campis arenosis. Calyx communis, reticulato-venosus, squamis rubro-carinatis.  $\eta$

5. *pubescens*, fol. linearib. acutis pilosis subtus tomentosis, flor. spicatis, bracteis villosis filiformib. Ait. Kew. 1. p. 268. Ph. capitata. Willd. p. 1109? Burm. afr. 121. t. 44. f. 3. Lam. ill. 127. f. 2? Hab. ad Cap. b. spei.  $\eta$

6. *eriphoros*, fol. linearib. pilosiusculis subtus tomentosis, margine revolutis capitulis terminalibus, flor. tomentosis. Aiton. Kew. 1. p. 268. P. fol. lanceolat. acutis subtus tomentosis, capitulis terminalib. tomentosis. Thunb. prodr. 44. Pluck. amalib. 72. t. 445. f. 1. Ph. nitida. Lam.

7. *rosmarinifolia*, fol. linearibus planiusculis erectis, subtus incanis, capitulis ovatis tomentosis. Lam. l. c. Hab. ... Capitula majuscula, compacta, lanuginosa.  $\dagger$

8. *trichotoma*, fol. trigonis obtusis glabris, capitulis terminalib. hirsutis, caul. trichotomo. Thunb. prodr. app. p. 187.

9. *axillaris*, fol. lineari-lanceolatis subtus incanis, flor. distinctis, racemis foliosis terminalib. Lam. ill. 2. p. 77. Encycl. bot. 5. p. 289. Hab. ... Sequenti affinis, sed differt flor. axillaribus et solitariis. Rami pubescentes, albicantes.

10. *plumosa*, fol. lineari-lanceolatis subpubescentibus, bracteis lanatis spica oblonga. Thunb. prodr. 45. Lam. ill. t. 127. f. 4. Pluck. mant. 45. t. 342. f. 3. Hab. in Aethiopia.  $\eta$

11. *villosa*, fol. linearibus superioribus villosis, flor. racemosis. Th. Hab. ad Cap. bon. spei.  $\eta$

12. *imberbis*, fol. linearib. obtusis scabris, flor. terminalib. pubescentib. Linn. Erica africana flor. albido rosmarini. Seb. mus. 2. t. 49. f. 5. Ph. Brunioides. Lam. ill. 2. p. 78. Hab. ad Cap. b. spei.  $\eta$

13. *stipularis*, fol. linearib. stipulatis, flor. quinquenodib. Lin. Capitulis terminalib. Thunb. prodr. 44. Burm. afr. 117. t. 43. f. 2. Cor. lutea.

14. *cordata*, fol. cordato-ovatis patentibus, caul. profifero. Com. rar. 62. t. 12.

15. *dioica*, fol. cordatis, flor. dioicis. L. Mant. 342. Cal. squamæ hirtæ pilis glaucogriseis. Var. fol. revolutio-linearib.

16. *buxifolia*, fol. ovatis sparsis ternisq. subtus tomentosis. Linn. Burm. afr. 119. t. 44. f. 1. Habit. in Aethiop.  $\eta$

17. *spicata*, fol. oblongis cordatis acuminatis subtus tomentosis, spicis cylindraceis, flor. longitudine bractearum. Aiton. Kew. 1. p. 269. P. fol. cordato-sagittatis lanceolatis. Lin. suppl. 153. Lam. ill. t. 127. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Differt ab omnib. capitulo elongato in spicam villosam.  $\eta$

18. *myrtifolia*, fol. ovatis acuminatis subtus candidissimis, flor. subsolitar. Poir. in encyc. bot. 5. p. 293. Hab. ... Fol. minuta. Bract. O.

19. *callosa*, fol. oblongis cordatis acuminatis pilosis subtus tomentosis, flor. subcapitatis. Ait. Kew. 1. p. 269. Linn. suppl. 153. Ph. reflexa. Lam. ill. 2. p. 79? Distincta. a P. cordata.

20. *paniculata*, fol. ovatis mucronatis superne glabris nitidis subtus tomentosis, racemis foliosis paniculatis. Willd. p. 1112. Accedit ad P. callosam.

21. *imbricata*, fol. cordato-ovatis glabris, flor. racemosis. Thunb.

22. *racemosa*, fol. ovatis glabris, flor. simplicib. paniculato-racemosis. L. Thunb. prodr. 45. Beckea cordata. Burm. Hab. juxta Cap. b. spei fossas.  $\eta$

23. *pinifolia*, fol. acerosis utrinque planis glaberrimis, flor. paniculato-racemosis

glabris. Lin. suppl. p. 153. Beckea *africana*, fol. linearib. canaliculatis. Burm. pr. p. 12. Hab. in Cap. b. spei summis monib. Frut. 5-6-pedalis, habitu Tamarisci. Invol. commune o. Vid. Enc. bot. 5. p. 294.

*Obs.* Antecedenti speciei affinis, quacum ratione floris (ambarum fructus adhuc examinandus est) a ceteris Phyllicis differt, an ob id hinc cum Bergio separari possunt duae hae species?

546. BRUNIA. Flores aggregati. Cal. superus, 5-partitus. Filamenta unguibus petalorum inserta. Stigma 2-sidum. Caps. minimae, 2-loculares.

1. *nodiflora*, fol. trigon. incurv. scutis, capitulis in ramis lateralibus terminalibus. Thunb. prod. 41. Willd. a. p. 1141. Breyn. cent. 22. t. 10. Pluck. mant. 69. t. 346. f. 4. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei.

2. *paleacea*, fol. trigonis rectis arcte adpressis, capitulis corymbosis paleaceis, paleis flor. longiorib. Willd. p. 1142. Th. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *lanuginosa*, fol. trigonis patul. apice fuscis, capitulis globosis fastigiatis. Thunb. prod. 41. Pluck. alm. 361. t. 318. f. 4. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei. Similis B. abrotanoidi. h

4. *verticillata*, fol. trigonis obtusis glabris, ramulis verticillatis fastigiatis, capitulis terminalibus. Thunb. Lin. suppl. 156. Ad Cap. b. spei.

5. *deusta*, fol. trigonis glabris apice nigris, capitulis terminalib. Thunb. prodr. app. p. 187. Cum sequentib. ad Cap. b. spei.

6. *microphylla*, fol. ovato-trigonis carnosis glabris, capitul. terminalibus, ramis divaricatis. Thunb. l. c.

7. *laxa*, fol. trigonis, floribusque spicatis glabris. Thunb.

8. *alopecuroides*, fol. trigonis acutis glabris, capitul. lateralib. globosis glabris. Thunb. l. c.

9. *laevis*, fol. linearibus convexis incurvis, capitul. terminalib. Thunb.

10. *abrotanoides*, fol. lanceolatis glabris squarrosis, capitul. subfastigiatis. Th. Burm. afr. 266. t. 100. f. 1. Levisan capensis, serpilli folio. Pet. gaz. 9. t. 5. Pluck. mant. 69. t. 346. f. 7. Hab. in Aethiopia. Germen superum. Stylus 1, emarginatus.

11. *superba*, fol. triquetris filiformibus callosio-mucronatis patulis, ciliato-villosis. Hab. ad Cap. b. spei. h +

12. *fragarioides*, fol. triquetris adpressis margine ciliatis. Willd. p. 1143. Ad Cap. bon. spei. Fol. parva lineari-filiformia. h

13. *ciliata*, fol. ovatis acuminatis ciliatis. Lin. Sp. pl. 288. Hab. in Aethiopia. Germen superum. Stylus bifidus. h +

547. STAAVIA. Flores aggregati. Stam. calyci inserta. Styli 2, coaliti. Bacca 5-sperma corticata. Receptaculum paleaceo-villosum.

1. *radiata*, fol. lanceolato-trigonis patulis, calycis radio colorato, capitulo brevior. Th. prod. 41. Willd. Sp. a. p. 1144. Brunia radiata. Pluck. L. mant. 47. t. 454. f. 7. Moris. s. 6. t. 3. f. 43. Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *glutinosa*, fol. lineari-lanceolatis trigonis patulis, radio calycis colorato capitulo longiore. Thunb. prod. 41. Lin. sub Brunia. Pluck. mant. 149. t. 431. f. 1. 7. Hab. ad Cap. b. spei. Similis praecedenti at discus major glutinosus. h

548. PLECTRONIA. Cal. turbيناتus, 5-dentatus, persistens, clausus sinibus s. squamis 5, villosis. Petala 5, calycis fandi inserta. Bacca infera, 2-locularis, 2-sperma.

1. *corymbosa*. Burm. prodr. P. ventosa. Willd. Spec. 2. p. 1152. Burm. afr. t. 94. Hab. ad Cap. b. spei. Arb. ramis 4-gonis. Fol. lanceolato-ovata.

549. CARPODETUS. Cal. turbيناتus, germine adnatus, 5-dentatus: dentibus deciduis. Petala calyc. margini inserta. Stigma capitatum. Bacca semiinfera, sicca, medio annulata, 5-locularis.

1. *serratus*. Forst. gen. p. 33. t. 17. Willd. p. 1113. Hab. in N. Zeelandia.

*Obs.* Hoc et antecedens genus Rhamnis affinis, ab iis fructu infero distincta.

550. BIOSMA. Cal. sub-5-partitus persistens. Cor. 5-petala. Nec-

- taria* 5, supra germen. *Caps.* 3 s. 5, coalitæ. *Semina* calyptrata.
1. *oppositifolia*, fol. trigonis obtusis ciliatis, flor. terminalib. Th. prod. 43. Willd. Sp. 2. p. 1133. Pluck. alm. 136. t. 279. f. 4? Vid. D. scabra. Lam. enc. 2. p. 283. Habit. ad Cap. b. spei, cum sequentibus speciebus; quæ omnes parvi fructus sunt.
2. *obtusata*, fol. trigonis acutis punctatis, calyce, petalisque ciliatis, ramulis pubescentib. Th. prod. 84.
3. *linearis*, fol. linearib. obtusis glabris patulis, flor. terminalibus subsolitariis. Th.
4. *virgata*, fol. trigonis obtusis punctatis glabris, flor. subracemosis fastigiatis. Th.
5. *alba*, fol. trigonis acutis punctatis, bracteis calyceque ciliatis. Th.
6. *hirsuta*, fol. trigonis mucronatis hirsutis, flor. terminalib. subsolitariis. Thunb. Comm. rar. 3. t. 3.
7. *rubra*, fol. trigonis mucronatis glabris subtus bifariam punctatis, lacin. calycinis glabris. Th. Comm. rar. 2. t. 2. Pluck. mant. 68. t. 347. f. 4. Hab. in Aeth. Habitus juniperi. Fol. subtus pnnctis pertusa. An flor. rubri? Vid. Lam. enc. 2. p. 285.
8. *pectinata*, fol. trigonis acutis punctatis ciliatis. Th. Hab. ad Cap. b. spei. 17
9. *ericoides*, fol. trigonis obtusis glabris, flor. terminalib. subsolitariis. Thunb. Pluck. amalib. 236. t. 279. f. 5. Hab. in Aethiopia. 17
10. *hispida*, fol. trigonis muticis villosobispidis patulis, umbellis terminalibus. Th. D. capensis. Lin. Murr. syst. ed. 14. p. 239. Hab. ad Cap. b. spei. Stamina sterilia huic fere petalaloida sunt. 17
11. *ciliata*, fol. lanceolatis carinatis ciliatis, umbellis terminalib. Th.
12. *bifurca*, fol. trigonis acutis hirsutis, racemis terminalib. subumbellatis.
13. *bifida*, fol. lanceolatis mucronatis punctatis glabris imbricatis, flor. capitatis, petal. bifidis. Willd. Sp. p. 1136. Jacq. coll. 3. p. 278. t. 20. f. 1.
14. *capitata*, fol. trigonis villosobispidis imbricatis, florib. spicato-capitatis. Th. Caulis prolifer, facie Bruniae nodifloræ.
15. *villosa*, fol. lanceolatis villosis imbricatis, capitulis terminalib. Th.
16. *cupressina*, fol. ovatis trigonis glabris imbricatis, flor. terminalib. solitariis. Brunia uniflora. Lin. Spec. pl. 2. p. 289.
17. *imbricata*, fol. ovatis acutis ciliatis, umbellis terminalib. Th. Similis D. ciliatæ, sed Putala purpurea subrotunda.
18. *marginata*, fol. cordatis, inferiorib. ovatis, superioribus lanceolatis, umbellis terminalib. Th. Lin. suppl. 155.
19. *lanceolata*, fol. lanceolatis obtusis subpilosis, flor. axillarib. geminis. Th.
20. *pubescens*, fol. lanceolato-trigonis muticis villosis imbricatis, umbellis terminalib. Hartogia ciliaris. Lin. Syst. Nat. p. 223. Pluck. alm. 197. t. 411. f. 3.
21. *latifolia*, fol. ovatis crenatis pubescentibus, pedunc. lateralib. unifloris, ramis subtomentosis. Th. prod. Lin. suppl. 154.
22. *crenata*, fol. ovatis crenatis subtus punctatis, flor. axillarib. solitariis. Calycis fol. subulata, crenata.
23. *tetragona*, fol. ovatis carinatis ciliatis quadrifariam imbricatis, flor. terminalib. solitariis. Th. Lin. sup. 155. Facile distinguatur fol. valde approximatis, quo caulibus illis totus obiectus evadat.
24. *uniflora*, fol. oblongis subtus punctatis, flor. terminalibus, calycib. ciliatis. Th. Sert. hanov. 1. p. 16. t. 8. Flos huic speciei maximus.
25. *rugosa*, fol. ovatis rugosis villosis reflexis, umbellis terminalib.
26. *ovata*, fol. ovatis glabris marginatis, flor. axillarib. solitariis et geminis. Th. D. pulchella. Houttuyn. t. 21. f. 2.
27. *barbigera*, fol. cordatis acutis glabris, umbellis terminalib. Th. Lin. suppl. p. 155. Petal. barbata. Pistil. 1, flore longius.
28. *glandulosa*, fol. ovatis acutis carinatis hirsutis patulis, cal. villosis. Th. prodr. p. 187.
29. *betulina*, fol. subcuneatis crenatis subtus punctatis, flor. lateralibus solitariis. Hartogia (*betulina*). Berg. cap. 67.
30. *orbicularis*, fol. orbiculatis, ramis villosis.
31. *pulchella*, fol. ovatis glanduloso-crenatis glabris, flor. axillarib. geminis. Th. prod. 43. Fructus 3-locularis. Cornua terminata glandulis duabus. Polymor. hum genus sexu, nectariorum figura, capsularum numero, sensit divisionem in Diosmata et Hartogias, sed utraque demum plures observationes retraxerunt in unum. Linn.

*Obs.* Hoc genus secundum ill. Jussieu ad familiam Rutaceam pertinet.

551. **BURSARIA.** *Cal.* inferus, 5-dentatus. *Petala* 5, linearia. *Stigma* simplex. *Caps.* cordata, compressa, 2-partibilis, disperma. *Sem.* reniformia.

1. *spinosa*, caul. fruticoso spinoso, fol. emarginatis, flor. racemosis. Cav. ic. 4. p. 30. t. 350. Hab. prope Jackson et Botany Bay N. Hollandiae. *Caps.* siliculam Thlaspi. Bursae pastoris adaequat, unde nomen. *h*

552. **GOUANIA.** Polygama. *Cal.* superus turbinatus, 5-fidus. *Petala* 5, squamiformia. (*Cor.* o. Lin.) obvolvencia *stamina*, (*Anthera* 5, sub calyptra tecta. L.) *Stigma* 3-fidum. *Fruct.* tripartibilis: coeculis s. *capsulis* 3-gonis dorso saepius 2-alatis, 1-spermis non deniscentibus. Juss. (Flor. masculi hermaphroditis mixti.)

1. *domingensis*. Linn. G. glabra. Jacq. amer. pict. p. 128. t. 264. f. 96. Lam. ill. t. 845. Vahl. symb. bot. 3. p. 101. Habit. in St. Dominica. Frut. scandens habitu Vitis et Paulliniae.

553. **PITTOSPORUM.** *Cal.* deciduus. *Petala* 5, in tubum convinentia. *Caps.* 2-5-locularis, 2-5-valvis. *Semina* pulposa.

1. *undulatum*, fol. ovato-lanceolatis undulatis acutis nitidis, pedunc. ternis terminalib. trifloris. Vent. Hort. Cels. p. 76. t. 76. Habit. in ins. Canaria. Frut. sempervirens, viscoso-pulverulentus. Fruct. adhuc ignotus. Pet. oblonga odor fortis.

2. *coriaceum*, fol. obovatis obtusis coriaceis, caps. 2-valvibus. Act. 3. p. 488. Willd. Sp. 2. p. 1145. Andrew. t. 151. Lam. ill. t. 144. Habit. in ins. Canariis. *Cor.* caerulea.

554. **LICANIA.** *Cal.* turbinatus, 5-fidus. *Petala* 6, fauci cal. inserta. *Drupa* olivæformis, carnosae. *Nux* ovata, fibris tecta, 1-locularis.

1. *incana*. Aubl. t. 45. Lam. ill. t. 122. *Hedycrea* Schreb. gen. pl. p. 160. secundum quem *Cor.* o. Willd. Sp. 2. p. 1210. Hab. in

Guyana. Fol. alterna simplicia, stipulacea. Flor. parvi, spicati. *Drupa* punctata, edulis. *h*

555. **CALODENDRUM.** *Cal.* 5-partitus brevis. *Cor.* 5-partita, petalis lanceolatis, unguiculatis. *Stam.* 5-sterilia, petaliformia (*Nectar.* 5-phyllum Th.) *Caps.* 5-angularis, 5-locularis, 5-valvis: loculis 2-spermis.

1. *capense*. Th. prod. p. 44. Willd. Spec. 2. p. 1148. Lam. in Journ. d'Hist. natur. n<sup>o</sup>. 2. p. 56. t. 3. Dict. capensis. Lin. suppl. p. 232? Hab. ad Cap. b. spei. Arb. trunco crasso ob flor. paniculas formosa. Pet. glandulosa. E Dictamni familia.

556. **CEDRELA.** *Cal.* marcescens. *Cor.* 5-petala, infundibuliformis, basi ad  $\frac{1}{3}$  receptaculo adnata. *Caps.* lignosa, 5-locularis, 5-valvis. *Sem.* deorsum imbricata, ala membranacea.

1. *odorata*, flor. paniculatis, fol. pinnatis. Willd. Sp. 2. p. 1147. Lam. ill. gen. t. 137. Brown. jam. 158. t. 10. f. 1. Hab. in Amer. merid. Arb. procera, frondosissima, adhuc junior allium redolens, et cujus lignum pariter odoratum, ad varia utensilia perutile. Flor. Per. 3. p. 9.

557. **HUMBOLDTIA.** *Cal.* 4-partitus. *Petala* 5. *Legumen* oblongum, compressum.

1. *laurifolia*. Willd. Spec. 2. p. 1147. Batschia laurifolia. Vahl. symb. 3. p. 39. t. 56. Hab. in Zeylona. Arb. ramis articulatis flexuosis inanib. Fol. pari pinnata 4 vel 5-juga. Racemi axillares solitarii vel gemini multiflori. Willd. *h*

558. **HUERTEA.** *Cal.* 5-dentatus, inferus. *Petala* ovata, sessilia. *Stigma* 2-fidum, acutum. *Drupa*? obovata. *Nux*? unilocularis.

1. *glandulosa*, fol. imparipinnatis. Fl. Per. 3. p. 5. t. 227. f. a. Habit. in Peruviae nemorib. Arb. 30-ulnaris, coma frondosa, trunco crasso. Pedicel. bracteolis stipati. Glandulae 2, ad basin foliolorum parium, et 2 ad basin singuli folii.

*Obs.* Auctores l. c. p. xxi. hanc arborem ex Rhamni familia putant, forte *Araliis* affinium videtur.

559. CAMAX. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata 5-loba. *Stigma* 3-4-fidum. *Bacca* (villosa) 4-locularis, polysperma.

1. *fraxinea*. Willd. Sp. 2. p. 1117. *Rouprea gujanensis*. Aubl. 1. p. 198. t. 78. Lam. ill. t. 121. Hab. in sylvis Gujanæ. Flor. parvi numerosi cum fol. pinnatis? verticillati. h

560. TODDALIA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stigma* capitatum. *Caps.* baccata, 5-locularis: loculis 1-spermis. (*Bacca* sicca. Lam.)

1. *aculeata*, caul. aculeato, fol. ovatis acuminatis. Lam. ill. t. 139. *Scopolia aculeata*. Smith. ic. ined. 1. p. 34. Willd. 2. p. 1115. *Paullinia asiatica*. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 62. f. 1. Schreb. Pluck. alm. 202. t. 95. f. 5. Hab. in India orient. Panic. racemosae axillares. Willd. h

2. *inermis*, caul. inermi, foliol. obovat. obtusis. Willd. sub *Scopolia*. Lam. l. c. t. 139. f. 2. In ins. Borbonia? Corymb. terminalis. Willd. h

561. RUYSCHIA. *Cal.* 5-phyllus, involucreatus. *Cor.* 5-petala, reflexa. *Stylus* o. *Stigma* 4-5. *Bacca* sub-5-locularis, polysperma.

1. *clusiaefolia*, fol. obovatis integris aveniis, flor. bractea solitaria. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 502. Jacq. amer. 75. t. 51. f. 2. Willd. p. 1116. Habit. in Martinicæ sylvis interioribus, in arborum truncis. h

2. *Surubea*, fol. obovatis obtusis mucronatis venosis. Willd. *Souroubea*, fol. obovatis emarginatis apice denticulatis venosis, flor. bracteis tripartitis. Swartz. l. c. 1. p. 504. Lam. ill. t. 135. *Souroubea gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 244. t. 97. *Logania pentacrina*. Scop. Gmel. Hab. in sylvis Gujanæ ad ripas rivuli Gallion dicti. h

562. CORTESIA. *Cal.* inferus, 10-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 2-partitus. *Stigma* globoso-peltatum. *Bacca* disperma.

1. *cuneifolia*, caul. fruticoso ramosissimo, fol. alternis cuneiformibus trifidis, flor. solitariis. Cav. ic. 4. p. 53. t. 377. Hab. in Buenos-Ayres planitie Pampas. Flor. Mayo.

Obs. Hoc genus, honori Ferd. Cortesii, herois illius intrepidi ac imperii Mexici debellatoris, dicatum, ad familiam Boragineam aut Sebastianam pertinere videtur et secundum auctorem generi *Rochefortiae*. Sw. affine est.

563. EUPAREA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-12-petala. *Bacca* exsucca polysperma.

1. *amoena*. Gaert. sem. 1. p. 230 t. 50. f. 5. Willd. Sp. 2. p. 1183. Lam. ill. t. 133. Hab. in Nov. Holland. Procumbens, facie Nummulariae. Flor. colore Anagallidis phoeniceæ. Caps. Trientalis proxima. Gaert.

564. EGICERAS. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Caps.* arcuata, unilocularis, univalvis, monosperma.

1. *majus*, fol. ellipticis sentis venosis, caps. cylindraceis arcuatis. Willd. Sp. 2. p. 1183. Gaert. sem. 1. p. 216. t. 46. f. 1. *Rhizophora corniculata*. Lin. Mangium fruticosum corniculatum. Rumph. 3. t. 77. Hab. in Moluccis. h

2. *minus*, fol. ellipticis obtusis subaveniis, caps. acinaciformib. Willd. Gaert. l. c. t. 46. f. 1. Rumph. 3. t. 82. Hab. in Moluccis. h

565. BILLARDIERA. *Petala* quinque, foliolis calycinis alternis. *Nectar.* nullum. *Stigma* simplex. *Bacca* supera polysperma.

1. *scandens*, pedunc. solitar. unifloris, fol. subhirsutis. Smith. N. Holl. 1. p. 1. t. 1. Hab. in N. Holland. h

566. MANGIFERA. *Cor.* 5-petala. *Drupa* reniformis.

1. *indica*, fol. oblongo-lanceolatis, flor. submonandris, drupa maxima reniformi. Lam. enc. 3. p. 667. Willd. Spec. 2. p. 1150. Jacq. coll. 4. p. 96. Icon. rar. v. 2. t. 337. Rumph. 1. t. 25. Rheed. 4. t. 1. 2. Habit. in Ind. h

2. *laxiflora*, fol. ovato-lanceolatis subsessilibus, flor. pentandris, drupa ovata subrotunda. Hab. in ins. Mauritii. h

3. *axillaris*, fol. ovato-oblongis obtusiusculis, panic. axillaribus, flor. decandris. Lam. l. c. Hab. in Ind. h

567. HIRTELLA. *Pet.* 5. *Filam.* longissima persistens, spira-

lia. *Bacca* 1-sperma. *Stylus* lateralis. (Stam. 3 et 5.)

1. *americana*, racemis simplicib. axillarib. solitariis, pedunc. communi villosa, flor. pentandris, fol. oblongis acuminatis. Willd. Sp. 2. p. 1151. Sw. obs. 94. Aubl. t. 98. Hab. in Brasilia, Gujan, et Cajenn. h

2. *peruviana*, fol. oblongis acuminatis, racemis compositis pubescentibus, floribus triandris. H. *racemosa*. Flor. Peruv. 3. p. 5, t. 227. f. b. Cosmibuena prodr. Flor. Per. p. 10. t. 2. In Chinchaio nemorib. Drup. cuneiformis subplicata parum recurvata, hirsuta, 1-sperma. Styl. basi germinis. h

3. *triandra*, racemis compositis terminalib. solitariis, pedunc. communi pubescente, flor. triandris, fol. oblongis acuminatis. Willd. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 508. H. americana. Jacq. amer. p. 8. t. 8. Hab. in sylvis Jamaicae, Hispaniolae, Martinicae ad latera torrentum. h

4. *paniculata*, racemis compositis terminalibus aggregatis, pedunc. communi hirsuto, flor. pentandris, fol. ovalib. acutis. Willd. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 510. Hab. in Cajenna. h

5. *rugosa*, fol. ovato-acuminatis subbulato-rugosis, pedunc. villosissimis, flor. fasciculatis. Hab. in Portorico. In specimine, communicato a Dom. Thuillier, fol. sunt superne nitida, inferne sparsim et ad nervos pilosa. Stam. 3. h

568. WALKERA. *Cal.* 5-partitus inferus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* 5, monospermae. *Nuces* reniformes.

1. *serrata*. Willd. Spec. p. 1145. Meesia serrata. Gaert. sem. 1. p. 344. t. 70. f. 6. In Ind. orient. Fol. alterna. Corymbi terminales. Flor. parvi flavescentes. Willd. h

569. BARRERIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* rotata: laciniis scrobiculatis. *Filam.* dilatata. *Anth.* tetragonae, marginatae, marginibus coherentibus. *Fructus*...

1. *theobromaefolia*. Willd. Spec. 2. p. 1145. Poraqueiba gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 123. t. 47. Lam. ill. t. 134. Hab. in sylvis prope flumen Sinemari Gujanac. Arbor 50-pedalis. Fol. alterna. Spica axillaris. h

570. GALAX. *Cor.* hypocrateriformis. *Cal.* 10-phyllus. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, elastica.

1. *aphylla*. Lin. excl. Synon. Gron. Virg.

Viticella. Mitch. gen. 24. Habit. in Virginia. h

571. LASIOPETALUM. *Perianthium* 3-phyllum, (tomentosum) persistens. *Cor.* rotata, hispida (lanuginosa Andr.): laciniis ovatis incurvatis. *Antherae* bilobae, apice poris 2. *Caps.* supera, 3-locularis, 3-valvis, dissepimento medio valvularum. Smith.

1. *ferrugineum*, fol. lineari-lanceolatis obtusis inaequaliter sinuatis, subtus lanuginosis, flor. racemosis axillarib. Andrew. t. 208. Smith. in Act. Soc. Lin. 4. p. 217. Hab. in N. Holl. ad portum Jackson, in paludosis. Plant. viminea, ramis extensis, tomento ferrugineo, fol. superficie excepta, undique tecta.

Obs. Quamvis in systemate artificiali forte indifferens videtur, quoniam locum planta quaedam occupet, tamen hoc (et sequens genus?) ob affinitatem inter plantas ericoideae, p. 174. (ubi ex improviso omissum) collocandum est.

572. CRYPTANDRA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* tubulosus, limbo 5-fido: squamis 5, cucullatis inter segmenta. *Stam.* fauci inserta sub singulis squamis. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* supera, 3-valvis, 3-locularis e valvulis inflexis. *Sem.* solitaria compressa.

1. *australis*. Fruticulus ericoideus, fol. fasciculatis, florib. capitatis extus setosis. Smith. in Act. Soc. Lin. vol. 4. Hab. in Australia.

573. VENTILAGO. *Cal.* tubulosus. *Cor.* squamae stam. munientes, cal. inserta. *Caps.* supera, sphaerica, ala longissima terminata. *Sem.* solitarium.

1. *madraspatana*, scandens, fol. ovatis integerrimis glabris. Willd. in Nov. Act. Berol. v. 2. Ej. Sp. 2. p. 1106. Gaertn. 1. p. 223. t. 49. Roxb. Corom. 1. p. 55. t. 76. Rumph. 5. t. 2. In Indiae montosis et maritimis. h

2. *denticulata*, fol. ovatis crenatis pubescentib. Willd. in N. Act. Berol. 2. Hab. in Ind. prope Samulcotta. Genus e Malpighia familia videtur.

574. ERYCIBE. *Cal.* 5-dentatus,

inferus. *Cor.* 1-petala decemlobata. *Styl.* o, *Stigma* 5-sulcatum. *Bacca* 1-sperma.

1. *paniculata*. Roxb. *Corom.* t. 2. ic. Hab. in sylvis *Coromandeliae* montosis. Frutex scandens, junior fuliginoso-pulverulentes.

575. RIBES. *Petala* 5 et *Stamina* calyci inserta. *Stylus* 2-fidus. *Bacca* polysperma, infera.

\* RIBESIA. *Inermia* for. *racemosis*.

1. *rubrum*, inermis, racemis glabris nuntantibus, flor. planis (petal. obcordatis), fol. obtuse quinquelobis, caule erecto. Willd. Sp. 2. p. 1153. Smith brit. 1. p. 263. Flor. dan. t. 667. Var. fructib. albis. Flor. lutescentes. Hab. sponte in Sueciae et Angliae borealibus. h

2. *petraeum*, inermis, racemis pilosiusculis erectis, flor. planiusculis (petalis obtusis) rubris, fol. acuminato-lobatis incisio-dentatis, caule erecto. Willd. Smith. l. c. R. racemis florentib. erectis, fructescens pendul. Jacq. ic. 1. t. 49. Misc. 2. p. 36. Hab. in alpib. Carinthiacis, Syriacis, et in Silesia; Bohemia, etiam in Angliae montosis. h

3. *spicatum*, inermis, spicis erectis, petalis oblongis, bract. flore breviorib. Smith. l. c. p. 264. Robson. in Trans. of Linn. Soc. 5. p. 240. t. 21. Hab. in sylvis Angl. boreal. Fol. R. rubri, subtus magis tomentosa. *Bacca* R. rubri. An prioris var.? h

4. *trifidum*, inermis, fol. glabriusculis, racem. pubescentibus, flor. parvis petalis (purpureis) spathulatis, haccis hirsutis, cal. lacin. subtrifidis. Michaux, Flor. 1. p. 110. Hab. juxta Quebec et sinum Hudsonis.

5. *rigens*, inermis, racem. erectis, fol. reticulato-rugosis, subtus pubescentibus, racemis (etiam fructiferis) rigescentibus, bac. hispidulis. Michaux, l. c. Hab. in Canada, ad amnem Mistassin.

6. *procumbens*, inermis, racem. erectis, flor. planiusculis, fol. obtuse lobatis, caule procumbente. Willd. p. 1154. Pall. ross. 2. p. 35. t. 65. Hab. in Dauriae muscosis umbrosis paludosis. h

7. *prostratum*, inermis, ramis reclinato-prostratis, racem. suberectis, bac. hispidis. Lam. enc. 3. p. 48. L'Her. Surp. 1. t. 2. R. glandulosum. Ait. Willd. p. 1154. Hab. in Amer. boreal. ins. Newfoundland. h

8. *alpinum*, inermis, racemis erectis: bracteis flore longioribus, fol. subtus luci-

dis. Flor. Dan. t. 668. Jacq. austr. t. 47. Hab. in montosis et subalpinis. Polygamia dioica. Bac. insipidae.

9. *fragrans*, inermis, racemis erectis, cor. campanulatis, fol. obtuse trilobis, caule ascendente. Willd. p. 1155. Pall. Nov. Act. Acad. Petrop. 10. p. 377. t. 9. Hab. in Sibiria in montibus Mongoliae finitimis altioribus. *Bacca* rubicundae, suavissimi saporis. h

10. *triste*, inermis, racem. pendulis, cor. planiusculis, fol. quinquelobis. Willd. Pall. in N. Act. Acad. Petrop. 10. p. 378. Hab. in Sibiria circa summa montium cacumina Jugi Jablennoi et in altioribus montibus Mongoliae finitimis. Bac. parvae nigrae insipidae, scatescentes succo atro-rubro, ad tingentia vina praestantissima. Pall. l. c. h

11. *macrobotrys*, inermis, racemis longissimis pendulis hirsutis, fol. cordatis lobatis incisio-serratis, petiol. basi ciliatis. Fl. Peruv. 3. p. 12. t. 202. Hab. in Peruviae Andium nemorib. Fol. vitis viniferae habitu. Bac. hirsuta, viridis.

12. *albifolium*, inermis, racemis fol. duplo longioribus, pendul. fol. subcordatis trilobis incisio-serratis petiol. ciliatis. Flor. Peruv. l. c. f. h. Hab. in nemorib. Munna locis frigidis. Flor. purpurascens.

13. *punctatum*, inermis, racemis pendulis brevibus, fol. trilobis serratis subtus punctatis. Flor. Peruv. t. 233. f. a. In Chile collib. Bac. rubra, punctata.

14. *albinervium*, inermis, fol. abbreviat. acute lobatis glabriusculis: nervis albidis, racem. recurvatis. Michaux. Hab. in Canada, ad amnem Mistassin. *Bacca* glabrae, rubrae. h

14. *recurvatum*, inermis, ramis recurvatis, fol. latiusculis acute lobatis pubescentibus glanduloso punctatis, racemis reflexis, tubulatis glabris (haccis nigris). Michaux, Flor. p. 110. Hab. ad ripas Latorum juxta sinum Hudsonis.

16. *nigrum*, inermis, fol. subtus punctatis, racem. laxis, flor. campanulatis, bract. pedicellis breviorib. Lam. enc. 3. p. 295. Pl. dan. t. 556. Hab. ad ripas fluvior. et sepes Graveolens. h

17. *pensylvanicum*, inermis, fol. intrinseque punctatis, flor. racemosis subcylindricis, bract. pedicellis longiorib. Lam. l. c. R. floridum. Willd. p. 1156. Dill. elth. 324. t. 244. f. 315. Hab. in Pensylv. h

18. *glandulosum*, inermis, racem. brevibus, fol. cordatis obtuse trilobis duplicato-serratis rugosis. Hab. in collib. sylvae

ticis Chile. Frutex biorgyalis glandulosus. Cal. glandulos., pubescens.

19. *viscosum*, inerme, racem. brevibus, fol. cordatis 5-lobis serratis asperis viscosis. Flor. Peruv. 3. p. 13. Habit. in Peruviae præruptis. Cal. flavus. Bacca dilute purpurea.

20. *cuneifolium*, inerme, pedunc. 2-3-floris, fol. cuneiformib. incis. Habit. in Peruv. alpih. Fol. fasciculata. Bract. duæ ad basin singuli floris. Habitus Grossulariæ, fruct. magni. Flor. Per. l. c.

\*\* *Grossularia*, *aculeata*, *pedunc. plerisque paucifloris*, fruct. majusculis.

21. *Diacantha*, aculeis geminatis stipularibus, fol. cuneiformi-tripartitis dentatis, flor. racemosis. Willd. p. 1157. Raxillis hispidosis, racem. erectis, fol. cuneiformibus incis. Pall. ross. 2. p. 36. t. 66. Iun. 3. app. n°. 79. t. 2. f. 2. Habit. in glareosis saxosis, locisque salsis Davuriæ. Media inter Grossularis et Ribesis. Nonnunquam aculei desunt. h

22. *saxatile*, aculeis sparsis, fol. cuneiformib. obtuse trilobis, racem. erectis. Willd. Pall. Nov. Act. Acad. Petrop. 10. p. 376. Habit. in Sibiria in montib. granitosis Songariæ. Species media inter R. alpinum et R. Discantham, habitu Grossulariæ, fructu Ribesii. h

23. *rotundifolium*, spina subaxillari, fol. suborbiculatis: lobis subrotundo-obtusis, pedunc. 1-floris, limbo calyc. tubuloso, bac. glabra. Michaux. p. 111. Hab. in Carol. montib. excelsis.

24. *hirtellum*, spinula subaxillari, ram. subhispidis, fol. parvis semitrifidis: lobis subdentatis, pedunc. 1-floris, bac. glabra rubra. Michaux. In Amer. boreal. saxosis, ad amnem Sagney. h

25. *gracile*, spina subaxillari, fol. petiol. gracilibus utrinque pubescentibus: lobis acutis dentato-incis. pedunc. capillarib. subbifloris, cal. tubulato - campanulatis glabris. Michaux. l. c. Habit. in montib. Tennasséc.

26. *reclinatum*, ramis subaculeatis reclinatis, pedunc. bractea triphylla. Linn. Hab. in Germania, Helvetia. h

27. *Grossularia*, ramis aculeatis, petiol. pilosis, bract. 2-phylla, bac. hirsutis (aut glabris). Linn. vid. Smith. brit. 1. p. 206. Hab. in Europ. sylvis et sepibus. Fili in fructu capitati. h

28. *Uva crisa*, ramis aculeatis, bac. glabris, pedicellis bract. monophylla. Hab. in Eur. boreali. Var. prioris? h

29. *oxycanthoides*, aculeis majoribus et subsolitariis ad gemmas, minoribus undique sparsis, bacc. glabris subgeminis. Lam. enc. 3. p. 51. Dill. elth. t. 139. f. 166. Habit. in Canada.

30. *lacustris*. R. *oxycanthoides*? spina subaxillari multiplici, caul. undique hispidulo, fol. ultra medium lobatis, petiol. villosis, bacc. racemosis hispidis. Michaux, p. 111. Hab. ad lacus Mistassins.

30. *Cynosbati*, aculeis a passim subgemmis, fol. molliter pubescentibus, racem. nutanti-paucifloris, cal. erecto-campanulatis, bacc. aculeatis. Mich. l. c. Jacq. hort. 2. t. 123. Hab. in Canada. h

576. *HEDERA*. *Petala* 5, oblonga. *Bacca* 5-sperma, calyce cincta.

1. *Helix*, fol. tri-quinquelobis: floralib. ovatis, umbella erecta. Willd. Spec. 2. p. 1179. In Eur. arboribus. muris aut saxis repente scandens. Flor. sero autumno. h

2. *pendula*, fol. ovato-lanceolatis integris, umbel. subcapitatis, pedunc. longissimis pendulis. Swartz. Flor. ind. occ. 1. p. 512. Hab. in altis montibus Jamaicæ. h

3. *nutans*, fol. ellipticis coriaceis, umbel. nutantibus hemisphaericis, pedunc. erectiusculis. Swartz. l. c. p. 514. Hab. in montib. caeruleis Jamaic. austr. h

4. *terebinthinacea*, fol. septenatis ellipticis integerrimis, racemo terminali, pedunc. umbellatis. Willd. Vahl. symb. 3. p. 42. Hab. in sylvis et nemorosis Zeylonæ. h

Obs. Familiae *Caprifoliæ* affine genus.

577. *VITIS*. *Petala* apice calyptratim coherentia, emarceda. *Bacca* 5-sperma, supera.

1. *vinifera*, fol. lobatis sinuatis nudis aut tomentosis. 3. *Apyrena*, s. *Corinthiaca*. Bauh. hist. 2. p. 72. Ubique fere colitur. Var. bac. rubris, cui fol. tomentosa sunt. h

2. *palmata*, fol. palmatis glabris, laciniatis, umbel. racemosis. Vahl. symb. 3. p. 42. Hab. in Virginia. h

3. *indica*, fol. cordatis dentatis subtus villosis, cirrhis racemiferis. Linn. Sylvestris, sarmentis lacte repentibus, uvis mi-



morib. nigris. Brown. jam. 178. Sloan. hist. 2. t. 110. f. 4. Pluck. phyt. 249. f. 1. Hab. in Ind. utraque. h

4. *flexuosa*, fol. cordatis dentatis, subtus villosis, caul. flexuoso, panic. elongatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 332. Hab. in Japonia. h

5. *Labrusca*, fol. cordatis subtrilobis dentatis subtus tomentosis. Lin. Plum. sp. 18. ic. 259. f. 1. Hab. in America septentrionali. h

6. *vulpina*, fol. cordatis dentato-serratis utrinque nudis. Sp. Hab. in Virgin. h

7. *heterophylla*, fol. simplicib. incisotrilobis quinquelobisque serratis nudis. Th. jap. 103. Hab. in Japon. h

8. *laciniosa*, fol. quinatis : foliol. multifidis. Hab. .... Fol. parva eleganter incisa. h

9. *heptaphylla*, caul. scandente, fol. septenatis ovatis integerrimis. Hab. in Ind. orient. Similis *V. hederaceae*. Spicae simplices, subtomentosae : flor. verticillatis. Petal. apice cohaerentia. Stam. 5. h

10. *pinnata*, fol. pinnatis dentato-serratis glabris. Vahl. symb. 3. p. 43. Hab. ... Pedicelli umbellati. V. Rami purpurascens. h

578. **RORIDULA**. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Antherae* basi scrotiformes, apice poro 2 dehiscentes. *Styl.* 1. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis.

1. *dentata* (verticillata). Lin. Lam. ill. t. 141. Irion verticillatum. Burman. Drosera Roridula. Thunb. Hab. ad Cap. bon. spei. Tota planta ut Drosera pilis glandulosis viscida. Fol. in caule suffruticoso verticillatim congesta, linearia, ciliata.

579. **LAGOECIA**. Umbella simplex. *Invol.* universale sub-8-phyllum; partiale 4-phyllum, capillaceo-pinnatum. *Cal.* superus 5-fidus : laciniis capillaceo-multifidis. *Petala* 2-fida. *Sem.* 1, cal. coronatum.

1. *cuminoides*. Linn. Willd. p. 1184. Lam. ill. t. 142. Cuminum sylvestre, capitul. globosis. C. Bauh. Habit. in Graecia.

580. **CLAYTONIA**. *Cal.* 2-valvis.

*Cor.* 5-petala. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* 3-valvis, 1-locularis, 3-sperma.

1. *virginica*, fol. lineari-lanceolatis, petal. integris. Ait. Kew. 1. p. 284. Willd. Sp. 2. p. 1185. Fol. linearibus, calycibus obtusis. Aiton. Pluck. alm. 272. t. 102. f. 3. Fol. lanceolatis, calycibus acutiusculis. Ait. Hab. in Virgin. sylvar. humidis et Nov. Angliae. Flor. albi, rubro-lineati. Lin. Fol. praelongo-linearia; flor. albedo-rosci. Michaux.

2. *caroliniana*, fol. brevi-ovalibus, in petiolum abrupte angustatis, flor. roseis, Michaux, Flor. 1. p. 160. Hab. in montib. Carolin. Martio.

3. *sibirica*, fol. nervosis, radicalibus caulinisque ovatis, racemo secundo, petal. bifidis. Willd. p. 1186. Hab. in Sibir. Scap. declinatus. Fol. caulinis duobus oppositis, intraque Racemi duo. Flor. rubri. Tr

4. *perfoliata*, fol. enerviis, radicalib. rhomheo-ovatis, caulinis subconnatis, flor. umbellato-verticillatis, petalis integris. Willd. l. c. Donn. ind. hort. cantab. p. 25. Hab. in Amer. bor. Fl. albi. ©

581. **SAUVAGESIA**. *Cor.* 5-petala, fimbriata. *Cal.* 5-phyllus. *Nect.* 5-phylum, cum petalis alternans. *Caps.* 3-locularis, 3-sulcata, 3-valvis : valvis marginibus introflexis. (Stipulae pennato-ciliatae.)

1. *erecta*, caul. ramosissimo procumbente erectoque, fol. lanceolato-serrulatis lineatis, flor. subternis erectis. Flor. Per. 3. p. 11. Willd. Sp. 2. p. 1185. Jacq. amer. t. 51. f. 3. Ed. picta. t. 77. Hab. in Amer. Nectar. duplex : exterius pilis plurimis raris, orbiculatis positus (Stam. sterilia ?) Interius foliolis 5. linearibus, petal. alternantib. distinctum. Fl. Per. l. c.

2. *nutans*, flor. nutantibus, nectario staminib. majore. Hab. in ins. Madagascar. Aubert.

*Obs.* Cum *Viola* familiam naturalem efficere videtur.

582. **VIOLA**. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis, postice cornuta (aut ecalcerata). *Anth.* apice membranula cohaerentes,

aut distinctæ. *Caps.* supera, 3-valvis, 1-locularis.

\* *Acaules.*

† *VIOLA. Cor.* calcarata. *Anth.* coherentes.

*palmata*, acaulis pubescens, fol. palmatis quinquelobis, lobis dentatis indivisib. Lin. Willd. Sp. p. 1159. Pluck. analth, 129. t. 447. f. 1. Fol. nonnulla indivisa, reniformi-cordata. Michaux. Hab. in Virginia.  $\mathcal{T}$

2. *pedata*, acaulis, fol. pedatis septem-partitis: lacin. lineari-lanceolatis integris. Michaux. Flor. 2. p. 151. Andrew. t. 153. Pluck. alm. 188. t. 114. f. 7. Hab. in Virginia. Fol. lacin. dentatis. Willd.  $\mathcal{T}$

3. *pinnata*, acaulis, fol. multifidis, lacin. lobatis. Willd. p. 1160. Gmel. sib. 4. p. 101. t. 49. f. 4. V. acaulis, fol. palmato-multifidis et lacinia. Misc. taur. 3. p. 181. t. 5. f. a. Hab. in Sibiria et alpi. Europ.  $\mathcal{T}$

4. *sagittata*, acaulis, fol. oblongis acutis cordato-sagittatis serratis basi incis, flor. inversis. Ait. Kew. 3. p. 287. Hab. in Pensylv.  $\mathcal{T}$

5. *lanceolata*, acaulis, fol. lanceolatis crenatis. Gmel. sib. 4. p. 99. t. 49. f. 2. Hab. in Canada, Carolina, Sibiria. Flor. albid.

6. *rotundifolia*, acaulis, fol. orbiculato-cordatis: sinu clauso subdentatis, petiolo pubescente, cal. obtuso. Michaux 2. p. 150. In Carol. montibus excelsis. Flor. flavi.

7. *obliqua*, acaulis, fol. cordatis acut. subplanis glabris, flor. erectis, petal. oblique flexis. Ait. l. c. Hab. in Pennsylvania, Virgin. Petala oblongo-ovata straminea, basi caerulea.

8. *cucullata*, acaulis, fol. cordatis acutiusculis glabris serratis basi cucullatis, flor. inversis, petal. oblique flexis. Ait. l. c. Andrew. Hab. in Amer. bor. Petal. oblonga caerulea: superum, infra medium albidum, venis violaceis, lateralia longiora, infra medium albida barbata. Ait.  $\mathcal{T}$

9. *primulifolia*, acaulis, fol. oblongis subcordatis: petiol. membranaceis. Linn. Hab. in Sibiria, Virginia. Fol. obtusissima, crenata, basi decurrentia per petiolum, ut in Prim. officinali. L.  $\mathcal{T}$

10. *philippica*, acaulis, fol. ovato-oblongis obtusis crenulatis petiolo longiori-

bus, scap. 1-floris bibracteatis. Cav. ic. 6. p. 19. t. 529. f. 2. Hab. in ins. Luçon.

11. *magellanica*, acaul., fol. reniformib. repandis villosis. Willd. Forster in Comment. Soc. Goett. 6. p. 47. t. 8. Hab. in Tierra del Fuego, locis uliginosis. Fl. amplus luteus, venis spadiceis.  $\mathcal{T}$

12. *hirta*, acaul., fol. cordatis acutis piloso-hispidis, stolonib. subnullis. Fl. dan. t. 618. Hab. in nemorib. Vere. Cor. majuscula dilute caerulea.

13. *palustris*, acaul., fol. reniformib. L. Fl. dan. t. 83. Allion. t. 2. f. 2. Moris. hist. 2. s. 5. t. 35. f. 5. Hab. in Europ. frigidiorib. et montosis turfosis humidis. Fol. subconvoluta. Fl. venosi, diluti.  $\mathcal{T}$

14. *odorata*, acaul., fol. cordatis, stolonib. reptantib. Lin. Fl. dan. t. 309.  $\beta$ . V. maritima alba. Baub. pin. 199. Hab. in Eur. nemorib. et ad sepes. Fl. primo vere.  $\mathcal{T}$

\*\* *Caulescentes.*

15. *canina*, caul. adultiore adscendente caniculato, fol. oblongo-cordatis, cal. acut. Roth. germ. I. II. p. 269. Hab. in apricis sylvis. Flor. per aestatem saepe apetalis. Roth.  $\mathcal{T}$

16. *montana*, caul. erectus, fol. cordat. oblongis. Lin. V. caul. lato, erecto, fol. ellipticis, crenatis, stipulis semipinnatis. Hall. belv. n.º. 567. Moris. hist. 2. p. 475. s. 5. t. 7. f. 7.  $\beta$  *Persicifolia*, caul. erecto, fol. ovato-lanceolatis serratis, Roth. germ. II. p. 271. Hab. in alpi. Lapponiae, Austriae, Germaniae, Baldo.  $\mathcal{T}$

17. *lactea*, caul. adscendente tereti, fol. ovato-lanceolatis, stipul. inciso-serratis. Smith. Flor. brit. 1. p. 247. Hab. in Angl. ericetis montosis. Fl. albido-caerulei.  $\mathcal{T}$

18. *nummularifolia*, fol. subrotundis orbiter crenatis, stipul. lanceolatis serratis, caul. brevissimo bifloro. Vill. Dauph. 2. p. 663. Allion. ped. n.º. 1640. t. 9. f. 4. Ejusd. Sp. t. 2. f. 2. Bocc. Mus. 2. t. 127. Hab. in alpi. Delphinatus et Pedemontanis.  $\mathcal{T}$

19. *cenisia*, caul. filiformibus indivisis, procumbentibus, fol. ovatis petiolatis, basi margine ciliatis, stipul. indivisis. Willd. p. 1165. Allion. ped. n.º. 1641. t. 22. f. 6. Hab. in Cenesii alpinis Bonche dictis. Flos magnus, caeruleus: calcare petalis brevior.  $\mathcal{T}$

20. *canadensis*, caul. erecto teretiusculo, fol. cordatis acuminatis dentatis glabris, stipulis integris. Ait. Kew. 3. p. 299. Hab. in Canad. et Carol. montib. altis.  $\mathcal{T}$

21. *striata*, caul. erecto semitereti, fol. ovatis cordatis acutis serratis, stipulis lanceolatis serrato-ciliatis. Ait. l. c. Habit. in Amer. bor.  $\overline{\text{T}}$

22. *pubescens*, caul. erecto villosulo tereti hinc planiusculo, fol. cordatis pubescentibus, stipulis oblongis apice serrulatis. Ait. Cum priore.  $\overline{\text{T}}$

23. *pennsylvanica*, villosulo-pubescent, caul. apice folioso, fol. late cordatis, stipul. membranaceis ovalib. subserratis. Michx. Flor. 2. p. 149. Hab. in Pensylv. umbrosis, juxta rivulos. Flor. lutei.

24. *hastata*, glabriuscula, caul. simplicissimis sursum foliosis, fol. alternis hastatis subpetiolatis, stipulis minutis denticulatis. Michx., l. c. Hab. in Carolin. montib. Fl. lutei.

25. *debilis*, caulescens, fol. subcordatis denticulatis, flor. (albis) longe pedunculatis, stipulis lanceolatis sublaceris. Mich. p. 150. Cresc. in montib. Alleghanis.

26. *mirabilis*, subcaulis, caul. triquetro, fol. reniformi-cordatis, flor. caulinis apetal. Lin. Jacq. austr. t. 19. V. florib. radicalib. corollatis abortientibus, caulinis apetalis seminferis. Lin. Hort. cliff. 407. V. montana latifolia, flores e radice. Dill. elh. 408. t. 303. f. 390. Hab. in Germania, Sueciae, nemorib. montosis. Cor. majuscula caerulea.  $\overline{\text{T}}$

27. *biflora*, caul. bifloro, fol. reniformibus serratis. Flor. dan. t. 46. V. alpina rotundifolia lutea. Bauh. pin. 199. Pluck. alm. t. 234. f. 1. Hab. in alpih. Fl. parvi, lutei.  $\overline{\text{T}}$

28. *uniflora*, caul. unifloro, fol. cordatis dentatis. Gmel. sib. 4. p. 101. t. 48. f. 5. Hab. in Sibiria  $\overline{\text{T}}$

29. *decumbens*, caulescens procumbens, fol. linearibus confertis, stipulis subulatis. Thunb. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spei. Stipulae minutae subulatae acutae. Cor. caerulea.  $\overline{\text{T}}$

30. *tricolor*, caul. angulato glabro diffuso, fol. oblongis incisiss, stipulis pinnatifidis. Lin. Hab. in cultis et sylvaticis. Cor. obscure violacea: lab. infernis colore dilatore basi macula flava. Cal. major.  $\odot$

$\beta$ . *bicolor*, erecta, cal. stipulisque ciliatis. Hoffm. germ. 2. p. 170. In Hercyn. Cor. caerulea.

31. *arvensis*, caul. angulato sulcato, fol. ovato-lanceolatis serratis, stipul. basi

incisis, cal. pubescente cor. sublongiore. V. bicolor. arvensis. Bauh. pin. Roth. germ. 2. p. 273. Hab. in agris et cultis. Petal. alba: infimum flavo-maculatum.  $\odot$

32. *rothomagensis* (pilosa), diffusa hirta, fol. oblonge petiolatis subcordato-ovatis crenatis, bract. pinnatifidis: lacinia ultima majore subovato. Thuil. par. p. 454. Hab. in montosis prope Ruten Gallorum. Flor. pallide caerulei. V. tricolori similis sed diffusa debilior et undique pilosa.  $\overline{\text{T}}$

33. *lutea*, caul. triquetro simplici, fol. ovato-oblongis crenatis ciliatis, stipul. palmato-incisis. Smith. brit. p. 248. Hab. in Angliae pascuis montosis. Flor. lutei, nigro-radiati, rarius caerulescentes. S.  $\overline{\text{T}}$  +

34. *grandiflora*, caul. triquetro simplici, fol. oblongiusculis, stipul. pinnatifidis. L. V. fol. imis subrotundis, caulinis ellipticis. Hall. helv. n<sup>o</sup>. 566. t. 17. V. montana lutea grandiflora. Bauh. Barr. ic. 692. Hab. in alpih. Helveticis, Pyrenaeis. Caul. rammosus, foliosus. Fl. maximus, flavus.  $\overline{\text{T}}$

35. *Zoysii*, caul. brevissimo erecto, fol. subrotundis crenatis, stipul. integerrimis, pedunc. triquetris. Willd. V. acaulis, scapo subtriquetro striato unifloro, flore maximo nutante flavo, calcari subulato caeruleo petalis subaequali. Host. in Jacq. Coll. 4. p. 279. t. 11. f. 1. Barr. ic. 691. Habitat in alpih. Carinth. Similis V. grandiflorae.  $\overline{\text{T}}$

36. *pumila*, fol. ovato-ellipticis crenatis, glabris, stipul. serratis, caul. erecto. Vill. dauph. 2. p. 666. V. valleria. Allioni n<sup>o</sup>. 1644. t. 24. f. 3? Cresc. in monte Coire in Delphin.  $\overline{\text{T}}$

37. *calcarata*, caul. abbreviato, fol. subrotundo-cordatis crenatis, stipul. subrotundis dentatis, nectariis calyce longioribus. Willd. V. alpina purpurea, exiguis fol. Bauh. pin. 199. Hab. in Pyrenaeis, Helveticis alpih. Caul. subnullus. Petal. subrotunda.

38. *cornuta*, caul. elongato, fol. ovatis subcordatis margine ciliatis, stipul. oblongis pinnatifidis, nect. subulatis cor. longioribus. Willd. Hab. in Pyrenaeis. Caul. longus, petala oblonga. Priori affinis.

39. *maculata*, caulescens, fol. ovatis crenatis subulatis maculatis, pedunc. axillaribus solitar. fol. longiorib. Cav. ic. 6. p. 20. t. 530. Hab. in ins. Maclovianis. Cor. patens lutea: petal. majus rubro-lineatum.

40. *rubella*, fruticosa, fol. ovato-acut. oblongis punctatis serratis, pedunc. solitariis axillarib. fol. subaequalib. Cav. l. c.

t. 531. f. 1. Hab. in St. Carlos de Chilae. Cor. rubella. h

41. *capillaris*, fruticosa, fol. ovato-acutis serratis: basi inaequali, pedunc. axillaribus solitariis fol. longiorib. Cav. l. c. p. 21. t. 531. f. 2. Cresc. in Talahuano vicinis. Stipul. lanceolatae, serraturis capillaribus, internodiis saepe longiores. C. A. V. stipulari Sw. diversa.

42. *capensis*, suffruticosa, caul. erecto, fol. obovatis serratis. Hab. ad Cap. bon. spei. h

43. *arborescens*, caul. fruticoso, fol. lanceolati. integerrimis. V. Hispanica fruticosa longifolia. Tournef. inst. 421. Barr. t. 568. Hab. in Hispan. h

\*\*\* *Floribus erectis, nec resupinatis.*

44. *stipularis*, caul. simpliciter repente, ol. ovato-lanceolatis crenatis glabris, stipulis ciliatis, pedunc. solitariis terminalib. Swartz prod. 117. Habit. in Ind. occident. St. Christophoro. h

45. *suffruticosa*, caul. procumbente, fol. lanceolatis subserratis confertis, cal. postice aequalibus. Hab. in Ind. h

46. *oppositifolia*, caul. suffruticoso, fol. oppositis, flor. racemosis. Lin. Habit. in Cumana. h

47. *Hybanthus*, arborescens scandens, aculeata, fol. oblongisobtusis glabr. Aubl. guj. 2. p. 811, t. 319. Hybanthus. Jacq. amer. 77. T. 175. f. 24. 25. Ed. pict. t. 260. Hab. in America meridion. Pedunc. multiflori. h

Obs. Species hujus subdivisionis accuratius inquirendae, numine generi Ionae s. Ionidio. Vent. (ut subgeneri hinc ad interim proposito) inseri potius debeant. V. *diandra* dubia species.

†† IONIA. Cal. 5-phyllus: foliolis basi productis. Cor. subbilabiata: calcar o. Antherae plerisque distinctae. Stigm. simplex. Caps. 1-locularis, 3-valvis: valv. medio seminiferis. (Ionidium. Vent. Jard. de Malmaison. p. 27.)

48. *Calceolaria*, hirsuta, fol. lanceolatis, petal. inferiorib. involutis. Ionidium. Vent. l. c. Willd. Sp. 2. p. 1172. Loefl. It. p. 184. Hab. in Amer. merid. et Cajen.

49. *glutinosa*, fol. alternis ovato-lanceolatis argute serratis. Vent. Hab. in Monte-Video.

50. *buxifolia*, fol. alternis obovat. integerrimis, margine revolutis. Vent. Hab. in ins. Madagasc. Juss.

51. *enneasperma*, caul. basi ramosissimo, fol. lanceolato-linearib. integerrimis. distantib. Lin. Burm. Zeyl. p. 195. t. 85. Rheed. g. t. 60. Hab. in Ind. h

52. *stricta*, fol. oppositis lanceolatis integerrimis, stipulis brevissimis, pedunc. rectis, fol. breviorib. Vent. l. c. sub Ionidio. Hab. in St. Domingo.

53. *parviflora*, fol. ovatis serratis: inferioribus oppositis, superioribus alternis. Vent. Cav. ic. 6. p. 21. Habit. in America meridion. h

54. *Ipecacuanha*, fol. ovalibus serratis glabris, petal. inferiore plano. Vent. sub Ionidio. V. fol. ovalib. margine subtusque pilosis. Lin. Pombalia. Vandelli, fasc. pl. p. 7. t. 1. Hab. in Brasilia. Rad. Ipecacuanhae albae producere dicitur. h

55. *verticillata*, fol. (verticillatis) oppositis lanceolatis integerrimis, stipul. petiolis longioribus, pedunc. cernuis longissimis. Ionidium Polygalae-folium. Vent. l. c. p. 27. t. 27. V. Viola verticillata. Ortg. Dec. pl. Solea verticillata. Sprengel in Sehrad. Jour. bot. 2. 1800. p. 190. t. 6. Hab. in Amer. meridion.

583. IMPATIENS. Cal. 2-phyllus. Cor. 5-petala, irregularis, nectario cucullato. Anth. primo sub-connatae. Caps. supera, 5-valvis.

\* *Pedunculis unifloris.*

1. *bifida*, pedunc. unifloris solitar., fol. oblongis serratis, nectar. longissimis bifidis. Thunb. prod. 41. Willd. Sp. 2. p. 11. t. 73. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *chinensis*, pedunc. uniflor. solitariis, fol. oppositis ovatis, nectar. arcuatis. Lin. Hab. in China. Caul. ruber. Flos. purpureus. ☉

3. *latifolia*, pedunc. uniflor. solitariis, fol. ovatis: serraturis lanceolatis, nectar. flore longiorib. Lin. Rheed. g. t. 48. Hab. in Ind. ☉

4. *capensis*, pedunc. unifl. solitariis, fol. ovatis: crenis piliferis. Thunb. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *oppositifolia*, pedunc. unifloris aggregatis, fol. oppositis linearib. L. Rheed. g. t. 31 ? Hab. in Zeylon. arenosis.

6. *fasciculata*, pedunc. axillarib. uniflor. aggregatis, fol. oppositis lanceolatis. Lam.

Lam. enc. t. p. 359. Rheed. g. t. 47. Hab. in Malab.

7. *cornuta*, pedunc. unifloris aggregatis, fol. lanceolatis, nectaris flore longioribus. Linn. Burm. zeyl. 41. t. 16. f. 1. Hab. in Zeylona. ☉

8. *Balsamina*, pedunc. unifloris aggregatis, fol. lanceolatis, superioribus alternis, nectar. flore brevioribus. Linn. Blackw. t. 583. Hab. sponte in Ind. Ubique colitur.

\* \* *Pedunculis multifloris.*

9. *biflora*, pedunc. bifloris, fol. ovatis serratis. Willd. l. flor. fulvis maculis rubr. Walter. carol. 219. Hab. in Carolina. †

10. *triflora*, pedunc. solitariis trifloris, fol. lineari-lanceolatis, nectarario arcuato flore longiore. Willd. Burm. zeylon. 41. t. 116. f. 2. Herm. par. 105. t. 105. Habitu in Zeylonae paludosis.

11. *natans*, pedunc. trifloris solitariis, fol. lanceolatis, nectarario brevissimo. Willd. Hab. in Ind. orient.

12. *Nolitangere* (palustris), pedunculis multiflor. solitariis, fol. ovatis, geniculis caulibus tumentibus. Fl. dan. t. 588. β. Flor. fulvis, fol. minoribus argute denticatis. Mich. 2. p. 149. Habitu in Europ. et Canad. nemoribus, locisque paludosis, humidis.

584. GRONOVIA. *Petala* 5 et *stamina* calyci campanulato inserta. *Bacca* sicca, monosperma, infera.

1. *scandens*. Linn. Jacq. ic. 2. t. 338. Coll. 3. p. 197. Hab. in Vera Cruce. Planta cucurbitacea. Caul. altissimus. Fol. urentia, pampinea. Lin. T.

585. KUHNIA. Flos compositus. Sem. solitarium: pappo plumoso. Recept. nudum.

1. *Eupatorioides*, fol. lato-lanceolatis serratis, corymbis terminalibus. Vent. Hort. Cels. p. 91. Linn. Fil. Dec. Pl. p. 21. t. 11. Gronia. Gaerin. de sem. 2. p. 411. Habitu in Pennsylvania.

2. *rosmarinifolia*, fol. lineari-lanceolatis integerrimis margine revolutis pedunc. terminalibus 1-floris. Vent. l. c. Eupatorium canescens. Orteg. Dec. Pl. p. 34. Hab. in ins. Cuba.

Obs. Genus e fam. plant. compositarum corymbiferarum Juss. ob characteres infra hac in classe oblinum locum.

AMARANTHOIDEI (gen. 536-592). *Cal.* in hac familia persistens et saepe pericarpium vices deinde gerit; in quibusdam squamis cinctus. *Cor.* o. *Filam.* 5, nunc basi in urceolum connata (Genera talia potius hinc ad classem Monodelphiam amandanda), nunc libera, setulis aliis 5. (stam. sterilia quorundam) passim interjectis. Styl. simplex aut divis. *Caps.* 1-locularis, monosperma aut polysperma. *Fol.* ut plurimum integra, nunc alternata, nunc opposita, quibusdam stipulis distincta. *Fl.* substantia sicca durabili gaudentes, capitati aut spicati, in genere *Amarantho* monioici in *Tresine* dioici sunt. Maximo *Amaranthorum* et *Caryophylleorum* affinitas in perisperm. farinaceo; sed in his cor. polypetala in illis nulla.

586. GOMPHRENA. *Cal.* 5-phyllus coloratus: exterior 3-phyllus: foliolis 2 conniventibus carinatis. *Petala* 5, rudia, villosa (*Cor.* potius o?). *Nect.* cylindricum, 5-dentatum. *Caps.* circumscissa 1-sperma. *Stylus* semibifidus.

1. *globosa*, caule erecto, fol. ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunc. diphyllis. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1321. Flos globosus. Rumph. 5. p. 289. t. 100 f. 2. Rheede 10. t. 37. Hab. in Ind. Var. Capitulis rubris et argenteis. ☉

2. *perennis*, fol. lanceolatis, capitul. diphyllis, flos. perianthio proprio distinctis. Dill. elth. 24. t. 20. f. 22. Hab. in Bonaria. T.


3. *hispida*, caule erecto, capitulis diphyllis, fol. crenatis. Rheed. mal. 9 p. 141. t. 72. Hab. in Malabar. Flor. caeruleo-ruforescentes.

4. *angustifolia*, fol. lineari-lanceolatis glabris, capitulis terminalibus oblongis subtriphyllis. Vahl. symb. 3. p. 45. In India orient. Habitus Gomphrenae, diversa tantum stylo unico. Vahl.

5. *vermicularis*, caul. repentibus, fol. subteretibus carnosius, capitulis solitariis terminalibus oblongis. Swartz. obs. p. 101. Illecebrum *vermiculatum*. Linn. Herm. parad. 15. t. 15. Pluck. alm. 27. t. 75. f. 9. Hab. in arenosis maritimis Americae calidioris. T.

6. *brasiliensis*, caule erecto, fol. ovato-oblongis, capitulis pedunculatis globosis

R



aphyllis. Lin. Jacq. ic. rar. 2. t. 346. Coll. 2. p. 278. Hab. in Brasilia.  $\text{h}$

7. *serrata*, caule erecto brachiato, capitalis solitariis terminalibus sessilibus, calyc. serratis. Lin. Sp. pl. 326. Habit. in Amer. An eadem ac *G. hispida*? vid. Lam. enc. 1. p. 120.

8. *interrupta*, caule erectiusculo, flor. spicatis sessilib. interruptis monogyn. Sw. obs. 108. L'Her. stirp. 1. p. 5. t. 3. Celosia *procumbens*. Jacq. ic. 1. p. t. 51. misc. 2. p. 344. Habit. in aridis arenosis Jamaic. austr.  $\odot$

9. *flava*, pedunc. oppositis bifidis tripartitis, capitulo intermedio sessili. Hort. cliff. 87. Hab. in Vera Cruce.

10. *arborescens*, arborescens, pilosa, subvolubilis. Lin. suppl. 173. Habit. in N. Granada. Bractee plures longitudine floris aggregati. Corollula cylindrica longitudine calycis. A congeneribus valde diversa, tamen genuina. Lin.  $\text{h}$

587. **ACHYRANTHES.** Cal. 5-phyllus. Cor. o. Squamulae 5, basi in tubum connatae, apice fimbriatae stam. alternae. Stigma 2-fidum. Sem. solitarium, cal. foliatis conniventibus obtectum. (Stipulae o.)

\* *Folii oppositis.*

1. *argentea*, fol. subrotundo-ovatis acuminatis, subtus argenteis, calycib. reflexis spicae adpressis. Willd. Spec. 2. p. 1191. Lam. encyc. 1. p. 539. Bocc. sic. 16. t. 9. Pluck. alm. 260. f. 2. Hab. in Sicilia et ad Cap. b. spei.  $\odot$

2. *aspera*, fol. obovatis acutiusculis, basi attenuatis, calyc. reflexis spicae adpressis. Willd. A. *obtusifolia*, caul. erecto, fol. ovato-cuneiformibus obtusis pubescentibus, cal. glabris. Lam. l. c. enc. 1. p. 539. Burm. zeyl. 15. t. 5. f. 3. Pluck. alm. 26. t. 10. f. 4. Mill. dict. t. 11. f. 2. Hab. in Zeylona, Jamaica. Planta est diuretica et antedysenterici. a.  $\text{h}$

\* *fruticosa*, caul. erecto, fol. ovatis calycibusque glabris. Lam. l. c. An Rumph. amb. 6. t. 12. f. 1? Hab. in India. Frutex 5-6-pedalis. Spicae longae.

3. *lappacea*, caule fruticoso diffuso, fol. glabris ovatis acuminatis basi attenuatis, spica interrupta, flosculis lateralibus utrinque fasciculo setarum uncinato. Willd. P. 1192. A. atropurpurea. Lam. encyc. 1.

p. 546.  $\beta$ ? A. *styracifolia*, caul. herbacea, spic. albida. Lam. Burm. zeyl. 47. t. 18. f. 1. Pluck. alm. 93. t. 82. f. 2. Rheed. 10. t. 59. Hab. in Ind. Ad latera florum lateralium utrinque penicillus purpureus, e setis rigidis uncinatis.  $\text{h}$

4. *echinata*, caule erecto pubescente, fol. ovatis acutis basi attenuatis subtus pubescentibus, spica interrupta, flosc. lateralibus utrinque fasciculo setarum uncinato. Willd. Retz. obs. 2. p. 12. Hab. in Ind.  $\text{h}$

5. *muricata*, caule fruticoso patulo, fol. alternis laevibus, floribus spicatis remotis ovatis, cal. squarrosos. Lin. A. *alternifolia*. Mant. 50. et 344. Hab. in Aegypto, Arabia. Facie Celosiae. Pistil. stigma bifido. Semen 1, nudum, durum. Linn.

6. *patula*, caule fruticoso patulo pubescente, flor. spicis orbiculatis echinato-uncinatis, (bract. 2, calyciformibus patulis.) Lin. suppl. 160. Habit. in India orient.  $\text{h}$

7. *prostrata*, caul. prostratis fruticosis, spicis oblongis, flosc. binatis utrinque fasciculato setarum uncinato. Lin. Hab. in Ind. Spicae e dichotomia pedunculatae, virides, apice purpureascentes.  $\text{h}$

8. *Monsoniae*, caul. ramosis tomentosis, fol. verticillatis subulatis pungentibus, spic. ovato-cylindricis tomentosis terminalibus. A. *pungens*. Lam. enc. 1. p. 546. Illecebr. Monsoniae. Lin. fl. Pluck. Mant. 11. t. 334. f. 4. et t. 357. f. 4. Hab. in Indiis.

9. *sanguinolenta*, caule ramoso, fol. oppositis petiolatis ovato-acutis, spic. terminalibus congestis. Lam. enc. 1. p. 546. Linn. Sp. 2. p. 294. Illecebrum. Linn. Willd. p. 1204. Rumph. 7. t. 27. f. 2. Fol. rubra. Pistill. purpureum.  $\text{h}$

10. *brachiata*, caule erecto herbaceo brachiato, fol. oppositis glabris lanceolato-ovatis, spic. tomentosis lateralibus. Lin. Mant. p. 50. Illecebr. Lin. Willd. p. 1203. Pluck. alm. 11. t. 334. f. 5. Habit. in Ind. orient.  $\odot$

11. *halimifolia*, caul. repentibus dichotomis ramosissimis, fol. obovatis carnosus, capitulis axillaribus. Lam. enc. 1. p. 547.  $\beta$ . Burm. amer. t. 21. f. 2. Hab. in Peru prope Limam.  $\beta$ . in Antillis.  $\text{h}$

12. *sarmentosa*, fol. ovatis acuminatis alternis, spicis axillaribus, caule suffruticoso. Vahl. symb. 2. p. 44. Habit. in Ind. orient.  $\text{h}$

13. *polygonoides*, caule decumbente

tetragono, fol. ovato-cordatis, spicis laxis laevib. Retz. obs. 2. p. 12. Digera arvensis. Forsk. descript. 65. Hab. in Arabia felici, India.

14. *altissima*, caule suffruticoso scandente, panic. terminalibus axillaribusque ramosis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 522. Sloan. hist. 2. p. 142. t. 91. f. 2. Hab. in sylvis montium Jam. An Celosia? h

15. *nivea*, fol. verticillatis ovatis tomentosis, corymb. compactis dichotomis, flor. corollatis. Ait. Kew. 1. p. 286. Hab. in Canariis. h

16. *stellata*, fol. senis linearibus pelucidis-maculatis, flor. corymboso-dichotomis. Willd. Hab. in Guinea. Stipulae numerosae membranaceae albae diaphanae lanceolatae setula terminatae. W. h

17. *corymbosa*, fol. quaternis linearibus mucronatis pubescentibus, flor. corymboso-dichotomis. Willd. p. 1196. Syst. Veg. p. 204. Polia arenaria. Loureiro. fl. cochin. p. 204. Bocc. mus. 44. t. 39. Pluck. alm. 134. t. 86. f. 6. Hab. in Zeylona. h

18. *tenuifolia*, fol. oppositis lineari-subulatis subtus carinatis, flor. corymbosis. Willd. Hab. in Sierra Leona.

19. *dichotoma*, caul. suffruticosis, fol. oppositis linearibus planis acutis, cyma dichotoma. Lin. Hab. in Virginia. Similis A. corymbosae.

20. *ficoideum*, caul. repentibus glabris, fol. lanceolatis in petiolum attenuatis, capit. axillaribus pubescentib. nitidis. Illecebrum. Lin. Willd. p. 1208. Gomphrena. Lin. S. N. Jacq. amer. ed. pict. t. 90. Hab. in Amer. litoribus, et in Hisp.

β? *sessile*, caul. repentib. bifarie tomentosis, fol. lanceolatis subsessilibus, capit. oblongis glabris. Lin. sub Illecebro. Alternanthera. Forsk. Pluck. alm. t. 133. f. 1. Rumph. 6. t. 15. f. 1. Rheed. 10. t. 9. In Ind. Caul. purpureus. Fol. in tenellis serrata. Lin.

\* \* Fol. alternis.

21. *alternifolia* (globosa), caul. erecto, fol. echinis subglobosis, capit. oppositifoliis. Lin. suppl. p. 159. Pluck. alm. t. 260. f. 1. In Ind. orient. ⊙

22. *javanica*, caul. erecto subsimplici incano, fol. alternis oblongis tomentosis, spic. numerosis terminalibus. Illecebrum javanicum. Lin. Willd. p. 1205. Achyrantes alopecuroides. Lam. encyc. 1. p. 548. Iresine javanica. Burm. ind. t. 65. f. 2.

β. *persica*, fol. obovalibus panic. terminali, spic. simplicib. longissimis. Burm. l. c. t. 65. f. 1. sub Iserine. Aerva tomentosa. Forsk. secundum. Vahl. symb. 2. p. 44. Hab. in India. Cal. hyalinus: carina viridi. h

23. *bengalensis*, caul. erecto herbaceo, fol. alternis oppositis lanceolatis pubescentibus. Lin. Mant. sub Illecebro. Lam. enc. 1. p. 549.

24. *lanata*, caul. diffusis suberectis, fol. alternis ovatis petiolatis spic. lateralibus tomentosis. Lam. enc. 1. p. 548. Illecebr. Act. Willd. Burm. zeyl. t. 26. f. 1. Rheed. 10. t. 29. Hab. in Ind. Caul. rigidus, subtenuis, parum villosus. Var. fol. rotundis. Retz. obs. bot. 2. 13. ⊙

25. *Amaranthoides*, caule fruticoso diffuso, fol. alternis ovato-acutis petiolatis laevibus, spic. filiformibus terminalibus, flor. remotis. Lam. enc. 1. p. 549. Rumph. amb. 5. t. 83. f. 2. Hab. in ins. Java et Molluccis. Stigm. 5. Amaranthus frutescens. H. P. et Dumont-Courset, Bot. Cultiv. 1. p. 648. Digera frutescens. Juss. h

26. *ciliata*, caul. herbaceo, fol. altern. ovato-acutis glabris, petiol. ciliatis, spicis axillaribus filiformibus solitariis, flor. remotis subquarrosis. Lam. l. c. Hab. in Ind. orient. Flor. antecedenti et fol. amaranthis similis. Lam.

588. CELOSIA. Cal. 3-phyllus, corollae 5-petale facie. Stam. basi nectario plicato conjuncta. Caps. horizontaliter dehiscens. Styl. 2-3-fidus. (Fol. opposita.)

1. *argentea*, fol. lanceolatis, stipul. subfalcatis, pedunc. angulatis, spicis scariosis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1197. Knorr. del. 1. t. 11. Rheed. 10. t. 38. et β. t. 39. Fol. linearib. Hab. in China. ⊙

2. *albida*, foliis linearib. lanceolatis, caule exstipulato, spicis ovatis, bracteis longitudine corollae. Willd. C. pyramidalis. Burm. ind. 65. t. 25. f. 1. Hab. in Ind. orientali. ⊙

3. *margaritacea*, fol. ovatis, stipulis falcatis, pedunc. angulatis, spicis scariosis. Lin. Rheed. 10. t. 38. Hab. in Malabar. Simillima C. argenteae. Stamina purpurea. ⊙

4. *cristata*, fol. oblongo-ovatis, pedunc. teretibus substriatis, spicis oblong. Lin. Lam. ill. t. 168. f. 1. Rumph. 5. t. 84. Hab. in Asia. Var. fol. angustis et latis, et flor. flavis ac rubris. ⊙

5. *comosa*, spicis cylindricis comosis, fol. lanceolatis. Retz. obs. 6. p. 26. Hab. in India orient. Spicae superne steriles et saepius divisiae, comosae evadunt e bracteis minutis imbricatis. Caps. operculata disperma. Retz.

6. *paniculata*, fol. ovato-oblongis, caul. assurgente paniculato, spicis alternis terminalibus remotis. Lin. Sloan. hist. 1. t. 91. f. 1. Hab. in Jamaicae occidentalis saxosis aridis. Caulis prostratus. Stigma trifidum. ☉

7. *nitida*, fol. ovato-deltoidibus attenuatis, spicis terminalibus ramosis, flor. distinctis, caul. suffruticoso. Vahl. symb. 2. p. 44. Sloan. hist. 1. p. 142. t. 91. f. 5. Hab. in India occident.

8. *coccinea*, fol. ovatis strictis inauriculatis, caul. sulcato, spicis multiplicibus cristatis. Lin. Hab. in Ind. ☉

9. *castrensis*, fol. lanceolato-ovatis lineatis acuminatissimis, stipulis falcatis, spicis cristatis. Linn. Barr. rar. t. 1195. Bocc. mus. t. 66. Hab. in Ind. ☉

10. *corymbosa*, fol. linearibus verticillatis glabris, flor. corymboso-dichotomis. Willd. Retz. obs. 2. p. 13. Hab. in Ind. orientali. Similis Achyranthi corymbosae. Willd. An diversa? ☞

11. *caudata*, fol. ovatis, racemis compositis laxis longissimis, pistillo bifido, caule exstipulato. Vahl. symbol. 1. p. 21. Hab. in Arabia felici.

12. *trigyna*, fol. ovatis acuminatis planis, caule herbaceo, racemo laxo, bract. scariosis, pistillo trifido. Willd. Jacq. hort. 3. p. 12. t. 15. Lam. ill. t. 168. f. 2. Hab. in Senegallia. ☉

13. *virgata*, fol. ovatis acuminatis undulatis, caule suffruticoso, racemo laxo, bract. membranaceis, pistillo trifido. Willd. C. *virgata* fruticosa glabra, fol. caulinis spatulatis, ramis lanceolatis, flor. aggregatis spicatis. Jacq. ic. 2. t. 339. Collect. 2. p. 279. Hab. . . h

14. *polygonoides*, fol. cordatis, caule hispido, racemo spicato laxo, flor. trigynis. Retz. obs. 2. p. 12. Hab. in Malab. Caps. urceolata. ☞

15. *baccata*, fol. cordatis acuminatis, racemo spicato laxo, flor. trigynis, fructibus baccatis. Willd. Retz. obs. 5. p. 23. Hab. in Ind.

16. *gnaphaloides*, fruticosa lanata, fol. oppositis ovatis subius albis, capitulo globoso-pedunculato. Lin. suppl. 161. Hab. in

Mente - Video in Brasilia. An Illecebrum? +

17. *nodiflora*, fol. cuneiformibus acutiusculis, spicis globosis lateralibus. Lin. Jacq. hort. t. 68. Burm. zeyl. 16. t. 5. f. 2. Pluck. alm. 27. t. 133. f. 2.

18. *elongata*, fol. ovalibus basi attenuatis incanis, spicis terminalibus longe pedunculatis nudis subcapitatis. Sprengel in Schrad. bot. Journ. 1800. p. 196. Hab. . . (H. P.)

19. *glauca*, fol. alternis lineari-lanceolatis carnosius canis, cor. unceolari: limbo 5-dentato, stylo 3-partito. Wendland Hort. Herrenh. p. 4. t. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Cap. 1-locularis, in 2 partes dehiscens, sem. ad repleta. h

Obs. An forte distincti generis? cum a Celosia differt: cor. 1 - petala nec 5 - petala, caps. perpendiculariter, nec transversim dehiscens et stylis tribus.

589. ILLECEBRUM. Cal. 5-phyllus: laciniis apice fornicatis. Cor. o. Stigma simplex, aut bifidum. Caps. 5-valvis, 1-sperma.

1. *verticillatum*, fol. subrotundis, flor. verticillatis nudis, caul. procumbentibus. Lin. Fl. dan. t. 335. Hab. in Europae paucis ulis, locis praesertim arenosis. ☞

Obs. Inter omnes Linnæi species, dicit b. Gaertner (de fruct. et sem. 2. p. 218), solum I. *verticillatum* characteri generico Linnæoano respondet, reliquae ad Paronychiam, Achyranthem et Celosiam debent referri:

2. *aristatum*, flor. subfasciculatis, fol. lanceolatis arceis aristatis. Ait. Kew. 1. p. 290. Hab. in Canariis. ☞

3. *canariense*, fruticosum, fol. ellipticis acutis, stipulis bracteisque ovatis brevioribus, panic. terminalibus dichotomis. Lin. suppl. 161. Hab. in Teneriffa. h

4. *cymosum*, caule ramoso erecto, fol. subtereibus glabris aristatis, flor. cymosis, bract. brevissimis. Villars de genere Illecebro, in Schrad. Journ. f. d. Bot. 1801. p. 406. cum ic. Lin. Willd. Sp. 2. t. 1206. (exc. syn. quae ad sequentem speciem pertinent.) Hab. in Hisp. et Mons-peliis. ☉

5. *echinatum*, caulib. prostratis, fol. obovato-acuminatis scabris, capitul. axillaribus echinatis. Vahl l. c. p. 409. Desf.



atl. 1. p. 204. Moris. s. 5. t. 20. f. 5. Bocc. sic. t. 20. f. 3. Hab. in Gallia meridionali, Lusitania et Barbaria.

6. *Paronychia*, flor. bracteis nitidis obvallatis, caul. procumbentibus, fol. laevibus. Lin. *Paronychia nitida*. Gaertn. de fr. 2. p. 218. Hab. in Hisp. et Narbona, et in Delphinatu. Styl. bifidus.  $\overline{\text{L}}$

$\beta$ . *polygonifolium*, caul. prostratis, fol. ovato-lanceolatis glabris, flor. lateralibus terminalibusque. Vill. l. c. Hab. in Delphinatu alpinis, etiam in Lusitan. in monte Estrella. Link.

$\gamma$ . *italicum*, fol. glabris oblongo-lanceolatis sursum bracteisque oppressis, ramis erectis, flor. lateralibus terminalibusque. Vill. l. c. p. 420. (*I. Paronychia italica*.) Hab. in Italia et circa Marseille. An prioris var. ?  $\overline{\text{L}}$

8. *narbonense*, caul. prostratis hirsutis, fol. lanceolatis acutis, margine scabris, flor. lateralibus. Vill. p. 411. l. argentum. Pourr. Chlor. p. 321. Hab. prope Narbonam. Cal. margine subpellucidus, deorsum hirtus, intus nervis 3 distinctus. Priori affine.

9. *maritimum*, caulib. prostratis, fol. oblongis acutis, margine scabris, flor. lateralibus. Vill. Circa Aix a cl. Jussieu detectum. I. *Polygonifolio* S. *Paronychia* habitu simile. V.  $\overline{\text{L}}$

10. *lugdunense*, caul. prostratis ramissimis, hirsutis, fol. lanceolatis binis, bract. quaternis semilanceolato-linearibus. Vill. Hab. ...  $\overline{\text{L}}$

*Obs.* Haec et antecedens species, dicit cl. Villars, *Herniarias* exacte referunt, quae ulterius hinc examinari debent, an forte illius generis sint.

11. *serpyllifolium*, caul. nodosis ramosis prostrato-repentibus, fol. obovato-lanceolatis subcaruosis, margine ciliatis, flor. bracteis occultatis terminalibus. Vill. Dauph. 2. p. 558. Hab. ad littora flum. Duranæ, prope Grenoble, Gay, etc.

$\beta$  ? *Herniarioides*, caul. nodosis repentibus prostratis, fol. ovato-cordatis ciliatis, flor. terminalibus. Vill. in Journ. bot. p. 413. l. *Herniarioides*. Pourr. Chlor. p. 321. Fol. et bract. majores quam in priore. Germen concium. Styl. simplex.  $\overline{\text{L}}$

12. *capitatum*, flor. bract. nitidis occultatis capit. terminalia, caul. erectiusculis, fol. ciliatis, subtus villosis carinato-oblongis appressis. Lob. ic. 420. Hab. in G. Narbonensi, Hispania, in colibus prope Montelimar et in Oriente.

13. *niveum*, caul. suberectis ramosissimis, fol. patentib. villosis, bract. maxim. flores occultantib. Enc. bot. 5. sub *Paronychia*. Borrel. ic. 687 et 725 ? Hab. in Gallia merid. et in Hispania.

14 ? *subulatum*, radice crassa, caule erectiusculo, fol. subulatis longis, florib. terminalib. Enc. bot. sub *Paronychia*. Hab. in Ind. Juss.

15. *divaricatum*, flor. bracteis subfasciculatis, pedunc. dichotomis paniculatis, foliis ovato-oblongis petiolatis. Ait. Kew. 1. p. 291. Hab. in Canar.  $\odot$

16. *arabicum*, flor. sparsis congestis, bracteis nitidis æquantibus, caul. procumbentib. Corrigiola *albella*, fol. oppositis, stipulis hyalinis. Forsk. descr. 207. Hab. in Arabia. Simill. l. *Paronychia*, at Flor. non in capitula terminalia, et bract. non flore longiores. L.

17. *striatum*, caul. erecto cymoso ramoso, cal. striatis. Enc. bot. 5. p. 25. sub *Paronychia*. Hab. Fol. subsagittulata. Rami magis denudati quam in reliquis. l. c. A Commerson detectum.

18. *dichotomum*, caul. erecto pluries dichotomo, fol. distantibus oblongis muticis, flor. cymosis. Enc. bot. l. c. Hab. ... (Herb. Juss.) Caul. elongati subnulli.

19 ? *linearifolium*, caul. recto villosa, fol. linearibus longis capitulis terminalib. Enc. bot. p. 26. sub *Paronychia*. In Herb. Juss. Bract. argenteæ. Capit. majuscula, passim sphaerica.

20. *frutescens*, caul. fruticoso dichotomo, fol. oppositis pulverulentis. l'Herit. stirp. 1. p. 75. t. 37. Hab. in aridis Limæ. An *Achyranthes* ?  $\eta$

21. *alsinifolium*, caul. diffusis, foliis ovatis, florib. congestis, bracteis nitidis. Mant. Scop. del. ins. t. 13. Tournef. hist. 508. Habit. in Hispania.

*Obs.* Plures species hujus generis, accuratius adhuc examinandi, vide sub genere *Achyranthis*.

590. ANYCHIA. Cal. connivens : laciniis oblongis, apice subsaccato. Cor. o. Filam. distincta : setulis nullis interpositis. Stigm. 2, oblonga. Caps. utricularis, non dehiscens. Sem. 1, subreniforme. (Fol. opposita, stipulacea. Stam. passim 3.)

1. *Herniariae*, humifusa pubescens, fol.

oblongo-ovalibus ciliatis aristatis. A Herniarioides. Michaux, Flor. 1. p. 113. Hab. in arenosis Carolinae septentrionalis. Cal. laciniae acumine setaceo distinctae.

2. *Argyrocoma*, cespitosa procumbens subpubescens, fol. linearibus acutissimis, capit. fasciculato-terminalibus, cal. apice barbatis. Michaux, l. c. Hab. in Carolinae superioris rupibus. Illecebr. Paronychiaae habitus.

*Obs.* Hoc ad genus, Illecebris valde affine, b. Michaux etiam retulit Queriam canadensem L., quam in planta sylvestri fere semper 5-andram et in culta saepe tantum 2-andram observavit.

591. *GYMNOCARPON*. Cal. 5-partitus, coloratus, persistens. Cor. o. Stam. 10: alterna sterilia. Stigma simplex. Semen 1, cal. indurato tectum.

1. *fruticosum*. Trianthema fruticosa. Vahl. symb. p. 32. G. decandrum. Gmel. syst. p. 429. Desf. Atl. 1. p. 203. Juss. gen. pl. Hab. in Aegypto et in deserto prope Cassam. Diffusa, caul. nodosis. Fol. opposita subulata, stipulacea. Cal. purpurasc.

592. *HAGEA*. Cal. 5-phyllus. Petala 5, emarginata. Stylus simplex. Caps. 3-gona, 1-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *Teneriffae*, caule herbaceo prostrato, fol. spatulatis subacuminatis. Polycarpea. Lam. in Journ. d'Hist. nat. 2. p. 3. t. 25. Hab. in monte lamoso: Le Pic. ins. Teneriffae.

*Obs.* Ad evitacionem nominis conformitatis Polycarpeae cum Polycarpon, cuius habitum refert, cl. Ventenat illud in inventoris memoriam Hortulani Lahaye commutavit.

2. *gnaphalodes*, caul. suffruticoso prostrato, fol. oblongis tomentosis, flor. terminalibus congestis. Schousb. Maroc. 1. p. 117. Roth. N. Bot. Beyr. p. 170. sub Illecebro. Polycarpaea microphylla. Cav. in Annal. de ciencias natur. n.º 7. p. 25. Hab. prope Magadore in arenosis.

*Obs.* Ob caps. 3-valvem et ob petala manifesta ab Illecebro differt, forte una alterave species ex Amaranthoideis adhuc hujus loci sunt.

593. *GLAUX*. Cal. 1-phyllus, co-

loratus, 5-lobus. Cor. o. Caps. 1-locularis, 5-valvis, 5-sperma, cal. cineta.

1. *maritima*. Linn. Flor. dan. t. 548. Hab. in Europ. e. Americae maritimis, salsis. ¶

594. *BUTTNERIA*. Cor. 5-petala. Nectar. 5-phyllum. Filamenta apice nectarii inserta. Caps. 5-cocca, muricata.

\* *Aculeatae*.

1. *scabra*, fol. lanceolatis dentatis basi subbistatis, rachi, petiolis cauleque angulato aculeatis. Willd. Sp. 2. p. 1117. Jacq. amer. p. 76. Hab. in Amer. merid. Samentosa, aculeis recurvis. h

\* *carthagenensis*, fol. ovatis, costa petiolisque aculeatis. Jacq. amer. ed. picta. p. 41. Hab. Carthagenae in monte Popa.

2. *tereticaulis*, fol. lanceolatis acuminatis integerrimis, rachi, petiolis cauleque tereti aculeatis. Willd. p. 1118. Lam. l. c. 1. p. 517. Cavan. diss. 5. p. 292. t. 149. f. 2. Hab. in Peru. h

3. *microphylla*, fol. ellipticis integerrimis emarginatis, aculeis stipularib. Willd. Jacq. hort. t. 29. Lam. enc. 1. p. 517. Cav. diss. 5. p. 292. t. 148. f. 2. Hab. in America. Rami flexuosi. Fol. remota, ovalia. h

4. *ovata*, fol. ovatis serratis, petiolis inermibus, ramis 5-angularibus aculeatis, caule erecto. Lam. enc. 1. p. 516. Cavan. diss. 5. p. 291. t. 149. f. 1. Habit. in Peru. h

5. *cordata*, fol. cordatis inermibus, pedunc. subternis inaequalibus septemfloris. Flor. Peruv. 3. p. 9. Cav. diss. 5. p. 291. t. 150. Hab. in Provinciae Chancay sepibus. Incolae fol. contusis ad morsus araneorum utuntur. h

6. *sulcata*, fol. cordato-ovatis serratis, costa petiolisque aculeatis, pedunc. geminis 3-5-floris. Flor. Per. 3. p. 10. In Peruv. praeruptis calidis. Pedunc. declinati, bracteolis deciduis involucrati.

7. *hirsuta*, fol. cordatis acutis crenatis, costa petiolisque aculeatis, peduncul. congestis compositis. Flor. Per. l. c. Hab. in Andium montibus. Flor. umbellati, involucrati.

\* \* *Inermes*.

8. *herbacea*, fol. cordatis acuminatis, dentatis eglandulosis, caule inermi herba-

ees. Willd. Roxb. corom. 1. p. 28. t. 29. Hab. in cacumine montium Ind. ¶

9. *catalpacifolia*, fol. cordatis integerrimis, caule scandente ineremi. Willd. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 21. t. 46. Hab. ad Caracas. ¶

595. *AYENIA*. *Cal.* inferus, 5-partitus. *Petala* 5, apice in stellulam connexa, unguibus capillaribus longis in coronæ formam arcuatis. *Glandulæ* 5, stamini-formes, erectæ, petal. disco insidentes. *Nectar.* cyathiforme, 5-fidum. *Stam.* sub petalis circa crenam inserta iisque recondita. *Caps.* depressa, 5-sulcata, 5-locularis, 5-valvis : valvulis bifidis, elasticè dehiscens. *Sem.* solitaria. (Flor. Per. 3. p. 11.)

1. *pusilla*, foliis ovatis argute serratis, caul. prostratis. Flor. Per. 1. c. Cav. diss. 5. p. 289. t. 147. Sloan. jam. hist. 1. p. 209. t. 132. f. 2. Hab. in Jamaica et Peruviae præruptis calidis. Suffruticosa habitu Poterii sanguisorbæ. *Caps.* 5-coeca, muricata.

2. *laevigata*, fol. ovatis integris glaberrimis, germine pedicellato, nectario decemfido radiato. Swartz. prod. 97. Hab. in Jamaica. ¶

3. *tomentosa*, fol. ovato-subrotundis tomentosis. L. Hab. in Cumana.

4. *magna*, fol. cordatis pubescentibus, florum germine sessili, nectario concavo. L. Hab. in Cumana. ¶

*Obs.* Hoc et antecedens genus potius ad eorum familiam, ad *Malvaceam* in classem Monodelphiam transportanda.

596. *GLUTA*. *Cal.* campanulatus, deciduus. *Petala* 5, inferne adglutinata columnæ (stipiti) germinis. *Filam.* apici columnæ inserta. *Germen* columnæ insidens. Fruct. ...

1. *Benghas*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1120. Hab. in Java. Arbor. Fol. alterna sessilia. Panic. terminalis. pedunculata. Passifloris affinis. An potius ad Gynandriam pertinet? ¶

† *MUSACEÆ PENTANDRÆ*, genera 597-598.

597. *HELICONIA*. *Spatha* univer-

salis partialesque. *Cal.* o. *Cor.* supera, 3-petala. *Nect.* 2-phyll. *Stigma* 1. *Caps.* trilocularis : loculis monospermis.

1. *caribæa*, fol. basi apiceque rotundatis, spadice erecto radicalibus, spathis distichis multifloris, nectarii folio superiore indiviso. Willd. Sp. 2. p. 1187. Lam. enc. 1. p. 421. Plum. gen. 50. ic. 59. Hab. in ins. Caribæis. Corolla virescens. Filam. alba. ¶

2. *Bihai*, foliis basi apiceque acutis, spadice erecto radicalibus, spathis distichis multifloris, nectarii folio superiore trifido. Willd. Swartz. obs. 96. t. 5. f. 2. H. tuteo-fusca. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 25. Musa *Bihai*. Lin. Hab. in Amer. calidiore, locis subudis montosis. Habitus Musæ, 12-pedalis. Corollæ croceæ, nectarium caeruleum. ¶

3. *humilis*, foliis basi angustatis apice acuminatis, spadice erecto flexuoso radicalibus, spathis distichis multifloris, nectarii folio superiore tridentato. Willd. 1. c. H. fol. basi angustatis, nervis simplicissimis, nect. alutato. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 23. t. 48. 49. Musa *humilis*. Aubl. guj. 2. p. 931. Hab. ad Caracas et in Gujana. ¶

4. *psittacorum*, fol. basi rotundatis inflorescentiaque glaberrimis, spadice caulino, nectario lanceolato concavo. Andr. t. 124. Lin. suppl. 158. Hab. in Surinamo, Jamaica. Flor. coccinei, apice fuso. ¶

5. *hirsuta*, fol. basi rotundatis glaberrimis, spadice caulino flexuoso hirsuto, spathis distichis multifloris, nectario lanceolato. Willd. p. 1188. Linn. suppl. 158. Hab. in America merid. Germen hispidum. Cor. curva dipetala. Petalum superius complicatum hispidum, interius apice macula fusca notatum. ¶

\* *indica*, fol. utrinque attenuatis, spathis paucissimis multifloris. Lam. enc. 1. p. 426. Rumph. 5. t. 62. f. 2. In Ind. et in ins. Molluccis. †

598. *STRELITZIA*. *Spatha* universalis, partialesque. *Cal.* o. *Cor.* supera 3-petala : lacin. majoribus subhastatis. *Nect.* 3-phyllym genitalia involvens. *Stigma* 3. *Caps.* 3-locularis : loculis polyspermis.

1. *Reginæ*, foliis parallelo-costatis. Willd. Spec. 2. p. 1190. Ait. Kew. 1. p. 285.

R 4

t. 2. *Heliconia alba*. Lin. suppl. 157. Hab. ad Cap. b. spei. Folia radicalia petiolata oblonga, subtus glaucescentia. Petioli tripedales et ultra, scapi longitudine. Spatha margine purpurascens. Petala lutea. Nect. caeruleum. Ait. T.

2. *angusta*, fol. costatis reticulato-venosis. Willd. l. c. Thunb. prod. 45. *Heliconia Bihai*. Lin. suppl. 157. Hab. ad Cap. b. spei. T.

#### АРОЧНЫЕ. *Contortae*. L. (Gen. 599-628.)

Plantae terrennes aut lignosae. Succus lacteus saepius acris, causticus. Fol. opposita, aut verticillata, rarissime, alterna, simplicia, indivisa, integerrima. Flor. plerumque extra-axillares. *Cal.* quinquepartitus imae corollae appressus. *Cor.* 1-petala, regularis. Tubus subnullus mediocris, longus: limbus 5-partitus; laciniis plus minus obliquatis. Appendix corollina, (Nect. Linn.) processibus marginalibus forma variantibus; rarius nulla. *Stamin.* 5. Filam. brevissima aut longiuscula; plana, conniventia. Anth. cordatae 1. sagittatae, acuminatae 5. caudatae raro apice membranaceo obsusae, 2-locul. *Pollen* particulosus: particulis plus minus cohaesibilibus, seu rarius intra singulos antherae loculos in clavulam solidam luteam concretus. Ex binis ejusdem Antherae clavulis polliniciis, altera a dextra, altera a sinistra suam dirigit extremitatem attenuatam in formam filamentum elastici; cujus ope adnectitur minutissimo corpusculo fusco, supra singulas rimulas stigmaticas adfixo. Istud autem corpusculum, sponte decedens s. avulsum, sibi appensus retinet binas clavulas pollinicas, ex binis antheris proximis prodeuntes. *Ovar.* unicum, oppositum s. bisulcum, biloculare; ovalis ex axi propendentibus: peracta fecundatione plerumque bipartibile, rarius indivisum. *Stilus* unicus modo brevissimus, modo intra promissum Corollae tubum longus. Stigma: corpusculum crassum, attenuatum s. coarctatum Ovarii apici subsessiliter impositum, ad ambitum rimulis quinque stigmaticis, antheris alternantibus exaratum: seu plerumque tuberculum discoideum s. cylindraceum petalatum stylum terminans, vario processu saepe superatum, ambitu solo viscida materie illinitum. *Folliculi* gemini, (alterius abortionem solitarii,) discretis rarissime maturitate tantum separabiles; 1-loculares, interiore facie dehiscences, raro etiam utroque margine

tuncque bivalves: in paucioribus vero, baccatus seu drupaceus, 2-locularis; posterioris Nuce simplicis s. geminae. *Recept.* in Folliculo 1-valvi ad suturam, qua dehiscente saepius fit liberum, positum, in 2-valvi ad alterum marginem: in aliis ex axi ortum habet. *Sem.* plura, propendentia s. retrorsum imbricata; modo coma basilari ascendente quasi papposa; modo membranaceo-alata, seu etiam nulla; in Bacca Drupaeque interdum paucissima, rarissime etiam solitaria. *Embryo* Albumine carnosio inclusus, directione Seminis, rectus: Cotyledonibus Radicula cylindrica latioribus, plano-appressis. Rich. - A Linnæo nonnulla genera rubiacea ex gr. *Gardenia*, *Genipa* perperam ad hanc familiam sunt relata. Quaedam in prima divisione secundum Jussieu collocata genera Apocynceis tantummodo affinia sunt, hinc ab aliquibus ab hac familia separantur.

+ *Fructus baccatus aut drupaceus.*

#### 599. STRYCHNOS. *Cor.* tubulosa, 5-fida. *Bacca* 1-locularis, cortice lignoso.

1. *Nux vomica*, fol. ovatis, caule inermi. Lin. Fl. zeyl. 91. Willd. Spec. 2. p. 1052. Roxb. corom. 1. p. 8. t. 4. Blackw. t. 395. Hab. in Ind. Bac. polysperma. H.

2. *colubrina*, fol. ovatis acutis, cirrhis simplicibus. Linn. Rheed. mal. 7. p. 10. t. 5. Blackw. t. 403. Rumph. 2. t. 37. Hab. in Ind. H. +

3. *potatorum*, fol. oppositis ovatis, acut. quintuplinerviis venosis, cymis axillarib. Willd. Roxb. 1. p. 9. t. 5? St. Tetan-kotta. Retz. obs. 2. p. 12. Hab. in montosis ad Madras. Corol. fauce villis albis clausa. Bacca magnitudine Cerasi monosperma. For. albiissimi aromatici. H.

Obs. Planta a Clar. Roxburg descripta forte nova species est, ob fol. simpliciter venosa. Willd.

4. *brachiata*; fol. oppositis ovatis oblongisque acuminatis 5-nerviis, caul. brachiato tereti, flor. corymbosis. Flor. Per. 2. p. 30. t. 157. Hab. in Peruv. nemorib. imis. Rami longissimi, penduli, granulosi. Pedunc. axillares. Cor. extus hirsuta. H.

#### 600. IGNATIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* longissima, infundibuliformis. *Drupa* unilocularis, poly-

sperma. *Sem.* irregularia, angulata.

1. *amara*. Lin. suppl. 149. Willd. p. 1053. vid. Juss. gen. pl. Hab. in Ind. Arb. ramosissima, sarmentis scandentibus. Fol. ovata spithamea. Panic. axillares. Fruct. ovatus, magnitudine Pyri. Lín. h

601. THEOPHRASTA. *Cor.* campanulata; laciniis obtusis. *Caps.* pulposa, 1-locularis, globosa, maxima, polysperma.

1. *americana*, fol. longissimis repandentatis acutiusculis. Lin. Willd. Spec. 2. p. 824. Eresia. Plum. gen. 8. ic. 126. Hab. in Amer. equinoctiali. Fruct. pomi mediocris magnitudine, croceus, rugosus, sem. rubra carnosa continens. Pulpa edulis. h

2. *longifolia*, fol. mucronato-dentatis acuminatis. Willd. Jacq. Coll. 4. p. 156. Ad Caracas in America. Fol. utrinque attenuata.

602. ANASSERA. *Cal.* parvus, 5-fidus. *Cor.* urceolata, 5-loba, intus villosa. *Stigma* didymum. *Caps.* oblonga, 2-valvis, 2-locularis.

1. *borbonica*, fol. ovatis obtusiusculis, corymbis lateralibus. Anasser. Lam. ill. 2. p. 40. Juss. gen. pl. p. 150. Hab. in Borbonia.

2. *moluccana*, fol. lanceolatis acutis, corymbis subterminalibus. Lam. l. c. Rumph. 7. p. 12. t. 7. Hab. in Molluccis.

603. FAGRÆA. Contorta. *Cal.* campanulatus 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: tubo longissimo. *Bacca* carnosa, 2-locularis, polysperma. *Sem.* globosa.

1. *zeylanica*. Thunb. N. G. pl. et in Act. Holm. 1782. p. 125. t. 4. Lam. ill. t. 167. Willd. Sp. 2. p. 830. Fol. opposita obovata, integra, stipulacea? An Rubiacis affinis? h

604. MELODINUS. Contorta. *Cor.* hypocrateriformis: fauce corollula 5-fida lacera. *Stigma* 2. *Bacca* carnosa, 2-locularis, po-

lysperma, magna. *Sem.* compressa.

1. *scandens*. Lin. suppl. p. 169. Willd. p. 1274. Lam. ill. t. 179. Hab. in N. Caledonia. Fol. oblongo-ovata. Planta revera digyna? h

605. RAUWOLFIA. Contorta. *Cor.* tubulosa, basi globosa. *Bacca* succulenta, disperma.

1. *nitida*, fol. quaternis lanceolatis acuminatis glaberrimis nitidis, flor. terminalibus. Willd. Sp. 2. p. 1217. Jacq. amer. dict. n. 2. Plum. gen. 19. ic. 236. f. 1. Hab. in Amer. merid. h

2. *canescens*, fol. quaternis oblongo-obovatis acuminatis pubescentibus, flor. terminalibus axillaribusque. Willd. R. hirsuta. Jacq. amer. ed. pict. t. 259. f. 17. Plum. ic. 261. f. 2. Pluck. phyt. 266. f. 2. Hab. in Jamaica, et in fruticulis Garibaerum. Cymae pedunculatae in dichotomia caulis. Willd. h

3. *tomentosa*, fol. quaternis oblongis utrinque attenuatis tomentosis, flor. terminalibus et axillaribus. Jacq. amer. ed. pict. t. 46. Hab. Carthagenae in rupestribus. *Cor.* candida. Limbus *cor.* in R. pubescente obtusus, in R. tomentosa acutus. Willd.

4. *flexuosa*, fol. oblongis obovatisque angustis, racem. flexuosis paucifloris. Flor. Per. 2. p. 26. t. 102. Hab. in Peruv. frutic. Flor. in culta saepe 4-andri. *Cor.* albolutca. l. c.

5. *macrophylla*, fol. obovatis ovatisque emarginatis integerrimisque, racem. erectis multifloris. Flor. Per. l. c. t. 102. f. b. Hab. in Peruv. collibus arenosis. *Cor.* lutescens. Stam. saepe 4.

606. VALLESIA. *Cal.* minimus. *Cor.* hypocrateriformis, utrinque globosae. *Stam.* fauci inserta. *Drupa* 2, divergentes. *Nux* striato-reticulata, 1-locularis.

1. *dichotoma*, fol. ovatis acutis undulatis, racemis dichotomis. Flor. Peruv. 2. p. 26. t. 151. Cresc. in rudiculis in Peruvia. h

2. *cymbaefolia*, fol. lanceolatis cymbaeformibus apice incurvis. Orteg. Dec. p. 58. Rauwolfia glabra. Cav. ic. 3. p. 50. t. 297. Willd. p. 1218. Hab. in N. Hispan. *Cor.* alba.

607. **OPHIOXYLON**. *Cor.* tubulosa filiformis, medio incrassata: limbo 5-partito. *Stigma* capitatum. *Bacca* didyma, 2-locularis, 2-sperma. Planta polygama. Flor. masculi, hermaphroditis mixti, 2-andri. *Juss.*

1. *serpentinum*, fol. verticillatis, flor. terminalibus conglomeratis. Lin. syst. ed. Reich. 4. p. 329. Rumph. 7. t. 16. Rheed. 6. t. 7. Lam. ill. t. 842. f. 3. Habit. in Zeylona. *h*

2. *Ochrosia*, fol. verticillatis, florib. dichotome corymbos. *Ochrosia*. *Juss.* gen. pl. Hab. in ins. Borbonia. Priorem speciem ita adaequat habitu, ut vix genere mihi distingui videatur. *h*

608. **CARISSA**. *Cal.* brevis. *Cor.* tubulosa. *Stam.* inclusa. *Bacca*, 2-locularis: loculis 1-2-aut polyspermis.

\* *Spinosae.*

1. *Carandas*, foliis ovatis mucronatis reticulato-venosis, laciniis corollae lanceolatis. Willd. Sp. 2. p. 1219. Lam. ill. t. 118. f. 1. *Carandas*. Rumph. p. 7. t. 25. Hab. in Ind. *h*

2. *spinarum*, fol. ovatis acutis venosis, laciniis cor. lanceolato - oblongis. Vahl. symbol. 1. p. 22. Lam. ill. t. 118. f. 2. Rumph. 7. t. 19. f. 1. Habit. in India orientali. *h*

3. *salicina*, fol. lanceolato - oblongis mucronatis venosis, versus petiolum angustioribus, florib. fasciculatis subcorymbosis. Lam. enc. bot. 1. p. 554. Hab. in India. Sonner. An prioris var.? sed fol. multo angustiora et flor. ad dimidium minores. Lam. *h*

4. *Arduina*, fol. cordato-ovatis mucronatis subsessilibus, spinis apice bifidis. Lam. l. c. p. 554. *Arduina* bispinosa. L. Willd. Sp. 2. p. 1117. Mill. ic. t. 300. Flor. albi. *Bacca* disperma. Habit. ad Cap. bon. spec. *h*

5. *edulis*, fol. ovatis acutis aveniis, ramis superne villosis, laciniis cor. lanceolato-linearibus. Vahl. symb. 1. p. 22. Antura. Forsk. descr. 63. Hab. in Arabia felici. *h*

\*\* *Inermes.*

6. *inermis*, inermis, fol. ovato-cordatis mucronatis aveniis. Vahl. symb. 3. p. 43. Hab. in Ind. orient. *h*

7. *mitis*, inermis, fol. lanceolatis attenuatis. Vahl. symb. 3. p. 44. t. 59. Hab. in Ind. orient. *h*

609. **GYNOPOGON**. Contorta. *Stigma* bilabiatum, apice villosum. *Drupa* nuce semibiloculari.

1. *stellatum*, fol. verticillatis ternis lanceolatis. Forst. prod. n°. 117. Willd. Sp. 2. p. 1221. Hab. in Societatis Americorum insulis. *h*

2. *Alyxia*, fol. verticillatis quinis obovatis. Forst. prod. n°. 118. Hab. in Norfolkiae insula. *h*

3. *scandens*, fol. oppositis ovatis coccatis. Forst. prod. n°. 119. Hab. in Societatis insulis. *h*

610. **CERBERA**. Contorta. *Cor.* infundibuliformis: tubo clavato. *Drupa* monosperma: nuce 2-loculari, 4-valvi.

1. *Ahopai*, fol. ovatis acutis. Willd. Sp. 2. p. 1222. C. laciniis cor. undulatis, cal. foliolis reflexis. Andrew. t. 231. *Ahopai* major. Pis. bras. 308. Hab. in Brasilia. Cor. flava. *h*

2. *ovata*, fol. ellipticis obtusis. Willd. C. fol. ovatis sparsis subsessilibus, flor. terminalibus subquinis. Cav. ic. 3. p. 35. t. 270. Habit. in N. Hispania. Cor. lutea. *Stigm.* clavatum, umbell. referens. Cavan. *h*

3. *parviflora*, foliis stellatis obovatis. Forst. prod. n°. 121. Hab. in ins. Americorum. *h*

4. *Manghas*, fol. lanceolatis: nervis transversalibus. Linn. Petiv. gaz. t. 16. f. 4. Burm. zeyl. 150. t. 70. f. 1. Rumph. 2. t. 81. Hab. in Indiis ad aquas. *h*

5. *undulata*, fol. lanceolatis utrinque attenuatis undulatis, cymis ramosis divaricatis axillaribus. Andrew. t. 130. *Cerb. maculata*, fol. maculatis, etc. Willd. Sp. p. 1223. *Ochrosia* maculata. Jacq. ic. rar. 2. t. 321. Hab. in ins. Borbonia.

*Obs.* D. Andrew maculas in foliis tanquam praeternaturale quid et in speciminibus siccis a nimia pressione forte ortas respicit. Cor. candida, ore amoene rubro.

6. *Thevetia*, fol. linearibus longissimis confertis, cor. lac. truncatis. Jacq. amer. 48. t. 34. Pluck. alm. t. 207. f. 3. Hab. in Cuba et Martinica rarius. Noces pro crepitaculis Americanorum inserviunt. *h*

\* *Peruviana*, fol. lineari - lanceolatis confertis longis, pedunc. brevissimis paucifloris. C. Thoretia. Flor. Peruv. 2. p. 27. Hab. in Peruviae nemoribus e fructibus, Cascabeles nuncupatis, Indi reticulas longas conficiunt quas strepitus causa in choris ad collum et genua appendunt.

*Obs.* Haec peruviana planta a priori diversa videtur. Germ. in hac 4-gonum, in illa, secundum Jacquin, subrotundum; stig. in hac capitatum, acuminatum, denticulis 20 - recurvis ornatum, in illa capitatum subovatum, apice bifido. Jacq. Pedunc. huic suboctoflori, breves in illa saepius uniflori. J.

611. GELSEMIUM. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo patente 5-lobo subæquali. *Caps.* compresso-plana 2-partibilis, 2-locularis. *Sem.* plana, valvularum marginibus adnexa. *Juss.*

1. *sempervirens*. Bignonia sempervirens. Lin. *G. nitidum*, scandens glaberrimum, fol. lanceolatis, flor. fasciculis axillaribus paucifloris, flor. luteis suaveolentibus. Michaux. Flor. 1. p. 120. Hab. in Amer. bor. maritimis. h

++ *Fructus bifollicaris.*

\* *Semina nuda s. basi non comosa aut papposa, saepe margine membranaceo aucta.*

612. VINCA. Contorta. *Cor.* hypocrateriformis, fauce 5-gona. *Folliculi* 2, erecti, teretes, angusti. *Sem.* oblonga, nuda.

1. *minor*, caulib. procumbentibus, fol. oblongo-lanceolatis, margine glabris. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1232. Blackw. t. 59. Hab. in sylvis. Sempervirens. h

2. *herbacea*, caul. procumbentibus, fol. oblongo-lanceolatis edentulis, cal. ciliatis. Rotaib. Pl. hong. p. 8. t. 8. Hab. in apricis arenosis et in calcariis prope Budam, vere. L

3. *major*, caul. declinatis, fol. ovatis, junioribus margine ciliatis, flor. pedunculatis. Willd. Hab. in Gallia Narbonensi, Hispania, Helvetia, etc.

4. *lutea*, caule volubili, fol. oblongis. Lin. Moen. acad. 4. p. 307. Catesb. car. 2. p. 53. p. 53. Hab. in Carolina. Facies Echitis. Willd. h

5. *rosea*, caule suffrutescente erecto, flor. geminis sessilibus, fol. ovato-oblongis, petiolis basi bidentatis. Linn. Mill. dict. t. 186. Hab. in Madag., Java. Var. fol. villosis. h

6. *parviflora*, caul. herbaceo erecto, fol. (rhomboidco-) lanceolatis, flor. geminis involucrentis. Retz. obs. 2. p. 14. *V. pusilla*. Lin. suppl. 166. Murr. Comment. goett. 1772. p. 66. t. 4. f. 1. Hab. in Traquebariae hortis, vitum summum. Corol. Lithospermi officinalis magnitudinis et colore. C

613. MATELEA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* rotata. *Antheræ* in capitatum 5-gonum conjunctæ. *Stigma* dilatata. *Folliculus* 1, (altero saepius abortivo) verrucosus, 5-gonus. *Sem.* plana, margine crenata.

1. *palustris*. Aubl. guj. 1. p. 278. t. 109. f. 1. Lam. ill. t. 179. Hostea viridiflora. Willd. Sp. p. 1274. Hab. in Gujan. paludosis. Fol. oblongo - ovata acuminata et  $\beta$ . fol. latiora. Aubl. f. 2. Flor. axill. T

614. PLUMERIA. Contorta. *Cal.* obtusus, minimus, deciduus. *Cor.* infundibuliformis, tubo subcurvo. *Stigma* 2 - fidum. *Folliculi* 2, dorsum flexi, longi verticosis. *Sem.* oblonga, basi ala membranacea (crenato-dentata) aucta.

1. *rubra*, foliis ovato-oblongis, petiolis biglandulosis. Lin. Willd. p. 1242. Catesb. carol. t. 92. Ehret. t. 10. Hab. in Jamaica, Surinamo. Arb. procera ramosa.

2. *alba*, fol. lanceolatis revolutis, pedunc. superne tuberosis. Lin. Jacq. Amer. t. 174. f. 2. ed. picta. t. 38. Plumier. Sp. ic. 231. In Jamaica. Priorie habitu, sed parum ramosa.

3. *purpurea*, fol. oblongo-ovatis, margine revolutis, cor. rubris. Flor. Per. 2. p. 20. t. 137. Hab. in Peruv. hortis. Cor. quam in reliquis speciebus minor, fragrantissima: ore laeviter lutescente. l. c. h

4. *incarnata*, fol. ovato-oblongis acutis, cor. incarnatis disco fulvo. Flor. Per. l. c. t. 138. Cum priorie. Flor. cymosombellata. Nimis affinis sequenti dicitur. h

5. *carinata*, fol. oblongo-ovatis acuminatis carinatis: marginibus planis rubris, cor. magnis tricoloribus. Flor. Per.

6. *ar.* Cor. in centro lutea, extus ad medium alba, superne rubescens. *h*

6. *tricolor*, fol. oblongis acutis, marginibus planis venosis, cor. tricoloribus. Flor. Per. t. 139. Cor. tubus ruber, faux crocea, limbus albo-roseus.

*Obs.* Plumieriae nostrae, dicunt auctores Flor. Peruvianae, inter se differunt colore et magnitudine florum (quare forte varietates aut subspecies tantummodo sunt) et cum nec color, nec magnitudo speciem mutat, nobis satis visum est illas seorsim describere. Etiam cum iis potius Plumieria quam Plumeria dicendum est hoc genus, quod comprehendit arbores formosissimas et gratissimas.

7. *obtusata*, fol. lanceolatis petiolatis obtusis. Linn. Catesb. car. 2. p. 93. t. 63. Plum. i. c. 232. Habit. in America calidiore. *h*

8. *purpurea*, flor. limbo clausis. Jacq. amer. 37. Habit. in Amer. hortis, ubi, secundum Jacquinum, sub nomine *Donnellas* sive *Virgines*, eo quod nunquam explicentur corollae, quae flavescences et omnium odoratissimae sunt, coluntur.

615. CAMERARIA. *Cal.* minimus acutus. *Cor.* infundibuliformis: tubo utrinque ventricosus. *Anthere* filo longo terminatae. *Folliculi* 2, basi utrinque bilobi, horizontales. *Sem.* imbricata membranae (alae) inserta.

1. *latifolia*, fol. ovatis acuminatis parallelo-costatis nitidis, flor. corymbosis terminalibus. Willd. Sp. 2. p. 1245. Andr. t. 16. Mill. dict. Jacq. amer. 37. t. 182. f. 86. Plum. gen. 18. ic. 72. f. 1. Hab. in America calidiore. Cor. alba: fundo flavescens. *h*

2. *zeylanica*, fol. ovato-oblongis acuminatis parallelo-costatis, corymbis terminalibus, axillaribusque. Willd. Hab. in Zeylona. For. minores. *h*

3. *lutea*, fol. ovato-oblongis acuminatis reticulato-venosis, umbella pedunculata pauciflora. Willd. Lam. encyc. 1. p. 566. C. *Tamaquarina*. Aubl. guj. 1. p. 260. t. 102. *β. gujanensis* fol. ovatis acuminatis, floribus parvis axillaribus odoratis. Aubl. guj. 1. p. 262. Hab. ad ripas amnis Galibiensis Gujanae. *h*

4. *angustifolia*, foliis linearibus. L. Plum. gen. 18. ic. 72. f. 2. Hab. in America calidiore. *h*

616. TABERNÆMONTANA. *Contorta*. *Cor.* hypocrateriform. tubus angulato-striatus, basi subglobo-us. *Folliculi* 2, horizontales. *Sem.* pulpae immersa. (Fol. opposita.)

1. *citrifolia*, fol. ovatis, floribus lateralibus glomerato-umbellatis. L. Jacq. amer. 38. t. 125. f. 13. ed. pict. Plum. gen. 18. ic. 248. f. 2. Hab. in America. *h*

2. *laurifolia*, fol. ovalibus obtusiusculis. Mill. dict. n.º 3. Jacq. amer. p. 39. t. 103. Hab. in Jamaica. *h*

3. *echinata*, fol. ovato-oblongis acuminatis, flor. glomerato-umbellatis, fructibus echinatis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 263. t. 103. Hab. in Gujana. *h*

4. *grandiflora*, fol. caule dichotomo, calycibus inaequalibus laxissimis. Mant. 53. Jacq. amer. 40. t. 31. Hab. Carthagenae. Cal. fol. alba: exteriora 2 cordata. *h*

5. *cymosa*, fol. ovato-lanceolatis, flor. cymosis. Jacq. amer. 39. t. 181. f. 14. Hab. Carthagenae. Fol. semipetalia. Folliculi rubrescentes pulpa aurantia. *h*

6. *amygdalifolia*, fol. ovali-lanceolatis, staminibus tubum corollae superantibus. Willd. Jacq. amer. 39. t. 181. f. 15. Hab. in Carthagenae sylvaticis. *h*

7. *discolor*, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. axillaribus bifloris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 535. Hab. in Jamaica. *h*

8. *persicariaefolia*, fol. lanceolatis acuminatis, flor. racemosis. Willd. p. 1245. Jacq. ic. rar. 2. t. 320. Collect. 4. p. 159. Hab. in insula Mauriti. *h*

9. *arcuata*, fol. obovatis oblongis acuminatis, corymb. ternis multifloris, folliculis revolutis-arcuatis. For. Per. 2. p. 22. t. 143. Copiose in Peruviae nemoribus, ad Pozuzo vicum. Arbor succo lacteo, copioso scatet, qui aëri expositus in gummiresinam condensatur.

10. *Sananho*, fol. oblongis acuminatis, corymb. biquadrifidis, fructibus obovato-subrotundis acuminatis. Flor. Per. t. 144. In Peruv. nemoribus. Follic. obtuse digoni. Cor. tubus longissimus. *h*

11. *elliptica*, herbacea, fol. subternis lanceolatis. Thunb. jap. 111. Hab. in Japonia. Affinis T. Amsoniae. L. *¶*

12. *alternifolia*, fol. alternis, caule ar-



borescente. L. Rheed. t. t. 43. Hab. in Malabar. h

617. **AMSONIA**. Contorta. *Cor.* infundibuliformis, fauce clausa. *Folliculi* 2, erecti. *Sem.* teretia nuda oblique truncatis. (Stigma margine annulari. *Fol.* alterna.)

1. *latifolia*, caule glabriusculo, foliis ovali-lanceolatis: superioribus acuminatis. Michaux. Flor. 1. p. 12. Tabernem. Amsonia. Lin. Willd. p. 1246. Hab. in umbris humidis sylv. Carolinae.

*Obs.* Cultae fol. minus acuminata et subglabra. M.

2. *angustifolia*, fol. angusto-linearibus crebris erectis pubescentibus. Michaux. l. c. A. ciliata. Walt. In Georgiae sabulosis apricis.

618. **URCEOLA**. Contorta. *Cor.* urceolata. *Nectar.* cylindricum integrum, germen cingens. *Folliculi* 2, 1-loculares, 2-valves. *Sem.* pulposa.

1. *elastica*. Roxb. in Asiat. researches. 5. p. 167. 87. Sprengel in Schrad. Journ. bot. 1800. 2. p. 236. Hab. in India. Flor. paniculati Succus here coagulatus, resinam offert elasticam, *Kacoutchouk* similem.

\* \* *Semina basi comosa s. papposa.*

619. **NERIUM**. Contorta. *Cal.* 5-partitus parvus, persistens. *Cor.* infundibuliformis, fauce coronula lacera. *Folliculi* conniventes longe acuminati.

1. *Oleander*, foliis lanceolatis angustis ternis, subtus costatis, cal. laciniis squarrosis, nect. planis tricuspidatis. Willd. Sp. 2. p. 1234. Ait. Kew. 1. p. 206. Desfont. Atl. 1. p. 208. Lam. ill. t. 174. Pulchra haecce Arbucula, per totam aetatem, florens, sponte crescit in India, et in Atlante ad fluviorum ripas. Val. flor. albis.

2. *odorum*, fol. lineari-lanceolatis ternis subtus costatis, laciniis calycinis erectis, nectaris multipartitis filiformibus. Willd. p. 1235. N. *odoratum*, - anth. superne barbato-plumosis. Lam. enc. 3. p. 456. Rheed. 9. t. 2.  $\beta$ . Flor. plenis. Herm. lugdb. 447. t. 449. Hab. in India orientali. Priore tenebris, et in caldariis colendum. h

3. *salicinum*, fol. lineari-lanceolatis

ternis enervis. Vahl. symb. 2. p. 45. Forsk. descr. 205. Hab. in Arabia felici. h

4? *obesum*, foliis oblongo-lanceolatis sparsis, subtus villosis. Vahl. symb. 2. p. 45. Forsk. descr. 205. Hab. in Arabia felici. h

5. *zeylanicum*, fol. lanceolatis oppositis, ramis rectis. L. Burm. zeyl. 23. t. 12. f. 2. Hab. in India. h

6. *divaricatum*, fol. lanceolatis-ovatis, ramis divaricatis. L. Hab. in India. Flor. albi.  $\sigma$

7. *antidysentericum*, fol. ovatis acuminatis petiolatis, follic. apice connexis. Lam. enc. 4. p. 457. Burm. zeyl. 167. t. 77. Rheed. 1. t. 47. Hab. in Malabar, Zeylona, Russia. Flor. albi, odorati. h

8. *coronarium*, fol. ellipticis, pedunc. ex dichotomia ramorum geminis bifloris. Ait. Kew. 1. p. 297. Jacq. ic. rar. 1. t. 52. Coll. 1. p. 138. Burm. zeyl. t. 59. Rumph. 4. p. 87. t. 59. Rheed. 2. t. 54. Hab. in India orientali. Corona petaloidea duplex. An *Tabernaemontana*? Lam. l. c. h

420. **STROPHANTHUS**. Contorta. *Cor.* infundibuliformis: laciniis longissime caudate. *Coronula* faucis dentibus 10 simplicibus.

1. *sarmentosus*, glaber sarmentosus, floribus sub-glomeratis terminalibus et lateralibus, antheris in filum productis. Decand. in Bulletin de Sciences par la soc. Philom. n<sup>o</sup>. 64. p. 123. t. 8. f. 1. Hab. in Sierra-Leone in Africa. Flor. cum foliis nascuntur, magni, rubri. h

2. *laurifolius*, glaber erectus? fol. subternis, flor. glomeratis terminalibus (post folia nascentibus), anther. in filum productis. Decand. l. c. Hab. in Africa. Non sarmentosus. *Var.* fol. oppositis et ternatim verticillatis. h

3. *dichotomus*, ramis pedunculisque dichotomis, fol. mucronato-acuminatis. Decand. Hab. in India. Echites *caudata*, cor. infundibuliformibus: apicib. thecarib. longissimis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1240. Burm. ind. t. 26. Anth. priorum.

$\beta$ . *rotundata*, fol. ovato-rotundis. Nerium candatum. Lam. enc. 3. p. 458. Hab. in India. Arb.

4. *hispidus*, totus piloso-hispidus, anther. acutis muticis. Decand. l. c. t. 8. f. 2. In Africa. Loco stipularum fasciculus pilorum adest. Lacin. cor. omnium longissimae ad 7 uncias. h

621. *ECHITES*. Contorta. *Folliculi* 2, longi, recti. *Sem.* coma instructa. *Cor.* infundibuliformis, fauce nuda. *Antheræ* conniven-tes in conum.

1. *biflora*, caul. sarmentosis, fol. oblongis, pedunculis subbifloris. Jacq. amer. 38. t. 21. ed. picta. t. 28. Willd. Sp. 2. p. 1237. Plum. amer. 82. t. 66. Nerium sarmentosum, fol. oppositis oblongis acutis, subtus cinereis, tubo floribus fauce ampliato. Brown. jam. 180. Hab. in Caribæis. Flor. candidi cum fauce lutea. Pedunc. 1-4-flori. h

2. *quinqueangularis*, pedunculis racemosis, fol. obovatis acuminatis. Jacq. amer. 32. t. 25. ed. picta. t. 32. Hab. in America meridionali. Flor. flavo-virescentes. Non lactescit. J. h

3. *annularis*, caule volubili, cor. hypocrateriformibus, tubo annulo elevato. Lin. suppl. 166. Hab. in Surinamo. Caul. scaber. Sigma annulo cinctum. L.

4. *tomentosa*, fol. cordato-oblongis acuminatis, caulique hirsutis, floribus racemosis pilosis. Vahl. symb. 3. p. 44. Hab. in Cajen.

5. *suberecta*, pedunc. multifloris, cor. cylindraceis extus hirsutis, fol. subovatis mucronatis subtus pubescentibus. Swartz. obs. 104. Andrew. t. 187. Jacq. amer. 32. t. 26. Sloan. jam. 89. hist. 1. p. 206. t. 130. f. 2. Hab. in Jamaica. Flor. lutei magni. Succus lacteus venenatus. h

6. *domingensis*, pedunc. racemosis, fol. cordato-ovatis rigidiusculis subtus discoloribus, caule volubili. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 529. Jacq. ic. rar. 1. t. 53. Collect. 1. p. 73. In fruticetis maritimis Jamaicae, Hispaniolae. h

7. *agglutinata*, pedunculis racemosis, fol. ovatis emarginatis acuminatis. L. Jacq. amer. 31. t. 23. ed. picta. t. 30. Hab. in fruticetis montosis in Domingo. Flor. parvi, candidi. T

8. *Asperuginis*, pedunculis racemosis, folliculis filiformibus, fol. oblongis acutis superne asperis, caule volubili. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 531. Apocynum scandens, siliquarum externa parte vestibitis haerente. Plum. ic. 26. Hab. in fruticetis siccissimis Jamaicae, Hispaniolae. Antecedenti similis. h

9. *torulosa*, pedunc. subracemosis, fol. lanceolatis acuminatis, follic. torulosis longis. Jacq. amer. 33. t. 27. ed. picta. t. 34. Swartz. obs. 105. Brown. jam. 181. t. 10.

f. 2. Lam. ill. t. 174. f. 1. Hab. in Jamaica. h

10. *umbellata*, pedunc. umbellatis, fol. ovatis obtusis mucronatis, caule volubili. Jacq. amer. 30. t. 22. ed. picta. t. 29. Sloan. jam. 89. hist. t. p. 207. t. 131. f. 2. Hab. in Jamaica ca. Flor. magni, albi, tubo longissimo viridant. Jacq.

11. *circinalis*, pedunc. axillaribus articulatis multifloris, laciniis corollae undulatis, fol. ellipticis, caule volubili. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 533. Hab. in sepibus montosis Hispaniolae. h

12. *floribunda*, racemis compositis corymbosis, fol. ellipticis acuminatis, costatis, ramis erectiusculis. Willd. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 534. Hab. in fruticetis, montium Jamaicae. h

13. *trifida*, pedunc. trifidis multifloris, fol. ovato-oblongis acuminatis. Jacq. amer. 31. t. 24. ed. picta. t. 31. Hab. in America. Flor. tubo longo purpurascante, limbo sordide virente. J. h

14. *repens*, pedunc. racemosis, fol. lanceolato-linearibus angustis, follicul. torulosis. Jacq. amer. 33. t. 28. ed. picta. t. 35. Hab. in Domingo rupestribus et ad marg. sylvarum. h

15. *corymbosa*, racemis corymbosis, staminibus eminentibus, fol. lanceolato-ovalibus. Jacq. amer. 34. t. 30. et picta. t. 37. Swartz. obs. 105. Hab. in sylvaticis Insulae Domingo. h

16. *costata*, pedunc. cymosis, fol. elliptico-lanceolatis acuminatis. Forst. prod. n°. 123. Rheed. 9. t. 14. Hab. insulis Societatis. h

17. *spicata*, spicis axillaribus, brevibus, staminibus eminentibus, fol. subovatis distichis. Jacq. amer. 34. t. 29. ed. picta. t. 36. Hab. in sylvis Carthagenae, ubi arbores vicinas ad 60 pedum altitudinem scandit. h

18. *siphilitica*, fol. ovatis subpetiolatis glaberrimis costatis, paniculis dichotomis, floribus spicatis. Lin. suppl. 167. Hab. in Surinamo. Decoctum herbae Surinamensis in Siphilitide notissimum. h

19. *glandulosa*, fol. cordato-subrotundi acuminatis tomentosis glanduliferis, pedunc. racemosis. Flor. Per. 2. p. 19. t. 135. In Peruviae nemoribus. Plant. tomentosa. Caul. ad articulationes et folia ad cordaturam et per petiolis (et stipulae) glandulifera. h

20. *laxa*, fol. cordatis acutis, basi multiglandulosis, pedunc. longis laxis racemosis

paucifloris. Flor. Per. l. c. t. 131. f. b. Hab. in Pillao nemorib. Plant. parum villosa. Rami filiformes subvillosi. h

21. *acuminata*, glabra, fol. ovatis oblongisque acuminatis basi glandulis 5, racemis brevibus, pedicellis geminis. Flor. Per. t. 134. f. a. Cresc. in sylvis Chinchao ad Macora praedium. Cor. alba, extus purpureasc.

22. *hirsuta*, fol. oblongo-ovalibus acuminatis basi excavatis, subius villosis, racemis multifloris. Flor. Per. 2. p. 19. t. 136. In Peruviae nemorib. Fol. ad basin glandula 1-2-praedita. Cal. in flore acutus, in fructu obtusus. L. c.

23. *subsagittata*, fol. oblongo-sub-sagittatis acuminatis: angulis posticis obtusis, pedunc. paucifloris. Flor. Per. l. c. Cum priore. Fol. margine ciliatis, basi glandulosa. L. c.

24. *puberula*, fol. ovali-lanceolatis basi utrinque acutis subius puberulis, flor. parvis fasciculato-corymbosis. Michaux. Flor. 1. p. 120. L. *difformis*. Walt? In Carol. inferioris sylvis. Follic. graciles, 1/2 pedales.

25. *scholaris*. fol. subverticillatis oblongis, follic. filiformibus longissimis, umbellis compositis. L. Lignum scholare. Rumph. 2. t. 82. Rheede 1. t. 45. Hab. in India. h

Obs. Arbor ramis ad genicula tantum foliatis, cujus lignum ad varia utensilia adhibetur, inter alia ex eo tabulae conficiuntur, superficie altera figuris variis ornata, altera laevissima, in qua pueri in scholis scribere solent.

26. *truncata*, cymis pedunculatis subsexfloris, lobis corollarum truncatis. Lam. enc. 2. p. 340. Catesb. Car. 2. p. 53. t. 53. Hab. in ins. Bahama. E. *biflora* subsimilis affirmatur. +

27. *lappulacea*, pedunc. racemosis hispida, flor. oppositis follic. utrinque hispidolappaceis. Lam. l. c. Plum. Spec. 2. Mss. 2. t. 70. Burm. Amer. t. 26. Cresc. a St.-Domingo. Cor. alba. +

28. *succulenta*, aculeis binis extrafoliaceis, fol. linearibus subius tomentosis, cor. hypocrateriformibus. Lin. suppl. 167. Hab. ad Cap. b. spec. Filam. barbata. h

29. *bispinosa*, aculeis binis extrafoliaceis, fol. lanceolatis glabris, cor. hypocrateriformibus. Lin. suppl. p. 167. Hab. ad Cap. b. spec. Var. prioris? Fructus hi bini posteriores succulenti lactescentes bispinosi, ut absque visa fructificatione Euphorbias crederes. L. h

622. *PERGULARIA*. Contorta. Nect. ambiens genitalia cuspidibus 5 sagittatis. Cal. hypocrateriformis: tubo cal. longiore. Folliculi 2, sapius asperi.

1. *glabra*, fol. ovatis acutis glabris, caula fruticoso. Willd. Spec. 2. p. 124. Flos pergularius. Rumph. 5. t. 29. f. 2. Hab. in India. h

2. *edulis*, fol. obvatis integris glabris, caule herbaceo volubili. Thunb. prod. 38. Hab. ad Cap. b. spec. h

Obs. Est *Cynanchi* species secundum Andrew. Repos. p. 8. t. 185.

3. *tomentosa*, fol. cordatis tomentosis. L. Vahl. symb. 1. p. 23. Asclepias cordata. Forsk. descr. 49. Hab. in Arabia. h

4. *purpurea*, fol. cordatis glabris, cor. laciniis lineari-oblongis glabris, umbel. Vahl. symb. 3. p. 44. Asclepias (cordata). Burm. ind. 72. t. 27. f. 2. Hab. in India orientali, China

5. *japonica*, fol. cordatis glabris, cor. laciniis ovatis interne villosis, umbel. simplicibus. Thunb. jap. 111. Hab. in Japonia.

Obs. Cel. Andrew, qui hoc genus ad classem Gynandriam decandriam amandat, sequentem nectarii dedit characterem; *Nectarium* duplex, genitalia involvens: squamulae exteriores 5 cuspidatae, quinque interiores (quae vera filamenta?) membranaceae: singula occultans stamina (antheras?) duo alterna (quae tunc non pistillo uti in Gynandris sunt adnexa. Secundum eundem P. *glabra* (cui fol. vere ovata sunt) et *japonica* eandem efficit speciem, ab eo P. *minor* denominatam et depictam, nec non P. *purpurea* a *tomentosa* haud diversa, quas sub nomine P. *odoratissima*, fol. senioribus subtomentosis, cor. viridibus, conjunxit; vid. Ejus Rep. t. 185.

623. *PERIPLOCA*. Contorta. Cor. rotata 5-partita; corona (Nect.) urceolata 5-fida, faucem ambiente, setas 5 exs-rent. *Stigma* capitatum, 5-gonum. Folliculi 2.

1. *græca*, floribus interne hirsutis terminalibus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1248. Jacq. Misc. 1. p. 11. t. 1. f. 2. Lam. ill. t. 177. Hab. in Syria, Sibiria. Stigma 10-crenatum. h

2. *mauritiana*, fol. ovatis longe acuminatis, flor. racemosis, fruct. horizontaliter

patentib. Poiret in Enc. bot. 5. p. 188. Cyn. mauritanum. Lam. Enc. 2. p. 236. Rumph. 5. t. 10. Rheed. g. t. 11. In India.

3. *Secamone*, floribus interne hirsutis paniculatis, fol. lanceolato-ellipticis. Secamone. Alp. aegypt. 133. t. 134. Hab. in Aegypto. Differt a praecedente primo intuitu floribus minutis copiosis. h

4. *laevigata*, cor. glabris, laciniis obtusis, cymis trichotomis, fol. oblongo-lanceolatis venosis laevibus, caule glabro. Willd. Ait. Kew. 1. p. 301. P. puniceaefolia caule fruticoso lento, fol. lanceolatis. Car. ic. 3. p. 9. t. 217. Hab. in Canariis. Cor. interne luteo-viridis, laciniis macula fulva notatis. W. h

5. *angustifolia*, cor. glabris, laciniis emarginatis, cymis trichotomis, fol. lanceolatis aveniis laevibus, caule glabro. Willd. p. 1249. Desf. Atl. 1. p. 209. P. fruticosa, fol. aveniis angusto-lanceolatis perennantibus, folliculis horizontalibus basi oppositis. Billard. ic. pl. Syric. 2. p. 13. t. 7. Hab. in Syria et Atlante. Cor. interne purpurea, in medio macula alba notata. h

6. *esculenta*, glabra, fol. lineari-subulatis, racemis elongatis simplicibus, florib. interne nudis. Lin. suppl. 168. Roxb. corom. 1. p. 13. t. 11. Pluck. amal. 19. t. 359. f. 6. Hab. ad littora fluminum Zeylonae et Malabaricae. Var. latitudine foliorum. W. h

7. *emetica*, cor. glabris, corymbis paucifloris axillaribus, fol. lineari-lanceolatis aveniis. Willd. p. 1250. Retz. obs. 2. p. 14. Willd. phytog. 1. p. 6. t. 5. f. 2. In Ind. h

8. *indica*, spicis axillaribus, imbricatis, fol. ellipticis obtusis mucronatis, caule glabro. Willd. p. 1251. Burm. zeyl. 187. t. 83. f. 1. Pluck. mant. 17. t. 359. f. 2. Hab. in Zeylona. h

9? *capsularis*, fol. lanceolatis integerrimis oppositis, cymis axillaribus diffusis. Forst. prod. n.º. 126. Hab. in Nova Zelandia. +

10. *africana*, fol. ovatis acutis, flor. corymbosis, caule hirsuto. Willd. Jacq. misc. 1. p. 13. t. 1. f. 3. Comm. rar. 18. t. 18. Pluck. alm. 37. t. 137. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. purpurea. Nect. album campanulatum, 5-gonum: ore 10-dentato, vagina interior albidula, cum nect. conglutinata ambiens pistillum. Jacq.

11. *tunicata*, fol. oblongis cordatis acuminatis, florib. umbellatis. Willd. obs. 2. p. 15. phytog. Retz. 1. p. 7. t. 5. f. 1. Hab. in Tranquebaria.

12. *sylvestris*, fol. subrotundo-ovatis reticulato-venosis, subtus pubescentibus, floribus umbellatis. Retz. obs. 2. p. 15. Willd. 1. c. 1. p. 7. t. 5. f. 3. Hab. in sylvaticis Zeylonae. h

13. *albicans*, fol. ovatis acuminatis, racemis paucifloris, caul. suberoso candicante. Encycl. bot. 5. p. 197. Hab. in India orient. Commers. Non confundi debet cum Cynancho tuberoso L. quocum cortice convenit. Fruct. ignotus. h

14. *cordata*, fol. ovato-cordatis mucronatis, flor. axillaribus subumbellatis, pedunc. capillaribus. Enc. bot. 1. c. Hab. in India. Sonner. P. *indicae* affinis, sed tota glabra. h

15. *parviflora*, fol. ovato-sublinearibus, flor. minimis subsessilibus, caul. volubili. Enc. bot. 5. p. 197. In India a Sonnerat lecta. Non confundenda dicitur cum Cynancho *parviflora*. Sw., cujus habitum refert. h

16. *virgata*, fol. lanceolatis, flor. longe spicatis subnudis, caul. virgatis, ramis florentibus lateralibus. Enc. bot. 1. c. In Ind. orient. Cor. albidula, parva. h

Ga4. CYNANCHUM. Contorta. Cor. rotata. Nect. cylindricum, 5-dentatum, cor. faucem ambiens, simplex. Folliculi 2.

1. *viminale*, caule volubili perenni aphylo. L. Euphorbia viminalis. L. Spec. plant. 2. p. 649. Bass. Act. bonon. Alp. aegypt. 150. t. 150. Hab. in Africae maritimis et Indiae nemorosis. Caul. nudus, crassitudine calami. h

2. *filiforme*, caule erecto simplicissimo, fol. linearibus, floribus verticillatis axillaribus. Lin. suppl. 169. C. fol. linearibus planis. Thunb. prod. 46. Hab. in Cap. b. spei.

3. *crispum*, caule erecto herbaceo, fol. lanceolatis crispis, floribus lateralibus. Thunb. prod. 46. Cum priore.

4. *tenellum*, caule herbaceo subvolubili, fol. ovato-oblongis. Lin. suppl. 168. Hab. in Nova Granada.

5. *obtusifolium*, caule volubili herbaceo, fol. oblongis apice rotundatis cum acumine, umbellis lateralibus. Lin. suppl. 169. cfr. Lam. enc. 2. p. 236. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. virides subumbellati. W. ☉

6. *capense*, caule volubili undique coniformi, fol. subcordato-ovatis, pedunculis multifloris.

multifloris. Lin. suppl. 168. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *acutum*, caule volubili herbaceo, fol. cordato-oblongis glabris. Apocynum latifolium. Clus. hist. 1. p. 125. Hab. in Sicilia, Hispania, Astracan. Cymae poliferae. W.  $\overline{\text{U}}$

8. *rostratum*, caule petiolisque hirsutis, fol. cordato-oblongis, petalis lanceolatis planis. Vahl. symb. 3. p. 45. Hab. in insula Trinitatis. Cor. ante explicationem ovata acuminato-rostrata.

9. *granulosum*, caule pedunculisque hirsutis, fol. cordato-ovatis acuminatis, petalis ovato-acuminatis. Willd. p. 1254. Cav. ic. 2. p. 14. t. 21. Hab. in America calidiore. Caulis pilis rufis. Cor. maxima hujus generis, viridis, coriacea.  $\overline{\text{U}}$

10. *nigrum*, caule volubili, fol. oblongo-cordatis glabris acutis, racemis simplicibus paucifloris. Willd. Cav. ic. 2. p. 45. t. 159. Hab. in Mexico. Cor. nigrae.  $\overline{\text{U}}$

11. *racemosum*, caule volubili fol. ovato-cordatis glabris acuminatis, racemis simplicibus multifloris. Willd. Jacq. amer. 81. t. 54. ed. pict. t. 80. Hab. in Carthagera. Cor. candidae, parvae.  $\overline{\text{U}}$

12. *excelsum*, caule volubili, fol. glabris cordato-lanceolatis, caps. longis angustis acutis. Desf. Atl. 1. p. 212. Hab. in palmetis prope Tozzer. Fol. glauca.  $\overline{\text{U}}$

13. *Ipecacuanha*, caule volubili pubescente, fol. cordato-ovatis cuspidatis subtus pubescentibus, umbell. simplib. paucifloris villosis. Willd. Jahrb. d. Pharm. t. 2. p. C. vomitorium, fol. ovato-lanceolatis, corymb. etc. Lam. enc. 2. p. 235. Asclepias asthmatica. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1270. Hab. in Zeylonae sylvis et in ins. Franciae. Rad. vim vomitoriam ad dosin 24. gr. oblata excipit. Cal. lacin. setaceae.

14. *tomentosum*, caul. volubili tomentoso, fol. subcordato-ovalib. mucronatis subtus tomentosis, umb. subquinquefloris. Lam. l. c. In Ind. orient.

15. *maritimum*, caule volubili, foliis cordatis hirsutis subtus tomentosis, pedunc. aggregatis. Jacq. amer. 81. t. 56. ed. pict. t. 82. Hab. in Terra Bomba Amer. meridion. Cor. atropurpureae.  $\overline{\text{h}}$

16. *suberosum*, caule volubili hirsuto, fol. ovato-cordatis acuminatis, corymbis axillaribus, lacinis cor. lanceolatis. Willd. Dill. elth. 300. t. 229. f. 296. Habit. in America calidiore.  $\overline{\text{h}}$

17. *carolinense*, caule volubili herbaceo hirsuto, fol. ovato-cordatis acutis hirsutis,

flor. subumbellatis, cor. obtusis. Jacq. ic. 2. t. 342. Coll. 2. p. 288. Hab. in Carolina.  $\overline{\text{U}}$

18. *obliquum*, caule volubili herbaceo hirsuto, fol. cordatis acutis villosis, florib. umbellatis, petalis obliquis ad oras revolutis. Jacq. ic. 2. t. 341. Collect. 1. p. 148. Hab. in Carolina.  $\overline{\text{U}}$

19. *hirtum*, caule volubili fruticoso inferne suberoso fisso, fol. ovato-cordatis. L. Moris. S. 15. t. 3. f. 61. Hab. in America.  $\overline{\text{U}}$

20. *crispiflorum*, caule volubili, foliis subtus villosis oblongis cordatis, sinu clauso, petalis apice crispis. Plum. ic. 210. t. 216. f. 1. Hab. in fruticetis Jamaicae et ad isthmum Darien.  $\overline{\text{h}}$

21. *prostratum*, caule prostrato herbaceo, fol. reniformi-cordatis acutis subtus tomentosis. Willd. Cav. ic. 1. p. 5. t. 7. Hab. in Mexico.  $\overline{\text{U}}$

22. *monspeliacum*, caule volubili herbaceo, fol. reniformi-cordatis acutis glabris. Cav. ic. 1. p. 44. t. Go. Jacq. ic. 2. t. 340. Collect. 4. p. 168. Hab. in Hispania et Narbonae maritimis.  $\overline{\text{h}}$

23. *sibiricum*, caule volubili herbaceo, fol. articulato-cordatis glabris. Willd. in N. Act. berol. v. 2. t. 6. f. 1. Hab. in Sibiria. Non confundendum cum *C. erecto*.

24. *extensum*, caule volubili herbaceo hirsuto, fol. reniformi-cordatis acutis, petalis acutis, margine hirsutis. Jacq. ic. 1. t. 54. Misc. 2. p. 353. C. cordifolium. Retz. obs. 2. p. 15. Hab. in India orientali.  $\overline{\text{h}}$

25. *reticulatum*, caule volubili, foliis acuminatis glabris planis, umbellis axillaribus. Willd. p. 1258. Retz. obs. 2. p. 15. Hab. in India orientali.  $\overline{\text{h}}$

26. *undulatum*, glabrum, caule volubili fol. oblongis acuminatis, basi attenuatis, undulatis, umbellis capitatis. Willd. Jacq. amer. 83. t. 58. ed. pict. t. 84. Hab. Carthagerae in monte de la Popa. Cal. cinereus. Cor. violacea.  $\overline{\text{h}}$

27. *purviflorum*, caule volubili filiformi, fol. ovatis apice subulatis, umbellis subsessilibus. Swartz. Fl. ind. occident. 1. p. 537. Plum. ic. 215. f. 1. Hab. in fruticetis sylvaticis montosis Indiae occidentalis.  $\overline{\text{h}}$

28. *erectum*, caule erecto divaricato, fol. cordatis glabris. L. Jacq. hort. t. 38. In Syria.  $\overline{\text{h}}$

29. *hastatum*, fol. subhastato-lanceolatis: auriculis rotundatis, flor. fasciculatis subsessilibus. Hab. in Africa.

30. *angustifolium*, caul. volubili, fol. linearibus angustis, umbellis longe pedunculatis. Hab. ad litora maris in Carolina. Michaux, fil. Ex Herb. Rich.

† *Gonolobium*. Cor. rotata, 5-partita. Appendix (nectar. L.) brevissima, inclusa. *Sylus* discoideo-5-gonus. *Folliculi* ut plurimum costati seu angulati.

31. *macrophyllum*, sarmentis petiolisque hirsutis, fol. amplis abrupte acuminatis puberulis, cor. laciniis ovali-lanceolatis. Michaux, Flor. 1. p. 119. sub *Gonolobo*. Vincetoxicum gonocarpos. Walt. Hab. in Carolinae sylvis.

32. *hirsutum*, sarm. petiolisque hirsutissimis, fol. sensim acuminatis utrinque pubescentib., cor. lacin. oblongo-ovalibus obtusis. Michaux, l. c. Vincet. acanthocarpus. Walt. Cum priore. Follic. oblongi sparsim muricati.

33. *lave*, sarment. glabriusculis, fol. subconoido-cordatis, folliculis laevibus. Michaux, l. c. sub *Gonolobo*. Hab. in dumetosis ripariis flum. Mississippi.

34. *obtusifolium*, fol. cordatis suborbiculatis subtomentosis mollibus. Hab. Ex herbario Rich.

35. *planiflorum*, caul. volubili, fol. cordatis glabris subtus tomentosis, pedunc. subracemosis. L. Jacq. amer. ed. pict. t. 81. Hab. in Carthagen. Amer. Flor. virentes. J.

36? *album*, caule volubili, fol. oppositis ovato-scutis inferne albis umbel. solitariis multifloris. Cav. ic. 4. p. 5. t. 310. sub *Asclep.* In Peru. Cor. rotata, sordide alba. Cornic. clausi, candidi. C.

†† *Vincetoxicum*. Cor. erecta. *Nectarium squamulos* s. *callas* 5, *carnosus retusus* sistens.

37. *Vincetoxicum* (vulgare), caule erecto, fol. ovatis acuminatis margine tenuissime ciliatis. Willd. Sp. p. 1268. sub *Asclepias*. Flor. lan. t. 849. Vincetoxicum officinale. Moench. method. p. 717. Hab. in montosis calcareis et in sylvaticis. T.

38. *nigrum*, caul. superne subvolubili, fol. ovatis basi barbatis. Lin. sub *Asclep.* Hab. in Italiae et Galliae meridionalis collibus. Cor. nigrescens. T.

*Cbs.* Ob appendices uniformes solidas duae haec species cum *Cynanchis* majorem affinitatem habent, quam *Asclepiadibus*; an potius distinctum efficiunt genus?

625. *APOCYNUM*. Cor. campanulata. *Filamenta* 5, cum staminibus alterna. *Styl.* subnullus. *Stigma* latum. *Folliculi* longi, lineares.

1. *filiforme*, caule decumbente herbaceo hirsuto, foliis lineari-filiformibus, floribus umbellatis. Thunb. prod. 47. Willd. 2. p. 1259. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *hastatum*, caule decumbente herbaceo, fol. hastatis. Thunb. l. c. A. minutum. Lin. suppl. 169. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. filiform. Umb. simplex subsexflora. T.

3. *androsæmifolium*, caule rectiusculo herbaceo, fol. ovatis utrinque glabris, cymis terminalibus glabris. L. Dod. mem. 59. t. 51. Moris. s. 15. t. 3. f. 16. Hab. in Virginia, Canada. Flor. rosæ, muscipae. T.

4. *cannabinum*, caule rect. herbaceo, fol. oblongis subtus tomentosis, cymis lateralibus folio longioribus. Ait. Kew. 1. p. 303. Michaux. Flor. 1. p. 122. Moris. s. 15. t. 3. f. 14. Hab. in Canada, Virginia. Cor. palléscente-virides. Fol. in culta magis glabra. T.

5. *hypericifolium*, caule erectiusculo herbaceo, fol. oblongis cordatis glabris, cymis folio brevioribus. Aiton. p. 304. Jacq. hort. 3. p. 37. t. 66. Hab. in America boreali. T.

6. *venetum*, caule erectiusculo herbaceo, fol. elliptico-lanceolatis mucronatis, margine denticulato-serratis. Willd. Hab. in Adriatici maris insulis. T.

7. *paniculatum*, caule frutescente volubili, fol. ovato-lanceolatis acutis glabris, floribus terminalibus et axillaribus paniculatis. Lam. encyclop. 1. p. 212. A. Acouci. Aubl. guj. 1. p. 174. t. 107. Hab. in pratis Sinemariensibus Gujanæ. h.

8. *umbellatum*, caule volubili frutescente, fol. ovatis acuminatis subtus tomentosis, cyma terminali. Willd. Flor. purpurascens. Aubl. guj. 1. p. 275. t. 106. Hab. in Cajenna. h.

9. *tiliaefolium*, caul. volubili subfruticoso, fol. cordato-subrotundis acuminatis longe petiolatis. Lam. enc. 1. p. 214. Rheed. q. t. 15. Rumph. 5. t. 175. f. 2? Hab. in India. Sonnerat. Flor. magni in fasciculo umbelliformi axillari.

10. *cotinifolium*, fol. rotundatis obtusis petiolatis viridibus, flor. parvis corymbois terminalibus. Lam. l. c. p. 215. Hab. in ins. Java.

11. *reticulatum*, caule volubili perenni, fol. ovatis venosis. Rumph. 5. t. 40. Hab. in India. h

12. *cordatum*, caule volubili hirtio, fol. ovatis subtus villosis. Thunb. prod. 47. Hab. ad Cap. b. spei. f

13. *lanceolatum*, caule volubili herbaceo striato glabro, fol. lanceolatis, umbella triflora. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *triflorum*, caule volubili herbaceo piloso, fol. lanceolatis, umbellis lateralib. subtrifloris. Thunb. Lin. suppl. 169. Hab. ad Cap. b. spei.

15. *lineare*, caule volubili, herbaceo glabro, fol. lineari-lanceolatis, florib. paniculatis. Thunb. A. fol. linearibus planis, umb. axillaribus compositis. Lin. suppl. 169. Hab. ad Cap. b. spei.

† *QUIRIVELA*. Caps. ovalis, cal. tecta, 1-locularis, 5-valvis. Sem. ... ? Flor. ... ?

16. *frutescens*, caule erecto frutescente, fol. lanceolato-ovalibus, cor. acutis, fauce villosis. Lin. Willd. 2. p. 1260. Flor. Zeyl. t. 12. f. 1. *Quirivela zeylanica*, fol. ovato-lanceolatis subacuminatis, flor. racemosis axillarib. Poir. in Enc. bot. vol. 6. (ined.) p. 24. Lam. enc. t. p. 215. Kirwael Zeylonensium. Hab. in Zeylona.

*Obs.* Hanc plantam non hujus generis, nec ejusdem familiae esse dicitur. In vivis aut melioribus specimenibus hinc ulterius examinari debet.

626. *ASCLEPIAS*. Contorta. Cor. rotata, (saepius) reflexa. *Nect.* 5. ovata, concava, corniculum exserentia. *Anth.* coraeae longitudinaliter dehiscentes.

\* *Foliis nullis.*

1. *aphylla*, caul. aphylo. Thunb. prod. 47. Willd. Sp. 2. p. 1262. Hab. ad Cap. b. spei.

\*\* *Foliis oppositis planis.*

2. *undulata*, fol. sessilibus oblongis lanceolatis, undulatis glabris, petalis ciliatis. Sp. pl. 312. Comm. rar. 16. t. 16. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *crispa*, fol. corlato-lanceolatis undulatis scabris oppositis, umb. terminali. Lin. suppl. 170. A. undulata, fol. revolutorepandis pilosis. Syst. veg. p. 214. Comm. par. 17. t. 17. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. purpurei. h

4. *pubescens*, fol. ovatis venosis nudis,

caule fruticoso pedunculique villosis. L. Moris. 3. s. 15. t. 3. f. 35. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. purpurascens. h

5. *mucronata*, fol. oblongis mucronatis glabris, umbellis axillaribus. Thunb. prod. 47. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *procera*, fol. obovato-oblongis, petiolis brevissimis, cor. subcampanulatis. Ait. Kew. 1. p. 305. A. gigantea. Jacq. obs. 3. p. 17. t. 69. Houttuyn. 5. t. 44. Hab. in Persia. h

7. *gigantea*, fol. obovato-oblongis, petiolis brevissimis, laciniis cor. reflexis involutis. Ait. Kew. 1. p. 305. Rheed. t. 31. Seb. thes. 1. t. 26. f. 1. Hab. in India orientali. Valde venenata. Nectaria laminae solidas conniventes sistit. Cor. albo-rubroque variegata. h

8. *grandiflora*, fol. petiolatis oblongis pilosis, caule simplici hirtio erecto, flor. axillaribus pedunculatis. Lin. suppl. 170. Habit. ad Cap. b. spei. Umb. nulla. Flos colore Fritill. Meleagridis tessellato. L.

9. *carnosa*, fol. ovatis carnosius glaberrimis. Lin. suppl. 170. Hab. in China. †

10. *syriaca*, fol. ovalibus subtus tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nutantibus. L. Blackw. t. 521. Hab. in Virginia, circa Astracan. Planta utilissima. Sem. coma pro serico et caules lini adinstar praeparari possunt.

β. *illinoensis*, caule simpl., fol. lanceolato-oblongis sensim acutis subtus tomentosis, umbel. subnutantibus tomentosis. A. *syriaca*. β. Michaux. Flor. 1. p. 115. In pratis Illinoensibus.

11. *obtusifolia*, foliis amplexicaulibus oblongis rotundato-obtusis undatis, umbel. terminali longius pedunculata glabra, corniculis exsertis. Michaux. l. c. Hab. a Virginia ad Carolinam.

12. *hybrida*, caul. simplicissimo subto mentoso, fol. petiolatis ovalib. puberulis, umbel. aphyllis terminalib. Michaux. A. variegata. Walt. Hab. in Carolina. Cor. purpurascens: limbo albente.

13. *amplexicaulis*, tota glauca, caul. decumbentibus simplicibus, fol. cordatis amplexicaulibus, corniculis delitescen tibus, compresso-ligulatis. Michaux. p. 116. Hab. in pascuis aridis subulosis in Georgia. Fol. purpureo-venosa. Umb. e summis axillis et terminales.

14. *humistrata*, fol. sessilibus cordatis

oppositis, caul. prostrato, umbel. axillaribus. Walt. Flor. carol. p. 105. Hab. in Carolina.

15. *amoena*, fol. ovatis subtus pilosiusculis, caule simplici bifariam puberulo, umbellis nectarisque erectis. L. Michaux. Flor. p. 118. In America septentrionali. Habitus prioris. Petal. purpurea, append. longis roseis. M.

16. *purpurascens*, foliis ovatis subtus villosis, caule simplici, umbellis erectis, nectaris resupinatis. Dill. elth. 32. t. 28. f. 31. Hab. in Carolina. Affinis *A. syriacae*, uti sequens.  $\mathcal{T}$

17. *variegata*, fol. ovatis rugosis nudis, caule simplici, umbellis subsessilibus: pedicellis tomentosis. L. Pluck. alm. 34. t. 77. f. 1. Hab. in Amer. boreali.  $\mathcal{T}$

18. *curassavica*, fol. lanceolatis petiolatis glabris nitidis, caule simplici, umb. erectis solitariis lateralibus. Mill. Swartz. obs. 106. Sloan. hist. 2. t. 129. Dill. elth 34. t. 30. f. 33. Hab. in Curassao. Flor. aurantii, pulchri. Folliculi ad latera denticulati.  $\mathcal{H}$

19. *nivea*, fol. ovato-lanceolatis glaberrimis, caule simplici, umb. erectis lateralibus solitariis. L. Dill. elth. 33. t. 29. f. 32. Plum. sp. 2. ic. 30. Hab. in Virginia et America calidiore. Cor. viridis nectar. nivea. Folliculi edentuli.  $\mathcal{T}$

20. *laniflora*, fol. planis lineari-lanceolatis, caule fruticoso, umbellis lateralibus solitariis, cor. hirsutis. Vahl. symb. 1. p. 23. t. 7. Hab. in Arabia felici.  $\mathcal{H}$

21. *parviflora*, fol. lanceolatis acuminatis glabris oppositis basi attenuatis, caule suffruticoso erecto, umbellis lateralibus solitariis. Ait. Kew. 1. p. 307. Hab. in Carolina, Florida.  $\mathcal{T}$

22. *incarnata*, caule erecto superne ramoso tomentoso, fol. lanceolatis utrinque subtomentose lanuginosis, umbel. pluribus, origine geminis, cornic. exsertis. Michaux. p. 115. Jacq. hort. t. 107. Hab. in Canada, Virginia, in pratis humidis Illinoensibus.

Obs. Culta, dicit Michaux. l. c., omnibus partibus minor, multo magis pubescit, et Willdenow. l. c. p. 1267. fol. determinat. *glabra*.

$\beta$ . *pulchra*, fol. lanceolatis subtus pubescentibus, caul. superne diviso, umbellis erectis geminis. Willd. p. 1267. Hab. in America boreali.  $\mathcal{T}$

23. *debilis*, glaberrima, caule debili erecto simplici, fol. petiolatis ovali-lan-

ceolatis utrinque acutis membranaceis, pedicel. capillaribus. Michaux. p. 116. Hab. in Carol. aquis umbrosis. Flor. albi.

24. *citrifolia*, fol. ovatis undulatis subtus discoloribus pubescentibus, umb. terminali, caul. erecto simplici. Willd. Jacq. ic. 2. t. 343. Collect. 2. p. 290. Hab. in Amer.  $\mathcal{T}$

25. *decumbens*, fol. villosis, caule decumbente. L. Gron. virg. p. 27. Hab. in Virginia.  $\mathcal{T}$

26. *lactifera*, fol. ovatis, caule erecto, umb. proliferis brevissimis. L. Hab. in Zeylona. Succ. instar lactis inservit. Burm.  $\mathcal{T}$

27. *volubilis*, arborea volubilis, fol. oppositis planis ovatis integerrimis acuminatis umbellis erectis. Linn. suppl. 170. Hab. in Zeylona.  $\mathcal{H}$

28. *alexicaca*, caule volubili, fol. inferioribus cordatis, superioribus ovatis, umbellis sessilibus. Jacq. Collect. 2. p. 101. Rheed. 9. t. 13. Hab. in Zeylona.  $\mathcal{T}$

29. *viminalis*, caule suffrutescente volubili filiformi, fol. oppositis lanceolatis glabris, umb. lateralibus multifloris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 539. Sloan. jam. 89. hist. 1. p. 207. t. 131. f. 1. Hab. in Jamaicae austr. lis fruticetis sabulosis juxta rivos.  $\mathcal{T}$

30. *laurifolia*, caule erecto, fol. subsessilibus ovali-lanceolatis sensim angustatis acutissimis glabris margine asperiusculis. Michaux. p. 117. Hab. in Georg. ad amnem Althamaha. Cor. subtus viridescens, supra cum appendiculis purpurea. Affinis *A. amoenae*. L. et var. sequentis? M.

31. *paupercula*, caul. erectiusculo glabro oligophyllo, sursum nudo, fol. linearib. longissimis, umb. terminalib. paucifloris. Michaux. p. 118. A. lanceolata Walt. ? In Carol. infer. herbidis humidis. Cor. rubella, append. lutea.

32. *graminea*, fol. linearib. gramineis oppositis, caul. ramoso, umbel. terminalib., cornicul. erectis mucronatis. Lam. enc. 1. p. 283. In India. Caul. tenuis, subangularis.

\*\*\* *Foliis lateralibus revolutis.*

33. *arborescens*, fol. revolutis ovatis, caule fruticoso subvillosa. Burm. afr. 31. t. 13. Hab. in Cap. b. spei montibus. Cor. albae.  $\mathcal{H}$

34. *fruticosa*, fol. revolutis linearilanceolatis, caule fruticoso. Lin. Herm. Mill. dict. t. 35. Pluck. alm. 36. t. 138. f. 2.  $\beta$ . *crassifolia*. L. Syst. Veg. p. 214. Hab. ad Cap. b. spei. Nect. compressa absque



ungue, cujus loco auriculæ duæ, longiores, reflexæ. L. h

35. *sibirica*, fol. revolutis lineari-lanceolatis oppositis ternatisque, caule decumbente. Gmel. sib. 4. p. 77. n. 21. Murr. comment. goetting. 1779. p. 23. t. 7. Hab. in Sibiria. Var. fol. alternis, binis et ternis. T

36. *davurica*, fol. linearibus subulatis piloso-ciliatis oppositis, umb. pedunculatis axillaribus, calycib. pilosis. Willd. p. 1272. Hab. in Davuria. Distincta fol. brevioribus, flor. umbellatis fere magnitudine A. syriacæ. W. T

37. *setosa*, fol. linearibus revolutis oppositis, caule fruticoso. Vahl. symb. 1. p. 23. t. 8. A. setosa. Forsk. Hab. in Arabia felici. h

38. *filiformis*, caule erecto, fol. filiformibus, umb. lateralibus elongato-pedunculatis. Lin. suppl. p. 169. Thunb. prod. 47. Hab. ad Cap. b. spei.

Obs. Ascl. filiformis, Apoc. filiforme, et Cyn. filiforme ut simillima inter se diversa floribus.

39. *verticillata*, fol. revolutis linearibus verticillatis, caule erecto. L. Pluck. mant. 17. t. 336. f. 4. Hab. in Virginia. Pedunc. oppositifolii. Flor. albi.

40. *mexicana*, fol. revolutis lineari-lanceolatis senis, caule erecto. Willd. p. 1273. A. fol. verticillatis senis lanceolatis. Cav. ic. 1. p. 42. t. 58. Hab. in Mexico. ♂

\*\*\* *Foliis alternis.*

41. *longifolia*, caule decumbente foliisque sparsis praelongo-linearibus puberulis. Michaux. p. 116. Var. fol. subverticillatim approximatis. In Georg. occidentalis sylv. Append. corollæ genitatib. brevior et corniculo orbata. M.

42. *Linaria*, fol. sparsis subulatis canaliculatis, umb. lateralibus multifloris. Cav. ic. 1. p. 42. t. 57. Hab. . . . T

43. *rubra*, fol. alternis ovatis, umb. ex eodem pedunculo communi pluribus. L. Sp. pl. Gron. virg. 27. Hab. in Virginia.

44. *tuberosa*, foliis alternis lanceolatis hirs, caule divaricato piloso. L. Michaux. Flor. 1. p. 117. (qui fol. dicit sparsa.) Herm. lugdb. 646. t. 647. Dill. elth. 35. t. 30. f. 34. Hab. in Amer. boreali. T

45. *floridana*, fol. alternis lanceolato-linearibus, subus pubescentib. umbel. terminalibus, caule simplice piloso. Lam.

enc. 1. p. 284. Pluck. Amalrh. 18. t. 359. f. 47. Hab. in Florida. +

627. *CEROPEGIA*. Contorta. *Folliculi* 2 erecti. *Sem.* plumosa. *Cor.* urceolata limbus connivens.

1. *Candelabrum*, fol. ovatis mucronatis, umbelli pendulis, floribus erectis. Willd. Sp. 2. p. 1275. Rheed. g. t. 16. Hab. in Malabaria. T

2. *tuberosa*, fol. ovatis acutis, umbel. erectis, radice repente tuberosa. Willd. Roxb. coron. 1. p. 12. t. 9. Hab. in Indiae locis incultis. T

3. *bulbosa*, fol. obovato-ellipticis cuspidatis, umbellis erectis, radice bulbosa. Willd. l. c. Roxb. 1. p. 11. t. 7. Hab. in siccis nemorosis Indiae. T

4. *bisflora*, fol. ovatis, pedunc. bisfloris. Willd. Lin. Fl. zeyl. 110. Hab. in Zeylona. Flor. recte extensis. T

5. *juncea*, fol. lanceolatis sessilibus, pedunc. subbisfloris, caule carnosio. Willd. Roxb. 1. p. 12. t. 10. In Indiae siccis incultis. Flor. maximi albo-virescentes striis purpureis pulchre variegati. W. T

6. *acuminata*, fol. lanceolatis longe acuminatis, umb. multifloris rectis, radice bulbosa. Willd. p. 1276. Roxb. 1. p. 12. t. 8. Hab. in Indiae nemorosis siccis. T

7. *sagittata*, umb. subsessilibus, fol. saguatis. L. Mant. 215. Lam. ill. t. 179. f. 1. Hab. in Cap. b. spei arenosis. Cor. coccinea subcylindrica basi minus ventricosa. T

8. *tenuifolia*, flor. umbellatis, fol. linearibus integerrimis. Thunb. prod. 37. Lam. l. c. f. 2. Pluck. mant. 17. t. 335. f. 5. Hab. in Cap. b. spei duris. Apud Willd. Sp. 2. p. 1276. male *tenuiflora* nuncupata.

628. *STAPELIA*. Contorta. *Cor.* rotata. *Nect.* duplici stellula tegente genitalia. *Folliculi* 2. *Sem.* plumosa.

\* *Cor. quinquefida*, laciniis margine pilosis.

1. *ciliata*, denticulis ramorum patentibus pedunculatis, corollis supra papillosis margine ciliatis, laciniis ovatis acutis planis. Masson. Stap. p. q. n. 1. t. 1. Hab. in locis siccissimis Cap. b. spei (ubi omnes species crescent) infra Bockland Berg. Cor. flavescens. Willd. Sp. pl. 2. p. 1277. sqq. h

2. *revoluta*, ramis tetragonis erectis denticulatis, dentibus patentibus, cor. glabra, laciniis ciliatis acutis revolutis. Mass. p. 12. n°. 10. t. 10. Cum priore. Denticuli caulis recti. Cor. paulo minor pallide violacea. h

3. *hirsuta*, caule aphylo tetragono, denticulis erectis, flore pedunculato, cor. hirsuta. Thunb. profl. 46. Jacq. misc. 1. p. 28. t. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. flavescens striis transversalibus atro-violaceis, laciniis apice et margine violaceis. W. h

4. *sororia*, ramulis divaricatis quadrangularibus, angulis dentatis, dentibus remotis acutis incurvatis, cor. unicolori quinquefida, laciniis lanceolatis planis, villosis, margine ciliatis. Mass. p. 23. n°. 39. t. 39. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. nutantes, cor. unicolores. h

5. *grandiflora*, ramis quadrangularibus clavatis, angulis dentatis, dentibus remotis incurvatis, cor. magna plana quinquefida, laciniis lanceolatis acutis margine ciliatis. Mass. p. 13. n°. 11. t. 11. Hab. in locis calidis ad Sontags Rivier. h

6. *ambigua*, ramis erectis quadrangularibus clavatis, angulis dentatis remotis incurvatis, cor. magna plana quinquefida, laciniis lanceolatis hispidis, margine ciliatis. Mass. p. 13. n°. 12. t. 12. Hab. in desertis aridis Cap. b. spei. Distincta pedunculis multiflor. Cor. hispida rufo-purpurea, striis transversalibus atro-violaceis variegata. h

7. *pulvinata*, ramis ramulisque tetragonis reclinatis dentatis, cor. quinquefida plana, melio villosa, laciniis patentissimis rugosis acuminatis ciliatis. Mass. p. 13. n°. 13. t. 13. Hab. prope Camies Berg inter frutices. Cor. magna fundo elevato rufo valde villosa. Nect. atro-violacea.

8. *Asterias*, ramis pluribus erectis tetragonis dentatis, dentibus brevibus erectis, cor. magna quinquefida, laciniis lanceolatis margine revolutis ciliatis. Mass. p. 14. n°. 14. t. 14. Hab. ad Cap. b. spei in Karro. Nectaria albida. h

9. *gemmiflora*, ramis pluribus erectis tetragonis dentatis, dentibus suberectis acutis, cor. plana scabra quinquefida, laciniis ovato-lanceolatis, margine ciliatis. Mass. p. 14. n°. 15. t. 15. Hab. in locis aridis inter frutices, ultra Platte-Kloof. Var. cor. punctis aureis sparsis. Ab omnibus satis distincta: laciniis cor. superne 5-nerviis. et cor. externe flava purpureo-maculata. h

10. *divaricata*, ramis pluribus tetragonis divaricatis glabris dentatis, dentibus

parvis suberectis, cor. glaberrima quinquefida, laciniis lanceolatis patentibus, margine revolutis ciliatis. Mass. p. 17. n°. 22. t. 22. Cor. Boraginis rubrocarnea. Nectaria aurantiaca. h

11. *rufa*, ramis ramulisque erectis tetragonis anguste dentatis, dentibus erectis, cor. quinquefida, laciniis triangularibus acutis rugosis, margine ciliariibus. Mass. p. 16. n°. 20. t. 20. In locis calidis ultra Platte-Kloof. Cor. magnitudine floris Periplocæ graecae. h

12. *acuminata*, ramis pluribus, suberectis tetragonis dentatis, cor. quinquefida plana glabra rugosa, laciniis caudato-acuminatis margine ciliatis. Mass. 17. t. 17. Hab. in Namaqualand. Cor. laciniis cuspidatis cineris, striis atro-purpureis undulatis apice atro-purpureis, margine albo ciliato. W. h

13. *reclinata*, ramis pluribus tetragonis reclinatis dentatis, dentibus acutis patentibus, cor. quinquefida recurvata, laciniis patentibus replicatis fimbriatis. Mass. p. 19. n°. 28. t. 28. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. parva, atro-purpurea. Nect. flava. h

14. *elegans*, ramis pluribus confertis oblongis dentatis, dentibus patentibus acutis, cor. quinquefida, laciniis triangularibus hispidis, margine fimbriatis. Mass. p. 19. n°. 27. t. 27. Hab. ad Cap. b. spei in Karro. Cor. atro-violacea, fundo pentagono rufescente. Nect. flava. W. h

15. *caespitosa*, ramis confertis procumb. tetragonis dentatis, dentibus acutis patentibus, cor. quinquefida recurvata, laciniis patentibus replicatis ciliatis. Mass. p. 20. n°. 29. t. 29. Cum. priore sub fruticibus. Cor. atro-purpurea, fundo circulari virescente. h

16. *arida*, ramis pluribus erectis tetragonis dentatis, dentibus patentibus acutis, flor. solitariis pedunculatis, cor. laciniis planis setaceis. Mass. p. 21. n°. 33. t. 33. Habit. in desertis siccis Kannaland. Cor. parva pallide flava, laciniis basi punctatis, fundo circulari flavo. Nect. albida. h

17. *parviflora*, ramis tetragonis dentatis recurvatis, cor. parva, laciniis angustis planis patentibus margine ciliatis. Mass. p. 22. n°. 35. t. 35. In Namaqualand sub fruticibus. Cor. minima hujus generis, flavo-virescens, fusco-punctata. Nect. aurantiaca. h

18. *subulata*, cor. quinquefidis nutantibus, laciniis oblongis acuminato-cuspidatis pilosis, pilis secundis, ramis tetragonis atte-

nuatis nutantibus sub apice floriferis. Willd. p. 1283. Forsk. Cat. pl. Arab. p. 108. n°. 193. tab. 7. Hab. in Arabia felici. h

19. *concinna*, ramis ramulisque erectis tetragonis glaberrimis, angulis dentatis, dentibus erectis, cor. quinquefida plana hispida. Mass. p. 15. n°. 18. t. 18. Hab. in Karro. Cor. cinerea, striis undulatis fuscis setisque candidis, fundo fusco distincta. h

20. *glandulifera*, ramis pluribus suberectis tetragonis, angulis dentatis, dentibus erectis acutis, cor. plana glandulis setaceis clavatis tecta, lacinii ovato-lanceolatis acutis patentibus. Mass. p. 16. n°. 19. t. 19. Hab. circa Nord Olifant Rivier. Cor. sulphurea, pilis albis tecta. Nect. aurantiaca et nigra. h

\* \* *Cor. quinquefidis, laciniiis margine glabris.*

21. *pedunculata*, ramis pluribus divaricatis tetragonis subdentatis, pedunc. longissimis, cor. quinquefida, laciniiis lanceolatis margine revolutis, angulis fimbriatis. Mass. p. 17. n°. 21. t. 21. Hab. in regionibus aridis Camies Berg. Cor. brunneo-purpureascent, variat colore lutescente. h

22. *aperta*, ramis pluribus divaricatis tetragonis dentatis, dentibus obtusissimis, pedunc. longiusculis, corolla quinquefida plana, laciniiis ovatis obtusis rugosis. Mass. p. 23. n°. 37. t. 37. Hab. in Namaqualand prope Kock-Fontain. Similis precedenti, pedunculo et ramis, sed flore distinctissima. Cor. purpureascent, lituris obscurioribus rugosa. Fundus cinerascens nigro-punctatus. h

23. *Gordoni*, ramis ramulisque teretibus tuberculatis, tuberculis spinosis, pedunc. solitariis, cor. magna decemfida. Mass. p. 24. n°. 40. t. 40. Hab. in Groot Namaqualand versus Orange Rivier. Cor. inter maximas hujus generis diametro fere triunciali, plana rotata fusco-flavescens, centro albicante. Nect. nigra. An hujus generis? h

24. *pilifera*, ramis pluribus teretibus sulcatis tuberculatis piliferis, flor. sessilibus solitariis. Mass. 17. n°. 23. t. 23. Lin. suppl. 171. Hab. in Cap. desertis, collibus aridissimis. Cor. atro-purpurea circulo rubro in medio. Comeditur ab Hottentottis, quibus audit Guasap. Mass. l. c. h

25. *caudata*, caule folioso, fol. lineariblongis, flore pedunculato, laciniiis cor. linearibus. Thunb. prod. 46. Hab. ad Cap. b. spei. h

26. *articulata*, articulis ramorum oblongis teretibus reticulatim obsolete verru-

cosis, spinulis minutis, flor. subsessilibus cor. supra papillois, laciniiis triangularibus. Ait. Kew. 1. p. 310. Mass. p. 20. n. 30. t. 30. Edulis cor. atra. Rami spicae femineae Zeae Mays haud absimiles sunt. Sequenti affinis. h

27. *mammillaris*, cor. quinquefidis glabris, laciniiis lanceolatis, pedunc. cor. brevioribus, ramis medio floriferis erectis hexagonis tuberculatis, tuberculis spinosis. Willd. p. 1287. L. Mant. p. 216. Thunb. prod. 46. Burm. afr. 27. t. 11. †

28. *pruinosa*, ramis tetragonis dentatis, dentibus recurvatis, laciniiis cor. planis ovatis pilosis. Mass. p. 24. n°. 41. t. 41. Hab. in regionibus siccis Namaqualand inter frutices. h

29. *ramosa*, ramis pluribus erectis tetragonis dentatis, dentibus obtusissimis, flor. aggregatis subsessilibus, cor. laciniiis lanceolatis acutis replicatis. Mass. p. 21. n°. 32. t. 32. Hab. in regionibus Karro, circa aquas thermales. Cor. atro-purpurea, fundo circulari albidot Flor. proveniunt in callis extra dentes. h

30. *pulla*, subhexagona erecta, aculeis patentissimis, floribus sessilibus aggregatis, cor. laciniiis lanceolatis, supra holosericeis replicatis. Ait. Kew. 1. p. 310. Mass. n°. 31. t. 31. S. fasciculata. Thunb.? Hab. in locis calidis arenosis Karro. Flor. extra dentes quidem nec callo insident. W. h

31. *ascendens*, cor. quinquefidis glabris, laciniiis linearibus margine reflexis acutis, pedunc. cor. brevioribus, caule tetragono ascendente apice florifero. Willd. Roxb. corom. 1. p. 28. t. 30. Hab. in arenosis siccis Indiae orientalis. h

32. *quadrangula*, cor. quinquefidis, flor. sessilibus, caule tetragono, ramis divaricatis apice floriferis, dentibus truncatis. Willd. Forsk. descr. 52. t. 6. Hab. in Arabia felici, et circa Mogadore in Barbaria. Schousb. Flor. conferti parvi terminales viridi-flavescentes. Succus non lacteus sed aqueus. h

33. *incarnata*, ramis erectis tetragonis dentatis, dentibus patentibus acutis, flor. subsessilibus, cor. laciniiis lanceolatis planis. Mass. p. 22. n°. 34. t. 34. Lin. suppl. 171. S. caule aphylo tetragono, denticulis patentibus, flore sessili, laciniiis corollae obtusis. Thunb. prod. 46. Hab. campis siccis arenosis. Cor. incarnata, variat colore albo. Mass. Herba editur Afris. h

34. *punctata*, articulis ramorum oblongis subtetragonis dentatis, florib. fasciculatis, cor. laciniiis lanceolatis acutis patentibus,

supra papillosis. Mass. p. 18. n°. 24. t. 24. Hab. in Cap. b. spei regionibus Namaqualand. Cor. laciniae albedo-incarnatae, sanguineo-punctatae. h

35. *geminata*, ramis oblongis subtetragonis dentatis, dentibus parvis, floribus geminatis, cor. lacinii lanceolatis acutis margine revolutis. Mass. p. 18. n°. 25. t. 25. Cor. aurantiaco-flava sanguineo-punctata. h

36. *decora*, articulis ramorum oblongis subteretibus, floribus geminatis, corollarum lacinii lanceolatis acutis, supra scabrosis, margine revolutis. Mass. p. 19. n°. 26. t. 26. Cor. laciniae flavae punctis scabris atropurpureis obsitae, fundus pentagonus pallidus. h

37. *pulchella*, ramis pluribus reclinatis dentatis, dentibus acutis, floribus fasciculatis, cor. quinquefida, lacinii triangularibus acutis, centro orbiculato. Mass. p. 22. n°. 36. t. 36. Cor. flava sanguineo-punctata, lacinii apice fusciscentibus. h

38. *vetula*, ramis pluribus erectis tetragonis glabris, angulis dentatis, dentibus apice incurvatis, cor. plana glabra quinquefida, lacinii lanceolatis obtusis. Mass. p. 15. n°. 16. t. 16. Hab. in montibus ad Hex Rivier Cap. b. spei. Cor. profunde violacea, linea transversalibus atro-violaceis, lacinii superne trinerviis. W. h

39. *verrucosa*, ramis pluribus suberectis, dentibus ramorum acutis decussatis, cor. plana verrucosa, medio parum elevati in pentagonum, genitalia ambiens, scabrum. Mass. p. 11. n°. 8. t. 8. Cor. flavescens sanguineo punctata. h

40. *irrorata*, ramis pluribus suberectis denticulatis, dentibus subpatentibus acutis decussatis, cor. plana rugosa, lacinii lanceolatis acutis. Mass. p. 12. n°. 9. t. 9. Cor. sulphurea sanguineo-maculata laciniarum apicibus purpurascens. Differt a priori defectu verrucarum et circuli pentagoni floris. h

41. *mixta*, cor. quinquefidis rugosis, lacinii ovatis acuminatis, fundo circulari elevato papilloso, pedunc. longitudine cor. ramis tetragonis adscendentibus basi floriferis. Willd. p. 1292. h

42. *variegata*, cor. quinquefidis rugosis, lacinii ovatis acutis, fundo circulari concavo rugoso, pedunculis cor. longioribus, ramis tetragonis adscendentibus basi floriferis. Willd. Jacq. misc. 1. p. 27. t. 4. Curt. mag. 26. Moris. s. 15. t. 3. f. 4. h

\*\*\* *Corolla decemdentata.*

43. *campanulata*, ramis pluribus sim-

plicibus erectis tetragonis dentatis, dentibus patentibus acutis, cor. decemfida campanulata scabra, tubo barbato. Mass. p. 11. n°. 6. t. 6. Cor. sulphurea maculis elevatis atropurbris, fundo fusciscentis, etiam externe maculata. W. h

44. *barbata*, ramis pluribus tetragonis pentagonisque confertis suberectis, dentibus ramorum acutis subpatentibus, cor. campanulata decemfida, lacinii acutis subpatentibus. Mass. p. 11. n°. 7. t. 7. Cor. campanulata, albido-flavescens, maculis elevatis atropurpureis variegata, pilisque clavatis obsita. Willd. h

45. *venusta*, ramis tetragonis pentagonisque, ramulis patentissimis divaricatis, denticulis ramorum patentibus acutis, cor. decemfida, tubo glabro ampliato in orbiculum elevatum. Mass. p. 10. n°. 3. t. 3. Cor. sulphurea, limbo rubro punctato. h

46. *guttata*, ramis pluribus tetragonis pentagonisque confertis subpatentibus, dentibus ramorum acutis patentibus, cor. decemfida lacinii acutis tubo campaniformi-ampliato in orbiculum elevatum. Mass. p. 10. n°. 4. t. 4. Cor. sulphurea sanguineo-punctata. h

47. *humilis*, ramis pluribus quadri- et quinqueangulatis patentibus, cor. orbiculata decemfida, lacinii quinque longioribus, quinque brevioribus patentibus, pedunc. solitariis. Mass. p. 10. n°. 5. t. 5. h

48. *reticulata*, ramis pentagonis denticulatis, dentibus patentibus, cor. decemangulata, tubo intus barbato ampliato in orbiculum elevatum. Mass. p. 9. n°. 2. t. 2. Hab. in cavernulis rupium versus N. Olifantis Rivier. Cor. limbus atro-purpurascens lineis albidis reticulatus, fundus et orbiculus elevatus purpurei. W. h

49. *clavata*, caule simplici crasso clavato reticulatum obsolete verrucoso, apice fructifero. Willd. p. 1295. Patterson. itin. 1. 8. + Hab. in Cap. b. spei campis arenosis. Adhuc obscura, cujus fructus tantum notus est. W. h

Obs. Differentias specficas illos Massoni ex antopsia redditas Willdenovianis praeuli, forte melius secundum regulas artis exaratis.

GENTIANEA (Gen. 629-636.) calyce sunt instructo persistente et cor. regulari, 5-partita, marcescente. Stam. cor. inserta, et ejus numero conformia (4-5). Stylus, forte in omnibus, unicus aut demum bifidus. Caps. 1-2-locularis,

2-valvis : valvis margine introflexis, semina plurima parva in valvis marginali inserta. Caulis plerisque herbaceus. Folia opposita, integra, plerisque amara. Flor. in quibusdam bracteati.

629. *SPIGELIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* didyma, 2-locularis, 4-valvis.

1. *Anthelmia*, caule herbaceo, foliis sessilibus summis 4 verticillatis. Lam. amoen. 5. t. 2. Willd. Sp. 2. p. 824. Hab. in Cajenna, Brasilia. Racemi terminales.

2. *fruticulosa*, caule fruticuloso, fol. ovatis sessilibus : summis quaternis. Lin. ill. p. 474. Hab. in Cayenna. *Cal.* 1-petalis.

3. *marilandica*, perennis, caule tetragono, fol. omnibus oppositis. L. Curt. mag. t. 202. Michaux. Flor. 1. p. 147. Catesb. carol. 2. t. 78. Hab. in Amer. boreali. Fol. sessilia, ovato-lanceolata.  $\overline{\text{U}}$

630. *OPHIORHIZA*. *Cor.* infundibuliformis. *Germen* 2-fidum. *Stigmata* 2. *Fructus* bilobus.

1. *Mungos*, fol. lanceolato-ovatis. Hab. in India orientali.  $\overline{\text{U}}$

2. *Mitreola*, caul. acutangulo, fol. ovatis sessilibus. Michaux. 1. p. 148. Swartz. obs. 59. t. 3. f. 2. (nec. 1.) *Cynoctonum* sessilifolium. Gmel. syst. Hab. in Americae agrestib. et pascuis.  $\odot$

3. *subumbellata*, caule fruticoso, fol. lanceolatis acutis, umbellis axillaribus trifidis. Forst. prod. n<sup>o</sup>. 66. Hab. in insula Otahiti.  $\overline{\text{h}}$

631. *LISIANTHUS*. *Cor.* tubo ventricoso laciniis recurvatis. *Cal.* campanul., carinatus. *Stigma* capitatum bilobum. *Caps.* 2. locularis, 2-sulca, 2-valvis. *Sem.* numerosa subimbricata, margine minimo membranaceo cincta.

1. *longifolius*, ramosus, fol. lanceolatis acutis pubescentibus, caule tereti. Willd. Sp. 2. p. 826. Brown. jam. 137. t. 9. f. 1. Hab. in Jamaicae sylvis.  $\overline{\text{h}}$

2. *glaucofolius*, fol. oblongis sessilibus, pedunculis elongatis unifloris. Jacq. ic. rar. 1. t. 33. Collect. 1. p. 64. Hab. ... Fol. avenia subtus glauca, cor. coerulescens.  $\overline{\text{U}}$

3. *exaltatus*, cor. subcampanulatis 5-fidis crenatis, pedunc. longissimo terminali. Lam. ill. p. 478. Gentiana exaltata. Liu. Hab. in St. Domingo. Priori affinis.

4. *caerulescens*, fol. lanceolatis acutis glabris, caule tetragono. W. Aubl. guj. 4. p. 207. t. 82. Hab. in pratis humidis Gujanac.  $\odot$

5. *alatus*, fol. oblongis acuminatis glabris, caule tetragono aalto. W. Aubl. p. 204. t. 80. Hab. in Cajennae et Gujanac locis incultis.  $\odot$

6. *Chelonoides*, glaber, fol. oppositi subconnatis oblongis, panicula terminali dichotoma racemosa. Lin. suppl. 134. Hab. in Surinami et Cajannae altis arenosis.

7. *purpurascens*, fol. sessilibus glabris, flor. paniculatis, caule tetragono. Willd. Aubl. guj. 1. p. 201. t. 79. Lam. ill. t. 107. f. 2. Hab. in fissuris rupium Gujanac. Cor. cernuae, incurvae.  $\odot$

8. *grandiflorus*, fol. ovatis acuminatis sessilibus, florib. paniculatis, cor. limbo undulato. Willd. L. fol. connatis ovato-oblongis acutis, flor. viriscentibus. Aubl. guj. 1. p. 205. t. 81. Hab. in humidis Gujanac, Cajennae.  $\odot$

9. *exsertus*, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. trichotomis, genitalibus longissimis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 346. Hab. in jugis montium caeruleorum Jamaicae.  $\overline{\text{h}}$

10. *frigidus*, fol. ovatis acuminatis, panicula terminali trichotoma, cor. ventricosis, laciniis subrotundis Swartz. l. c. Hab. in regione muscosa monte la Soufrière ins. Dominicae. Diversus a L. alato, quod flores erecti nec penduli et folia petiolata nec sessilia. S.  $\overline{\text{U}}$

11. *latifolius*, foliis lanceolato-ovatis acuminatis, pedunc. trichotomis, laciniis cor. erectis, genitalibus inclusis. Swartz. Fl. ind. p. 348. Hab. in montibus altis Jamaicae. Simillimus L. exserto, diversissimus genitalibus inclusis. S.  $\overline{\text{h}}$

12. *umbellatus*, fol. elongatis obovatis, flor. terminalibus umbellatis, laciniis cor. brevissimis obtusis erectis. Swartz. p. 550. Hab. in alpihus Jamaicae occidentalis.  $\overline{\text{h}}$

13. *corymbosus*, fol. ovato-lanceolatis subpetiolatis, caule tereti striato, corymbis terminalibus. Flor. Per. 2. p. 14. t. 124. L. glaber. Smith. ic. ined. 1. p. 29. t. 29. Willd. p. 828. Hab. in Peruviae nemorib. Cor. lutca. Petioli breves, connati.

14. *calygonus*, foliis lanceolato-ovatis breviter petiolatis, caule obsolete 4-gono, pedunc. 1-floris, cal. 5-gono. Flor. Per. l. c. t. 126. In Peruviae montib. frigidis. Cor. subringens, rosea rubra.  $\overline{\text{h}}$

15. *viscosus*, fol. oblongis breviter petiolatis venosissimis, caule 4-gono sulcato,

corymb. terminalib. viscosis. Flor. Peruv. l. c. t. 125. Hab. in altis locis Munna. Cor. luteo-viridis: laciniae subrotundo-cordatae.

16. *revolutus*, fol. lanceolatis petiolatis, margine revolutis, caule 4-gono striato, corymb. terminalibus. Flor. Peruv. l. 127. In Munna montib. frigidis.  $\text{h}$

17. *cordifolius*, dichotomus, fol. cordatis, acuminatis, petiolis brevibus, flor. terminalibus quandoque geminis. Brown. Jam. 137. Lin. Mant. p. 43. In Jamaica.  $\text{h}$

18. *acutangulus*, fol. sessilibus, inferiorib. cordatis, superiorib. ovatis, caule 4-gono, panic. dichotoma. Flor. Per. 2. p. 14. t. 122. f. a. Hab. in Panatabuarum montib., locis meridionalib. Cor. lutea subringens, tub. incurvato.  $\text{C}$

19. *ovalis*, fol. ovalibus aveniis breviter petiolatis, caule tereti, pedunc. corymbosis dichotomis. Flor. Per. 2. p. 13. Hab. in Peruv. nemorib. Cor. viridi-lutea. Caps. pendulac. Caul. virgati.  $\text{h}$

20. *carinatus*, fol. subrotundo-ovatis trinerviis sessilibus, foliolis calycinis carina sursum ampliata. Latis, Lam. enc. 3. p. 658. t. 107. f. 3. Hab. in Madagascar.  $\text{h}$

21. *trinervius*, pubescens, fol. ovatis mucronatis trinerviis, flor. laxo paniculatis terminalibus. Enc. 3. p. 630. ill. p. 476. Hab. in Madagascar.  $\text{h}$

22. *campanulaceus*, fol. ovatis acutis petiolatis, flor. terminalib. subinaequalibus. Lam. ill. p. 476. Enc. bot. 3. p. 660. Hab. in Amer. meridionali. Cor. magna. Stam. incurva: 2 breviora?  $\text{C}$

23. *parvifolius*, caule subuliformi, fol. linearibus, corymb. terminali paucifloro. Lam. ill. l. c. Cum priore. Caul. simpl. Fol. minuta, erecta. Flor. parvi, infundib.

632. *CHIRONIA*. Cal. 5-partitus, subcampanulatus. Cor. subrotata. Pistillum declinatum. Stam. tubo corollae insidentia. Antherae deumculares spirales. Pericarpium 4-loculare.

1. *trinervia*, herbacea, calycinis foliolis membranaceo-carinatis. L. Willd. Sp. 2. p. 1065. Burm. zeyl. 145. t. 67. Hab. in Zeylona.  $\text{C}$

2. *Jasminoides*, herbacea, fol. lanceolatis, caule tetragono, calycib. subulatis. Lam. ill. p. 479. t. 108. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

3. *Lychnoides*, caule simplici, foliis linearis-lanceolatis, internodiis longioribus. Hab. ad radices montium Cap. b. spei. Cal. foliola carinata. Cor. purpurea.

4. *uniflora*, caule simplici virgato anguloso, fol. linearis-lanceolatis internodiis subbrevioribus, flor. magno terminali. Lam. enc. 2. p. Ej. ill. p. 480. t. 108. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *Melampyriifolia*, fol. lanceolatis sessilibus lateralibus decurrentibus, cal. tubo brevior. Lam. ill. p. 479. Cum priore.

6. *nudicaulis*, herbacea, fol. oblongis obtusiusculis, caul. subdiphyllis simplicissimis unifloris, cal. denubus setaceis. Lin. suppl. p. 151.

7. *campanulata*, herbacea, fol. sublinariis, calycib. longitudine corollae. L. Hab. in Canada. Caul. ramis longis Fol. lanceolato-linearis, laevia. Flor. solitarii, purpurei. L.

$\beta$ . *gracilis*, ramis laxis setaceo-elongatis 1-floris, fol. linearis-setaceis, cal. setaceo cor. subaequali. Michaux. Flor. 1. p. 146. In Carol. inferiore. Caul. debilis. Cor. rosea: lacin. obovalibus.

8. *paniculata*, erecta firma, fol. lanceolato-linearibus, panic. brachiata multiflora subfastigiata, cal. subulato cor. semibrevis. Michaux. l. c. Cum priore. Caul. lineis 4 subquadrangulus.

9. *angularis*, caule erecto marginato-4-angulo, fol. amplexicaulib., corymb. multifloro, cal. hinc lanceolato-linearib. Michaux. Lin. Sp. pl. Hab. in Virginia et Carol. inferioris uliginosis subulosis.

10. *linoides*, fol. linearibus glabris, caule herbaceo fastigiato ramoso. Thunb. Bryn. cent. 175. t. 90. Hab. in Capitiis b. Spei herbilib.  $\text{h}$

11. *baccifera*, fol. linearis-lanceolatis glabris, caule fruticoso ramosissimo, fructu baccato. Thunb. prod. 35. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei. Caulis 4-gonus.

Obs. Stigm. petistum. Bacca 1-locularis, polysperma: *Roeslinia* tetragona. Moench. Method. plant. Suppl. p. 211.

12. *frutescens*, fruticosa, fol. lanceolatis subtomentosis, calycib. campanulatis. L. Mill. dict. t. 37. Lam. ill. t. 108. f. 1.

13. *decussata*, fruticosa subtomentosa, f. l. decussatis oblongis lato-linearibus, cal. globosis quinquepartitis. Vent. hort. Cels. p. 31. t. 31. Hab. ad Cap. bon. Sp. Flor. magni. Caul. et cal. magis tomentosus. Sapi. amarus. Prioris var.?  $\text{h}$

† *Chloroideae*.

14. *ealycosa*, fol. oblongo-obovalibus, flor. solitariis subseptempariis, cal. foliaceo corollam superante. Michaux. l. c. p. 147. *C. dichotoma* Walter? In Carol. infer. erecta. Cor. laciniae obovales.

15. *chloroides*, caul. subdecumbente, fol. lanceolatis erectis, flor. 7-13-partiis, lacinii oblongis. Michaux. *Chlora dolocandra*. Lin. Willd. Sp. v. 3. p. 341. Hab. in Noveboraco et N. Caesarea.

633. *FRYTHRAEA*. *Cal.* appressus, subpentagonus, 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: tubo longo. *Antherae*, post anthesin, spirallyter tortae. *Stigmata* 2 approximata; rarius simplex. *Caps.* sublinearis, 1-locularis. *Recept.* 2, extantia. (Richard. Cat. hort. med. paris.)

\* *Flor. sessilibus*.

1. *Centaurium*, foliis oblongo-ovalibus basi rosaceis congestis, caule elongato, flor. fasciculato-paniculatis, basi squamis 1-2 cinctis. Gent. *Centaurium*. Lin. *Chironia* Gent. Willd. Flor. dan. t. 617. *Centaurium* vulgare. Rafn. Schum. Sacland. p. 68. Hab. in sylvis. Var. flor. albis.

β. *grandiflora*, major, limbo majusculo concavo petalis latis. In pratis humidis passim. An hujus loci *Centaur. Erythraea*. Rafn. Schousboe?

2. *chilensis*, fol. lanceolatis, caul. dichotomo corymboso. Willd. Sp. 2. p. 1067. sub *Chironia*. Gent. peruviana. Lam. enc. 2. p. 642. Few. Peruv. 2. t. 35. Hab. in regn. Chilensis et Peruviae. Fol. 1 - nervis. Lam. ☉

3. *conferta*, pumila stricta ramosa, fol. ovalibus obtusis, flor. sessilibus fasciculatis confertis, cal. cor. tubum ad dimidium aequante. Habit. in Hispania. Ex Herb. Richardi.

4. *spicata*, fol. lanceolato-oblongis, ramis dichotome paniculatis, flor. subcandis, cal. bracteisque cor. subaequalibus. *Chironia spicata*. Willd. p. 1063. In Europae australioris pratis humidis herbosis, et in Barbaria. *Stigma* capitatum, integrum.

\*\* *Flor. pedicellatis*.

5. *ramosissima*, subpumila ramosissima, fol. brevioribus, caul. geniculis aequalibus, flor. subdichotomis basi squamis desti-

tutis. *Chironia Gerardi*. Schmidt Flor. bohém. 1. n. 13. Gent. palustris. Lam. Vaill. par. t. 6. f. 1.

β. *inaperta*, pumila simplex ramosaque foliosa, fol. ovatis, flor. ternis limbo connivente acuto. Hujus loci *Chir. inaperta*. Willd. Gent. pusilla. Lam. Vaill. t. 6. f. 2. Hab. in pascuis.

6. *luteola*, patule ramosa setacea, fol. linearibus angustis, cal. patulo cor. subaequali. Cum priore rarius. Pedunc. elongati solitarii. Cor. 4-fida? lutea. Anth. non tortiles?

7. *maritima*, herbacea, fol. oblongo-lanceolatis, caule dichotomo corymboso, tereti, flor. pedunculatis digynis. *Chironia*. Willd. Cav. ic. 3. p. 49. t. 296. f. 1. In Europae australis maritimis. Cor. lutea. β. *tingitana*, caul. compressiusculo, fol. trinerviis. Schousboe. p. 85.

8. *pyrenaica*, fol. ovato-lanceolatis erectis, cor. lacin. lanceolatis. Hab. in Pyrenaeis. Cor. alba. Rich.

9. *linarifolia*, cor. infundibuliformi, stylo longo simplice, fol. linearibus subuninerviis. Lam. enc. 2. p. 641. sub *Gentiana*. Bocc. Mas. 2. t. 43. Barrell. ic. 423. Hab. in Europa australi. Hispania etc. Rad. fusiformis. Flor. purpurasc. Lam.

634. *VOHIRIA*. *Cor.* hypocrateriformis, tubo longissimo utriusque tumido, limbo 5-fido, lacin. ovatis patentibus. *Antherae* in fauce tubo sessiles. *Stigma* simplex. *Caps.* 1-locularis bivalvis. *Sem.* numerosa, scobiformia.

1. *caerulea*, flor. geminatis, cor. lacinii rotundatis. Lam. ill. p. 491. sub *Vohiria*. Aubl. guj. 1. p. 21. t. 83. f. 2. Lita caerulea. Willd. Sp. p. 1071. Hab. in Gujanae sylvis. T

2. *rosea*, flor. geminatis, cor. lacinii acutis. Lam. t. 109. Aubl. l. c. t. 83. f. 1. Lam. ill. t. 109. L. rosea Willd. Cum priore.

5. *spathacea*, caul. multifloro, bract. subspathaceis, cor. lacinii oblongis. Lam. ill. p. 491. Hab. in Gujana.

4. *breviflora*, caul. subtrifloro, fol. membranaceis, cor. tubo cal. duplo longiore. Lam. ill. Cum priore. Richard. Caul. apollinaris.

5. *uniflora*, caul. subaphyllo 1-floro, cor. lacini. acutis. Lam. l. c. Gentiana.

6. *aphylla*. Jacq. amer. t. 60. f. 3. Hab. in Martinicae sylvis humentibus. Incolit vetustarum arborum truncos cavos, in quibus tractu temporis aliqua humi portio fuit collecta, quo sensu parasitica posset vocari. Jacq.

## DIGYNIA.

635. GENTIANA. Cor. 1 - petala.

Caps. 2-valvis, 1-locularis, Receptaculis 2, longitudinalibus.

\* Corollis 5-9-fidis subcampanulatis.

1. *lutea*, fol. latis ovatis nervosis, cor. subquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. L. Mat. med. p. 75. Willd. dict. Willd. Sp. 2. p. 1331. Froelich. de Gent. p. 15. Asterias. Rencalm. spec. 64. t. 63. Hab. in alpinis et subalpinis pratis. Fol. Veratri. Rad. magna carminativa.

2. *purpurea*, cor. subquinquefidis campanulatis striato-punctatis verticillatis, cal. membranaceis spathaceis. Froel. p. 18. Andrew. t. 117. Flor. dan. t. 50. G. punctata. Villars. delph. 2. p. p. 522. Hab. in alpinis Helveticis, Sabaudis, Pyrenaeis, Delphinatus, Norvegicis. ¶

3. *pannonica*, cor. subsexfidis campanulatis punctatissimis verticillatis, cal. coriaceis truncatis. Froel. p. 21. Fol. caulinis lanceolatis acuminatis. Jacq. austr. 2. t. 136. G. punctata. Jacq. obs. 2. p. 17. t. 39. Moris. 2. 12. t. 4. f. 3. In alpinis. A. sequente differt: cor. laciniis subrotundo-ovatis nec ovatis acutiusculis. Willd.

4. *punctata*, cor. subsexfidis campanulatis punctatissimis verticillatis, cal. membranaceis truncatis. Froel. l. c. p. 24. Jacq. austr. 5. t. 28. G. purpurea. Villars. Moris. 2. 12. t. 4. f. 2. Hab. in alpinis. ¶

5. *campanulata (immaculata)*, cor. septemfidis campanulatis striatis immaculatis, cal. septemfidis. Murr. syst. 267. Jacq. austr. 5. p. 43. app. t. 29. G. alpina major, flor. flavis punctis correntibus. Bauh. pin. 187. Hab. in alp. Carinthiae Garten, et in alpinis Aquilejensibus. ¶

6. *septemfida*, cor. campanulatis septemfidis quinquefidisque, laciniis intermediis ciliatis. Froel. p. 47. Pall. ross. 2. p. 101. t. 92. f. 1.

7. *asclepiadea*, cor. quinquefidis campanulatis oppositis axillaribus subsessilibus,

foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis. Froel. Jacq. austr. t. 328. Lam. ill. t. 109. f. 3. G. asclepiadis folio. Bauh. pin. 187. β. *plicata*, caule 1-floro. Schmidt. Hab. in montosis Helvetiae, Austriae, Italiae, Hispaniae, etc.

8. *montana*, cor. quinquefidis campanulatis, fol. cordatis sessilibus. Forst. prod. n°. 133. Hab. in Zeelandia.

9. *cruciata*, cor. quadrifidis imberbibus, flor. verticillatis sessilibus, fol. decussatis connato-vaginantibus. Jacq. austr. t. 372. Tretorrhiza. Rencalm. spec. 74. t. 73. Hab. in montosis apricis et sylvaticis. ¶

10. *macrophylla*, flor. quinquefidis sessilibus verticillatis, fol. radicalibus caulem inferne subnudum aequantibus. Froel. Gent. p. 31. Pall. ross. 2. p. 108. t. 96. G. flor. confertis terminatricibus, cor. 4-5-fidis lanceolatis, caule procumbente media parte nudo. Gmel. sib. 2. p. 104. t. 52. Hab. in Sibiria praesertim orientaliore. ¶

11. *adscendens*, cor. quinquefidis campanulatis subsessilibus axillaribus, fol. acutis: radicalibus lanceolatis elongatis. Froel. p. 43. G. decumbens Lin. suppl. 174. Pall. ross. t. 94. Gmel. sib. t. 71. f. 4. excl. synonym. In montosis apricis Sibiriae. ¶

12. *triflora*, cor. campanulatis quinquefidis aggregato-sessilibus. fol. linearibus, flor. alternis productis. Froel. p. 38. Pall. ross. t. 93. f. 1. Hab. in Sibiria orientali, in alpinis Transbaicalensibus. ¶

13. *frigida*, cor. campanulatis quinquefidis terminalibus sessilibus binatis, laciniis obtusis, fol. linearibus oblongis ternariis. Willd. p. 137. Froel. p. 39. Icon. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 13. Schmidt. in Roemer. Archiv. 2. p. 14. t. 2. f. 2. In alpinis summis Styriacis, Carpathicis. A sequente diversa. ¶

14. *algida*, cor. campanulatis quinquefidis terminalibus pedunculatis subternis, laciniis acutis, fol. lanceolatis trinerviis. Willd. p. 137. Pall. ross. 2. p. 107. t. 95. Pall. itin. 3. app. n°. 82. t. L. fig. 2. Hab. in alpinis ad Jeniseam, ad lacum Baical et inque Camtschatka. ¶

15. *saxosa*, cor. quinquefidis campanulatis, fol. spathulatis. Lin. suppl. 175. Forst. in Act. holm. 1777. p. 184. t. 5. Hab. in rupibus maritimis. N. Zeelandiae. ¶

16. *Pneumonanthe*, cor. 5-fidis campanulatis axillaribus pedunculis, fol. linearilanceolatis obtusis. Flor. dan. t. 209. Michaux. Flor. 1. p. 176. In Europae et Americae pratis humidis. Cqr. speciosa. Filam. connata. ¶



17. *Saponaria*, caul. cylindrico asperiusculo, fol. ovali-lanceolatis, flor. fasciculatis sessilibus, cor. quinquefidæ lacin. cum acumine obtusis. Michaux. Flor. 1. p. 176. Catesb. car. 1. t. 70. Willd. p. 1338. In Amer. boreal. sylvarum herbosis. Habitat *G. cruciatae*. Cal. lacin. foliaceae. Cor. majusculæ plicæ internæ in lacinulam desinunt. M.

18. *puberula*, caule asperiusculo, fol. lineari-lanceolatis undulosis calycibusque ciliatis flor. sessilib. terminalib. 5-fidis. Mich. l. c. Hab. ad confluentem fluv. Ohio et Missisipi. *G. Pneumonanthe* affinis. Cor. majusculæ lacin. obtusæ.

19. *angustifolia*, caule simpliciter gracili 2-floro, fol. angusto-linearib. patulis, cor. quinquefidæ lacin. in denticulum lacernum desinentib. Mich. p. 177. Hab. in Carol. inferior. pratis. Cor. magna.

20. *villosa*, cor. quinquefidis campanulatis ventricosis, fol. villosis. Froel. Gent. p. 36. Hab. in Virginia. Cor. extus pallida, intus lineato-varia. †

21. *ochroleuca*, cor. quinquefidis campanulatis verticillatis subpedunculatis, fol. ovato-lanceolatis trinerviis laevibus. Froel. p. 35. Pluck. alm. 166. t. 186. f. 1. Hab. in Virginiae, Carolinae locis humidis. ‡

22. *linearis*, cor. quinquefidis campanulatis obtusiusculis terminalibus congestis sessilibus, fol. linearibus acutiusculis. Froel. p. 37. In Pennsylvaniae vallibus montanis. ‡

23. *quinqueflora*, cor. quinquefidis tubuloso-campanulatis terminalibus subquinis, caule ramosissimo alato, fol. amplexicaulibus. Froel. p. 51. *G. quinquefolia*. Lin. Hab. in Pennsylvania, Carolina. Statura *G. Amarellæ*. ☉

24. *aurea*, cor. subquinquefidis campanulatis verticillatis, fol. ovatis, caule inferne ramoso. Froel. p. 54. *G. involucreata*. Rottb. in Act. Ilaf. 10. p. 434. t. 1. f. 2. A. B. Flor. dan. t. 344. ☉

25. *glauca*, cor. quinquefidis campanulatis sessilibus, fol. ovatis rotundatis. Pall. ross. 2. t. 93. f. 2. Hab. in Camtschatkae alpinis et in insulis Beringii. Caul. digitatis, simplicissimus. Cor. e glauco caeruleus. W. †

\*\*\* *Cor. infundibuliformibus nudis decemfidis.*

26. *altaica*, cor. decemfida infundibuliformi, lacinii alternis minoribus serrulatis, caule florib. brevior. Pall. ross. 2. p. 109. t. 97. f. 1. Froel. p. 62. *G. grandiflora*. Lax-

mann. in Comment. N. Petrop. 18. p. 526. t. 6. f. 1. Hab. in Sibiriae alpinis summis Altaicis ad nives. ‡

27. *pyrenaica*, cor. decemfida infundibuliformi, caule inferne ramoso, fol. lanceolato-linearibus. Froel. p. 63. Gouan. illust. 7. t. 2. f. 2. Cresc. in Pyrenæis. ‡

\*\*\* *Cor. nudis quinquefidis.*

28. *grandiflora* (*acaulis*. L.), cor. quinquefida campanulata, caul. quadrangulum subequante, fol. ovato-lanceolatis trinerviis. Vill. delph. 2. p. 525. Froel. Gent. p. 57. Lam. enc. 2. p. 637. Ciminalis longiflora. Moench. meth. p. 514. Anth. connatae. Plant. culta caulescens. ‡

β. *angustifolia*, fol. oblongo-linearibus enerviis, cor. campanulata excedente. Villars. l. c. p. 526. Bar. ic. 110. *G. caulescens*. Lam. enc. 2. p. 638. Valde amara. Anth. quoque connatae.

γ. *alpina*, fol. ovoidis subcarnosis enerviis obtusis, cor. campanulata caul. elongato aequante. Vill. l. c. t. 10. Praecedentibus minor. Fol. vere rotunda. V. Cresc. cum priorib. in alpinis, germanicis, italicis et gallicis.

29. *longiflora*, cor. subquinquefida infundibuliformi caul. longiore, fol. confertis sublinearibus. Lam. ill. p. 485. Hab. in Sibiria. Cor. 2. unc. longa.

\* *serpyllifolia*, cor. 5-fida infundibuliformi lobis subintegerrimis acutiusculis, fol. ovatis obtusis. Lam. enc. 2. p. 540. Cam. hort. t. 15. f. 1. Barrel. ic. t. 101. f. 1. Hab. in Italia.

β? *brachiphylla*, fol. lanceolatis subrotundis brevissimis, cor. infundibuliformi. Vill. delph. 2. p. 528. Barrel. ic. 103. 2. Hab. in summis alpinis Delphinatus. Cor. azurea, denata.

γ. *elongata*, cor. quinquefida infundibuliformi, caule elongato filiformi subnudo uniflora, cal. oblongo aequali, fol. radicalibus aggregatis. Haenke in Georg. Coll. 2. p. 88. t. 17. f. 3. *G. uniflora*. Jacq. it. 1. p. 203. t. 1. f. 2. Hab. in alpinis.

30. *verna*, caul. simpliciter pumilo, cor. quinquefida infundibuliformi caulem excedente, fol. ovatis acutiusculis radicalibus confertis majoribus. L. Cor. crenata, lacin. basi appendiculatis. Smith. brit. 1. p. 285. Engl. bot. t. 493. Barr. ic. 109. f. 1. *G. bavarica*. Jacq. obs. 3. p. 19. t. 71. Barr. 109. f. 2. *Ericala*. Rencal. spec. 75. t. 68. f. 2.

31. *utriculosa*, multicaulis, fol. radicalib. ovatis rosaceis, cor. quinquefidis hypocrateriformibus, cal. plicato-carinatis. L. Barr. ic. 48. 122. f. 2. Hab. in Germaniae australioris, Helvetiae, Italiae et Galliae pratis montanis et subalpinis. ☉

32. *bavarica*, cor. quinquefida infundibuliformi, laciniis obtusis serratis, fol. ovatis obtusis, radicalib. confertis imbricatis, caulinis minoribus. Froel. Gent. p. 71. Villars. delph. 2. t. 10. Schmidt. in Roemer. Archiv. 1. p. 17. t. 5. f. 12. Gentianella elegantissima bavarica. Cam. hort. 65. t. 15. f. 1. Barr. ic. 101. In alpinibus.

33. *pumila*, cor. quinquefida infundibuliformi subserrata, fol. lanceolato-linearibus. Jacq. Obs. 2. p. 29. t. 46. Ej. Flor. austr. 4. t. 302. In Alpij. Una cum antecedente *G. vernae* nimis affinis. ☿

34. *imbricata*, cor. quinquefida infundibuliformi caulem superante, fol. imbricatis ovatis acutis margine scabris. Froel. p. 74. Cam. hort. t. 15. f. 2. Barr. ic. f. 2. Hab. in alpinibus Helvetiae, Carinthiae. ☿

35. *prostrata*, cor. quinquefida infundibuliformi, caul. unifloris prostratis, fol. obtusis subimbricatis. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 66. t. 17. f. 2. Hab. in summis alpium Salisburgensium. ☿

36. *nivalis*, caul. multifloro, cor. quinquefidis infundibuliformibus, ramis alternis unifloris, fol. caulinis lanceolatis. Froel. p. 83. Flor. dan. 17. Hall. helv. t. 17. β. caule elongato filiformi subramoso. Froel. Barr. ic. 509. f. 2. γ. caule humili subunifloro. Barr. ic. 103. f. 2. Hab. in summis alpinibus. ☉

37. *aquatica*, cor. quinquefidis infundibuliformibus terminalibus sessilibus, fol. margine membranaceis. L. Pall. ross. 2. p. 109. t. 97. f. 2. G. humilis aquatica verna. Amm. ruth. 4. t. 1. f. 1. Hab. in Sibiria, Japonia, China ad aquas. ☉

38? *Scilloides*, caule unifloro prostrato ramoso, fol. obovatis obtusis trinerviis, cor. infundibuliformibus quinquefidis, bracteis binis. Linn. suppl. 175. Hab. in insulis Azoreis. Limbus planus imberbis luteus.

39. *Amarelloides (kentuckensis)* caul. 4-gono, fol. semi-amplexicaulib. ovalibus, flor. subternis pedicellatis, cor. (sublutea) 5-fida, lacin. lanceolatis setaceo-acuminatis. Michaux. Flor. t. p. 175. Hab. in monticulis Kentucky. Sequente paullo minor. Cor. obsolete lutea, munita, fauc. glabra. M.

\*\*\* *Cor. fauce squamis capillaceo-multifidis acutis, 4-5-fidis.*

40. *Amarella*, flor. fasciculato-subumbellatis, cor. hypocrateriformib. 5-fidis fauce barbatis: tubo transversim crispo, cal. lacin. aequalibus, fol. ovato-lanceolatis. Flor. dan. t. 328. Var. flor. 4-fidis. Smith. brit. 1. p. 297. Autumno frequens in sylvaticis, et pascuis cal. careis. Sapor valde amara. Huc pertinet *G. germanica*. Willd.

41. *lanceifolia*, cor. hypocrateriformib. 4-5-partiis barbatis acutis: laciniis lanceolatis acutis, fol. lanceolatis. Rafn. Flor. Dan. Schumacher. Flor. Saelland. p. 80. G. Amarella. Willd. p. 1347. Hippiion axillare. Schmidt. Habit. in Europ. septentrionalis pratis. Aug. Sept. Cor. minor quam in priore. Rad. flava. Willd.

42. *uniflora*, cor. quinquefida hypocrateriformi barbata, laciniis ovatis acutis, fol. ovatis acutis, caule simplicissimo unifloro. Willd. Hippiion Gentianella. Schmidt. l. c. p. 23. t. 3. f. 4. In pascuis humidis alpinis Sudetorum et Bavariae. ☉

43. *obtusifolia*, cor. quinquefidis hypocrateriformibus barbatis, tubo calyce subaequali breviori, fol. lanceolatis obtusis. Hippiion obtusifolium. Schmidt. bohém. n°. 126. Roem. arch. 1. p. 22. t. 2. f. 3. Hab. in summis montium jugis Bavariae inque Sudetis. ☉

44. *uliginosa*, cor. subquinquefidis hypocrateriformibus acutis fauce barbatis, calycib. subaequalibus, fol. ovato-lanceolatis, caule ramoso tetragono basi subulato. Willd. p. 1347. G. Amarella. Willd. profl. Berol. n°. 293. Hab. in Marchiae Electoralis pascuis udis. ☉

45. *pratensis*, cor. subquinquefidis hypocrateriformibus obtusis fauce barbatis, cal. laciniis inaequalibus, fol. lanceolatis. Froel. Gent. p. 88. Flor. Dan. t. 328. G. campestris. Pall. ross. 2. p. 107. Hab. in Russiae, Sibiriae et Daniae pratis et humidis. ☉

46. *campestris*, cor. quadrifidis hypocrateriformibus obtusis fauce barbatis, cal. laciniis duabus maximis. Froel. p. 21. Flor. dan. t. 357. Hab. in pascuis montanis, sylvat.

47. *auriculata*, cor. quadrifidis quinquefidisque campanulatis intus villosis, cal. laciniis alternis cordatis. Pall. ross. 2. p. 102. t. 92. f. 1. In Sibiria, Camuschaika, etc. ☉

48. *tenella*, cor. quadrifidis hypocrateriformibus fauce barbatis, caule subdichotomo, pedunc. longissimis, fol. subovatis

obtusiusculis. Froel. p. 96. Rottb. Act. Hafn. 40. p. 436. t. 2. f. 6. Flor. dan. t. 3:8. *G. tetragona*. Lam. Hab. in alpinis Norvegiae inque Islandia. Cal. laciniæ subrotundo-ovatae acutae, duae majores et latiores. Willd. ☉

49. *glacialis*, cor. quadrifidis hypocrateriformibus fauce barbatis, caule inferne ramoso folioso. Froel. p. 98. Villars. delph. 2. p. 532. *G. tenella*. Towson Travels in Hungary. t. 14. Hippien longepedunculatum. Schmidt. l. c. p. 21. t. 3. f. 5. Hab. in summis alpinis.

50. *dichotoma*, cor. quinquefidis campanulatis fauce barbatis, caule dichotomo, pedunc. longissimis, fol. subovatis acutis. Froel. p. 100. Pall. ross. 2. p. 110. Gmel. sib. 4. p. 106. t. 51. f. b. Hab. in Sibiria. ☉

51. *nana*, cor. quinquefidis campanulatis fauce barbatis, caul. subdichotomis, pedunc. elongatis, fol. ovatis obtusis. Froel. p. 102. Jacq. Misc. 1. p. 161. t. 10. f. 3. Hab. in summis alpinis Carinthiae et Salisburgi ☉

52. *carinthiaca*, cor. quinquefidis rotatis fauce barbatis, caul. dichotomis, pedunc. longissimis, fol. ovatis obtusis. Froel. de Gent. p. 103. *Swertia carinthiaca* Jacq. misc. 2. p. 53. t. 6. In alpinis Carinthiacis et Salisburgensibus. ☉

53. *sulcata*, cor. quinquefidis rotatis fauce squamosis, calycisque laciniis lanceolatis, fol. linearib. obtusis. Willd. p. 1351. *Swertia sulcata*. Rottb. in Act. Haf. 10. p. 438. t. 1. f. 4. Flor. dan. t. 343. Hab. in Islandia. An a sequente diversa? ☉

54. *rotata*, cor. quinquefidis rotatis, fauce squamosis, laciniis ovatis, cal. lacin. oblongo-ovatis, fol. ovato-lanceolatis acutiusculis. Willd. Cor. quinquefidis rotatis, fauce squamosis, fol. linearib. lanceolatis. Froel. p. 105. *Swertia rotata*. Lin. Gmel. sib. 4. t. 52. f. 2. Pall. ross. t. 89. Hab. in Sibiria. ☉

\*\*\*\*\* *Cor. quadrifidis hypocrateriformibus, fauce nudis.*

55. *ciliata*, cor. quadrifidis, laciniis serratis medio inciso-ciliatis, fol. lanceolatis linearibusque, caule flexuoso angulato. Froel. p. 109. Jacq. austr. t. 113. Hab. in montibus. ☉

56. *crinita*, cor. quadrifidis, laciniis inciso-ciliatis, fol. lanceolatis acutis, caule erecto tereti. Froel. p. 112. Hab. in Amer. boreali.

57. *barbata*, cor. quadrifidis, laciniis

serrulatis medio inciso-ciliatis, fol. linearibus acuminatis, caule angulato stricto. Froel. p. 114. Pall. ross. 2. t. 92. f. 2. Hab. in Sibiria et in pratis alpinis Caucasi. ☉

58. *detonsa*, cor. quadrifidis, laciniis apice crenulatis, margine utrinque bidentatis, fol. linearibus acutis caule erecto. Froel. p. 116.

636. SWERTIA. Cor. rotata. Nectariferi poro ad basin laciniarum corollae. Caps. unilocularis, 2-valvis.

\* *Corolla ecalcarata.*

1. *perennis*, cor. quinquefidis, pedunc. tetragonis subulatis, caule indiviso, fol. radicalibus ovalibus. Willd. Sp. 2. p. 1329. Jacq. austr. t. 243. Hab. in alpinis et locis montosis humidis.

2. *difformis*, cor. quinquefidis terminali sexfida, pedunc. longissimis, fol. linearibus. L. Hab. in Virginia. Flor. albi.

3. *decumbens*, cor. quinquepartitis, fol. linearib. lanceolatis, caulibus decumbentibus. Vahl. symb. 1. p. 24. *Parnassia polynectaria*. Forsk. descr. 207. Icon. t. 5. f. 6. Hab. in Arabia felici.

4. *dichotoma*, cor. quadrifidis, pedunc. nutantibus, fol. ellipticis, caule ramoso. Willd. Gmel. t. 53. f. 3. Pall. ross. 2. t. 91. Hab. in Sibiria. ☉

5. *tetrapelata*, cor. quadrifidis, fol. lanceolatis nervosis, caul. simplice. Pall. ross. 2. p. 99. t. 50. Hab. in Camtschatka. ☉

\*\* CERATIA. Cor. subcampanulata, basi cornicula exserens.

6. *corniculata*, flor. quadrifidis, cor. subcampanulata, tubo deorsum quadrilobato. Michaux. Flor. 1. p. 97. Gmel. Sibir. 4. t. 53. f. 4. Pall. ross. 2. t. 90. f. 1. Hab. in Sibiriae et Canadae paludosis. Flos. flavovirens. ☉

7. *umbellata*. cor. quadrifidis, quadricornibus, fol. lanceolato-linearibus connatis, flor. terminalib. umbellatis. Flor. Peruv. 3. p. 21. t. 242. f. b. Hab. in Andium alpinis. Cal. corollaeque lutea. ☉

CONVOLVULACEAE pentandri-digyni.  
(Gen. 637 - 643.)

637. FALKIA. Cal. subinflatus, 5-partitus, 5-angularis. Cor. campanulata, emarginato crenata (crenato-decempartita. Andr.)

*Styli* divaricati. *Stigm.* subglobosa, lanata. *Sem.* 4, globosa, arrillata, in fundo calycis. *Andrew.*

1. *repens*, fol. cordatis longe petiolatis, caul. sarmentoso. *Andrew.* Repos. t. 257, qui bene observavit hoc genus non ad Hexandriam pertinere, ad quam retulit Linne, fil., Willd. Sp. tom. 2. p. 248. Hab. ad Cap. bon. Sp. Convolv. exacte refert, sed fructu a convolvulaceis differre videtur.

638. *EVOLVULUS. Cal.* 5-phyllus. *Cor.* rotato-campanulata: lobis subemarginatis. *Styli* 2, profunde bifidi: laciniis capillaribus divergentibus. *Stigm.* simplicia. *Caps.* 2-locularis, 4-valvis, 4-sperma. *Sem.* bina. (*Sem.* solitarium. Lin.) *Flor. Peruv.*

1. *nummularius*, fol. subrotundis, caul. repente, flor. subsessilibus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1516. Jacq. amer. pict. t. 260. f. 23. Sloan. hist. t. p. 157. t. 99. f. 2. Hab. in Jamaicae pratis. ☉

2. *villosus*, fol. oblongo-ovalibus, caul. procumbentibus, pedunc. longis bifloris. *Flor. Per.* 3. p. 30. t. 253. f. h. Hab. in Peruv. collib. arenosis. Fol. perpendicularia. *Cor.* caeruleo-violacea. ☿

3. *incanus*, fol. ovatis acutis, caul. procumbentibus, pedunc. brevibus 1-2-floris. *Flor. Peruv.* l. c. p. 30. t. 252. (*E. sericeus*.) Cum priore. Suffrutescens, dense sericeus. *Cor.* caerulea, extus villosa. ♀

4. *gangeticus*, fol. cordatis obtusis mucronatis petiolatis villosis, caule diffuso, pedunc. unifloris. L. Amoen. acad. 4. p. 306. n°. 121. Hab. in India.

5. *emarginatus*, fol. reniformibus repandis. Linn. suppl. p. 186. Burm. ind. 77. t. 30. f. 1. In India orientali. ☉

6. *alsinoides*, fol. oblongo-obovatis obtusis glabrisculis petiolatis, pedunc. trifloris. Willd. p. 517. Rheed. it. t. 64. Hab. in Malabar, Zeylona. ☉

7. *hirsutus*, fol. ovatis sessilibus utrinque hirsutis, caul. pilosis cespitosus, pedunc. subunifloris. Lerm. Encyc. 3. p. 38. Ejusd. ill. t. 216. f. 2. Burm. Zeyl. 11. t. 6. f. 1. et t. 9. f. 1. Pluck. alni. 116. t. 9. f. 1. Hab. in India orientali. ☉

8. *linifolius*, foliis lanceolatis villosis sessilibus, caule erecto, pedunc. trifloris

longis. L. Amoen. 4. p. 306. n°. 122. E. fol. lanceolatis villosis sessilib., caul. erecto piloso, pedunc. longis submultifloris. Lam. l. c. p. 537. Ej. ill. t. 216. f. 1. Brown. jam. 152. t. 10. f. 2. Hab. in Jamaica. *Cor.* subtubulosa caerulescens.

9. *sericeus*, foliis lanceolatis sessilibus subtus sericeis, pedunc. brevibus unifloris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 576. Brown. jam. t. 10. f. 3. Hab. in sabulosis arillis Jamaicae. Simillima *E. linifolio*, sed distinguitur pedunc. brevissimis unifloris. S. ☉

β? *Commerioni*, flor. axillarib. subsessilibus solitariis albis, fol. parvis linearilanceolatis. *Convolvulus* Commeri, vid. Lam. enc. 3. p. 538. In Montevideo.

639. *DICHONDRA. Cal.* 5-partitis; laciniis subspathulatis. *Cor.* brevicampanulata, 5-partita. *Stigma* peltato-capitata. *Caps.* subcompressa, partito-didyma, 2-locularis: loculis 1-spermis. *Sem.* globosa.

1. *carolinensis*, pubescens, fol. absque emarginata reniformibus (senior-biculatis?) utrinque viridibus, cal. villosociliatis. Michaux. Flor. 1. p. 136. Dimidiata repens. Gmel. Hab. in Carolina. *Styl.* 1, sed profunde bipartitus. M.

2. *repens*, fol. reniformibus emarginatis subtus pubescentibus. Willd. Sp. 2. p. 1353. Smith. ic. ined. 1. p. 3. t. 80. Lam. ill. t. 183. Sibthorpia evolvulacea. Lin. Supp. p. 288. Hab. in N. Grenada et N. Zeelandia.

β? *peruviana. D. repens*, caul. filiformi, repente, fol. reniformibus emarginatis, subtus nervosis sericeis. *Flor. Peruv.* 3. p. 22. In Peruviae ruderalis. *Cor.* albido-lutea. Fruct. dispermus, membrana tenui evolvi tectus. l. c.

\* *sericea*, fol. reniformibus retusis subtus sericeis. Swartz. Flor. 1. p. 556. Willd. p. 556. Hab. in Jamaica et in Ins. Mauritiis. ☿

640. *CRESSA. Cal.* 5-phyllus. *Cor.* hypocrateriformis. *Filam.* tubo indentata. *Cap.* supra 2-valvis, 1. s. 4-sperma; basi dehiscens.

1. *cretica*, cor. imberbibus, capsulis monospermis. Retz. obs. 4. p. 24. Willd. p. 1320. Lam. ill. t. 183. Desf. Atl. t. p. 220. *Lysimachiae* spicatae purpureae affinis. Pluck. alm. 216. t. 47. f. 6. Hab. in Creta litioribus salsis, et ad maris littora prope Tancrum. Cineræ, pubesc.

2. *indica*,

2. *indica*, cor. apicibus barbatis, capsulis tetraspermis. Retz. obs. 4. p. 24. Hab. in Indiæ salsis. Similis *C. creticae*. ☉

641. *NAMA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-partita. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis. *Recept.* 2-lamellatum. *Sem.* numerosa.

3. *jamaicensis*, caul. decumbente, fol. obovatis, flor. solitariis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1326. Lam. ill. t. 184. Brown. Jam. t. 18. f. 2. Hab. in Jamaica, in saxosis. *Cor.* 5-crenata, longitudine cal. Br. ☉

642. *HYDROLEA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* rotata, aut campanulata. *Filam.* basi (et *Antherae*) cordata. *Styli* longi divergentes. *Stigmata* capitato-peltata. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis.

\* *Spinosae.*

1. *spinosa*, fol. lanceolatis hirsutis, flor. terminalibus. Willd. Sp. 2. p. 1327. Auhl. Guj. 1. p. 281. t. 110. Hab. in Amer. meridionali. Fol. viscosa. L. Flor. interdum 6-fidi, 6-andri, et caps. 3-styla, 3-locularis. Jus.

2. *trigyna*, spinosa, fol. oblongis hirsutis, flor. 3-gynis axillaribus. Swartz. Flor. ind. occ. 1. p. 558. Hab. pro Vera-Cruz et in Acapulco viciniis.

Obs. Cavanilles ic. pl. v. 6. p. 19. hanc et priorem in unam conjunxit, quia stylo-  
rum numerus (secundum eundem) in eadem planta variat a 2 ad 4, et quia hae plantae in reliquis conveniunt.

2. *caroliniana*, spinosa, fol. lanceolatis longis, flor. subsessilibus axillaribus. Michaux. Flor. p. 177. H. quadrivalvis. Walt. Hab. in aquis stagnantibus. H. spinosae similis dicitur, sed non ita ramosa. Flor. 1-5 fasciculati.

\*\* *Inermes.*

3. *Zeylanica*, caul. inermi, flor. subracemosis, fol. lanceolatis glabris. Vahl. Symb. 2. p. 46. Nama zeylanica. Lin. Flor. zeyl. t. 2. Steris javanica. Mant. p. 54. Lam. ill. t. 184. Burm. ind. t. 39. f. 3. Rheed. 10. t. 28. In Ind. orientali. ☉

4. *urens*, flor. paniculatis (parvis), apicibus conjugatis dichotomisque, fol. duplicato-dentatis cordatis, superiorib. ovatis. Flor. Per. 3. p. 21. t. 23. Hab. in Peruv. praeruptis calidis. 1-3-ordinatis.

dense hirsuta. Cor. violacea limb. extus hispido. ☉

5. *crispa*, flor. panicul. (magnis), apicibus conjugatis, fol. multiformibus crispis incis serratis. Flor. Per. p. 22. t. 244. f. 2. In Andium nemorib. ad margines Pozuzo fluvii. Cor. magna alba campanulata. ☉

6. *dichotoma*, flor. solitariis e dichotomis, fol. oblongo-spathulatis. Flor. Per. l. c. fig. b. Hab. passim in Huanuci urbis arenosis et argillosis. Viscosa. Fol. supra retrogum aspera. Cor. alba, lincis caeruleo-violaceis maculata. ☉

643. *CUSCUTA*. *Cal.* 4-5-fidus. *Cor.* 4-5-fida. *Caps.* 2-locularis, basi circumscissa. *Sem.* bina. (Stam. passim. 4. Embryo spiralis. G. Nect. 5. squamae in corol. basi quibusdam.)

1. *vulgaris*, flor. subsessilibus, cor. 4-5-andra fauce nuda, stigmatibus acutis. *C. europaea*. Lin. Smith. Flor. brit. 1. p. 282. Flor. dan. t. 199. Engl. bot. t. 378. Hab. in agris, ad sepes, in plantis parasitica, quas extinguit, hinc valde nociva.


2. *corymbosa*, flor. pedunculatis corymbosis, cor. ovatis 4-fidis 4-andris fauce nudis, stigm. capitatis. Flor. Peruv. 1. p. 69. t. 115. f. b. Hab. in Peruviae cultis, praesertim supra Medicag. sativam.

3. *Epithymum*, minor, flor. sessilibus, staminib. squama crenata munitis, stigm. simplicib. L. Smith. l. c. p. 283. Engl. bot. t. 35. Flor. dan. t. 427. *C. europaea*. Lam. enc. 2. p. 229. *C. europaea*. (2) Willd. Sp. p. 702. In plantis humilioribus, praesertim in pratis, parasitica. A. vulgari distinctissima; etiam multo tenerior, col. rubella. ☉

4. *odorata*, flor. congestis sessilib., cor. campanulatis, basi squamis fimbriatis, stigm. capitatis. Flor. Per. l. c. t. 105. f. a. Hab. in Limaë segetibus et versuris. Cal. albus punct. purpureis maculatus.

5. *americana*, flor. pedunculatis umbellatis, stigm. capitatis, cor. tubulosae limbo patente. Lin. Jacq. Amer. ed. picta. t. 17. *C. surinamensis*. Schill. lepr. t. 2. Sloan. hist. Jam. t. 128. f. 1. Hab. in sepiibus et fruticosis Caribaeorum. Flor. parvi aggregati flavescentes. Nectar. e squam. 5, fimbriatis infra stamina, cor. adnata. Jacq.

6. *chinensis*, flor. paniculatis, 5-fidis, cal. anguloso longius line corollae. Lam. p. 353. Enci. bot. 2. p. 229. Hab. in



China. Flor. subsparsi in pedunc. ramosis. Cor. fere globosa, albida. Styli brevissimi, stig. subcapitata. Lam.

7. *africana*, flor. pedunculatis, pedunc. unifloris, cor. quinquefidis. Willd. p. 703. C. americana. Thunb. prod. p. 32. Hab. in Cap. b. spei arboribus. Pedunc. uniflori bractea lanceolata suffulti.

Obs. Haec in Myria aethiopa crescentem vilit Linnaeus et sub nomine Schreberae descripsit. Willd.

8. *monogyna*, flor. pedunculatis monogynis. Vahl. symb. 2. n. 32. Tournef. Cor. 45. ? *Lupuliformis*, flor. racemosis. Krock. siles. n. 251. t. 36. Ruxb. Cent. 1. p. 15. t. 23. (Secundum Willdenow.) Hab. in Oriente. ? in Silesia et Monspelii. Facies C. americanae, at omnia duplo majora. V.

9. *reflexa*, racemis numerosis, cor. 5-partita : laciniis reflexis. Roxburgh. corom. 2. p. 2. t. 104. Hab. in India. Cresc. durante caelo frigido.

644. LINCONIA. *Cal.* laciniae bractaeformes, per paria oppositae : exteriores minores. *Cor.* (Cal. Juss.) basi urceolata, 5-fida : laciniis palcaeformibus, canaliculatis, basi foveatis. *Caps.* semi infera, 2-locularis, 2-partibilis : loculis 1-spermis.

1. *atopcuosidea*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1266. Herm. afr. 7. Hab. in montosis aquosis Cap. b. Sp. Frutex abietiformis. Fol. linearia, triquetra, subverticillata.

\* *peruviana*, fol. verticillatis subdenis linearibus sessilibus hirsutis basi connatovaginis. Lam. enc. 3. p. 527. Hab. in Peru.

645. VELEZIA. *Cal.* gracilis, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala, parva. *Caps.* 1-locularis, apice 4-valvis. *Sem.* plurima, receptaculo filiformi, centrali affixa.

1. *rigida*. L. Willd. Sp. 2. p. 1329. Barr. rar. 1. 1018. Bocc. mus. 2. t. 43. Hab. in Europ. australi : Hispania et in Barbaria prope Mascar. Desf. atl. 1. p. 221. Caul. ramosissimus. Cor. parva limbo roseo. Stam. 5-6. ☉

646. VAHLIA. *Cal.* 5-phyllu. *Cor.* 5-petala. *Caps.* infera, unilocularis, polysperma.

1. *capensis*. Thunb. Diss. Nov. gen. c.

c. Willd. Sp. 2. p. 1354. Russelia. Linn. suppl. 175. Hab. ad Cap. b. spei, sabulosis. Statura Silenis. Fol. opposita. Fl. ex summis ramis 2-3. Petala et Antherae nivae. Th.

647. CARMONEA. *Cal.* persistens, 5-partitus. *Cor.* rotata. *Styl.* capillares. *Drupa* globosa, 6-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *heterophylla*, fol. alternatim fasciculatis, flor. racemosis. Cav. ic. 5. p. 438. Hab. in ins. Luzon. etc. Fol. oblongo-ovata, nunc integra, nunc apice tridentata. h

648. ROCHEFORTIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis, fance aperta. *Fructus* 2-locularis, polyspermus.

1. *cuneata*, fol. cuneiformibus obovatis integris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 552. Hab. in Jamaicae saxosis aridulis montosis. h

2. *ovata*, fol. ovatis emarginatis. Swartz. l. c. p. 554. Hab. in Jamaicae fruticetis lapidosis. h

649. HEUCHERA. *Petala* 5. *Caps.* 2-rostris, 2-locularis.

1. *americana*, viscosa-pubescent, scapis subnudis, thyrso elongato, fol. radicalibus longe petiolatis semptemlobis. Murr. Comm. Gott. 3. p. 66. Cortusa americana, flore squalide purpureo. Herm. parad. 131. t. 131. H. Cortusa. Nichaux. 1. p. 171. Habit. in America boreali. Petala purpurascencia. T

2. *villosa*, minor villosissima, fol. acute lobatis, panicul. capillaribus. laxiflora. Michaux. 1. p. 172. Cresc. in Carol. infer. montibus. Flor. parvi, albi.

650. GUMILLEA. *Cal.* campanulatus, 5-fidus. *Cor.* o. *Germen* semibifidum. *Caps.* 2-locularis, polysperma, birostris.

1. *auriculata*, fol. impari-pinnatis. Flor. Per. 3. p. 23. t. 24. Habit. in Peruvia nemorib. juxta Munnae vicum.

651. BUMALDA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Styli* villosi. *Caps.* 2-locularis, birostris.

1. *trifolia*, fol. oppositis ternatis. Thunb. jap. p. 114. Ej. Diss. bot. 1. p. 63. Hab. in Japoniae montibus. Racemi terminales. h

652. ULMUS. *Cal.* campanulatus 5-fidus. *Cor.* o. *Caps.* (Nux

Samara. G.) compressa, membranaceo-alata. (Stam. etiam 4 et 8. Flor. conglomerati.)

1. *campestris*, foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, flor. subsessilibus conglomeratis pentandris, fructib. glabris. Willd. Sp. pl. 2. p. 1324. Lam. ill. t. 185. *β. latifolia*, fol. subtus pubescentibus. Cresc. in campestribus, ad vias publicas. Rami divaricati, nonnulli quasi penduli. *h*

2. *suberosa*, flor. duplicato-serratis basi subaequalibus, flor. subsessilibus conglomeratis tetrandris, ramulis suberoso-alatis. Willd. U. *hollandica* quorund. videtur. U. *campestris* plurium autor. et Linnæi? *β. fruticosa*, humilis, fol. parvulus pubescentibus. Cum priore, *β. alpes*. Rami virgati, erecti, ramuli subdistichi. *h*

3. *alata*, ramis utrinque alato-suberosis, fol. oblongo-ovalibus sensim acutis, basi subaequalibus, fructu pubescente-ciliata. Michaux. p. 173. U. *pumila*. Walt. ? Arb. medicis, fol. carpineae. Hab. in Virginia et Carolina inferiore.

4. *fulva*, fol. ovali-oblongis longissime acuminatis utrinque pubescentibus, gemmis lana densa fulva tomentosis, flor. sessilibus. Michaux. Fl. 1. p. 172. Hab. in Americæ frigidioris regionib. in montibus Alleghanis. Succus sub cortice viscosus (unde incolis Sliperi-elm.) *h*

5. *effusa*, fol. duplicato-serratis basi inaequalibus, flor. octandris pedunculatis effusis, fructib. margine ciliatis. Willd. U. *campestris*. Flor. dan. t. 632. U. *montana*. With. Smith. brit. 282. U. ciliata. Ehrh. Hab. in nemoribus, sepibus. Fol. latiora, quam in præcedente, minusque aspera. Sm.

6. *americana*, ramis laevibus, fol. serraturis uncinato-acuminatis, flor. p. dicelatis, fructib. villo densissimo fimbriatis. Michaux. Flor. 1. p. 172. Hab. in Amer. boreali. Stam. 5-8. Fol. subtus pubescentia.

7. *memoralis*, fol. oblongis glabriusculis aequaliter serratis basi subaequalibus, flor. sessilibus. Ait. Kew. 1. p. 320. Hab. in Amer. boreali. *h* +

8. *pumila*, fol. aequaliter serratis: basi aequalibus. Pall. ross. 1. p. 76. t. 48. Hab. in Sibiria. *h*

*Obs.* Statura, dicit Pallas l. c., hujus speciei sæpe certat cum quercu. Rami divaricati. Stipul. ferrugineae, membranaceo-setaceae. Samarae s. nuculae glabrae, apice nictæ. Sequens quæ in horto Celsii colitur diversa species videtur.

\* *microphylla*, fol. (parvulis) inciso-serratis basi attenuatis subaequalibus, ramis virgatis. U. *pumila*. *β. transbaicalensis*. Pall. l. c. fig. A. B. C. E. Fol. conferta lanceolata - ovata Euphr. officinalis, var. sylvestris, fere similia, sed paullo majora, sub lente tenuiter pubescentia. *h*

9. *chinensis*, sempervirens? fol. (subparvis) coriaceis nitidis brevi serratis ovatis basi obliquis. U. *pumila* quorundam. Thé de l'abbé Gallois per ironiam. (Cels.). Hab. in China. Colitur in hortis et (durante hyeme) in frigidariis. Statura humilis. Fol. lacte viridia, rigida ex ovato sublanco-lata. *h*

10. *integrifolia*, fol. integerrimis, stam. 7-9. Roxb. Corom. 1. p. 56. t. 78. In monib. cilianensib. Ind. orient. Arb. magna. Cal. 4-5-6-fidus. R.

653. *PLANERA*. Polygama. Cal. membranaceus, subcampanulatus, 4-5-fidus. Cor. o. *Stigm.* 2, oblonga, glandulosa, recurvo-divergentia. *Caps.* (Nux?) subglobosa, membranacea, 1-locularis, non dehiscens, aut laevis, aut squamulosa (non alata), 1-sperma. Masculi floris intermixti stam. 4-6. (Frondescencia et Floratio Ulmi, cui valde affinis. Michaux.)

1. *aquatica*, fol. petiolatis oblongo-ovalibus basi obtusis, aequaliter serratis, caps. scabra. Michaux. Flor. 2. p. 248. Pl. aquatica. Gmel. Syst. p. 150. Hab. ad ripas fluv. Ohio, Mississippi et Carol. Vere.

2. *Richardi*, fol. subsessilibus oblongo-ovalibus crenato-dentatis basi emarginatis, caps. laevi. Michaux. l. c. Ulmus polygama. Richard. Rhamnus carpinifolius. Pallas Flor. ross. 1. t. 60? Habitat circa mare Caspium.

654. *CELTIS*. Polygama. Cal. 5-partitus. Cor. o. *Styli* divaricati, crassiusculi. *Drupa* monosperma. *Flor. masculi* (inferioris) cal. 6-partitus et Stam. 6. (Folia sæpius obliqua. Filam. elastica?)

1. *australis*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, fructu solitario. Lam. enc. 4. p. 136. C. fructu nigricante. Tournef. Scopoli Delic. 2. p. 97. t. 18. Duhamel. Arbr. 1. p. 143. t. 53. Hab. in Europa australi et Barbaria. Arb. magna, cujus fructus mense Jan. maturescunt. Lign. durum, nigrescens.

2. *occidentalis*, fol. oblique ovatis serratis acuminatis, fructu solitario. Lam. l. c. Mill. dict. t. 88. Gaertn. de fr. 1. p. 374. t. 77. f. 3. Scop. l. c. p. 100. C. fol. inferioribus ternis, superioribus solitariis. Michaux. 2. p. 249. Hab. in Amer. boreali, copiose ad Mississipi. Drupa cerasiformis obscure purpurea.

β? *tenuifolia*, fol. tenuioribus minus acuminatis, dentibus majoribus basi magis rotundatis; vid. Enc. bot. l. c. p. 137 et 138. Cresc. in Ludoviscana; colitur in H. P. An distincta?

3. *Tournefortii* (lutea), fol. parvis ovatis crenato-serratis: junioribus subcordatis, basi obliquis, fructu luteo. Enc. bot. l. c. C. orientalis minor, fol. minoribus et crassioribus, fructu luteo. Tournef. Iter. 2. p. et t. 425. C. orientalis. Mill. dict. n.º 3. Hab. in oriente, nunc in hortis colitur. Lign. candidum. Arb. statura Pruni. T. h.

4. *orientalis*, fol. ovato-lanceolatis, basi oblique cordatis serrulatis subtus villosis, panic. axillaribus. Enc. bot. l. c. Rhecl. 4. t. 40. Retz. obs. bot. 6. p. 34. Hab. in Indiae montosis humidis, ad fluv. ripas. T.

5. *cordata*, fol. latis oblique cordatis acuminatis subpubescentibus, pedunc. subbifloris. C. crassifolia. Lam. enc. l. c. p. 138. Hab. in Amer. sub nomine imposito in hortis colitur. Fol. serraturae acutae et fere spinulosae.

6. *sinensis*, fol. lato-ovatis crenatis glaberrimis venis prominentibus. Hab. in Sina. Ex hort. Celsii. Fol. majuscula, obtusa.

7. *micrantha*, fol. oblique cordatis ovato-lanceolatis serrulatis superne scabriusculis. Swartz. Prodr. p. 53. Ejusd. Flor. 2. p. 542. Brown. jam. p. 173. t. 12. f. 2. Ait. Kew. 3. p. 437. Rhamnus micranthus. Lin. Plum. gen. ic. 206. Hab. in Antillis. C. orientali affinis, sed fol. superne scabra, nec subtus incano-tomentosa et magis serrulata. Sw.

8. *Lima*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis oblique cordatis serratis superne scaberrimis. Swartz. Prodr. p. 53. et Flor. p. 545. cfr. Enc. bot. 4. p. 140. Hab. in Ind. occidentali. Priori affinis, sed scabritie singulari differt. Sw.

Obs. Ad Celtes quoque retulit cl. Swartz Rhamnum iguanum. Lin. sub nomine. C. aculeata, cui affinis videtur Celtis integrifolia. Lam. enc. l. c., quae fol. integerrimis et stylis bifidis distinguitur, sed vix hujus generis est.

655. *HERNIARIA*. Cal. 5-partitus. Cor. o. Filam. 5-sterilia cum staminibus alterna. Caps. 1-sperma.

1. *glabra*, herbacea glabra, glomerulis multifloris spicaeformibus. Lam. enc. 3. p. 124. Willd. Sp. 2. p. 1296. Flor. dan. t. 529. Hab. in apricis, arenosis, siccis. Pallescens, diffusa.

2. *hirsuta*, herbacea hirsuta, glomerulis parvis paucifloris. Lam. l. c. Baub. hist. 3. t. 379. f. 1. Priore rarior in arenosis.

3. *incana*, fruticulosa, fol. ovato-oblongis pilosis, cal. piloso-incanis. Lam. l. c. Hab. in Europa australi. Rami densi, decumbentes. Flor. fasciculati, axillares.

Obs. Forte non diversa ab H. *lenticulata* L., quae vero pro planta debia habetur; vid. Litter. Vahlhii ad cl. Willdenow. in Schrad. Bot. Journ. 1799. v. 1. p. 285.

β? *capensis*, suffruticosa, hirsuta, fol. ovatis. H. *lenticulata*. Thunb. prodr. p. 48. Hab. ad Cap. b. spec. h.

4. *alpina*, fol. obovatis acutis glabris margine ciliatis, floribus glomeratis quinquefidis hirsutis. Willd. p. 1297. H. *alpina*, glomerulis paucifloris hirsutis, radice crassa subliguosa. Villars. delph. 2. p. 556. H. *alpestris*, flor. 4-5-fidis etc. Lam. enc. 3. p. 125. Hab. in alpinis Delphinatus et Helvetiae. T.

5. *fruticosa*, fol. ovalib. congestis acutiusculis hirsutis, flor. glomeratis quadrididis. hispido - hirsutis, caule fruticoso. Willd. Lob. ic. 85. Hab. in Hispania et Gall. meridionali. Rad. crassiuscula.

6. *polygonoides*, glabra, caule erecto dichotomo, fol. ovatis cuspidatis, flor. terminalibus. Willd. p. 1298. Cavan. ic. 2. p. 27. t. 131. H. erecta. Desf. Atlar. 1. p. 214. Illecebrum suffruticosum. Lin. Hab. in Hispania et in colliis. prope Mascar.

*ATRIPLEX*. Gen. 656-63. *pentandra*, flor. incompletis s. cor. o, parvis, conglomeratis. Sem. 1.

656. *ATRIPLEX*. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Styl. 2-partitus. Sem. 1, depressum. Flor. seminini intermixti, quibus: Cal. 2-phyllus. Sem. 1, compressum. (Hae nota a sequente genere differt.)

1. *Halimus*, tota, argenteo-glauc, caul. fruticoso, ramosissimo, fol. deltoidibus



integris. *Jain*. *Halimus latifolius*. Bauh. Hab. in Hispaniae, Lusitaniae, Angliae, Siberiae, Barbariae et Virginiae maritimis. Fol. subcarnosa, persistentia, aliquando basi dentata.  $\text{h}$

2. *odorata*, cinereo-glaucula, caul. fruticoso, ramis angulatis, fol. petiolatis hastatis, spica simplici fructigena crassa supina. An *A. albicans*. Ait. Kew. 3. p. 430? Hab. ad Cap. b. sp. Col. in hortis. Floscul. ex pallescente subpurpurei. Cal. fruct. inflatus subcarnosus complicatus. Odor satis gratus uti fruct. Cucum. Melo.  $\text{h}$

3. *mollis*, caul. fruticoso erecto, fol. lanceolatis carnesis mollioribus, cal. fructus rotundus integerrimis. Desf. Atl. 2. p. 301. Hab. in Barbariae desertis. Facies sequentis. Cal. planus membranaceus maximus. D.

4. *portulacoides*, albedo-glaucula diffusa, caule fruticoso, fol. subpetiolatis obovatis. L. Sowerb. engl. bot. t. 261.  $\beta$ . Pluck. Alm. Or. t. 61. f. 4. Hab. in Oceani septentrionalis littoribus.  $\text{h}$

5. *glaucula*, caule suffruticoso procumbente, fol. ovatis sessilibus integerrimis: inferioribus subdentatis. L. Dill. elth. 46. t. 40. f. 46. Barr. rar. 1145. t. 733. Hab. in Galliae australis, Hispaniae et Barbariae maritimis.  $\text{h}$

6. *rosea*, caule herbaceo, fol. incanis serratis (profunde sinuatis), fructibus quadrangularibus dentatis. A. sylvestris, fructu roseo compresso. Bauh. pin. 119. Hab. in Europa australiore.  $\odot$

*Obs.* Cal. fructus lobato-dentatus: laciniis lateralibus truncatis quadrangularibus. Link in Schrad. Journ. 1800. p. 55.

$\beta$ ? *foliosa*, caul. herbaceo, rhombo-oblongis sinuato-dentatis, fruct. triangularibus acutis. Link. l. c. Hab. cum praecedente ad littora Tagus in Lusitania.  $\odot$

*Obs.* An cum sequente tantummodo prioris varietas? vid. Lam. enc. 1. p. 274.

7. *sibirica*, caule herbaceo, fol. deltoidibus angulatis, calycibus fructus extus muricatis. Hab. in Sibiria. Magnitudo *A. hortensis*. Fol. infra argentea. Flor. albi. Gmel.  $\odot$

8. *tatarica*, caule herbaceo, fol. deltoidibus sinuato-dentatis undulatis alternis. Hab. in Tataria. Altitudo humana.  $\odot$

9. *hortensis*, caule erecto herbaceo, fol. triangularibus. Blackw. t. 99. et 552.  $\beta$ . *A. hortensis rubra*. Bauh. pin. 119. Habitat sponte in Tataria.  $\odot$

10. *laciniata*, caule herbaceo, fol. deltoidibus dentatis subius argenteis. Hab. ad

Europae et Virginiae septentrionalis littora marina. Tota tecta quasi epidermide secedente. Spicae terminales hermaphroditae antheris lacte rubris. Flor. feminei axillares gemini. L.  $\odot$

$\beta$ ? *sinuata*, caul. herbacea, fol. deltoidibus hastatis sinuatis subius argenteis cal. seminum spicatis muricatis. Hoffm. Flor. Germ. 2. p. 277. *A. laciniata*. Lam. enc. 1. p. 275? Moris. 6. 5. t. 32. f. 17.

11. *bengalensis*, caul. herbaceo erecto? fol. oblongo-deltoidibus subhastatis obtusis. Lam. l. c. p. 276. Hab. in Bengalia. Fol. viridi rubescunt.  $\odot$

12. *hastata*, caul. herbaceo erecto, cal. valv. faemineis magnis membranaceis reticulatis, margine dentibus longe setaceis. Smith. in Engl. bot. Hoffm. l. c. Moris. 6. 5. t. 32. f. 14. Hab. in Europa frigidior. Genuina *A. hastata* paucis tantum nota videtur.

13. *patula*, procumbens, caul. herbaceo patulo, fol. triangulari-lanceolatis, cal. sem. triangularibus acutis margine et disco dentatis. Smith. Engl. bot. *A. hastata*. Curt. Fl. Lond. *A. virgata*. Scop. Del. insub. 2. p. 14. t. 7? Hab. in culis et ruderalis.

14. *virgata*, caul. herbaceo patulo, fol. lanceolatis, ramis decussatis. Hoffm. Germ. 2. p. 277. Schkubr. Handb. 3. t. 347.

15. *nitens*, caul. erecto herbaceo, fol. nitidis: inferioribus sagittatis eroso-dentatis acuminatis, mediis hastatis, supremis lanceolatis, cal. sem. 3-angularibus integris. Hoffm. l. c. p. 278. Schk. l. c. t. 358. Hab. in Germaniae sepibus. E. maximis.

16. *alba*, caul. erecto ramosissimo herbaceo, fol. ovatis, flor. axillaribus glomeratis, cal. fructus angulatis dentatis laevibus. Scop. l. c. t. 8. Hab. . .  $\dagger$

17. *littoralis*, caule herbaceo erecto, fol. omnib. linearibus integerrimis subdentatisque longis. *A. angustissimo* et longissimo folio. Herm. lugd. 79. Hab. in Europae littoribus maris  $\odot$

18. *marina*, caule herbaceo erecto, fol. crassiusculis linearibus serratis. *A. angustifolia* dentata. Pet. herb. t. 7. f. 4. Hab. in Angliae, Sueciae littoribus marinis. Pusilla, vix palmaris.  $\odot$

19. *pedunculata*, caule herbaceo divaricato, fol. lanceolatis obtusis integris, calycibus faemineis pedunculatis. L. Engl. bot. t. 232. Flor. dan. t. 304. Pluck. alm. 61. t. 36. f. 1. Hab. in maritimis.  $\odot$

*Obs.* Thunbergius hoc genus cum sequente combinavit.

657. *CHENOPODIUM*. Cal. 5-phyl-lus, 5-gonus. Cor. o. Sem. 1, len-ticulare, superum.

\* *Foliis angulosis.*

1. *Bonus Henricus*, fol. triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. L. Willd. Sp. 2. p. 1299. Flor. dan. t. 579. Hab. in Europae ruderais. ☞

2. *mucronatum*, fol. triangulari-hastatis obtusis mucronatis, racemis foliosis. Thunb. prod. 48. Hab. ad Cap. b. spci.

3. *triandrum*, fol. cordato-sagittatis, spicis terminalib. aphyllis interruptis. Forst. prod. n.º. 129. Hab. in Nova Zeelandia.

4. *urbicum*, fol. triangularibus subden-tatis, racemis confertis strictissimis, cauli approximatis longissimis subaphyllis. Flor. dan. t. 1148. Hab. in plateis et ruderais. ☉

5. *Atriplicis* (purpurascens), foliis rhombeo-ovatis lanceolatisque, inferioribus sinuato-dentatis, paniculis axillaribus ramosis, caule erecto. Ait. Kew. 1. p. 311. Lin. suppl. p. 171. Ch. purpurascens. Jacq. hort. 3. p. 43. t. 80. Fol. summa farina tecta. Lam. enc. 1. p. 156. Hab. in China. Facies. *Atriplicis horten-sis* rubrae. Flor. tres ad quinque in racemulo sessiles sanguinei. Cal. pentagonus. ☉

6. *rubrum*, fol. cordato-triangularibus obtusiusculis sinuato-dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis, caule brevioribus. Flor. dan. t. 1249. Curt. Lond. ic. Moris. hist. 2. t. 31. Hab. in Europae cultis, ruderatis. Adulta rubet diffusa. Fol. nidita, crassa. Sem. minutissima. ☉

7. *murale*, fol. ovatis inaequaliter den-tatis acutis nitidis, racemis corymbosis nudis, caule ramoso patulo. Willd. Ber-geret. Phyt. ic. Desf. Atl. 1. p. 214. Hab. in Europae et Algeriae muris aggeribusque. Fol. longe petiolata.

β ? *guineense*, fol. ovatis inaequaliter dentatis acutis, racemis subramosis nudis erectis, caule simplici erecto. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 345. Hab. in Guinea. ☉

8. *Quinoa* (chilensis), fol. triangulari-ovatis obsolete dentatis, junioribus pulve-rulentis, racemis confertis petiolo breviorib. Willd. p. 1381. Feuille. peruv. t. 10. Hab. in Chili. Venarum folii per infimum est longe protractum ut inde facies folii triplinervi. W. ☉

9. *serotinum*, fol. deltoideis sinuato-dentatis rugosis glabris uniformibus, racemis terminalibus. L. Hab. in Hispania, Gallia, Anglia, Sibiria. ☉

10. *album*, fol. rhomboideo-ovatis erosis postice integris : summis oblongis, racem-is erectis. Hab. in agris Europae passim. Sem. laevissima nec punctata. Smith. Planta matura albicat. L.

11. *viride*, fol. lanceolata rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. L. Hab. in Europae cultis, agris. Caul. erectus, viridis, angulis purpurascen-tibus. †

\* *ficifolium*, fol. hastato-sinuatis erosis postice integris : superioribus oblongis in-tegerrimis, sem. punctatis. Smith. brit. r. p. 276. C. viride. Curt. Lond. ic. C. seroti-num. Huds. Hab. in fimetis et ruderais circa Londinum. Ramor. axillae purpu-rascentes. An C. *viride* auctorum ? C. vi-ride. L. ut varietatem C. *albi*, considerat cl. Smith.

12. *punctulatum*, fol. (albo-punctatis) imis rhombeo-ovatis sinuatis, supremis ellipticis, racem. lateralibus spicatis folio-sis. Scop. Delic. insubr. 1. p. 26. t. 11. Hab. . . . Fol. rubro colore tingunt aquam, in qua macerantur. S.

13. *hybridum* (angulatum), fol. cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis di-varicatis nudis. Curt. Flor. Lond. ic. C. *an-gulatum*. Enc. bot. 1. p. 194. C. stramonii folio. Vaill. paris. 36. t. 7. f. 2. Hab. in Europae cultis, ruderais. Foetens. ☉

14. *Botrys*, fol. oblongis sinuatis, racem-is nudis multifidis. Botrys. Dod. Hab. in Europae australis arenosis. ☉

15. *ambrosioides*, fol. lanceolatis den-tatis, racemis foliatis simplicibus. Moris. s. 5. t. 35. f. 8. Hab. in Mexico, Lusitania. ☉

16. *multifidum*, fol. multifidis : segmen-tis linearibus, flor. axillaribus sessilibus. Dill. elth. 78. t. 66. f. 77. Hab. in Bonaria. ☞

17. *anthelminticum*, erectum, fol. ovato-oblongis rariter dentatis, racemis aphyllis, flor. 3-gynis. Lin. Michaux. p. 173. Hab. in Pennsylvania, Bonaria et in Kentucky ru-derais. ☞

18. *glaucum*, fol. ovato-oblongis repau-dis subtus glaucis, racemis nudis simplicibus glomeratis. Flor. dan. t. 1151. β ? concate-natum. Thuill. Paris. p. 125. Bauh. hist. 3. p. 470. t. 473. Hab. ad Europae fimeta, in fossis passim et glareosis. ☉

\*\* *Foliis integerrimis.*

19. *Vulvaria* (olidum), fol. integer-rimis rhombeo-ovatis, flor. conglomeratis axillaribus, caul. diffuso. Flor. dan. t. 1152.

Curt. Lond. ic. C. foetidum. Lam. enc. 1. p. 296. *Atriplex foetida*. Bauh. Garosmus. Dod. 616. *Ilab.* in Europae cultis oleracis, ad vias in ruderatis.

20. *polyspermum*, fol. integerrimis ovatis, cymis dichotomis aphyllis axillaribus, sem. subnudis. Flor. dan. t. 1153. *Blitum majus polyspermum* a seminis sopia. Moris. hist. 2. t. 30. f. 6. *Hab.* in Europae cultis. Caulis etiam erectus. ☉

21. *caudatum*, fol. ovatis obtusis integerrimis, panicula nuda terminali elongata, caule simplici erecto. W. Jacq. ic. 1. t. 344. Col. 2. p. 325. *Hab.* in Guinea. ☉

22. *acuminatum*, fol. ovatis acuminatis integerrimis, panic. nuda terminali. Willd. in N. Act. berol. 2. t. 5. f. 2. *Habit.* in Sibiria. C. sepium affinis.

23. *laterale*, fol. caulinis lanceolatis obtusis, ramorum oblongis, pedunc. lateralibus solitariis unifloris. Ait. Kew. 1. p. 313. *Hab.*... ☉

24. *scoparium*, fol. planis lineari-lanceolatis margine ciliatis, flor. glomeratis axillaribus. Willd. p. 1306. *Oxyris*. Dod. pempt. 151. *Hab.* in Graecia, Japonia, China, Carniolia. ☉

25. *villosum*, fol. linearibus integris planis villosis mollissimis incanis, racem. lanatis. Lam. enc. 1. p. 196. *Hab.*... *Salsola* refert.

26. *maritimum*, fol. subulatis carnosissimis semiteretibus, floribus glomeratis axillaribus. Flor. dan. t. 489. Moris. s. 5. t. 33. f. 3. *Hab.* in Europae maritimis. ☉

27? *oppositifolium*, fol. subulatis oppositis, glomerulis foliosis axillaribus. Willd. p. 1307. Lin. suppl. 172. *Salsola oppositiflora*. Pall. it. 2. p. 735. t. O. *Hab.* in Sibiriae aridis limosis ad Jaikum.

28. *aristatum*, ramosissimum, fol. lanceolatis subcarnosis, integerrimis, corymbis dichotomis aristatis axillaribus. L. C. fol. ex lineari-lanceolatis, racemis conjugatis dichotomis nudis, apice setaceis. Gmel. sib. 3. p. 83. t. 15. f. 1. R. *Hab.* in Sibiria, Virginia. Panicula magna divaricatissima. ☉

658. BETA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Sem.* reniforme, intra substantiam baseos calycis.

1. *vulgaris*, flor. congestis, fol. inferioribus ovatis. Ait. Kew. 1. p. 315. Willd. 2. p. 1308. Gaertn. de fr. 1. t. 75. f. 5. *Hab.* sponte Europ. australioris maritimis, nunc ubique colitur. ☉

2. *patula*, flor. congestis, fol. omnibus lineari-lanceolatis, ramis divaricatis. Ait. l. c. *Hab.* in Madera. Caulis vix pedalis ramosissimus. ☉

3. *Cicla*, flor. ternis radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, spicis lateralibus longissimis. Mill. dict. n°. 2. *Hab.* in Lusitania ad Tagum. ☉

4. *maritima*, flor. geminis, caul. decumbentibus, fol. triangularibus petiolatis. Mill. dict. n°. 1. *Hab.* in littoribus maris. ☉

*Obs.* Typus genuinus B. vulgaris et cicla videtur.

5. *trigyna*, flor. ternis trigynis, cal. corollinis. Walld. Hongar. p. 34. t. 35. Inventa ad hortos pagi Pazoni in Comitatu Syrmecensi. Flor. in spicis longis ante anthes in nutantibus digesti. +

659. SALSOLA. *Cal.* 5-phyllus, basi capsularis. *Cor.* o. *Styl.* 2-3. *Caps.* 1-sperma. *Sem.* cochleatum. (*Cal.* fructus in quibusdam margine membranaceo cinctus.)

1. *Kali*, herbacea decumbens, fol. subulatis spinosis, calycibus marginatis axillaribus. L. Willd. Sp. 2. p. 1310. Flor. dan. t. 818. Moris. s. 5. t. 33. f. 11. *Hab.* in littoribus maris. ☉

2. *Tragus*, herbacea erecta, fol. subulatis spinosis laevibus, calycibus ovatis. L. *Hab.* in Europa australi. ☉

3. *rosacea*, herbacea, foliis subulatis mucronatis, calycib. explanatis. *Rosacca*, caule erecto ramoso, fol. alternis conico-subulatis mucronatis, membranis corollinis purpureis. Cav. ic. 3. p. 44. t. 286. Buxb. cent. 1. t. 14. f. 2. *Hab.* ad Asiae septentrionalis salinas et in Arce Alonensi in Hispania. ☉

4. *caroliniana*, herbacea decumbens glabra, fol. dilatato-subulatis spinenscentibus, cal. fructiferis latius explanato-alatis. Michaux. Flor. 1. p. 174. Walt. *Hab.* ad littora in Carolina. Affinis rosaceae. Gemmae fructificantes valde turgidae. M.

5. *Soda*, herbacea patula, fol. inermibus. L. Jacq. hort. t. 68. *Hab.* in Europae australis salis. ☉

6. *sativa*, diffusa herbacea, fol. retortatis glabris, flor. conglomeratis. L. Cav. ic. 3. p. 46. t. 291. In Hispaniae australis maritimis. ☉

7. *spicata*, herbacea, fol. oblongis obtusis semiteretibus, flor. ternis axillaribus

subspicatis. Willd. S. falsa. Cav. ic. 3. p. 46. t. 290. Hab. in Hispania. ☉

8. *altissima*, herbacea erecta ramossissima, fol. filiformibus acutiusculis basi pelunculiferis. L. Buxb. cent. 1. p. 21. t. 31. f. 2. Hab. ad Salinas Italiae, Saxoniae, Astracani. ☉

9. *trigyna* (triflora), herbacea erecta, foliis filiformibus obtusis carnosius, flor. axillaribus sessilibus ternis, stylo triado. S. altissima. Cav. ic. 3. p. 46. t. 289. Hab. t. in Hispania. ☉

10. *salsu*, herbacea erectiuscula, fol. linearibus subcarnosis muticis, calycibus succulentis diaphanis. L. Jacq. hort. 3. p. 44. t. 83. Hab. in maritimis. ☉

β? *americana*, humilior, subdecumbens, flor. confertioribus. Michaux. 1. p. 174. Ad ostium Guni. St. Laurentii.

11. *nudiflora*, sublignosa adscendens, fol. glomerulorum carnosis, flor. glomeratis, fol. glomerulorum longitudine. Willd. p. 131. Hab. in India orientali, ad maris litora. ☉

12. *avescescens*, sublignosa erecta, fol. teretibus pubescentibus, flor. subglomeratis. Willd. Cav. ic. 3. p. 45. t. 288. Hab. in Hispaniae montibus Orcelitanis. ☉

13. *hirsuta*, herbacea diffusa, fol. teretibus obtusis tomentosis. Flor. dan. 187. Hab. in Daniae et Mospelii maritimis. ☉

14. *laniflora*, herbacea, fol. teretibus pubescentibus, flor. axillaribus, antheris coloratis. Willd. Pall. it. 2. app. 104. tab. P. Hab. in Sibiria circa Saratschik. Cal. excresecens in paleas acutas longissimas, laminibus lateralibus roseis.

15. *arenaria*, caul. diffuso, fol. linearibus pilosis, cal. fructus laciniis membranaceis scariosis venosis ovato-oblongis obtusis. Kochia arenaria. Roth. N. bot. Beytr. p. 175. S. arenaria. Ejusd. Flor. germ. 2. app. p. 575. Willemetia. Maerkl. Chenopodium. Flor. Wetteravica. p. 356. Camphorosma mospeliaca. Pollich. Palat. n. 176. Hab. in regionib. Rhenanis, Germ. australioris. Cal. laciniarum post anthesin (quod in multis *salsolis* obvenit) in alas 5 rotatas albidulas, venis purpureis pictas increscunt.

16. *hyssopifolia*, herbacea, fol. linearibus planis, glomerulis florum axillaribus densis. Willd. Pall. it. 1. app. n. 107. t. L. Kochia. Roth. Hab. in Sibiriae campis siccis salsis ad Rhymnum. ☉

17. *canescens*, caul. suffruticoso folioso, fol. lineari-acutis tomentosis planis argenteo-sericeis. Hort. Par. Chenopodium sinense.

Willemet in Essays de Médecine et d'Hist. Nat. 3. p. 233. Hab. . . . Rami juniores ar- genti.

18. *diffusa*, herbacea tomentosa decumbens, fol. lanceolatis. Thunb. prodr. p. 49. S. sericea. Ait. Kew. 1. p. 317. Chenolen diffusa. Willd. Sp. 2. p. 1203. Thunb. Diss. bot. 1. p. . . Hab. ad Cap. b. sp. maritima. Fol. opposita, argenteo-tomentosa cum acumine carnosius. Styl. filiformis, 2-fidus.

19. *polycelos*, sublignosa diffusa, fol. oblongis, calycibus marginatis glomeratis coloratis. L. Bocch. mus. 2. p. 34. t. 34. Barr. rar. 214. t. 275. Hab. in Siciliae, Hispaniae maritimis.

20. *prostrata*, frutescens, fol. linearibus pilosis inermibus. L. Grmel. sib. 3. t. 18. f. 2. Jacq. austr. t. 209. Hab. in Asia boreali, Hispania, Austria, Helvetia, Sibiria. h

21. *monandra*, caule herbaceo ramoso carnosius subaphyllo, fol. teretibus carnosis, flor. monandris. Willd. Pall. it. 3. app. 83. t. M. f. 1. Hab. in Sibiria ad lacum Altan, inque desertis Astrachanensibus. ☉

22. *vermiculata*, frutescens, fol. fasciculatis teretibus filiformibus, floralibus ovatis acutis carnosis. Willd. S. mycophylla. Cav. ic. 3. p. 45. t. 287. Barr. rar. 501. t. 215. Hab. in Hispania, Lusitania et Sibiria. h

23. *Arbuscula*, fruticosa, fol. fasciculatis teretibus basi attenuatis incurvis, flor. solitariis sparsis. Willd. Pall. it. 1. app. n. 102. t. K. Hab. in deserto Tatarico ad ripas Lacus salsi Inderiensis. h

24. *aphylla*, fruticosa subaphylla, ramis flosculorum rudimento cooperitis. Lin. suppl. 173. Caroxylon Salsola. Thunb. Diss. Nov. pl. gen. Hab. ad Cap. b. sp. in omni Karro. Frutex altitudine humana aphyllus valde irregularis L. h

25. *arborescens*, frutescens, fol. semicylindricis, inferioribus conjugatis. Lin. suppl. 173. Hab. in Sibiria. Caul. adscendentes albi. Cal. scarioso-rosacei. h

26. *fruticosa*, fruticosa, fol. carnosis teretibus obtusis imbricatis muticis. Engl. Bot. t. 635. Chenopodium fol. linearibus teretibus carnosis, caule fruticoso. L. Hort. cliff. 86. Hab. in maritimis Galliae, Hispaniae, Angliae, Lusitaniae, Persiae. Sem-pervirens. Eract. ternae. h

27. *indica*, fruticosa, fol. linearibus carnosis semiteretibus, floralibus oblongis obtusis. Willd. p. 1317. Habit. in India orientali. h

28. *sedoides*, suffruticosa, fol. teretibus filiformibus ciliatis, flor. glomeratis axillaribus. Willd. Pall. itin. 1. app. n°. 108. t. M. f. 1. 2. Hab. in Sibiriae humidis salsis. ¶

29. *muricata*, fruticosa patula, ramulis hirsutis, cal. spinosis. L. S. monobractea. Forsk. descr. 55. *Bassia muricata*. Allion. Misc. taur. 3. 177. t. 4. f. 2. Buxb. cent. 3. t. 49. Hab. in Europa australi, Aegypto. Cal. bini, congesti. ¶

30. *camphorosmoides*, fruticosa spinosa ramosissima, fol. glabris alternis filiformibus cum fasciculis axillaribus. Desfont. Atl. 1. p. 218. Kali orientale fruticosum spinosum, camphoratae-folius. Tourn. Cor. 18. Hab. in incultis prope Flemsen. ¶

31. *brevifolia*, fruticosa ramosissima, fol. ovatis confertis brevissimis pubescentibus. Desf. l. c. Boc. sic. 59. In arenis prope Casiam. Fol. uti in *Sedo acri*. D.

32. *mollis*, fruticosa, ramis patentibus, fol. teretibus carnosius glaucis obtusis. Desf. l. c. Cum priore. Fol. glabra, succosa Sedi *albi* fol. simillima. D.

33. *oppositifolia*, fruticosa, fol. subulatis inermibus oppositis. Desf. Atl. 2. p. 219. Moris. s. 5. t. 33. S. *fruticosa*. Cav. ic. 3. t. 285. Hab. in agro Tunetano. Cal. fructus membranaceae rosae latae flabelliformes in campanam conniventes. D. Styl. bifidus. C.

34. *verticillata*, fruticosa erecta, fol. oppositis linearibus semicylindricis, flor. subverticillatis. Schousboe. Maroc. 1. p. 123. Hab. prope Magadore. Fructus nondum observatus. ¶

35. *glauca*, fruticosa, erecta glaberrima, fol. semiteretibus filiformibus, cal. solitariis bracteatis, fructib. explanatis hyalinis. Bieherst. Tableau, etc. Kali orientale fruticosum altissimum, flor. stam. purpureis. Tournel. Cor. p. 18. Hab. in praecipitibus montium inter Kubam et veterem Schamachiam. ¶

36. *Echinus*, fruticosa glabra, fol. subulatis mucosis, spiduis divaricatis floriferis. Bill. Syr. 2. p. 10. t. 5. *Anabasis spinosissima*. Lin. suppl. p. 173. Willd. Sp. p. 1319. Hab. in Aegypto, Persia in monte Libano. Ob fructum potius hujus generis.

37. *platyphylla*, caul. herbaceo ramosissimo, fol. lato-lanceolatis sinuato-dentatis, flor. paniculatis trigynis, cal. fructus margine orbiculari hinc emarginato. Michaux. Flor. t. p. 174. S. *radiata*. Desf. in Annal. du Mus. 2. p. 28. t. S. *atriplicifolia*.

Sprengel, *Kochia* Roth. N. bot. Beyr. p. 177? Hab. in Amer. septentrionali. Sub nomine *Sals. Chenopodioides* et *latifolia* hinc inde colitur. Ob folia, habitus a ceteris omnino alienus est.

*Obs.* Genus *Salsolae*, nonnullis speciebus *Chenopodii* affine, iterum recognosci debet et forte dividendum. Cl. Roth. nonnullas species ab hoc genere secundum characterem sequentem separat:

Kochia. Cal. 1-phyllus, campanulatus, 5-fidus: in fructu in marginem foliaceum 5-petaliformem excrecens: fauce clausa dentibus 5, triangularibus. Cor. o. Stylus 1, brevis. Stigm. 2-3, longa. Caps. 1-locularis: 1-2-sperma. Semen incurvum.

660. *ANABASIS*. Cal. 3-phyllus. Cor. 5-petala. Bacca 1-sperma, calyce cincta.

1. *aphylla*, aphylla, caule ramoso articulado, articulis emarginatis, ramis apice floriferis. Willd. Sp. 2. p. 1318. *Salsola articulata*. Cav. ic. 3. p. 43. t. 284. Buxb. cent. 1. p. 11. t. 18. Hab. ad maris Caspii littora et circa Tripolim. ¶

2. *cretacea*, aphylla, caul. numerosis caespitosis simplicissimis articulatis basi floriferis, articulis emarginatis. Willd. Pall. it. 1. app. n°. 109. t. N. Hab. in Sibiria. ¶

3. *foliosa*, fol. subclavatis. L. *Salsola clavifolia*. Pall. it. 2. p. 486. Hab. ad mare Caspium. ○

4? *tamariscifolia*, fol. subulatis, pericarpis exsuccis. L. Cav. ic. 3. p. 42. t. 283. Hab. in Hispania. Stigm. 3, obtusa. ¶

661. *ANREDERA*. Cal. 2-partitus, dorso carinatus. Cor. o. Styl. 2-fidus. Sem. 1, cal. compresso membranaceo-bialato tectum.

1. *spicata*. Juss. Gen. pl. Gmel. Syst. p. 454. *Basella rescariaria*, fol. subcordatis, pedunc. simplicibus, fruct. orbiculato-compressis vesicariis. Lam. enc. 1. p. 382. Hab. in Peruvia. Caul. scandens. Flor. spicati alterni.

662. *BOSEA*. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Bacca 1-sperma.

1. *Yervamora*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1322. Lam. ill. t. 182. Frutex peregrinus horto Bosiano *Yervamora* dictus. Walt. hort. p. 24. t. 10. Hab. in ins. Canariis. ¶

663. MICROTEA. *Cal.* 5-phyllus, patens. *Cor.* o. *Drupa* sicca, echinata.

1. *debilis*. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 543. Lam. ill. t. 182. Willd. p. 1309. *Schollera*. Robr. in Act. hafn. 2. 1. p. 210. Hab. in Caribaeis, ins. St. Eustachii, etc. Caul. diffusus. Fol. ovata. Racemi secundi filiformes. ©

664. PHYLLIS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5 petala. *Stigmata* hispida. *Sem.* 2, oblonga, axi filiformi annexa.

1. *Nobla*, stipulis dentatis, fruct. pendulis. L. Dill. Elth. t. 299. f. 386. Lam. ill. t. 186. Hab. in Canariis. Flor. corymbosi. h

665. COPROSMA. Polygama. *Cal.* minimus, 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Styli* longi, basi coherentes. *Bacca* infera, 2-sperma. (Stam. etiam 6-7.)

1. *lucida*, pedunc. compositis. Lin. suppl. p. 178. Forst. gen. n<sup>o</sup>. 69. Murr. Syst. veg. p. 200. Hab. in N. Zeelandia. Similis Phyllidi, glaberrima. Fol. opposita, ovata. Stipul. interfoliaceae. L.

2. *foetidissima*, flor. solitariis. Lin. l. c. Lam. enc. 2. 98. Ej. ill. t. 854. Cum priore.

*Obs.* Hoc genus, ulterius examinandum, ab ill. Juss. inter Rubiaceas, cum priore, collocatum est.

666. PANAX. Polygama. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* infera, cordata, 2-sperma. *Cal.* in flore Masc. integer.

1. *simplex*, foliis alternis lanceolatis serratis, umbell. compositis. Forst. Flor. austral. p. 75. Hab. in N. Hollandia.

2. *trifolia*, pusilla, rad. subrotunda, fol. ternis: foliolis subsessilibus. Michaux. Flor. Trew-Ehr. t. 6. f. 2. Hab. in Pennsylvania et Novaeboracae. Fol. glabra nitida, passim quina.

3. *quinquefolia*, rad. fusiformi, fol. ternis: foliol. quinis petiolatis. Michaux. l. c. p. 256. Trew-Ehr. t. 6. Lam. enc. 2. p. 713-714. Planta celebris ob radicem Ginzeng s. Nintzin.

4. *attenuata*, fol. ternatis quinatisve:

foliol. ovatis attenuatis crenatis, caul. arborescente. Swartz. Flor. 2. p. 562. Hab. in Ind. occident. in monte la Souffire, Gadeloupe et in ins. St. Christophe.

5. *arboorea* (australasia), fol. septenatis dentatis glabris, umb. composita, caul. arboreo. Lin. suppl. p. 441. Hab. in N. Zeelandia.

6. *undulata*, fol. 6-8-tenatis lanceolato-ovatis acuminatis subundulatis, subius ferrugineo-pubescentibus, flor. paniculatis, caul. arboreo. Aubl. gujan. 2. p. 949. t. 360. F. Morototoni. Ej. et Gmel. Syst. II. p. 466. Hab. in Gujanae sylv. et ad St. Domingo. Arh. 60-100-pedalis, apice foliosa, tota aromatica. Fruct. compress. cordati pubescentes.

7. *fruticosa*, fol. supradecompositis dentato-ciliatis, caul. fruticoso. Lin. Rumph. amb. 4. t. 33. Hab. in ins. Ternatè. Altitudine humana, vi diuretica gaudet.

667. CUSSONIA. Involucr. o. *Cal.* 1-phyllustruncatus crenatus. Petala 5, oblonga acuta. Fructus didymus, 2-ocularis cal. stylisque coronatus.

1. *thyrsoidea*, fol. quinatis: foliol. simplicibus cuneatis ternatisque apice dentatis. Thunb. Diss. acad. 1. p. 12. et N. act. Ups. 3. t. 12. Lam. ill. t. 187. Willd. Sp. 2. p. 1355. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *spicata*, fol. septenis: foliol. simplicibus lanceolatis ternatisque apice serratis. Thunb. l. c. Act. Ups. t. 3. Cum priore.

*Obs.* Hoc genus a Thunbergio inter umbellatas collocatum, a Jussieu rectius una cum praecedente ob semina pericarpio inclusa, ad fam. Aralias refertur.

UMBELLATAE familiam exhibent, primo obtutu ab aliis facile dignoscendam, ob flores umbellatim dispositos, et fructus inferos, nudos, in semina duo, ex axe centrali filiformi pendula, bipartibiles. Umbellae sunt aut simplices s. flores in pedunculo communis sessiles, aut compositae s. in umbellulas radiatim pedicellatas divisae; nonnullae anormales sunt s. a forma communi aberrantes. Utraque sunt vel nuda, vel involuatae. Flores constant ex calyce integro aut quinque-dentato, minimo; corolla 5-petala, aequali, aut radiata: petalis exterioribus majoribus. Stamina adsunt 5 et

styli 2. Lagoecia unico tantum gaudet stylo. Plures flores in eadem umbella abortiunt ob stylosum defectum, qui polygami denominantur. Caul. plerisque herbaceus, et folia composita sunt. Diverse harum plantarum partes, praesertim semina, gaudent qualitate calida, aromatica, nonnunquam caustica, imo venenata; radices quarundam edules sunt.

668. ERYNGIUM. Flor. capitati. Involucr. polyphyllum. Cal. proprius, 5-phyllus, superus. Cor. 5-petala. Recept. paleaceum. Fruct. coronatus, 2-partibilis. (Fol. Cardui.)

\* *Foliis laciniatis.*

1. *campestre*, fol. radicalibus petiolatis ternatis: caul. inferiorib. pinnato-lanceolatis, caul. superne ramosissimo. L. Schousb. Maroc. p. 135. Willd. Sp. 2. p. 1358. Jacq. austr. t. 155. Flor. dan. t. 554. *β. lusitanicum*, latifolium. Tournef. 327. Hab. in incultis, ad vias ubique.  $\mathcal{T}$

2. *Bourgati*, fol. omnib. digitatis lacini. suborbiculatis, capitul. subrotundis paleis subulatis integris. Ait. Kew. 1. p. 326. Gouan. ill. p. 7. t. 3. Hab. in Gallia australi, in Helvetia. Fol. quoad formam ut in Ger. columbino. Involucr. Subulata 9-12-phylla. Capit., rarius unicum, amethystinum. Lam.

3. *amethystinum*, fol. radicalibus tri-  
fidis basi subbipinnatis, bracteis linearibus spinis interjectis. Moris. s. 7. t. 35. f. 2. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 122. Hab. in Syriae montibus et in campis prope Tingidem. Nomen colorem plantae exprimit.  $\mathcal{T}$

4. *rostratum*, fol. caulinis pinnatis: radicalibus polymorphis, involucr. inaequalibus, capitulis apice rostratis. Cav. ic. 6. p. 34. t. 552. Hab. in maris Chilensis littore prope Talcahuano urbem. Col. plant. luteo albus.

5. *monocephalum*, fol. amplexicaulibus canaliculatis laxè pinnatis, involuero patentissimo rigido. Cav. l. c. p. 35. t. 553. Hab. in Mexico. Flor. violacei. Involucr. amplum, 30-phyll.

6. *triquetrum*, fol. radicalib. trilobis inciso-spinosis, caul. digitato-palmatis, flor. corymbosis, involucr. 3-4-phylo subulato-canaliculatis, pedicellis triquetris. Desf. Atl. 1. p. 225. t. 54. Hab. in Barbariae arvis. Col. plant. amethystinus.  $\mathcal{T}$

7. *rigidum*, fol. palmato-laciniatis, bract. rigidis pinnatifidis pungentibus, caul.

crasso. Lam. enc. 4. p. 752. E. Spinalba. Vill. Delph. 2. p. 660. t. 17. Hab. in Galliae alpih., locis incultis. Capit. magna, oblonga, bract. 9-10 pinnatifidis, albidis, spinosis cincta. A sequente omnino diversum.

8. *alpinum*, fol. radicalibus integris cordatis, caulinis lobatis sublaciniatis, bracteis mollibus pinnatifido-ciliatis caerulescentib. Lam. l. c. p. 753. Jacq. ic. rar. t. 94. Hab. in alpih.  $\mathcal{T}$

9. *caeruleum*, fol. radicalibus cordato-ovatis, caulinis palmatis, involucri foliolis quinque subulatis basi utrinque spinula minima armatis, paleis mucronatis. Tableau d. prov. sur la côte occidentale de la mer Caspienne. n°. 7. Munting. Phytogr. p. 455. Moris. s. 7. t. 37. f. 13. Habit. in coll. et apricis prov. Schiruanensis.  $\mathcal{T}$

10. *maritimum*, fol. radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capit. pedunculatis, paleis tricuspidatis. L. Moris. s. 7. t. 36. f. 6. Hab. in maritimis. Rad. longissima. Col. pl. glaucus aut albicans.  $\mathcal{T}$

*β 1 aquifolium*, fol. ovatis acutis spinosis amplexicaulibus, involucr. 6-7-phylo, fol. intus caeruleis. Cav. Annal. de ciencias natur. n°. 7. p. 32. E. *maritimum*. Flor. Dan. t. 875.  $\mathcal{T}$

11. *ilicifolium*, fol. obovatis dentato-spinosis, margine cartilagineis, caul. dichotomo, involucr. foliaceis, paleis tricuspidatis. Cav. ic. 6. p. 225. t. 53. Lam. enc. 4. p. 757. Hab. in Barbaria et Lusitania.

12. *dichotomum*, fol. radicalibus cordato-oblongis crenatis, umbel. dichotomis, capit. florum rotundo involucr. breviori, paleis tricuspidatis. Desf. Atl. 1. p. 126. t. 55. In collib. incultis circa Masca. Affine E. *plano*, sed omni parte minus. Capit. parva. D.

13. *corniculatum*, fol. radicalibus ellipticis subulatis petiolatis: caulinis perparvis pinnatifido-laciniatis, caul. trichotomo, involucr. inaequalibus, paleis integris. Lam. l. c. p. 758. Tournef. Inst. p. 327. Hab. in Lusitania. Capitul. numerosa, cincta involucr. 5-6-phylo cujus fol. 3. cacteris longiora cornicula mentientia. Lam.

14. *planum*, fol. radicalibus cordato-ovalibus planis crenatis petiolatis caulinis sessilibus, capit. ovatis pedunculatis. Lam. enc. 4. p. 753. Jacq. Austr. t. 39. Barr. ic. 1174. Hab. in Russia, Polonia, Austria et Gallia meridionali? Capit. et pedunculi amethystini.

15. *tricuspidatum*, fol. radicalibus cordatis : caulinis palmatis, auriculis retroflexis, paleis tricuspidatis. L. Willd. p. 135. Desf. Atl. 1. p. 224. E. Bocconi, fol. radicalibus cordato-subrotundis crenatis apice subincisis : caulinis inferioribus trifidis ; superioribus digitatis, paleis tricuspidatis. Lam. l. c. E. capitulis Psyllii. Bocc. Sic. t. 47. Moris. s. 7. t. 36. f. 12. Hab. in Europ. australi, Barb. et Oriente.

16. *creticum*, fol. caulinis digitatis spinosis brevissimis subreflexis, caul. superne corymboso, involucr. subhexaphyllis. Lam. l. c. p. 754-755. Tournef. Cor. p. 23. Hab. in ins. Candia. Col. pl. amethystinus.

17. *glomeratum*, fol. pinnato-laciniatas : lacinias angustis spinosis, thyrso terminali, capit. globosis subglomeratis. Lam. l. c. Cum priore et in Oriente. Rad. longa, apice crassa. Capit. minuta numerosa. Invol. foliola 6, lineari-subulata. L.

18. *dilatatum*, fol. pinnatifidis apice dilatatis trifido-laciniatas spinosis, involucr. hexaphyllis margine spinosis. Lam. l. c. Barrel. ic. 36. Bocc. Mus. t. 71. Hab. in Hispania. Lusitania et Barbaria. An ab E. amethyst. satis diversum?

19. *lateriflorum*, fol. lanceolatis nervosis integerrimis, caul. ramisque flexuosis, capit. lateralib. sessilibus ebinatis. Lam. l. c. p. 756. Gramen orientale spicatum, etc. Tournef. cor. p. 39. Cenchrus frutescens. Lin. ? Hab. in Oriente. Species omnium valde singularis. Caul. flexuosus, sursum ramosissimus.

20. *virgatum*, fol. ovatis inciso dentatis remotissimis, caul. virgato tenui apice corymboso. Lam. l. c. Hab. . . Caul. gracilis. Fol. fere ut in V. Teucrium. Paleae breves 3-dentatae. L.

21. *Galioides*, minutum, fol. sessilibus digitatis spinosis minimis, caul. debili dichotomo, capit. sessilibus. Lam. l. c. Moris. hist. 3. p. 167. n. 19. In Portugaliae humidis. Galium refert ob fol. quasi verticillata. L.

22. *tenuis*, fol. spinosis : radicalib. inaequaliter dentatis ; caulinis digitatis, foliolis angusto-lanceolatis, involucr. subulatis serrato-spinosis capit. longioribus, paleis tricuspidatis. Desf. Atl. 1. p. 227. Lam. enc. 4. p. 755. Clus. hist. 2. p. 159. ic. Tabern. ic. 694. Hab. in Hispaniae et Barbariae collib.

23. *odoratum*, fol. inferioribus oblongis dentato-spinosis, superioribus subdigitatis, caul. dichotomo, capit. sessilibus, invol.

brevissimis. Lam. l. c. Tournef. inst. 327. Hab. in Lusitania, locis humidis. Pal. subtridentatae. Medium inter antecedens et sequens. L.

24. *pusillum*, fol. radicalibus oblongis dentatis, caul. dichotomo, capit. sessilibus. Lin. Desf. Atl. 1. p. 223. Moris. s. 7. t. 36. f. 11. Clus. hist. 2. p. 158. ic. Cresc. in Hispania oriente et Algeriae pratis humidis. Paleae rigidae simplices apice spinosae. L.

25. *serratum*, fol. oblongis serratis : floralib. pinnatis brevibus, capit. globosis involuero longioribus. Cav. ic. 6. p. 36. t. 554. Hab. in Mexico. Germ. hispidum.

26. *humile*, pedunc. radicalibus fol. 2. oppositis, fol. radicalib. ovatis petiolo brevioribus : caulinis sessilibus oblongis serratis, involucr. 10-phyllis tricuspidatis. Cav. ic. 6. p. 37. t. 856. f. 1. Hab. in regno Quintensi. Fol. serraturae in setulam desinunt.

27. *subacaule*, fol. radicalibus ovatis subcrenatis inermibus longe pedunculatis, pedunc. nudis radicalibus. Cav. ic. l. c. fig. 2. In Nov. Hispania.

28. *ovalifolium*, simplex, fol. ovalibus dentatis, capitulis omnib. pedunculatis involuero paulo-breviorib., paleis tricuspidatis. Michaux. 1. p. 163. Hab. in Carolinae subhumidis.

29. *nudicaule*, fol. radicalib. oblongo-spathulatis serratis ciliatisque, caul. nudo, involucr. longitudine capitulorum. Lam. l. c. p. 758. Ill. gen. t. 187. f. 2. Hab. in Monte-Video. Commers. Fol. radicalia rosacea congesta. Pal. simpl.

30. *foetidum*, pumilum graveolens, fol. spinuloso-serratis : radicalibus cuneato oblongis rosaceo-congestis, caul. dichotomo, paleis longissimis lineari-lanceolatis. Michaux. Flor. l. c. Lam. enc. 4. p. 758. Sloan. jam. hist. 1. p. 264. t. 156. f. 3 et 4. Herm. Lugd. t. 237. Hab. in Amer. boreali et meridionali. Odor valde ingratus. ♂

\* \* *Bromeliae-folia* : fol. integerrimis margine ciliato-spinulosis.

31. *aquaticum*, fol. gladiatis ciliato-spinosis : floralibus indivisis brevissimis. Lam. l. c. p. 758. E. Yuccifolium. Michaux. Flor. 1. p. 164. Jacq. ic. rar. t. 347. Moris. s. 7. t. 37. f. 21. Hab. in Americae padulosis. Paleae lanceolatae, indivisae.

32. *virginianum*, fol. gladiatis serrato-spinosis : floralibus dissectis reflexis, caul. apice corymboso. Lam. l. c. p. 759. E. aquaticum. Michaux. p. 163. Pluck. Alm.



t. 396. f. 3. Hab. in Virginia et Carolina. Palcae 3-5-cuspidatae.

33. *longifolium*, fol. gladiatis ciliato-spinosis : floralibus brevissimis 3-5-fidis, caul. apice dichotomo. Cav. ic. 6. p. 36. t. 555. Hab. in imp. Mexicano. Capit. globosa, cicere minora. Palcae integrae. C.

34. *ebracteatum*, fol. gladiatis subintegerrimis, caul. superne trichotomo, capitulis cylindricis nudis. Lam. enc. 4. p. 759. Hab. circa Paraguay in Monte-Video et Bonaria. Commers.

669. ARCTOPUS. *Umbella* simplex, involucello monophyllo 4-partito spinoso magno cincta. Flosa plures in disco masculi, 4 in radio faeminei. Cal. 5-dentatus. *Petalata* integra, oblonga. *Fruct.* 4, in involucello connivente reconditi. *Flor.* masculi in distincta planta : involucro 5-phylo. Juss. (Habitus *Eryugii*.)

1. *echinatus*. L. Reich. Syst. pl. 4. p. 360. Lam. ill. t. 855. Burm. Afr. p. 1. t. 1. (Mas.) Hab. in Aethiopia. *Flor.* inter fol. terminales. Fol. conferta, sinuata, ciliata, supra spinosa. T.

670. EXOACANTHA. *Involucr.* spinosum. *Involucel.* dimidiata. *Flor.* omnes hermaphroditi, aequales. *Sem.* 1. ovata, striata.

7. *heterophylla*, fol. pinnatis : foliolis radicalibus ovatis dentatis incis, caulinis lanceolatis acutis. Billardiere. Pl. Syriacae. p. 10. t. 2. Lam. ill. t. 190. Willd. 2. p. 1379. Hab. prope Nazareth. G.

671. ECHINOPHORA. *Flor.* laterales masculi : centrali hermaphrodito. *Sem.* 1, involucello immersum.

1. *spinosa*, foliolis subulato-spinosis integerrimis, trifidisque. Cav. ic. 2. p. 24. t. 127. Willd. Sp. 2. p. 1378. Smith. brit. 1. p. 203. Hab. ad littora maris, praesertim Mediterranci. T.

2. *tenuifolia*, fol. incis inermibus. Column. ecphr. 1. p. 48. t. 101. Moris. s. 9. t. 1. f. 2. Hab. in Apuliae maritimis apricis, salis. Fol. radicalia ampla, 3-pinnata. Lam. T.

672. HYDROCOTYLE. *Umbella* simplex : *Involucr.* 4-phyllum.

*Petalata* integra. *Sem.* semiorbi-  
culato-compressa.

1. *vulgaris*, fol. peltatis orbiculatis undique emarginatis, umbel. 5-floris. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1360. Flor. dan. t. 90. Curt. Lond. ic. Hab. in paludosis et inundatis, etiam in Jamaica. Umb. e centro saepe prolifera. T.

β ? *verticillata*, fol. peltatis ovalibus, umbell. verticillatis. Thunb. l. c. 1. 3. Hab. ... Similis *vulgaris* dicitur ; sed, fol. majora, petioli longiores, et umbel. verticillatae. †

2. *natans*, fol. reniformibus repando-crenatis natantibus. Thunb. Dess. acad. p. 412. Cyrill. Pl. rar. Neap. t. 6. Hab. in Italia.

3. *tribotys*, fol. peltatis subrotundo-reniformibus biconatis, umb. radiis 3 longissimis, flor. verticillatis subquinis.

4. *umbellata*, fol. peltatis crenatis, umbellis multifloris. L. pedunculatis. Michaux. Flor. 1. p. 161. Hab. in Americae humidis. Differt a prima flosculis non 5, sed pluribus quam viginte, in umbellam simplicem digestis. L.

5. *bonariensis*, fol. subpeltatis reniformi-subrotundis crenatis, umbella composita, radiis ramosis apice lateribusque floriferis. Lam. l. c. enc. 3. p. 147. Cav. ic. 5. p. 60. t. 488. H. *multiflora*. Flor. Per. 3. p. 24. t. 246 ? Hab. in arenosis maritimis Bonariae versus Monte-Video e Limae humidis. Umb. composita, prolifera. C.

6. *americana*, fol. reniformibus sublobatis crenatis, umbel. paucifloris sessilibus. Lam. l. c. Michaux. p. 162. Hab. in Amer. et in India orientali. β. *gracilis*, caul. filiformi stricto, fol. minorib. Michaux.

7. *hirsuta*, hirsuta, fol. reniformibus lobatis crenatis, flor. verticillatis, verticillis quadrifloris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 560. Hab. in sylvis montosis Hispaniolae locis humidis umbris. T.

8. *triflora*, fol. reniformibus crenatis, pedunc. trifloris. Flor. Per. 3. p. 245. Hab. in Chile locis humidis. Caul. repens. Sem. villosa.

9. *globiflora*, fol. reniformi subrotundis duplicato-crenatis, umb. globosis multifloris. Fl. Per. l. c. p. 25. t. 247. In Peruv. nemorib. et humidis versus Munna. Hirsuta. Caul. purpureo. T.

10. *gracilis*, fol. peltatis sinuatis crenatis umbell. 6-floris. Flor. Per. 3. p. 26. t. 247. In Peruv. stagnatis. Pusilla. Caul. filiform. villosus.  $\overline{\text{U}}$

11. *quinqueloba*, fol. peltatis quinquelobis lobis acutis duplicato-serratis, umbel. globosis verticillatis. Flor. Per. 2. p. 25. t. 248. Hab. in Peruviae nemorib. Villosa.  $\odot$

12. *moschata*, fol. reniformibus septemlobatis serratis villosis, umbellis multifloris. Forst. prod. n°. 135. Hab. in Nova Zeelandia.

13. *citriodora*, fol. reniformib. 7-9-sinuatis crenatis hirsutis, umb. parva multiflora. Flor. Per. p. 26. In reg. Chilens. campis humidis et umbris. Fol. fricata odorem Melissae aut Citri exhalant.  $\overline{\text{U}}$

14. *incrassata*, fol. reniformib. 7-9-sinuatis crenato-serratis: serraturis incrassatis albicantib., umb. multifloris globosis. Fl. Per. l. c. In Peruviae umbris. Caul. purpurasc.

15. *acutifolia*, fol. cordatis acutis sinuatis crenatis, umb. simplicibus globosis multiradiatis. Flor. Per. p. 25. t. 248. Cresc. c. priore. Subvillosa.

16. *asiatica*, fol. reniformibus dentato-crenatis. L. Petiolis scapisque fasciculatis. Lam. enc. 3. p. 152. Thunb. prod. 49. Rumph. 5. t. 169. f. 1. Rhed. 10. t. 46. Hab. in India orientali et Cap. b. sp. ?  $\overline{\text{U}}$

$\beta$  ? *lunata*, fol. semilunatis crenatis basi truncatis, petiolis scapisque fasciculatis. Hab. cum priore, cujus tantum var. ?

17. *Sibthorpioides*, fol. cordato-orbiculatis obsolete lobatis crenatis, scapis subsolitariis petiolis longiorib. Lam. l. c. p. 153. Hab. in ins. Francia. Fol. minima.

18. *Ficarioides*, tota glabra, fol. cordato-subrotundis obsolete angulosis laevibus, petiolis scapisque glabris, umbel. subquinquefloris. Lam. l. c. Cresc. c. priore. Fol. parva undulata. Flor. 5, minuti subcapitati.

19. *repanda*, fol. rotundato-cordatis (majusculis) subanguloso-repandis: petiolis (nervisque) pilosis, capitulo pedunculato trifloro villosa. H. *Ficarioides*. Michaux. p. 161. Hab. in udis Car. infer.  $\dagger$

*Obs.* A priore diversa videtur. Ceterum tres hae species H. asiaticae omnino affines, et ulterius examinandae.

20. *erecta*, fol. cordatis crenatis, scapis paucifloris longitudine petiolorum. Linn. suppl. 177. Hab. in Jamaica.

21. *villosa*, tomentosa, fol. cordatis integerrimis tomentosis villosis. Linn. suppl. 175. Centella villosa. Lin. Moen. acad. 6. afr. 98. Mercurialis afra. L. Mant. 298. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. volubilis. Dioscoreae facie. Caul. prostrati apice foliosi floriferique.

22. *glabrata*, glaberrima, fol. obovatis s. lanceolatis acutis trinerviis glaberrimis. Linn. suppl. 175. Centella glabrata, fol. lanceolatis. L. Hab. ad Cap. b. spei.

23. *Ranunculoides*, fol. quinquepartitis incisib., umbellis simplicibus. Willd. p. 1363. Hab. in Mexico. Caul. repens geniculatus.

24. *Saniculaefolia*, fol. ternatis subpalmatis, lobis crenatis, lateralibus bipartitis, umbella composita. Lam. enc. 3. p. 147. t. 188. f. 4. Cav. ic. 5. t. 488. f. 2. Hab. in Bonaria.

25. *Solandra*, tomentosa, fol. cuneiformibus ovatis retusis septemdentatis. Linn. suppl. 176. H. tomentosa, fol. obovatis dentatis tomentosis. Thunb. prod. 49. Solandra capensis. L. Hab. ad Cap. b. spei.  $\dagger$

26. *tridentata*, tomentosa, fol. linearicuneiformibus apice tridentatis. Linn. suppl. 176. H. fol. cuneatis trifidis villosis. Thunb. Diss. bot. 2. p. 412. t. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Simillima priori.

27. *triloba*, caul. suffruticoso, fol. cuneiformibus trilobatis glabris. Thunb. Diss. acad. p. 412. t. 3. Hab. ad Cap. bon. spei.

*Obs.* An forte una cum priore *Azorellae* species, cujus habitum refert ?

28. *lineata*, minuta glaberrima, fol. crassiusculis linearicuneatis transversim lineatis, umbella pedunculata. Michaux. Flor. 1. p. 162. Hab. in Carol. inferioris inundatis. Affinis H. chiensis. L.

29. *sinensis*, fol. linearibus, umbellis multifloris. Thunb. Diss. acad. 2. p. 411. Hab. in China.

30. *linifolia*, fol. linearilanceolatis subfalcatis, umbel. paucifloris. Thunb. Diss. acad. 2. p. 411. Lin. suppl. p. 176. Hab. ad Cap. b. spei. Chinensis. L. ? cfr. Thunb. l. c.

31. *virgata*, glaberrima, fol. semiteretibus sulco exaratis internodiis longioribus. Linn. suppl. 176. Lam. enc. 3. p. 148. t. 188. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Var. humilior, involucri triphyllis. Lam. l. c.

*Obs.* An hae tres posteriores revera species diversae ?

673. **AZORELLA**. Umbella simplex. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5, ovato-oblonga, obtusa. *Fructus* subglobosus, striatus, calyce persistenti coronatus. *Involucrum* 3-5-8-phyllum.

1. *linarifolia*, fol. sparsis linearibus, caul. elongato, umbel. composita. Cav. l. c. t. 485. Hab. in N. Hollandia, prope portum Jackson. Fruct. striis exasperatis. An Hydrocotyle?

2. *crassifolia*, caespitosa, fol. imbricatis crassis glaberrimis ovatis apice reflexis, umbel. multiflora. A. caespitosa. Cav. ic. 5. p. 57. t. 484. f. 2. Hab. in regn. Chilensis montib. altissimis. Fere omnes species caespitosae sunt. Planta, uti sequens substantia resinosa onusta.

3. *Chamitis*, caespitosa, fol. congestis vaginantibus integerrimis basi setosis, flor. solitariis. Chamitis integrifolia. Gaertn. de fr. 1. p. 94. t. 22. Bolax. fol. ovatis integerrimis. Commers. Lam. ill. gen. t. 189. f. 1. A. filamentosa. Vahl. Willd. Sp. 2. p. 1365. Hab. in Terra del Fuego, in montibus freti Magellanici.

*Obs.* Praeter flores solitarios huic speciei adhuc singulare, quod fructus non raro tripartibilis et trispermus, quo natura umbellae defectum compensare voluisset. G.

4. *trifurcata*, fol. trifidis, petiolis nudis. Vahl. symb. 3. p. 48. (A. caespitosa.) Lam. ill. t. 189. f. 2. Bolax. Juss. Chamitis trifurcata. Gaertn. sem. 1. p. 95. t. 22. f. 4. Hydrocotyle gumifera. Lam. enc. 3. p. 156. f. 7. e.

5. *gumifera*, fol. brevioribus densissime imbricatis. Lam. enc. l. c. ill. t. 189. f. 2.

† **FRAGROSA**. *Petala* inaequalia. *Fruct.* ovatus. *Involucr.* 8-phyllum. Flor. Peruv. 3.

5. *corymbosa*, fol. imbricatis cuneiformibus trifidis minimis. Flor. Per. 3. p. 27. t. 250. In Peruviae alpih. humidis. Facie Lycopodii. Flor. solitariis. Cor. albidolutescens.

6. *spinosa*, fol. cuneiformibus trifidis spinosis. Flor. Per. l. c. In regn. Chilensis. aridis et fruticetis.

7. *multifida*, fol. obovato-cuneiformibus multifidis. Flor. Per. l. c. p. 27. t. 249. f. 2. Hab. in Andium alpih. Sem. fulvescentia.

8. *crenata*, fol. obovatis: lacinii acute

crenatis. Flor. Per. l. c. fig. c. In Peruv. collib. frigidis. Sem. purpurascens.

9. *cladophisa*, fol. ovatis cuneiformibusque inciso-serratis. Flor. Per. l. c. t. 250. f. b. Hab. in Peruv. collib. frigidis. *Involucr.* poliphyllum piloso-ciliatum.

10. *reniformis*, fol. reniformibus crenatis pilosissimis. Flor. Peruv. 3. p. 26. t. 249. Hab. in Peruviae umbrosis. Sem. fusca.

674. **SPANANTHE**. Umbella simplex. *Cor.* aequales. *Involucr.* subheptaphyllum. *Petala* lanceolata, patentia. *Fructus* ovalis, in dorso 3-striatus.

1. *paniculata*, caul. erecto, fol. latis triangularibus acuminatis crenatis basi barbatis. Willd. p. 1363. sub Hydrocotyle. Spananthe. Jacq. Icon. rar. 3. p. 247. Coll. 3. p. 247. Hab. circa Caracas. ☉

675. **BOWLESIA**. Umbella simplex triflora. *Flosc.* fertiles paralleli. *Petala* aequalia. *Fruct.* 4-gonus, subpyramidalis. *Sem.* extus concava.

1. *palmata*, fol. palmatis multipartitis lobis laciniosis: lateralib. bipartitis. Flor. Per. 3. p. 28. t. 251. f. a. Hab. in Peruviae collib. arenosis. Succosa, hispida ex setis 4-6 stellatis. ☉

2. *lobata*, fol. lobatis longe petiolatis. Flor. Per. l. c. fig. b. Hab. in Peruviae alpih. Andium. Setae, pag. fol. super. 3-5-fasciculatae, reliquae octonae, stellatae. Pl. procumbens. ☉

3. *incana*, fol. reniformibus crenatolobatis. Flor. Per. l. c. t. 268. f. a. Hab. in Peruviae collib. Procumbens. Setae 5-6-fasciculatae, reliquae 12 stellatae.

676. **SANICULA**. Umbellae confertae, subcapitatae. *Fructus* aculeatus. *Flor.* disci abortientes.

1. *europaea*, fol. radicalib. simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. Flor. dan. t. 283. Engl. bot. t. 98. Hab. in sylvib. ☿

2. *canadensis*, fol. radicalibus compositis: foliolis ovatis. Thunb. prod. 49. Hab. in Virginia et ad Cap. b. spec. ☿

3. *crithmifolia*, fol. decompositis linearibus, umbellis trifidis. Willd. in Act. Berol. v. 2. Arteria squamata. Pallas. in N. Act. Petrop. 10. p. 308.

4. *marilandica*, flosc. masculis pedunculatis, hermaphroditis sessilibus. Jacq. collect. 2. p. 293. Icon. rar. 2. t. 348. Hab. in Marilandia, Virginia. ¶

677. **ASTRANTIA**. *Involuc.* partialia latiuscula, lanceolata, patentia æqualia, petalis longiora, colorata. *Flor.* plurimiabortientes.

1. *Epipactis*, fol. quinquelobis obtusis serratis, involucris oblongis obtusis serratis, Willd. Sp. 2. p. 1367. Scop. carn. n.º 303. t. 6. Jacq. aust. 5. p. 32. app. t. 11. Hab. in sylvis montanis et subalpinis Carinthiae, Pannoniae. ¶

2. *major*, fol. radicalibus quinquelobis, lobis trifidis acutis dentatis, involucris linearibus lanceolatis integerrimis. Willd. p. 1368. Hab. in alpinis Helvetiae, Hetruriae, Bohemiae, Pyrenaeis. ¶

3. *carniolica*, fol. radicalibus quinquelobis, lobis oblongis acutiusculis subtrifidis mucronato-dentatis, involucris integerrimis. Willd. Jacq. austr. 6. app. t. 10. Hab. in alpinis Carnioliae, Carinthiae. ¶

4. *minor*, fol. radicalibus digitatis, fol. septenis novenis lanceolatis acutis profunde dentatis. Willd. Lam. enc. 1. p. 320. t. 191. f. 2. Hab. in alpinis Helvetiae, Pyrenaeis. ¶

5. *heterophylla*, fol. caulinis integris ovatis aristato-serratis sessilibus, involucris apice ciliato-serratis. Willd. in N. Act. Berol. v. 2. Hab. in Sibiria.

6. *ciliaris*, fol. lanceolatis serrato-ciliatis. Linn. suppl. 177. Jasiona capensis. Berg. Act. ups. 3. p. 187. t. 10. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. simplex junceus, apice divisus in paucos ramos floriferos. L.

678. **BUPLEURUM**. *Involucra* umbellulae majora, 5-phylla. *Petala* (flava) involuta. *Fructus* subrotundus, compressus, striatus. (Fol. integerrima.)

\* *Herbacea.*

1. *rotundifolium*, involucris universalibus nullis, fol. perfoliatis. Lin. Blackw. t. 95. Lam. ill. t. 189. f. 1. Hab. inter segetes. ○

2. *stellatum*, involucellis coadunatis: universali triphylo. Lin. B. fol. gramineis, involucro peculiari octies emarginato. Hall. helv. n.º 771. t. 18. Hab. in alpinis Helvetiis. ¶

3. *petraeum*, involucellis subpentaphyllis coadunatis, universali pentaphyllo, fol. caulinis cordato-lanceolatis amplexicaulibus, radicalibus linearibus. Willd. Sp. 2. p. 1370. Pluck. phytog. t. 50. f. 5.

4. *graminifolium*, involucellis heptaphyllis, universali subtriphylo, fol. radicalibus linearibus, scapis monophyllis. Vahl. symb. 3. p. 48. B. petraeum. Jacq. Coll. 1. p. 209. Icon. rar. 1. t. 56. Vill. delph. 2. p. 576. t. 14. Hab. in montibus Galliae, Italiae, Carinthiae. ¶

5. *angulosum*, involucellis pentaphyllis orbiculatis, universali triphylo ovato, fol. amplexicaulibus cordato-lanceolatis. L. Perfoliata alpina. Hab. in Pyrenaeis, β. in Vallis alpibus. Var. β. fol. angustissima striata. L. ¶

6. *pyrenaicum*, involucellis pentaphyllis subrotundis emarginatis connatis, universali triphylo, basi inciso, fol. lanceolatis cordatis amplexicaulibus. Willd. Gouan. illust. p. 8. t. 4. f. 1. 2. Hab. in Pyrenaeorum monte Laurenti. ¶

7. *longifolium*, involucellis pentaphyllis ovatis: universali subpentaphyllo, fol. ovatis amplexicaulibus. Hab. in Germania, Thuringia, inque monte Jura Helvetiae. ¶

8. *falcatum*, caul. flexuoso, involucellis pentaphyllis acutis, universali subpentaphyllo, fol. lanceolatis, caule flexuoso. L. Jacq. austr. 1. 158. Hab. in collibus et sylvaticis calcareis, gypsacis, frequens. Fol. radicalia ovata. ¶

9. *exaltatum*, involucris utroque subpentaphyllo minimo, fol. omnibus linearibus: inferioribus elongatis, caul. erecto paniculato. Tableau de la mer Caspienne, etc. n.º 8. In pratis montosis et collibus sicciore, etiam Tauriae.

10. *caricifolium*, involucellis pentaphyllis cuspidatis, universali monophyllo lanceolato, fol. linearibus basi attenuatis. Willd. B. gramineum. Villars. delph. 2. p. 575. Hab. in montibus Delphinatus, Vallisae. ¶

11. *Odontites*, umbell. lateralibus oppositifoliis subsessilibus: radiis inaequalibus, involucellis pentaphyllis lanceolato-linearibus coloratis longioribus. Desf. Atl. 1. p. 229. Jacq. hort. t. 91. Coll. 3. p. 68. J. Bauh. hist. 3. p. 207. ic. Hab. in alpinis Vallisae, Italiae rupestrib. et inter Barbariae segetes. ○

12. *semicompositum*, fol. lanceolatis mucronatis: inferioribus obtusis, involucris subulatis:

subulatis : partiali flor. longiore, umbel. radiis inaequalibus, sem. aspero. Desf. l. c. p. 230. Gouan. ill. 9. t. 7. f. 1. Hab. in Hispania, Monspelii et in Algeriae arvis. Var. fol. caul. inferiorib. lanceolatis acutis. D. ☉

13. *procumbens*, caul. procumbente, fol. linearibus, ramulis paniculatis, involucl. subovatis acutis brevissimis, sem. rugoso. Desf. l. c. Hab. prope Tunctum. Affine B. tenuissimo. ☞

14. *ranunculoides*, involucl. pentaphyllis lanceolatis longioribus : universali triphylo, fol. caulinis lanceolatis. L. Jacq. Collect. 3. p. 66. Park. theatr. t. 338. Hab. in Helvetia et Pyrenaeis. ☞

15. *rigidum*, caule dichotomo subnudo, involuclis minimis acutis. Hab. Monspelii. Fol. lanceolata, nervosa, rigida. Involucl. 3-phyllum.

16. *tenuissimum*, umbellulis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris. Engl. bot. t. 478. Flor. dan. t. 1090? Column. ecphr. t. p. 85. t. 247. Moris. s. o. t. 14. f. 4. Hab. in Germania, Anglia, Gallia, Italia. Caul. ramosissimus. Fol. linearia. Umbellulae axillares. L. ☉

17. *baldense*, caule erecto ramoso, fol. linearibus, involuclis subtetraphyllis inaequalibus umbella brevioribus, involuclis pentaphyllis. Willd. Terra. giorn. p. 47. t. 1. Hab. in montanis subalpinis Croatiae, Carnioliae et in monte Baldo. ☞

18. *Gerardi*, caule erecto ramosissimo, fol. linearibus acuminatis involuclro pentaphyllis linearibus subulatis umbella longioribus. Willd. Jacq. austr. 3. t. 256. B. junceum. Hab. in Gallia, Italia, Palatinatu, Austria. ☉

19. *junceum*, caule erecto paniculato, fol. linearibus, involuclis triphyllis longitudine umbellae, involucl. pentaphyllis. Willd. Hab. in Gallia, Italia, Helvetia, Germania. ☉

20. *nudum*, caule ramoso aphylo, fol. radicalibus decompositis planis incis, involuclis involuclisque lanceolato-oblongis. Ait. Kew. t. p. 331. Hab. ad Cap. b. spei. ☞

#### \*\* Frutescentia.

21. *arborescens*, frutescens, fol. oblongis integerrimis petiolatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spei. ☞

22. *fruticosum*, frutescens, fol. lanceolato-obovatis integerrimis sessilibus. Willd. B. fol. obverse ovatis in petiolum

attenuatis. Hort. cliff. 104. Hab. in Galliae australis et Orientis saxosis maritimis. ☞

23. *frutescens* (hispanicum), frutescens, fol. striatis linearibus subulatis rigidis, infloresc. ramosa, involucl. subpentaphyllis, involucl. umbellula brevioris. Desf. l. c. p. 241. Cav. ic. 2. t. 106. B. angustifolium hispanicum. Barrel. t. 2255. Hab. in collibus inculis prope Flemsen.

24. *gibraltarium*, fruticosum, fol. rigidis lanceolatis obliquis erectis mucronatis, involucl. reflexis. Desf. p. 233. Lam. enc. t. p. 520. B. coriaceum. L'Herit. Stirp. t. 67. Willd. Sp. p. 1377. B. obliquum. Vahl. Hab. in Hispan. prope Gibraltari et in Cap. Bon. dicto apud Tunetanos. Affine priori. Fol. utrinque glauca.

25. *plantagineum*, fruticosum, fol. perennantibus lanceolatis nervosis mucronatis, ramis floriferis ramosis striatis, involucl. subulatis adpressis. Desf. p. 233. t. 37. Hab. in Atlante prope Bougie. Involucl. univ. 5-7-phyllum. ☞

26. *canescens*, fruticosum, fol. ovalilanceolatis obtusis nervosis subsessilibus. Schousboe. p. 113. Hab. in fruticeto prope Magadore. Glabrum, glaucescens. Involucl. univ. 5-phyllum. Priori affine.

27. *spinosa*, frutescens, ramis paniculae senilibus nudis spinescentibus, fol. linearibus. Linn. suppl. t. 78. Gouan. illust. p. 8. t. 2. f. 3. Habit. in Hispania. Panicula desolata in spina transiens more Alyssi spinosa. L. ☞

28. *difforme*, frutescens, fol. vernalibus decompositis planis incis, aestivalibus filiformibus angulatis trifidis. L. B. fruticans, fol. filiformibus trifidis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. hyemalia Petroselinii, aestivalia Spartii. L. ☞

679. HERMAS. Polygama. Involucl. universale 3-12-phyllum : partiale 2, 1-laterale. Umb. hemisphaerica; radiis (flor. masculis deciduis) truncata. Umbellulae laterales flor. masculis tantummodo instructae. Sem. suborbiculata, compressa, stria longitudinali elevata. (Fol. tomentos.)

1. *depauperata*, fol. cordato-oblongis supra nudis subamplexicaulis, axillis superioribus et involucl. lanuginosis. Lam. enc. 3. p. 121. Lin. mant. p. 219. Burm. t. 71. f. 2. Bupleurum villosum. Ljé. Sp.

pl. 2. p. 343. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequentibus omnibus.

2. *gigantea*, fol. ovato-lanceolatis supra lanuginosis subtus tomentosis obsolete crenatis. Lin. suppl. p. 435. Lam. l. c. Bupleurum. Thunb. prodr. p. 50. sub Bupleuro. Fol. Verbasci. Caul. 4-pedalis.

3. *capitata*, fol. ovatis inciso-crenatis subtus tomentosis, umbel. capitatis. Thunb. prodr. l. c. Lin. suppl. p. 435. Pl. parva. Fol. fere ut in Dryade octopetala. Umb. radii non truncati. Lam. enc. 3. p. 122.

4. *quinquedentata*, caul. glabro, fol. ovatis quinquedentatis subtus tomentosis, umbel. solitaria. Lin. suppl. l. c. Fol. parva.

5. *ciliata*, caul. glabro, fol. ovatis ciliatis subtus tomentosis, umbel. pluribus. Lin. suppl. p. 436.

CSO. CAUCALIS. Cor. ut plurimum radiatæ: disci masculæ. Petala inflexo emarginata. Fructus setis hispidus. Involucrum polyphyllum integrum, aut nullum.

1. *grandiflora*, involucris singulis pentaphyllis: foliolo unico duplo majore, petalis exterioribus maximis. Jacq. austr. t. 54. Willd. p. 1283. Hab. in Europa inter segetes. ☉

2. *daucoides*, umbellis trifidis aphyllis, umbellulis trispermis triphyllis. Jacq. austr. t. 157. Moris. s. g. t. 14. f. 6. Hab. in arvis. Nomen haud aptum. Involucrum universalis loco villis adest albidus.

3. *latifolia*, umbella universali trifida: partialibus pentaspermis, fol. pinnatis serratis. Jacq. hort. t. 128. Hab. in Germania, Helvetia, Gallia, Oriente inter segetes. Foliol. lanceolata. Flor. rubri.

4. *mauritania*, involucro universali monophyllo, partialibus triphyllis. L. Walth. hort. 127. Hab. in Mauritania. ☉ +

5. *maritima*, humilis pubescens, laciniis foliorum obtusiusculis, umbellis involucratæ bifidis, fructibus ovatis crassis, aculeis inaequalibus flavescens. Lam. enc. t. p. 657. Cav. ic. 2. p. 1. t. 10. C. pumila. Vahl. Willd. Daucus muricatus. β. L. Hab. in maritimis Europæ australioris et Barbariæ. Caul. fusco-tomentosus. Pedunc. subradicales. ☉

6. *orientalis*, umbellis patentibus, foliolis partialibus superdecompositis laciniatis: lacinulis linearibus. Moris. s. g. t. 14.

f. 5. Bellon. it. lib. 3. t. 200. Hab. in Oriente. Semina setis exstantibus apice viscoso-glandulosis. L. ☉

7. *capensis*, caule humillimo aspero, involucris et involucellis subtriphyllis, fructibus globosis muricatis. Lam. enc. t. p. 657. C. africana. Thunb. prodr. p. 49? Hab. ad Cap. b. spei.

8. *platycarpus*, umbellis trifidis, involucris et involucellis triphyllis, umbellulis dispermis. Lam. enc. t. p. 650. Gouan. fl. monsp. 285. Moris. s. g. t. 14. f. 2. Colum. cephr. t. t. 94. f. 2. Hab. in Gallia australi, Italia. Fruct. magnus purpurascens.

9. *leptophylla*, involucro universali subnullo, umbella bifida, involucellis pentaphyllis. L. Hab. in Europa australiori inter segetes. Fructus setis fideis s. flavis distinctus. Habitu C. Daucoidis.

10. *humilis*, caul. retrorsum hispidus, umbell. biradiata, involucro o, involucellis subpentaphyllis, fructibus elongatis pilis confertis peltatis-uncinatis. Desf. Atl. t. p. 239. Jacq. hort. 2. t. 165. C. parviflora. Lam. Enc. t. p. 656. Hab. in Gallia meridionalis et Barbariæ segetibus. Involucrum partiale heptaphyllum. Desf. Sem. setis flavescens. An ab antecedente diversa?

11. *Anthriscus*, caul. elongato, ramis erectiusculis, foliolo ovato-lanceolatis pinnatifidis, involucro universali subnullo. Tordylium Anthriscus. Lin. Jacq. Austr. t. 261. Curt. Lond. ic. Torilis Gaertn. Hab. ad sepes, in ruderalis. Involucrum universale observavi vix ullum, quod ab aliis polyphyllum affirmatur.

12. *arvensis*, involucro universali subnullo, seminibus ovatis, stylis reflexis, fol. decompositis, foliolo extremo linearilanceolato, caul. remosissimo. Ait. Kew. t. p. 334. C. helvetica. Murr. syst. veg. p. 26. Jacq. hort. 3. p. 12. t. 16. C. infesta. Curtis. Lond. ic. C. segetalis. Thuillier. Hab. in agris. Pedalis, ramis congestis. An hujus loci Scandix infesta. Lin.? ☉

13. *nodosa*, caul. prostrato, umbellis simplicibus sub-sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. Lin. sub Tordyllo. Jacq. Austr. app. t. 24. Engl. bot. t. 199. Hab. ad margines agrorum, etc. Sem. latere interiora tantum tuberculata.

681. DAUCUS. Cor. subradiatæ. Flosculi disci abortivi. Fructus pilis hispidus. (Umbella fructus contractus, infundibuliformis.)

1. *Carota*, seminibus hispidis, petioli

subtus nervosis, folior. laciniis angustolinaribus acutis. Lam. enc. t. p. 634. Flor. dan. t. 723. *β. sylvestris* Bosc. centrali rubro sterili. Hab. in pascuis, arvis.

*β polygamus*, umbel. flosculis marginalibus pluribus masculis. Gouan. illustr. pag. Jacq. hort. 3. t. 38. Hab. in Hispania. Sem. pilis longioribus instructa dicuntur.

*Obs.* Vidi adhuc varietatem *D. Carotae* locis siccis colliculosis lectam, involucri laciniis integerrimis distinctam; occurrit quoque in Argentorati agris post segetem var. memorabilis a b. Hermannò *exigua* denominata, caul. brachiato divaricato.

\* *maritimus*, involucri. brevibus dissectis, umbellis parvis, fol. tenuiter dissectis glabris lucidis, caul. subnudo. Lam. l. c. *D. Carota*. *β. Smith.* Brit. t. p. 300. Hab. in Angliæ et Galliae meridionalis maritimis. An distincta species?

2. *mauritanicus*, seminibus hispidis, flosculo centrali sterili carnoso, receptaculo communi crasso hemisphaerico, fol. latis glabris, foliol. ovatis incisus dentatis. Lam. l. c. Moris s. g. t. 13. f. 4. Hab. in Hispania, Italia, Mauritania. Conf. *D. grandiflorus*. Desf. Atl. t. p. 243.

*β ? lucidus*, fol. lucidis, caule hirsuto, petiolis laevibus. Linn. suppl. 179. *D. hispanicus* seminibus aculeatis, flosculo centrali sterili nullo, caule nudo. Gouan. illustr. g. Moris 3. s. g. t. 13. f. 4. Hab. in Italia, Hispania, Mauritania. ☉

3? *gummifer*, involucri. bracteaeformibus simplicibus latis membranaceis ad latera coloratis, fol. laciniis ovatis incisodentatis. Lam. Bocc. Mus. t. 20. Hab. in lapidosis, maritimis Europ. australioris.

4. *grandiflorus*, caul. piloso, fol. decompositis: foliolis linearibus acutis, umbel. lateralibus, fol. brevioribus, sem. aculeis peltato-stellatis. Desf. Atl. t. p. 240. t. 59. Hab. in Algeriae segetibus. Facie *Cauc. gran litorae*. Petala in ambitu maxima.

5. *parviflorus*, fol. multifarium pinnatis: pinnulis inferiorum ovato-oblongis incisus: superiorum linearibus acutis, caul. scabro, umbel. distinctis, petal. minutissimis flavescens. Desf. Atl. t. p. 241. t. 60. Hab. ad littora prope Arcau. Petal. minima flavescens. Sem. teretia, apice peltata.

6. *aureus*, caul. dichotomo piloso scabro, cor. radiantibus flavis, acul. rigidis, apice peltato uncinatis. Desf. p. 242. Hab. inter segetes circa Mascar. Petal. in ambitu majora. ☉

7. *crinitus*, foliol. verticillatis multifariam pinnatifidis rigidulis acutis, involucri. apice multipartitis, semine crinito. Desf. p. 242. t. 62. Park. Theatr. 1331. In Atlante et in collib. incultis prope Mascar et Flems. Sem. setae longae molles violaceae aut albae. Flor. contriti aromati. *D.*

8. *Gingidium*, radiis involucri planis: laciniis recurvis. Lin. *Gingilium*. Matth. Comm. p. 372. t. 373. Bocc. sic. ic. 40. Moris. s. g. t. g. f. 10. Hab. Monspelii. ☉ +

9. *muricatus*, seminibus triglochidi-aculeatis. L. Desf. Atl. p. 243. Moris s. g. t. 14. f. 4. Herm. par. t. 111. Col. ecphr. t. p. 63. t. 94. Hab. in Mauritania, in arvis. Fol. fere Cari Carvi. Cor. ante anthesin purpurascens. Sem. crassa Caulalidis, aculeis validis. *D.* ☐

10. *hispidus*, caul. hispido, pil. inferioribus retroversis, fol. subbipinnatis: foliol. ovatis inciso-lobatis villosis, acul. sem. peltato-stellatis. Desf. p. 243. t. 61. Hab. in rupium fissuris ad maris littora. Petala flava. Afria. *D. mariumo*.

11. *glaberrimus*, glaber, fol. pinnatis foliol. ovatis incisus: terminali trilobis: lac. obtusis, umbellul. distinctis, sem. muricatis. Desf. p. 244. t. 64. Cresc. in sylv. Palmarum prope Tozzer. Umbel. parva, umbellul. distinctae in pedunc. longis, facie Ammeos.

12. *copticus*, flor. aequalibus, fol. tripinnatis glabris, foliol. linearibus angustissimis, caul. laevi. Lam. enc. t. p. 635. Ammi copticum. Lin. Jacq. hort. t. 196. Hab. in Aegypto. Sem. uti in ceteris Daucis.

13. *setifolius*, caul. laevi, fol. setaceis pubescentibus, sem. semicylindricis: angulis ciliato-eclinatis. Desf. t. p. 244. t. 65. Sem. turgida, cinerea, pubescentia. An *Visnaga*? Hab. in collib. prope Mascar.

14. *alatus*, seminib. angulis membranaceis hispidis, flore parvo luteo. Poir. II. t. p. 135. Cresc. ad maris littora prope La-Calle.

682. A. M. M. I. *Umbella laxa*. *Involucra* pinnatifida. *Cor.* radiata: omnes hermaphroditæ. *Fructus* laevis, striatus.

\* *Visnaga* (L.) *Daucoidea*, umbel. decorata concava.

1. *Visnaga*, fol. decompositis subbifloribus, sem. inter stria villosis, umbel.

V 2

universali basi coalita. Lin. Willd. p. 1391. sub Dauco. *Vismaga daucoides*. Gaertn. de fr. 1. p. 92. t. 107. Tab. ic. 716. Hab. in Gallia, in Oriente et in Barbaria. Radix umbellae, calore exsiccati, ad dentiscalpia adhibetur. Schousb. Hinc Gallis *Herbe aux cure-dents*.

2. *Meoides*, fol. multifidis capillaceis, petiolis canaliculatis. *Ammi anethifolium*. Lam. 1. c. Danc. Meoides. H. Par. Hab. in Oriente. Sem. glaberrima. ¶

\*\* *Umbel. laxa subdivaricata*.

3. *majus*, fol. inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, superioribus multifidis linearibus. L. Blackw. t. 447. Willd. p. 1392. Hab. in Europae australis et Orientis vicis, arvis. ○

4. *glaucofolium*, fol. bipinnatis : foliolis pinnatis trifarcatis linearibus albo-acuminatis. Villars. Delph. 2. p. 592. Dauc. petraeus glaucofolius. Bauh. hist. 3. p. 58. Hab. in Gallia meridionali et circa Parisios. ¶

5. *divaricatum*, sem. striatis ovatis, caul. ramoso divaricato, umbel. radiis subtrifloris. Gmel. Syst. N. L. II. p. 474. sub Dauco. Walt. Flor. Carol. p. 114. Hab. in Amer. boreali. Pedic. Sem. glaberrima, profunde striata.

6. *capillaceum*, fol. omnibus capillaceo-multifidis, sem. glabratis. Michaux. Flor. 1. p. 165. Hab. in Carolinae campestris. Statura Am. coptic. L. †

7. *daucifolium*, fol. supradecompositis, foliol. tripartito-pinnatifidis acutis. Willd. p. 1393. Scop. carn. n. 342. t. 10. Crithmum pyrenaicum. Hort. cliff. 94. Hab. in Pyrenaeis, Carniolia. ¶

683. *ARTEDIA*. *Involucrum* pinnatifidum. *Cor.* radiatæ. *Flor.* disci masculi. *Fructus* compressus, margine lobis membranaceo-scariosis cinctus.

1. *squamata*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1389. Lam. ill. t. 193. Hab. in Libano. Fol. multipartita - tenuia. Sem. non hispida, sed disco glabra striis elevatis, margine lobato-alata, magna. ○

684. *BUNIMUM*. *Cor.* uniformis. *Umbella* conferta. *Fructus* ovatus.

1. *Bulbocastanum*, fol. uniformibus, petiolo subaequalibus, involuero polyphylo. Willd. p. 1394. Flor. dan. t. 220. B. minus

fol. uniformibus, involuero polyphylo fructib. subcylindricis apice crassioribus, stylis reflexis deciduis. Gouan. ill. 10. Moris. s. 9. p. 204. t. 2. f. 1. Hab. in sylvaticis, agris et arvis. Rad. edulis.

2. *majus* (ternatum), fol. caulinis ternatis subsessilibus angustis linearibus, involucr. o. B. *majus* fruct. ovatis; styl. persistentibus. Gouan. ill. p. 10. Willd. p. 1394. hujus loci. Hab. in Gallia, frequens mihi obvium in pascuis et arbutis prope Montd'or in Auvergne Gall.

β. *flexuosum*, caul. basi attenuato, flexuoso, involucr. subtriphylo. Smith. brit. 1. p. 301. B. Bulbocastanum. Curt. Lond. ic. Involucr. 1-3-phyllum, saepe nullum. Sm.

3. *aromaticum*, foliol. filiformibus, involucr. subhexaphylo, involucll. triphyllis. Lin. Mant. p. 218. Hab. in Creta et Syria. Sem. ovata, minuta, torulis 5, scabriusculis. L.

685. *CONIUM*. *Involucella* dimidiata, subtriphylla. *Fructus* subglobosus, 5-striatus, utrinque crenatus.

1. *maculatum*, canle ramosissimo maculato, seminibus striatis Jacq. austr. t. 156. Willd. Sp. 2. p. 1395. Curt. Lond. ic. Hab. in agris, ruderalis. ♂

2. *rugosum*, seminibus rugosis. Thunb. prot. 50. C. suffruticosum. Berg. cap. 77. Hab. ad Cap. b. spei.

3. *rigens*, seminibus submuricatis, pedunculis sulcatis, foliol. canaliculatis obtusis. L. Hab. ad Cap. b. spei littora maris. Caul. brevis, rigens. h

4. *africanum*, seminibus muricatis, petiolis pedunculisque laevibus, foliolis planiusculis. Jacq. hort. t. 194. Hab. in Africa. Glaucum. Odor Apii graveolentis. L. ○

5. *dichotomum*, caul. sulcato dichotomo, sem. oblongis compressis sulcatis tuberculosis. Desf. Atl. 1. p. 246. t. 66. Hab. inter segetes prope Mascar. Sem. profunde sulcata.

686. *SELINUM*. *Fructus* ovali-oblongus, compresso-planus, in medio striatus. *Involucrum* reflexum. *Petala* cordata, aequalis. *Cal.* integer.

1. *sylvestre*, caule laevi, radice fusiformi multiplici. Willd. Sp. p. 1396. Linn.



suppl. 180. Flor. dan. t. 412. Moris. s. 9. t. 17. f. 2. Hab. in Hercynia, Gallia.  $\mathcal{T}$

2. *palustre*, sublactescens, caule striato, radice fusiformi subdivisa, radiis umbellae hispidis. Willd. Flor. dan. t. 257. Engl. bot. t. 229. S. sylvestre. Jacq. aust. t. 152. S. Tyselinum. Crantz. austr. p. 170. Bauh. hist. In Europae septentrionalis paludibus.  $\mathcal{T}$

3. *austriacum*, caule sulcato, involucri universali polyphylo, foliol. cuneiformibus incis. Willd. Jacq. aust. t. 71. S. argenteum. Vill. delph. 2. p. 636. S. petiolis argenteis et viridibus striis lineatis, semine alis latius albidis. Crantz. fasc. 3. p. 43. t. 14. f. 2. Hab. in montosis Austriae, Italiae, Galliae.  $\mathcal{T}$

4. *sibiricum*, fol. tripinnatis, involucri universali partiali. decoloribus enneaphyllis. Retz. obs. 2. p. 16. Hab. in Sibiria.  $\mathcal{C}$

5. *lineare*, caul. sulcato-striato, foliol. pinnatifidis : lacin. linearibus. Schumacher. Flor. Zealand. p. 95. Hab. in Dania, in aggeribus. Caul. strictus, bipedalis. Fol. vaginac membranaceae, glaucae. Involucra setaceo-capillacea. S.

6? *Carvisfolia*, caule sulcato acutangulo, involucri universali evanido, foliolis lanceolatis incis. apice callosa-mucronatis, pistillis fructus reflexis. Jacq. austr. t. 16. Gmel. sib. 1. p. 204. t. 48. Carvisfolia. Vaill. t. 5. f. 2. Vill. Dauph. 2. p. 629. Ob sem. margine membranacea. Hab. in Germania, Helvetia, Sibiria, Austria.  $\mathcal{T}$

7. *appianum*, caul. tereti striato : involucri universali monophyllo, fol. vaginis amplexicaulib. erectis, foliolis filiformibus mucronatis. Viviani Flor. ital. fragm. t. x. Hab. inter saxa montium Carrarae. Habitu rigido.

8. *Chabraei*, caule tereti striato, involucri universali nullo, vaginis foliorum laxis, foliolis filiformi-linearibus. Willd. Jacq. aust. t. 72. Peucedanum Carvisfolia. Vill. delph. 2. p. 630. Hab. in nemoribus Germaniae, Galliae, Italiae.  $\mathcal{T}$

9. *Segneri*, caule subtereti striato, involucri universali nullo, foliol. trifidis linearibus mucronatis. Willd. Jacq. hort. t. 61. Segneri. ver. 2. p. 41. t. 13. Hab. in Italia, Carniolia. Caul. quadrupedalis laevis non striatus, nisi in summitate.  $\mathcal{T}$

10. *Monnieri*, umbellis confertis, involucri universali reflexo, seminum costis quinque membranaceis. Jacq. hort. t. 62. Hab. in Gallia australi.  $\odot$

11. *decipiens* (frutescens), caule lignoso inferne nudo, fol. inferioribus bipinnatis, pinnulis lanceolatis integris incis. serratis. Schrad. et Wendl. sert. hannov. fasc. 3. p. 23. t. 13. Hab. ... Involuc. polyphyllum, foliolis latis lanceolato-cuneiformibus trifidis, margine membranaceis. W.  $\mathcal{h}$

12. *canadense*, nitens glaberrimum, fol. bipinnatis : foliol. multipartitis : lacin. lanceolatis, fructib. ovalibus. Michaux. Flor. 1. p. 165. An Athamantia chinensis. Lin. ? Hab. ad ostium flum. St. Laurentii.

13. *Oreoselinum*, fol. triplicato-pinnatis : foliolis ovato-acutis inciso-serratis divaricatis. Athamantia. Lin. Jacq. austr. t. 68. Oreoselinum nigrum. Delarbre, Flor. de la Auvergne. 1. p. 428. Hab. in collibus ardis et ad vinearum margines. Sem. rotundata.

14. *Cervaria*, fol. pinnatis, inciso-angulatis, sem. oblongis. Athamantia. Lin. Hort. Cliff. p. 92. S. fol. pinnis semilobatis circumserratis. Hall. helv. n. 804. Roth. germ. 2. p. 354. Jacq. austr. t. 69. Oreoselinum claphobosum. Delarbre l. c. p. 429. Hab. in montosis agrorum et vinearum versutis, etc.

687. **MULINUM.** *Umbella simplex.* Involuc. polyphyllum. Fructus (turgidus) ovatus, profunde sulcatus : angulis rotundis. Petala lutescentia. Cal. denticulatus.

1. *proliferum*, foliis trifidis vaginantibus : lacin. subulatis, umbel. prolifera. Selinum. Cav. ic. 5. p. 58. t. 486. f. 1. Hab. in Americae meridion. portu Descado. Rad. tortuosa.

2. *microphyllum*, fruticosum, fol. minutis numerosissimis tripartitis : petiolis caul. ambientibus. Cav. l. c. p. 59. fig. 2. Cum priore.  $\mathcal{h}$

3. *spinosum*, fol. quinquepartitis : lacin. lanceolatis acumine pungente, petiol. basi caulem vaginantibus. Cav. l. c. t. 487. f. 1. Hab. in altissimis montibus regni Chilensis in Cordillera. Cal. haec major.

4. *acaule*, fol. ovatis inferne attenuatis, umbel. radicali sessili. Cav. l. c. t. 487. f. 2. Cresc. prope port. Descado. Umb. in centro fol. sedens. Fruct. omnium maximus. Fol. super terram expansa.

Obs. Plantae hae toto habitu a Selinis differunt, quare eas sub distincto genere separavi.

638. *ATHAMANTA*. *Involucr.* polyphyllum. *Fructus* ovato-oblongus, pubescens, striatus. *Petala* inflexa, emarginata. *Cal.* integer.

1. *Libanotis*, fol. bipinnatis planis, umbella hemisphaerica, seminibus hirsutis. L. Jacq. austr. t. 392. Willd. p. 1400. Engl. bot. t. 138. Pluck. alm. 129. t. 173.  $\beta$ . pyrenaica. Jacq. hort. 2. t. 197. Hab. in Sueciae, Germaniae pratis siccis apricis.  $\mathcal{T}$

2. *sibirica*, fol. pinnatis inciso-angulatis. Gmel. sib. I. p. 186. t. 40. f. 1. 2. Hab. in Sibiria. Flor. subtus rubri.  $\mathcal{T}$

3. *condensata*, fol. subpinnatis foliolis deorsum imbricatis, umbella lentiformi. Hab. in Sibiria. Germina villosa. Antherae et receptacula flosculorum purpurea. L.

4. *incana*, tota pubescens incana, fol. supradecompositis, foliolis cuneiformibus quadridentatis, umb. multiradiata globosa. Willd. p. 1402. Hab. in Sibiria.

*Obs.* Similis praecedenti, sed tomento tenui incano, caule crassiore, foliorum forma et parvitate distincta. W.

5. *sicula*, fol. inferioribus nitidis, umbellis primordialibus subsessilibus, acminibus pilosis. Hab. in Sicilia. Fol. inferiora nitida, superiora villosa. Caulis pubescens.  $\mathcal{T}$

6. *Matthioli*, foliolis capillaceis, stylis persistentibus erectis, seminibus oblongis hirsutis. Willd. p. 1403. Jacq. ic. rar. 1. t. 57. A. foliolis elongato-subsetaceis, sem. ovato-acutis striatis hirsutis saepe volentibus. Wulff. in Jacq. Coll. 1. p. 217. Libanotis rupestris. Scop. carn. n. 315. t. g. Villars. 2. p. 618. Dalech. hist. p. 758. f. 750. Hab. in Croatia, Carniola et Delphinatu. Rad. longissima

7. *cretensis*, foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis. Jacq. austr. t. 62. Hab. in Helvetia, Austria, Carniola.  $\mathcal{T}$

8. *annua*, fol. multipartitis: laciniis linearibus teretiusculis acuminatis. Myrrhis tenuifolia annua cretica. semine laringine alba pubescente. Moris. hist. 3. p. 303. Hab. in Creta. Var. *Cretensis*?  $\odot$

639. *PEUCIDANUM*. *Fructus* ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. *Involucra* brevissima. (Caul. albus. Fol. multifido-linearia.)

1. *officinale*, fol. quinques tripartitis filiformibus linearibus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1405. Gmel. sib. 1. t. 47. Hab. in Europae

australioris pratis pinguibus. Flor. flavescens.  $\mathcal{T}$

\* *gallicum*, fol. quadri-quinques partitis lineari-acuminatis (sublanceolato-linearibus), flor. albis. P. gallicum. Tournef. Hist. d. pl. de Paris. v. 2. p. 478. Hab. in sylvaticis, praesertim prope Fontainebleau. Caul. altus, basi fibris aridis cinctus.  $\mathcal{T}$

2. *arenarium*, fol. subquadrripinnatis, umbellis pedunculatis 5-7-fidis, involuc. universali subnullo. Plantar. hongar. p. 18. t. 20. Hab. in clivis arenosis Pestini. Altitudo spectabilis. Rad. profundissime penetrat. Cor. flava. Accedit ad P. *officinale*.

3. *italicum*, fol. tripartitis, foliol. linearibus longissimis. Mill. dict. n. 2. P. officinale.  $\beta$ . Lin. A prima specie diversum videtur, ob fol. tripartita tantummodo: foliolis 3-plo fere longioribus, etiam multo latioribus.

4. *serotinum*, caul. altissimo, fol. quinques partitis, foliol. ternatis confluentibus. P. *tenuifolium*. Enc. bot. 5. p. 228. Colitur in Hort. Parisiensi. Cor. flavescens. Foliol. basi confluant, apice divergunt.

5. *alpestre*, foliolis linearibus ramosis. Lin. Hort. Cliff. Hab. ...  $\dagger$

6. *capillaceum*, fol. bipinnatis, laciniis capillaceis sulcatis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei, c. sequente.

7. *tenuifolium*, fol. bipinnatifidis, laciniis lanceolatis oppositis alternisque marginatis. Thunb.

8. *sibiricum*, foliolis linearibus acutis, umbellis primordialibus sessilibus. Willd. p. 1406. Hab. in Sibiria. Fol. supradecomposita, foliolis longis linearibus acutis in petiolum partialem decurrentibus. W.  $\mathcal{T}$

9. *japonicum*, fol. quinques tripartitis, foliol. cuneiformibus trifidis. Thunb. jap. 117. Hab. maritimis Japoniae.

10. *Silaus*, foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis, involucro universali diphylo. L. Jacq. austr. t. 15. Riv. t. 59. Hab. in Helvetiae, Narbonae, Germaniae, Angliae, subhumidis. Caul. foliola lanceolata, quasi carinata: extimis coadunatis. Flor. lutei, extus albi. L. Involucr. etiam o.  $\mathcal{T}$

11. *alsaticum*, fol. pinnatifidis: laciniis trifidis obtusiusculis, involucro polyphylo. Jacq. austr. t. 70. Hab. in Alsaciae, Austriae, Palatinatus dumetis humidiusculis. Petala lutea.  $\mathcal{T}$

12. *aureum*, fol. tripartitis, foliolis caulinis linearilanceolatis, radicalibus

oblongis multifidis. Ait. Kew. 1. p. 341. Hab. in Canariis. ♂

13. *nodosum*, foliolis alternatim multifidis, caul. nodoso. L. Hab. in Creta.

14. *geniculatum*, fol. subrotundo reniformibus crenatis. Forst. prod. Hab. in Nova Zeelandia.

690. **CRITHMUM. Involucr.** polyphyllum. *Fructus* ovalis, compressus. *Flosculi* aequales.

1. *maritimum*, fol. lanceolatis carnosis. L. Jacq. hort. 1. 187. Hab. ad maris litora. ♀

2. *latifolium*, fol. cuneiformibus fissis. Ait. Kew. 1. p. 342. C. fol. pinnatis, foliolis sessilibus obovatis lobatis, lobis dentatis. Linn. suppl. 180. Hab. in maritimis Teneriffae et Salvages. Sesquipedale. Flor. lutei. ♂

3. *canariense*, fol. carnosis bipinnatis basi ample vaginantibus. Cav. in Annal. d. scientias natur. p. 35. Hab. prope Teneriffae.

691. **CACHRYS. Involucra** polyphylla. *Fruct.* magnus subovatus, angulatus aut laevis, suberoso-corticatus.

1. *odontalgica*, fol. radicalibus supradecompositis tomentoso-canis, caule nudo umbellifero, seminibus cortice suberoso laevissimo. Linn. suppl. 181. Willd. Sp. p. 1409. Pall. it. 3. app. n°. 75. t. 9. f. 1. 2. 3. Hab. in desertis Sibiriae inter Wolgam et Jaicum. Radix longissima saporis acerrimi unde gaudet vi sialogoga. L. ♀

2. *Libanotis*, fol. bipinnatis, pinnis oppositis linearibus subpungentibus, seminibus sulcatis glabris. Vahl. symb. 3. p. 49. C. semine fungoso sulcato plano minore. fol. Peucedani angustis. Moris. s. g. t. 1. f. 6. Umb. t. 3. f. 3. Hab. in Sicilia. ♀

3. *laevigata*, fol. supradecompositis ferulaceis, laciniiis setaceis brevibus, seminibus laevibus non sulcatis glabris. Lam. enc. 1. p. 256. C. peucedanoides. Desf. Atl. 1. p. 250. C. Morisoni. Vahl. Willd. p. 1409. C. semine fungoso laevi, fol. ferulaceis. Moris. umb. 63. t. 3. f. 1. Hab. in Hispania, Gallia australi, Italia et Algeriae agris. ♀

4. *humilis*, fol. supradecompositis glabris: foliolis linearibus trifidis mucronatis, seminibus glabriusculis. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 119. Hab. prope Cap Spartel.

5. *microcarpos*, fol. tripartito-decompositis: foliol. setaceis, seminibus glabris: striis crenatis. Tableau de la mer Caspienne. n°. 9. Moris. s. g. t. 1. f. 1. Hab. ad margines lapidosus rivorum in montosis inter Kubam et Schamachiam. ♀

6. *sicula*, fol. (glaucis) pinnatis: foliolis linearibus acutis divaricatis, seminibus ovatis sulcatis hispidis. Moris. s. g. t. 1. f. 3. Umb. t. 3. f. 2. Boec. sic. 37. t. 18. Hab. in Sicilia, Hispania et Barbaria. Semina crassissima, sulcata, hispida. ♀

7. *taurica*, fol. bipinnatis, foliolis linearibus acutis, seminibus sulcatis suberculatis. Willd. Hab. in Tauria, inque Sibiria. Sem. triplo minora quam in praecedentibus. Planta dioica W.

8. *cretica*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis serratis, seminibus sulcatis asperis. Lam. enc. 1. p. 257. C. cretica Angelicae folio asphodeli radice. Tournef. cor. 23. Hab. in Creta. ♀

9. *panacisfolia*, fol. pinnatis ternatisque, foliolis oblongis crenatis villosis, seminibus hirsutis. Vahl. symb. 1. p. 25. C. pastinacea. Lam. enc. 1. p. 257. C. tomentosa. Desf. Atl. 1. p. 249. Moris. s. g. p. 267. t. 1. f. 4. C. ungarica panacis folio. Tournef. ins. 325. Boec. sic. 1. t. 1. Hab. in Castilia nova, Sicilia, Barbaria. ♀

10? *crispa*, fol. multifidis, dichotomis foliol. linearibus, caul. humili subdichotomo, sem. alis tennibus undulato-crispis. Hab. ... Ex hort. b. Monnieri Versaliensi. Pulchra. Cor. lutea. Sem. parvula, oculo nudo scabra. An Laserpitium?

692. **FERULA. Involucr.** universale caducum; partiale polyphyllum. *Fructus* ovalis, compresso-planus, striis utrinque 3. (Caul. ut plurimum altissimus.)

1. *communis*, foliolis linearibus longissimis simplicibus. L. Willd. p. 1411. Desf. Atl. 1. p. 251. Moris. s. g. t. 15. f. 3. Hab. in Europa australi et in Barbaria. cfr. Lam. enc. 2. p. 454.

2. *sibirica*, foliolis lineari-lubulatis teretibus, involucro universali nullo. Willd. Pall. itin. 2. app. n°. 102. t. N. Hab. in Sibiriae locis arenosis humidiusculis. ♀

3. *glauca*, fol. supradecompositis: foliolis lanceolato-linearibus planis subtus glaucis. L. Hab. in Sicilia, Italia. ♀

4. *rablensis*, fol. subquadripinnatis, foliolis linearibus planis angustissimis trifidis

simplicibusque. Wulf. Jacq. Coll. 4. p. 312. Hab. in Carinthia. ¶

5. *tingitana*, fol. lacinialis : lacinulis tridentatis inaequalibus nitidis. F. folio laetissimo lucido. Herin. par. 165. t. 165. Moris. s. g. t. 15. f. ult. Hab. in Hispania, Barbaria. Fol. uti in Apio Petroselino. Lam. enc. ♂

6. *Ferulago*, fol. pinnatifidis : pinnis linearibus planistrifidis. L. Desf. Atl. p. 251. Moris. s. g. t. 15. f. 1. Hab. in Sicilia et Barbaria.

7. *orientalis*, foliorum pinnis basi nudis, foliis setaceis. Hort. Tournef. itin. 3. p. 239. t. 239. Hab. in Oriente.

8. *Meoides*, foliorum pinnis utrinque appendiculatis, foliis setaceis. Lin. Laserpitium orientale, folio mei, flore luteo. Tournef. cor. 23. Hab. in Oriente.

9. *nodiflora*, fol. linearibus angustissimis, umbell. pedunculatis ad nodos verticillatis. Lam. enc. 3. p. 456. Moris. s. g. t. 15. f. 1. Jacq. austr. 5. appot. p. 28. Barrel. ic. t. 835. Hab. in Carn. et Europ. meridionali.

10. *sulcata*, foliol. linearibus, umbell. primordiali sessili lateralibus brevioribus, sem. longe ellipticis profunde sulcatis. Desf. Atl. t. 253. p. 67. Hab. in Algeriae collib. incultis. Priori affinis. ¶

11. *canadensis*, lucida canadensis. Lin. Hab. in Virginia. ¶ +

12. *Asafoetida*, foliis alternatim sinuatis obtusis. L. Kaempf. amoen. 535. t. 536. Phil. transact. v. 75. an. 1785. Hab. in Persia. Olor alliaceus. Rad. succus condensatus sub nomine indito notus. ¶

13. *persica*, fol. supradecompositis, fol. multifidis crenis decurrentibus, umbella primordiali sessili. Willd. Hab. in Persia. ¶

693. **LASERPITIUM.** Fructus oblongus : angulis membranaceis. Petala inflexa, emarginata, patentia.

1. *latifolium*, fol. oblique cordatis dentatis, dentibus mucronatis, seminum alis crispis. Willd. p. 1414. Jacq. aust. t. 146. L. foliis oblique cordatis crenatis, crenis mucronatis, umbella alba. Lam. enc. 3. p. 421. Moris. s. g. t. 19. f. 1. Hab. in Europ. memoribus siccis. ¶

2. *Libanotis*, fol. ovatis serratis, terminalibus inciso-lobatis, sem. alis laevibus. Willd. L. umb. purpurea. Lam. l. c. Riv. t. 21. Moris. s. g. t. 19. f. 6. Hab. in Italia. ¶

3. *capense*, foliolis ovatis integris mucronatis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei.

4? *trilobum*, foliolis trilobis incis. L. Pluck. phyt. 223. s. 7. Hab. in Gargano monte, foliola basi cordata. ¶

5. *aquilegifolium*, foliolis obtusis basi ovatis lobatis. Jacq. aust. 2. t. 147. Hab. in collibus saxosis Austriae. Fructus alis membranaceis brevibus quinis instructa, interjectis quatuor angustioribus. Jacq. Fruct. oblongo-ellipticus, costatus apterygius : Siler aquilegifolium. Gaertn. de fr. t. p. 92. t. 21. ¶

6. *gallicum*, foliolis cuneiformibus trifidis, laciniiis oblongis obtusiusculis, apice calloso-mucronatis. Willd. Pluck. phytog. t. 198. f. 6. Hab. in Europa australi. ¶

7. *angustissimum*, foliolis cuneiformibus tri-quinquesfidisque, laciniiis lanceolatis acuminatis. Willd. p. 1416. Hab. in Europa australi?

8. *triquetrum*, fol. ovato-oblongis aut elato-pinnatifidis, foliol. ovato-lanceolatis serratis, petiolis late membranaceis. Vent. Hort. Cels. p. 97. t. 97. Hab. Constantinopoli. Succo gummi-resinoso scatet. ¶

9. *formosum*, foliol. pinnatifidis, laciniiis linearibus cuspidato-mucronatis. Willd. L. c. Pluck. phytog. t. 199. f. 1. Hab. in Europa australi. ¶

10. *angustifolium*, foliolis lanceolatis obtusis mucronatis integerrimis sessilibus. Moris. s. g. t. 19. f. 9. Pluck. alm. 205. t. 198. f. 4. Hab. in Europa australi. ¶

11. *aureum*, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis sessilibus, terminalibus bi-trifidisque. Willd. Tournef. cor. 23. Hab. in Oriente.

12. *prutenicum*, hispidum, foliolis lanceolatis integerrimis : extimis coalitis. Jacq. austr. t. 153. Rivin. pent. t. 23. Hab. in Borussia, Germania, Austria. Involucr. reflexa. ¶

13. *dauricum*, foliolis pinnatifidis, laciniiis linearibus, involucrio universali polyphyllo pinnatifido, caule maculato. Willd. Jacq. hort. 3. t. 38. Ligusticum ferulaceum. Allion. ped. n°. 1319. t. 60. f. 1. Hab. in Sibiria et in alpinis Italiae. ¶

14. *silaifolium*, foliolis pinnatifidis, laciniiis lanceolatis, involucrio universali subnullo, caule glabro. Willd. Jacq. austr. app. t. 44. Hab. in Carnioliae et Austriae saxosis asperis. ¶

15. *Aciphylla*, caule vaginato, petiolis foliorum dilatatis, fol. digitatis linearibus elongatis mucronatis. Linn. suppl. 181. *Aciphylla squarrosa*. Forst. char. gen. p. 135. t. 68. Hab. in Nova Zeelandia.

16. *peucedanoides*, foliolis linearilanceolatis venosis striatis distinctis. Jacq. ic. 2. t. 350. Jacq. Collect. 1. p. 220. Seg. veron. 3. p. 227. t. 17. Pluck. alm. t. 66. f. 1.  $\beta$ . Foliolis linearibus angustissimis. W. Hab. in Baldi Carnioliae et Croatiae alpinis. Rad. crassa.  $\overline{\text{L}}$

17. *Siler*, foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. L. Jacq. austr. t. 145. *Siler montanum*. Moris. s. g. t. 3. f. 1.  $\beta$ . *Siler angustifolium*. Bauh. pin. 162. Moris. l. c. f. 2. Hab. in Austria, Helvetia, Gallia.  $\overline{\text{L}}$

Obs. Sem. sulcata absque membranulis. L. Alae sem. angustissimae. Lam.

18. *Archangelica*, fol. decompositis, foliolis ovatis bi-trifidis dentatis subtus hirsutis. Willd. Jacq. ic. s. g. t. 58. Coll. 1. p. 214. Dougl. pempt. 3. g. t. 3. 8. Hab. in rupetribus umbrosis Carnioliae, Croatiae.  $\overline{\text{L}}$

19. *Chironium*, foliolis oblique cordatis, petiolis hirsutis. Blackw. t. 434. Moris. s. g. t. 17. f. 1. Hab. Monspelii.  $\overline{\text{L}}$  +

20. *lucidum*, foliis supradecompositis linearibus subulatis glabris, involucri universalibus pinnatis. Ait. Kew. 1. p. 345. Hab. in Helvetia.  $\overline{\text{L}}$

21. *serulaceum*, fol. supradecompositis, foliolis linearibus. L. Tournet. it. 2. p. 111. et t. 121. Hab. in Oriente.  $\overline{\text{L}}$

22. *hirsutum* (*Halleri*), fol. supradecompositis hirsutis, foliolis multifidis, involucri polyphylli fol. margine membranaceis apice ciliatis. Willd. L. fol. subhirsutis quadripinnatis circumscriptione triangularibus, foliolis parvis multipartitis. Lam. enc. 3. p. 424. L. Halleri. Allion. pedem. n°. 1315. Vill. delph. 2. p. 625. L. Panax. Gouan. illust. 13. Hall. helv. n°. 795. t. 19. Hab. in alpinibus. Distinctum a *Thapsia Asclepium*.  $\overline{\text{L}}$

23. *scabrum*, fol. supradecompositis scabris, foliolis elongato-tridentatis, vaginis petiolorum dentatis laxis, involucri polyphylo. Willd. Car. ic. 2. p. 72. t. 190. Hab. in Hispania. Simile praecedenti. Stylis decidui.  $\odot$

24. *Thapsioides*, glabrum, fol. multifariam decompositis, foliolis rigidulis nitidis subulatis. Desf. Atl. 1. p. 252. Hab. in Atlantico. Cor. lutea. Sem. crassa.  $\overline{\text{L}}$

25. *Meoides*, caul. glabro, petiol. hispidis, fol. multifariam decompositis, folior. confertis aciformibus. Desf. l. c. p. 253. J. B. hist. 3. p. 37. Hab. in monte Lazar Algeriae. Fol. maxima denso caespite. Cor. lutea. Umb. laterales primordiali longiores.  $\overline{\text{L}}$

26. *Daucoides*, glaberrimum, fol. imis bipinnatis : caulinis pinnatis, foliolis linearibus, sem. alis denticulatis. Desf. Atl. l. c. t. 20. *Caucalis virgata*. Poir. it. 153. In Barbariae maris littoribus. Umb. fructifera excavata.

27. *Fontanesii*, glabrum, caul. sublichotomo, fol. inferioribus longe petiolatis : foliolis angusto-linearibus, umbellulis distinctis. L. *peucedanoides*. Desf. p. 255. t. 71. Hab. in arvis prope Shibam.

28. *gummiferum*, glabrum, fol. planis, foliolis angustis rigidulis, umbell. hemisphaericis distinctis, cor. candidis. Desf. l. c. t. 72. L. *Thapsiaeforme*. Botero Phytogr. Lusit. n°. 19. t. 205. Hab. in Barbaria et Lusitania in cultis aridis. Rami succum glutinosum et graveolentem fundunt. D.

29. *polygamum*, fol. pinnatis, foliolis pinnatifidis brevibus, umbel. polygama, seminib. coronatis. Lam. enc. 3. p. 425. Grec. in Barbaria. Poir. Habitus Selini, cal. Oenanthis, et semina Laserpitii. Stylis longi persistentes. L.

30. *simplex*, scapo nudo apophyllo simplici, fol. pinnatis multifidis acutis linearibus, umb. semiglobosa. Lin. Jacq. Misc. 2. t. 2. Ligusticum. Vill. Delph. t. 14. Allioni. t. 71. Hab. in Alpibus.  $\overline{\text{L}}$

694. HASSELIQUISTIA. Cor. radiatae, disci masculae s. abortivae. Petala incurvato-bifida. Sem. nimbellae exteriora orbiculata crenata, interiora haemisphaerica urceolata.

1. *aegyptiaca*, fol. pinnatis : foliolis pinnatifidis. Lin. suppl. p. 179. Willd. Sp. p. 1379. Jacq. hort. t. 87. Hab. in Arabia Aegyptio. Caul. teres, villosus. L.  $\odot$

2. *cordata*, fol. inferiorib. ternatis foliol. ovatis crenatis, superiorib. cordatis simplicibus. Lin. Jacq. hort. 2. p. 91. t. 193. Hab. ... Caul. flexuosus.  $\odot$

Obs. Genus sequenti nimis affine.

695. TORDYLIUM. Cor. radiatae, omnes hermaphroditae. Fructus suborbiculatus, margine callosus,

crenatus aut laevis planus. In  
volucra (longa) indivisa.

1. *syriacum*, involucris umbella longioribus. L. Willd. p. 1381. Hab. in Syria. ☉

2. *officinale*, involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. L. Hab. in Anglia, Narbona, Italia, Sicilia. Flor. carnei.

3. *peregrinum*, seminibus sulcatis rugosis plicatis, involucrio universaliter monophylla subtrifido. Caulalis hispanica. Cam. hort. 37. t. 11. Hab. in Oriente. D.

4. *apulum*, umbellulis remotis, fol. pinnatis : pinnis subrotundis laciniatis. Jacq. hort. t. 53. T. apulum minimum. Column. ecphr. t. p. 122. t. 124. Hab. in Italia, Apuliae incultis.

5. *maximum*, umbellis confertis radiatis, foliolis lanceolatis inciso-serratis. L. Jacq. austr. t. 142. Hab. in ruderatis, sepibus. ☉

6. *sisifolium*, umbellis confertis radiatis, fol. pinnatis, foliol. oblongis serratis. Scop. Car. p. 164. t. 8. Willd. p. 1383. Hab. in Carniolae alpinis. Petala rubra.

7. *humile*, fol. inferioribus pinnatis : foliol. lobatis incisissimis, caul. inferne piloso, involucr. minimis setaceis, sem. margine crenatis. Desf. Atl. l. p. 235. t. 58. Hab. in Tunetia inter segetes prope Hamamelif.

8. *absinthifolium*, incanum, fol. decompositis : foliolis cuneiformibus trifidis, cor. subuniformibus, fructu villosulo. Vent. Choix de Pl. p. 22. t. 22. sub Heracleo. Hab. in Oriente, Persia. Involucr. parva, aequalia.

696. **HERACLEUM**. *Fructus* ellipticus, emarginatus, compressus, striatus, marginatus. *Cor.* difformis, inflexo-emarginata. *Involucrum* caducum.

1. *Sphondylium*, fol. pinnatis, foliolis quinis oblongis pinnatifidis acutis dentatis, cor. subuniformibus. Willd. Sp. p. 1421. Blackw. t. 530. Sphondylium. Riv. t. 4. Hab. in pratis, ad vias. ☉

2. *flavescens*, fol. pinnatis, foliolis quinis oblongis pinnatifidis acuminatis dentatis, margine scabris, floribus radiatis. Willd. l. c. H. angustifolium. Jacq. aust. 2. p. 46. t. 173. Hab. in Austria. ☿

3. *angustifolium*, fol. cruciato-pinnatis : foliolis linearibus, cor. flosculosis. (β. *lon-*

*gissolium*, folior. pinnis longissimis. Jacq. aust. 2. p. 46. t. 174. Hab. in Suecia, Anglia, Germania. Flor. uniformes. ☿

4. *elegans*, foliolis decussive pinnatifidis dentatis. Willd. p. 1422. Jacq. aust. 2. p. 175. Hab. in Austria. ☿

5. *sibiricum*, fol. pinnatis : foliolis quinis : intermedii sessilibus, coroll. uniformibus. L. Gmel. sibir. 1. p. 128. t. 50. Hab. in Sibiria. Caul. profunde sulcatus, hispulus. Folior. vaginae basis barba alba densa. ♂

6. *Panaces*, fol. pinnatis : foliolis quinis : intermedii sessilibus, flor. radiatis. Hab. in Apenninis, Sibiria. Fol. subtus tomentosa, et pedunc. laeves nec scabris.

7. *tuberosum*, fol. pinnatis, foliolis septenis, floribus radiatis. Molina Chil. ed. germ. p. 115. Hab. in Chili, in collibus arenosis. ☿

8. *austriacum*, fol. pinnatis utrinque rugosis scabris, flor. subradiatis. Jacq. austr. t. 61. Hab. in Austriae alpinis. ☿

9. *lanatum*, fol. ternis petiolo nervisque subtus lanato-villosis : foliolis amplis subrotundo - cordatis, subpalmato - lobatis, fruct. orbiculatis. Michaux. Flor. t. p. 166. Hab. in Canada.

10. *alpinum*, fol. simplicibus cordatis obsolete lobatis serratis. Willd. Sphondylium fol. subrotundis glabris, obtuse semitriobis. Hall. helv. n. 810. Barr. ic. 55. Hab. in Helvetiae alpinis. Scapus nudus. Fol. Ficus. L. ☿

β. *pyrenaicum*, fol. simplicibus cordato-palmatis, subtus tomentosis, fruct. orbicularibus. Lam. enc. 1. p. 403. Hab. in Pyrenaeis. †

11. *pumilum*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis glabris, caule prostrato. Vill. delph. 2. p. 640. t. 14. H. minimum. Lam. enc. 1. p. 403. Hab. in alpinis Delphinatus. ☿

697. **LIGUSTICUM**. *Fructus* oblongus, 5-sulcatus utrinque. *Corol.* aequales. *Petala* involuta integra. *Cal.* 5-dentata.

1. *Levisticum*, fol. magnis multiplicibus : foliolis superne incisissimis. L. Blackw. t. 275. Willd. p. 1424. Moris. s. 9. t. 3. f. 1. Angelica palustri-folia. Lam. enc. 1. p. 173. Hab. in Apenninis Liguriae. ☿

2. *scoticum*, fol. biternatis, foliolis subrhombicis inciso-serratis. Flor. den. t. 207.

*Michaux.* t. p. 166. *Legltf.* p. 159. *Pluck.* alm. t. 96. f. 2. *Angelica scotica.* Lam. l. c. *Hab.* ad littora maris in Anglia, Scotia, Succia, Dania, Canada. *Aromaticum.* ¶

3. *aquilegifolium*, fol. triternatis, foliolis trifidis dentatis, stylis divaricatis persistentibus. Willd. p. 1425. *Danaa aquilegifolia.* Allion. pedem. n°. 1392. t. 63. *Hab.* in saxosis apricis Taurinensium. ¶

4. *petioponense*, fol. multi, licato-pinnatis. foliolis pinnatis incis. Jacq. aut. 5. p. 33. app. t. 13. *Athamanta Golaka.* Haecquet. carniol. p. 14. t. 5. *Hab.* in Petioponensiis, Carniolicis, Rhæticis et Gehennicis montibus nemorosis. Fol. maxima. Caul. 3-4-pedalis. ¶

5. *cicutæfolium*, fol. decompositis: foliol. obtusis uninerviis, ramis divaricatis. Vill. Delph. 2. p. 612. t. 15. L. apioites. Lam. enc. 3. p. 577. Till. Pis. p. 98. t. 39. f. 2. *Hab.* in sylvaticis apricis Delphinatus. Facie Oreosolini. Petala alba.

6. *austriacum*, fol. bipinnatis: foliolis confluentibus incis integerrimis. Jacq. austr. t. 151. Allion. pedem. t. 43. L. Gmelini. Vill. delph. 2. p. 610. t. 13. *Hab.* in Italiae, Galliae, Austriae, Silesiae alpinis. ¶

7. *cornubiense*, fol. radicalibus decompositis incis, caulinis ternatis lanceolatis integerrimis, seminum sulcis obsoletis. Smith. ic. pict. pl. rar. fasc. a. p. 11. t. 11. Ej. Brit. 1. p. 310. Petiv. herb. brit. 26. f. 9. *Hab.* in Cornubia (Cornwal in Anglia) dumetis et ad sepes. Rad. resina flava scatet. S.

8. *pyrenaeum*, fol. supradecompositis, foliolis pinnatifidis, lacinii linearibus mucronatis, involucri universali subnullo deciluo, costis seminum membranaceis glabris. Willd. Gouan. illust. p. 14. t. 6. f. 2. *Hab.* in Pyrenaeis; etiam in montibus Vogesiensibus lectum a D. Nessler. ¶

9. *candicans*, fol. supradecompositis, foliolis cuneiformibus incis glabris, involucri universali diphylo subfoliaceo, costis seminum membranaceis glabris. Ait. Kew. 1. p. 348. *Hab.* . . . ¶

10. *peregrinum*, umb. primariae involucri subnullo, lateralium basi membranaceo: radiis subramosis. Jacq. hort. 3. p. 13. t. 18. *Apium hortense magnum*, petroselinii sapore. Bauh. hist. 3. p. 99. *Hab.* in Lusitania. Conf. cum n°. 6. Folia tripartita: lacinii cuneatis incis glabris petroselinii, sed majoribus. Petioli lateribus membrana alba. L. Pet. flavescentia. ¶

11. *balearicum*, fol. pinnatis: foliolis infinis acie foliolo. L. *Hab.* in Balearibus, Ruae. ¶

12. *Gingidium*, fol. pinnatis, foliolis rhombico-cordatis obliquis crenatis obtusis. Forst. prod. 140. *Gingidium montanum.* Forst. char. gen. 41. t. 21. *Hab.* in montibus Novae Zeelandiae.

13. *longifolium*, fol. biternatis, radicalibus decompositis, foliolis lineari-lanceolatis integerrimis. Willd. p. 1428. Moris. 6. 9. t. 15. f. 1? *Hab.* in Sibiria. ¶

14. *actææfolium*, fol. duplicato-tripartitis, foliolis ovalibus aequaliter dentatis, involucri setaceis, fruct. subalato-costatis. Michaux. L. c. Cresc. ad ripas flum. St. Laurentii.

15? *barbinode*, caul. laevi: nodis barbatis, fol. biternatis (plerisque), fruct. ovalibus margine utroque subdipertis. Mich. p. 167. *Hab.* in Carol. superiore.

16. *pusillum*, annuum, fol. biternatis multipartitis, umbellulis 3-5-floris, fruct. subscabris. Michaux. Flor. 1. p. 168. *Hab.* in sabulosis aridis Carolinae.

17? *bulbosum*, pusillum, radice globosa, caul. debili diphylo, fol. laterali tripartito, pinnulis divisis. Michaux. p. 168. *Hab.* ad ripas prope Knoxville. Martio solo nivoso floret. M. An distinctum genus?

998. *ANGELICA.* Fructus subrotundus, solidus, utrinque 3-alat. stylis reflexis. Cor. aequales: petalis incurvis.

1. *Archangelica*, foliorum impari lobato. Flor. dan. t. 206. Blackw. t. 496. Willd. Sp. 2. p. 1428. *Hab.* ad rivulos. ¶

2. *sylvestris*, foliolis aequalibus ovato-lanceolatis serratis. Habit. in subhumidis sylvaticis. Caul. laevis rore cæcio. ¶

3. *Razoulii*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis serratis decurrentibus. Gouan. illust. 13. t. 6. Vocc. mus. tab. 99. *Hab.* in Pyrenaeis. ¶

4. *verticillaris*, fol. divaricatis: foliolis ovatis serratis, caule pedunculis verticillato. Jacq. hort. t. 130. *Hab.* in Italia? Caul. humanæ altitudinis et ultra, rore glaucescente. ¶

5. *atropurpurea*, extimo foliorum pari coadunato: foliolo terminali petiolato. L. Corn. canad. 198. t. 199. Lam. enc. 1. p. 172. *Hab.* in Canada. Caul. atropurpureus. Pe-

tala extus ferruginea, intus purpurascens. Flor. parvi viridi-rubicundi. Lam.  $\overline{\text{T}}$

6. *triquinata*, foliolis inciso-dentatis: imperi rhombeo sessili, lateralibus decurrentibus. Michaux. t. p. 168. Hab. in Canada. Petiol. 3-partitus.

7. *lucida*, foliolis aequalibus ovatis inciso-serratis. Jacq. hort. 3. p. 16. t. 24. Corn. canad. t. 197. Moris. s. g. t. 3. f. 8. Hab. in Canada.  $\overline{\text{J}}$

699. SIUM. Fructus subovatus, compressus, striatus. Involucrum polyphyllum. Petala cordata.

1. *filifolium*, fol. filiformibus, involucri conatis. Thunb. prod. 50. Willd. p. 1431. Conium tenuifolium. Vahl. symb. 3. p. 49. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *latifolium (sulcatum)*, caul. elongato sulcato angulato, fol. pinnatis: foliolis lanceolatis aequaliter serratis, umbella terminali. L. Hort. cliff. 38. Flor. Jacq. austr. t. 66. Engl. bot. t. 206. Willd. 2. p. 1431. Hab. in rivulis paludosis.  $\overline{\text{T}}$

Obs. Fol. radicalia primo vere sunt supradecomposita et bipinnata, caulina vero et quae aestate gignuntur simpliciter pinnata. Willd. Haec et sequens species plurimum confunduntur.

3. *angustifolium (incisum)*, caul. ramoso striato: fol. pinnatis: foliol. inciso-lobatis umbellis axillaribus pedunculatis, involucri universali pinnatifido. Jacq. aust. t. 67. Engl. bot. t. 139. S. nodiflorum. Flor. dan. t. 247. Hab. in aquosis. Involucr. etiam integrum.

Obs. Nomen triviale Lin. hujus et prioris speciei mutari debet, cum ab omnibus fere auctoribus haec duae plantae ob nomina haec incongrua commutentur.

4. *nodiflorum*, (Aelile), caul. procumbente, fol. pinnatis: fol. ovatis umbellis axillaribus sessilibus. Moris. hist. s. g. t. 5. f. 3. Hab. ad ripas fluviorum. Involucrum saepe deest, aut 1-phyllum.

5. *repens*, caule repente, foliolis subrotundis dentato-angulatis. Jacq. aust. 3. p. 34. t. 260. Hab. in pratis humidis et inundatis.

Obs. Sison *inundatum* huic simile sed in S. repente, folia sunt latiora obtusiora uniformia, et umb. quadriradiatae involucri universali instructae. Willd. p. 1433.

6. *Sisarum*, fol. pinnatis: fol. floralibus ternatis. L.  $\beta$ ? *Ninsi*, fol. serratis pinnatis, rameis ternatis, caul. bulbifero. Lam. enc. 1. p. 405. Burm. ind. t. 29. f. 1. Blackw. t. 514. Kaempf. amoen. 817. t. 818. Hab. in China.  $\overline{\text{T}}$

7. *rigidus*, fol. pinnatis: foliolis lanceolatis subintegerrimis. Moris. s. 11. t. 7. f. 1. Hab. in Virginia. Caul. rigidulus, et Foliola.

8. *lineare*, fol. pinnatis: foliol. sublan- ceolato-linearibus subseratis. Michaux. Flor. p. 167. In aquosis Canadae. Priori affine. Involucr. oligophyllum. Umb. radiis brevibus. M.

9. *japonicum*, fol. pinnatis, foliolis incisis, umb. terminalibus. Thunb. jap. 118. Hab. in Japonia. Caul. flexuosus. Fol. infima maxima. Th.

10. *Falcaria*, foliolis linearibus decurrentibus connatis. Jacq. austr. t. 257. Falcaria. Riv. pent. t. 47. Moris. s. g. t. 8. f. 1. Hab. in agris, inter segetes.

Obs. A nonnullis auctoribus distinctum genus haec ex specie conficitur.

11. *grandiflorum*, fol. bipinnatis, foliolis subrotundis inciso-dentatis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei.

12. *paniculatum*, fol. bipinnatis, foliolis linearibus inciso-pinnatifidis. Hab. ad Cap. b. spei.

13. *patulum*, fol. bipinnatis, foliolis trifidis, ramis diffusis. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *graecum*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis serratis summis confluentibus. Willd. Ligusticum graecum, folio aii. Tournef. cor. 23. Hab. in Graecia. Flor. lutei.

15. *decumbens*, fol. bipinnatis, foliolis trifidis, caule decumbente. Thunb. jap. 118. In Japonia.

16. *siculum*, fol. radicalibus ternatis, caulibus bipinnatis. Jacq. hort. t. 133. Zan. hist. 78. t. 128. Hab. in Sicilia, et in colli- bus Algeriae. Petala lutea.  $\overline{\text{T}}$

17. *asperum*, fol. tripinnatis, pedunc. pedicellisque scabris. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei, cum a sequentibus.

18. *hispidum*, fol. tripinnatis, petiolis pedunculisque scabris. Thunb.

19. *villosum*, fol. tripinnatis, laciniae ovatis inciso-serratis villosis. Thunb.



700. **SISON.** *Fructus* ovatus, striatus. *Involucra* sub-4-phylla.

1. *trifoliatum*, fol. omnibus trifoliatis: foliol. dentatis: inferiorib. ovalibus dentatis, pedunc. geminis, fructib. oblongis, Michaux. Fl. p. 168. In Canada superiore.

2. *marginatum*, fol. pinnatis, superioribus quinatis: foliol. sessilibus lanceolatis integerrimis, involucr. nullis, Michaux. Hab. in udis Carolinae.

3. *Amonum*, fol. pinnatis, umbellis erectis. L. Jacq. hort. 3. t. 17. Blakw. t. 442. Willd. Sp. 2. p. 1436. Sium aromaticum. Lam. enc. 1. p. 405. Hab. in Galliae, Angliae lutosus et in Carniolia. Umb. universalis 4-fida, radio quarto centrali. L. ☉

4. *segetum*, caul. junceo, fol. pinnatis, umbellis cernuis. Jacq. hort. t. 34. Engl. bot. t. 228. Smith. brit. 1. p. 316. Hab. in Angliae agris et in Helvetia, in solo lutoso calcareo subhumido. Sm. ☉

5. *Ami*, fol. tripinnatis: radicalibus linearibus: caulinis setaceis: stipularibus longioribus. Hab. in Lusitania, Apulia, Aegypto. Fol. radicalia linearia, supra-lecomposita, plana: foliolis replicato-imbricatis. L. ☉

6. *inundatum*, repens, umbellis bifidis. Flor. dan. t. 89. Sium tol. radicalibus capillaribus multifidis, caulinis pinnatis, ultima pinna trilobata. Hall. helv. n. 780. Hydrocotyle inundatum. Smith. brit. 1. p. 290. Moris. 2. g. t. 9. f. 5. ☐. Fol. omnibus capillaceis, caul. suberecto. Schumacher Zaeclaud. 1. p. 90. Hab. in inundatis. ☉

7. *verticillatum*, foliolis verticillatis capillaribus. L. Light. scot. 2. t. 35. Sium verticillatum. Smith. brit. 1. p. 314. Engl. bot. t. 395. Moris. Sect. 3. t. 7. f. 10. Hab. in Anglia, Gallia, in Pyrenaeis, in pratis humidis salis.

8. *salsum*, fol. radicalibus compositis, foliolis subverticillato-fasciculatis lanceolatis, caule aphylo, ramis umbelliferis dichotomis. Lin. suppl. 181. Peucedanum redivivum. Pall. Act. petrop. 1779. 2. p. 252. t. 8. f. 1 - 3. Sium nudicaule. Lam. enc. 1. p. 407. Hab. in Sibiria locis salis limosis aridissimis circa. Wolgam. Fol. evanidis caul. nudus ex ramulis umbelliferis cum bracteis subulatis. ☉

9. *sylvaticum*, fol. radicalibus longe petiolatis decompositis, foliolis tripartitis: lacinis cuneatis incis, caul. subaphyllo.

Brotero Phytogr. Lusit. n. 18. Hab. in Lusitaniae umbriosis.

10. *crinitum*, fol. omnibus tripinnatis capillaribus, involucris decomposito-setaceis. Pall. 1. c. p. 250. t. 7. Hab. in Sibiria. ☉

701. **HUANACA.** *Cal.* denticulis minimis, persistens. *Petala* lanceolata, patentia. *Fruct.* ovatus, acutus, lineis tribus striatus. *Involucr.* universale 2-phyllum, tripartitum longum, parziale polyphyllum.

1. *acaulis*, petiol. elongatis 5-phyllis, fol. setaceis quadripartitis. Cav. ic. 6. p. 18. t. 528. f. 2. Hab. in Americae meridion. partu Descado. Pet. luteo-rubra. Umb. 2. laterales longius pedunculatae, masculae. C.

702. **BUBON.** *Involucra* polyphylla. *Fructus* ovatus, striatus, villosus et glaber.

#### \* Herbacea.

1. *macedonicum*, caul. ramosissimo pubescente, foliolis rhombo-ovatis, incisedentatis, dentibus acuminatis, umb. numerosissimis seminibus birtis. Ait. Kew. 1. p. 351. Willd. Sp. 2. p. 1439. Blackw. t. 382. Hab. in Macedonia, Mauritania et Conchinchina. Umbel. numerosae albae. ☉

2. *rigidius*, glabrum, foliolis linearibus. L. Bocc. Mus. 2. p. 84. t. 76. Barr. ic. 77. Hab. in Sicilia. Flor. flavescentes. Ferulam refert.

#### \*\* Fruticosa.

3. *tortuosum*, caul. fruticoso nodoso, ramis tortuosis divaricatis, involucri minimo, seminib. globosis striatis hirsutis. Desf. Atl. 1. p. 257. t. 73. Hab. in regn. Tunetano prope Kerwan, ubi denso caespite crescit, oloreque aromaticum spirat. D. h

4. *Galbanum*, foliolis ovato-cuneiformibus acutis argute serratis, umbellis paucis, sem. glabris caule frutescente glauco. Ait. Kew. 1. p. 352. Pluck. alm. 31. t. 12. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Umbellae densae, magnae. h

5. *laevigatum*, foliolis lanceolatis obtusissimis et obsoletissimeque crenatis, seminibus glabris, caule frutescente. Ait. Kew. 1. p. 352. Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *gummiferum*, foliolis incis acuminatis inferioribus latioribus, seminibus glabris,

caule frutescente. Ait. Kew. 1. Comm. hort. 2. p. 115. t. 58. Hab. in Aethiopia.  $\mathcal{H}$

703. CUMINUM. *Fructus* ovatus, striatus. *Umbellulae* 4. *Involucra* 4-fida : foliolis simplicibus et trifidis.

1. *Cuminum*. Lin. Cav. ic. 4. p. 36. t. 360. Moris. s. g. t. 2. Fol. laciniae lineares. Hab. in Aegypto, Aethiopia.  $\odot$

704. OENANTHE. *Flosculi* difformes : in disco sessiles, steriles. *Fructus* striatus, retusus, suberoso-corticatus, coronatus calyce et pistillo. (Umbel. globosae.)

1. *fistulosa*, stolonifera, fol. caulinis pinnis filiformibus fistulosis, involuc. universali subnullo. Flor. dan. t. 846. Engl. bot. t. 363. Moris. s. g. t. 7. f. 8. Hab. in Europae fossis et paludibus.  $\mathcal{H}$

2. *crocata*, fol. omnibus multifidis obtusis subaequalibus. *Aeq.* hort. 3. p. 32. t. 55. Hab. in paludibus. Venenata, imprimis radia, succo croceo scaten.  $\mathcal{H}$

3. *prolifera*, umbellularum pedunculis marginalibus longioribus remosis masculis. *Jacq.* hort. 3. p. 35. t. 92. Moris. s. g. t. 7. f. 5. Hab. in Sicilia, Apulia.  $\mathcal{H}$

4. *globulosa*, fol. bipinnatis, fructibus globosis. Gouan. illustr. 18. t. 9. Sem. crassa ovata, vix striata. Desf. p. 258. Hab. in Lusitania et in regu. Tuncetano.  $\odot$

5. *virgata* (stylosa), radicib. tuberosis, foliol. radicalibus argute incisus, ramis virgatis. Poir. it. 2. p. 138. Enc. bot. 4. p. 529. Hab. in Barbaria. Priori affinis. Styli longissimi.

6. *modiflora*, caul. prostrato, fol. bipinnatis planis, umbell. lateralibus, fructu sulcato scabro. Schousb. Maroc. p. 120. Hab. in Barbar. arenosis juxta fluvios. Involucr. univers. subnullum.  $\odot$

7. *peucedanifolia*, fol. omnibus linearibus, radicalibus bipinnatis, caulinis pinnatis, involucro universali nullo, radicem napulis ovatis sessilibus. Poll. pal. n°. 192. Fig. 3. Oen. filipenduloides. Thuill. Hab. in pratis uliginosis. Radices nonnullis in regionib. Gallicis (Anjou) a pueris comeduntur.

8. *pimpinelloides*, foliolis radicalibus cuneatis fissis; caulinis integris linearibus

longissimis, simplicibus. Hacy. earn. 10. t. 3. Hab. Montspeli et in Europa australi.  $\mathcal{H}$

9. *inebrians*, foliorum inferioribus pinnis ovatis, superiorum linearibus, petiolis angulatis. Thunb. prod. 49. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *tenuifolia*, fol. bipinnatis, pinnis linearibus, summis indivisis. Thunb. prod. 49. Hab. ad Cap. b. spei, cum tribus sequentibus.

11. *serulacea*, fol. supradecompositis, pinnulis subulatis sulcatis. Thunb.

12. *interrupta*, fol. interrupte bipinnatis, lacinii incisio-serratis. Thunb.

13. *exaltata*, caule striato, seminibus turbinatis striatis. Thunb. prod. 50.

14. *filiformis*, fol. simplicibus filiformibus retusis, flor. pedunculatis. Lam. ill. t. 283. f. 2. Enc. bot. 4. p. 529. Bah. ad Cap. b. spei. Caul. pedalis, tortuosus, subnudus.

15. *carolinensis*. Oe. *filiformis*, fol. omnibus simplicibus filiformibus fistulosis. Walt. Flor. Carol. p. 113.  $\dagger$

705. PHELLANDRIUM. *Flosculi* disci minores. *Fructus* ovatus, laevis; coronatus perianthio et pistillo.

1. *aquaticum*, caulis foliorumque ramificationibus divaricatis. Flor. dan. t. 1154. Hab. in fossis.  $\odot$

706. CICUTA. *Fructus* subovatus, sulcatus. *Involucr.* o : partiale 3-5-phyllum.

1. *virosa*, umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. Flor. dan. t. 208. Blackw. t. 574. Hab. in paludibus. Fol. pinnata : foliola lanceolata ternata, acute serrata. Rad. tuberosa succo croceo.  $\mathcal{H}$

2. *bulbifera*, fol. foeniculaceis, ramis verticillatis bulbiferis. Michaux. Flor. 1. p. 165. Hab. in Virginiae et Canadae aquis.

3. *maculata*, foliorum serraturis mucronatis, petiolis membranaceis apice bilobis. Pluck. alm. 31. t. 76. f. 1. Hab. in Virginiae aquis.  $\mathcal{H}$

707. ÆTHUSA. *Involucr.* universale o. *Involucella* dimidiata,

3 - phylla, pendula. *Fructus* striatus.

1. *Cynapium*, fol. pinnatis, foliol. pinnatifidis nitidis. Blackw. t. 517. Curt. Flor. Lond. ic. t. 18. Hab. inter olera, et arvis et in montosis. ☉

*Obs.* Planta nociva et fere venenata cum Apio petroselino aut Chaerophyllos. Scand. cerefolio. L. commutari potest sed odore et sapore insipido, praeter notas generis, distinguitur.

708. MEUM. *Cal.* obsoletus. *Petala* inflexa integra. *Involucr.* universale 1-phyllum: partiale paucifolium sublaterale. *Fruct.* elliptico-oblongus utrinque tricostratus.

1. *heterophyllum*, fol. radicalibus pinnatis: foliolis ovatis incis, caulinis multipartito-setaceis, caul. ramosissimo. Moench. meth. p. 86. Aethusa Bunius. Lin. Wi M. p. 1446. Jacq. hort. t. 198. Seseli Bunius. Willd. Delph. 2. p. 588. Moris. s. 9. t. 2. f. 10. Hab. in Pyreneis et in agris Delphinatus. Flor. parvi flavescentes. Fol. inferiora lucida. Caul. ad nados purpurascens.

2. *Mutellina*, caul. subnudo, fol. duplicato-pinnatis, pinnulis semipinnatis: lobulis lanceolatis. Hall. helv. n.º 763, sub seseli. Gaertn. de fruct. 1. p. 106. t. 23. Phellandrium Mutellina. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1444. Jacq. Flor. Austr. 1. t. 56. Hab. in Alpibus. ☿

3. *Athamanta*, fol. omnibus multipartito-setaceis, vaginis petiolorum dilatatis ventricosis, involucrio universali monophyllo. Ait. Kew. 1. p. 354. Aeth. Meum. Lin. Willd. p. 1447. M. athamanticum. Jacq. austr. t. 303. Smith. Flor. brit. 1. p. 309. Ligusticum Meum. Crantz. austr. 308. Roth. germ. II. p. 322. Hab. in alpinis et montosis in pratis.

4? *fatuum*, fol. omnibus multipartito-setaceis, vaginis petiolorum angustis, involucrio universali polyphylo. Ait. Kew. 1. p. 355, sub Aethusa. Hab. . . . ☿ +

709. CORIANDRUM. *Cor.* radiata: *Pet.* inflexo-emarginata. *Involucr.* univ. 1-phyllum; Partialis dimidiata. *Fructus* sphaericus.

1. *sativum*, fructibus globosis. Lin.

Willd. Sp. p. 1448. Engl. bot. t. 67. Hab. in agris. *Cal.* stylique persistentes.

2. *testiculatum*, fructibus didymis. Pluck. alm. 120. t. 169. f. 2. Moris. s. 7. t. 2. f. 2. Hab. in Europae australis agris. *Cal.* et styli decidui. ☉

710. MYRRHIS. Umbella composita. *Involucr.* erecta. *Fruct.* oblongus profunde sulcatus: angulis submembranaceis.

1. *odorata*. Scandis odorata. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1449. Jacq. Flor. austr. append. t. 37. Odorata. Rivini. Pent. t. 57. Chaerophyllum. Lam. enc. 1. p. 681. Hab. in sylvis montosis. Sapor praesertim fructus, qui magnus, anisatus. ☿

711. SCANDIX. Umbella simplex. *Flor.* radiati. *Involucr.* polyphyllum, emarginatum aut pinnato-incisum. *Fruct.* rostro longissimo terminatus, subpilosus.

1. *chilensis*, foliolis integris ovato-lanceolatis. Molina Chil. Willd. Sp. 2. p. 1449. Hab. in regno Chilensi. +

2. *Pecten*, foliolis multifidis seminibus majoribus subglabris. Jacq. Flor. austr. t. 363. Flor. dan. t. 844. Hab. frequens in agris inter segetes. *Involucr.* foliol. emarginata et incisa.

3. *australis*, foliolis multifidis, seminibus rostro attenuato incanis pilosioribus, flor. radiatis. Lin. Anisomarathrum. Col. cephr. 1. t. 90. Hab. in Europa australi et Creta.

*Obs.* Priori similis, pro cuius varietate a nonnullis sumitur, sed omnibus partibus tenuior, nec involucrio ita emarginata.

4? *grandiflora*, umbell. subsexfidis, sem. rostro aciculari hispidulo, petalo exteriori maximo. Lam. enc. 1. p. 686. sub Chaerophyllo. S. sem. pedunculo villosio brevioribus. L. Tournef. cor. 23. Hab. in Oriente.

5. *pinnatifida*, involucrio pinnatifidis, fol. digitatis, laciniis multifidis. Vent. Hort. Cels. p. 14. t. 14. Hab. in Persia, inter Amadam et Therum.

712. OLIVERIA. Umbella simplex. *Involucr.* polyphyllum longius. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 2-partita. *Fruct.* ovato-teres hirsutus.

1. *decumbens*. Vent. Hort. Cels. p. 21.

t. 21. Cresc. circa Bagdad, ubi ab Olivier, entomologo celebri inventa est haec species. Fol. 3-5-fida. Odor fere Thymi. V. ☉

713. **ANTHRISCUS**. Umbella composita a. *Involucella* lanceolata erecta. *Fruct.* ovatus pilis scaber, rostro glabro.

1. *vulgaris*, seminib. ovatis hispidis, caul. laevi, umbel. sublateralibus, petiol. margino villosa-ciliato. Scandix Anthriscus. Län. Willd. Sp. 2. p. 1450. Jacq. austr. t. 154. Caulis scandicina. Roth. germ. 2. p. 312. Chaerophyllum. Lam. enc. 1. p. 606. Hab. in Europ. praesertim australioris aggeribus, ad sepes inter segetes. Vere. ☉

2. *nodosa*, seminib. subcylindricis hispidis, caule hispido, geniculis tumidis. L. Mant. 356. sub scandice. Moris. s. g. t. 10. f. 4. Hab. in Sicilia, Germania et circa Parisios.

3. *trichosperma*, seminib. hirsutissimis pilis semine duplo longioribus. Län. Mant. 67, sub scandice. Hab. in Aegypto. Caul. plures, obliqui. Folia bipinnata, foliolis ovato-lanceolatis, inciso-serratis, margine scabris. Flor. conformes, carnei.

714. **CHAEROPHYLLUM**. *Involuc.* reflexum, concavum. *Petala* inflexo cordata. *Fructus* oblongus, laevis, aut striatus, glaberrimus.

\* *Cerifolium*, seminib. laevibus. *Involucr.* universale passim 1-2-phyllum.

1. *sylvestre*, caule striato, geniculis tumidiusculis, sem. laevibus. Jacq. austr. t. 149. Willd. Sp. 2. p. 1452. Hab. in Europae pomariis et cultis. Magna ramosissima odore tetra. Sem. dein fusca.

2. *verticillatum*, glaberrimum, foliis variis: radicalib. pinnatis: fol. majusculis cordatis subaliquis serratis, ceteris decompositis. Hab. in Europa. Hort. Paris. Praeter fol. radicalia priori simile, sed minus.

3. *sativum*, seminib. laevibus, umbell. lateralib. subsessilibus, involucr. universali foliiformi. Scandix cerifolium. Län. Willd. p. 1450. Blackw. t. 236. Hab. sponte in agris Europae australis, frequens in hortis pro usu culinari ceditur. Sem. nitida, dein nigricantia.

4. *procumbens*, seminib. niidis laevibus, fol. decompositis, caul. procumbente scandix procumbens. Län. Moris. s. g. t. 11. (f. ult.) Hab. in Virginia. Umb. radiis plurimum tribus. Sem. tenuia, nigricantia.

5. *glaberrimum*, fol. radicalibus 2-3-ternatis: foliol. ovatis obtusis; caul. lanceolatis, involucr. submonophyllo, sem. laevibus acutis. Desf. Atl. 1. p. 260. t. 74. sub scandice. Hab. in Atlantae prope Flansen. Umb. fol. oppositae, pedunculatae.

\* \* *Seminib. striatis*. (Chaerophyllum.)

6. *bulbosum*, caule laevi, geniculis tumido, basi hirtio. Jacq. austr. t. 61. Pluck. caltn. 249. t. 206. f. 2. Hab. ad saepes. Radix turbinata s. obovata. Caulis sexpedalis.

7. *aristatum*, caule laevi geniculis tumido, seminibus hirtis biaristatis. Thunb. jap. 119. Hab. in Japonia. Caul. striatus glaber. Involucra subulata. Sem. oblonga, albo-villosa. Th.

8. *temulum*, caule maculato scabro: geniculis tumidis. Jacq. austr. t. 65. Curt. Flor. Lond. ic. Moris. s. g. t. 10. f. 7. Hab. ad arvos, vias et sepes. Umbellae virgines cernuae. Sem. striata. L. ☉

9. *capense*, caule laevi aequali, seminibus sulcatis, foliolis trifidis glabris. Thunb. prol. 51. Hab. ad Cap. b. spec.

10. *scabrum*, caule aequali, foliolis incisus acutis hirtis, pedunc. scabris. Thunb. jap. 119. Hab. prope Jedo in Japonia.

11. *palustre*, fol. tripinnatis laetis, foliol. inciso-serratis, fruct. biaristatis divergentibus. (p. *hirsutum*, fol. hirsutis. Län. Willd. p. 1455. Lam. enc. 1. p. 683. Jacq. austr. t. 148. Moris. s. g. t. 10. f. 6. Hab. in montosis, praesertim ad rivulos.

12. *aromaticum*, caule aequali, foliolis cordatis serratis integris, fructib. biaristatis. Jacq. austr. t. 150. Boec. mus. 2. p. 29. t. 19. (p. *Myrrhis orientalis* angelicae folio tuberosa radice. Tournef. cor. 22. Hab. in Lusatia, Mienia, Austria, Silesia. Fol. Aegopoli Podagrariae. Th.

13. *canadense*, fol. ternatis, foliolis ovato-acutis subincisis. Sison canadense. Län. Willd. p. 1456. Myrrhis canadensis. Riv. pent. t. 53. Gaertn. de fr. t. p. 109. Hab. in Amer. septentrionali. Sem. breviuscula, subobliqua.

14. *Claytoni*, foliol. oblongo-ovalibus subpinnatifido-lobatis, umbella pauciradiata divaricata, fruct. laevigatis. Myrrhis Michaux. Flor. 1. p. 170. Hab. in montib. Alleganiis.

15. *coloratum*, caule aequali, fol. subdecompositis, involucrellis coloratis. L. Jacq. hort. t. 51. Moris. s. g. t. 10. f. 6. Hab. in Illyria. Caul. hirsutus. Involucella ovata,

ovata, acuminata, luteo-colorata ut in Bupleuris. Cor. lutea.

16. *aureum*, caule aequali, foliis incisis, seminib. coloratis sulcatis muticis. Jacq. austr. t. 64. Rupp. jen. 3. p. 282. t. 5. Hab. in Germania, Helvetia. Semina flava sulcis 4, obtusis, remotis.  $\overline{\text{T}}$

17. *arborescens*, fruticosum. L. Syst. 6. Hab. in Virginia. Fol. Chaerophylli sylvestris, ampla, supradecomposita, pinnis patentissimis. L. h. +

715. **IMPERATORIA.** *Fructus* subrotundus, compressus: medio gibbus, margine alato cinctus. *Petala* inflexo-emarginata.

1. *Ostruthium*. L. Blackw. t. 279. Hab. ad radices alpium Helvetiae, Austriae, Alverniae. Fol. ternata, latuscula, serrata. Involucr. uno alterove foliolo tenuissimo.  $\overline{\text{T}}$

716. **SESELI.** *Umbellae* globosae. *Involucr.* foliolo uno alterove. *Fructus* ovatus, striatus.

1. *glifolium*, foliis glififormibus, caule flexuoso erecto. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *pimpinelloides*, caule declinato, umbellis nubilibus nutantibus. L. Meum nutans. Moench. meth. p. 86. Hab. in Europa australiore. Fol. pinnata, pinnis multifidis, segmentis alternis. Caul. primo decumbens, sub florescentia ferme erectus foliolo uno alterove: petiolo membranaceo, spatheiformi. Semina ovalia striis 3, elevatis. Lin.  $\overline{\text{T}}$

3. *leucospermum*, caul. erecto flexuoso fol. setaceis, involucr. submonophyllo, involucl. foliolis basi connatis, radiis umbel. germinibusque tomentosis. Plant. hongar. p. 92. t. 98. Cresc. in montib. apricis calcaeis Budae. Fruct. sulcatus, coronatus. Umbellulae primo nutantes. Rad. resinosa. L. c.

4. *montanum*, petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, fol. caulinis angustissimis. Blackw. t. 426.  $\beta$ . *multicaule*, fol. bipinnatis, foliolis linearibus simplicibus trifidisque, involuclis subulatis. Retz. obs. 3. p. 27. Jacq. hort. 2. p. 59. t. 129. Meum nudicaule. Moench. method. p. 86. Hab. in Galliae, Italiae collibus. Caul. teres laevis. L.  $\overline{\text{T}}$

5. *striatum*, petiolis rameis membranaceis emarginatis, caule striato, pinnis subulatis sulcatis. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *glaucum*, petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris: foliolis singularibus binatisque canaliculatis laevibus petiolo longioribus. Jacq. austr. t. 144. Moris. 3. p. 273. s. g. t. 2, 4. Hab. in Gallia, Austria, Carniolia. Caul. striatus.  $\overline{\text{T}}$

7. *aristatum*, petiolis rameis membranaceis laxis integerrimis, fol. supradecompositis, foliolis lanceolatis aristatis, fructibus ovatis. Ait. Kew. 1. p. 359. Hab. in Pyrenaeis.  $\sigma$

8. *annuum*, petiolis rameis membranaceis ventricosis emarginatis. Jacq. austr. t. 55. S. bienne. Crantz. Villars Delph. 2. p. 585. Moris. 3. s. g. t. 8. Hab. in Pannonia, Gallia, Germania. Caul. subsulcatus. Rad. crassa, non annua. Flor. albicanti-subviolacei.  $\overline{\text{T}}$

9. *Chaerophylloides*, petiolis rameis membranaceis ventricosis integris, caule dichotomo paniculato, fol. supradecompositis glabris. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *Ammoides*, caul. ramosissimo, fol. radicalibus foliolis imbricatis. L. Jacq. hort. t. 52. Hab. in Lusitania, Italia.  $\odot$

11. *tortuosum*, caule rigido divaricato ramosissimo. Oenanthe striata rigida. L. Hort. cliff. Hab. in Europa australi. Var. foliolis cuneatis.  $\sigma$

12. *Turbith*, involuero universali monophyllo, seminib. striatis villosis stylatis. Amoen. acad. 4. p. 310. Hab. in Europa australi.  $\overline{\text{T}}$


13. *Hippomarathrum*, involuclis connato-monophyllis. Jacq. austr. t. 143. Hab. in Austriae, Carnioliae, Germaniae saxis.  $\overline{\text{T}}$

14. *pyrenaeum*, fol. duplicato-pinnatis; foliolis incisis acutis, involuclis setaceis umbellula longioribus. Gouan. illustr. p. 11. Hab. in Pyrenaeis.

15. *Saxifragum*, caule glififormi divaricato, fol. duplicato-ternatis linearibus, umbellis subsexfidis. L. Sp. pl. 374. Pimpinella saxifraga tenuifolia. Bauh. pin. 160? Conf. Vill. Delph. 2. p. 587. Hab. ad lacum Genevensem inque Germania.  $\overline{\text{T}}$  +

16. *elatum*, caule elongato geniculis callosis, fol. bipinnatis: foliolis teretibus, fructibus scabris. Gouan. illustr. 16. t. 8. Hab. in Austria, Gallia. Fruct. perianth. coronatus. Vill. Delph. p. 580.

17. *caruifolium*, fol. bipinnatis, lacin. decussatis linearibus, ramis erectis, seminib.



laevibus. Vill. Delph. 2. p. 586. Hab. in Delphinatu. Involucr. 2-3-phyllum. Involucr. 5-7-phyllum.

717. THAPSIA. (Involucra o.) *Fructus* oblongus, membrana cinctus. *Petala* flava.

1. *villosa*, foliolis dentatis villosis basi coadunatis. Willd. p. 1464. Moris. t. 9. t. 18. f. 3. Hab. in Hispania, Lusitania, Galloprovincia, Ceto Monspelienis. ¶

2. *foetida*, foliolis multifidis basi angustatis. Blackw. t. 459. Moris. s. 9. t. 18. f. 7. Hab. in Hispania. ¶

3? *polygama*, fol. decompositis, foliolis acutis, involucri apice pinnatifido. Desf. Atl. t. p. 261. t. 75. Hab. prope Bone ad littora. Flor. centrales evanidi.

4. *Asclepium*, fol. digitatis, foliolis bipinnatis tetraeco-multifidis. Moris. s. 9. t. 18. f. 6. Colum. ecphr. t. p. 87. t. 65. Hab. in Apulia, Oriente. ¶

5. *garganica*, fol. glabris pinnatis: foliolis pinnatifidis; laciniis lanceolatis. Gouan. illustr. 18. t. 10. Magnol. monsp. t. 286. Hab. in Barbaria, Gargano Apuliae. ¶

6. *foliolata*, fol. ternatis ovatis. Hab. in Virginia.

718. PASTINACA. *Fructus* ellipticus, compresso-planus. *Petala* involuta, integra.

1. *lucida*, fol. simplicibus cordatis lobatis lucidis acute crenatis. Jacq. hort. t. 199. Gouan. illustr. 19. t. 11, 12. Hab. in Europa australi. ¶

2. *sativa*, fol. simpliciter pinnatis. Lin. Willd. Sp. p. 1466. *Pratensis*, fol. pinnatis glabris: foliolis ovato-oblongis inciso-lobatis, exterioribus trilobis. Flor. Dan. t. 1206. P. *sativa*. Mill. dict. Blackw. t. 379. Hab. in pratis.

3. *arvensis*, fol. pubescentibus pinnatis, fol. ovatis sublobatis: impari trilobo. Hab. in agris cultis inter segetes. P. *sativa* quorund. P. *sylvestris*. Mill. ? Videtur distincta species, cum minor sit, fol. minus lobata; etiam loco natali differat.

3. *Opopanax*, fol. pinnatis: foliolis basi antica excisis. L. Gouan. illustr. p. 19. t. 13, 14. Hab. in Italia, Sicilia et Syriat. Petioli subhispidi. ¶

4. *dissecta*, fol. caulinis supradecompo-

siis: rameis subbipinnatis; foliolis dissectis. Vent. Hort. Cels. p. 78. t. 78. Hab. in Oriente. Subpilosa. Involucr. universale. Flor. aurei.

719. SMYRNIUM. *Fructus* subcompressus, gibbosus, (nigrescens) striatus. *Petala* acuminata, carinata.

1. *perfoliatum*, fol. caulinis simplicibus amplexicaulibus, caul. alato. L. Willd. p. 1467. Plant. rar. Hungar. t. 23. Moris. s. 9. t. 4. f. 2. Fol. inferiora composita. Enc. bot. 3. p. 666. Hab. in Italia, Hisp., Ungaria et Creta. Flor. vere. Fol. caul. flava. ♂

2. *aegyptiacum*, foliis floralibus binis simplicibus cordatis integerrimis. Hab. in Aegypto.

3. *laterale*, fol. caulinis ternatis incisisserratis, umbellis lateralibus sessilibus. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

4. *Olusatrum*, fol. caulinis ternatis petiolatis serratis. Blackw. t. 408. Habit. in Scotia, Wallia, Gallia, Hispania, Belgio. Foliola rhomboidea. ♂

5. *apiifolium*, fol. caulinis cuneiformibus obtusis trifidis dentatis. S. creticum paludarii folio. Tournef. cor. 23. Habit. in Creta. Involucr. universale et parziale nullum. W. †

6. *cordatum*, fol. radicalibus suborbiculato-cordatis crenatis: caulinis petiolatis trifidiatis: supremis 3-partiis, umb. radiis brevibus. Michaux. Flor. 1. p. 170. Hab. in sylvis montosis Carolinae.

7. *aureum*, fol. biternatis lobo medio 3-5-gono ovali-lanceolatis serrulatis, umbel. brevi radiatis. Michaux. Hab. in Carolinae montibus. Flor. plerique abortiunt. Mich. Flosc. omnes fertiles. L.

8. *atropurpureum*, fol. omnibus ternatis: foliolis ovato-acutis serratis, flor. atropurpureis. Lam. enc. bot. 3. p. 667. Hab. in Amer. septentrionali.

9. *integerrimum*, fol. caulinis duplicato-ternatis integerrimis. L. Michaux. p. 171. Hab. in Virginia. Fol. fere Aquilegiae, triternata, glauco-viridia. Umb. radii pauci, setaceo-elongati.

10. *nodiflorum*, fol. ternatim divisis: foliolis ovatis serratis, ramulis verticillato-paniculatis laxis. Allioni. n°. 1347. t. 73. Ligusticum. Villars. Willd. Sp. p. 1425. Angelica paniculata. Lam. enc. t. p. 172.

Hab. in alpin. Delphin. et Helvetiae. Sem. subrotunda, gibba, nigricantia.

720. **ANETHUM**. *Fructus* subovatus, compressus, striatus. *Petala* involuta, integra, (flava.)

1. *graveolens*, annuum, fructibus compressis. L. ☉

2. *segetum*, subparvum, fol. caulinis tribus, fructibus ovalibus. Hab. in Lusitania et Gallia. ☉

3. *Foeniculum*, perenne, fruct. ovatis. Riv. t. 60. Hab. in cultis oleraceis. ☿

721. **CARUM**. *Fructus* ovato-oblongus, striatus. *Involucrum* sub-1-phyllum. *Petala* carinata, inflexo-emarginata.

1. *Carvi*, caule ramoso, vaginis foliorum ventricosus, involucrio partiali nullo. Willd. Sp. 2. p. 1450. Flor. Dan. t. 1097. Jacq. austr. t. 393. Hab. in pratis. Fruct. aromaticus. ♂

2. *simplex*, caule simplicissimo, vaginis foliorum adpressis, involucrio partiali polyphyllo. Willd. l. c. Hab. in Sibiria. Umbellulae capitatae.

722. **PIMPINELLA**. *Fructus* ovato-oblongus. *Petala* inflexa. *Stigm.* subglobosa. Umbellulae subglobosae, primo mutantes.

1. *Saxifraga*, caule striato glabro, fol. pinnatis glabris, radicalibus foliolis subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. Willd. Sp. pl. 2. p. 1477. Engl. bot. t. 407. Flor. dan. t. 606. Hab. in pascuis siccis, ad vias in rupestribus. ☿

2. *nigra*, caule striato pubescente, fol. pinnatis pubescentibus, radicalibus foliolis subcordatis incisus obtusis dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. Willd. Hab. in Germaniae siccis. Radix vulnerata caeruleo lactescit. ☿

3. *magna*, fol. uniformibus pinnatis, foliolis omnibus lobatis, impari trilobo. Jacq. austr. t. 396. Engl. bot. t. 408. Flor. dan. t. 1153. Hab. in pratis, sylvaticis. Var. *Flor. rubris* : P. rubra quorundam.

\* *media*, fol. pinnatis, foliolis radicalibus subcordatis subtrilobis serratis, caulinis inciso-angulatis. Hoffm. Flor. germ. t. p. 146. Jacq. austr. t. 397. P. orientalis. Gouan. ill. t. 15? Cum priore.

4. *lutca*, fol. pinnatis pubescentibus : fo-

liolis cordatis dentatis antice excisis, pedunc. filiformibus paniculatis. Desf. Atl. 1. p. 265. Hab. in Atlant. Fol. P. *magnae*, radicalia pubescentia. Odor. aromaticus.

5. *dissecta*, fol. omnibus pinnatis, pinnis multipartitis, segmentis subfalcatis acutis. Retz. obs. 3. p. 30. t. 2. P. genevensis. Vill. Delph. 2. p. 604. Hab. in pratis, sylvaticis. ♂? C. hircina. Roth.

6. *Tragium*, fol. pinnatis erectis, foliolis cuneatis incisus, summis simplicib., seminib. lirsutis. Vill. Delph. 2. p. 605. Tragium alterum Dioscoridis. Calum. Phytob. p. 75. t. 17. ed. Plancii. Hab. in Delph. ad pedem mont. St. Just. Foliol. prioris anni pubescentia rotundata, dein 3-5-fida.

7. *peregrina*, foliis radicalibus pinnatis crenatis ; summis cuneiformibus incisus, umbellis nubilibus nutantibus. Jacq. hort. t. 231. Column. cephr. t. p. 108. t. 109. Hab. in Italiae pascuis sterilibus. ☿

8. *Anisum*, fol. radicalibus trifidis incisus. Involucr. 1-phyllum. Fruct. pubesc. Anisum vulgare. Gaertn. t. p. 102. Hab. in Aegypto et hinc inde colitur. ☉

9. *villosa*, fol. radicalibus bipinnatis : foliolis crenatis basi cuneatis, petalis (crassis) seminibusque villosis. Schousb. p. 125. Hab. in arenosis regionis Tingitanac. Rad. tuberosa albid. Invol. o. ☿

10. *Bubonoides*, foliis radicalib. 2-3-pinnatis : caul. melius alternis compositis, petiolo latissimo duplo brevioribus, umbel. numerosissimis, sem. villosis. Brotero Phytograph. Lusitan. Fasc. 1. Hab. in Lusitaniae collib. calcariibus.

11. *dichotoma*, pedunc. oppositifoliis, fol. floriferis bifidis, petiolis alato-membraceis. L. Mant. 58. Hab. in Hispania. Petiolis aucti membrana alba.

12. *dioica*, pumila, umb. numerosissimis compositis simplicibusque, rad. fusiformi, fol. multifidis, linearibus. Jacq. austr. 1. t. 28. P. glauca. Thuill. Seseli pumilum. Lin. Sp. pl. 2. p. 373. Hab. in Austria, Gallia, Helvetia. ☿

13. *glauca*, fol. supradecompositis, caul. angulato ramosissimo. Lin. Gouan. ill. p. 15. Tragoselinum, caul. crasso subcato divaricato. Hall. helv. n. 788. ? Hab. in Gallia, Italia, Helvetia, Hungaria.

Obs. Similis priori, sed differt aetate 2-3-plove altiore, fol. 3-4-plo-pinnatis, umbel. omnibus compositis, ramis non paucis oppositis et floresc. seriore. Plant. rar. Hong. p. 73. t. 72.

14. *capensis*, fol. supradecompositis: lacinii acutis, caul. striato. Thunb. Prodr. p. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

15. *leptophylla*, fol. multifido-setaceis, caul. elongato subdichotomo, umbel. trifida. Habit. in Ins. St. Dominica. Caul. tenuis. Fol. tenuissima, petiol. non membranaceus.

723. **APIUM.** *Fructus* ovatus, striatus. *Involucr.* 1-phyllum. *Petala* æqualia.

1. *Petroselinum*, foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis. Lin. Willd. p. 1475.  $\beta$ . *crispum*, fol. radicalibus amphioribus crispis, Mill. dict. n°. 2. Hab. in Sardinia juxta scaturigines.  $\sigma$

2. *graveolens*, caul. sulcato, fol. caulinis cuneiformibus. Flor. dan. t. 790. Ludw. ect. t. 180.  $\beta$ . *dulce*, fol. erectis, petiolis longissimis, foliolis quinquelobatis serratis. Mill. dict. n°. 5. Hab. in humidis, salsis præsertim mariiis.  $\sigma$

724. **ÆGOPODIUM.** *Petala* inæqualia. *Fructus* ovato-oblongus, costatus. *Involucr.* 0.

1. *Podagraria*, fol. caulinis summis ternatis ovatis. L. Flor. dan. t. 607. Hab. ad sepes et in pomatiis.  $\mathfrak{f}$

## TRIGYNIA.

725. **SEMECARPUS.** *Cal.* inferus quinquefidus. *Cor.* 5-petala. *Nux* reniformis, receptaculo magno carnosio depresso inserta.

1. *Anacardium*, (longifolium), fol. longis lanceolatis utrinque acutis, racemis terminalibus subpanicularis. Lam. enc. 1. p. 139. Lin. suppl. p. 182. Willd. Sp. p. 1476. Rumph. Amb. 1. t. 70. Roxb. Corom. 1. p. 13. t. 12. Habit. in montosis, sylvaticis Indiae. Arb. magna, præstat Anacard. officinarium.

2. *latifolium*, foliis alternis petiolatis ovatis subtus pubescentibus. Lam. l. c. Hab. in Ind. orientali.  $\mathfrak{h}$

726. **RHUS.** *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Bacca* 1-sperma.

\* *Foliis pinnatis.*

1. *Coriaria*, fol. pinnatis, foliolis ellipticis obtuse denatis, subtus villosis. Willd.

Sp. p. 1477. Ludw. ect. t. 122. R. petiolas inter foliola ultima subulatus. Ehrh. Hab. in Europa australi, Syris, Palestina.  $\mathfrak{h}$

2. *typhinum*, fol. pinnatis, foliolis lanceolatis acuminatis argute serratis, subtus pilosiusculis. Willd. arb. 288. Hab. in Virginia. Spica crassa, purpurasc.  $\mathfrak{h}$

3. *javanicum*, fol. pinnatis ovatis acuminatis serratis, subtus tomentosis. Hab. in China. Ex bacis contusis et aqua coctis, sinenses extrahunt oleum, quo pro vernice utuntur. Lour.  $\mathfrak{h}$

4. *semialatum*, fol. pinnatis serratis, petiolis extremis internodiis, membranaceis. Murr. in Comm. goett. 6. 1784. p. 27. t. 3. Hab. prope Macao. An diversum a Rh. javanico.  $\mathfrak{h}$

5. *glabrum*, fol. pinnatis lanceolatis serratis utrinque nudis, floribus hermaphroditis. Ait. Kew. 1. p. 365.  $\beta$  ? viridiflorum. Hortulan. Hab. in Americae septentrionalibus altioribus ad agros et sepes.  $\mathfrak{h}$

6. *elegans*, foliis pinnatis lanceolatis serratis, utrinque nudis, flor. dioicis. Ait. Kew. t. p. 366. R. glabrum panicula speciosa coccinea. Catesb. carol. app. 4. t. 4. Hab. in Carolina australi.  $\mathfrak{h}$

7. *Vernix*, foliis pinnatis integerrimis annuis operis alatis, petiolo in tegro aequali flor. dioicis. Toxic dendron fol. alatis, fructu rhomboide. Dill. elth. 39. t. 292. f. 377. Pluck. alm. 45. t. 145. f. 1. Hab. in America septentrionali, Japonia.  $\mathfrak{h}$

8. *succedaneum*, fol. pinnatis integerrimis perennantibus lucidis: petiolo integro aequali. L. Hab. in Japonia, China. Affine Rh. Vernix. Fol. hujus majora. Fructus magnitudine Cerasi, nec albus. L.  $\mathfrak{h}$

9. *Copallinum*, fol. pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulado. Pluck. alm. 318. t. 56. f. 1. Hab. in America septentrionali.  $\mathfrak{h}$

10. *alatum*, fol. pinnatis, foliolis ovatis apice serratis, petiolis internodiis omnibus alatis. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathfrak{h}$

11. *pauciflorum*, fol. pinnatis, foliolis alternis decurrentibus cuneiformibus apice serratis, panicula sessili pauciflora. Linn. suppl. 181. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathfrak{h}$

12. *Metopium*, fol. pinnatis quinatis integerrimis subrotundis glabris. L. Metopium fol. subrotundis pinnato-quinatis, racemis uluribus. Brown. jam. 177. t. 13. f. 3. Sloan. hist. 2. p. 90. t. 199. f. 3. Hab. in Amer.  $\mathfrak{h}$



13. *striatum*, fol. impari pinnatis : foliolis integerrimis ovato-lanceolatis subtus tomentosis, racemis maximis, baccis striatis. Flor. Per. 3. 29. t. 252. Habit. in Chinchao nemorib. Cort. succus tincturam atram praebet.

14. *lineatifolium*, foliolis ovatis dentatis lineatis, racem. axillaribus, bacc. striatis. Oriega Dec. pl. p. 89. Hab. in ins. Cuba. Bipedale. h

15. *pumilum*, pubescens, fol. pinnatis multijugis : foliolis ovalibus incidentatis, subtus tomentosis. Michaux. Flor. 1. p. 182. Hab. in Carol. superiore. Altitudine pedali. Fruct. holosericeus.

16. *digitatum*, scandens, fol. pinnatis, foliolis oblongis integerrimis glaberrimis. Linn. suppl. 184. Fol. quinatis, caule scandente cirriferu. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. h +

\* \* Foliis ternatis.

17. *cirriferum*, scandens, fol. ternatis, foliolis integerrimis glabris. Linn. suppl. 184. Hab. ad Cap. b. spei. h

18. *tridentatum*, scandens, fol. ternatis, foliolis incanis serratis, serraturis tribus ad quinque. Linn. suppl. 184. R. caule cirriferu scandente. Thunb. prod. 52. Cum prior. e. h

19. *radicans*, fol. ternatis : foliolis petiolatis ovatis nullis integerrimis, caule radicante. L. Duham. arb. 2. t. 98. Hab. in Virginia, Canada. Ilicium. h

β? *Toxicodendron*, fol. ternatis : foliolis petiolatis angulatis pubescentib., caul. radicante. Cornut. canad. 96. t. 97. Barr. ic. 218. Cum praecedente cresc., cujus vix varietas videtur. h

20. *aromaticum*, fol. ternatis, foliolis sessilibus ovato-rhombis inciso-serratis pilosiusculis. Ait. Kew. 1. p. 367. Conf. Michaux. Flor. 1. p. 184. Hab. in Carolina superiore et Kentucky. h

21. *suaveolens*, foliis ternatis, foliolis sessilibus ovato-rhombis, inciso-serratis glabris. Ait. Kew. 1. p. 368. Myrica trifoliata. Lin. ? Hab. in America boreali. h

22. *dentatum*, fol. ternatis, foliolis obovatis mucronato-dentatis glabris, caule scabro. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. spei. h

23. *sinuatum*, fol. ternatis, foliolis ovatis obtusis sinuatis subtus villosis. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. spei. h

24. *cuneifolium*, fol. ternatis, foliolis sessilibus cuneiformibus glaberrimis septemdentatis, denubus mucronatis. Linn. suppl. 183. Hab. ad Cap. b. spei. h

25. *incisum*, fol. ternatis, foliol. sessilibus cuneiformibus inciso-pinnatifidis subtus tomentosis venosis, calycibus tomentosis. Linn. suppl. 183. Fol. Myriacae quercifoliae. h

26. *albidum*, fol. ternatis : foliolis sessilibus cuneiformibus crenatis utrinque canotomentosis, petiolis marginatis. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 128. Hab. in collib. arenosis prope Mogadore. Vernac. *Tassad*. Cultum canitiem et tomentum exuit. Bac. dulcescentes rubrae. h

27. *tomentosum*, fol. ternatis : foliolis subpetiolatis rhombeis angulatis ovatisque subtus tomentosis. L. Pluck. alm. 319. t. 219. f. 7. Comm. hort. 1. p. 279. t. 92. Fol. majuscula fere ut in Sal. Capraea.

28. *villosum*, fol. ternatis, foliolis obovatis integerrimis sessilibus utrinque pilosis. Ait. Kew. 1. p. 368. Linn. suppl. 183. R. folio subrotundo integro molli et incano. Pluck. alm. 319. t. 219. f. 8. Cano tomento a reliquis distinguitur.

29. *pubescens*, foliis ternatis, foliolis obovatis mucronatis glabris, ramis villosis. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. spei. h

30. *viminale*, fol. ternatis, foliol. longissimis lineari-lanceolatis integerrimis glabris basi attenuatis, intermedio subpetiolato. Ait. Kew. 1. p. 368. Vahl. symb. 3. p. 50. Willd. p. 1484. R. *lanceum*. Linn. suppl. 184 ? Hab. ad Cap. b. spei. Panicula supradecomposita, fol. brevior. Semper-virens. h

31. *angustifolium*, fol. ternatis : foliolis petiolatis lineari-lanceolatis integerrimis, (subseratisque) subtus tomentosis. L. fol. subtus argenteis acutis et margine incis. Pluck. alm. 319. t. 219. f. 6. Hab. in Aethiopia Sempervirens. Fol. ovato-lanceolata. h

32. *rosmarinifolium*, fol. ternatis : foliolis sessilibus linearibus revolutis subtus ferrugineis. Vahl. symb. 3. p. 50. Burm. afr. 251. t. 91. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h

33. *Thesera*, spinosum, fol. ternatis, foliolis lineari-lanceolatis integerrimis, petiolis dilatatis. Rh. pentaphyllum. Desf. Atl. 1. p. 267. t. 77. Rhamnus pentaphyllus. Lin. Boec. sic. t. 27. Hab. in Sicilia et Barbaria. Sempervir. Flor. dioici.

34. *Oxyacanthoides*, spinosum, foliis

ternatis glabris : foliol. angusto-cuneiformibus apice trilobis integrisque flor. dioicis. Dumont. Cours. Bot. Cultiv. 3. p. 568. Hab. in Africa. Spinae axillares denum foliosae.

35. *Crataegiforme*. Rh. *Oxyacantha*, caul. fruticoso ineremi, fol. ternatis canis, foliol. ovato-cuneatis : medio longiore. Cav. in Annal. de scienc. nat. p. 35. †

36. *laevigatum*, fol. ternatis : foliolis sessilibus lanceolatis laevibus. Hab. ad Cap. b. spei. Panic. longa, tenuissima sempervir. h

37. *lucidum*, fol. ternatis, foliolis obovatis retusis glabris. Thunb. prod. p. 52. Cav. ic. p. 27. t. 132. Pluck. alm. 379. t. 218. f. 9. Burm. afr. 252. t. 91. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei, inque Mexico. Sempervirens. h

38. *glaucum*, fol. ternatis : foliolis obcordatis, nonnullis glauco-pulverulentis. Elegans species. Foliol. parvula, nitida emarginata : 2 inferiora minora. Semperv.

39. *undulata*, fol. ternatis : foliol. glabris obovatis undulatis, petiol. canaliculatis dilatatis. Ex Hort. Celsii. Foliol. majus passim subrhomboidale apice in nonnullis subincisis. Diversum a R. suaveolente. Semperv.

40. *aequale*, fol. ternatis : fol. omnib. magnitudine aequalibus substabris, obovato-lanceolatis integris, caul. petiolisque puberulis. Hinc inde colitur. Fol. majuscula cum parvo mucrone.

41. *lanceum*, fol. ternatis : fol. lanceolatis glabris integerrimis, flor. paniculatis. Foliola 2 inferiora paullo minora, forma aequalia : angulo recto distantia ; margine subrevoluta mucronata. Panic. fol. longior. An Rh. *lanceum*. Linn. suppl. p. 184. aut Thunb. prodr. p. 52 ?

Obs. Tres posteriores species (forte quoque ex Cap. b. spei) accuratius examen adhuc merentur, an forte cum una alterave jam cognita eadem sint nec ne.

\*\*\* *Foliis simplicibus.*

42. *Cotinus*, fol. simplicibus obovatis. Jacq. austr. t. 210. R. racemis plumosis, fol. ovatis. Hall. helv. n.º 82. Hab. in Lombardia, Carniola, Helvetia, Sibiria, Austria. h

43. *atrum*, fol. simplicibus ovato-oblongis, floribus polygamis. Forst. prod. 142. Hab. in N. Caledonia. h

727. VIBURNUM. Cal. 5-partitus,

superus. Cor. 5-fida. Bacca aut Drupa 1-sperma.

\* *Foliis integerrimis.*

1. *Tinus*, fol. integerrimis ovatis opacis : ramificationibus venarum subtus villosoglandulosis. L. Willd. Sp. 2. p. 1486. Curt. Magaz. t. 38. Hab. in Lusitania, Hispania, Italia et Barbaria. h

2. *lucidum*, fol. coriaceis ex ovato sublan- ceolatis nitentibus integerrimis. V. *Tinus* var. (3. Ait. Kew. p. 370. Hab. in Hispania. Caul. humilis. Cor. majuscula lactea extus rubescens. Caul. subquadrangularis.

3. *rugosum*, foliis lato-ovatis rugosis subtus hirsutis, involucr. universali 7-phyllo. V. *Tinus*. Var. *hirta*. Ait. ? Hab. in ins. Canariis. Flor. sub fine hyemis. Caul. satis altus, ramis subangulatis pilosis. Flor. subodorati congesti. Huc V. *Tinus*. Var. *latifolia* et V. *strictum* Hortul.

4. *Tinoides*, fol. ellipticis glabris integerrimis, ramis cymisque teretibus hirsutis. Linn. suppl. 184. Hab. in America meridionali. h

5. *villosum*, fol. integerrimis ovatis, subtus incano-villosis. Swartz. R. ind. orchid. t. p. 564. Hab. in montibus Jamaicae. h

\*\* *Fol. serratis aut crenatis.*

6? *scandens*, fruticosum scandens, fol. oblongis serratis, cymis terminalibus, radiis terminatis flore maximo. Linn. suppl. 184. V. *virens*. Thunb. jap. 123. Hab. in Japonia. Stamina 10. styli et fructus ignotus. Thunb. h †

7. *nudum*, fol. ovalib. subrugosis margine revolutis obsolete crenulatis. Ait. Kew. t. p. 370. V. fol. integerrimis lanceolato-ovatis. Lin. Sp. pl. 381. Mill. ic. 183. t. 274. Hab. in Virginia. Cymae in hac nudae, 6. non involucae. h

8. *prunifolium*, fol. ovatis ovalibusque glabris argute serratis, petiolis marginatis. Ait. Kew. t. p. Pluck. alm. 249. t. 46. f. 2. Hab. in Virginia, Canada. Fol. tenuia, lacte viridia. h

9. *davuricum*, fol. ovatis serratis punctato-pilosis, cymis dichotomis paucifloris. Pall. ross. 2. p. 30. Lonicera mongolica. Pall. ross. 1. p. 59. t. 38. Gmel. sib. 3. t. 25. Hab. in Davuria. h

10. *dentatum*, fol. ovatis dentato-serratis plicatis, fruct. subglobosis. *Lucidum*, fol.

utrinque glabris suborbiculatis. Ait. Kew. 1. p. 372. Pubescens, fol. ovalibus acuminatis subtus villosis. Ait. l. c. Michaux. Flor. 1. p. 179.

11. *plicatum*, fol. ovatis obtusis dentato-serratis plicatis. Thunb. in Act. soc. Lit. n. 2. p. 332. V. dentatum. Thunb. jap. 122. Hab. in Japonia. h

12. *erosum*, fol. ovatis acuminatis erososerratis glabris, petiolis tomentosis. Thunb. jap. 124. Hab. in Japonia. h

13. *Lantana*, fol. cordatis serratis venosis subtus tomentosis. In Europae sylvis *β. canadensis*, fol. latioribus minus tomentosis crenatis. *β. grandifolium*. Ait.

14. *Lantanoides* (subdecumbens), petiolis nervisque pulverulento-tomentosis, fol. suborbiculato-cordatis abrupte acuminatis dentatis, cymis sessilibus, fruct. ovatis. Michaux. Flor. 1. p. 179. Hab. in sylvis ad rupes in Canada. Priori affinis, sed humilior caul. subprocumbentibus. M. h

15. *tomentosum*, fol. ovatis acuminatis serratis venosis subtus tomentosis, umbellulis lateralibus. Thunb. jap. 123. Hab. in Japoniae sylvis variis inter Miaco et Jedo. h

16. *hirtum*, fol. ovatis serratis villosis, petiolis hirtis. Thunb. Hab. in Japonia. h

17. *acerifolium*, fol. cordato-ovatis aut trilobis acuminatis argute serratis, petiolis eglandulosis pilosis. Willd. Vent. Hort. Cels. p. 72. t. 72. Hab. in Virginia. Facie fere grossulariae. Petioli basi stipulis linearibus. h

18. *orientale*, fol. trilobis acuminatis grosse obtusiuscule dentatis, petiolis eglandulosis glabris. Willd. p. 1490. Pall. ross. 2. t. 58. fig. H. Hab. in Imeretiae subalpinis. Affine praecedenti. h

19. *Opulus*, fol. trilobis acuminato-dentatis, petiolis glandulosis glabris. Willd. p. 1490. Flor. dan. t. 661. *β. roseum*, cyma globosa, flor. pleno. Hab. in sylvis. h

20. *dilatatum*, fol. obovatis acuminatis inaequalibus, dentatis villosis. Thunb. jap. 124. Hab. in Japonia. Caulis cinereus, et pedunculi tomentosi. Stylus simplex. Thunb. † h

21. *macrophyllum*, fol. obovatis acuminatis dentatis glabris. Thunb. jap. 125. Hab. in Japonia. h

22. *cuspidatum*, fol. ovatis cuspidatis serratis villosis. Thunb. Cum priore, Umb. supradecomposita terminalis, flor. radiantibus. Thunb. h

23. *Lentago*, fol. lato-ovatis acuminatis argute serratis, petiolis marginatis crispis. Ait. Hab. in Canada. Kalm. Cym. sessilibus. h

24. *cassinoides*, fol. ovatis lanceolatisque crenatis glabris, petiolis carinatis eglandulatis. Lin. V. fol. parvulis cuneato-obovatis crenato-dentatis coriaceis, cymis arcte sessilibus. Michaux. Flor. 1. p. 179. Hab. in umbrosis sylvarum, juxta rivos Carolinae infer. et Georgiae. h

25. *nitidum*, fol. lineari-lanceolatis supra nitidis obsolete serratis integerrimis. Ait. Hab. in America boreali. h

26. *laevigatum*, fol. lanceolatis laevibus remote serratis basi integerrimis. Ait. Cassine Peragua. Lin. Habit. in Carolina, Virginia.

728. CASSINE. Cat. 5-partitus. Petala 5. Bacca 3-sperma.

1. *capensis*, ramulis 4-gonis, fol. petiolatis ovatis retusis crenatis, panicula folio brevior. Thunb. prod. 52. Willd. Sp. 2. p. 1492. Burm. afr. 239. t. 85. Dill. elth. 315. t. 236. f. 305. Hab. ad Cap. b. spec. h

2. *Colpoon*, fol. petiolatis ovatis crenatis, panicula longitudine folii. Thunb. prod. 52. Evonymus Colpoon, flor. quadrifidis, fol. ovalibus saepius integerrimis. L. Mant. p. 210. Hab. ad Cap. b. spec. An a priore satis diversa? h

3. *barbara*, fol. sessilibus serrato-dentatis cordato-oblongis, ramulis quadrangulis. Lin. Hab. ad Cap. b. spec. h †

4. *Maurocenia*, fol. sessilibus integerrimis obovatis coriaceis integerrimis convexis, flor. axillaribus confertis. Lam. enc. 1. p. 653. Maurocenia Frangularia. Mill. dict. n°. 1. Dill. elth. t. 121. f. 147. Pluck. alm. t. 158. f. 2. In Aethiopia. h

5. *concava*, fol. alternis subpetiolatis subrotundis integerrimis superne concavis, pedunc. simplicibus axillaribus. Lam. enc. 1. p. 652. Pluck. alm. t. 280. f. 4. C. humilis. quorund. Hab. in Africa. Caul. subtortuosus. An eadem ac *Celastrus lucidus*? h

6. *laevigata*, fol. aeternis subpetiolatis oblongo-ovatis obtusis integerrimis planiusculis, peduncul. axillaribus racemosis. Lam. enc. 1. p. 652. Hab. in Cap. b. sp. Truncus cortice nigro. Bacca, uti in antecedentibus, trigona. *Celastris* affinis. h

7. *oleifolia*, foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis marginatis,

corymb. minimis axillarib. Lam. l. c. Cum priore. Ram. juniores angulati, glabri.

8. *xylocarpa*, fol. petiolatis ovatis sessilib. pedunc. dichotomis fol. breviorib. fruct. ossis. Vent. Choix d. Pl. p. 23. t. 23. Hab. in. Anillis, ins. St. Thomae. h

729. *SAMBUCUS*. Cal. 5-partitus. Cor. 5-fida. Bacca. 3-sperma.

1. *Ebulus*, cymis tripartitis, stipulis foliaceis ovatis, caule herbaceo. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1494. Flor. dan. t. 1156. Hab. in Europa magis australi, et in Barbaria locis depressis. h

2. *nigra*, cymis 5-partitis, stipul. 2. utrinque setaceis, foliis pinnatis, foliolis ovatis serratis, caule arboreo. Flor. dan. t. 545. Engl. bot. t. 476.  $\beta$ . *laciniata*, fol. bipinnatis, pinnis ternatis, foliol. lanceolatis incis. Retz. obs. 3. p. 10. Hab. in Europa et Japonia. Var. fructu nigro et albo. h

3. *canadensis*, stipul. nullis, cymis quinquepartitis, foliis subbipinnatis foliol. oblongo-ovalib. nitidis glabris, caule frutescente. Michaux. Flor. 1. p. 181. Hab. in Canada. Flores ut in *S. nigra*, sed Baccae parvae atro-rubrae dulces. Willd. h

4. *pubescens*, cyma subracemosa, cortice verruculoso, fol. terminalib. quinatis foliol. ovali-lanceolatis subtus pubescentibus. Michaux. l. c. Hab. in altis montib. Pennsylvan. Canadae et Carolinae. Affinis sequenti; fruct. etiam rubri, sed fol. nunquam ternata. M.

5. *racemosa*, racemis compositis ovatis, caule arboreo. Jacq. Icon. var. 1. t. 59. Hab. in montibus sylvaticis. Baccae rubrae. h

6. *japonica*, fruticosa, cymis tripartitis, stipulis nullis. Thunb. jap. 125. Hab. in Japonia. Cyma supradecomposita trichotoma nuda absque bracteis. Germin superum. Stigma capitatum. Th. h

Obs. Ulterius examinanda est haec species, quae ob germin superum saltem non hujus generis est.

730. *SPATHHELIA*. Cal. 5-phyllus. Pet. 5. Caps. 1-gona, 3-locularis. Sem. solitaria.

1. *simplex*. Lin. Lam. ill. t. 209. Spathe saedice simplici, fronde pinnata comosa, racemo simplicissimo laxo terminali. Brown.

jam. 187. Sloan. hist. 2. p. 28. t. 171. Hab. in Jamaica. h

731. *STAPHYLEA*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. inflatae, connatae. Nuces 2, globosae cum cicatrice.

1. *occidentalis*, fol. duplicato-pinnatis, capsulis trigonis, seminibus solitariis, caule arboreo. Swartz. prod. 55. Fl. ind. occid. 1. p. 566. Hab. in Jamaicae campestribus montium. h

2. *pinnatis*, fol. pinnatis. Hab. in Europae australioris succulentis. Styli duo. Styli 2, saepius 3. h

3. *heterophylla*, fol. ternatis quinatis, pinnatisque serratis. Flor. Per. 3. p. 29. t. 253. In Andium nemorib. Caps. unica non inflata, subtriloba. Hab. Sambuci.

4. *trifolia*, fol. ternatis. Hab. in Virginia. h

732. *TAMARIX*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 1-locularis, 3-valvis. Sem. coma instructa.

1. *gallica*, flor. pentandris, spicis lateralibus, fol. lanceolatis amplexicaulibus imbricatis. Willd. Sp. p. 1498.  $\beta$ . *canescens*, fol. cauleque tomentoso-can. Pall. ross. 2. p. 72. t. 79. Hab. in Gallia, Hisp. Italia, Russia.  $\beta$ . in desertis salis maris Caspii. h

2. *africana*, fol. imbricatis minimis. flor. pentandris, spic. tereti densissima, peduncul. squamosis, stylo trifido. Desf. Atl. 1. p. 269. Hab. in Algeria ad maris littora. Affinis priori. Spica crassior. Flor. 2-4-plo majores. h

3. *articulata*, flor. pentandris, spicis lateralibus, fol. brevissimis vaginatis. Willd. Vahl. symb. 2. p. 48. t. 32. Thuja aphylla. L. Hab. in India orientali, Arabia. h

4. *songarica*, flor. octandris decandrisque, fol. filiformibus carnosiss. Pall. in Act. Petrop. 10. p. 374. t. 10. f. 4. Hab. in Sibiria locis salsis Songariae. h

5. *germanica*, flor. decandris, spicis terminalibus, fol. sessilibus lineari-lanceolatis. Willd. p. 1499. Mill. ic. t. 262. f. 2. Hab. in inundatis, ad flum. ripas. h

$\beta$ ? *caspica*, caule herbaceo annuo, flore minore. Pall. ross. 2. t. 80. f. B.  $\odot$ . Ad mare Caspium. Var. videtur differre ob caulem herbaceum. Willd.

733. REICHELIA. *Cal.* 5-partitus.  
*Cor.* campanulata 5-fida. *Caps.*  
3-locularis circumscissa polysperma. *Sem.* receptaculo maximo adherentia.

1. *palustris*. Aubl. guj. 1. p. 285. t. 111. Hab. in Gujanae ad rivulorum ripas. Caul. plures tripedales. Fol. alterna integerrima. Flor. caerulei, axillares.  $\overline{\text{U}}$

734. SALMASIA. *Cal.* 5-partitus.  
*Cor.* 5-petala. *Styl.* o. *Capsula*  
3-locularis, 3-valvis polysperma.

1. *racemosa*. Willd. p. 1502. Tachibota gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 287. t. 112. Lam. ill. t. 208. Hab. in sylvis Gujanae. Frutex ramis hirsutis rufescentibus. Fol. alterna oblonga acuminata integerrima glabra. Flor. albi. W. h

735. MALESHERBIA. *Cal.* inferus  
persistens. *Petala* fauci cal. infra  
incisuras insidentia. *Nect.* *Coro-*  
*nula* 10 squamis, membranaceis  
2-4-crenatis, petalis alternis.  
Anth. incumbentes basi excavatae.  
*Styl.* infra apicem germinis orbic-  
ulatum affixi. *Stigm.* capitata.  
*Caps.* apice trivalvis. *Sem.* plura  
affixa receptac. 3, linearibus,  
per caps. parietem decurrentibus.

1. *thyrsiflora*, fol. lineari-lanceolatis  
sinuatis dentatis, cal. tubuloso-ventricosus.  
Flor. Per. 3. p. 30. t. 254. Gynopleura tu-  
bulosa. Cav. ic. 4. p. 52. t. 375. Hab. in  
Peruv. argillosis aridis, calidis. Foetida,  
hirsutissima. Cal. et petala lutea utrinque  
villosa, marcescunt. h

2. *linearifolia*, fol. sublinearibus ses-  
silibus ciliatis villosis, cal. infundibuli-  
formi. Cav. l. c. t. 376. Hab. in montib.  
Chilensibus. Cal. tomentosus. Petal. luteo-  
alba.

736. TURNERA. *Cal.* 5-fidus,  
infundibulif. exterior diphyllus.  
*Petala* 5, calyci inserta. *Stig-*  
*mata* multifida. *Caps.* 1-locu-  
laris, 3-valvis.

1. *ulmifolia*, flor. sessilibus petiolaribus,  
foliis basi biglandulosus. L. Hort.  
cliff. t. 10. Willd. Sp. 2. p. 1503. Sloan.  
jam. hist. t. 127. f. 4. 5.  $\beta$ . *angustifolia*,  
flor. sessilibus petiolaribus, fol. lanceolatis

rugosis acuminatis. Curt. mag. t. 287. Hab.  
in Jamaica, et in America calidiorie.  $\overline{\text{O}}$

2. *Pumilea*, flor. sessilibus petiolaribus,  
fol. eglandulosus. Lin. Pet. gaz. 59. t. 38.  
f. 9. Sloan. l. c. t. 127. f. 6. Hab. in Ja-  
maice campis sabulosis aridis.  $\overline{\text{O}}$

3. *rupestris*, pedunculis axillaribus bi-  
setis, fol. linearibus serratis. Willd. Aubl.  
guj. 1. p. 289. t. 113. f. 1. Hab. in rupibus  
locis humidis Gujanae. h

4. *sidoides*, pedunc. axillaribus bisetis,  
fol. obovato-cuneatis serratis. Hab. in Bra-  
silia. Caul. palmaris.

5. *frutescens*, pedunc. axillaribus bi-  
setis, fol. lanceolatis acuminatis aequaliter  
serratis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 290. t. 113.  
f. 2. Hab. in fissuris rupium Gujanae. h

6. *rugosa*, pedunc. axillaribus aphyllis,  
flor. pentagynis, fol. oblongis eroso-den-  
tatis rugosis. Willd. Piriqueta villosa. Aubl.  
guj. 1. p. 298. t. 117. Burcardia. Schreb.  
Hab. in Gujanae et Cajennae maritimis  
arenosis.  $\overline{\text{O}}$

7. *cistoides*, pedunc. axillaribus aphyllis,  
fol. apice serratis. Lin. Plum. spec. 7.  
icon. 150. f. 1. Sloan. hist. t. 127. 7. Hab.  
in America meridionali. Caulis digitalis.  
Bracteae nullae.  $\overline{\text{O}}$

8. *racemosa*, racemis terminalis elon-  
gatis, foliis ovatis dentatis. Jacq. hort.  
vindob. 3. t. 94. Hab. .... Petunc. longis-  
simi uniflori.  $\overline{\text{O}}$

9. *gujanensis*, racemo terminalib. pau-  
cifloro nudo, fol. linearibus serratis basi  
biglandulosus. Willd. Aubl. guj. 1. p. 291.  
t. 114. Hab. in Gujanae pratis paludosis.  $\overline{\text{O}}$

737. TELEPHIUM. *Cal.* 5-phyllus.  
*Petala* 5, receptaculo inserta.  
*Caps.* 1-locularis, 3-valvis.

1. *Imperati*, fol. alternis. Lam. ill. t. 213.  
Desf. Atl. 1. p. 270. Tournef. inst. 128.  
Hab. in Galloprovincia, Helvetia, et Bar-  
baria ad maris litora.  $\overline{\text{U}}$

2. *oppositifolium*, fol. oppositis. Shaw.  
afr. 572. f. 572. Hab. in Barbaria.  $\dagger$

738. CORRIGIOLA. *Cal.* 5-phyllus.  
*Petala* 5. *Sem.* 1, triquetrum.

1. *Telephiifolia*, caul. diffuso pro-  
cumbente, fol. oblongo-ovatis, ramis  
aphyllis, seminib. polygonis. Pourret Chlor.  
Narbon. p. 20. (Vid. Act. Tulos. v. 2.)  
Hab. ad rupes prope Bonlou.  $\overline{\text{U}}$

2. *littoralis*, decumbens, fol. linearibus, flor. pedunculatis, calycibus marginem membranaceis. Willd. Sp. 2. p. 1506. Lam. ill. t. 213. Flor. dan. t. 334. Moris. s. 5. t. 29. f. 1. Hab. in Galliae, Germaniae, Helvetiae et Barbariae arenosis. Humifusa, ramis centrifugis. ☉

3. *capensis*, flor. sessilib., calycib. viridibus. Willd. p. 1507. C. littoralis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. ☉ †

739. PHARNACEUM. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 3-locularis, polysperma.

1. *Cerviana*, peduncul. subumbellatis lateralibus, folia linearia aequantibus. L. Willd. p. 1587. Lam. ill. t. 214. f. 1. Gmel. sib. 3. t. 20. f. 2. Cerviana. Minuarti monogr. 1. Trichlis. Hall. Alsine. Pluck. mant. p. t. 332. f. 11. Hab. Rostockii, in Russia, Hispania, Guinea, Asia. ☉

2. *sperguloides*, fol. fasciculatis verticillatis linearibus acuminatis, umbel. terminalibus paucifloris. Enc. bot. 5. p. 260. Lam. ill. t. 214. f. 2. Hab. in India.

3. *lineare*, umbellis inaequalibus, fol. linearibus, oppositionibus remotis. Linn. suppl. 185. Hab. ad Cap. b. spei.

4. *teretifolium*, fol. filiformibus mucronatis, umbellis lateralibus, caule erecto frutescente. Thunb. prod. 53. Hab. ad Cap. b. spei. h

5. *microphyllum*, tomentosum, pedunc. umbellatis, fol. ovatis teretiusculis obtusis lana intertextis. Linn. suppl. 185. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *marginatum*, fol. ovatis marginatis obtusis, flor. axillaribus sessilibus. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *Mollugo*, pedunc. unifloris lateralibus, flor. longitudine foliorum, caule depresso. Burm. ind. 31. t. 5. f. 4. Burm. zeyl. 13. t. 7. Hab. in India orientali. ☉

Obs. Simillima Illecebro sicoideo. Fructificatio simillima Mollugini verticillatae. Petala vero simillima Glino lotoidi. L.

8. *glomeratum*, flor. glomeratis, caul. flexuoso, fol. linearibus. Linn. suppl. 185. Pluck. mant. 163. t. 331. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

9. *serpyllifolium*, pedunc. unifloris,

fol. ovatis. Linn. suppl. 186. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

10. *quadrangulare*, subfruticosum, fol. linearibus quadrifariam imbricatis. Linn. suppl. 185. Hab. ad Cap. b. spei. Ericae facie. Flor. elbii extus virides. L. h

11. *incanum*, pedunc. communibus longissimis, fol. linearibus, stipulis pilosis. Linn. suppl. 186. Hab. in Africa. Caul. profliferus. Rami stipulis tunicatis. L. h

12. *albens*, pedunc. communibus longissimis, fol. linearibus exstipulatis. Linn. suppl. 186. Pluck. phytog. t. 304. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *dichotomum*, pedunc. axillaribus elongatis dichotomis, fol. verticillatis linearibus. Linn. suppl. 186. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

14. *distichum*, racemis bipartitis flexuosis, foliis sublinearibus pubescentibus. Pluck. mant. p. t. 332. f. 4. Mollugo racemosa. Lam. ill. Hab. in India orientali.

15. *cordifolium*, racemis bipartitis terminalibus, fol. obcordatis. Hab. ad Cap. b. spei.

16. *bellidifolium*, fol. ovato-spathulatis, caul. nudo, racem. paniculatis dichotomis. Enc. bot. 5. p. 262. Plum. Amer. t. 21. f. 1. Sloan. jam. t. 129. f. 2. Hab. in Jamaica, Guiana. Facie a ceteris differt speciebus.

740. ALSINE. Cal. 5-phyllus. Petala 5, aequalia. Caps. supera, 1-locularis, 3-valvis, polysperma. Recept. centrale liberum.

1. *media*, caul. latere alterno piloso, petalis bipartitis, fol. ovato-cordatis. Flor. dan. t. 525. Curt. Lond. ic. Lam. ill. t. 214. Holosteum Alsine. Swartz. obs. 118. Stellaria media. Smith. Flor. brit. 2. Hab. in cultis. Stamina numero a 3-7 variant. ☉

\* *prostrata*, fol. oblongis, caul. prostrato dichotomo, flor. 5-andro. Forsk. aegypt. p. 207. Hab. in Aegypto.

† *SEGETELLA*. Fol. stipulacea. Petala integra. Stam. passim 3 et 4.

2. *viscosa*, caul. paniculato foliisque pubescentibus, petal. cal. brevioribus. Schreb. Hoff. Flor. germ. p. 148. Aren. tenuifolia. Flor. dan. t. 389. Hab. in collinis et arenosis Lipsiae, Silesiae. Flor. 3-andri.

3. *aegetalis*, glabra, petalis integris, fol. subulatis subsecundis. Lin. A. aegetalis gramineis fol. unum latus spectantibus. Vaill. paris. 8. t. 3. f. 3. Hab. inter segetes passim. (Stipul. membranaceae incisae. Stam. 3-4.)

4. *mucronata*, petalis integris brevibus, fol. setaceis, calycibus aristatis. Hab. in Helvetia, Gallia. ☉

Obs. Genus dividendum, aut potius supprimendum et ejus species pro petalorum forma tum Stellariis tum Arenariis inserendae, a quibus numero staminum inconstante tantum differre videntur.

741. *DRYPIS*. Cal. 5-dentatus. Petala 5. Caps. circumscissa, monosperma.

1. *spinosa*. Jacq. hort. 49. Lam. ill. t. 214. Mich. gen. 24. t. 23. Hab. in Mauritania, Italia, Istria. Petala angusta. Fol. subulata, subtrigona, mucronata.

742. *SAROTHTA*. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis, 3-valvis, colorata.

1. *gentianoides*. Lam. ill. t. 215. Gentiana caule ramisque ramosissimis, fol. subulatis minimis. Gron. Virg. 29. Pluck. mant. 43. t. 342. f. 2. *Hypericum*. Mich. 2. p. 79. Hab. in Virginia, Pennsylvania. ☉

743. *BASELLA*. Cal. 6. Cor. 7-fida: laciniis 2 oppositis latioribus, tandem haccata. Sem. 1.

1. *rubra*, fol. planis, pedunc. simplicib. L. Willd. p. 1513. Sabb. hort. rom. 2. t. 98. Rheed. 7. t. 24. Hab. in India. ☉

2. *alba*, fol. ovatis undatis, pedunculis simplicibus folio longioribus. Pluck. alm. t. 63. f. 1. Hab. in China, Amboina. ☉

3. *lucida*, fol. subcordatis, pedunculis confertis ramosis. In India. ☉

4. *cordifolia*, fol. cordato-subrotundis, pedunc. simplicibus folio brevioribus. Lam. enc. 1. p. 377. Hab. in India orientali.

744. *PORTULACARIA*. Cal. 2-phyllus. Petala 5. Sem. 1, alato-triquetrum.

1. *afra*. Jacq. Coll. 1. p. 160. t. 22. Claytonia Portulacaria, caule arboreo erecto.

L. Mant. 211. Dill. elth. 120. t. 101. f. 120. Hab. in Africa. h

## TETRAGYNIA.

745. *PARNASSIA*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Nectaria 5, cordata, ciliata apicibus globosis. Caps. 4-valvis, 2-locularis. Recept. parietalia. Sem. membranaceo-marginata. G.

1. *palustris* (europaea), foliis radicalibus cordatis, nectariis multisetis. Engl. bot. t. 82. Flor. dan. t. 584. Hab. in pratis uliginosis. Aug. Stamina primo germini incumbunt, polline disperso eriguntur. T

2. *caroliniana*, fol. radicalib. suborbiculatis, nect. (appendicibus perigynicis) trisetis. Michaux. Flor. 1. p. 184. Hab. in Carolinae udis. T

3. *asarifolia*, radical. reniformibus petalis unguiculatis appendicibus trifidis. Vent. Malma. p. 39. t. 39. Hab. in Amer. septentrionali. Ex maximis. T

## PENTAGYNIA.

746. *ARALIA*. Involucr. umbellulæ. Cal. superus, 5-dentatus. Petala 5. Bacca coronata 5-sperma.

\* Foliis integris.

1. *arborea*, caul. arboreo, fol. simplicibus, umbel. radiis 1-glandulosis. Lin. Willd. 2. p. 1518. Jacq. Schoenbr. 1. p. 26. t. 51. Hab. in Jamaica.

2. *capitata*, arborea, fol. simplicibus ellipticis integerrimis, paniculis terminalibus, florib. sessilibus capitatis. Swartz. prod. 55. Jacq. amer. 89. t. 61. ed. pict. Hedera capitata. Smith. ic. pict. 1. p. 4. t. 4. Hab. in subalpinis Antillarum, Jamaicae, etc. h

3. *cordata*, herbacea, caule angulato villosa inermi, fol. simplicibus cordatis. Thunb. jap. 127. Hab. in Japonia. T

\*\* Foliis lobatis

4. *japonica*, frutescens, fol. lobatis. Thunb. jap. 128. Banks ic. Kaeimpf. t. 10. Hab. in Japonia. h

\*\*\* Foliis digitatis.

5. *pentaphylla*, arborea aculeata, fol.

quinatis. Thunb. jap. 128. Cum priore, in Japonia. h

6. *Sciodaphyllum*, arborescens, foliis digitatis, foliolis numerosissimis inaequalibus, racemo longissimo simplici nutante, pedunc. umbellatis. Willd. p. 1519. Swartz. prod. 55. *Sciodaphyllum*. Brown. jam. 195. t. 19. f. 1. Hab. in sylvaticis montium aliusinorum caeruleorum Jamaicae. h

\*\*\* *Foliis supradecompositis et decompositis.*

7. *spinosa*, arborescens, caule foliisque aculeatis, panicul. ramosissima umbel. numerosa. Michaux. Flor. 1. p. 186. Comm. hort. 1. p. 89. t. 47. Hab. in Virginia. h

8. *chinensis*, caule petiolisque aculeatis, foliolis inermibus villosis. Rheed. 2. t. 26. Hab. in China. Caul. in summitate tantum foliosus. h

9. *hispida*, humilis suffruticosa, caul. petiolisque setis hispidis, foliol. ovatis inermibus incis-serratis glabris. Vent. Hort. Cels. p. 41. t. 41. Michaux. Flor. 1. p. 185. Hab. in America boreal. a Quebec ad sinum Hudsonis. Fol. subtus albricantis. Umb. pedunculatae terminales et axillares. h

10. *humilis*, caul. annuo, fol. imparipinnatis: foliolis corlatis serratis acutis, flor. umbellatis. Cav. ic. 4. p. 7. t. 313. Hab. in N. Hispania. Caul. tuberculis fuscis variegatur.

11. *racemosa*, caule herbaceo laevi, fol. glabris, pedunc. axillaribus ramosis umbellatis. Willd. p. 1521. Michaux. p. 185. Coll. canad. 74. t. 75. Moris. s. 1. t. 2. f. 9. Hab. in Canada et altis Aleghanis montib. Foliol. cordata. h

12. *nudicaulis*, caule subnullo, foliis binis terratis. L. Pluck. alm. 98. t. 138. f. 5. Hab. in Virginia. Caul. et fere nullus. Scapus aphyllus, trifidus, s. umbellulas tres ferens. L. h

747. **GLOSSOPETALUM**. *Cal.* semiinferus, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala, petalis ligula adnata instructis. *Bacca* 5-sperma.

1. *glabrum*, fol. glabris. Willd. Sp. 2. p. 1521. *Gouppia glabra*. Aubl. guj. 1. p. 206. t. 116. Lam. ill. t. 217. Hab. in Gujana. h

2. *tomentosum*, fol. tomentosum. Willd. Aubl. guj. 1. p. 206. Hab. in Gujana. h

748. **STATICE**. *Cal.* 2-phyllus,

integer, plicatus, scarosus. *Petalata* 5. *Sem.* 1, superum.

\* **AMERICA.** *Scapo simplice, flor. capitatis, cal. communi polyphylo.*

1. *Armeria*, scapo (subhumili) piloso, fol. gramineis flaccidis. Hoffm. Flor. germ. p. 150. Engl. bot. t. 226. Hab. in montosis. In hortis ad arearum margines ornandos saepe colitur.

2. *humilis*, fol. linearibus brevibus rigidiusculis, bract. plerisque acutis: infimis acutis. Link. in Schrad. Journ. 1800. p. 61. St. hispanica minima juniperi folio, majore flore. Tournef. inst. p. 341. Hab. in Lusitaniae monte Gerez.

3. *arenaria*, caul. scapo longo, bract. 2-3 capitulo longiorib. fol. lineari b. rigidulis glabris. Hab. in arenosis. (Copiose prope Fontainebleau.) A priore, specie distincta videtur. Hujus loci videtur *Statice* elongata Hoffm. l. c., qui vero folia dicit hirsuta.

4. *cespitosa*, scapis brevibus aggregatis capitatis, fol. acerosis. Cav. ic. 1. p. 38. Quer. hisp. 6. t. 15. f. 1. S. fol. acerosis, propaguli. numerosis congestis. Ortega Dec. p. 121. S. juniperifolia. Vahl. symb. 1. p. 25. Hab. in Hispaniae montib. Carpentanis et Lusitaniae littoribus.

5. *alliacea*, scapo simplici capitato, fol. lineari-lanceolatis acutis trinerviis. Willd. p. 1520. Schousb. Maroc. p. 131. S. *alliacea*, scapo junceo capitato, fol. linearibus acutis, inferne angustatis. Cav. ic. 2. p. 6. t. 109. Hab. in Hispaniae montibus et locis arenosis region. Tingitanae.

6. *cephalotes*, scapo simplici capitato, fol. lanceolatis 9-nerviis. Schousb. p. 132. S. squamis calycinis ovatis acuminatis. Ait. Kew. t. p. 381. S. Pseud-Armeria. Murray. syst. Veg. 300. Desf. Atl. 1. p. 273. Hab. in Algarbia et Barbaria. Lacin. perianthii seta longa terminatae. D.

7. *lusitanica*, scapo simplici capitato, fol. ovato-lanceolatis. Poirret. it. St. *scorzoneraefolia*, fol. linearibus lanceolatis acutis trinerviis. Link. l. c. p. 60. Tournef. inst. p. 341. Jacq. hort. Vind. t. 42. Hab. in Barbaria et in Lusitania prope Cabo de Rocca. Planta magna speciosa. Flor. coccinei.

\*\* **LI-MON-TUM.** *Flor.* sparsis in scapo paniculato aut spicato s. caule folioso.

7. *fasciculata*, caul. frutescente inferne



nudo, scapo simplici capitato, fol. fasciculatis linearib. canaliculatis recurvis. Vent. Hort. Cels. p. 38. t. 38. Hab. in Lusitania ad littora maris. Caul. inferae nudus.

8. *graminifolia*, scapo paniculato, ramis triquetris, fol. linearibus canaliculatis. Ait. Kew. 1. p. 383. Hab. . . .

9. *Limonium*, scapo paniculato tereti, fol. laevibus enerviis undulatis, sub apice mucronatis. L. Flor. dan. t. 315. Engl. bot. t. 102. *Limonium maritimum majus*. Bauh. pin. 192. Hab. in Europae et Virginiae maritimis. Flor. cyanei.

10. *Gmelini*, scapo paniculato angulato, fol. oblongo-ovatis emarginatis planis cartilagineo-marginatis subtus mucronatis. Willd. p. 1524. Gmel. sib. 2. p. 220. t. 90. Hab. in Sibiria locis salsis. Simillima praecedenti, sed fol. firmiora obovata et flor. duplo minores. W. ¶

11. *scoparia*, scapo paniculato tereti, fol. oblongo-ovatis coriaceis mucronatis, subtus punctatis. Willd. Hab. in Sibiria. Similis sequenti sed non pilosa, scapi fere ut in *S. Limonio*. W. ¶

12. *latifolia*, scapo paniculato ramosissimo scabro, foliis pubescentibus, pilis fasciculato-stellatis. Smith. in Act. Soc. Linn. Lond. 1. p. 250. S. Coriaria. Pall. fl. taur. Hab. in Sibiria. Habitu ad *S. Limonium* accedit. ¶

13. *oleaeifolia*, scapo paniculato, ramis angulato-alatis, fol. lanceolatis mucronato-cuspidatis margine cartilagineis. W. p. 1525. Scop. delic. 1. n<sup>o</sup>. 11. t. 10. Barr. ic. t. 790. Hab. in Italia, Hispania.

14. *incana*, scapo paniculato, fol. lanceolatis trinerviis subundulatis apice mucronatis, paniculae ramis triquetris. L. Vahl. symb. 1. p. 25. Hab. in Arabia, inque Sibiria. Fol. radicalia, elliptico-lanceolata, incana, mucronata. ¶

15. *auriculataefolia*, scapo simplici ramoso tereti, apicis lateralibus terminalibusque secundis, fol. spatulatis acutis. Vahl. symb. 1. p. 25. Schousb. Maroc. p. 133. *Limonium lusitanicum auriculae ursi* folio. Tournef. inst. 342. Hab. ad littora maris Barbariae. ¶

16. *cordata*, scapo paniculato, fol. spatulatis retusis. Barr. ic. 805. Hab. ad maris Mediterranei littora. ¶

17. *scabra*, fol. radicalibus obovato-oblongis obtusis, ramis scabris. Thunb. prod. 54. Hab. ad Cap. b. spei.

18. *tetragona*, scapo paniculato tetragono, fol. obovatis. Thunb. prod. 54. Cum priore.

19. *reticulata*, scapo paniculato prostrato, ramis sterilibus retroflexis nudis, fol. cuneiformibus muticis. Engl. bot. t. 328. Smith. brit. 1. p. 342. Pluck. alm. 221. t. 42. f. 4. Boec. sic. t. 44. *β. dichotoma*, caule aphylo dichotomo, fol. spatulatis glabris, petalis basi coalitis. Cavan. diss. 1. p. 37. t. 50. Hab. in Melita, Hispania, Anglia et Sibiria. Flor. terminales fasciculati caerulei. Sm. ¶

20. *echioides*, fol. radicalibus obovatis, scapo paniculato, flor. remotiusculis sessilib. subarcuatis. Desf. Atl. 1. p. 274. Willd. p. 1527. Gouan. ill. t. 2. f. 4. Magnol. bot. 157. ic. Hab. Monspelii et in Barbaria prope Mascari ad rupe. Petal. angustissima. Cal. bractea tuberculosa involutus. Desf. ☉

21. *globulariaefolia*, fol. acuminatis horizontalibus, panic. laxa, racem. terminalih. secundis. Desf. l. c. Barrel. t. 793 et 794. S. ramosissima. Poir. ic. t. 2. p. 142. Hab. ad thermes prope Bone. Flor. albi. Fol. variant: radical. spatulata.

22. *spatulata (glauca)*, fol. radicalibus spatulatis obtusis glaucis integerrimis longe petiolatis, scapo tereti, flor. racemosis secundis. Desf. Atl. 1. p. 275. Cresc. in rupibus prope la Calle. Scap. superne ramosus: ramis paniculatis. D. ¶

23. *speciosa*, scapo ramoso tereti, ramis aequilatis alatis, floribus imbricatis, fol. obovato-cuspidatis mucronatis, margine cartilagineis. Willd. p. 1527. Gmel. sibir. 3. p. 221. t. 91. f. 1. Hab. in Tauria. ☿

24. *tatarica*, scapo ramoso divaricato, ramis triquetris, flor. distantibus, fol. lanceolato-obovatis mucronatis. Willd. Boerh. lugdb. 1. p. 76. t. 6. Hab. in Tataria. Var. flor. rubris et albis. ☿

25. *Echinus*, scapo paniculato, fol. subulatis mucronatis. L. Buxb. cent. 2. p. 18. t. 10. Hab. in Graeciae et Mediae desertis. Fol. imbricata, apice mucronato-spinosa.

26. *acerosa*, fol. lineari-subulatis rigidis pungentibus, scapo simplici spicato. Willd. in N. Act. Berol. 2. Hab. in Galatia.

27. *flexuosa*, scapo dichotomo corymboso-fastigiat., apicis capitatis, flor. imbricatis, fol. lanceolato-cuneiformibus obtusis mucronatis trinerviis. Willd. p. 1528. S. rosea. Pall. it. 3. p. 260. Hab. in Sibiria. ¶

28. *purpurata*, caule subfoliato, foliis obovato-uneatis trinerviis mucronatis. L. Thunb. prod. 54. S. peregrina. Berg. cap. 80. Hab. ad Cap. b. spei. Cal. purpurascens, radiis 5, sanguineis. Cor. purpurascens.

29. *longifolia*, caule paniculato scabro erecto, fol. obovato-linearibus. Hab. ad Cap. b. spei. †

30. *minuta*, caule suffruticoso folioso, foliis confertis cuneatis glabris muticis, scapis paucifloris. Bocc. sic. 26. t. 13. f. 3. Desf. Atl. p. 275. Pluck. alm. t. 200. f. 3. Hab. ad mare Mediterraneum et in Barbaria. Caul. caespitosi. †

31. *pectinata*, caule ramisque paniculatis triquetris, fol. obovatis petiolatis, spicis secundis. Ait. Kew. t. p. 385. Hab. in Canariis. †

32. *suffruticosa*, caule fruticoso : superne nudo ramoso, capitulis sessilibus, fol. lanceolatis vaginantibus. L. Gmel. sibir. 2. p. 216. t. 88. f. 2. 3. Hab. in Sibiria. †

33. *monopetala* (scabra), caule fruticoso folioso, flor. solitariis, fol. linearilanceolatis vaginantibus. L. Bocc. sic. 33. t. 17. Limonium fol. Halimi. Tournet. Inst. 342. Hab. in Sicilia, in Barbaria, in arenis salis. Gallas saepe fert. Fol. glauca aspera. †

34. *axillaris*, caule fruticoso folioso, panic. spicatis axillaribus, fol. lanceolatis vaginantibus. Vahl. symb. t. p. 26. t. 9. Forsk. descr. p. 58. Hab. in Arabia felici. †

35. *cylindrifolia*, caule fruticoso dichotomo, fol. teretibus vaginantibus. Vahl. l. c. t. 12. Hab. in Arabia, inque Africa boreali. †

36. *linifolia*, caule fruticoso prostrato, flor. paniculatis secundis, fol. linearibus. Linn. suppl. 187. Thunb. prod. 54. Hab. ad Cap. b. spei. †

37. *aurea*, caule fruticoso folioso ramoso, fol. subulatis. S. Limonium calycibus aureis. Aitm. ruth. 132. t. 18. f. 2. Hab. in Dauriae campis montosis. Cor. eleganter flava. †

38. *serulacea*, caule fruticoso ramoso, ramulis imbricatis paleis apice pilo terminatis. Pall. it. 3. p. 314. Desf. Atl. t. p. 276. Moris. s. 15. t. 1. f. 23. Pluck. alm. 221. t. 28. f. 4. Hab. in Barbaria, Lusitania, Hispania, in marijumijs. Ramuli imbricati paleis minutissimis. Flor. subimbricati, lutei. †

39. *pruinosa*, caule flexuoso ramoso furfuraceo. S. aphylla. Forsk. Habit. in Palestina. Caul. flexuosus.

40. *sinuata*, caule herbaceo ancipiti, fol. radicalibus lyratis, caulinis linearibus. Willd. Desf. Atl. t. p. 276. Clus. cur. 33. t. 33. β. Limonium africanum, caule alato, foliis integris hirsutis, petalo pallide flavo, calyce amoene purpureo. Mart. cent. 84. t. 84. Schousb. Maroc. t. p. 134. Hab. in Sicilia, Palaestina, Africa. Cal. violacei. Cor. flavescentes. †

41. *aegyptiaca*, caul. herbaceo, fol. radicalibus alternis pinnatifido-sinuatis, cor. lacin. intermediis linearib., perianth. communi bicorn. Viviani Hort. Di Negro Hab. in Aegypto.

42. *lobata*, fol. sinuatis, caulibus teretibus aphyllis. Hab. in Africa. Cal. albi. Cor. caeruleae.

43. *spicata*, caule nudo simplicissimo, spicis sessilibus alternis, fol. radicalibus sinuato-pinnatis. Gmel. sib. 2. p. 221. t. 91. f. 2. Willd. 2. p. 1532. Hab. in Persia. Radix tuberosa. Cal. et Petala alba. Gmel.

44. *mucronata* (crispa), caule crispato, fol. ellipticis integris, spicis secundis. Linn. suppl. p. 187. P'Herit. surp. t. p. 25. t. 13. Limonium peregrinum appendicibus crispis adhaerentibus. Pluck. alm. 221. Hab. in Barbaria ad versuras. Fol. radicalia petiolata elliptica mucronata. Spicae dimidiatae. Cor. rubrescentes.

749. LINUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. 5-valvis, 10-locularis. Sem. solitaria. (Filam. basi coalita.)

\* *Foliis alternis.*

1. *usitatissimum*, calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, fol. lanceolatis alternis, caule subsolitario. In cultis.

β. *humile*, cal. capsulisque mucronatis, petalis emarginatis, fol. lanceolatis alternis, caule ramoso. Mill. pict. n. 2. Habit. in Europa australi. ☉

2. *perenne*, calycib. capsulisque obtusis, fol. alternis lanceolatis integerrimis, caul. altis numerosis. Engl. bot. t. 40. Smith brit. t. p. 343.

β. *procumbens*, sylvestre caeruleum perenne procumbens flore et capitulo minore. Raj. angl. 3. p. 362. Hab. in Sibiria

et Anglia. Fol. subrecurva. Pet. subemarginata.  $\overline{\text{T}}$

3. *grandiflorum*, caul. basi ramoso, fol. angusto-lanceolatis, flor. laxo paniculatis, caps. mucronatis. Desf. Atl. 1. p. 278. t. 76. Hab. in arvis prope Mascar. Sp. pulcherrima petal. maximis roseis. D.

4. *viscosum*, calycibus acuminatis, fol. lanceolatis pubescentibus quinquenerviis, margine glandulosis. Willd. Linum sylvestre latifolium, caule viscoso, flore rubro. Bauh. pin. 214. Hab. in montib. Bononiensibus, Sumano, Augustae vindelicorum, Ingolstadtii. An var. sequentis?  $\overline{\text{T}}$

5. *hirsutum*, calycibus basi nervoso-striatis hirsutis acuminatis sessilib. alternis, fol. alternis hirsutis : ramis oppositis. Jacq. austr. t. 11. Scop. carn. ed. 2. t. 11. Lam. 1. c. p. 520. Moris. s. 5. t. 26. f. 5. Hab. in Austriac, Tatariae graminosis. Fol. floralia et calyces ciliati setis brevissimis, glandulosis. L.  $\overline{\text{T}}$

6. *aquilinum*, fol. alternis lanceolatis, pedunculis bifloris. Molin. chil. ed. germ. 126. Feuill. peruv. 2. t. 22. Hab. in montibus Chili.  $\overline{\text{T}}$

7. *narbonense*, calycib. acuminatis, fol. lanceolatis sparsis strictis scabris acuminatis, caul. tereti basi ramoso. Cal. magni, latere membranacei, apice quasi mucrone subulato instructi. L.  $\overline{\text{T}}$

8. *reflexum*, calycib. acuminatis, fol. ovato-lanceolatis acuminatis reflexis laevibus, filam. connatis. Ait. Kew. 1. p. 387. Hab. in Europa australi.  $\overline{\text{T}}$

9. *tenuifolium*, calycibus acuminatis margine glandulosis, fol. sparsis linearisetaeis retrorsum scabris. L. Jacq. austr. t. 215. Hab. in collib. aridis. Cor. rubro-sacrulesc.

10. *bicolor*, caul. simplicissimo, fol. confertis margine scabris, cor. lutea, fundo caeruleo, striis purpureis. Schousb. p. 135. In Barbata.

11. *angustifolium*, foliol. calycinis ellipticis subtrinerviis capsulisque acuminatis, fol. linearis-lanceolatis trinerviis, caul. numerosis. Smith. brit. 1. p. 344. L. *angustifolium*. Huels. Engl. bot. t. 387. Cresc. in pascuis praecipue maritimis in Anglia. Julio habitus. L. *tenuifolii*, sed cal. nequaquam glanduloso-ciliati. Styli subclavati. Sm.  $\overline{\text{T}}$

12. *decumbens*, caul. ascendente filiformi, fol. sparsis erectis subulatis laevibus mucronatis, flor. pedicellatis, cal. ovatis acutis. Desf. Atl. 1. p. 278. t. 79. Hab. in

regno Tunetano in arvis. Flor. primo vere. Cor. rosea. D.

13. *Selaginoides*, caulibus suffruticosis diffusis procumbentibus, fol. filiformibus conferto-sparsis, flor. sessilibus terminalibus. Lam. enc. 3. p. 504. Hab. in Brasilia in Montevideo.  $\overline{\text{h}}$

14. *prostratum*, flor. solitariis lateralibus brevissime pedunculatis, fol. alternis, caulib. prostratis ramosissimis. Lam. enc. 3. p. 504. Hab. in Peru in collibus siccis prope Limam. Fol. ovato-oblonga simillima *lis* Polycalae vulgaris. L.

15. *gallicum*, caul. ramosissimo, calycib. subulatis acutis, fol. linearis-lanceolatis alternis, paniculae pedunculis bifloris, flor. subsessilibus. Ger. prov. 421. t. 15. f. 1. Hab. Mompelii, circa Mans et in collib. prope Genuam. Viviani. Pistilla interdum tria.

16. *maritimum*, caul. sub simplici, calycibus ovatis acutis mucis, fol. lanceolatis trinerviis : inferiorib. oppositis. Jacq. hort. t. 154. In Austria ad Thermas badenses, Mompelii in Oriente et in Italia ad stagna marina.  $\overline{\text{T}}$

17. *corymbiferum*, fol. lanceolatis confertis erectis trinerviis retrorsum asperis, ramis filiformib. corymbosis, cal. subulato-mucronatis. Desf. Atl. 1. p. 279. t. 80. Hab. in Atlante prope Majane. Cor. lutea. L. usitatissimi magnitudiue.

18. *tenuis*, fol. linearib. acutis, ramis laxo paniculatis filiformib., flor. pedicellatis, cal. mucronato corollis quadruplo brevioribus. Desf. 1. c. t. 81. Hab. in Algeria collib. Differt a L. *gallico* coroll. quadruplo majoribus.  $\odot$

19. *virgatum*, cal. linearis-subulatis acutis, fol. linearis-lanceolatis alternis, caul. ramoso virgato. Schousb. Maroc. ed germ. 1. p. 136. Hab. in aggerib. et ad versuras prov. Hahae. Cor. lutea. Flor. 1-laterales.

20. *alpinum*, calycib. rotundatis obtusis, fol. linearibus acutiusculis subreflexis, caulibus declinatis. Jacq. austr. 4. t. 321. Zanon. hist. p. 146. t. 107. Lam. enc. 3. p. 521. Hab. in Austria alpibus. Flor. caerulei.  $\overline{\text{T}}$

21. *austriacum*, calycib. rotundatis obtusis, fol. linearibus acutis rectiusculis. L. Hab. in Austria inferiore, Palatinatu.  $\overline{\text{T}}$

22. *virginianum*, calycib. acutis alternis, capsulis mucis, panicula filiformi, fol. alternis lanceolatis : radicalib. ovatis. L. Hab. in Virginia, Pennsylvania ad Carolinam. Fol. linearis-lanceolata sparsa rarius opposita. Michaux. Flor. 2. p. 36.

21. *monopetalum*, cor. monopetalis quinquefidis. Steph. enum. mosq. n° 214. Hab. in Russiæ sylvis trans Occam. Refert. L. flavum. +

22. *strictum*, flor. glomeratis terminalib. calycib. subulatis, fol. lanceolatis strictis mucronatis: margine scabris. L. Desf. Atl. t. p. 278. L. sessiliflorum. Lam. enc. 3. p. 523. Hab. in Europa australi, et Barbaria. ♂

β. *alternum*, caul. superne corymboso, flor. alternis. Lam. l. c. Schousb. p. 138.

γ. *spicatum*, caul. simplicissimo, flor. spicatis. Lam. Tournef. p. 340. In Lusitania.

23. *monogynum*, fol. alternis linearilanceolatis trinerviis, caule suffruticoso. Forst. prod. n° 145. Hab. in N. Zelandia. h

24. *suffruticosum*, fol. linearib. acutis scabris, caul. suffruticosis. Lin. Cavan. ic. 2. p. 5. t. 108. Borell. ic. 1231. Hab. in regno Valentino. h

25. *salsaloides*, caul. basi fruticulosus imbricato-foliosus, superne nudiusculis filiformibus, fol. subulatis triquetris. Lam. enc. 3. p. 521. β. *crispum*, Lin. sylvestre fruticosum crispum hispanicum, parvo flore albo. Borell. ic. 765. Hab. in Hispania. Rad. lignosa, magna. Caps. minimae, acuminate. Fol. brevia. Lam.

26. *striatum*, fol. alternis subovatis: nervo marginibusque decurrentibus, flor. terminalib. Walt. Flor. Carol. p. 118. Gmel. Syst. N. Lin. II. p. 514. Hab. in America. Distincta species fol. majusculis brevi-ovatis erectis Camp. hybridae fere similibus.

27. *arborescens*, fol. cuneiformibus, caul. arborescentibus. Schreb. in Nov. Act. A. N. G. III. p. 478. Alp. exot. 19. t. 13. Hab. in Creta, Italia. h

28. *campanulatum*, fol. spatulatis: basi utrinque punctata glandulosa. L. flor. subsessilib. cal. longis acutis. Lam. enc. 3. p. 524. Willd. p. 1540. L. sylvestre luteum, fol. subrotundis. Bauh. pin. 212. Lob. ic. 414. Earell. ic. 820. Hab. in Galloprovinciae montibus, in Italia et in Russia, locis aridis.

29. *flavum*, cal. subserrato-scabris lanceolatis subsessilib., panic. ramis dichotomis. Jacq. austr. 3. t. 214. Lam. l. c. Hab. in Austria et Oriente. Petal. flava, lineis croceis. Var. prioris?

# \*\* *Foliis oppositis.*

30. *africanum*, foliis oppositis linearilanceolatis, flor. terminalibus pedunculatis. Hab. ad Cap. b. spei. Petala lutea unguibus villosis. h

31. *aethiopicum*, fol. oppositis ovatis mucronatis, caule fruticoso. Thunb. prod. 57. Hab. ad Cap. b. spei. h

32. *nodiflorum*, fol. floriferis oppositis lanceolatis, flor. alternis sessilibus calycib. longitudine florum. Lin. L. luteum ad singula genicula florum. Bauh. pin. 214. Moris. s. 5. t. 6. f. 11. Column. ceph. 2. t. 80. Hab. in Italiae pratis argillosis. Cor. flavescens.

33. *catharticum*, fol. oppositis ovato-lanceolatis, caule superne dichotomo, cor. acutis. Engl. bot. t. 382. Curt. Lond. ic. Blackw. t. 368. Hab. in nemorosis et pascuis succulentis. Flor. albi, nondum evoluti penduli. ☉

34. *setaceum*, caul. dichotomo paniculato, fol. setaceis subserrato-scabris subverticillatis, cal. foliolis ovato-lanceolatis ciliatis. Brotero Phytogr. Lusit. n° 22. t. 6. Hab. in collib. calcareis circa Coimbra in Lusitania.

35. *quadrifolium*, foliis quaternis L. Houtt. 6. t. 46. f. 1. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei.

36. *verticillatum*, fol. verticillatis. Boeckm. 2. p. 49. t. 42. Barr. t. 1226. Hab. in Italia. Calyc. et fol. superiora villosa.

750. **ALDROVANDA.** Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 5-valvis, 1-locularis, 10-sperma.

1. *vesiculosa*. Lin. Lam. ill. t. 220. Lenticula palustris indica, fol. subrotundis binis capillamentis ad imum barbatis. Pluck. alm. 211. t. 41. f. 6. Hab. in Italiae et Indiae padulis.

751. **DROSERA.** Cal. 5-fidus. Petala 5. Caps. 1-locularis: apice 3-5-valvis. Sem. plurima. (Styli etiam 6. Fol. pilis glandulosis obsita.)

1. *acaulis*, flore radicali exscapo solitario, fol. oblongis. Lin. suppl. 188. Willd. Sp. 2. p. 1543. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *rotundifolia*, scapis radicatis, fol. orbiculatis. Flor. dan. t. 1028. Roth. germ. II.

p. 373. Hab. in Europae, Americae paludosis. Styl. 6. Smith. ☉

3. *longifolia*, scapis radicatis, fol. obovatis oblongis, stigmatib. emarginatis. D. *intermedia*, scap. ascendentiul. fol. ovalibus. Hayne apud Schrad. bot. Journ. 1800. p. 37. Moris. s. 15. t. 4. f. 2. Hab. in locis uliginosis. Var. styl. 9. Smith. Fol. elliptica. ☉

4. *anglica*, fol. oblongis obtusis, flor. 8-gynis, caps. 4-valvibus. Smith. Flor. brit. t. p. 347. D. *anglica*, scapis radicatis erectis, fol. obverse lanceolatis, stigmatib. clavatis. Roth. N. Bot. Beytr. p. 184. Moris. s. 15. t. 4. f. 1. D. *longifolia*. Hayne l. c. p. 40. et plur. auctor. Hab. in paludosis. Styl. 3, profunde bifidi. H.

5. *cuneifolia*, scapis radicatis calycibusque hirsutis, fol. obovato-cuneiformibus. Willd. p. 1544. Hab. ad Cap. b. spei. D. rotundifolia sed major. Fol. reticulato-venosa crassiuscula.

6. *Burmanni*, scapis radicatis calycibusque glabris, fol. spatulatis sessilibus. Vahl. symb. 3. p. 50. Burm. zeyl. t. 94. f. 2. Hab. in Zeylona et Cochinchina. A praecedente distincta: fol. tenuioribus trinerviis, scapo glabro, flor. minorib. W.

7. *capensis*, scapis radicatis, fol. lanceolatis subtus scabris. D. fol. ad radicem longissimis, flor. spicatis. Burm. afr. 209. t. 75. f. 1. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei. Radix exserens fila spiralia. Flor. violacei.

8. *Lusitanica*, scapis radicatis, fol. subulatis subtus convexis, flor. subumbellatis decandris. L. Moris. s. 15. t. 4. f. 4. Pluck. alm. 323. t. 117. f. 2. Cav. in Annal. d. scienc. natur. p. 43. Hab. in Lusitania.

9. *cistiflora*, caule simplici folioso, fol. lanceolatis. J. Burm. afr. 210. t. 75. f. 2. Brey. prodr. 3. t. 22. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. fundus et Stamina nigra. Styl. nigri, apice dichotomi usque in capillos. L.

10. *indica*, caule ramoso folioso, fol. linearibus. Burm. zeyl. 207. t. 94. f. 1. Rheed. 10. t. 20. Hab. in India.

11. *peltata*, caule subramoso, fol. triangularibus longe petiolatis peltatis. Willd. p. 1546. Hab. in N. Hollandia. Caul. flexuosus (foliosus.) Racemus terminalis. W.

12. *pedata*, foliis pedatis. Cresc. cum priore. Née. Villi in Herbario D. Thibaut. Fol. laciniæ longe distant, longissimæ, di-

chotomæ glandulosæ; petiol. longissimi. Flor. corymbosi. An hujus generis?

752. GISEKIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 5, approximatae, subrotundæ, 1-spermae.

1. *pharnacioides*. L. Lam. ill. t. 221. Koelreutera molluginoides. Murray. in Comm. N. Goett. 3. p. 67. t. 2. f. 1. Hab. in India orientali. Caul. decumbentes. Umb. multiflora. Flor. deorsum penduli. L.

753. LAROCHEA. Cal. 1-phyllus, 5-fidus. Cor. 1-petala infundibuliformis, 5-fida. Squamæ 5 ad basin germinis. Caps. 5.

1. *coccinea*, fol. ovatis planis cartilagineo-ciliatis, basi connato-vaginantibus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1547. sub *Crassula*. Decand. et Redouté, Plant. grass. ic. Knorr. Delic. t. 1. B. 2. Brail. succ. 5. p. 7. t. 50. Flor. terminales aggregati: tubo longo.

2. *falcata*, fol. oppositis subconnatis glabris, in falcem inflexis. Rochea. Decand. l. c. ic. Crass. retroflexa. Meerb. ic. pl. Lugd. Hab. uti prior ad Cap. b. sp. Flor. glomerato-corymbosi in pedunc. dichotomis axillarib. Cor. coccinea: tubo breviusculo pallido.

Obs. Genus hocce dicatum memoriae D. Delarochæ, auctoris monographiae de Ixiis et Gladiolis.

754. CRASSULA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Squamæ 5 nectaniferae ad basin germinis. Caps. 5. (In aliquibus speciebus una pars demitur aut additur.)

\* Frutescentes.

1. *cymosa*, fol. linearib. cartilagineo-ciliatis connato-vaginantibus, caule fruticoso, cyma terminali. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1548. C. fol. perfoliatis lanceolato-subulatis ciliatis patulis, caule simplici, panicula composita. Thunb. prod. p. 55. Hab. ad Cap. b. spei cum plerisque speciebus. ¶

2. *flava*, fol. planis connato-perfoliatis laevibus, flor. corymboso-paniculatis. J. Burm. afr. 38. t. 23. f. 2. Pluck. alm. 340. t. 314. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *pubescens*, fol. connatis ovatis acutis villosis, caule ramoso, florib. corymbosis. Lin. suppl. 190. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *pruinosa*, foliis subulatis pruinoso-scabris, flor. corymbosis, caule fruticoso. Mant. 60. Hab. in Cap. b. spei. h

5. *scabra*, fol. oppositis patentib. connatis scabris ciliatis, caule retrorsum scabro. L. Dill. elth. 117. t. 95. f. 117. Panic. composito.

6. *corallina*, fol. connatis deltoideis obtusis, caule tecto, flor. umbellatis. Lin. suppl. 188. Hab. ad Cap. b. spei. h

Obs. *C. vestita* et *corollina* mira structura foliorum, similes Corallinis Zoophytorum. L.

7. *vestita*, fol. connatis deltoideis obtusis, caule tecto, floribus terminalibus capitatis. Lin. suppl. 188. Hab. ad Cap. b. spei. h

8. *argentea*, fol. connatis ovatis integris argenteis, caule tecto, corymbo supradecomposito. Lin. Hab. ad Cap. b. spei.

9. *perfoliata*, fol. lanceolato attenuatis crassis connatis canaliculatis, subtus convexis. L. Mill. dict. Plant. grass. ic. Dill. elth. 114. t. 96. f. 113. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei. h

10. *perfoliata*, fol. opposito-perfoliatis ovatis, caule simpliciter, flor. pedunculato-subverticillatis. Lin. suppl. 190. Caul. rubicundi nudiusculi. Flor. glomerati parvi.

11. *fruticulosa*, fol. oppositis subulatis acutis patentibus subrecurvatis, caule fruticoso. Lin. p. *C. caffra*. L. Mant. 222. Flor. parvi, albi, campanulati.

12. *ramosa*, fruticosa, foliis subulatis supra planis connatis-perfoliatis laevibus patentissimis, pedunc. elongatis, flor. cymosis. Ait. Kew. 1. p. 350. *C. dichotoma*. Lin. suppl. 188. h

13. *mollis*, fol. connatis tereti-trigonis glabris mollibus remotis, caule recto simpliciter, panicula trichotoma supradecomposita. Thunb. prod. 55. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *tetragona*, fol. subulatis sul incurvis obsolete tetragonis patentibus, caule erecto arborescente radicante. L. Plant. grass. ic. Pedunc. dichotomi. Cor. alba. Bradl. succ. 5. p. 19. t. 11. f. 41. Hab. in Aethiopia. Caul. radicat fibris. Cyma trifida, ramosissima, fastigiata. Cor. albae. L. h

15. *muricata*, fol. connatis trigonis ciliatis-scabris, ramis tetragonis, caule frutescente. Thunb. prod. 55. Hab. ad Cap. b. spei. h

16. *imbricata*, fol. ovatis acutis quadrefariam imbricatis laevibus, floribus axillaribus sessilibus. Ait. Kew. 1. p. 393. Hab. ad Cap. b. spei. h

17. *obovata*, fol. connatis oppositis sublancoatis cultratis approximatis. Lin. Mant. 61. Plant. grass. ic. Simillima sequenti. Petala spathulata, apice aristata globo, ut in sequenti, nec explicanda. L. Caul. et fol. subpurpurascens.

18. *cultrata*, fol. oppositis obovatis subcultratis obliquis connatis integerrimis. Ait. Kew. 1. p. 393. Dill. elth. 115. t. 97. f. 114. Hab. in Aethiopia. h

19. *portulacacea*, fol. ovalibus carnosissimis oppositis punctatis, caul. arboreo, flor. paniculatis. Lam. enc. 2. p. 172. Plant. grass. ic. Cor. magna carnea. Facie Claytoniae Portulacariae.

20. *obliqua*, fol. oppositis ovatis obliquis integerrimis acutis distinctis, margine subcartilagineis. Ait. Kew. p. 393. Hab. ad Cap. b. spei. h

21. *spathulata*, fol. petiolatis cordato-subrotundis acutiusculis tenuiter crenatis, corymbis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 395. Plant. grass. ic. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. patens rubra. h

22. *punctata*, fol. oppositis ovatis punctatis ciliatis, inferioribus oblongis. L. Corymbi axillares brevissimi fastigiat. Cor. alba. h

23. *perfoliata*, fol. connatis-perfoliatis cordatis punctatis. Scop. Del. insubr. 3. p. 12. t. 6. *C. perfoliata*. Lam. enc. 2. p. 114. t. 220. f. 2. Plant. grass. Fol. margine rubentia.

24. *marginalis*, caule fruticoso, fol. cordatis perfoliatis acuminatis planis patentibus intra marginem punctatis. Ait. Kew. 1. p. 356. Hab. ad Cap. b. spei. h

25. *cordata*, caule fruticoso, fol. petiolatis cordatis obtusis integerrimis, cymis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 396. h

26. *laetea*, caule fruticoso, fol. ovatis basi attenuatis connatis integerrimis, intra marginem punctatis, cymis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 406. Plant. grass. ic. Cyma magna subthyrsoides. Flos. terminalis saepius 6-petalus.

27. *arborescens*, fol. subrotundis carnosissimis supra punctatis, caule arboreo. C. Crotyleton. Murr. syst. veg. 305. Jacq. misc. 2. p. 295. t. 19. h

28. *rupestris*, fol. connatis ovatis integris glabris, corymbo supradecomposito. Lin. suppl. 189.

29. *pinnata*, fol. pinnatis, caule arboresco. Lin. suppl. 191. Hab. in China. h

**\*\* Herbacea.**

30. *spinosa*, caule simplicissimo, fol. mucronatis, flor. sessilibus lateralibus. L. Gmel. sib. 4. p. 173. t. 67. f. 2. Cotyledon spinosa. Murray. in Nov. Comm. Goett. tom. 7. p. 33. t. 5. Hab. in Sibiria.

31. *retroflexa*, fol. connatis oblongis remotis planis, caule simplici, cyma composita, pedicellis retrofractis. Lin. suppl. p. 188. Var. flore rubro et luteo.

32. *lineolata*, caule herbaceo, fol. cordatis sessilibus, pedunc. subterminalibus axillaribus approximatis umbelliformibus. Ait. Kew. 1. p. 331. ♂

33. *centauroides*, caule herbaceo dichotomo, fol. sessilibus oblongo-ovatis cordatis planis, pedunculis axillaribus unifloris. Ait. Kew. 1. p. 392. Caul. brachiatus.

34. *dichotoma*, caule herbaceo dichotomo, fol. sessilibus ovato-oblongis canaliculatis recurvatis, pedunculis axillaribus unifloris. Ait. Kew. 1. p. 392. Herm. lugdb. 550. t. 553. Hab. in Aethiopia. ☉

35. *glomerata*, patula, caule herbaceo dichotomo scabro, fol. ovato-lanceolatis crassis, flor. ultimis fasciculatis. L. Plant. grass. ic. Caul. palmatis, scaber, purpurascens. Flor. conferti in capitula, ut in Valeriana, Sclerantho. Petala calyce triplo minora. L. Var. caul. scabrido.

36. *pulchella*, caule herbaceo dichotomo, fol. ovato-oblongis carnosius reflexis, flor. in dichotomiis pedunculatis, pedunculis turbinatis. Ait. Kew. 1. p. 392. Affinis priori, differt: cor. calyce fere longioribus.

37. *strigosa*, caule herbaceo erecto dichotomo, fol. obovatis strigosis, pedunculis unifloris. L. Syst. Veg. p. 252. Hab. in Aethiopia.

38. *muscosa*, caule herbaceo prostrato, fol. oppositis ovatis gibbis imbricatis, flor. sessilibus solitariis. L. C. fol. connatis ovatis acutis quadrifariam imbricatis, flor. lateralibus. Thunb. prod. 54. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei.

39. *pyramidalis*, fol. connatis ovatis obtusis quadrifariam incumbentibus, capi-

tulis sessilibus. Lin. suppl. p. 189. Planta pulchra quadrangularis.

40. *columnaris*, caule pollicari, fol. rotundis imbricatis, fasciculo subrotundo terminali. Lin. suppl. 191. Burm. afr. 19. t. 9. f. 2.

41. *hemisphaerica*, fol. connatis subrotundis ciliatis hemisphaerice imbricatis, caule aphylo thyrsifloro. Thunb. prod. 57.

42. *aloides*, fol. ovatis distinctis acutis ciliatis, caule simplici pilosiusculo, racemo composito, ramis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 394. Pedunc. divisi in cymas trichotomas.

43. *capitella*, fol. oblongo-lanceolatis acutis connatis ciliatis, caule laevi, racemo elongato, flor. fasciculatis subsessilibus. Ait. Kew. 1. p. 394. Lin. suppl. 190. ♂

44. *Cotyledonis*, fol. connatis oblongis tomentosis ciliatis, caule subnudo, flor. corymbosis aggregatis. Lin. suppl. 190.

45. *barbata*, foliis connatis articulatis barbatis hemisphaericis imbricatis, caule subrotundo, flor. verticillatis. Lin. suppl. p. 188.

46. *ciliata*, fol. oppositis ovalibus planiusculis distinctis ciliatis, corymbis terminalibus. Lin. Plant. grass. ic. Dill. elth. 116. t. 98. f. 116. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei. Cor. flava.

47. *odoratissima*, fol. oppositis amplexicaulibus linearibus ciliatis, flor. capitatis. Andrew Repos. t. 26. Ad Cap. b. spei. Flor. lutei, odoratissimi praesertim nocte.

48. *thyrsiflora*, fol. perfoliatis ovatis ciliatis patulis, corymbo composito attenuato. Lin. suppl. p. 90.

49. *spicata*, fol. connatis lineari-subulatis, scapo subnudo, spica verticillata, verticillis inferioribus remotioribus. Lin. suppl. p. 189.

50. *subulata*, fol. subulatis teretibus patentibus, caule herbaceo. L. Pet. gaz. t. 89. f. 8. Herm. lugdb. t. 552.

51. *acutifolia*, fol. oppositis carnosius tereti-subulatis patentibus, cyma parva pedunculata. Lam. enc. 1. p. Plant. grass. ic. Hab. . . Differt a priori flor. pedunculo nudo indidentibus.

52. *alternifolia*, fol. serrato-dentatis planis alternis, caule simplicissimo, flor. pendulis. L. Burm. afr. 58. t. 24. f. 1. Hab. in Aethiopia.

53. *rubens*, fol. fusiformibus subdepressis, cyma quadrifida foliosa, flor. sessilibus, staminibus reflexis. L. Plant. grass. ic. Solum caule hirsuto, ramis simplicibus, floribus in alis sessilibus. Hall. hist. n. 8. 960. Scheuchz. it. 1. p. 48. t. 6. f. 3. 4. Lachenal. Act. helv. 7. p. 331. t. 11. Hab. in sylvaticis et ad rupes. Facie Sedi.

54. *cespitosa*, caule subulviso, foliis globoso-subrotundis imbricatis, flor. terminalibus sessilibus. Willd. p. 1560. Cav. ic. 1. p. 50. t. 63. f. 2. Hab. in Hispania. ☉

55. *minima*, fol. petiolatis subrotundis integris, pedunc. unifloris. Thunb. prod. 57.

56. *moschata*, caule herbaceo procumbente, fol. connatis oblongis acutis, pedunculis axillaribus unifloris, flor. tetrandris. Willd. p. 1561. Forst. in Comment. Soc. Goett. 9. p. 26. Hab. in Terra del Fuego.

*Obs.* Forte a *Crassulis* distincta ob singularem filamentorum situm. Willd.

57. *verticillaris*, caule herbaceo, fol. patentibus, flor. verticillatis aristatis. L. Tillaea erecta. Hort. ups. 24. Hab. in Europa australi. Caul. ramosissimus, diffusus. ☉

58. *expansa*, fol. semicylindrico-subulatis supra canaliculatis patentibus, pedunc. axillaribus solitariis unifloris, caul. dichotomis. Ait. Kew. 1. p. 350.

59. *dentata*, foliis petiolatis cordatis. dentatis. Thunb. prod. p. 57.

60. *nudicaulis*, fol. subulatis radicalibus, caule nudo. Dill. elth. 116. t. 99. f. 115. Hab. in Aethiopia. ☿

61. *tecta*, foliis connatis ovatis obtusis cinereo-lamellosis, scapo nudo, capitulo terminali. Lin. suppl. 190.

62. *cephalophora*, fol. connatis lineari-oblongis obtusis integris, capit. lateralibus pedunculatis. Linn. suppl. 190.

63. *montana*, fol. connatis ovatis acutis ciliatis, caule subnudo, flor. aggregatis. Lin. suppl. 189.

64. *turrita*, f. l. connatis quadrifariam imbricatis ovato-oblongis acutis ciliatis. Lin. suppl. 189. ☉

65. *alpestris*, fol. connatis ovatis acutis quadrifariam imbricatis, capitulis pedunculatis, caule folioso. Lin. suppl. 189.

66. *marginata*, fol. connatis ovatis marginine membranaceis, pedunculis unifloris, caule debili. Thunb. prod. 56.

67. *tomentosa*, villosa-scabra, foliis connatis lanceolatis villosis ciliatis, caule subnudo terminato, spica verticillata. Lin. suppl. p. 190. Thunb. prod. 56.

68. *crenulata*, fol. connatis lanceolatis punctato-crenulatis, caule folioso ☿ comyno decomposito. Lin. suppl. 189.

69. *deltoides*, fol. connatis deltoidibus patulis acutis, caule tecto, flor. corymbosis. Lin. suppl. 189. Fol. ut in *Mesembr. deltoides*.

70. *orbicularis*, sarmentis proliferis determinate foliosis, foliis patentissimis imbricatis ciliatis. Plant. grass. ic. Dill. elth. 119. t. 100. f. 118. Caul. nullus, sed propagines repentes orientes e fol. rosulis. Dec.

71. *sparsa*, fol. alternis subspathulatis acutis integerrimis, racemo composito. Ait. Kew. 1. p. 395.

72. *diffusa*, fol. oblongis basi attenuatis remote crenatis, pedunc. oppositifolii axillaribusque solitariis. Ait. Kew. 1. p. 395.

73. *prostrata*, decumbens pellucida, fol. lanceolatis acutis. Thunb. prod. p. 54.

74. *pellucida*, fol. subpetiolatis ovato-lanceolatis, filiformi diffuso-pellucido. Thunb. prod. 54. Dill. elth. 119. t. 100. f. 119. Hab. ad Cap. b. sp. cum prioribus.

755. COMMERSONIA. *Cal.* monophyllus, corollifer. *Petala* 5. *Nect.* 5-partitum. *Caps.* 5-locularis, echinata.

1. *echinata*. Linn. suppl. 189. Lam. ill. t. 218. Rumph. 3. t. 119. Hab. in insulis Societatis. Arbor fol. alternis oblique ovatis, subtus canis. Flor. minuti paniculati cani. L. h

756. SIBBALDIA. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5, calyci inserta. *Styli* e latere germinis. *Sem.* 5.

1. *procumbens*, fol. ternatis: foliolis superne glabris subtus pilosis, flor. corymbosis, petal. lanceolatis acutis longitudine calycis. Willd. in Act. Soc. Ber. 2. S. *procumbens*, fol. tridentatis. Lin. Flor. Lapp. 111. Flor. dan. t. 32. Hab. in alpinis. ☿

2. *parviflora*, procumbens, fol. ternatis: foliolis utrinque strigoso-pilosis tri-



# PENTANDRIA POLYGYNIA.

341

*dentatis*, flor. glomerato-capitatis, petal. obovatis, cal. duplo brevioribus. Willd. in Act. Soc. Ber. v. 2. *Fragaria orientalis*, flore luteo minimo. Tournef. Cor. 21. Hab. in Capadocia.

3. *erecta*, erecta, foliolis linearibus multifidis. Gmel. sib. 3. p. 186. Amm. ruth. 112. t. 15. Hab. in Sibiria.

4. *altaica*, erecta, foliis linearifiliformibus tripartitis. Willd. p. 1567. Lin. suppl. 191. Pall. in Act. petrop. 1773. t. 18. F. 2. Hab. in albis Altaicis Sibiriae. Flor. purpurei. ¶

## DECAGYNIA.

757. *SCHEFLERA*. Cal. 5-dentatus, superus. Petala 5. Caps. 8-10-locularis: loculis monospermis.

1. *digitata*. Forst. gen. 23. Willd. p. 1568. Lam. ill. t. 221. Hab. in N. Zeelandia. Araliac species. Dryand.

## POLYGYNIA.

758. *MYOSURUS*. Cal. 5-phyllus, deciduus, basi porrectus. Nect. (Petala) 5, lingulata, petaliformia. Sem. numerosa, in receptaculo longo caudæformi.

1. *minimus*, fol. integerrimis linearibus.

Flor. dan. t. 406. Lam. ill. t. 221. Hab. in collibus apricis et agris. Vere. Variat stam. 5-8. Petala antheriformia. ©

759. *CERATOCEPHALUS*. Cal. 5-phyllus, persistens. Petala 5, poro ad unguis mellifero, squamula tecto. Semina plurima, paria dorso adnata rostro acinaciformi. Receptaculum demum elongatum, spicæforme.

1. *falcatus*. scapo erecto 1-floro, fol. radicalibus cuneiformib. tripartito-multifidis. Ceratocephala spicata. Moench. meth. pl. p. 218. Ranunculus falcatus. Lin. Willd. Sp. II. 2. p. 13. Ran. ceratocephalus. Moris. s. 4. t. 28. f. 22. Bocc. sic. t. 14. f. 3. Jacq. Flor. austr. t. 48. Habitat inter segetes Europ. australioris et in Oriente. Quoad scapum antecedenti generi affinis. Var. Stam. 5-8. ©

Obs. An cum *Myosuro* conjungi potest?

760. *ZANTHORHIZA*. Cal. 6. Petala 5. Nectaria 5, pedicellata. Caps. 5, monospermæ.

1. *apifolia*. L'Herit. stirp. 1. p. 79. t. 38. Hab. in Nova Georgia et Carolina. Frutex humilis. Fol. Flor. atro-violacei paniculati. ¶

## MONOGYNIA.

Exacæ quaedam. Prinos. Rubiac et Crucianellac nonnullæ. Pavetta pentandra. Oldenlandia pentandra. Loranthe quaedam species. Cornus albida. Frankenia laevis. Polycnemum oppositifolium. Caesalpinia Crista, pentandra. Cassia pilosa, serpens, nictitans, Chamaecrista, Guilandinae s. Hyperantherae quaedam. Ceratonia Siliqua. Bombax pentandrum. Polygonum amphibium, Lapathifolium. Samara floribunda, pentandra. Passerina pentandra. Trianthema crystallina. Citharexylum pentandrum.

## DIGYNIA.

Apocynaceæ, nonnulla genera secundum Linné. Oldenlandia digyna. Zizyphi (Rhamnus). Cissus hederacea, Ampelopsis, stans (Vitis arborea. L.) Brunia nodiflora, paleacea (quæ digynæ). Polygonum filiforme. Scleranthus annuus. Trianthema 5-andra. Polygonum virginianum, etc.

## TRIGYNIA.

Polygonum ocreatum. Hydrolea trigyna. Minuartia montana. Arenaria rubra,


tenuifolia. Rhamnus Paliurus. Celastrus. Euphorbia antiquorum, maculata, articulata, cyparissias? Aralia capitata. Salsola salsa, fruticosa. Xylophyllae. Lin.

# P E N T A G Y N I A.

Spergula arvensis, pentandra. Cerastium pentandrum, semidecandrum. Suriana maritima. Mesembryanthemum pinnatifidum. Erodium. Actinophyllum pentandrum. Maherniac. Lin.

# P O L Y G Y N I A.

Ranunculus hederaceus.



## C L A S S I S VI.

## H E X A N D R I A.

## M O N O G Y N I A.

761. MUSA. *Spatha* supera. *Cor.* 2-petala : petalo altero erecto 5-dentato, altero concavo nectarifero. *Stam.* 6 quorum nunc 1, nunc 5 perfecta (ex Linnæo), *Bacca* oblonga, triquetra, polysperma.

1. *paradisica*, spadice nutante, flor. masculis persistentibus. Lin. Trew. Ehr. t. 18-20. M. clifortiana. Lin. Mus. 1. t. 1.  $\beta$ . fructu majore. Plum. N. genera p. 24. Hab. in utraque India et Africa. In caldariis communiter colitur.  $\mathcal{T}$

2. *sapientum*, caudice maculato, spadice nutante, flor. masculis deciduis. Lin. Trew. Ehr. 4. t. 21-23. Sloan. Jam. hist. 2. p. 147. Hab. in Amer. orientali.

3. *trogodytarum*, spadice erecto, spathis deciduis. Lin. M. uranoscopus. Rumph. 5. p. 137. t. 61. f. 2. Hab. in Moluccis. Fruct. parvus, irregularis rubicund. striis nigricantibus.  $\mathcal{T}$

4. *coccinea*, spadice erecto, flor. capitatis, spatis confertis coccineis maximis apice luteis. Andrew. t. 47. Hab. in China, Sumatra, Java, etc. *Stam.* 5. Germin ovatum, laeve. Stigm. capitatum, laeve.

5. *humilis*, spadice subsexfloro, bacca violacea. Aubl. Guj. 2. p. 931. Hab. in Gujana.  $\dagger$

*Obs.* De priore hujus generis specie consulti meretur C. Medicus Pflanzen-Physiologische Beobachtungen. 1803. Secundum ejus aliorumque observationes hoc genus melius ad Pentandriam transferri debet.

762. URANIA. *Cal.* 6. *Cor.* tripetala. *Nectar.* 2-phyllum : foliolo altero bifido. *Capr.* infera, trilocularis, polysperma. *Semina* biseriata, arillo tecta.

1. *speciosa*. Willd. Sp. pl. II. 1. p. 7. Ravenalia madagascariensis. Sonner. it. ind. t. 124. 125. Juss. gen. Jacq. hort. Schoenb. 1. t. 93. Hab. in Madagascar locis padulosis. Arbor facie Musae vel Heliconiae, altissima.  $\mathcal{h}$

763. BROMELIA. *Cal.* 3-fidus, superus. *Petala* 3. Squama nectarifera ad basin petali. *Bacca* trilocularis.

1. *Ananas*, fol. ciliato-spinosis mucronatis, spica comosa. L. Willd. Sp. II. p. 7. Comm. hort. 1. t. 57. Trew. Ebr. t. 2. Blackw. t. 567.  $\beta$ . *inermis*, fructu comoso, fol. inermibus. Ananas lucide virens, folio vix serrato. Dill. elth. 25. t. 21. f. 22. A. lucida. Mill. dict. n<sup>a</sup>. 4. Hab. in Amer. australi. Flor. violacei.  $\mathcal{h}$

2. *Pinguin*, fol. ciliato-spinosis mucronatis, racemo terminali. Jacq. amer. ed. picta. t. 91. Trew. Ehr. t. 51. Pinguin. Dill. elth. 320. t. 240. f. 311. Hab. in Jamaica, Barbados. Pro sepius vivis adhibetur.  $\mathcal{h}$

3. *incarnata*, fol. serrato-spinosis obtusis cum acumine, racemo simplici flexuoso, bract. inferiorib. maximis lanceolatis. Flor. Peruv. 3. p. 32. t. 252. Hab. in Andium nemorib. supra arbores. Petal. purpureo-violacea. Bacc. canescens.

4. *sphacelata*, fol. ensiformib. acutissimis ciliato-aculeatis, spic. axillarib. conico-truncatis, bract. medio sphacelatis.

Y. 4

Flor. Peruv. l. c. In regn. Chilens. umbrosis et subhumidis. Bract. basi albescentes. Pet. purpurea.

5. *bicolor*, fol. ensiformib. ciliato-aculeatis: interiorib. puniceis, flor. aggregato-conicis, bract. oblongis. Flor. Peruv. l. c. p. 33. Hab. in R. Chilens. littorib. supra saxa. Bacc. incana. Pet. caerulea.

6. *Karatas*, fol. erectis, flor. aculeis sessilibus aggregatis. Jacq. amer. Hort. 31. 3a. Hab. in Amer. meridionali. Stolones inter folia, peracto fructu, radicales, propagantes plantam.

7. *lingulata*, fol. serrato-spinosis, obtusis, spicis alternis. Plum. gen. 26. ic. 64. f. 1. Cum priore. Hab. in Amer. meridionali. h

8. *bracteata*, fol. serrato-spinosis, bracteis ovato-lanceolatis, scapo elongato, racemo composito, racemulis subdivisis, flor. sessilibus. Swartz. Houst. reliq. p. 7. t. 16. Hab. in rupestribus et in Jamaica et Vera Cruce. Bract. coccineae. h

9. *paniculigera*, fol. serrato-spinosis bracteis lanceolatis, racemo composito, racemulis subdivisis, flor. pedunculatis. Swartz. Fl. ind. oecid. 1. p. 585. Hab. in America. Bractea lato-lanceolatae semipedales, coccineae. h

10. *chrysantha*, fol. serrato-spinosis, bracteis lanceolatis dentatis, racemo subcomposito fol. brevioribus, flor. pedunculatis. Willd. p. 3. Jacq. Schoenh. 1. p. 28. t. 55. Hab. ad Caracas. Bract. flavescens dentatae. h

11. *humilis*, subcaulis, flor. aggregatis sessilibus, axillis stoloniferis. Jacq. Misc. 2. p. 325. Ic. rar. 1. t. 60. Hab. . . h

12. *Acanga*, panicula diffusa, fol. ciliato-spinosis mucronatis recurvatis. Caraguata. Pis. bras. po. t. gr. Moris. 5. 4. t. 22. f. 7. Hab. in Brasilia. h

764. **PITCAIRNIA**. *Cal.* 3-phyllus semisperuus. *Petala* 3. Squama nectarifera ad basin petalorum aut o. *Stigmata* 3, contorta. *Caps.* 3, introrsum dehiscens. *Sem.* alata, aut utrinque in setam longam terminata.

1. *bromeliaefolia*, fol. ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque glaberrimis. Ait. Kew. 1. p. 401. Schaeer. ic. fasc. 4. t. 11. L'Herit. scrt. angl. p. 7. t. 11. Hepetis an-

gustifolia. Swartz. prod. 56. Hab. in Jamaica, ad rupes umbrosas. h

2. *angustifolia*, fol. ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque tomentosis. Ait. Kew. 1. p. 401. Hab. in insula St. Crucis. h

3. *latifolia*, fol. integerrimis, basi subspinosis. Ait. 1. c. Wendl. Hort. Herrenh. t. 3. Bromelia nudicaulis. Lin. Habit. in Amer. meridion. Flor. spicati coccinei. Fl. hyeme.

4. *lanuginosa*, scapo racemoso-spicato simplicissimo, fol. angustis ensiformibus subtus lanuginosis ultra basin aculeatis. Flor. Per. 3. p. 35. t. 258. Hab. ad Pozuzo nemora supra saxa. Flor. violaceae. ¶

5. *pulverulenta*, scapo paniculato composito, fol. ensiformib. subtus pulverulentis: inferioribus petiolatis. Flor. Per. 3. p. 36. t. 259. In Andium nemoribus. Flor. puniceae.

6. *paniculata*, scapo paniculato, panic. decomposita, fol. ensiformib. serrato-aculeatis pulverulentis. Flor. Per. 1. c. t. 260. Cor. coccinea. Hab. in Andium montibus.

7. *ferruginea*, scapo paniculato, panicula diffusa, fol. ensiformib. aculeatis, flor. recurvo-falcatis. Flor. Per. 1. c. Hab. in colliib. aridis prope Liamam urbem. Cor. subpurpurea.

† *Cal. infero, tripartito. Anther. incumbentibus linearibus. Caps. valvis septiferis. Flor. Per. (Pourretia.)*

8. *crystallina*, spica maxima thyrsoides, fol. ensiformib. aculeatis, cal. lanatis. Pourretia *lanuginosa*. Flor. Peruv. 3. p. 33. t. 255. Hab. in Peruviae nemorosis et colliib. Cor. obscure viridis. Ex spica gummi crystallinum undique profuit. *loc. cit.*

9. *pyramidata*, spica pyramidata, fol. ensiformib. margine purpureis aculeatis, cor. luteo-virentibus. Flor. Peruv. p. 34. sub Pourretia uti sequens. Hab. in Peruv. montibus supra saxa.

10. *coarctata*, spica composita coarctata, fol. ensiformib. aculeatis, cor. luteis ad basin macula purpurea. Flor. Per. 1. c. Renealmia. Fewill. 3. p. 59. t. 39. Puya. Molin. Hist. Chil. Puya Chilensis. Gmel. syst. II. p. 553. Hab. in regn. Chilensis colliib. aridis. Chilenses caule substantia suberoso, ad vascula varia formanda utuntur. ¶

765. **GUZMANNIA**. *Cal.* inferus tripartitus: laciniis convolutis. *Petala* 3, in tubum convoluta.

*Antherae* in cylindrum coalitae.  
*Caps.* 3-locularis, trivalvis. *Sem.*  
 numerosa, oblonga, nuda.

1. *tricolor*, scap. tricolore, fol. inermibus. Flor. Peruv. 3. p. 39. t. 261. Pourratia sympagatera. Syst. veg. Flor. Peruv. et Chil. p. 82. Hab. in Peruviae montib. ad arborum truncos. Cor. alba, ephemera.  $\overline{\text{T}}$

766. *ÆCHMEA*. *Cal.* inferior (aut squama germen amplexens) monophyllus. cyathiformis subtrifidus: *superior* tripartitus coriaceo-scariosus: laciniis margine convolutis. *Petala* 3. *Squamae* 2, ad basin singuli petali. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis. *Sem.* obovata, pulpa molli nidulantia.

1. *paniculata*, scap. paniculato-racemoso, fol. ensiformibus carinatis aculeatis. Flor. Per. 3. p. 37. t. 264. Hab. in Andium nemorib. supra arbores. Cor. luteo-virens. Flor. marcescendo spiralter convoluti.

767. *THILANDSIA*. *Cal.* 3-fidus, persistens, subconvolutis. *Cor.* 3-fida, campanulata. *Caps.* 1-3-locularis. *Sem.* comosa.

1. *utriculata*, culmo paniculato, fol. amplioribus attenuatis basi ventricosis, spica assurgenti compressa brachiata, flor. subsessilibus. Brown. jam. 194. Willd. Sp. II. p. 11. Hab. in Americae meridionalis arboribus.  $\overline{\text{T}}$

2. *serrata*, fol. superne serrato-spinosis, spica comosa. Plum. gen. 10. ic. 72. f. 1. Hab. in America meridionali.

3. *lingulata*, fol. lanceolato-lingulatis integerrimis: basi ventricosus. Jacq. amer. 2. t. 62. Ed. picta. t. 92. Plum. gen. 10. ic. 74. Sloan. jam. 77. hist. 1. p. 189. t. 110. In Amer. meridion. arborib. vetustis parasitica.

4. *tetrantha*, erecta, scapo flexuoso, pedunc. ex spathis quadrifloris reflexis. Flor. Peruv. 3. p. 39. t. 265. Hab. in Andium nemorib. supra arbores et saxa. Petal. violacea.

*Obs.* Utriculus ab omnium foliorum convolutione formatus aqua repletur, quam per plures dies retinet.

5. *rubra*, panic. simplice rubra, spic. indivisis, fol. ensiformibus subacuminatis.

Flor. Peruv. In Peruv. praeruptis calidis ad Tarmae tractus. Petal. purpureo-violacea.

6. *maculata*, panic. composita, spic. subdivisis, fol. lanceolato-ensiformibus maculatis. Flor. Peruv. 3. p. 40. t. 267. In Andium nemorib. supra saxa et arbores.

*Obs.* Etiam in hac specie aqua pluvialis in folior. urceolo colligitur. Supra parietes et templorum porticus ab indis transfertur, ubi, ornamenti causa, viget. l. c.

7. *biflora*, scap. racemoso, flor. geminis, fol. ensiformib. acutis. Flor. Per. p. 41. t. 268. Cum priore.  $\overline{\text{T}}$

8. *parviflora*, panic. simplici spicul. 3-7, flor. distichis, fol. subulatis basi amplissima. Flor. Per. l. c. t. 269. Petal. albida. Fol. canescentia, squam. furfuraceis.  $\overline{\text{T}}$

9. *heptantha*, spic. septemflora disticha, petal. albis apice violaceis, fol. ensiformib. subulatis acutissimis. Flor. Per. p. 41. In Peruv. praeruptis calidis.

10. *purpurea*, panic. polystachia rosacea, flor. distichis, fol. ensiformi-subulatis recurvis. Flor. Per. t. 270. Hab. in saxosis et arenosis locis, et collibus. Pet. lamina purpurea.

11. *sessiliflora*, scapo spicato simplici, flor. solitariis sessilibus, fol. sublingulatis retusis. Flor. Per. 3. p. 42. t. 271. In Peruv. locis calidis. Flor. bract. concavis suffulti.  $\overline{\text{T}}$

12. *tenuifolia*, spicis alternis imbricatis, flor. distichis, fol. lineari-filiformibus erectis, apice setaceis. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 592. Plum. gen. 37. ic. 232. f. 2. Sloan. jam. t. 122. f. 1. Cum priore.

13. *flexuosa*, spicis laxis flexuosis, flor. distichis remotiusculis, foliis lanceolato-linearibus reclinatis, caule apice subdiviso. Swartz. p. 590. T. *tenuifolia*. Jacq. amer. p. 92. t. 63. Ed. p... Hab. in arborum ramis Jamaicae et Carthagenae.

14. *setacea*, spica simplici, spathis distichis imbricatis, fol. lineari-filiformibus reclinatis glabris. Swartz. l. c. Hab. in Jamaicae arboribus. Similis T. *tenuifoliae*.  $\overline{\text{T}}$

15. *paniculata*, fol. radicalibus brevissimis, culmo subnudo, ramis subdivisis adscendentibus. L. Plum. gen. 27. ic. 237. Hab. in America meridionali.

16. *fasciculata*, spicis lateralibus distichis imbricatis, fol. lanceolato-subulatis erectis strictis. Fl. ind. occid. 1. p. 586. T. *clavata*. Lam. Hab. in maritimis Jamaicae, arboribus adhaerens. Swartz. l. c.  $\overline{\text{T}}$

17. *nutans*, spicis subdivisis nutantibus, flor. distinctis ovatis, fol. ovato-lanceolatis membranaceis, caule subnudo. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 586. Hab. in montosis Jamaicae ad arborum ramos. ☞

18. *polystachya*, culmo spicis imbricatis lateralibus. L. Plum. gen. 37. Hab. in Amer. calidiore.

19. *monostachya*, fol. linearibus canaliculatis reclinatis, culmo simplici imbricato, spica simplici. L. Plum. gen. 37. ic. 23<sup>o</sup>. f. 1. Hab. in America meridionali. Flor. nivei.

20. *pruinosa*, spica simplici, spathis imbricatis, fol. lanceolato-linearibus reclinatis, spathisque squamuloso-tomentosis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 594. In arborum ramis vetustis Jamaicae. Non confundenda cum *T. recurvata*. Sw. ☞

21. *canescens*, spicis subternis, fol. linearibus erectis caulem aequantibus incanit. Swartz. Flor. 1. p. 595. Hab. ad maris littora Jamaicae in arboribus. *T. polystachya* proxima. ☞

22. *angustifolia*, spicis fasciculatis, fol. lineari-lanceolatis suberectis glabris caulem superantibus. Swartz. l. c. Hab. in Jamaica et Hispania. Distinguenda a *T. polystachya*. ☞

23. *capillaris*, caul. dichotomo, pedunc. subunifloro capillari, fol. triplo longiori glabro, fol. lineari-subulatis. Flor. Per. p. 42. 271. In Peruv. locis calidis, frequens in muris et supra saxa, arbores. Caespitosa, squamis furfuraceis densis tecta. Sequenti affinis.

24. *recurvata*, pedunc. bifloro, fol. paullo longiori leproso, fol. subulatis declinatis erectisque. Flor. Per. t. 271. Lin. Sp. pl. 2. p. 7. Sloan. Jam. hist. 1. p. 190. t. 121. f. 1. Hab. in Jamaicae et Peruviae locis calidioribus supra arbores, saxa et parietes. Cal. purpurasc. Pet. violacea. ☞

25. *virescens*, pedunc. 1-floro longitudine fol.; bract. solitaria convoluta, fol. lineari-subulatis. Flor. Peruv. p. 43. t. 270. Caps. virescens.

26. *Usneoides*, pedunc. 1-floro brevi, caul. ramoso filiformi flexuoso pendulo, fol. subulato-filiformibus. Flor. Peruv. p. 43. *T. usneoides*, filiformis ramosa intorta scabra. Lin. Willd. l. c. p. 15. Sloan. l. c. t. 122. f. 2 et 3. Cuscuta. Pluck. alm. t. 26. f. 5. Hab. in America.

*Obs.* Incolae hac planta contra haemorrhoidas utuntur. Etiam ad varias res, na-

tura praesertim fragiles, transportandas frequenter sumitur.

768. XEROPHYTA. *Cor.* 6-partita aequalis, tribus laciniis exterioribus angustioribus. *Stigm.* clavatum. *Caps.* scabra, infera, 3-locularis, polysperma.

1. *pinifolia*. Juss. Willd. Sp. II. p. 15. Lam. ill. gen. t. 225. Hab. in Madagascar. Arida, ramis alternis. Fol. linearia, pungentia. ☞

769. BURMANNIA. *Cal.* prismaticeus, coloratus, 5-fidus: angulis membranaceis. *Petala* 3. *Caps.* 3-locularis, recta. *Sem.* minuta.

1. *disticha*, spica gemina. Burm. zeyl. 50. t. 20. f. 1. Willd. p. 16. Hab. in Zeylonae paludosis. ☞

2. *biflora*, flor. gemino. L. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 2. Hab. in Virginiae paludosis.

770. TRADESCANTIA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Filamenta* villis articulatis. *Caps.* 3-locularis.

1. *virginica*, erecta, fol. lanceolatis glabris, flor. umbellato-congestis terminalibus. Willd. Sp. II. p. 16. Moris. s. 15. t. 2. f. 4. Hab. in Virginia. Flor. pubentes. ☞

2. *rosea*, erecta, fol. lanceolatis (gramineis), umbel. terminalibus paucifloris involucre longioribus. Vent. Hort. Cels. p. 24. t. 24. Michaux. Flor. 1. p. 193. Hab. in Carolinae et Georgiae sabulosis subadiis. Fol. longa. *Cor.* rosea. ☉

3. *latifolia*, caul. erecto simplici, fol. lanceolato-ovatis, flor. terminalibus subumbellatis involucre. Flor. Peruv. 3. p. 44. t. 272. Hab. in Peruviae collibus, et in montibus Lima. Cal. hirsutus, viscosus. Petal. violacea. Styl. incurvus. ☉

4. *crassifolia*, erecta, fol. ovatis marginate et subtus lanatis, flor. umbellato-congestis terminalibus. Willd. p. 17. Cav. ic. 1. p. 54. t. 75. Hab. in Mexico. Caul. lanatus, ramosus. Flor. maximi. ☞

5. *erecta*, erecta, fol. ovatis basi angustatis glabris, pedunculo terminali nudo bifido racemoso. Willd. Cav. ic. 1. p. 53. t. 74. Jacq. ic. rar. 2. t. 354. Coll. 4. p. 114. *T. undulata*. Vahl. Act. Haf. 2. P. 2. p. 27. t. 3. *T. liffida*. Roth. catal. bot. 1. p. 42. Cum priore.

6. *discolor*, aculis laevis, bracteis equitantes compressis, fol. lanceolatis carnosius subtus coloratis. Smith. icon. pict. p. 10. t. 10. Swartz. l. c. p. 607. L'Herit. sert. du gl. p. 8. t. 12. Hab. in America meridionali, in regionibus sinu Mexicano proximis. ☞

7. *malabaria*, erecta laevis, pedunc. solitarii longissimis. Sp. pl. 412. Rheed. g. t. 63. Hab. in Malabaria. ☞

8. *nervosa*, scapo unifloro. J. Mant. 223. Hab. in Suratte? Caul. diffusi. Stamina 6, pilis violaceis. Stylus apice hamosus.

9. *divaricata*, caule dichotomo, fol. ovato-lanceolatis glabris, vaginis villosis, florib. paniculatis, filamentis glabris. Vahl. eclog. 1. p. 34. Commelina hexandra. Aubl. gujan. 1. p. 35. t. 12. Hab. ad fluviorum ripas Gujanae, Cajennae, inque insula Trinitatis.

10. *geniculata*, procumbens hirsuta. L. T. caule paniculato, basi repente. Jacq. amer. 94. t. 64. Plum. ic. 116. f. 2. Hab. in America meridionali. ☞

11. *monandra*, diffusa, fol. ovatis acuminatis, pedunc. axillaribus multifloris, flor. monandris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 597. Hab. in nemoribus montium Hispaniolae occidentalis. Filam. huic et a sequentibus glabra sunt. ☉

12. *multiflora*, erecta ramosa, fol. cordatis margine vaginisque ciliatis, pedunc. confertis axillaribus, flor. triandris. Swartz. l. c. p. 569. Hab. in umbrosis sylvaticis montium Jamaicae.

13. *cordifolia*, repens filiformis, fol. cordatis, pedunculis terminalibus solitarii multifloris. Swartz. Flor. 1. p. 601. Hab. in montibus altis Jamaicae, locis umbrosis raminosis humidis. ☉

14. *procumbens*, caule procumbente radicante, fol. ovatis basi ciliatis vaginatis, pedunc. cymosis axillaribus, flor. 6-andris. Willd. Sp. p. 19. T. *multiflora*. Jacq. ic. 2. t. 355. Ej. Collect. 3. p. 226. Hab. ad Caracas. ☞

15. *parviflora*, repens, fol. ovato-oblongis: floriferis subcordatis, pedunc. umbellatis axillaribus. Flor. Peruv. 3. p. 43. t. 272. f. 2. Hab. in Peruvia. Filam. 3. glabra, 3-hirsuta. Fol. subtus purpurascens.

16. *axillaris*, caule ramoso basi repente, flor. sessilibus lateralibus. L. Pluck. alm. 135. t. 174. f. 3. Rheed. 10. t. 13. Hab. in India. Fol. linearia, vaginis coloratis longius ciliatis. Stylus clavatus. ☉

16. *formosa*, fol. oppositis connatis. T. *nodiflora*, caule simplici flexuoso, foliis brevissimis margine et vagina villosis, flor. axillaribus sessilibus glomeratis. Lam. enc. 2. p. 367. Hab. ad Cap. B. spei. Stylus apice barbatus.

17. *cristata*, repens laevis, spathis diphyllis imbricatis. Jacq. Hort. t. 137. Commelina cristata. L. Hab. in Zeylona. Filam. pilis caeruleis cor. breviora. Stylus clavatus. Stigma tubulosum, crenatum. ☉

18. *papilionacea*, repens laevis, spathis triphyllis imbricatis. Burm. ind. 17. t. 7. f. 1. Hab. in India. Spatha refert florem papilionaceum. Cor. violacea. Stam. breviores. ☉

ZANONIA. Cal. 3-partitus. Cal. 3-petala, demum baccans. Filam. villosa. Anth. geminae uniformes. Caps. 3-locularis, corolla baccante inclusa. Zan. *bibracteata*. Cramer Eumer. pl. p. 75.

19. *Zanonia*, erecta, fol. lato-lanceolatis, pedunc. lateralibus solitariis medio geniculatis, bract. geminis. Swartz. prodr. p. 57. Willd. p. 17. Commelina Zanonia. Lin. Z. graminea perfoliata. Plum. gen. 38. Sloan. hist. 1. t. 147. f. 1. Hab. in Jamaicae australioris nemoribus et in Guiana. Caul. altissimus.

771. POLLIA. Cor. infera, 6-petala. Pet. 3-exteriora majora. Bacc. polysperma.

1. *japonica*. Thunb. Diss. acad. 1. p. 13. Flor. japon. p. 138. Caul. articulatus villosus-asperatus. Flor. verticillato-corymbosi. Th. Hab. in Japonia.

772. MNASIUM. Spatha 2-valvis multiflora. Cal. 3-partitus. Cor. 1-petala, tubo brevissimo, tridentata. Stigm. 3, spiraliter contorta.

1. *padulosum*. Willd. Sp. II. p. 22. Rapaatea padulosa. Aubl. guj. 1. p. 305. t. 118. Lam. ill. t. 226. Hab. in sylvis padulosis Gujanae. Habitu Pontederiac. Cal. squamis imbricatis. Cor. flava. ☞

773. PONTEDERIA. Cor. 1-petala, 6-fida, bilabiata. Stamina 3, apici, tubo corollae inserta. Caps. 3-locularis.

1. *rotundifolia*, fol. orbiculato-cordatis. Lin. suppl. 192. Willd. l. c. Hab. in

Surinamo. Cor. sexfida inaequalis, facie floris neutri Centauraeae cyani. L.

2. *azurea*, fol. subrotundo-ellipticis, basi petiolisque incrassatis, flor. spicatis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 607. Hab. in fossis Jamaicae. T.

3. *vaginalis*, fol. cordatis, racemo cernuo. Pluck. aln. 215. t. 215. f. 4. Rumph. amb. 6. p. 178. t. 75. f. 1. Rheed. mal. 11. t. 44. Hab. in Indiae orientalis aquosis. T.

4. *limosa*, fol. cordato-ovatis, scapis lateralibus unifloris, flor. triandris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 611. Sloan. hist. 1. t. 140. f. 1. Hab. ad ripas limosas fluviorum Jamaicae, Hispaniolae. T.

5. *cordata*, fol. oblongo-cordatis, flor. spicatis. Lam. ill. t. 225. Les Liliacées. t. 72. Moris. s. 15. t. 4. f. 8. Hab. in Virginiae aquosis. T.

6. *hastata*, fol. hastatis, flor. umbellatis. L. Conf. Willd. p. 24. Pluck. alm 326. t. 220. f. 8. Moris. s. 15. t. 4. f. 7. Hab. in India. T.

774. **HÆMANTHUS**. *Involucr. polyphyllum, multiflorum. Cor. 6-partita, supera. Bacca 3-locularis.*

1. *coccineus*, fol. linguiformib. planis laevib. humi adpressis bifariis, umb. coarctata fastigiata involuero breviori, limbo patulo. Ait. Kew. 1. p. 304. Willd. p. 24. Comm. hort. 2. p. 127. t. 64. Les Liliacées. t. 29. Hab. ad Cap. b. spei. T.

2. *coarctatus*, fol. linguiformi-oblongis planis laevibus apice callosis erectis, umb. coarctata fastigiata invol. breviori, limbo erecto. Willd. p. 25. Hab. ad Cap. b. spei. T.

3. *puniceus*, fol. oblongis ellipticis acutis remsis undulatis, umb. coarctata fastigiata, limbo staminibusque erectis. Ait. Kew. 1. Willd. p. 404. Dill. elth. 167. t. 140. f. 2. Trew. Ehret. t. 44. Hab. ad Cap. b. spei. T.

4. *multiflorus*, fol. elliptico-lanceolatis acutis concavis erectis, umbella multiflora involuero longiore, pedunculis articulatis, limbo patulo, staminib. adscendentibus. p. 25. Sela mus. 1. p. 20. t. 12. f. 1. 2. 3. Swert. floril. 1. f. 3. Moris. s. 12. t. 12. f. 11. Rudb. elys. 2. p. 210. f. 3. Hab. in Sierra Leone. T.

5. *tigrinus*, fol. linguiformibus planis glabris margine ciliatis depressis, umbella coarctata, limbo staminibusque erectis. Willd. H. *tigrinus*, fol. oblongis ciliatis subtus maculatis, scapo maculato, umb.

coarctata. Jacq. Schoenb. 1. p. 29. t. 56. Hab. ad Cap. b. spei. T.

6. *quadrivalvis*, fol. oblongis basi angustatis planis patulis superne villosis, margine ciliatis, involuero tetraphyllo umbella coarctata longiore, limbo staminibusque erectis. Willd. Jacq. 1. c. p. 30. t. 58. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. superne apicem versus albo-villosa. W.

7. *pubescens*, fol. oblongo-lanceolatis, undique hirsutis, umbella fastigiato-rotundata, limbo staminibusque erectis. Ait. Kew. 1. p. 404. Lin. suppl. 193. Hab. ad Cap. b. spei. T.

8. *ciliaris*, fol. lanceolatis glabris ciliatis, involuero lato umbella rotundata brevior, limbo reflexo. Ait. Kew. 1. p. 404. Amaryllis ciliaris. Linn. suppl. 195. Breyn. cent. 1. 39. Hab. ad Cap. b. spei. T.

9. *albiflos*, foliis ellipticis acutiusculis planis glabris margine ciliatis, involuero tetraphyllo umb. rotundata brevior, limbo patulo. Willd. p. 27. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 31. t. 59. Hab. ad Cap. b. spei. T.

10. *toxicarius*, fol. bifariis oblongis planiusculis glabris, pedunculis spatha floreque longioribus. Ait. Kew. 1. p. 405. Amaryllis disticha. Lin. suppl. 195. Patters. iter. t. 1. Hab. ad Cap. b. spei in regione Rogge-Veld. Flor. incarnati. T.

11. *lanceaefolius*, fol. ellipticis basi attenuatis depressis planis glabris, margine ciliatis, pedunc. spatha floreque longiorib., limbo patente. Willd. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 31. t. 60. Hab. ad Cap. b. spei. T.

12. *carinatus*, fol. linearibus carinatis. Mill. Cum priore. †

13. *pumilio*, foliis lineari-lanceolatis erectis glabris, pedunc. spatharum florumque longitudine, limbo patenti. Willd. H. *pumilio*, fol. lineari-lanceolatis glabris falcatis, umbella pauciflora. Jacq. 1. c. p. 32. t. 61.

14? *spiralis*, fol. setaceis, scapo filiformi basi spirali flexuoso, involucri subulatis umbella uni-quadriflora brevioribus. Ait. Kew. 1. p. 405. Crinum teneilum. Jacq. ic. rar. 2. t. 361. Collect. suppl. p. 43. Cr. spirale. Andrew. t. 9a. Ad Cap. b. spei. T.

775. **MASSONIA**. *Cor. infera limbo 6-partito. Filamenta collo tubi imposita. Capsula 3-alata 3-locularis polysperma.*

1. *latifolia*, fol. subrotundis patentib., laciniis corollae patulis. Ait. Kew. 1. p. 405.



t. 3. Willd. Sp. II. p. 28. Thunb. Diss. Nov. pl. gen. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *angustifolia*, fol. oblongo-lanceolatis erectis, laciniis cor. reflexis. Ait. Kew. 1. p. 405. t. 4. M. *lanceolata*. Thunb. Flor. umbellati.

3. *violacea*, fol. ovatis, erectis, flor. racemoso-corymbosis. Andrew. t. 46. Ad Cap. b. spei.

4. *undulata*, fol. lanceolatis undulatis glabris. Hab. in Cap. b. spei interiore.

5. *echinata*, fol. ovatis mucicatis pilosis. Lin. suppl. 193. Hab. in Cap. b. spei, ad margines montis Bocklands-Berg. Flor. glomerati inter folia. ¶

776. GALANTHUS. *Petala* 3, concava. *Nectarium* ex petalis 3, parvis, emarginatis. *Stigma* simplex.

1. *nivalis*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 29. Jacq. austr. t. 310. Hab. in nemorosis et in pratis Europae australioris. Flor. primo vere. ¶

777. LEUCOIUM. *Cor.* campaniformis, 5-partita, apicibus incrassata. *Sigma* simplex.

1. *vernum*, spatha uniflora, stylo clavato. Jacq. austr. t. 312. Lam. ill. t. 230. f. 1. *Nivaria*. Moench. meth. p. 229. Hab. in sylvis.

2. *aestivum*, spatha multiflora, stylo clavato. Jacq. austr. t. 202. Lam. ill. t. 320. f. 2. Hab. in Europa australi.

3. *autumnale*, spatha monophylla biflora, petal. ovatis apice tridentatis, stylo filiformi. Schousb. Marocc. p. 130. Label. ic. 124. Hab. in Hispania, Lusitania et Barbariae locis aridis. Flor. autumnosub finem. M. octobr.

4. *trichophyllum*, spatha diphylla biflora, petal. lanceolatis acutis stylo filiformi. Schousb. l. c. p. 140. Cresc. in Barbaria in campis arenosis region. Tingitanæ prope Schaarf el Kaab. Fl. januario.

778. STRUMARIA. *Cor.* hexapetala patens. *Styl.* infra medium incrassatus, s. cum filamentis cohaerens. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* infera subrotunda 3-locularis.

\* *Styli struma cum filamentis connata.*

1. *linguae-folia*, fol. lineari-ensiformibus

rotundato-obtusis planis, scapo tereti, superne compresso, stam. longitudine corollae. Willd. Sp. 2. p. 31. S. *linguae-folia*, styli struma cum filamentis connata utrinque acuta, fol. linguaeformibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 356. Collect. suppl. 45. Hab. ad Cap. b. spei cum sequentibus speciebus. *Cor.* candida apicibus vi. escens. ¶

2. *truncata*, fol. lineari-ensiformibus rotundato-obtusis planis, scapo compresso, staminib. cor. longioribus. Willd. S. *truncata*, styli struma cum filam. connata superne truncata. Jacq. ic. rar. 2. t. 357. *Cor.* candida externe basi rubicunda. ¶

3. *rubella*, fol. linearibus oblique flexis, petalis planis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 358. Collect. suppl. 46. Spathae violaceae. *Cor.* incarnata. ¶

4. *angustifolia*, fol. linearibus planis, germine triglanduloso. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 359. Collect. suppl. 48. Spathae rubicundae. *Cor.* candida externe linea rubicunda.

\* \* *Styli struma a filamentis libera.*

5. *undulata*, foliis linearibus oblique flexis, petalis undulatis. Willd. p. 32.

6. *filifolia*, fol. filiformibus, petalis acutis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 361. Coll. 3. p. 222. Leucoium strumosum. Ait. Kew. 1. p. 407. t. 5. Crinum tencillum. Lin. suppl. 194.

779. TULBAGIA. *Cor.* infundibulif. Limbo 6-fido. *Nectarium* coronans faucem, 3-phyllum: foliolis bifidis magnitudine limbi. *Caps.* supera.

1. *alliacea*, nectario monophyllo sexdentato, fol. ensiformibus, flor. cernuis. Thunb. prod. 60. Jacq. hort. 2. p. 52. t. 115. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

2. *cepacea*, nectario triphylo, foliis linearibus, flor. erectis. Thunb. prod. 60. Antherae sessiles infra os tubi, tres superiores alternae. ¶

780. NARCISSUS. *Petala* 6, aequalia: *Nectario* (cor. limbo interiore) infundibuliformi. 1-phylo. *Stam.* intra nectarium.

1. *poeticus*, spatha uniflora, nectario rotato brevissimo scarioso (rubro) crenulato, fol. margine inflexis. Engl. bot. t. 275. N. angustifolius. Curt. mag. t. 193. Hab.

in G. Narbonensi, Italia, Helvetia, Germania, Anglia.  $\overline{\text{T}}$

2. *biflorus*, spatha biflora, nect. rotato brevissimo membranaceo crenato (albido), fol. acute carinatis, margine inflexis. Smith. Flor. brit. 1. p. 354. Curt. Mag. t. 197. Engl. bot. t. 276. N. poëticus. Huds. Hab. in Angliæ campis arenosis. Pet. ochroleuca. Nect. margine albido. S.

3. *incomparabilis*, spatha uniflora, nectario campanulato plicato crispo, petalis dimidio brevioribus, fol. planis. Curt. mag. 121. Nonpareille. Park. theat. 68. Hab. in Hispania, Lusitania.  $\overline{\text{T}}$

4. *Pseudo-Narcissus*, spatha uniflora, nectario campanulato erecto crispo, æquante petala ovata. L. Mill. dict. n.º. 11. Scop. carn. 2. p. 295. Engl. bot. t. 17. Dod. pempt. 22. f. 12. Hab. in Eur. austr. prætis et montosis.  $\overline{\text{T}}$

5. *bicolor*, spatha uniflora, nectario campanulato margine patulo crispo æquante petala. Gouan. illustr. 22. Rudb. elys. 2. p. 70. f. 7. Hab. in Europa australi, in Pyrenæis.  $\overline{\text{T}}$

6. *minor*, spatha uniflora, nectario obconico erecto crispo sextifido, æquante petala lanceolata. Sp. pl. 415. Curt. mag. 6. Bauh. hist. 2. p. 597. Hab. in Hispania.  $\overline{\text{T}}$

7. *moschatus*, spatha uniflora, nectario cylindrico truncato subrepando, æquante petala oblonga. L. Barr. ic. Rudb. elys. 2. p. 69. f. 6. Hab. in Hispania.  $\overline{\text{T}}$

8. *triandrus (pyrenæicus)*, spatha subuniflora nectario campanulato crenulato, dimidio brevioribus petalis, staminibus ut plurimum ternis. L. Curt. mag. t. 48. Rudb. elys. 2. p. 72. f. 12. Hab. in Pyrenæis. Stamina sex, quorum tria breviora, a nonnullis observata.  $\overline{\text{T}}$

9. *orientalis*, spatha subbiflora, nectario campanulato trifido emarginato, petalis triplo brevioribus. Rudb. elys. 2. p. 52. f. 2. Hab. in Oriente.  $\overline{\text{T}}$

10. *Amancaes*, spatha 3-6-flora, nectario magno campanulato repando sexlobato crenulato, stam. cernuis, fol. ensiformibus. Flor. Per. 3. p. 53. t. 281. f. 4. Hab. in collibus Limæ etc. Flor. magni, luteo-sulphurei, fragrantissimi.  $\overline{\text{T}}$

11. *trilobus*, spatha submultiflora, nectario campanulato subtrifido integerrimo, petalis dimidio brevioribus. Sp. pl. 417. Rudb. elys. 2. p. 61. f. 3. Hab. in Europa australi. Similis N. Ionquillæ.  $\overline{\text{T}}$

12. *odoratus*, spatha subbiflora, nectario campanulato sexfido laevi, dimidio petalis brevioribus, fol. semicylindricis. Curt. mag. t. 76. N. fol. juncis carinatis, scapo unifloro, scypho sexies emarginato. Hall. helv. n.º. 1251. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 7. Hab. in Europa australi. Var. spatha uniflora et multiflora.  $\overline{\text{T}}$

13. *biflorus*, spatha biflora, nectario brevissimo scarioso. Curt. mag. 197. Dod. pempt. 223. f. 2. Park. theat. 74. t. 75. f. 1. Hab. in Hispania, Anglia.  $\overline{\text{T}}$

14. *calathinus*, spatha multiflora, nectario campanulato subæquante, petala fol. planis. Sp. pl. 415. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 5. Hab. in Europa australi, Oriente. Nectar. longitudine petalorum.  $\overline{\text{T}}$

15. *Tazetta*, spatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis alterne latioribus brevioribus, foliis planis. Willd. p. 39. Desf. Atl. 1. p. 282. Knorr. del. 1. t. N. 3. Rudb. 57. f. 11. Hab. in G. Narbonensis, Lusitaniæ, Hispaniæ maritimis subhumidis. Petal. apice flocculo lanato.

16. *dubius*, spatha multiflora, nectario campanulato truncato triplo petalis ovatis æqualibus brevioribus. Willd. p. 40. Gouan. illustr. p. 22. Rudb. 2. t. 51. f. 2. Hab. Monspeli. Tazetta duplo humilior. Folia linearia. Nectar. campanulatum album integerrimum triplo brevius petalis. G.  $\overline{\text{T}}$

17. *viridiflorus*, spatha multiflora, nectar. campanulato brevissimo, petal. linearibus, fol. teretibus fistulosis. Schousb. l. c. t. 11. Cresc. in locis elevatis saxosis, humidis juxta Tingidem. Scapus teres, floriferus primum prodit, dein folia. Petal. cinereo-viridia. Flor. oct., novembr.

18. *serotinus*, spatha multiflora, nectar. brevissimo integro crenulato, petal. lanceolatis, fol. linearib. canaliculatis. Schousb. Maroc. 1. p. 141. Desf. Atl. 1. p. 283. N. autumnalis minor. Clus. hist. t. 252. Hab. in Europa australi et in Barbaria. Scap. subanceps. Petal. nivea. Flor. autumn.

19. *Bulbocodium*, spatha uniflora, nectario turbinato petalis majore, genitalibus declinatis. L. Curt. mag. t. 88. Rudb. 2. p. 75. f. 5, 7. Les Liliacées. Hab. inter Ulyssiponem et Hispalim. Fol. subulata.  $\overline{\text{T}}$

20. *Ionquilla*, spatha multiflora, nectario campanulato brevi, fol. subulatis. L. Curt. mag. t. 15. Hab. inter Hispalim et Gades, inter Guadaloupan et Toletum, et in Oriente locis uliginosis.  $\overline{\text{T}}$

781. *PANCRATIUM*. Cor. infundibuliformis: tubo longo. Petala 6. Nectar. (cor. limbus interior) 12-sidum. Stam. nectario imposita.

1. *zeylanicum*, spatha uniflora, petalis reflexis. L. Willd. Sp. II. p. 41. Herm. lugth. Gg. t. 693. Comm. hort. 1. p. 75. t. 38. Rudb. p. 199. f. 7. Hab. in India.  $\mathcal{T}$

2. *mexicanum*, spatha biflora, fol. lanceolatis, nectarii dentibus sex staminiferis, intermediis simplicibus. Willd. p. 42. P. spatha biflora. L. Hort. cliff. 133. Dill. eluk. 299. t. 222. f. 289. Hab. in Mexico et Carolinae inundatis. Michaux. Stam. calycem subaequantia.  $\mathcal{T}$

3. *humile*, spatha biflora, fol. filiformibus, nectarii dentibus sex obtusis bifido-emarginatis non staminiferis. Willd. Cav. ic. 3. p. 4. t. 207. f. 2. Heb. in Hispania. Flor. absque fol. octobri.  $\mathcal{T}$

4. *caribaeum*, spatha multiflora, fol. lanceolatis. L. Hort. cliff. 133. Mart. cent. 27. t. 27. Hab. in Jamaica, Caribaeis.  $\mathcal{T}$  +

5. *maritimum*, spatha multiflora, petalis planis, fol. lingulatis, stam. brevissimis. Mill. t. 197. Cavan. ic. 1. p. 41. t. 56. Les Liliacées. t. 8. Salisb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 70. t. 9.

$\beta$  ? *carolinianum*, spatha multiflora, foliis linearibus, staminibus nectarii longitudine. L. Catesb. carol. 2. app. 5. t. 5. Rumph. 6. t. 70. f. 2. Hab. in Hispania et Gallia meridionali et  $\beta$ . in utraque India. Stylus declinatus. Filam. inflexa.  $\mathcal{T}$

6. *fragrans*, spatha multiflora, fol. ellipticis, nectarii dentibus sex staminiferis, intermediis nullis. Willd. p. 43. Salisb. l. c. p. 72. t. 11. Trew. Ehret. t. 28. Hab. in Barbados.  $\mathcal{T}$

7. *littorale*, spatha multiflora, foliis linearibus lanceolatis, nectarii dentibus sex staminiferis, spatio intermedio repando. Willd. p. 43. Salisb. p. 74. t. 13. Jacq. hort. 3. p. 41. t. 75. et amer. pict. t. 101. Trew. Ehret. p. 6. t. 27. Hab. in insula Terra-Bomba dicta Americae calidioris.  $\odot$

8. *speciosum*, spatha multiflora, fol. ellipticis, nectar. dentibus sex staminiferis, intermediis simplicibus acutis. Willd. p. 44. P. Cor. tubo triangulo rare striato. Salisb. Act. p. 73. t. 12. Hab. ...  $\mathcal{T}$

9. *declinatum*, spatha multiflora, scapo compresso ancipiti, cor. laciniis tubum excedentibus, fol. lingulatis. Jacq. amer. ed. picta. t. 102. Jacq. hort. 3. p. 11. t. 10.

Commel. hort. t. 87. Hab. in Antillis. Scap. demum declinatus.

Obs. An *P. caribaeum*. Lin. eadem species? Vid. Enc. bot. 4. p. 733.

10. *illyricum*, spatha multiflora, fol. lanceolatis, nect. dentibus sex acutis bifidis non staminiferis. Willd. p. 45. P. spatha multiflora, fol. ensiformibus, staminibus nectario longioribus. Salisb. l. c. p. 74. t. 14. Seb. thes. 1. p. 17. t. 8. f. 1. Hab. in Galliae maritimis.  $\mathcal{T}$

11. *amboinense*, spatha multiflora, fol. cordato-ovatis acutis, nectarii dentibus sex acutis bifidis non staminiferis. Willd. Rudb. elys. 2. p. 238. f. 17. Hab. in Amboina.  $\mathcal{T}$

12. *croceum*, spatha triflora, fol. lingulatis incurvis, tubo corollae incurvo. Enc. bot. 4. p. 735. Hab. in Peruvia. Cor. crocea. An diversum a n<sup>o</sup>. 16? +

13. *ringens*, spatha subquinqueflora, flor. ringentibus, nectar. brevi, staminib. corollae longitudine, foliis ensiformibus acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 53. Collitur in Peruviae hortis. Petala reflexa, alba. Nect. viride.  $\mathcal{T}$

14. *flavum*, spatha multiflora, stamin. cor. longioribus, tubo nectario coarctato, petal. patulo-reflexis. Flor. Peruv. 3. p. 54. t. 284. Hab. in Peruv. collib. arenosis.  $\mathcal{T}$

15. *coccineum*, spatha multiflora, stamin. cor. longitudine, tubo nect. tenui, petal. erectis. Flor. Peruv. 1. c. t. 285. Hab. in collib. ad Tarmae oppidi traciis. Cor. coccinea.  $\mathcal{T}$

16. *recurvatum*, spatha 1-3-flora, tubo nectar. gracili recurvato, fol. ensiformib. carinatis. Flor. Peruv. 1. c. t. 285. In Peruviae praeruptis. Bulb. extus purpurascens. Cor. cernua, purpureo-lutescens.  $\mathcal{T}$

17. *latifolium*, spatha multiflora, flor. dependentibus, fol. lanceolato-oblongis latis. Flor. Peruv. 1. c. t. 284. Habit. in Peruv. Andium nemorosis humidis. Petal. luteo-rubra, apice viridia.  $\mathcal{T}$

18. *viridiflorum*, spatha 4-5-flora, limb. nect. longitudine petalor., fol. ensiformibus. Flor. Per. p. 55. Hab. in Peruv. nemorib. et locis petrosis. Flor. magni, pulchri.

19. *variegatum*, spatha 4-flora, flor. longissimis, nect. limbo brevissimo, dentibus furcatis retroflexis. Flor. Peruv. 1. c. Flor. spithamei, cernui, ex luteo, roseo albo-viridique colore variegati.  $\mathcal{T}$

782. *CRINUM*. *Cor.* supera, infundibuliformis, semisextida: tubo filiformi, limbo patulo recurvato: laciniis subulatis canaliculatis. *Filamenta* fauci tubi inserta, discreta. (*Semina* ad basin cor. vivipara. *Andrew.*)

1. *asiaticum*, fol. linearibus acuminatis carinatis, floribus sessilibus, tubo limbo longiore, spatha diphylla. Willd. Sp. II. p. 45. Mill. dict. t. 110. *Amaryllis* vivipara. Lam. enc. t. p. 123. Hab. in Malabar, Zeylona, America. Bulbi intra capsulas generantur. L. ¶

2. *americanum*, fol. oblongo-lanceolatis, margine glaberrimis, apice coarctato-unguiculato, flor. pedicellatis, tubo limbo brevior. Ait. Kew. t. p. 413. C. radice fasciculati. L'Hérit. sert. angl. 8. Comm. rar. t. 4. t. 14. Dill. elth. t. 161. f. 195. Hab. in Amer. Cor. limbus reflexus.

3. *crubescens*, fol. lanceolatis cartilagineo-crenatis apice producto explanato, flor. sessilibus, tubo limbo longiore. Ait. Kew. t. p. 413. Les Liliacées. t. 2. C. Commelini, cor. apicibus introrsum uncinatis, fol. linearibus canaliculatis. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 40. t. 202. Commel. rar. 15. t. 15. Hab. in America calidior. ¶

4. *giganteum*, fol. flaccidis undulatis, flor. sessilibus umbellatis, petalis concavis. *Andrew.* t. 169. Hab. in Africa prope Sierra Leone. Pet. albida. Stam. et pistil. declinata.

5. *urceolatum*, spatha multiflora, flor. campanulato-urceolatis pendulis, tricoloribus, fol. oblongis petiolatis. Flor. Peruv. 3. p. 58. t. 287. Hab. in Andium nemorib. prope Pozuzo. Cor. a medio ad basin lutea, superne viridis, marginibus albi la. ¶

6. *bracteatum*, fol. oblongo-lanceolatis basi attenuatis, margine cartilagineis glabris, apice subcallosis; flor. pedicellatis, tubo limbo brevior, spathis numerosis longioribus. Willd. p. 47. Hab. . . ¶

7. *nervosum*, fol. subrotundis nervosis, filamentis basi dilatatis undulatis. L'Hérit. sert. angl. 8. *Amaryllis* rotundifolia. Lam. enc. t. p. 124. Rumph. 6. t. 70. f. 1. Hab. in Philippinis. Scapus multiflorus polyphyllus. ¶

783. *AGAPANTHUS*. *Cor.* infera, infundibuliformis, regularis, sexpartita.

1. *umbellatus*, scapo fol. linearibus longiore, flor. umbellatis, tubo brevissimus.

Willd. II. p. 47. Les Liliacées. t. 4. L'Hérit. sert. angl. *Mauhlia* linearis, fol. linearibus scapo brevioribus. Thunb. prod. 60. Mill. ic. t. 210. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

2. *ensifolius*, scapo fol. lanceolatis brevior, flor. racemoso-umbellatis. *Mauhlia* ensifolia. Thunb. prod. 60. t. 3. Cam. priore. ¶

784. *EUSTEPHIA*. *Cor.* supera tubulosa cylindracea bifida. *Nect.* fovea 6 in tubo corollae. *Filam.* tricuspidata, discreta.

1. *coccinea*. Car. ic. 3. p. 20. t. 238. Hab. . . Habitu *Cyrtanthi*, sed nectariis et staminibus distincta. Fol. linearia. Flor. nutantes umbellati. W. ¶

785. *CYRTANTHUS*. *Cor.* supera incurva, tubulosa, clavata, sextida: laciniis ovato-oblongis. *Filamenta* tubo inserta, apice conniventia.

1. *angustifolius*, fol. linearibus canaliculatis, cor. tubo cylindraceo. Willd. p. 48. Ait. Kew. t. p. 414. Curt. mag. t. 271. *Crinum* angustifolium. Lin. suppl. 195. *Amaryllis* cylindracea. L'Hérit. sert. angl. 15. Hab. ad Cap. b. spei. Fl. purpurei. ¶

2. *ventricosus*, fol. linearibus planis strictis, cor. tubo ventricoso, staminibus adscendentibus. Willd. p. 49. C. angustifolius. Jacq. hort. Schoenb. t. p. 40. t. 76. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. limbus planus. †

3. *obliquus*, fol. lineari-lanceolatis obtusis planis oblique flexis, cor. tubo obverse conico. Willd. *Andrew.* t. 265. Jacq. hort. Schoenb. t. p. 39. t. 75. *Crinum*. Lin. suppl. 195. *Amaryllis* umbella. L'Hérit. sert. angl. 15. t. 15. Flor. coccinei, limbo virescente. ¶

786. *AMARYLLIS*. *Cor.* varia hexapetaloides irregularis. *Filamenta* fauci tubi inserta declinata (aut recta) inaequalia proportionem vel directione.

\* *Spatha uniflora*.

1. *lutea*, spatha uniflora, corolla campanulata aequali, staminibus strictis. Lin. Syst. Veg. 3ag. Willd. Sp. t. p. 50. *Colobium* luteum majus. Bauh. pin. 60. Hab. in Hispania, Italia, Thracia. Flor. autumn. Flor. lutei.

2. *Atamasco*, spatha bifida uniflora, cor. campanulata aequali, pistillo declinato.

Les

Les Liliacées. t. 31. Catech. car. 3. p. 12. t. 12. Pluck. alm. 220. t. 42. f. 3. Moris. 4. t. 24. f. 4. Hab. in Virginia. Fl. vere. Flor. albidis subsessiles.

3. *aurea*, spatha 1-flora, cor. campanulata patentiuscula, stam. erectis, stylo declinato, bulbo bulbillis obvallato. Flor. Peruv. 3. p. 56. t. 286. f. a. Hab. in arvis, inter segetes in Peru.  $\overline{\text{T}}$

4. *flammea*, spatha 1-flora, cor. laciniis semiconvolutis superne patentibus reflexis, genitalibus brevibus erectis. Flor. Peruv. 3. l. c. fig. b. Feuill. Obs. t. 3. p. 29. t. 21. Cum priore, cui valde affinis dicitur. Cor. flammeo-coccinea.  $\overline{\text{T}}$

5. *pumilio*, spatha diphylla uniflora, cor. infundibuliformi aequali, laciniis revolutis, staminib. inclinatim, alternis brevioribus. Ait. Kew. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. albidia notata, interne lineis sex rubris. Stigma trifidum, lacinae lineares rubicundae apice albae. Ait.

6. *tubispatha*, spatha monophylla tubulosa bifida uniflora, pedunculo spatha duplo longiore. L'Herit. sert. angl. 9. Hab. in Bonaria.  $\overline{\text{T}}$

7. *tubiflora*, spatha uniflora diphylla, cor. infundibuliformi, tubo longissimo. L'Herit. sert. angl. 10. Feuill. peruv. 3. p. 29. t. 20. Hab. in Limae, Chancaae arenosis.  $\overline{\text{T}}$

8. *maculata*, spatha uniflora diphylla linearis, flore pedunculato, genitalibus declinatis. L'Herit. sert. angl. 10. Hab. in regno. Chilensis. Scapus punctis lineatis maculatus.  $\overline{\text{T}}$

9. *chilensis*, spatha uni-seu biflora subbifolia, flor. pedunculatis, fol. linearibus. L'Herit. sert. angl. 11. Feuill. peruv. 3. t. 21. Cum priore. Flor. purpurei.  $\overline{\text{T}}$

10. *clavata*, spatha uniflora diphylla subulata, cor. clavata. L'Herit. sert. angl. 11. Willd. p. 52. Hab. in Africa australi.  $\overline{\text{T}}$  +

11. *formosissima*, spatha uniflora, cor. inaequali, riuigente: petalis tribus genitalibusque declinatis. L. Les Liliacées. t. 5. Dill. elib. 195. t. 162. f. 196. Rudb. 2. f. 10. Hab. in America meridionali. Flor. purpurascunt, fol. anteriores.  $\overline{\text{T}}$

\*\*\* *Spatha biflora*.

12. *reginae*, spatha subbiflora, cor. basi tubulosae campanulatis quinquepartitis, fauce tubi hirsuta. L'Herit. sert. 12. Mill. dict. t. 24. Hab. in Caribaeis.  $\overline{\text{T}}$

13. *speciosa*, spatha subbiflora, cor. erectis basi tubulosae campanulatis semi-

quinquefidis, fauce tubi glabra. L'Herit. sert. angl. 12. A. elata. Jacq. Schoenb. t. 62. A. purpurea. Ait. Willd. p. 51. Li. suppl. 195. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. sanguineo-purpurei magni umbellati. L.  $\overline{\text{T}}$

14. *linearis*, fol. linearibus, cor. campanulatis, laciniis duabus angustioribus. Willd. Crinum lineare. Lin. suppl. 195. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. magni, albi.  $\overline{\text{T}}$

15. *equestris*, spatha subbiflora, pedicellis erectis sparsis brevioribus, tubo filiformi horizontali, limbo oblique patulo sursum curvo, fauce pilosa. Ait. Kew. t. p. 417. Jacq. Schoenb. t. p. 33. t. 63. Herm. parad. 194. t. 194. Merian. surinam. t. 22. Hab. in America calidiore.  $\overline{\text{T}}$

16. *reticulata*, spatha subbiflora, cor. basi tubulosae nutantibus, fauce tubi glabra, scapo compresso, fol. oblongis basi attenuatis. Ait. Kew. t. p. 417. Andrew. t. 179. Hab. in Brasilia.  $\overline{\text{T}}$

17. *tatarica*, spatha subbiflora, cor. subcampanulatis profunde sexpartitis, lacinia supra angustissima, inferiore obovata acuminata, fol. linearibus scapo longioribus. Willd. p. 54. Pall. itin. 3. app. n°. 85. t. D. f. 1. Hab. in Siberia. Cor. fere hexapetala.

\*\*\* *Spatha multiflora*.

18. *Belladonna*, cor. erectiusculis hexapetalis laciniis planis, scapo compresso, fol. acnte canaliculatis obtuse carinatis alaberrimis. Ait. Kew. A. spatha multiflora, cor. campanulatis aequalibus ungue reflexis, genitalibus declinatis. L. Seb. thes. 1. p. 25. t. 17. f. 1. Hab. in Caribaeis, Barbados, Surinamo. Bulbus viridis. Cor. campanulata, incarnata: fundo viridi-alicante. Pet. 3. interiora basi ciliata. Styl. ruber. Lin. +

19. *miniata*, spatha 2-4-flora, cor. campanulatis ringentibus: lacinia supra retroflexa; infima angustiori, genital. decumbentibus. Flor. Peruv. 3. p. 57. Hab. in Andium nemorib. ad versura et in hortis. Cor. incarnato-miniata. Bulbus sectus et aëri expositus statim minii colorem acquirit. L. c.  $\overline{\text{T}}$

20. *bicolor*, spatha 6-12-flora, cor. subcampanulatis rubris apice virescentibus, nectar. bicornibus. Flor. Per. 3. p. 57. Hab. in praeruptis Tarmae, etc.  $\overline{\text{T}}$

21. *vittata*, flor. pedicellatis, cor. cuneiformi-infundibuliformibus, petalorum exteriorum rachibus interiorum margine adnatis, scapo tereti, stigmatibus sulcatis.

Ait. Kew. 1. p. 418. Curt. mag. t. 129. Les Liliacées. t. 10. L'Herit. sert. t. 15.  $\mathcal{T}$

22. *falcata*, flor. umbellatis longius pedunculatis sexpartitis, fol. falcatis, margine cartilagineo muricato discolor. L'Herit. sert. 13. Crinum falcatum. Jacq. hort. 3. p. 34. t. 60. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

23. *ornata*, flor. sessilibus, cor. basi tubulosis, tubo spathis limboque longiore curvo, limbi laciniis oblongis aristatis, laciniis infima divaricata, concava. Ait. p. 418. Hab. in Guinea.  $\mathcal{T}$

24. *longifolia*, flor. pedicellatis, spatha 12-20-flora, cor. basi tubulosis, tubo curvo brevi, limbi laciniis lanceolatis obtusis, fol. lato-subulatis canaliculatis apice flaccidis. Ait. p. 419. Ehret. pict. t. 13. Jacq. ic. 2. t. 362. Herm. parad. t. 195. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

25. *montana*, spatha multiflora, fol. lineari-subulatis, petalis alternis mucronatis, genitalibus erectis. Billard. ic. pl. syr. 2. p. 5. t. 1. Hab. in altis montibus Libani. Cor. caerulea. Singularis scapo folioso, spatha terminati multiflora et axillaribus unifloris. Willd. p. 56.  $\mathcal{T}$

26. *zeylanica*, spatha multiflora, cor. reclinatis, tubo filiformi longissimo; laciniis uncinatis. L'Herit. sert. angl. 13. A. bulbisperma pericarpio bulbifero. Burm. prod. 19. A. lineata. Lam. enc. 1. p. 123. Crinum zeylanicum. Lin. Ehret. pict. 5. f. 2. Trew. Ehret. t. 13. Tulipa javana. Rumph. 5. t. 105. Hab. in India orientali. Flor. odorati, candidi, striis purpureis.  $\mathcal{T}$

27. *revoluta*, flor. pedicellatis, cor. basi tubulosis, tubo filiformi brevi curvo, fol. linearibus angustis canaliculatis longis ab ortu flaccidis. Ait. Kew. 1. p. 419. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. suaveolentes.  $\mathcal{T}$

28. *latifolia*, spatha multiflora, flor. pedicellatis basi tubulosis, fol. oblongo-lanceolatis. L'Herit. sert. angl. 14. Rheed. 11. t. 39. Rudb. f. 12. Hab. in Indiae arenosis.  $\mathcal{T}$

29. *aurea*, spatha multiflora, cor. basi tubulosis sexpartitis, laciniis linearibus undulatis, genitalibus declinatis, cor. longioribus. L'Herit. angl. p. 14. Les Liliacées. t. 61. Jacq. Schoenb. 1. p. 38. t. 73. Hab. in China. Fol. linearia. Cor. lutea. Limbi lacinae lineari-lanceolatae apice incrassatae subuncinatae. Ait.  $\mathcal{T}$

30. *orientalis*, spatha multiflora, flor. pedicellatis sexpartitis pedunculis sesquipedioribus irregularibus, germinibus cuneiformibus angulatis. Ait. Kew. 1. p. 420. Jacq. Schoenb. 1. p. 39. t. 74. Moris. 4. 4.

t. 10. f. 35. Brunswigia. Heist. monog. c. 69. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. linguiformia.  $\mathcal{T}$

31. *sarniensis*, spatha multiflora, cor. revolutis, genitalibus erectis. L. Ehret. select. t. 9. f. 3.

$\beta$ . *capensis* (*sarniensis*), spatha multiflora, cor. patentissimis apice reflexis, genitalibus rectiusculis cor. longioribus, fol. ensiformi-linearibus. Jacq. Schoenb. 1. p. 34. t. 66. Hab. in Japonia, nunc in Sarnia insula Angliae, ubi per naufragium deportata.  $\beta$ . ad Cap. b. spei.

32. *Fothergillii*, spatha, multiflora, cor. hexapetala revoluta, general. erectis, fol. linearibus subcanaliculatis obtusis glaucis. Andrew. t. 163. Hab. in China.

*Obs.* Ob cor. radiatam et stam. recta cum priore distinctum efficere meretur genus.

33. *marginata*, petalis oblongis revolutis, genitalibus rectiusculis cor. longioribus, fol. lingulatis humi adpressis cartilagineo-marginatis. Willd. p. 59. Jacq. Schoenb. 1. p. 34. t. 65. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. Haemanthi coccinei. W.  $\mathcal{T}$

34. *curvifolia*, petalis oblongis undulatis revolutis, genitalibus cor. longioribus rectiusculis, fol. strictis lineari-casiformibus canaliculatis. Willd. Jacq. l. c. t. p. 33. t. 64. Ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

35. *undulata*, petalis linearibus canaliculatis undulatis, genitalibus deflexis cor. brevioribus, stigmatibus obsolete. Ait. 1. p. 420. Jacq. hort. 3. p. 11. t. 13.  $\mathcal{T}$

36. *radiata*, petalis lanceolatis undulatis erectis, genitalibus deflexis divergentibus cor. duplo longioribus, stigmatibus obsolete. Andrew. t. 95. Hab. in China. Facie Gloriosae; at stigm. integrum.

37. *humilis*, spatha tri- seu quadriflora, petalis lanceolatis subringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato, genitalibus ascendentibus petal. brevioribus, fol. linearibus obtusis glabris nudis plimis. Willd. p. 60. Jacq. Schoenb. 1. p. 36. t. 63.

38. *flexuosa*, spatha multiflora, petalis lanceolatis subringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato, genitalibus ascendentibus petalis brevioribus, fol. linearibus obtusiusculis concavis pustulato-punctatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spei.

39. *radula*, spatha multiflora, petalis patentissimis, infimo divaricato, fol. facie ad oras muricato-asperis prostratis. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 35. t. 68.

40. *striata*, spatha multiflora, cor. campanulatis aequalibus apice reflexis, fol.

subovatis, dorso striatis. Jacq. hort. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

41. *crispa*, spatha pauciflora, petalis patentissimis crispis, fol. linearibus angustissimis. Jacq. Schoenb. 1. p. 37. t. 72. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. minutissimi.  $\mathcal{T}$

42. *stellaris*, spatha multiflora, cor. patentibus planis, tubo brevissimo, stam. inaequalibus divaricatis cor. brevioribus, stylo recto, fol. linearibus erectis. Willd. p. 61. A. spatha multiflora, petalis patentissimis, tribus alternis infra medium barbatis, fol. linearib. erectis. Jacq. Schoenb. 1. p. 37. t. 71. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

43. *caspia*, spatha multiflora, cor. campanulatis, tubo brevissimo, filam. erectis cor. longioribus, fol. lanceolatis undulatis. Willd. p. 62. Crinum caspium. Pall. itin. 2. app. n<sup>o</sup>. 105. t. O.  $\mathcal{T}$

Obs. Genus hocce speciosas complectens species, quoad corollae formam, divisionem et staminum directionem forte dividi debet.

787. *MILLA*. Cor. infundibuliformis, limbo sexpartito plano. *Anthere* fauci insertae. *Germen* pedicellatum. *Caps.* supera.

1. *biflora*. Cav. ic. 2. p. 76. t. 196. Millea. Willd. Sp. II. p. 62. Fol. linearia laxa. Cor. magna alba Sisyrynchi.

788. *BULBOCODIUM*. Cor. infundibuliformis hexapetala; unguibus angustis staminiferis. *Caps.* supera.

1. *vernum*. Retz. obs. 2. t. 1. Rudb. elys. 2. p. 128. f. 2. Hab. in Hispania, Helv., Gall. et Russia.  $\mathcal{T}$

789. *SOWERBEA*. Cor. infera, hexapetala. *Filam.* tria biantherifera, tribus sterilibus interstinctis.

1. *juncea*. Smith. in Act. Soc. Lin. v. 2. Hab. in Australasia. Herba inodora, juncea, radice fibrosa. Scapus nudus umbellifer.

790. *ALLIUM*. Cor. 6-partita, patens. *Spatha* multiflora. *Umbella* congesta. *Caps.* supera. (Flor. capitati aut umbellati.)

\* *Fol. caulina plana. Umbella capsulifera.*

1. *Ampeloprasum*, caule planifolio um-

bellifero, umbella globosa staminib. tricuspidatis, petalis carina scabris. Lin. Willd. Sp. II. p. 63. Smith. brit. 1. p. 355. Rudb. elys. 2. p. 151. f. 1. Hab. in Oriente et in insula Holms Angliae. Fol. unc. 1. fere lata margine denticulato-sabris. Sm.  $\mathcal{T}$

2. *Porrum*, caule planifolio umbellifero, staminib. tricuspidatis, radice tunicata, fol. basi vaginantib. Blackw. t. 421. Hab. in vineis Helvetiae et in hortis colitur.  $\mathcal{T}$

3. *lineare*, caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis cor. duplo longioribus. L. dict. n<sup>o</sup>. 4. Gmel. sibir. 1. p. 56. t. 13 et 14. f. 1. Hab. in Sibiria.  $\mathcal{T}$

4. *suaevolens*, scapo nudo teretiusculo, fol. linearibus carinatis, umb. subrotunda, staminib. subulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 364. Collect. 2. p. 305. Hab. in Austria.  $\mathcal{T}$

5. *deflexum*, caule planifolio umbellifero, staminib. tricuspidatis, longitudine corollae, fol. angusto-linearibus, scapo declinato. Willd. p. 65. Hab. . .  $\mathcal{T}$

6. *rotundum*, caule planifolio umbellifero, staminib. tricuspidatis, umb. subglobosa, flor. lateralibus nutantibus. Hab. in Europa austr.  $\mathcal{T}$

7. *Victorialis*, caule planifolio, umbellifero, umb. rotundata, staminib. lanceolatis corolla longioribus, fol. ellipticis. L. Blackw. t. 544. Hab. in alpinis. Flor. flavescent.

8. *subhirsutum*, ~~caule teretiusculo~~, staminib. subulatis. L. fol. radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. Hall. alt. 18. Hab. in Africa, Italia, Hispania, Oriente.  $\mathcal{T}$

9. *magicum*, caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, staminib. simplicibus. L. Sauv. monsp. 18. Hab. . . Fol. radicalia canaliculata ampla.  $\mathcal{T}$

10. *obliquum*, caule planifolio umbellifero, staminib. filiformibus flore triplo longioribus, fol. obliquis. L. Jacq. ic. rar. 1. t. 62. Misc. 2. p. 308. Gmel. sibir. 1. p. 49. t. 9. Hab. in Sibiria. Umb. globosa, primo nutans.  $\mathcal{T}$

11. *ramosum*, caule subplanifolio umbellifero, staminib. subulatis longioribus, umb. globoso, fol. linearibus subconvexis. L. Gmel. sib. 1. p. 52. t. 11. f. 1. Cum priore. E medio caule ex ala, folio opposito; ramus nudus, longitudine caulis. L.

12. *tataricum*, caule planifolio umbellifero, foliis semicylindricis, staminibus

simplicibus, umb. plana. Lin. suppl. p. 196. Hab. in Sibiria. Caul. teres, semipedalis.  $\mathcal{T}$

13. *roseum*, caule planifolio umbellifero, umb. fastigiata, petalis emarginatis, staminibus brevissimis simplicibus. Desf. Atl. t. p. 287. Magn. monsp. 11. t. 10. Rudb. elys. 2. p. 166. f. 17. Hab. Monspelii, Pedemonti in vineis et in arvis Algeriae. Flor. magni rubri.  $\mathcal{T}$

14. *graminifolium*, caul. umbellifero, umb. subglobosa, stam. simplicibus cor. longioribus, fol. angusto-linearibus basi vaginantibus. Hab. prope Dax (Départ. des Landes) Thore. Caul. ultra pedalis. Cor. campanulata, carina rubra. Cum sequente non confundi debet.

15. *appendiculatum*, caul. umbellifero, stam. subulatis, petalis internis basi auriculatis, fol. angusto-linearibus subcarinatis. Hab. in Pyrenaeis supra saxa. Flor. inodori albi. Ramond.

\* \* *Fol. caulina plana. Umbella bulbifera.*

16. *sativum*, caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminib. tricuspidatis. L. Moris. 2. 4. t. 15. f. g. Hab. in Sicilia.  $\mathcal{T}$

17. *Scorodoprasum*, caule planifolio bulbifero, fol. crenulatis, vaginis ancipitibus, staminib. tricuspidatis. L. Hab. in Oelandia, Dania, Pannonia, Germania.  $\mathcal{T}$

18. *arenarium*, caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, spatha mucica, staminibus tricuspidatis. L. Flor. dan. t. 290. *Desf. Atl. t. 2. f. 2. ante anthesin cernuus. Petal. carina scabriuscula.*  $\mathcal{T}$

19. *carinatum*, caule planifolio umbellifero, staminibus subulatis, spatha acuta longissima. A. umbella bulbifera, vagina bicorni, fol. carinatis. Hall. all. 27. t. 2. f. 2. Lob. ic. 156. Hab. in Germania, Helvetia, Carniolia. Spatha longissima.  $\mathcal{T}$

\* \* \* *Fol. caulina teretia. Umbella capsulifera.*

20. *Sphaerocephalon*, caule teretifolio umbellifero, fol. semiteretibus, staminibus tricuspidatis corolla longioribus. Mich. N. gen. 25. t. 24. f. 2. Hab. in Italia, Sibiria, Helvetia, Germania.  $\mathcal{T}$

21. *compactum*, caul. teretifolio, spatha brevissima abrupte acuminata, capit. sphaerico bulbis confertissimis. Thuill. Flor. Paris. p. 167. Hab. in sepib. et dumetis circa Parisios. Flor. purpurascens. A. *vineali* affine.

22. *parviflorum*, caule subteretifolio umbellifero, umb. globosa, staminib. simplicibus cor. longioribus, spatha subulata. L. Hab. in Europa australi. Facie A. *sphaerocephali*.  $\mathcal{T}$

23. *Pallasii*, caule subteretifolio umbellifero difformi, staminib. simplicibus corollam aequantibus, stylo brevissimo. Murr. Comm. goett. 6. 1775. p. 32. t. 3. Hab. in Sibiria. Cor. exigua purpurea.  $\mathcal{T}$

24. *descendens*, caule subteretifolio umbellifero, pedunc. exterioribus brevioribus, staminib. tricuspidatis. L. Hall. all. n°. 11. t. 2. f. 1. Rudb. elys. 2. p. 160. f. 20. Hab. in Helvetia.  $\mathcal{T}$

25. *moschatum*, caule teretifolio umbellifero, umb. fastigiata subsexflora, petalis acutis, staminib. simplicibus, fol. setaceis. L. Baub. prodr. 28. t. 28. Rudb. elys. 2. p. 166. Hab. in Galloprovinciae, Narbonae, Hispaniae apricis elevatis.

26. *flavum*, caule teretifolio umbellifero, flor. pendulis, petalis ovatis, staminibus corolla longioribus. L. Jacq. austr. t. 141. Rudb. elys. 2. p. 157. f. 6. Hab. prope Fontainebleau, Monspelii, in Austria. Caul. foliosus, rore glauco. Stam. simplicia.  $\mathcal{T}$

27. *pallens*, caule subteretifolio umbellifero, flor. pendulis truncatis, staminibus simplicibus cor. aequantibus. Gouan. illustr. 24. Colum. cephr. 2. p. 6. t. 7. f. 2. Hab. in Italia, Hispania, Monspelii, Pannonia. Cor. campanulata, truncata, alba. Stylus vix ullus.

28. *puncusatum*, caule subteretifolio umbellifero, pedunc. capillaribus effusis, staminibus simplicibus, spatha longissima. L. Scop. carn. ed. 2. n°. 348. A. fol. teretibus, vagina bicorni, umbella pendula suave purpurea. Hall. opusc. n°. 25. cum ic. Hab. in Sibiria, Austria, Italia, Helvetia, Carniolia, Oriente.  $\mathcal{T}$

29. *odoratissimum*, bulbo tunicato poroso, fol. lineari-subulatis crassiusculis, spatha brevi subquadrifida, flor. umbellatis non bulbiferis. Desf. Atl. 1. p. 289. t. 83. Hab. in arenis deserti prope Olsam et Tozzer. Flor. hyeme.  $\mathcal{T}$

30. *vineale*, caule teretifolio, bulbifero, staminib. tricuspidatis. L. A. radice multiplici, fol. fistulosis, capite sphaerico, bulbifero, staminibus alternis trifidis. Hall. belv. n°. 1221. Hab. in Germania, Helvetia et Anglia in pascuis et inter segetes. Spatha decidua. Stam. setis duabus longis, extra florem eminentibus. L.  $\mathcal{T}$



31. *oleraceum*, caule teretifolio bulbifero, fol. scabris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus simplicibus L. Hall. all. n°. 26. f. 2. Hab. in Suecia, Germania, Helvetia, Ingrida. Spathae foliola basi ventricosa. ¶

\*\*\* *Folia radicalia. Scapus nudus.*

32. *nutans*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus planis, staminib. tricuspidatis. L. Porrum scapo antequam floruerit, nutante. Gmel. sibir. 1. p. 55. t. 12. Hab. in Sibiria. Stam. dentes obliquantur. Var. acetate et leco, ut vix dignoscatur. L. ¶

33. *ascalonicum*, scapo nudo tereti, fol. subulatis, umb. globosa, staminibus tricuspidatis. L. Moris. s. 4. t. 14. f. 3. Hab. in Palestina. Statura fere A. Schoenoprasii. Petala ovato-lanceolata, caerulea. Stam. alterna latissima.

34. *senescens*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus subtus convexis laevibus, umb. subrotunda, staminib. subulatis. Lin. Gmel. sibir. 1. p. 53. t. 11. f. 2. Hab. in Sibiria, Silesia, Helvetia. ¶

35. *illyricum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus lanceolatis planis, umb. fastigiata, staminib. subulatis. Willd. p. 76. Jacq. ic. 2. t. 365. Collect. 3. p. 273. Hab. in vineis et olivetis Austriae littoralis. ¶

36. *odorum*, scapo nudo teretiusculo, fol. linearibus canaliculatis subtus angulatis, umb. fastigiata. L. Hab. in Europa australi. Cor. albae, odoratae. Germen punctis excavatis. ¶

37. *inodorum*, scapo nudo subtriquetro, fol. linearibus planis subtus carinatis, umb. fastigiata florifera, staminib. simplicib. Hab. in Carolina. Simile sequenti, sed duplo major. W. ¶

38. *angulosum*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umb. fastigiata. L. Jacq. aust. 5. p. 11. t. 43. Gmel. sibir. 1. p. 58. t. 14. f. 2. Baub. hist. 2. p. 564. t. 764. Hab. in Sibiriae, Germaniae humidiusculis et montosis. ¶

39. *fragrans*, scapo tereti, fol. linearib. carinatis obtusis contortis, pedunc. nudis, staminib. planis. Vent. Hort. Cels. p. 26. t. 26. Hab. in Africa. Umb. laxa. Flor. albi, striis purpureis, magni.

40. *striatum*, scapo nudo subtriquetro fol. linearibus subtus striato-sulcatis brevioribus, umb. fastigiata, petalis obtusis, staminibus simplicibus. Willd. p. 77. Jacq.

ic. 2. t. 366. Collect. suppl. 51. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

41. *narcissiflorum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus subulatis longiore, umb. fastigiata, petalis mucronatis, staminibus simplicibus. Willd. A. caule nudo tereti, umbella terminali inclinata, petalis lanceolatis, staminibus simplicibus brevioribus. Villars. delph. 2. p. 258. t. 6. Hab. in Galliae australis montibus. ¶

42. *pedemontanum*, scapo subtrigono, fol. linearibus obtusis, umb. pauciflora. Willd. A. nigrum. Allion pedem. n°. 1881. t. 25. f. 1. Hab. in alpinis Pedemontanis. ¶

Obs. Ab A. nigro distinctum: fol. linearibus, umb. paucifloris, odore quum A. nigrum plane inodorum. Willd.

43. *nigrum*, scapo nudo tereti, fol. lanceolatis, umb. hemisphaerica, petalis patentibus, staminibus simplicibus. Willd. p. 78. Retz. obs. 1. p. 15. et 6. p. 27. A. multibulbosum. Jacq. aust. 1. p. 9. t. 10. A. monspessulanum. Gouan. illust. 24. t. 16. Desf. Atl. 1. Hab. Algiriae et in Galloprovincia. ¶

44. *canadense*, scapo nudo tereti, fol. linearibus, capitulo bulbifero. L. Kalm. it. 3. p. 79. Cfr. Michaux. Flor. 1. p. 194. Hab. in Canada. ¶

45. *mutabile*, scapo tereti, fol. superne subsaeceis convolutis flaccidis, umbel. submultiflora, stam. simplicibus. Mich. l. c. p. 195. Hab. in Georgia meridionali. Interdum capitulum totum bulbiferum. M.

46. *ursinum*, scapo nudo triquetro, fol. ovato-lanceolatis petiolatis, umb. fastigiata. L. Flor. dan. t. 757. Hab. in nemorosis et pratis humidis. Vere.

47. *clusianum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus planis ciliatis, umb. pauciflora, petalis obovatis concavis. Retz. Willd. p. 79. Moly Minas. Clus. hist. 1. p. 192. fig. Hab. in Europa australi. Bulbus pisi magnitudinis, ovato-turbinatus. Cor. candida. Stam. simplicissima. ¶

48. *triquetrum*, scapo nudo, foliisque triquetris, staminib. simplicibus. D. Rudb. elys. 2. p. 159. f. 16. Desf. Atl. 1. p. 288. Hab. in Hispania, circa Narbonam, et in Algeria. Fol. Sparganii, valde carinata. Cor. alba. ¶

49. *Cepa*, scapo nudo inferne ventricoso longiore fol. teretibus. L. Hab. ... ¶

50. *Moly*, scapo nudo subcylindrico, fol. lanceolatis sessilibus, umb. fastigiata. L. Moly Rayo flore. Swert. flor. 1. t. 60. f. 2.

Hab. in Hungaria, Baldo, Monspelii, Pyrenaeis.  $\mathcal{T}$

51. *triccoccum*, scapo nudo semitereti, fol. lanceolato-oblongis planis glabris, umb. globosa, seminibus solitariis. Ait. Kew. 1. p. 428. Hab. in America boreali.  $\mathcal{T}$

52. *fistulosum*, scapo nudo adaequante folia teretia ventricosa. L.  $\beta$ ? A. altaicum. Pall. itin. 2. app. n<sup>o</sup>. 108. Hab. ...  $\beta$ . in Sibiria.  $\mathcal{T}$

53. *Schoenoprasum*, scapo nudo adaequante folia teretia subulato-filiformia. L. A. radice multiplici, fol. radicalibus teretibus, scapi longitudine, flor. nimbellatis cylindricis. Hall. helv. n<sup>o</sup>. 1226. Flor. dan. t. 97. Hab. in alpibus Sibiriae, Orlandiae.  $\mathcal{T}$

54. *sibiricum*, scapo subnudo tereti, fol. semiteretibus, staminibus subulatis, petal. lanceolatis acutis. Willd. p. 82. Murr. Comment. goett. 6. 1775. p. 33. t. 4. A. roseum. Krock. Siles. t. 43. Buxb. cent. 1. 45. Hab. in Sibiria et in montibus Silesiae.  $\mathcal{T}$

55. *stellerianum*, scapo nudo tereti, fol. semicylindricis, umb. densis, staminibus subulatis cor. longioribus. Willd. Gmel. sib. 1. p. 63. t. 16. f. 1. 2. Hab. in Sibiria ad Jeniseam fluvium.  $\mathcal{T}$

56. *capillare*, scapo nudo tereti, fol. capillaceis, umb. pauciflora, petalis lanceolatis acutis. Willd. Cavan. ic. 3. p. 4. t. 206. f. 1. Hab. in regno Valentino.  $\mathcal{T}$

57. *setaceum*, scapo nudo tereti, fol. setaceo-subulatis ciliato-serratis, petal. ovato-lanceolatis apice emarginatis. Plant. Hongar. p. 70. t. 68. Hab. in lapidosis apricis in Hungaria. Valvul. spathae in mucronem productae.

58. *tenuissimum*, scapo nudo tereti, fol. lineari-subulatis, umbella pauciflora, petalis subrotundo-ovatis obtusis. Willd. Gmel. sib. 1. p. 61. t. 15. f. 2. 3. Hab. in Sibiria.

59. *gracile*, scapo nudo tereti longissimo, fol. linearibus canaliculatis, staminibus subulatis basi connatis. Ait. Kew. 1. p. 429. Hab. in Jamaica. Fol. narcissina. Petala inferne cum staminibus connata in tubum viridem. A.

60. *Chamae-Moly*, scapo nudo subnullo, capsulis cernuis, fol. planis ciliatis. L. Cav. ic. 3. p. 4. t. 207. f. 1. Moris. s. 4. t. 16. f. 6. Desf. Atl. 1. p. 288. Hab. in Italia, Hispania et Algeria.  $\mathcal{T}$

791. *LILIUM*. Cor. 6-petala. campanulata: linea longitudinali

nectarifera, laciniiis saepius reflexis. Caps. valvulis filo cancellato connexis.

\* *Cor. campanulatis erectis.*

1. *cordifolium*, fol. cordatis petiolatis. Willd. Sp. pl. II. t. 1. p. 84. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 332. Hemerocallis cordata. Thunb. Flor. jap. 143. Kaempf. t. 76. Hab. in Japonia.  $\mathcal{T}$  +

2. *longiflorum*, fol. sparsis lanceolatis, cor. tubulato-campanulatis, caule glabro. Thunb. l. c. p. 333. L. candidum. Thunb. jap. p. 133. Hab. in Japonia prope Nagasaki et Miaco. Caul. teres nolosus. Differt a sequente: fol. basi latioribus, cor. triplo longiori cylindrica. A. L. bulbifero cor. maxima alba. Th. Conf. Andrew Rep. p. 194.

3. *candidum*, fol. lanceolatis sparsis basi attenuatis, cor. campanulatis intus glabris. Curt. mag. t. 278. Knorr. del. 1. tab. L. Blackw. t. 11.  $\beta$ . *peregrinum*, fol. sparsis, cor. campanulatis cernuis, petalis basi angustioribus. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 2. Hab. sponte in Palaestina, Syria, Gades, Helvetia. Olor gratus, quod non in caeteris.

4. *japonicum*, fol. sparsis lanceolatis, cor. cernuis subcampanulatis. Thunb. jap. 133. Hab. in Japonia. Flor. terminales reflexo-cernui. Cor. campanulata albidula palmaris.

5. *lanceifolium*, fol. sparsis lanceolatis, cor. erectis subcampanulatis. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 333. L. bulbiferum. Thunb. Flor. jap. p. 134. Hab. in Japonia. Caul. angulatus hirsutus. Cor. parvae unguiculatae albae. Axillae foliorum superiorum bulbiferae. Th.

6. *bulbiferum*, fol. sparsis trinerviis, cor. campanulatis erectis: intus scabris. Jacq. Flor. austr. t. 226. Hab. in Europa australiore.  $\mathcal{T}$

$\beta$ . *croceum*, fol. sparsis 5-nerviis, pedunc. simplicibus, bulbis o. petal. interne macul. nigris variegatis. Col. in hortis. Conf. Vill. 2. p. 275. An huc potius Jacq. Fl. austr. t. 226?

\*\* *Cor. revolutis.*

7. *Catesbaei*, fol. sparsis lineari-lanceolatis, caule unifloro, cor. erecta, pet. longe unguiculatis margine undulatis, apice reflexis. Willd. l. c. p. 86. Walt. carol. 123. Michaux. 1. p. 97. L. spectabile. Salisb. Icon. rar. 5. t. 5. L. carolinianum. Lam. enc. 3. p. 514. Catesb. t. 58. Hab. in Carolina humidiusculis.  $\mathcal{T}$

8. *speciosum*, fol. sparsis ovatis petiolatis; caule ramoso, ramis unifloris, flore

*Cernuo*, cor. revolutis intus papilloso-dentatis. Willd. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 332. Kaempf. t. 47. Hab. in Japonia.  $\mathcal{T}$

9. *pomponium*, fol. sparsis lineari-subulatis, flor. reflexis, cor. revolutis intus papilloso-dentatis. Willd. p. 87. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 5. et ic. t. 65. f. 2. Knorr. del. 1. t. 4. L. fol. sparsis lineari-subulatis, apice caulis nudiusculo. Lam. enc. 3. p. 514.

$\beta$ . *angustifolium*, fol. linearibus sparsis, pedunc. longissimis. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 6. Hab. in Pyrenaeis, Sibiria.  $\mathcal{T}$

10. *chalconicum*, fol. lineari-lanceolatis sparsis, flor. reflexis, cor. revolutis intus punctatis. Willd. L. fol. sparsis lanceolatis, caule usque ad apicem folioso. Lam. l. c. Hab. in Persia, Carniolia.  $\mathcal{T}$

11. *superbum*, fol. imis verticillatis, caeteris sparsis, flor. racemoso-pyramidalis reflexis, cor. revolutis. Lam. enc. 3. p. 515. Trew-Ehret. 2. t. 11. Catesb. t. 56. Hab. in America septentrionali.  $\mathcal{T}$

12. *Martagon*, fol. verticillatis ovato-lanceolatis, flor. reflexis, cor. revolutis. Willd. p. 88. Jacq. austr. t. 351. Knorr. del. 1. t. 6.  $\beta$ . L. flor. reflexis, alterum hirsutum. Bauh. pin. 87. Hab. in sylvis. Vere.  $\mathcal{T}$

13. *carolinianum*, glaberrimum, fol. nerviis subverticillatis obovalibus, ramis floriferis crassis ternatis, cor. reflexis maculosis. Michaux. Flor. 1. p. 197. In herbosis humidis Car. inferioris.

14. *canadense*, fol. verticillatis linearibus, flor. reflexis, cor. revolutis campanulatis. Willd. Michaux. 1. p. 197. B. rr. nr. 778. t. 125. Moris. s. 4. t. 20. f. 9. Rudb. elys. 2. p. 177. f. 5. Catesb. t. 11. Hab. in Canada, et montib. Alleghanis Carolinae et Virginiae. Pelunc. terni. Cor. basi flavae, punctis atris.

15. *maculatum*, fol. sparsis et verticillatis lanceolatis glabris, cor. campanulatis intus maculatis, limbo reflexo. Thunb. in Act. Lin. Lond. 2. p. 334. L. canadense. Thunb. jap. 135. Hab. in Japonia. Cor. campanulata, limbo reflexo, incarnata, intus maculis purpureis.  $\mathcal{T}$

16. *camtschatcense*, fol. verticillatis, flore erecto, cor. campanulata, petalis sessilibus. L. Hab. in Canada, Camtschatca.  $\mathcal{T}$

17. *philadelphicum*, fol. verticillatis, flor. erectis, cor. campanulata, petalis unguiculatis. L. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 13. et ic. t. 165. f. 1. Hab. in Canada.  $\mathcal{T}$  +

792. FRITILLARIA. Cor. 6-petala, campanulata, supra ungues cavitate nectarifera. Stam. longitudine corollae. Sem. plana.

\* *Caps. trigonis. Bulbo uno super alterum.*

1. *persica*, racemo nudiusculo, foliis obliquis. L. Les Liliacées. t. Hab. in Persia? Racem. longus. Flor. violacei, penduli.

2. *verticillata*, fol. verticillatis lineari-lanceolatis, caule unifloro. Willd. p. 91. Hab. in Sibiria. Fol. exsiccata apice oris-pantur ac si cirrho essent instructa.  $\mathcal{T}$

3. *pyrenaica*, fol. infimis oppositis, flor. nonnullis folio interjectis. L. Hab. in Pyrenaeis, Russia.  $\mathcal{T}$

4. *Meleagris*, fol. alternis linearibus canaliculatis, caule unifloro. Willd. Flor. Dan. t. 972. Hab. in pratis Europa australioris.

Obs. Var. flor. albis (*praecox*), luteis maximis (*Italica*) et atropurpureis (*serotina*.)

5. *latifolia*, fol. alternis oblongo-lanceolatis planis, caule unifloro. Willd. p. 92. Hab. ... Colitur in hortis. Flor. viridis, stigm. obtusa canaliculata.  $\mathcal{T}$

6. *plantaginæa*, fol. radicalib. ovalibus nervosis petiolatis, caulin. lanceolatis, caul. 1-floro. Lam. enc. 2. p. 550. Habit. in Oriente. +

\* \* Ptilium. L. (*Imperialis*. Juss.) Scapus apice foliosus. Caps. angulis 6-angulis. Flor. et Sem. Fritillariae. Rad. tuberosa, basi fibrosa.

7. *imperialis*, flor. sub coma foliosa cernuis, fol. lineari-lanceolatis integerrimis. Curt. mag. t. 194. Ptilium. Lin. Hort. Cliff. p. 119. Frit. racemo comoso inferne nudo. Lin. Willd. p. 90. Imperialis coronata. Le Bot. cultiv. 1. p. 447. Hab. in Oriente, Persia. Var. quoad color. floris et fol. albo-variegata.

$\beta$ . *lutea*, major, flor. luteis patentiorib. interne non striatis. Lam. enc. 2. p. 549. Tournef. 372.

793. EUCOMIS. Cor. infera, 6-partita, persistens, patens. Fil. basi in nectarium adnatum connata. Caps. 3-locularis. Sem.

Z 4

ovata. (Scapus coma foliosa distincta.)

1. *nana*, scapo clavato, fol. lato-lanceolatis acutis. Ait. Kew. 1. p. 432. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 47. t. 92. Coll. 4. p. 213. *Fritillaria nana*. L. Hab. ad Cap. b. spei, cum *sequentibus*.

2. *bifolia*, scapo clavato, fol. ellipticis acutis geminis humi adpressis. Willd. Sp. pl. p. 92. Jacq. ic. 2. t. 449. Collect. 4. p. 215.

3. *regia*, scapo cylindrico, fol. linguiformibus obtusis humi adpressis. Ait. Kew. 1. p. 433. Frit. regia. Dill. elth. t. 92. f. 109. *Basilea coronata*. Lam. enc. 1. p. 382.

4. *undulata*, scapo cylindrico, foliis ovato-oblongis undulatis patentibus, comae fol. longitudine fere racemi. Ait. Kew. 1. p. 433. *Ornithogalum undulatum*. Thunb. prod. 62.

5. *punctata*, scapo cylindrico, fol. oblongo-lanceolatis canaliculatis patentibus, comae fol. brevibus, racemis longissimis. Ait. Kew. 1. p. 433. L'Herit. sert. angl. 18. t. 18. *Asphodelus comosus*. Houttuyn. t. 83. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

795. UVULARIA. Cor. 6-petala, erecta. Nect. fovea baseos petali. Fil. brevissima. (Flor. solitarii axillares.)

\* *Stylus* setaceus. Stigm. 3, longa. Caps. compresso-trigona, 3-locularis. Sem. ad hilum arillata.

1. *hirta*, fol. amplexicaulibus, hirtis, caule villosa. Thunb. Fl. jap. p. 36. Habit. in Japonia. Caul. pilis longis hirsutus. Flor. ignoti. †

2. *lanceolata*, fol. perfoliatis ovato-lanceolatis acuminatis. Ait. Kew. 1. p. 434. Corn. canad. t. 41. Hab. in America boreali. ¶

3. *perfoliata*, fol. perfoliatis ovatis, caps. truncata. Michaux. p. 199. Moris. 2. 13. t. 4. f. 12. Hab. in Virginia, Canada. ¶

4. *puberula*, fol. utrinque concoloribus ovalibus, basi rotundatis subamplexicaulibus, caps. sessili ovata. Michaux. Flor. 1. p. 199. Hab. in Carolinae montib. altis.

5. *sessilifolia*, fol. sessilibus lanceolato-ovalibus subtus glaucis, caps. stipitata ovata. Michaux. l. c. Hab. in Canada. ¶

6. *cirrhuosa*, foliis sessilibus cirrhis. Thunb. jap. 136. Hab. in Japonia. ¶

\*\* *Streptopus*. Cor. 6-petala subcampanulata. *Stigmata* brevissima. *Bacca* subglobose, laevigata, carthacea. Sem. hilo nudo. Michaux.

7. *amplexifolia* (*distorta*), fol. amplexicaulibus, pedicel. solitariis, medio distorto - geniculatis. Michaux. Flor. 1. p. 200. (*Streptopus distortus*.) *Uvularia*. Lin. Willd. Sp. II. p. 94. n°. 1. Moris. 2. 13. t. 4. f. 11. Hab. in Europae montibus et in Canadae sylv. nimbrosis. ¶

8. *rosea*, fol. amplexicaulibus serrulato-ciliolatis, anther. brevibus bicornibus. Michaux. p. 201. t. 18. sub *Streptopo*. Hab. in Carolinae et Canadae montibus. Flor. rosci.

9. *lanuginosa*, incana, fol. sessilibus subcordatis, pedicell. geminatis. Michaux. l. c. Hab. in altis montibus Carol. meridionalis. Flor. majusculi, virecentes.

795. GLORIOSA. Cor. 6-petala, undulata, reflexa. *Stylus* obliquus, apice trifidus.

1. *superba*, fol. cirriferis. L. Andrew. t. 129. Methonica. Herm. lugd. 688. t. 689. Les Liliacées. t. 26. Habit. in Malabar. Petala lanceolata, longa, lateribus undulata, coccinea, prope basin reflexa. Genitalia deflexa. ¶

2. *simplex*, fol. acuminatis. L. Hab. in Senegal. Fol. non cirrhosa. Flor. caerulei.

796. ERYTHRONIUM. Cor. 6-petala, campanulata: *Nectario* tuberculis 2, petalorum alternorum basi adnatis.

1. *Dens canis*. L. Gmel. sib. 1. p. 391. t. 7. E. fol. ovato-oblongis glabris nigromaculatis. Gron. virg. p. 151. Hab. in Europa australi, Sibiria et America septentrionali. ¶

797. TULIPA. Cor. 6-petala, campanulata. *Stylus* nullus.

1. *sylvestris*, caule unifloro glabro, flore (unicolore) subnutante, petalis acutis apice barbatis, fol. lanceolatis. Willd. 11. p. 95.

β? *turcica*, flore erecto petalis lanceolato-acuminatis, fol. lanceolato-linearibus. Roth. catal. 1. p. 45. Willd. l. c. Hab. in pratis Filam. basi villosa. Var. flor. pleno. ¶

2. *suaveolens*, parvula, caule unifloro pubescente, flore erecto, petalis obtusis glabris, fol. ovato-lanceolatis. Willd. p. 97. Roth. catal. bot. 1. p. 45. Lobel. ic. 127.

Hab. in Europa australi. Hyeme aut primo vere ab anthophylis in ollis colitur. Cor. flavo-coccinea variegata.  $\overline{\text{T}}$

3. *Celsiana*, caul. 1-floro glabro, flor. erecto (luteo), fol. lanceolato-linearibus canaliculatis, petiol. glabris. Les Liliacées. t. 38. Hab. in Oriente? Magnitudine prioris. Colitur in Horto Celsii.

4. *Clusiana*, caul. 1-floro glabro, flor. erecto (albo), petal. foliisque oblongo-acutis glabris: infimo vaginante. Les Liliacées. t. 37. Tulipa persica praecox. Clus. posib. p. 9. ic. In Persia? Petal. 3 interiora, basi rubescentia: unguiculo violaceo.

5. *Gesneriana*, caule unifloro glabro, flore (versicolore) erecto, petalis obtusis glabris, fol. ovato-lanceolatis. Willd. p. 97. Hab. sponte in Cappadocia et in Russia.  $\overline{\text{T}}$

6. *Esfora*, floribus erectis planiusculis, caule diphylo bi- s. trifloro, fol. lineari-subulatis. Linn. suppl. 196. Pall. it. 3. app. n.º. 86. t. D. f. 3. Hab. ad Wolam locis desertis maxime argillosis, imo salluginosis. Magnitudine Ornithog. lutei. Petala tria exteriora lanceolata dilute cyanea s. virescentia, interiora alba basi macula magna fulva. L.

7. *Breyneana*, caule multifloro polyphylo, foliis linearibus. L. Breyne. cent. t. 36. Rudb. elys. f. 11. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

798. *ALBUCA*. Cor. 6-petala, interioribus connatis, exterioribus patulis, (dorso saepius viridi-coloratis). *Sylus* triquet. Sem. plana.

\* *Staminibus tribus fertilibus.*

1. *altissima*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, fol. subulatis canaliculato-convolutis. Dryander. in Act. botm. 1784. p. 292. Jacq. ic. rar. 1. t. 36. Coll. 2. p. 264. Hab. ad Cap. b. spei, cum caeteris speciebus.  $\overline{\text{T}}$

2. *major*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, fol. lineari-lanceolatis, planiusculis. Dryand. l. c. p. 293. Jacq. ic. rar. 2. t. 443. Collect. suppl. 96. Les Liliacées. t. 69. Ornithogalum canadense. L. Sp. pl. 1. p. 308. Moris. 2. 4. t. 24. f. 7. Petala exteriora flava, apice et basi macula viridi notata, flavo-marginata, interiora albedo-flavescentia.  $\overline{\text{T}}$

3. *minor*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis lineari-subulatis canaliculatis. Dryand. l. c. p. 294.

4. *lutea*.  $\beta$ . Lam. enc. 1. p. 76. Herm. parad. 209. t. 209. Flor. lutei.  $\overline{\text{T}}$

4. *flaccida*, fol. lanceolato-linearibus flaccidis, racemo brevi, pedunc. patentissimis, flor. nutantibus, filamentis alternis sterilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 444. Collect. 4. p. 291.  $\overline{\text{T}}$

5. *viridiflora*, fol. linearibus canaliculatis foris villosis, racemo paucifloro, pedunc. patentibus, flor. nutantibus, filamentis sterilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 446. Collect. suppl. 98. Petala exteriora lacteoviridia, interiora luteo-virescentia.

6. *coarctata*, petalis interioribus apice fornicatis, fol. glabris, pedunc. longitudine bractearum. Dryand. l. c. p. 295. Fol. lineari-subulata.

\*\* *Staminibus omnibus fertilibus.*

7. *fastigiata*, pet. interioribus apice fornicatis, fol. linearibus planiusculis, scapo fol. brevior, pedunc. longissimis patentibus. Willd. Dryand. l. c. p. 296. Flor. albi. Pet. exteriora linearioblonga, interiora ovali-oblonga, paulo breviora.

8. *caudata*, fol. lanceolato-linearibus canaliculatis stricte erectis, pedunc. patentissimis. Jacq. ic. rar. 2. t. 442. Collect. 4. p. 203.

9. *setosa*, fol. lanceolato-linearibus, pedunculis patentissimis, floribus erectis, squamis bulbi apice setosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 440. Collect. suppl. p. 100. Flor. erecti.

10. *aurea*, fol. lanceolato-linearibus, pedunc. floribusque erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 441. Collect. 4. p. 202. Petala aurea.

11. *abyssinica*, pet. interioribus apice fornicatis, fol. lineari-lanceolatis canaliculatis strictis, pedunc. flor. cernuo brevioribus, bract. lineari-subulatis flore longioribus. Willd. p. 103. Hab. in Abyssinia? Petala flavo-viridia. W.

12. *fragrans*, fol. lineari-lanceolatis canaliculatis glabris, pedunc. patentissimis, flor. cernuis, filamentis omnibus fertilibus, bulbo depresso. Jacq. Schoenb. 1. p. 44. t. 84. Hab. ad Cap. b. spei. Habitus fere Antherici.  $\overline{\text{T}}$

13. *viscosa*, petal. interioribus apice fornicatis, fol. piloso-glandulosis. Dryand. Jacq. ic. 2. t. 445. Collect. suppl. 99. Lin. suppl. 196.

14. *spiralis*, floribus nutantibus, fol. spiralibus villosis-scabris. Lin. suppl. 196. Jacq. ic. rar. 2. t. 499. Collect. suppl. 100.

Hab. ad Cap. b. spei in summitate montis  
Ribecks Castel.  $\overline{\text{T}}$

799. **GETHYLLIS.** *Cor.* 6-partita,  
tubo filiformi longissimo. *Cal.*  
6, nisi vagina oblique truncata.  
*Th.* *Bacca* clavata, radicalis,  
unilocularis.

1. *spiralis*, fol. linearibus spiralibus  
glabris, limbi laciniis ovato-oblongis. Lin.  
suppl. 198. Thunb. Diss. acad. 1. p. 14. Pa-  
piria spiralis. Thunb. in Act. lund. 1. sect. 2.  
p. 111. Ad Cap. b. spei, cum sequentibus.  $\overline{\text{T}}$

2. *ciliaris*, foliis linearibus spiralibus  
ciliatis, limbi laciniis ovato-oblongis. Lin.  
suppl. 198. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 41.  
t. 70.  $\overline{\text{T}}$

3. *villosa*, fol. lineari-filiformibus spi-  
ralibus villosis, limbi laciniis ovato-ob-  
longis. Lin. suppl. 198.

4. *plicata*, fol. linearibus utrinque at-  
tenuatis plicato-nervosis piloso-ciliatis,  
laciniis limbi lanceolatis. Willd. p. 105.  
Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 42. t. 80. Hy-  
poxis plicata. Lin. suppl. 197. Hab. in colli-  
bus arenosis. *Cor.* flava extus virescens.  $\overline{\text{T}}$

5. *lanceolata*, fol. lanceolatis planis,  
limbi laciniis lanceolatis. Hab. ad Cap. b.  
spei.  $\overline{\text{T}}$

*Obs.* Gethyllides habent faciem Colchici.  
Flor. enim fruct. proferunt absque foliis.  
Sp. pl.

800. **CURCULIGO.** *Cor.* 6-petala,  
plana. *Spatha* 1-valvis. *Stylus*  
brevissimus. *Stigmata* 3, diver-  
gentia. *Caps.* 1-locularis, 4-  
sperma, spongiosa, rostrata.

1. *orchioides*. Roxb. corom. 1. p. 14.  
t. 13. Gaert. sem. 1. p. 63. t. 16 Willd. II.  
p. 105. Orchis amboinica major. Rumph. 6.  
p. 116. t. 54. f. 1. Hab. in Indiæ locis  
umbrosis incultis, prope Samulcoiah. Fol.  
lineari-ensiformia. Flor. flavi longe pe-  
dunculati.  $\overline{\text{T}}$

801. **HYPOXIS.** *Spatha* 2-valvis.  
*Cor.* 6-partita, persistens, su-  
pera. *Caps.* elongata, basi an-  
gustior. *Sem.* subrotunda nuda.

1. *erecta*, pilosa, scapo subquadri-  
floro fol. lineari-lanceolatis brevioribus, pedunc.  
flor. duplo longioribus. Willd. Sp. II.  
p. 106. Ornithogalum hirsutum. L. Sp. pl.  
ed. 1. p. 306. Hab. in Virginia, Canada.  
Ornithog. refert. Fol. Iunci pilosi.  $\overline{\text{T}}$

2. *sobolifera*, pilosa, scapo subquadri-  
floro, fol. lineari-lanceolatis patentibus  
longitudine scapi, pedunculis flore duplo  
longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 372.  
Collect. suppl. 53. Cum priore, cui valde  
affinis. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

3. *villosa*, villosa, scapo subquadri-  
floro fol. lineari-lanceolatis brevioribus, pe-  
dunculis flore brevioribus, fructibus cylin-  
draceis. Willd. p. 107. Lin. suppl. p. 198.  
Jacq. ic. rar. 2. t. 307. Collect. suppl. 51.  
Ad Cap. b. spei. Var. magnitudine.

4. *decumbens*, pilosa, scapo subbifloro  
decumbente fol. lineari-lanceolatis bre-  
vioribus. H. pilosa, capsulis clavatis. L. Mill.  
dict. t. 39. f. 2. Hab. in campis arenosis  
montium Jamaicae.

5. *obliqua*, scapo subtriflora hirsutis, fol.  
lineari-lanceolatis acuminatis subobliquis.  
Jacq. ic. rar. 2. t. 371. Collect. suppl. 54.  
Andrew. t. 195. Habit. ad Cap. b. spei.  
Rad. fibrosa. Ornith. minimum quadrantenus  
refert.

6. *aquatica*, fol. linearibus, scapis um-  
belliferis s. unifloris. Lin. suppl. 197. In  
Cap. b. spei fossis. Flor. in aliis solitarii her-  
maphroditi, in aliis umbellati mares. L.  $\overline{\text{T}}$

7. *minuta*, fol. triquetris carnosius gla-  
bris, scapis bifidis. Lin. suppl. 197. Thunb.  
prod. 59. Helonias minuta. L. Mant. p. 225.  
Hab. ad Cap. b. spei locis glareosis. *Cor.*  
patens nivea. Stylis 3, membranacei germi-  
ni adhaerentes in figuram pyramidalem.  $\dagger$

8. *alba*, parvula, fol. teretibus glabris,  
scapis subbifidis, petalis immaculatis. Lin.  
suppl. 198. Jacq. Collect. 4. p. 135. t. 2. f. 1.  
Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

9. *ovata*, fol. ovato-lanceolatis integris  
glabris, scapis unifloris. Lin. suppl. 197.  
Thunb. prod. 60. Hab. ad Cap. b. spei.  
Flos pulchellus albus.  $\overline{\text{T}}$

10. *veratrifolia*, scapo unifloro fol. ob-  
longo-ellipticis glabris plicato-nervosis bre-  
vioribus. Willd. p. 109. H. plicata. Jacq. ic.  
rar. 2. t. 367. Collect. suppl. p. 55.  $\overline{\text{T}}$

11. *stellata*, scapo unifloro fol. lineari-  
lanceolatis laxis carinatis glabris brevioribus,  
petalis basi maculatis. Lin. Suppl. 197. Jacq.  
ic. rar. 2. t. 368. Collect. 4. p. 134. Andrew.  
t. 101. Amaryllis capensis. L. Sp. pl. 420.  
Hab. ad Cap. b. spei. Macula nigricans ad  
ungues petalorum.

12. *elegans*, scapo stricto aequali, petal.  
intus albis basi macula lata nigra fimbriata.  
Andrew. t. 236. *Cor.* magna patens ut in  
prioribus.

12. *linearis (aurea)*, fol. lanceolato-linearib. glabris canaliculatis longioribus scapo 1-floro. Andrew. t. 171. Cor. magna, intus aureo-rubra, extus viridis.

13. *serrata*, foliis canaliculatis glabris ciliato-serratis, scapis unifloris. Lin. suppl. 197. Thunb. prod. 60. Jacq. ic. rar. 2. t. 369. Collect. 4. p. 134. Fabricia serrata. Thunb. Hab. ad Cap. b. spec. T.

14. *juncea*, fol. canaliculatis pilosis integerrimis scapis unifloris. Smith. spicil. t. 16. Hab. in Carolinae turfosis. T.

15. *sessilis*, pilosa, acaulis, fructificationibus subradicalibus. Sp. pl. 439. Dill. elth. 298. t. 220. f. 287. Hab. in Carolina. T.

802. **ERIOSPERMUM**. *Cor.* 6-petala, campanulata, persistens. *Filamenta* basi dilatata. *Caps.* 3-locularis. *Semina* lana involuta.

1. *latifolium*, fol. subrotundis acuminatis, basi cucullatis. Willd. II. p. 110. Jacq. ic. 2. t. 420. Collect. suppl. 73. Ornithogalum capense, fol. cordato-ovatis. L. Ornith. radice tuberosa cyclaminis folio, flore pallide caeruleo. Breyn. Cent. t. 41. Rudb. t. p. et f. 14. Hab. ad Cap. b. spec. Cum sequentibus. Racemus pedunculis patulis plus quam decies flore longioribus. T.

2. *lancaefolium*, fol. ovato-lanceolatis margine subundulato involuto. Willd. E. fol. lanceolatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 421. Coll. suppl. 72. Racemus pedunculis triplo flore longioribus erecto-patentibus. W.

3. *parvifolium*, fol. ellipticis obtusis planis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 422. Coll. suppl. 74. Pedunculi rectangule-potentes flore quadruplo longiores. W.

803. **ORNITHOGALUM**. *Cor.* 6-petala, erecta, persistens, supra medium patens. *Filamenta* basi dilatata aut subulata. *Caps.* subrotunda, angulata, 3-locularis. *Sem.* subrotunda, nuda.

1. *uniflorum*, scapo diphylo, fol. oppositis, pedunculo unifloro, petalis exterioribus lanceolatis retusis, interioribus ellipticis duplo latioribus. Willd. Sp. II. p. 111. Nov. Act. Petrop. XVIII. t. 6. f. 3. Hab. in Sibiriae montibus. Refert O. luteum, sed flos triplo major. Stigmata tria, lutea.

2. *fibrosum*, radical. fibrosis intertextis, fol. subquinis radicalibus subulatis canaliculatis, scapo 1-floro brevissimo. Desf. Atl. t. p. 294. Habitat in arenosis prope Kerwan. Cor. flava extus viresc.

3. *bulbiferum*, scapo folioso unifloro, fol. alternis linearibus subulatis basi bulbiferis, radicalibus filiformibus, petalis aequalibus acutis. Willd. p. 112. Lin. suppl. 199. Pall. itin. 2. app. n°. 106. tab. O. Hab. in aridis limosis ad Wolgam et Jaicum. T.

4. *bonariense*, fol. radicalibus longis angustis, spatha diphylla brevi, flor. umbellatis (albido-purpurascensibus). O. *spathaceum*. Poir. in Enc. bot. 4. p. 618. Hab. in pascuis maritimis in Bonaria s. Buenos-Ayres. Commers. Flor. parvi, striati.

5. *spathaceum*, scapo subtereti, spatha univalvi, umbella pedunculata subtriflora. Hayne in Usteri N. Bot. Annal. 15. Stück. p. 11. t. 1. Willd. p. 112. O. Haynii. Roth. O. minimum. Fl. dan. t. 612? Hab. in nemorosis humidiusculis prope Hamburgum et in ducatu Oldenburgensi. Scap. folio lanceolato spathiformi instructus. Flor. flavi.

6. *bohemicum*, scapo folioso subunifloro, fol. alternis lanceolatis, radicalibus filiformibus, pedunc. pilosiusculis; petalis aequalibus lanceolatis obtusiusculis. Willd. Act. bohem. 2. p. 121. icon. Hab. in saxosis udis Bohemiae. T.

7. *luteum (pratense)*, scapo anguloso diphylo, pedunc. umbellatis simplicibus glabris. L. O. *pratense*, scapo polyphylo, pedunc. simplicibus triquetris glabris. Pers. in Usteri N. Bot. Annal. 5. Stück. p. 8. t. 2. f. 1.

8. *sylvaticum*, majus, scapo diphylo pedunculis simplicibus triquetris glabris Pers. in Usteri N. Annal. 5. St. p. 7. t. 1. f. 1. O. luteum. Fl. dan. t. 612. Hab. in Pomariis, pratis. 9. in sylvis.

8. *minimum (arvense)*, scapo angulato diphylo, pedunc. pubescentibus umbellatis ramosis. L. O. *arvense*, scapo polyphylo, pedunc. ramosis teretiusculis tomentosis. Pers. l. c. p. 8. t. 1. f. 2. Hab. in arvis. Vere. Diversissimum a praecedente, pro quo a plurimis habetur.

9. *circinatum*, hirsutiae canescens, fol. linearibus recurvatis canaliculatis, radical. solitario, caulinis tribus, caule tri-s. quadrifloro. Lin. suppl. 199. Pall. itin. 3. app. n°. 85. t. D. f. 2. Hab. in siccis limosis nitrosis versus Astrachan. Simillimum O. minimo. Vagina laxa fibrosa reticulata fer-

ruginea folium et scapum quasi cucullo circumdans. L.  $\overline{\text{L}}$

10. *paradoxum*, caulescens, fol. multifidis ciliatis, scapo racemoso paucifloro, cor. campanulatis, filam. lanceolatis. Willd. p. 115. Jacq. Collect. suppl. 81. t. 1. Hab. ad Cap. b. spec. Planta florifera aphylla. Fructus ignotus. - Forte proprii generis planta. Willd.  $\overline{\text{L}}$

11. *imbriatum*, fol. linearibus ciliatis, scap. subifloro, bract. pedunc. subaequalibus. Willd. in Act. Soc. Berol. v. 3. Pall. in N. Act. Petrop. 10. p. 309. Hab. in Tauria.

12. *niveum*, racemo paucifloro, petalis lanceolatis, fol. filiformibus canaliculatis, filamentis subulatis. Ait Kew. 1. p. 440. Hab. ad Cap. b. spec.  $\overline{\text{L}}$

13. *umbellatum*, flor. corymbosis, pedunculis altioribus, filamentis basi dilatatis. O. stipulis maximis, petiolis lateralibus longissimis. Hall. helv. n $^{\circ}$ . 1215. Hab. in Pomariis, arvis.

14. *pyrenaicum*, racemo longissimo, petalis linearibus, filam. dilatatis, pedunc. floriferis patentibus: fructiferis scapo approximatis. Lin. Engl. bot. t. 499. Jacq. Fl. austr. t. 103. Hab. in alpinis Helvetiae, Austr. et in pratis Germaniae, Angliae. Flor. albo-virescentes.

15. *lacteum*, filam. alternis ad basin leviter marginatis, racemo pyramidato denso longo, fol. lanceolatis planis ad apicem conniventibus, ad oras villosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 434. Collect. suppl. 76. Hab. ad Cap. b. spec.

16. *ovatum*, fol. ovatis integris glabris, racemo ovato. Thunb. prod. p. 62. Hab. ad Cap. b. spec.

17. *ciliatum*, fol. ovatis acutis ciliatis, flor. racemosis. Lin. suppl. 199. Hab. ad Cap. b. spec. Cum 4-sequentibus.

18. *crenulatum*, fol. oblongis obtusis ciliatis, flor. racemosis erectis. Lin. suppl. 198. O. unifolium. Retz. obs. 2. p. 17.

19. *pilosum*, fol. lineari-ensiformibus ciliatis, flor. racemosis, pedunculis incurvis. Lin. suppl. 199. Thunb. prod. 61.

20. *revolutum*, filam. subulatis, fol. sublinearibus planiusculis glabris, scapo flexuoso racemoso, petalis ad oras revolutis. Jacq. Schoenb. t. p. 46. t. 89.

21. *conicum*, racemo conico, filam. subulatis, bracteis membranaceis longitudine pedunculorum, fol. lanceolatis planis

marginis villosis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 423. Collect. 3. p. 232.

22. *narbonense*, racemo oblongo, filam. lanceolatis membranaceis, pedunculis floribusque patentibus. L. Hab. in Galliae australis et Italiae, Sibiriae, Germaniae agris.

23. *latifolium*, racemo longissimo, filam. subulatis, pedunculis flore multo-ries longioribus, fol. lanceolatis. Willd. p. 119. Jacq. ic. rar. 2. t. 424. Collect. 2. p. 318. Hab. in Arabia, Aegypto. Flos albus.

24. *altissimum*, racemo longissimo, filam. subulatis, pedunc. flore duplo longioribus, fol. oblongis apice convolutis cuspidatis. O. giganteum, scapo racemose longissimis, bracteis subulatis brevibus. Jacq. Schoenb. 1. p. 45. t. 87.

25. *scilloides*, racemo longissimo, filam. subulatis, pedunc. longitudine flor., bracteis pedunculorum longitudine, fol. linearilanceolatis laxis, apice convolutis. Willd. O. filamentis subulatis, fol. subensiformibus apice candelatis, racemis longissimis cylindricis. Jacq. Schoenb. 1. p. 46. t. 88.

26. *longibracteatum*, racemo longissimo, bracteis pedunculis fere duplo longioribus, fol. lanceolato-ensiformibus. Murr. Syst. 327. Jacq. hort. t. 29. O. bracteatum. Thunb.

27. *japonicum*, racemo spicato cylindrico longissimo, scapo striato. Thunb. jap. 157. Fol. radicalia linearia plana scapo breviora. Cor. purpureo-caerulea patens persistens.

28. *comosum*, racemo brevissimo, bracteis lanceolatis longitudine florum, petalis obtusis, filamentis subulatis. Arnoc. acad. 4. p. 312. O. fol. linearibus canaliculatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 426. Collect. 2. p. 313. Rudb. elys. 2. p. 435. f. 1.

29. *pyramidale*, racemo conico, flor. numerosis adscendentibus, petalis elliptico-oblongis planis, staminibus lanceolatis aequalibus, stylo brevissimo. Ait Kew. 1. p. 441. Jacq. ic. rar. 2. t. 425. Coll. 2. p. 317. Rudb. elys. f. 4. Hab. in collibus Lusitaniae.

30. *tenellum*, filam. subulatis, scapo filiformi laxo racemoso, bracteis pedunc. duplo brevioribus, fol. linearibus canaliculatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 427. Collect. 2. p. 316. Petala lactea lanceolata, linea flavescens.

31. *odoratum*, filamentis lanceolatis, racemo longo, fol. lanceolato-linearibus superne planis humi prostratis. Jacq. ic. 2. t. 432. Collect. suppl. 78. Andrew. t. 269



*Petalis lutescentia linea medio viridi notata.*  
Creso. ad Cap. b. spei. c. sequentib.

32. *suaveolens*, filamentis lanceolatis racemo brevi, fol. linearibus canaliculatis longitudine scapi. Jacq. ic. rar. 2. t. 431. Collect. 2. p. 316.

33. *secundum*, filamentis lanceolatis, racemo brevi secundo, fol. sublinearibus ad apicem acutum fornicatis, ad oras cartilagineo-muricatis erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 433. Collect. suppl. 79. O. maculatum. Thunb. prod. 62?

34. *fuscatum*, filamentis lanceolatis tribus latioribus, racemo oblongo, fol. paucis lineari-cuneiformibus, scapo triplo brevioribus, capsulis alato-trilobis. Jacq. ic. rar. 2. t. 429. Coll. suppl. 80.

35. *barbatum*, filamentis subulatis, fol. subgeminis subulatis, petalis tribus alternis ad apicem barbatis. Jacq. Schoenb. 1. p. 47. t. 91.

36. *polyphyllum*, racemo paucifloro, filamentis subulatis, petalis linearibus obtusis, apice callosio-inflexis, fol. lineari-subulatis semiteretibus. Willd. p. 123. Jacq. ic. 2. t. 430. Collect. suppl. 79. Racemus brevis.

37. *funcifolium*, filamentis sublanco-latis, racemo longissimo, foliis subulatis plurimis. Jacq. Schoenb. 1. p. 46. t. 90.

38. *rupestre*, fol. filiformibus carnosius, scapo paucifloro, flor. reflexis. Thunb. prod. 61. Hab. ad Cap. b. spei. T.

39. *arabicum*, corymbo multifloro, filamentis subulatis, cor. late campanulata, petalis exterioribus obsolete tridentatis. Ait. Kew. 1. p. 412. O. flor. corymbosis, pedunculis scapo humilioribus, filam. sub-emarginatis. L. Poir. in Enc. bot. 5. p. 616? Rudb. elys. 2. p. 130. f. 1. Besl. 5. t. 12. f. 1. Hab. in Alexandria, Barbaria, Madera. Bractea amplexicaules. Flor. albi, basi fusi?

40. *thyrsoides*, fol. latis ciliatis, corym-bis multifloris racemiformib., filam. alternis furcatis, fol. lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 412. Q. Flor. luteis, bracteis pedunculo brevioribus. Ait. Houtt. t. 82. f. 3. P. Flor. albis, bracteis longitudine pedunc. Jacq. hort. 3. p. 17. t. 28. Mill. ic. 128. t. 192. Hab. ad Cap. b. spei. T.

41. *aureum*, racemo coarctato, sub-corymboso, filamentis alternis emarginatis, fol. lanceolatis cartilagineo-denticulatis. Willd. p. 124. O. minutum. Jacq. ic. rar. 2. t. 438. Collect. 3. p. 233. P. O. flavescens. Jacq. l. c. t. 437. Y. O. flavissimum,

Jacq. t. 436. Hab. ad Cap. b. spei. Var. flor. rubris, aurantiis, flavis, quas cl. Willdenow. l. c. non puto species distinctas agnoscit.

42. *coarctatum*, racemo multifloro coarctato, filamentis alternis emarginatis, fol. linearibus canaliculatis. Willd. p. 125. Jacq. ic. rar. 2. t. 435. Collect. suppl. 77. Hab. ad Cap. b. spei. T.

43. *caudatum*, racemo longissimo, fol. lanceolato-linearibus, corollis patentibus, staminibus dilatatis, alternis cuneiformibus. Ait. Kew. 1. p. 442. Hab. ad Cap. b. spei. T.

44. *nutans*, floribus secundis pendulis, nectario stamineo campaniformi. Jacq. austr. 1. 301. Hab. in Italia, Helvetia et Germania. T.

804. *SCILLA*. Cor. 6-petala, patens, decidua. *Filam.* filiformia, petalorum basi adnexa.

1. *maritima*, nudiflora, bracteis refractis. L. Willd. Sp. II. p. 125. Blackw. t. 591. Desf. Atl. 1. p. 297. Hab. ad Hispaniae, Lusitan., Siciliae, Syriae littora et in Barbariae arvis. Bulbus crassilte fere cap. humani. Fol. lanceolata, stricta. Scapus ante folia, longissimus, multiflorus. Flor. albi.

2. *Lilio-Hyacinthus*, racemo paucifloro, pedunculis ebracteatis, foliis lanceolatis humi adpressis, bulbo squamato. Willd. p. 126. S. radice squamata. L. Hort. cliff. 123. Moris. t. 12. f. 21. Hab. in Biscaja, Aquitania, Hispania, Pyrenaeis.

3. *italica*, racemo conico oblongo. L. Besl. cyst. vern. 42. f. 1. Hab. . . Bractee longitudine pedicellorum.

4. *lingulata*, foliis lanceolatis planis racemo denso conico, bract. subulatis pedicellis aequantibus. Desf. Atl. 1. p. 298. Poir. it. p. 151. Hab. in Barbariae arvis. Flor. hyeme. Fol. vagina basi cincta.

5. *villosa*, fol. lanceolatis planis villosis, flor. corymbosis. Desf. l. c. p. 299. t. 85. f. 2. In arenis prope Kerwan. Fl. hyeme.

6. *obtusifolia*, scapo laterali, foliis linguiformibus undulatis, flor. racemosis ebracteatis. Desf. l. c. t. 86. Hab. prope La Calle. Flor. S. autumnalis.

7. *parviflora*, fol. lineari-lanceolatis acutis glabris scapo brevioribus, flor. racemosis confertis, bract. brevissimis. Desf. Atl. 1. p. 300. S. numidica. Poir. it. p. 151. Hab. in Algeria.

8. *undulata*, fol. lanceolatis undulatis, flor. laxe racemosis, bract. brevissimis. Desf. Atl. 1. p. 300. t. 88. Hab. in Barbariae collib. incultis. Cor. campanulata, pallide rosea. Flor. autumnno.

9. *tetraphylla*, acaulis, floribus fasciculatis, fol. quaternis ovato-lanceolatis. Lin. suppl. 200. Hab. in Africa.

10. *peruviana*, corymbo conferto conico, fol. in orbem expansis margine ciliatis. Rudb. elys. 1. p. 37. f. 1. Moris. s. 4. t. 12. f. 19. Desf. Atl. 1. p. 298. Hab. in Lusitania et in Barbariae arvis. Radix tunicata, lanuginosa. Fol. in pl. culta glabra.

11. *japonica*, florum umbella terminali fastigiata. Thunb. jap. p. 137. Hab. in Japonia. Bracteae in scapo et sub flor. membranaceae lanceolae ae erecto-adpressae. Cor. patens albo-purpurea. T.

12. *amoena*, scapo angulato, pedunc. alternis flore brevioribus, bracteis obtusis brevissimis. Willd. Rudb. elys. 2. p. 34. t. 7. Hab. in Austria, Russia, Germania, Petal. basis lineolis 2 albidis. T.

13. *praecox*, scapo angulato, racemo subcorymboso, pedunculis flore duplo longioribus, bracteis obscuris. Willd. p. 128. Hab. . . A. praecedente habitu, parvitate et praecocitate floris jam primo intuitu distincta. W.

14. *campanulata*, bulbo solido, racemo multifloro oblongo-subconico, cor. campanulatus erectis, bract. bipartitis pedunc. longioribus, fol. lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 444. Scilla hyacinthoides. Jacq. ic. rar. 1. t. 65. Collect. 1. p. 61. Hab. in Hispania, Lusitania. T.

15. *bifolia*, radice solida, flor. racemosis ebracteatis, fol. lanceolatis sublinis in scapo elevatis. Ait. Kew. 1. p. 444. Engl. bot. t. 24. Hab. in Gallia, Germania. T.

16. *verna*, corymbo hemisphaerico paucifloro bracteato, fol. linearibus canaliculatis. Huds. angl. 142. Smith. brit. 1. p. 129. Engl. bot. t. 23. Flor. dan. t. 568. Hab. in Hispaniae et Cambriae pratis et Angliae maritimis.

17. *lusitanica*, racemo oblongo conico, petalis linearis. L. Rud. elys. 2. p. 34. f. 4. Hab. in Lusitania. T.

18. *orientalis*, flor. erectis racemosis, fol. elliptico-ensiformibus. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 334. S. bifolia. Thunb. jap. 138. Hab. in Japonia. T.

19. *hyacinthoides*, racemo cylindraceo multifloro petalis germine aequilongiorib.,

pedunculis coloratis, fol. lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 445. Hab. in Madera et Lusit. T.

*Obs.* Nisi saepius a bulbo principe avelantur bulbilli, per annos saepe viginti non florebit. Gouan.

20. *autumnalis*, fol. filiformibus linearibus, floribus corymbosis, pedunculis ebracteatis nudis adscendentibus longitudine floris. L. Cav. ic. 3. p. 38. t. 274. f. 2. Engl. bot. t. 78 Curt. Lond. ic. Hab. in Europa australiori solo glaroso et pascuis sterilibus. Pet. rosea. T.

21. *mauritanica*, flor. racemosis, bract. binis pedunc. aequantibus, fol. linearibus planis apice involutis. Schousb. maroc. 1. p. 154. Hab. in monte Shibil Kibir in Barbaria. Priori affinis, sed cor. minores, minus patulae. S.

22. *tingitana*, flor. racemosis, bract. solitariis pedunc. brevioribus, fol. lanceolatis planis, apice involutis. Schousb. p. 155. Cum priore. Bract. persistentes. Cor. majores quam in S. autumnali.

23. *biflora*, racemo laxo, flor. geminis. S. biflora. Flor. Peruv. 3. p. 69. In Peruviae collib. arenosis. Cor. alba.

24? *unifolia*, folio teretiusculo latere subspicato. L. Ornithogalum spicatum unifolium, flore niveo odorato. Griseb. lusit. Hab. in Lusitania.

505. **CYANELLA.** Cor. hexapetala: petalis 3 inferioribus propendentibus. Stylus et Stamen intimum declinatum. Caps. subrotunda, 3-lobularis. (Stam. etiam 3 deflexa.)

1. *capensis*, caule folioso paniculato, racemis divaricatis, fol. lanceolatis undulatis. Willd. Sp. II. 1. p. 131. Lin. suppl. p. 201. Andrew. t. 191. Jacq. hort. 3. p. 21. t. 35. Hab. ad radices montis Tabularis in Cap. b. spei. Flor. caerulei. T.

2. *orchidiformis*, caule ramoso, racemis erectis, fol. caulinis ensiformibus strictis radicalibus ovatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 447. Collect. 4. p. 211. Cum priore. Fol. glauca, margine cartilagineo-denticulata. Stam. tria deflexa.

3. *lutea*, scapo nudo subramoso: racemis erectis, fol. linearis-lanceolatis planis. Willd. Lin. suppl. 201. Thunb. in Act. holm. 1794. p. 195. t. 7. f. 1. Hab. in campis inundatis arenosis Cap. b. spei. Stam. tria deflexa. T.

4. *alba*, scapo nudo unifloro, fol. filiformibus. Willd. Thunb. l. c. p. 195. t. 7. f. 2. Hab. in Bockland. ¶

So6. ASPHODELUS. Cor. 6-partita, patens. Nect. ex valvulis sex germen tegentibus.

1. *acaulis*, caul. nullo, fol. subulato-triquetris, pedicel. fructiferis reflexis. Desf. Ait. 1. p. 302. t. 89. Hab. in montib. Slibae. Cor. pallide rosea.

2. *luteus*, caule folioso, fol. triquetris striatis. L. Blackw. t. 233 Jacq. hort. t. 77. A. stipulis maximis. Hall. helv. n<sup>o</sup>. 1206. A. luteus flore et radice. Bauh. pin. 28. Hab. in Sicilia et Helvetia. ¶

3. *creticus*, caule folioso superne nudo ramoso, fol. filiformibus striatis denticulatis subciliatis. Lam. Enc. 1. p. 297. Hab. in Creta.

4. *ramosus*, caule ramoso nudo, fol. ensiformibus carinatis laevibus. L. Hab. in Europa australi. ¶

5. *albus* (simplex), caule nudo simplici, pedunc. confertis longitudine bractearum, fol. linearibus carinatis laevibus. Willd. p. 133. A. ramosus. Murr. Comm. Goett. 1776. p. 37. tab. 7. Blackw. t. 238. Hab. in saxosis Lusitaniae, Hispaniae, Narbonae, Croatiae. ¶

6.  *fistulosus*, caule nudo, fol. strictis subulatis striatis subfistulosis. Cav. ic. 3. p. 1. t. 202. Moris. s. 4. t. 1. f. 5. Hab. in Gallo Provincia, Hispania, Creta. ¶

7. *altaicus*, caule nudo simplici, staminibus cor. duplo longioribus, fol. linearibus canaliculatis. Willd. p. 134. Act. Petrop. 1779. p. 260. t. 10. Ad radices mont. Altaicorum. ¶

8. *liburnicus*, caul. simplici basi folioso, cor. cernuis monopetalis, fol. setaceis. W. Scop. carn. n<sup>o</sup>. 411. t. 12. Hab. in Istria. †

So7. PHALANGIUM. Cor. 6-petala patens. Filamenta nuda s. glabra. Caps. ovata. Sem. angulata. (Rad. plerumque fibrosa aut fasciculata. Fol. plana. Flor. in plurimis albi aut purpurascens. Huc omnia ANTHEERICA L. prioris sectionis.)

\* Filamenta filiformia aequalia.

1. *serotinum*, fol. planiusculis, scapo unifloro. Lin. Willd. II. p. 134. sub Anth-

rico, (uti omnes sequentes species.) Ornithogalum striatum. Willd. Sp. II. 119. Fol. crassulis, scapo unifloro. Rag. angl 3. p. 374. t. 17. f. 1. Hab. in alpinis ¶

2. *fragrans*, fol. tereti-filiformibus strictis scapo brevioribus, scapo simplici. Willd. p. 135. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 45. t. 86. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

3. *filifolium*, filam. glabris, radice bulbosa, fol. filiformibus flexuosis glabris, scapo simplici flexuoso. Jacq. ic. rar. 2. t. 414. Collect. suppl. 93. Hab. ad Cap. b. spei in regione Namaquas.

4. *flexifolium*, fol. lineari-filiformibus flexuosis reflexis, basi ciliatis scapi ramosi longitudine. Willd. p. 135. Jacq. ic. rar. 2. t. 412. Collect. suppl. 93. Lin. suppl. 201. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *filiforme*, fol. filiformi-teretiusculis scaberrimis, petalis lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 451. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *exuviatum*, fol. lineari-subulatis canaliculatis, scapo simplici fol. brevioris, squamis radicalibus transversim rugosis. Willd. p. 136. Jacq. ic. rar. 2. t. 415. Collect. suppl. 89. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

7. *elongatum*, fol. lineari-filiformibus scapo ramoso brevioribus, racemis elongatis. Willd. p. 136. Anthericum filiforme. Thunb. prod. 62. Hab. ad Cap. b. spei. †

8. *virgatum*, foliis strictis filiformibus acutis, caul. superne ramoso, ramis virgatis simplicibus, flor. minimis caul. folioso sulcato. Poir. in Enc. bot. 5. p. 246. Hab. in Carolina. Cor. alba, medio stria purpurea. Scap. 2-3-pedalis.

9. *fastigiatum*, caul. altissimis nudis, ramis pluribus virgatis, flor. subternatis. Enc. 1. c. Hab. . . Fol. ? Flor. albi. †

10. *revolutum*, fol. oblongis undulatis, spic. longissimis pyramidalis. petal. revolutis. Ph. spicatum. Enc. bot. 1. c. Hyacinthus revolutus. Lin. suppl. p. 204. Hab. ad Cap. b. sp. Cor. pallescens, fascia brunnea.

11. *capillare*, fol. capillaribus substriatis longis, scapo nudo simplici, spica brevi viridescens. Enc. bot. 1. c. Hab. . . †

12. *croceum*, bulbosum, fol. gramineis, spica pyramidalis, bract. convoluta - amplexantibus, seminib. subglobosis. Michaux. Flor. 1. p. 196. Hab. in humidis sylv. Georgiae. Flor. crocei.

13. *planifolium*, foliis planis, scapo compresso glabro, filam. inferne lanatis superne apiculatis. Schousb. Maroc. 1.

p. 157. Willd. II. p. 136. A. bicolor. Desf. Atl. 1. p. 304. t. 90. Hab. in Lusitania et in Barbaria, in fruticetis Shibil Kibir. Petal. intus nives, extus purpurascens, etiam utrinque purpurea.

14. *gracum*, fol. planis, scapo simplici, floribus corymbosis, flav. lanatis? Syst. Veg. 272. Hab. in Oriente. Fol. linearia, longitudine fere scapi. L. Filam. non lanata. L. Mant. 365.

15. *squamum*, scapo squamis membranaceis tumidis imbricato. Lin. suppl. 282. Hab. ad Cap. b. spei. Radix tuberibus oblongis tomentosis pluribus, filo pendulis. Cor. infundibuliformis extus subpubescens sexpartita. Var. fol. hirsutis et glabris. L.

16. *comosum*, fol. ensiformibus glabris, scapo ramoso comoso. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$  +

17. *floribundum*, foliis planis glabris linearibus lanceolatis acutis, scapo simplici, racemo multifloro cylindrico compacto, petalis patentibus, staminibus glabris. Ait. Kew. 1. p. 447. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

18. *revolutum*, fol. trigonis scabris, scapo ramoso, cor. revolutis. Mill. dict. n.º. 1. A. fol. linearibus scapo longioribus. Thunb. prod. 62. Comm. hort. 1. p. 67. t. 34. Hab. ad Cap. b. spei.

19. *ramosum*, fol. planis, scapo ramato, cor. planis, pistil. recto. L. Jacq. austr. t. 16. Hab. in rupibus et sylvis calcareis.

20. *sulphureum*, fol. lanceolato-linearibus canaliculatis, apice obtuso-concavis, scapo racemoque simplicissimis, cor. patentissimis. Pl. Hongar. p. 89. t. 95. Hab. ad Thermas. Fl. Majo.

21. *caeruleum*, fol. ensiformibus, panic. longissima, flor. caeruleis. Flor. Peruv. 3. p. 67. Bermudiana caerulea. Feuill. 2. p. 715. pl. 8. Hab. in R. Chilensis umbrosis. Rad. fasciculata, odore Ireos florentinae. Cor. marcida, spiraliter contorta.

22. *coarctatum*, fol. inferne carinatis, medio coarctatis, pedunc. bifido-dichotomis, pedicel. subumbellatis. Flor. Per. l. c. t. 299. Hab. in Andium montibus. Cor. violaceo-caerulea. Planta tincturam croceam immutabilem praebet.

23. *eccremorhizum*, fol. ensiformibus carinatis, scapo folioso, racem. longis, spathis 2-3-floris. Flor. Per. t. 301. Cresc. in Peruviae collib. Habitus Asphodeli. Rad. tuberosa pendula, lanuginosa.

24. *glaucum*, racemo longissimo simplici multifloro, pedunc. florifero patentibus:

fructiferis adpressis. Flor. Per. l. c. p. 68. Hab. in Andium montibus. Fol. ensiformia, supra glauca.

25. *elatum*, fol. planis scapo ramoso, pedunculis aggregatis, corollis planis. Ait. Kew. 1. p. 448. Hab. ad Cap. b. spei.

26. *falcatum*, fol. carnosis ensiformibus falcatis glabris, caule ramoso racemoso. Lin. suppl. 202. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. depressa terrae incumbentia.

27. *contortum*, fol. planis ensiformibus, caule ramoso, floribus remotissimis. Lin. suppl. 202. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. contorta.

28. *vespertinum*, fol. linearibus ensiformibus carinato-triquetris, scapo ramoso brevioribus. Willd. p. 139. A. filamentis muricatis. Jacq. Schoenb. 1. p. 44. t. 85. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

29. *graminifolium*, fol. linearibus planis depressis scapo ramoso brevioribus, petalis alternis undulatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 411. Collect. suppl. 87. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

30. *japonicum*, fol. ensiformibus convolutis glabris, scapo ramoso angulato, flor. racemosis cernuis. Thunb. jap. 138. Hab. in Japonia, China et Java.

31. *niveum*, fol. planis basi plicatis, caul. simplice, flor. densissimis longe spicatis bract. niveis pedunc. aequantibus. Enc. bot. 5. p. 248. Hab. in India. Cor. parva.

32. *longifolium*, fol. linearibus decumbentibus margine ciliatis scapo ramoso longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 413. Collect. suppl. 92. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

33. *hirsutum*, fol. linearibus hirsutis scapo ramoso brevioribus, racemo longissimo. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

34. *Adenantha*, fol. linearibus ensiformibus basi connatis, glandula inter filamentum et antheram. Forst. prod. n.º. 149. Hab. in N. Caledonia.

35. *pilosum*, scapo simplici folioso glabro, fol. lanceolatis vaginantibus utrinque pilosis. Willd. p. 140. Jacq. ic. rar. 2. t. 416. Collect. suppl. 87. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

36. *undulatum*, fol. ensiformibus falcatis undulatis scapo longioribus. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

37. *triflorum*, fol. canaliculato-ensiformibus, scapo simplici, bracteis remotis trifloris. Ait. Kew. 1. p. 448.

3. *A. bipedunculatum*, filam. glabris, radice fasciculata, fol. lanceolato-linearib. carinatis, scapo racemoso simplici, bract. subbifloris. Jacq. ic. 2. t. 410. Collect. suppl. 88. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

38. *canaliculatum*, fol. subcarnosis pilosis ensiformi-triquetris latere angustiori canaliculatis, scapo simplici. Ait. Kew. 1. p. 448. Hab. ad Cap. b. spei. Scapus teres pilosus.  $\mathcal{T}$

39. *Albucoides*, fol. linearibus canaliculatis glabris, margine cartilagineis, scapo simplici. Ait. Kew. 1. p. 449. Hab. ad Cap. b. spei. Petalis luteis, carina viridi, apice fornicatis, refert Albuca. Ait. l. c.  $\mathcal{T}$

40. *Liliago*, fol. planis, scapo simplicissimo, cor. planis, pistillo declinato. Jacq. hort. 1. t. 83. Moris. 2. 4. t. 1. f. 10. Liliago Cordi. Lob. ic. p. 48. Hab. in Helvetia, Germania, Gallia.  $\mathcal{T}$

41. *Liliastrum*, fol. planis, scapo simplicissimo, cor. campanulatis, staminibus declinatis. L. Scheuchz. alp. 1. p. 48. et 7. p. 514. Hab. in alpinibus Helveticis, Allobrogicis. Corol. Lillii candidi.  $\mathcal{T}$

42. *spirale*, scapo spirali. L. Hab. sub monte Leonis Cap. b. spei, locis glareosis.  $\mathcal{T}$

**\*\* Filamenta medio incrassata.**

43. *physodes*, filam. glabris, rad. bulbosa, fol. oblongis planis lucidis, racemo subcorymboso. Jacq. ic. rar. 2. t. 418. Coll. suppl. p. 94. A. marginatum. Thunb. Stam. medio dilatata. Facies scillae. Willd. p. 147. Cum sequente ad Cap. b. spei.

44. *pusillum*, filam. lanceolatis glabris, rad. bulbosa, fol. lanceolato-linearibus in orbem prostratis. racem. corymboso. Jacq. 1. c. t. 417. Collec. suppl. p. 94.

*Obs.* Stam. uti in priore specie, quam ob rem a cl. Willd. in subdivisione peculiari: *Scilloides* illae enumerantur.

45. *coarctatum*, fol. ensiformibus carinatis, medio coarctatis, pedunc. bifido-dichotomis, pedicell. subumbellatis, filam. ad medium incrassatis. Flor. Per. 3. p. 67. t. 299. Hab. in Andium montibus. Cor. violaceo-cerulea. Planta tincturam croceam praebet.

808. **ANTHERICUM.** *Filamenta* barbata, cetera *Phalangii*. (Fol. succulenta, fistulosa. Flor. lutei. *Bulbine*. L.)

1. *frutescens*, fol. carnosius teretibus,

caule fruticoso erecto ramoso. Willd. sp. II. p. 143. Plantae grasses. ic. Hab. ad Cap. b. spei, uti omnes quae sequuntur.  $\mathcal{H}$

2. *rostratum*, antheris barbatis, caul. fruticosus radicanibus brevissimis, fol. subulatis teretibus pulposis. Jacq. ic. rar. 2. t. 403. Collect. suppl. 82. Habit. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{H}$

3. *Aloides*, fol. carnosius linguiformi-lanceolatis planiusculis. Willdenow. p. 143. Plant. grasses. ic. Dill. elth. 312. t. 232. f. 300. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. inferne convexa.  $\mathcal{T}$

4. *nutans*, fol. carnosius lanceolatis planis basi concavis, apice reflexis, racemo apice nutante. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 407. Collect. suppl. 86.

5. *incurvum*, fol. carnosius trigonis incurvis brevissimis, racemo elongato cernuo. Thunb. prod. 62.

6. *latifolium*, fol. carnosius lato-ensiformibus glabris, racemo longissimo, caule simplici. Lin. suppl. 202. Jacq. ic. rar. 2. t. 408. Collect. 249.

7. *pugoniforme*, filam. barbatis acaule, radice subrotunda perenni, fol. crasso-subulatis antice sulcatis apice teretibus pulposis erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 405. Collect. suppl. 83.

8. *praemorsum*, fol. carnosius linearibus canaliculatis distichis erectis scapo brevioribus. Willd. A. radice perenni difformi praemorsa, fol. subtriquetris. Jacq. ic. rar. 2. t. 406. Collect. suppl. 85.

9. *Asphodeloides*, fol. carnosius subulatis scmiteretibus strictis. L. Jacq. hort. t. 181. Hab. in Aethiopia. Fol. margine aspera.  $\odot$

10. *longiscapum*, fol. carnosius subulatis semiteretibus flexuosis glaucis, scapo triplo brevioribus. Willd. p. 145. Jacq. ic. rar. 2. t. 401. Collect. suppl. 84. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{H}$

11. *annuum*, fol. carnosius subulatis teretiusculis, scapo subracemoso. L. Hort. ups. 83. Mill. dict. n. 7. Plantae grasses. ic. Hab. in Aethiopia.  $\odot$

12. *hispidum*, fol. carnosius compressis hispidis. L. A. filam. muricatis, scapo hispido. Jacq. ic. 2. t. 409. Collect. suppl. p. 91. Habitat ad Cap. b. spei. Radix fibrosa.  $\mathcal{T}$

13. *muricatum*, fol. linearibus muri-

A 2

caulis striatis, scapo ramoso inferne muricato. Thunb. prod. 63. Scapus bipedalis postea ramosus.

14. *ciliatum*, fol. ensiformibus carnoso-subtriquetris ciliatis, scapo simplici, racemo longissimo. Lin. suppl. p. 202. Fol. longissima.

15. *Cauda felis*, fol. canaliculato-ensiformibus, scapo simplici, racemo oblongo. Lin. suppl. p. 202. A. caudatum. Thunb. prod. 63.

16. *triquetrum*, fol. filiformibus triquetris scapo simplici brevioribus, racemo ovato. Lin. suppl. p. 202.

17. *scabrum*, fol. triquetris serrulatis, caule ramoso scabro, pedunc. fructiferis recurvis. Lin. suppl. p. 202.

18. *cirrhatum*, fol. lanceolatis planiusculis, scapo paniculato, filam. barbatis bicirrhatis. Forst. prod. n. 148. Hab. in N. Zeelandia.

19. *crispum*, fol. ellipticis crispis ciliatis, scapo ramoso. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei. †

*Obs.* An omnes hae species revera hujus generis?

809. *NARTHECIUM*. Cor. hexapetala, patens, persistens. Filam. filiformia, hirsuta. Caps. supera prismatica. Sem. utrinque appendiculata.

1. *ossifragum*. Smith. Brit. 1. p. 368. Engl. bot. t. 535. Anthericum. Lin. Willd. p. 147. Flor. dan. t. 42. Hab. in uliginosis, paludib. turtosis. Fol. ensiformia, Cor. flava. †

810. *XANTHORRHÆA*. Cor. infera, hexapetala, persistens. Filam. plana, nuda. Caps. triquetra. Semina bina, compressa, marginata.

1. *resinosa*. Hab. in Australia, s. N. Hollandia. Caud. lignosus resina flava scattens. Scap. longissimus, amento terminatus multifloro. Smith. in Act. soc. Lin. V. †

811. *CONANTHERA*. Cor. supera. Petala 6, reflexa. Antherae in conum acutum coalitae. Caps.

oblonga, 3-locularis, 3-valvis. Sem. pauca, subrotunda.

1. *bifolia*, pedunc. bifloris, fol. 2-radicibus, lineari-ensiformibus. Flor. Peruv. 3. p. 68. t. 301. Bermudiana pulposa. Tew. 3. p. 8. pl. 3. Hab. in R. Chiliens. collibus. Petal. violaceo-caerulea basi variegata. Bulb. 1-articulatus.

2. *Echeandia*, scapo simplici, fol. lanceolato-ensiformibus, petal. 3-exterioribus angustissimis, filam. glandulosis. Anthericum reflexum. Cor. ic. 3. p. 21. t. 241. Willd. II. p. 140. Echeandia terniflora. Ortega dec. pl. p. 90. Hab. . . . Cor. lutea.

*Obs.* Hoc genus ad Syngenesiam-mouogamiam potius transferendum.

812. *ASPARAGUS*. Cor. 6-partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca 3-locularis, supera, polysperma. (Fol. fasciculata.)

1. *officinalis*, caule herbaceo erecto paniculato, fol. setaceis, flor. dioicis, pedunculis in medio articulatis. Lamarck. Encyclop. 1. p. 295. β *Asparagus maritimus*, humilior, divaricatus, griseus. Hab. in arenosis, sylvaticis.

2. *tenuifolius*, humilis, caule herbaceo ramosissimo folioso, flor. hermaphroditis, pedunc. longis sub flore nodosis. Lamarck. Enc. 1. p. 295. Bauh. pin. 544. Hab. in Galliae meridional. montosis et uliginosis.

3. *declinatus*, caule inermi tereti, ramis declinatis, fol. setaceis. L. Hab. ad Cap. b. spei. †

4. *decumbens*, caule herbaceo inermi decumbente ramosissimo, ramis flexuosis, fol. setaceis, pedunc. solitariis terminalibus. Willd. p. 151. Jacq. Schoenb. 1. p. 71. t. 97. Hab. ad Cap. b. spei. †

5. *crispus*, caule herbaceo debili tortuoso, ramis incurvis flexuosis suberispis, flor. solitariis, pedunc. nudo. Lam. Enc. 1. p. 295. Hab. in ins. Franciae. †

6. *flexuosus*, herbaceus inermis, caule flexuoso, fol. lanceolatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *scandens*, herbaceus inermis volubilis, foliis lanceolatis falcatis. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei.

8. *falcatus*, aculeis solitariis reversis,

ramis teretibus, fol. ensiformibus falcatis, pedunc. axillaribus 1-floris. Burm. zeyl. 36. t. 13. f. 2. Hab. in Zeylona.  $\zeta$

9. *racemosus*, aculeis solitariis, ramis striatis, fol. fasciculatis linearibus-subulatis falcatis, racemis multifloris axillaribus. Willd. Hab. in India orientali. Flor. parvi et pedunc. bracteis oblongis suffulti. W.  $\eta$

10. *retrofractus*, aculeis solitariis, ramis teretibus reflexis retrofractisque, fol. setaceis fasciculatis. Pluk. smalth. 40. t. 375. f. 3. Hab. in Africa.  $\eta$

11. *aethiopicus*, aculeis solitariis reversis, ramis angulatis, fol. lanceolato-linearibus. Mant. 63. Hab. ad Cap. b. spei. Rami flexuosi, angulati.  $\zeta$

12. *asiaticus*, aculeis solitariis, caule erecto, ramis filiformibus, fol. fasciculatis setaceis. L. Pluk alm. 45. t. 15. f. 4. Hab. in Asia?  $\eta$

13. *albus*, aculeis solitariis, ramis angulatis flexuosis, fol. fasciculatis triquetris muticis deciduis. L. A. aculeatus, spinis horridus. Bauh. pin. 590. Moris. s. 1. t. 1. f. 3. Hab. in Lusitania, Hispania et Barbaria. Turiones edules sunt. Caul. albus.  $\eta$

14. *acutifolius*, caule inermi angulato fruticoso, fol. aciformibus regidulis perennantibus mucronatis aequalibus. L. Mill. dict. n. 3. Sauv. monsp. 45. Hab. in Lusitania, Hispania, Monspelli et Oriente. Turiones quoque comeduntur.  $\eta$

15. *subulatus*, frutescens inermi, ramis retroflexis, foliis teretibus subulatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.  $\eta$

16. *dependens*, fruticosus aculeatus, ramis reflexis, fol. subulatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.  $\eta$

17. *horridus*, ophyllus fruticulosus pentagonus, acul. tetragonis compressis striatis. Lin. suppl. p. 203. Cavan. ic. 2. p. 30 t. 136. Desf. atl. 1. p. 307. Hab. in Hispania et Barbariae arvis. Sequentis var.?  $\eta$

18. *aphyllus*, caule inermi angulato fruticoso, fol. subulatis striatis inaequalibus divergentibus. Moris. s. 1. t. 1. f. 2. A. phyllacanthus. Lam. enc. 1. p. 296. Hab. in Sicilia, Hispania, Lusitania et Barbaria, ad littora maris.

19. *lanceus*, aculeis solitariis, fol. lanceolatis subfalcatis, pedunc. axillaribus solitariis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.  $\eta$

20. *capensis*, spinis quaternis, ramis aggregatis teretibus, fol. setaceis. L. Pluk. alm. t. 78. f. 8. Hab. ad Cap. b. spei. Spinnae ternae. Lam.

21. *sarmentosus*, fol. solitariis linearilanceolatis, caule flexuoso, aculeis recurvis. Flor. zeyl. 124. Mill. dict. n. 11. Hab. in Zeylona.  $\eta$

22. *verticillaris*, fol. verticillatis. L. A. orientalis, fol. gallii. Tournef. Buxb. cent. 5. app. 47. t. 37. Hab. in Oriente.  $\dagger$

813. DRACÆNA. Cor. 6-partita, erecta. Filam. medio subcrassiora. (L.) aut simplicia. Bacca 3-locularis, 1-sperma.

1. *Draco*, arborea, fol. subcarnosis apice spinosis. Lin. Willd. Sp. p. 155. Blackw. t. 358. Draco arbor. Habitat in India orientali.  $\eta$

2. *marginata*, fol. angustis planis acutis confertis terminalibus, margine purpureis. Lam. enc. 2. p. 324. Hab. ad Madagascar. Priori affinis.

Obs. Non est D. marginata. Ait. quae nunc dentata nominatur.

3. *indivisa*, arborea, fol. ensiformibus acutis, racemo laterali composito. Forst. escul. n. 33. Hab. ad portum obscurum N. Zealandiae.  $\eta$

4. *umbraculifera*, arborea, fol. ensiformibus acuminatis, panicula terminali densissima subsessili. Jacq. Schoenb. 1. p. 50. t. 95. Hab. culta in insula Mauriti.  $\eta$

5. *australis*, arborea, fol. ensiformibus acutis, racemo terminali erecto supradecomposito. Forst. prod. n. 151. Hab. in N. Zealandia.  $\eta$

6. *cernua*, arborea, fol. lanceolatis suboblique flexis, panicula dependente divaricata. Willd. p. 157. Schoenb. 1. p. 50. t. 96. Hab. in insula Mauriti.  $\eta$

7. *ferrea*, arborea, fol. lanceolatis acutis. L. Hab. in China. Fusco-purpurea.  $\eta$

8. *dentata*, fruticosa, fol. dentato-spinosis, racemis axillaribus, baccis polyspermis. Ait. Kew. 1. p. 454. D. *marginata*. Aloe purpurea. Lam. enc. 1. p. 85. Plant. grass. ic. Genus forte intermedium inter

A a 2

aloem et dracaenam. Fol. non succulenta. Hab. in insula Bourbon. h

9. *terminalis*, arborescens, fol. lanceolatis petiolatis, ramis paniculae patentissimis. Lam. l. c. Willd. II. p. 154. Jacq. ic. 2. t. 448. Collect. 2. p. 357. Rumph. 4. t. 34. Hab. in India, China. Fol. fere cannae. Rad. contra diarrhaeam. Demum purpurascens.

10. *reflexa*, fol. ensiformibus supra basin angustatis; inferioribus reflexis, flor. pedicellis longioribus. Lam. enc. 2. p. 327. Cordyline. Commers. Rumph. 7. t. 35. ? Hab. in inc. Mauritania. Filam. non incrassata? Bacca flava.

11. *mauritanica*, suffrutescens, fol. ensiformibus, scapo sarmentoso alterne paniculato, flor. pedicellis aequantibus. Lam. p. 325. Hab. in insula Borbonia. Fol. iridea.

12. *striata*, frutescens erecta, fol. lanceolatis oblique falcatis striatis, caule flexuoso. Lin. suppl. 204. Asparagus striatus. Thunb. prod. 65. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *undulata*, herbacea caulescens erecta, fol. ovatis acutis multinerviis, flor. axillaribus pedunc. Lin. suppl. 204. Asparagus undulatus. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *erecta*, herbacea caulescens erecta, fol. lanceolatis subulatis subsessilibus. Lin. suppl. 204. Asparagus erectus. Thunb. prod. 65. Hab. ad Cap. b. spei.

15. *borealis*, herbacea subcaulescens, fol. ellipticis subplicatis. Ait. Kew. 1. p. 454. t. 5. Andner. t. 206. Filam. simplicia. Hab. in sinu Hudsonis et Canada. ¶

16. *graminifolia*, herbacea acaulis, fol. linearibus. L. Hab. in Asia. Statura Anthericoli Phalangii. Fol. valide striata. Flor. ad singulos dentes racemi 4 s. 5, quasi e gumma prodeunt. L. Filam. incrassata.

814. DIANELLA. Cor. aperta. Filam. apice tumida s. incrassata. Bacca 3 locularis: loculis 4-spermis.

1. *nemorosa*. Lam. enc. 2. p. 276. Les Liliacés. t. 1. Jacq. Schoenb. t. p. 49. t. 54. Rumph. 5. t. 73. Dracaena ensifolia. Lin. Willd. Sp. II. p. 158. Hab. in Indiae nemoribus. Fol. iridea. Flor. paniculati, atrovirentes. Bacca amethystea.

815. CORDYLINE. Cor. externe pubescens. Filam. simplicia, basi corol. inserta. Stigm. subincrassatum. Bacca (turbinata) 1-locularis.

1. *hemichrysa*. Commers. Dianella hemichrysa. Lam. Hab. in insula Borboniae, supra arbores et saxa. Fol. radicalia subius flava et pubescentia. (Ex. observat. cel. du Petit-Thouars.)

816. SANSEVIERA. Cor. infera, monopetala; tubo filiformi, limbo 6-partito, revoluta. Stam. limbo inserta. Bacca 1-sperma.

1. *guineensis*, fol. lanceolatis planiusculis uniformibus, stylo staminibus duplo longiore, bracteis tubo corollae triplo brevioribus, flor. sessilibus. Willd. Sp. II. p. 159. Thyrsoflora. Thunb. prod. 65. Aletris hyacinthoides β guineensis L. Jacq. hort. 1. p. 64. t. 84. Aloe guineensis, radice geniculata, fol. ex viridi et auro undulatum variegatis. Comm. hort. 2. p. 39. t. 20. Hab. in Guinea, Bacca lutea. ¶

2. *zeylanica*, fol. glabris oblongis acutis lanceolatis canaliculatis, stylo longitudine staminum, bracteis pedunculi longitudine. Willd. Salmia spirata, fol. rigidis canaliculatis maculatis, flor. spicatis. Cav. ic. 3. p. 24. t. 246. Liriope spicata. Loureiro coch. p. 248. Com. hort. 2. p. 41. t. 27. Hab. in Zeylonia. Fol. carnosius minor. ¶

3. *lanuginosa*, fol. nervosis; nervis lanuginosis, inferioribus oblongis, reliquis linearibus, stylo staminum longitudine, pedunc. bracteatis. Willd. p. 160. Salmia ebractea. Cav. l. c. Rheed. 11. p. 38. t. 42. Hab. in Indiae arcuosis. ¶ +

817. CONVALLARIA. Cor. 6-fida (varia). Bacca maculosa, 3-locularis, supera.

\* Cor. campanulatis.

1. *majalis*, scapo nudo semicylindrico, fol. ovatis. Willd. Sp. II. p. 160. Flor. dan. t. 854. Hab. in montosis sylvaticis. ¶

2. *japonica*, scapo nudo ancipiti, flor. racemosis secundis, fol. linearibus gramineis, scapo triplo longioribus. Lin. suppl. 204. Ksemph. amoen. 823. ic. Hab. in Japonia.



3? *spicata*, scapo nudo, racemo spicato, flor. aggregatis. Thunb. jap. 141. Hab. in Japonia. Cor. subglobosa violacea. Fruc. obscurus. Thunb.  $\mathcal{T}$  +

\*\*\* *Polygonatum*, oor. *infundibuliformibus*.

4. *verticillata*, foliis verticillatis. L. Flor. dan. 1. 26. Engl. bot. t. 128. Hab. in sylvaticis, monosis, praecipitiis.  $\mathcal{T}$

5. *Polygonatum*, fol. alternis amplexicaulis, caule ancipiti, pedunc. axillaribus subunifloris. Flor. dan. 1. 377. Engl. bot. t. 280. Hab. in nemorosis, rupibus. Flor. gemini, in apice caul.

6. *multiflora*, fol. alternis amplexicaulis, caule tereti, pedunc. axillaribus multifloris. Flor. dan. 1. 152. Engl. bot. t. 229. Hab. in Europae et Americae boreal. sylv. montosis. Flor. 3-ni aut subquini apice bini.

7. *latifolia*, fol. alternis amplexicaulis acuminatis, caule angulato, pedunc. axillaribus multifloris. Jacq. austr. 3. t. 232. Hab. in Austriae, Bavariae, Pannoniae sylv.  $\mathcal{T}$

\* *dichotoma*, fol. cordatis amplexicaulis, caule ramoso dichotomo. Crea. in montibus Gebennicis procul Monspelium. Thibaud. Ulterius examinandum an constans sit species. Differentia ex unico specimine eruta est.

8. *umbellulata*, fol. radicalibus oblongo-ovalibus, scapo radicali nudo pubescente umbellula terminali multiflora. Michaux. Flor. 1. p. 202. Hab. in montibus alleghanis. Flor. odorati, albi aut intus purpureo-maculati.  $\mathcal{T}$

\*\*\* *Maianthemum*, corol. *rotatis*.

9. *racemosa*, fol. sessilibus, racemo terminali composito. L. Moris. s. 13. t. 4. f. 9. Hab. in Virginia, Canada, et Carol. montibus.

10. *stellata*, fol. alternis amplexicaulis, racemo terminali simplici. Moris. s. 15. c. 4. f. 7. Hab. in Canada. Flores saepius tetrandri. W.  $\mathcal{T}$

11. *trifolia*, pumila fol. amplexicaulis ovali-lanceolatis ternis, racemo terminali simplici. Michaux. 1. p. 202. Gmel. sibir. 1. p. 36. t. 6. Hab. in Sibiriae sylv. et in rupibus à sinu Hudsonis ad Quebec.  $\mathcal{T}$

12. *bifolia*, fol. cordatis, flor. tetrandris quadrifidis. Flor. dan. 1. 291. Michaux. Flor. 1. p. 201. Hab. in Europae et Americae borealis sylv. Fol. 2-3, interdum oblongo-ovalia.  $\mathcal{T}$

818. *LAPAGERIA*. Cor. 6-petala, basi trigona. Petala 3-interiora latiora, subunguiculata. Anthera erectae. Stigm. clavatum. Bacca supera 1-locularis, polysperma. Sem. receptaculo triplici, per parietes, decurrenti affixa.

1. *rosea*, fol. ovato-lanceolatis quinque-nerviis. Flor. Peruv. 3. p. 65. t. 297. Hab. in regn. chilensis sylv. Fruticosa, scandens. Cor. magna, rosea aut roseo-punicea intus punctis albis distincta.  $\mathcal{h}$

Obs. Hoc genus (dicunt auctores Flor. Peruv.) dicatum est *Joseph. Lapageriae*, lectissimae feminae, Nap. Bonaparte uxori dignissimae, botanices et hist. naturalis *Fautrici* egregiae.

819. *LUSURIAGA*. Cor. infera, 6-petala. Petala 3-exteriora angustiora. Filam. receptaculo inserta. Anthera erectae, sagittatae. Stigma 3-angulare. Bacca trilocularis: dissepimentum membranaceum. Semina bina: 1-passim abortiente.

1. *radicans*, fol. lanceolatis obliquis. Flor. Peruv. 3. p. 66. t. 298. Hab. in regn. chilensis sylv. Petala et genitalia albidolutescentia punctis et lineis rubris variegata.

820. *CALLIXENE*. Cor. 6-petala: petalis alternis basi biglandulosis. Filam. basi latiora. Anth. versatiles. Stigm. 3-gonum. Bacca supera, 3-locularis, polysperma.

1. *marginata*. Lam. ill. t. 278. Enargea marginat. Gaertn. de sem. 1. p. 203. t. 59. f. 3. Willd. Sp. 11. p. 230. Hab. in freto Magellanico. Suffrut. inferne nodosus aphyllus. Flor. solitarii terminales. Fol. marginata tumida.

821. *PHILESIA*. Cor. 6-petala: petalis 3-interioribus longioribus. Filam. basi connata. Anth. lon-

gæ, versalites. *Stigm.* 3-lobum.  
*Bacca* subtrigona, polysperma.

1. *buxifolia*. Willd. p. 231. Lam. ill. t. 248. Habit. cum priore genere. Ramuli flexuosi. Flor. revoluta. Cor. magna. h

822. HERRERIA. *Cor.* infera, 6-partita. *Stigm.* 3-gonum. *Caps.* triquetralata, 3-locularis, 3-valvis : valvulae septiferæ. *Sem.* margine membranaceo cincta.

1. *stellata*, caul. volubili aculeato, fol. radiatis lineari-ensiformibus. Flor. Per. 3. p. 69. t. 303. f. a. Salsa Few. 2. p. 716. pl. 7. Hab. in R. Chilens. sylvis. Cor. lutescens, odora. h

823. RIPOGONUM. *Cor.* 6-partita, minima. *Anthere* longæ, tetragona, subsessiles. *Bacca* globosa, 2-sperma. *Sem.* hemisphærica.

1. *scandens*. Forst. N. Gen. pl. ic. Hab. in Australia.

824. FLOSCOPA. *Cal.* 3-fidus inferus pilosus (Cor. petal. 3-exteriora?). *Petala* 3, ovata. *Caps.* 2-locularis, 1-sperma.

1. *scandens*, caul. scandente, fol. lanceolatis, flor. fastigiato. Loureiro Cochinch. t. p. 238. (Ed. Willd.) Hab. in montibus Cochinchinæ. Flor. parvus, dilute violaceus. h

825. ONCUS (Oncorhiza). *Cal.* 2-phyllus inferus. *Cor.* 6-fida, campanulata. *Bacca* 3-locularis.

1. *esculentus*, scandens, fol. cordatis subrotundis, spic. laxis. Lour. l. c. p. 240. In Cochinchinæ sylvis. Rad. tuber maximum (unde nomen) farinosum, edule. Dioscoreæ affine genus.

826. POLYANTHES. *Cor.* infundibuliformis incurva. *Filamenta* fauci inserta. *Germen* in fundo corollæ.

1. *tuberosa*, flor. alternis geminis, radiculis tuberosis, scapo squamoso, fol. linearibus longioribus. Flor. Peruv. 3. p. 66. Willd. Sp. II. p. 164. Amica nocturna.

Rumph. 5. t. 98. Hab. sponte in Java et Peruv. Odor flor. gratus.

2. *pygmaea*, fol. oblongo-ovatis scapo longioribus. Willd. p. 165. Jacq. ic. rar. 2. t. 380. Collect. suppl. 56. Hab. ad Cap. b. spec. Planta simillima Agapantho ensifolio, quocum forte proprium format genus. W. T.

827. DRIMIA. *Cor.* infera campanulata 6-fida, laciniis revolutis. *Stam.* corollæ inserta. *Stigma* capitatum.

1. *ciliaris*, fol. sublinearibus ciliatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 377. Collect. suppl. p. 41. Hab. in Cap. b. spec. cum sequentibus. Flor. albi.

2. *elata*, fol. lanceolato-linearibus glabris glaucescentibus scapo duplo brevioribus. Jacq. ic. rar. 2. t. 373. Collect. sup. 38. Cor. externe virescens.

3. *pusilla*, fol. lanceolatis glabris basi canaliculatis, floribus erectis. Willd. Sp. p. 165. D. fol. lanceolato-linearibus glabris, scapum aequantibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 374. Collect. suppl. 42. Cor. virescentes uti in sequente.

4. *undulata*, fol. lineari-lanceolatis glabris undulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 376. Collect. suppl. 41. Hyacinthus revolutus. Thunb. prod. 64? Hab. ad Cap. b. spec. T.

5. *media*, fol. lineari-subulatis semiteretibus. D. fol. subulatis antice subcanaliculatis glabris. Jacq. ic. rar. 2. t. 375. Coll. suppl. 40.

Obs. Totum genus ab Hyacinthis non satis distinctum est; insertio staminum enim in diversis speciebus Hyacinthi variat. Willd. p. 166.

828. HYACINTHUS. *Cor.* erecta campanulata aut subrotunda 6-fida, passim 6-partita : laciniis equalibus. (Pori 3-melliferi germinis. Lir.) *Stam.* cor. medio inserta. *Caps.* loculi subbispermi.

\* *Corolla* 6-partita. (Scyllioidei.)

1. *Non scriptus*, racemo cernuo : cor. campanulatis sexpartitis apice revolutis. L. Blackw. t. 61. Scilla nutans. Smith. brit. t. p. 366. Engl. bot. t. 377. Hab. in Angliæ, Galliæ, Hispaniæ, Italiæ nemoribus, vere.

β. *cernuus*, minor, cor. campanulatis

*sempartitis* (incarnatis) racemo cernuo. L. H. hispanicus. Clus. hist. 1. p. 177. Hab. in Hispania. Cor. huic basi ventricosior, praecedenti vero minime. L. ¶

2. *convallarioides*, cor. campanulatis sempartitis, fol. subulatis. Willd. p. 168. Lin. suppl. p. 204. Jacq. Schoenb. t. p. 42. t. 8r. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. lutei.

3. *brevifolius*, cor. sempartitis, racemo cernuo, fol. scapo brevioribus. Thunb. prod. 63. Cum priore.

\*\*\* *Corol. campanulata 6-fida.*

4. *amethystinus*, cor. campanulatis semisexfidis basi cylindricis. H. oblongo caeruleo flore, minor. H. minor hispanicus angustifolius. Hab. in Hispania, Russia. ¶

5. *orientalis*, cor. infundibuliformibus semisexfidis basi ventricosioribus. Hab. in Asia, Africa.

6. *flexuosus*, cor. campanulatis, racemo erecto, fol. linearibus scapo longioribus. Thunb. prod. 64. Hab. ad Cap. b. spei. †

7. *corymbosus*, cor. infundibuliformibus corymbosis erectis, scapo fol. brevior. L. Jacq. Collect. 3. p. 230. t. 19. f. 2. Hab. in Cap. b. spei pascuis. Folia linearia, angustissima, saepius tria. Scapus fol. brevior. Flor. purpurei.

8. *romanus*, cor. campanulatis semisexfidis racemosis, stam. membranaceis. L. Willd. p. 169. Lam. enc. 3. p. 192. Hab. in Italiae cultis et hortis. Cor. campanulatae (cylindrico-ovatae. Capell.) ultra medium sexfidae, albae. L. Transitorium ad sequentem divisionem facit.

\*\*\* *Muscari. Corol. ovatis aut cylindricis brevi incis.*

9. *maritimus*, fol. subulatis, racemo tereti, cor. cylindricis: summis coloratis sessilibus abortivis. Muscari. Desf. atl. 1. p. 383. Hab. ad maris littora prope veterem Carthaginem. Cpr. fere H. comosi.

10. *parviflorus*, fol. subulato-feliformibus, racemo terminali brevissimis, flor. distinctis. Muscari parviflorus. Desf. l. c. p. 309. Cresc. cum priore. Affinis. H. racemoso, sed flor. longe rarioribus et cor. superne latioribus. differt. D.

11. *Muscari*, cor. ovatis omnibus aequalibus. Hort. cliff. 126. Hab. in Asia.

12. *comosus*, cor. angulato-cylindricis:

summis sterilibus longius pedicellatis erectis. L. In agris, passim in sylvis.

\* *monstrosus*, flor. paniculatis monstrosis. L. Hort. cliff. 126. H. paniculatus, racemo paniculato sterile, pedunc. ramosis coloratis, cor. campanulatis basi acutis. Lam. enc. 3. p. 193. Moris. s. 4. t. 11. f. 2. Hab. in Italia (Paviae.)

13. *botryoides*, cor. globosis uniformibus, fol. canaliculato-cylindricis strictis. Scop. carn. n°. 424. Lob. ic. p. 108.

14. *racemosus*, cor. ovatis uniformibus confertis, summis sessilibus (sterilibus), fol. laeis dependentibus linearibus. Willd. p. 170. Jacq. austr. t. 187. Knorr. del. 1. t. T. 8. H. junciformis. Lam. l. c. p. 194. Hab. in Europa australi.

\*\*\* *ZUCCANGNIA. Cor. cylindrica. Petalata* exteriora longiora, lanceolato-setacea, saepe reflexa.

15. *viridis*, petal. exterioribus subulatis longissimis, fol. linearibus canaliculatis scapo longioribus. Lin. Jacq. ic. rar. 1. t. 66. Zuccangnia viridis. Thunb. Dis. N. genera pl. Pars. IX. Lachenalia viridis. Willd. Sp. II. p. 174. Hab. ad Cap. b. spei.

16. *livida* (H. serotinus. L.), flor. secundis, petal. exteriorib. subdistinctis, interioribus coadunatis. L. Cav. ic. p. 18. t. 50. Lachenalia serotina. Willd. p. 175. Hab. in Hispania. Cor. fuscescens: pet. longitudine subaequalia. Flor. initio aestatis.

829. *PHORMIUM. Cor. 6-petala, infera: petalis 3-interioribus longioribus. Stam. adscendentia, exserta. Caps. oblonga, triquetra. Sem. compressa.*

1. *tenax*. Forst. gen. n°. 24. Cook. it. v. 2. t. 96. P. fol. plurimis, inflorescentia ramosa. Lin. suppl. 204. Hab. in N. Zeelandia. Fol. exquantia, ensiformia 2-3-petalia. Incolae ex hac planta Lini speciem faciunt.

830. *LACHENALIA. Cor. 6-petala, infera: petalis obtusis 3-interioribus longioribus. Stam. erecta. Caps. subovata, trilata. Sem. globosa.*

1. *glaucina*, cor. campanulatis sessilib., petalis interioribus longioribus patulis obtusis, stylo staminib. longiore, fol. linearilanceolatis glabris. Willd. Sp. II. p. 172.

Jacq. ic. rar. 1. t. 39r. Collect. suppl. 39. Hab. ad Cap. b. spei, cum. *sequentibus*. Petala exteriora glauco viridia, apicibus rubicundis, interiora albido-incarnata. Scap. immaculatus.

2. *orchioïdes*, cor. campanulatis sessilibus, stylo longitudine staminum fol. oblongo-lanceolatis margine cartilagineo-crenatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 39o. Collect. 3. p. 241. Phormium Hyacinthoides. Lin. suppl. 204. Scapus maculatus.

3. *pallida*, cor. campanulatis brevissime pedunculatis, scapo apice angulato fol. lineari-oblongis brevioribus. Willd. L. mediana. Jacq. ic. rar. 2. t. 39a. Collect. 3. p. 242.

4. *hyacinthoides*, cor. campanulatis, fol. lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo duplo longioribus. Willd. p. 173. Jacq. ic. rar. 2. t. 38a. Collect. suppl. 58. Hyacinthus orchioïdes. Jacq. hort. vind. 2. t. 178. Petala tria exteriora, alba externe apice rubicunda et macula viridi notata, interiora alba emarginata.

5. *angustifolia*, cor. campanulatis, petal. interioribus longioribus, patulis obtusis, fol. lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 381. Collect. suppl. 47. Scapus rubro-maculatus. Petala alba patentia.

6. *contaminata*, cor. campanulato-cylindraceis, petalis interioribus lanceolatis obtusis erectis, fol. lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo longioribus. Willd. p. 174. L. orthopetala. Jacq. ic. 2. t. 383. Collect. 3. p. 240. Fol. supra maculis obscure rubentibus adspersa.

7. *pusilla*, cor. cylindricis, stam. cor. longioribus, fol. elliptico-linearibus basi attenuatis scapo longioribus patulis. Willd. Jacq. ic. 2. t. 385. Collect. suppl. p. 71. Fol. rubro-maculata. Scapus vix ullus. Flor. alidi adpressi.

8. *patula*, fol. geminis lineari-lanceolatis canaliculatis pulposo-carnosis, ad medietatem erectis, dein reflexis, cor. campanulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 381. Collect. 4. p. 149. Cor. alba, sub apice macula viridi et petal. interioribus ad apicem linea rubicunda notatis.

9. *fragrans*, fol. geminis lineari-lanceolatis planis maculatis glabris, scapo erecto, cor. pedicellatis subcampanulatis. Jacq. Schoenb. 1. p. 43. t. 8a. Cor. candida.

10. *liliflora*, fol. geminis ex oblongo lanceolatis dense facie pustulatis, scapo erecto tereti, cor. patentibus reflexis, petalis sublinearibus. Jacq. ic. 2. t. 387. Collect. suppl. 66. Cor. alba.

11. *pustulata*, fol. geminis lanceolato-linearibus pustulatis, scapo triquetro reclinato, flor. subcampanulatis subsessilib. Jacq. ic. rar. 2. t. 385. Coll. 3. p. 244. Cor. alba, apice viridis.

12. *purpureo-caerulea*, cor. campanulatis pedunculatis, petalis interioribus obtusis revolutis, stam. cor. longioribus, scapo apice angulato, fol. lanceolatis pustulatis. Willd. p. 177. Andrew. t. 251. Jacq. ic. 2. t. 389. Coll. suppl. 63. Scillam refert, odorata. Fol. erecta.

13. *unicolor*, fol. geminis lineari-lanceolatis, facie rariter pustulatis, scapo erecto tereti, cor. subcylindricis, petalis interioribus apice patulis, genitalib. declinatis. Jacq. ic. 2. t. 389. Coll. suppl. 61. Cor. violacea depressa.

14. *violacea*, fol. geminibus oblongis maculatis, scapo tereti adscendente, racemo erecto pedunculatis patentissimis longitudine florum, flor. basi planis propendulis. Jacq. ic. 2. t. 394. Coll. 4. p. 147. Petala exteriora viridia, interiora violacea.

15. *purpurea*, fol. geminis lineari-lanceolatis immaculatis ad oras subtilissime cartilagineo-crenatis, flor. pedunculatis patentissimis, cor. subcylindricis. Jacq. ic. 2. t. 393. Coll. suppl. p. 65. Hab. ad Cap. b. spei. Pet. exteriora alba, interiora atrosanguinea.

16. *lancaeifolia*, cor. subcampanulatis patentibus, pedunc. corolla triplo longioribus, petalis linearibus obtusis subaequalibus, fol. ovatis acuminatis. Willd. p. 178. Jacq. ic. 2. t. 40a. Coll. suppl. 69. Fol. variegata, latissima. Scapi prostrati.

17. *unifolia*, cor. cylindraceis, pedunc. longitudine corollae, petalis interioribus longioribus obtusis inaequalibus, folio solitario lineari-lanceolato. Willd. L. folio unico canaliculato, racemo laxo. Jacq. Schoenb. 1. p. 43. t. 83. Scapus punctatus.

18. *hirta*, cor. campanulatis pedunculatis, fol. linearibus hirtis. Thunb. prod. 64. Hab. in Cap. b. spei aquosis. Fol. unicum basi late vaginans. Flor. racemosi, albo-caerulescentes.

19. *isopetala*, cor. cylindraceis pedunculatis, petalis linearibus obtusis subae-

qualibus, scapo apice angulato, fol. lanceolatis deflexis. Willd. p. 179. Jacq. ic. rar. 2. t. 401. Collect. suppl. 69. Cor. albae, apice atro-purpureae.

40. *tricolor* (aloides), cor. cylindraceis pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus emarginatis, bracteis acutis, fol. lanceolatis. Willd. p. 179. Phormium Aloidis, fol. binis radicalibus supra fuscomaculatis. Lin. suppl. p. 205. Jacq. ic. rar. 1. t. 61. Les Liliacées. t. 2.

β? *luteola*, fol. geminis elongato-lanceolatis subimmaculatis, scapo erecto, cor. propendulis cylindricis cum limbo petalorum interiorum patentissimis. Jacq. ic. 2. t. 395. Coll. 4. p. 148.

21. *rubida*, fol. patulis superne planis, cor. cylindraceis brevissime pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus, stylo stam. longiore, fol. oblongis. Willd. p. 179. Jacq. ic. 2. t. 398. Coll. suppl. 60.

22. *tigrina*, fol. subgeminis, basi ad medietatem usque mutuo amplexantibus et convolutis, dein lanceolatis et patulis acutis maculatis, scapo erecto maculato, flor. cylindricis punctatis pendulis. Jacq. ic. 2. t. 399. Coll. suppl. 67. Willd. p. 180.

23. *punctata*, fol. geminis linearilanceolatis canaliculatis utrinque maculatis erectis, scapo erecto maculato paucifloro, flor. cylindricis incurvulis punctatis pendulis. Jacq. ic. 2. t. 396. Collect. 2. p. 323. Scapus rubromaculatus. Petala exteriora incarnata sanguineo-punctata, interiora alba rubropunctata apice flavescencia.

24. *pendula*, fol. ovato-oblongis, cor. cylindraceis, petalis tribus interioribus longioribus integris, flor. pedunc. pendulis. Ait. Kew. 1. p. 461. Andrew. t. 41. Phormium bulbiferum. Cyrill. Neap. fasc. 1. t. 12.

β. *tricolor*, fol. immaculatis. Jacq. ic. 2. t. 400. Coll. 3. p. 239. Petal. exteriora rubra, interiora flavescencia apice violacea. Willd. L. pendula. Jacq.

25. *quadricolor*, fol. geminis linearilanceolatis maculatis, scapo erecto, cor. propendulis cylindricis cum limbo petal. interiorum patulo. Jacq. ic. 2. t. 398. Collect. suppl. 62. Andrew. t. 148.

831. *LANARIA*. Cor. supera, lanata, filamentis longior: limbo 6-partito, patulo. Peric. 3-loculare.

γ. *plumosa*. Ait. Kew. 1. p. 462. Thunb.

Argolasia. Juss. Hyacinthus lanatus, cor. lanatis, caule ramoso. L. Hab. ad Cap. b. spei. Scapus corymbosus.

832. *VELTHEIMIA*. Cor. tubulosa 6-dentata (pendula). Stam. tubo inserta. Caps. membranacea, triolata, loculis monospermis.

1. *viridifolia*, fol. lanceolatis plicatundulatis obtusis, dentibus limbi rotundatis rectis. Willd. Sp. p. 181. Jacq. hort. Schoenh. 1. p. 41. t. 78. Aletris capensis. L. Hab. ad Cap. b. spei, uti sequentes.

2. *glauca*, acaulis, fol. lanceolatis glaucis, flor. nuantibus, limbo patente. Ait. Kew. 1. p. 463. Jacq. Schoenh. 1. p. 40. t. 77.

3. *sarmentosa*, acaulis, fol. ensiformibus laxis, flor. spicatis, radicibus sarmentosis. Aletris. Andrew. t. 54. Flor. nuantibus rubentes, apice pallescent. Flor. hyeme.

4. *Uvaria*, acaulis, fol. ensiformibus canaliculatis carinatis. L. sub Aletris. Knorr. del. 1. t. A. 13. Seb. thes. 1. p. 29. t. 19. f. 3. Flor. coccinei.

5. *pumila*, scapo brevior fol. linearibus acute carinatis. Ait. Kew. 1. p. 464. sub Aletris.

833. *ALETRIS*. Cor. infundibuliformis, subsexfida rugosa. Filam. laciniarum basi inserta. Caps. seminfera, superne cal. marcido vestita, 3-locularis, polysperma.

1. *farinosa*, acaulis, fol. lanceolatis membranaceis, flor. alternis. Willd. II. p. 183. A. alba, flor. pedicellatis oblongotubulosis, cal. fructus laeviusculus farinosus. Michaux. Flor. 1. p. 190. Hab. in Amer. septentrionali.

2? *fragrans*, caulescens, fol. lanceolatis. L. Hab. in Africa. Caul. 10-12-pedalis. Flor. sordide albi circa vespertam durante nocte explicati fragrantissimi. Fl. Maj. Jun. h

3. *aurea*, flor. subsessilibus breviter tubulatis subcampanulatis, cal. fructus rugosis scaberrimis. Michaux. Hab. in Carol.

Obs. Synonyma Plucknetii et Morisoni a Linnaco ad Heloniam bullatam relata, huc pertinent. Michaux. l. c. p. 190.

834. *YUCCA*. *Cor.* campanulato-patens. *Sylus* nullus. *Caps.* 3-6-locularis, apice pertusa.

1. *gloriosa*, fol. lanceolatis latiusculis integerrimis. L. Willd. Sp. II. p. 183. Michaux. Flor. 1. p. 166. Barr. rar. 70. t. 1194. Hab. in Canada, Peru, et Carolinae litoribus.

2. *aloifolia*, arborescens, fol. lineari-lanceolatis crenulatis strictis. L. Dill. elth. t. 324. f. 416. Hab. in Jamaica, Vera Cruce, Carolina, etc.

3. *draconis*, arborescens, fol. crenatis nuntantibus. L. Dill. elth. 437. t. 324. f. 417. Hab. in America. h

4. *filamentosa*, aculis, fol. lanceolatis serrato-filiferis. L. Trew. Ehret. sel. t. 37. Hab. in Virginiae et Carolinae litoribus. h

835. *ALOE*. *Cor.* tubulosa, ore subsexfido patulo, fundo nectarifero. *Filam.* receptaculo inserta. *Caps.* supera, 3-locularis, 3-valvis, polysperma. *Sem.* biserialia margine membranaceo. (Flor. ore nunc recto, nunc labiato. Fol. carnosa. s. succulenta crassa.)

1. *dichotoma*, caule dichotomo, fol. ensiformibus serratis, flor. paniculatis, stem. cor. ovata longioribus. Willd. Sp. pl. II. p. 184. A. ramosa. Lin. suppl. 206. Patters. iter. t. 3. 4. 5. Thunb. Diss. de Aloë. n°. 1. Hab. in monte Bockland Cap. b. spei. h

2. *spicata*, caulescens, fol. planis ensiformibus dentatis, flor. spicatis campanulatis horizontalibus. Thunb. Diss. n°. 2. Lin. suppl. p. 205. Hab. in Cap. b. spei interioribus regionibus. Ex hujus succo optima Gumma-resina Aloës paratur. Th. h +

3. *umbellata*, caulescens, scapo nudo, fol. crassis maculatis margine spinosis, flor. racemoso-umbellatis. Plant. grasses, cum. ic. et descr. A. *maculosa*. Lam. enc. 1. p. 87. A. perfoliata. Lin. Var. ad Cap. b. spei cum omnibus fere speciebus. Flor. majusculi, rubri.

4. *fruticosa*, caulescens, fol. amplexicaulibus reflexis subrecurvis longis margine spinosis. A. arborescens. Plant. grass. ic. Mill. diet. n°. 3. Lam. l. c. Scap. bract.

obtectus. A. *cornes de belier*. Gall. fol. formam non male exprimit.

5. *ferox*, caul. arborescente, fol. perfoliatis undique spinosis, staminib. cor. duplo longioribus. Plant. grass. ic. Lam. l. c. n°. 2. Com. prael. t. 19. A. perfoliata S. Act. Flor. spicati densi, parvuli, bract. setaceis suffulti.

6. *rhodacantha*: caulescens, fol. patulis amplexicaulibus margine rubris spinosis, scapo bract. magnis confectis oblecto. Plant. grass. Specium. Phit. ic. 71. Flor. subspicati, primo erecti.

7. *mitraeformis*, caulescens, fol. crassis margine spinosis inferne adpressis spinulosis, racemis umbellatis. Plant. grass. Lam. n°. 8. Dill. At. t. 17. f. 19. Scap. subramosus, bracteatus. Var. fol. conniventibus et patulis.

*Obs.* Antecedentes et nonnullae sequentes plerumque ut varietates *A. perfoliatae* habitae sunt quare nomen ipsum suppressendum duxi.

8. *succotrina*, caul. fruticoso, fol. oblongo-ensiformibus submaculatis, margine cartilagineo spinoso. Plant. grass. ic. Lam. enc. 2. p. 85. Trew. t. 333. A. perfoliata, succotrina. Ait. Kew. 1. p. 466. Scap. bracteatus. Flor. penduli, rubri apice virescunt.

9. *vera* (*rubescens*), caul. brevi, fol. amplexicaulibus patulis lanceolatis, margine spinoso ex viridi purpurascens, scapo compresso ramoso bracteis minutissimis. A. *rubescens*. Plant. grass. ic. A. vera. Lam. l. c. n°. 4. Hab. in Indiis. Flor. parvuli rubri.

10. *vulgaris* (*flava*), fol. patulis lanceolatis margine spinosis, scapo ramoso, ramis bract. duplici amplexis. Plant. grass. ic. Lam. l. c. n°. 3. p. 86. A. barbadensis. Mill. Act. p. 466. Hab. in India. Flor. majusculi, flavescent.

\* *abyssinica*, fol. lanceolatis patulis duriusculis submaculatis, margine spinisque rubris. Lam. l. c. n°. 5. A. vulgaris. β. Plant. grass. A. maculata vera. Forsk. Arab. p. 73. Hab. in Abyssinia.

11. *picta*, caulescens, fol. ensiformibus dentatis pictis patentibus, flor. racemosis reflexis cylindricis. Thunb. Diss. n°. 4. Thunb. prod. 61. Plant. grass. ic. Fol. margine spinosa, maculata. Flor. obscure rubri, spicati.

12. *sinuata*, caulescens, fol. ensiformibus sinuato-serratis reflexis, floribus

racemosis erectis cylindricis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 5. Thunb. prod. 61. A. barbadensis mitior lacte virens et splendens. Dill. elth. p. 23. t. 19. f. 20. Caul. spithameus flexuoso-erectus inaequalis. Thunb. †

13. *humilis*, acaulis, scapo bracteato, fol. trigonis subulatis aculeatis, flor. racemosis reflexis, cylindricis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 6. Les Plant. grass. ic. Flor. longi, rubri apice virides.

14. *arachnoides*, acaulis, fol. caespitosis glaucescentib. trigonis cuspidatis ciliatis, flor. subspicatis erectis cylindricis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 7. Thunb. prod. 61. Plant. grasses. ic. Cor. labiata, albicans. Hab. ad Cap. b. spei in Carro juxta Swartkops Zoutpan. h

15. *atrovirens*, fol. caespitosis patulis brevibus apice trifariis : angulis spinosis, lateribus subtuberculatis. Plant. grass. ic. A. arachnoides. β. Thunb. Willd. p. 188. Cor. fuscescens sublabiata.

16. *brevifolia*, fol. caespitosis brevissimis glaucis apice trigonis, margine spinosis, scapo bract. numerosis. Plant. grass. ic. A. perfoliata. S. Lin. Comm. Nar. t. 45. Aloës artichaut. Gall. Flor. congesti penduli rubri.

17. *Serra*, caulesc., fol. caespitosis patulis margine spinosis : spinis inferioribus approximatis coalitis ; superioribus remotis, medio subspinosis, scapo dense bracteato. Plant. grass. ic. Flor. rubri.

β ? *verrucosa*, acaulis, fol. ensiformib. acutis papillois distichis, flor. racemosis reflexis clavatis. Ait. Kew. 1. p. 468. Comm. hort. 2. p. 17. t. 9. A. carinata. β. *ensiformis*, fol. ensiformibus planiusculis. Plant. grasses.

18. *carinata*, acaulis, fol. subdistichis acinaciformibus papillois, flor. racemosis cernuis curvatis. Ait. Kew. 1. p. 469. Plant. grass. ic. Dill. elth. 22. t. 18. f. 20. Flor. basi ventricosi rubri, apice virides.

19. *maculata*, acaulis, fol. linguiformibus glabris pictis, floribus racemosis cernuis curvatis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 10. Thunb. prod. 5. Hab. ad Cap. b. spei in Hautniquas montibus. h †

20. *Linguiformis*, caulinis, fol. linguiformibus subdenticulatis glabris distichis, flor. racemosis erectis cylindricis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 11. Thunb. prod. 61. Ait. Kew. 1. p. 469. Lin. suppl. 206.

β. *disticha*, flor. racemosis pendulis ovato-cylindricis curvis. L. Linguiformis. Plant. grass. ic.

21. *plicatilis*, subacaulis, fol. linguiformibus inermibus laevibus distichis, flor. racemosis pendulis cylindricis. Ait. Kew. 1. p. 470. Plant. grasses. ic. Curt. mag. t. 457. Flor. rubri, suberecti.

22. *variegata*, subacaulis, fol. trifariis pictis canaliculatis, angulis cartilagineis, flor. racemosis cylindricis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 12. Plant. grass. ic. Hab. in Aethiopiae argillosis. Flor. longi, subcurvi, penduli, rubelli. Fol. maculis albis variegata.

23. *viscosa*, subcaulescens, fol. imbricatis trifariis ovatis, flor. racemosis cernuis subbilabiatis. Plant. grass. ic. A. africana erecta triangularis et triangulari fol. viscoso. Com. prael. 82. t. 31. Dill. elth. 15. t. 13. f. 13. Hab. in Cap. b. spei campestrib. Fol. in cultis saltem non viscosa. Cor. acuminata. h

24. *rigida*, subcaulescens, fol. inermibus, superioribus subspiralibus, patulis rigidis acuminatis. Plant. grass. ic. Cor. bilabiata albedo-virescens. Fol. superiora quoad iconem, rubescunt.

25. *spiralis*, subcaulescens, fol. ovatis, octofariis imbricatis, flor. racemosis recurvis. Thunb. A. *spiralis*, subcaulescens, fol. inermibus ovato-acutis imbricatis octofariis, flor. cylindricis obtusis transverse rugosis. Plant. grass. ic.

26. *margaritifera*, acaulis, fol. subtrigonis acuminatis, tuberculis cartilagineis undique adpersis. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 14. Plant. grass. ic. Aloë *pumila*. Lin. cum varietatib. Flor. erecti ? (cernui Ait.) albi subbilabiati. Quoad magnitudinem variat. vid. Willd. p. 189.

27. *retusa*, acaulis, fol. quinquefariis deltoideis. Thunb. prod. 61. Plant. grass. ic. Cor. albicans bilabiata : labio inferiore revoluto. Fol. apice depresso-triquetra. Hab. in Africae argillosis. h

836. AGAVE. Cor. erecta supera tubulosa aut infundibuliformis. Filam. cor. longiora, erecta. Caps. (infera) triangularis, polysperma. (Caps. situ a praecedente genere differt.)

1. *americana*, acaulis, fol. dentato-spinosis, scapo procero, staminib. corolla longioribus, stylo staminibus longiore. Lin.

Willd. Sp. II. p. 192.  $\beta$ . Aloë *variegata*, folior. margine luteo. Hab. in America calidiori. Hodie ab ea sepes in Lusitania, et Helvetia. In vario usu apud Peruvianos est; vid. Flor. Peruv. 3. p. 66. Ex foliis filo et papyrus praeparari possunt.

2. *vivipara*, acaulis, fol. dentatis, scapo ramoso, tubo corollae medio angustato, staminibus corollam aequantibus Willd. Comm. prael. 65. t. 15. Rumph. 5. t. 64. Hab. in America. Panic. bulbifera. Fol. dilatata.  $\eta$

3. *virginica*, acaulis herbacea, fol. cartilagineo-serratis, scapo simplissimo. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 378. Collect. 2. p. 261. Hab. in Virginia.  $\zeta$

4. *Inrida*, subcaulescens, fol. dentato-spinosis, scapo ramoso, stylo staminibus brevior. Hab. in America meridionali. Simillima *A. americanae*, cor. virescens nec lutea.

5. *tuberosa*, caulescens, fol. dentato-spinosis, rad. tuberosa. Ait. Kew. 1. p. 472. Mill. dict. n.º 4.  $\beta$ . spinis duplicibus. Hab. in America.  $\eta$  +

+ **Фурия**. *Cor.* campanulata, 6-partita, supera. *Stam.* glandulae inserta, dorsum incrassata, compressa, apice subulata. *Caps.* infera trilocularis, trivalvis, polysperma.

6. *faetida*, caulescens, fol. integerrimis. L. Furcraea gigantea. Vent. in Bull. Philom. n.º 28. Plantae grassae. ic. Jacq. ic. rar. 2. t. 330. Collect. 2. p. 312. Panic. ampla, multiflora. Cor. albido-virescens.  $\eta$

7. *odorata*, acaulis, fol. ciliato-spinosis. Agave cubensis. Jacq. amer. Ed. pict. t. 260. f. 25. Willd. p. 193. *A. mexicana*. Lam. enc. 1. p. 52. Hab. in Ins. Cuba et Mexico.

*Obs.* Ob Corol. *hexapetalam* (quae odorem spirat gratum) et filam. (ex Jacquino) basi obovata, compressa, omniumque crassissima, desinentia in superiorem partem subulatam, hanc speciem huic divisioni, s. generi diverso? adnumeravi.

837. **ALSTROEMERIA**. *Cor.* 6-petala campanulata, aut subbilabiata: petalis 2-inferioribus basi semitubulosis. *Stam.* declinata, aut erecta. *Stigm.* 3, linearia. *Caps.* subrotundo-ovalis, 3-6-angularis, 3-valvis, aut intus pulposa non

dehiscens. *Sem.* plura, globosa. (Flor. umbellati. Fol. saepius ob petiolos contortos resupinata.)

\* *Caul. erecto aut assurgente.*

1. *peregrina*, caul. erecto-assurgente, fol. lineari-lanceolatis contortis, flor. 2-6. petal. exteriorib. obcordatis acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 58. t. 288. Jacq. hort. t. 50. Curt. mag. t. 139. Willd. Sp. II. p. 194. Hab. in Peruviae et chilensis collibus, praeruptis, maritimis arenosis et glaucosis. Rad. tuberoso-pendula longissima.

*Obs.* Vox *Pelegrina* ab Hispanis in regno Peruviano usitata, significat flos superbus. Willd. l. c. vulgo *Peregrina* non *Pelegrina* appellatur. Flor. Per. l. c.

2. *Ligita*, caule erecto, fol. spathulato-oblongis, pedunc. umbellae involuero longioribus, cor. bilabiata. Lin. suppl. 207. *A. Ligita*, caul. erecto, fol. lanceolato-linearibus flor. umbellatis, petal. subconformibus. Flor. Per. p. 59. Tew. obs. 2. pl. 4. Hab. in Lima et passim in arenosis conceptionis urbis R. chilens. Vernacule *Liutu* (farina e radice praeparata.)  $\zeta$

3. *revoluta*, caul. erecto, fol. lanceolatis, petal. reflexis: interioribus minorib. Flor. Per. 3. p. 59. Hab. in R. chilensis collibus Prov. Rere. Petal. purpurea, interiora a medio ad basin lutea: punct. purpureis variegata. Rad. hujus et 2 sequentium ut in priore.

4. *versicolor*, caul. erecto, fol. lanceolato-linearibus, umbel. 2-3-flora, petal. internis angustioribus: infimo brevior, latior. Fl. Peruv. l. c. Cum priore, in collib. aridis altis. Pet. lutea macul. purpureis.  $\zeta$

5. *haemantha*, caul. erecto, fol. lineari-lanceolatis ciliatis, umb. subsexradiata, pedunc. bifloris, petal. exteriorib. serratis. Flor. Per. p. 60. Cresc. in collib. rudertatis. Petal. sanguinei coloris, 2-interiora longiora, lin. luteis variegata. Var. petal. albido-purpureis et luteo variegatis. L. c.

6. *Lineatiflora*, caul. erecto, fol. lanceolatis, umb. 4-7-radiata, pedunc. bifloris basi folio minori suffultis, petal. serratis linearibus. Flor. Per. p. 60. Hab. in Peruv. collibus. Rad. tuberoso-pendula. Petal. purpurea, 2-interiora col. luteo et purpureo variegata.

7. *distichifolia*, caul. ascendente, fol. distichis oblongo-lanceolatis, umb. 3-8-flora, petal. aequalibus: interiorib. plauis.



Flor. Per. l. c. t. 287. In Andium nemoribus et in Munae montib. altis. Cor. punicea. Caps. non dehiscens. Sem. pauc. pulpa nidulanta. l. c. T.

8. *secundifolia*, caul. dependente, fol. secundis lanceolatis acutissimis subtus albis, umbel. subquinqueflora, flor. hirsutis. Cum priore. Pet. 3-interiora lutea punct. nigris maculata, a, ice virid. a. Stigm. lanuginosa.

\* \* Caul. volubili.

9. *Salsilla*, caule volubili, fol. petiolatis lanceolatis acuminatis, umb. ramosa, pedunc. involucro longioribus bracteatis laxis. Lin. suppl. 206. Pedunc. dichotomis trifloris. Flor. Per. p. 61. Fowill. peruv. 2. p. 713. t. 6. Hab. in Lima, et R. chilensis sylvis. Petal. obovata - cuneiformia, tria interiora ad basin macula violacea. Flor. Peruv.

10. *ovata*, caule volubili, fol. lanceolatis, sup. flori pagina lanuginosis, inferiori lucidis, flor. umbellatis, cor. tubulosis. Cav. ic. 1. p. 54. t. 76. Hab. in Peru. Petal. tria exteriora coccinea apice viridia; interiora viridia, punctis nigris variegata. Caps. magna 6-sulcata. Fol. obliqua. C.

11. *anceps*, caul. volubili ancipiti, fol. lanceolatis acutis, umb. 17 - flora, pet. aequalibus punct. atro - purpureis. Flor. Peruv. p. 61. In Andium nemorib. Fol. lineata.

12. *rosea*, caul. volubili tereti, fol. ovato-lanceolatis, umb. 18-radiata, petal. interiorib. lineis nigris maculatis. Fl. Per. l. c. Cum priore. Pet. rosea. Fol. subtus pubescentia. T.

13. *crocea*, caul. volub. tereti, fol. lineari - lanceolatis subtus pubescentibus, umb. multiflora, petal. aequalib. croceis. Fl. Per. l. c. Fol. sparsa, acutissima, basi contorta. Hab. in Peru.

14. *bracteata*, caul. volubili, fol. lanceolata-linearibus, umb. 5-partita sub 12-flora, petal. interioribus spatulatis. Fl. Per. Petal. purpurea, interiora viridia, basi lutea, marg. punct. violacea.

15. *fimbriata*, caul. volubili, fol. lanceolatis angustis, umb. multiflora, petal. interiorib. fimbriatis. Fl. Per. p. 61. Cor. luteo-croceo variegata. Petioli contorti. T.

16. *latifolia*, caul. volubili, fol. oblongo-ovatis acuminatis, umb. multiradiata, pedunc. 1-3-floris, cor. rubro - viridi. Fl. Per. p. 64. In Peruv. collibus, Lomas dictis. Pet. interiora punct. et lineis violaceis variegata. T.

17. *tomentosa*, caul. subvolubili, fol. lanceolatis margine reflexis subtus tomentosis, umb. multiflora; radiis bifloris. Fl. Per. p. 62. t. 292. In Andium nemorib. locis frigidis et pluviosis. Pet. exteriora coccinea, interiora lutescentia. Sem. in pulpa dulci. eduli, nidulantur. Affinis A. *ovatae*. Cav. T.

\* \* \* Caul. scandente.

18. *setacea*, caul. scandente, fol. lanceolatis, umb. simpliciter radiis numerosis, bracteol. setaceis, cor. parva. Flor. Per. p. 62. t. 292. Hab. in Peru. Andium nemorib. Pet. exteriora punicea, interiora spathuleta lutea. T.

19. *denticulata*, caul. scandente, fol. lanceolato-ovatis acutissimis, margine repando-denticulatis, flor. umbellato-corymbosis. Flor. Per. l. c. t. 293. Cum priore in montib. altissimis, pluviosis. Cor. rubro-lutescens. T.

20. *purpurea*, caul. scandente, fol. lanceolatis angulatis subtus pubescentibus, flor. corymbosis subumbellatisque purpureis. Fl. Per. p. 61. t. 293. Hab. versus Pillae vicum. Caps. subturbinata, trigono-alata.

21. *macrocarpa*, caul. scandente, fol. oblongo-lanceolatis, umb. multiradiata, pedunc. bifloris longissimis. l. c. Cum priore. Cor. rubro-lutescens. Caps. nunc. Island. magnitudine intus pulposa. An diversa ab A. *ovata*. Cav. ?

22. *cordifolia*, caul. scandente, fol. cordatis acuminatis, umb. sexradiata, pedunc. 2-3-floris. Flor. Per. p. 64. t. 250. Cor. rubicundo-lutescens.

23. *formosa*, caul. scandente, fol. lanceolatis longis, umb. semiglobosa, flor. numerosis puniceo-luteis punctatis. Flor. Per. p. 64. t. 266. Hab. in Andium nemorib. ad Munna.

Obs. *Alstroemeria pulchella et formosa*. Lin. suppl. pl. p. 206. et 207, heic sunt omissae, cum forte cum una alterave specie ex tam multis enumeratis, quarum ampla descriptio in Flor. Peruviana extat (ubi vero earum nulla mentio est facta) conveniant.

838. *HEMEROCALLIS*. Cor. campanulata: tubo cylindrico. Stam. declinata. *Stigma* parvulum, simplex, villosulum.

\* Fol. oblongis sublanceolatis.

1. *flava*, fol. lato linearibus cernatis,

petalis planis acutis, nervisque petalorum iudivisis. Willd. Sp. II. p. 197. Jacq. hort. t. 137. Les Liliacées. t. 15. Hab. in Helvetiæ, Sibiriac, Hungariæ campis. Cor. flava.

2. *graminea*, fol. angusto-linearibus carinatis gramineis, petal. tribus interioribus majoribus undulatis. Andrew. t. 244. Hab. in Europa septentrionali. Media inter priorem et sequentem speciem, cum qua flore fere conveniunt. Cor. extus brunnea, odorata. A. †

3. *fulva*, fol. linearibus (lanceolatis) carinatis, petalis tribus interioribus obtusis undulatis, nervisque petalorum exterioribus ramosis. Willd. Les Liliacées. t. 16. Hab. in China. Flor. e longinquo Liliium bulbiferum s. croceum referunt. †

4. *lancifolia*, fol. oblongis utrinque attenuatis. Willd. Hab. in Japonia. †

\*\* *Fol. latis subcordatis petiolatis.*

5. *alba*, fol. ovato-cordatis, cor. tubo longo, bract. pedicellis longioribus. Andrew. t. 194. H. *japonica*. Thunb. Willd. p. 198. Les Liliacées. t. 3. Hab. in Japonia. Cor. Candida, odorata. Flor. Jul., Aug. in caldariis.

Obs. Secundum mentem clar. Andrew l. c. ut synonyma huc referenda sunt Liliium longiflorum et L. japonicum. Willd. L. caudilium. Thunb. Fl. japon.?

6. *caerulea*, fol. cordatis, membranaceis brevibus, cor. limbo campanulato. H. caerulea. Vent. Malm. t. 18. Andrew. t. 6. Hab. in China. An huc Liliium cordifolium. Willd. Vid. Andrew. Obs. l. c.

839. ACORUS. *Spadix* cylindricus, tectus flosculis. *Cor.* 6-petala, nuda. *Stylus* o. *Caps.* 3-locularis.

1. *Calamus*, scapi mucrone longissimo foliaceo. Ait. Kew. 1. p. 474. Moris. s. 8. t. 13. f. 4. (P. A. asiaticus, radice tenuiore. Herm. lugth. g. Rumph. amb. 5. t. 72. f. 1. Rheed. 11. t. 60. Habitu in Europæ, et Indiæ fossis. †

2. *gramineus*, scapi mucrone spadicem vix excedente. Ait. Kew. 1. p. 474. Hab. in China. Vere flor. profert præcedentis similis. †

840. ORONTIUM. *Spadix* cylindricus, tectus flosculis. *Cor.* 6-

petala, nuda. *Stylus* nullus. *Folliculi* 1-spermi.

1. *aquaticum*, fol. lanceolato-ovatis venosis. Thunb. jap. 144. Banks. Ic. Kaempf. Lam. ill. gen. t. 251. Hab. in Virginiae, Canadæ paludibus, scaturiginibus. †

2. *japonicum*, fol. ensiformibus venosis. Thunb. jap. 144. Banks. Ic. Kaempf. t. 12. Hab. in Japonia. Fol. sunt nervosa nec venosa. Willd. †

841. TACCA. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 6-petala, calyci inserta, antherifera. *Stigma* stellatum. *Bacca* sicca, 6-angularis, polysperma, infera.

1. *pinnatifida*. Lin. suppl. p. 251. Lam. ill. t. 232. Leontice Leontopetaloides, fol. simplicibus tripartito-multifidis, cor. monopetalis calyculatis. L. Sp. pl. p. 448. Tacca littorea. Rumph. amb. 5. t. 114. Hab. in India orientali et Tahiti. Fol. similis Dracontio polyphylo. †

842. CORYPHA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* globosum, magnum, osseum.

1. *umbrellifera*, frondibus pinnato-palmatis plicatis, petiolis ciliato-spinosis, spadice erecta. Lam. enc. 2. p. 130. Rheed. 3. t. 1-2. Hab. in India. Altitudine 60-70-pedum, et vix floret ante 30. s. 40 ætatis annum, ubi tunc perit. Fol. amplissimum.

2. *rotundifolia*, frondib. orbiculatis palmato-peltatis radiatim plicatilibus petiolis ciliato-spinosis, spadice pendulo. Lam. enc. 2. p. 131. C. Saribus. Gmel. Syst. II. p. 569. Saribus Rumph. 1. t. 8. Houttuyn. t. 2. f. 1. 2. Hab. in Moluccis. †

Obs. C. minor, frondib. palmatis flabelliformibus plicatis subtrifidis, filis interjectis paucis, stipitibus inermibus. Jacq. hort. ut peculiare genus nunc sub nomine *Sabal* a coryphis separatur.

843. LICUALA. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-partita. *Nect.* truncatum sertiforme. *Drupa* 1-sperma.

1. *spinosa*. Willd. Sp. II. p. 201. Thunb. N. pl. Gen. 3. p. 70. Rumph. 1. p. 43. t. 9. Hab. in Moluccis. Frons palmata, laciniiis pincaribus apice truncatis dentatis. W. †

844. THRINAX. *Cal.* 6-dentatus.

*Cor. o. Stigma* infundibuliforme, obliquum. *Bacca* monosperma.

1. *parviflora*. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 614. Willd. p. 202. *Corypha* palmacea, fol. flabelliformibus cum appendiculo ad imum, petiolis tenuioribus flexilibus compressis. Brown. jam. 190. Hab. in maritimis et aridis Jamaicae, Hispaniolae. Palma 10-20 pedalis. h

845. *CALAMUS*. *Cal.* 6-phyllus.

*Cor. o. Bacca* exarida, 1-sperma, retrorsum imbricata.

1. *Rotang*, caudice densissime aculeato, aculeis erectis, spadice erecto. Willd. Sp. II. p. 202. C. petraeus. Loureiro coch. p. 260. Rhced. t. 64. 65. Rumph. amb. 5. p. 88. t. 151. Hab. in Indiae sylvis juxta fluentia. h

2. *verus*, frondibus longissimis, spinis confertis longis, spadice brevi, corolla tripetala. Loureiro. Flor. coch. p. 261. Rumph. 5. t. 54. Hab. ad fluviorum ripas Indiae orientalis. Caudex solitarius. Rumph. l. c. h

3. *Draco*, aculeis caudicis adpressis, frondium patentibus, spadice erecto. Willd. p. 203. Rumph. 5. t. 58. f. 1. Hab. in India orientali. h

4. *niger*, aculeis candidis et frondium horizontalibus, spadice coarctato pendulo. Rumph. 5. p. 101. t. 52. In littoribus Indiae orientalis. Aculei fusco-nigricantes. h

5. *viminalis*, aculeis caudicis patentibus, frondium distantibus reflexis, spadice nutante. Rumph. 5. t. 55. Hab. in sylvis humentibus Javae et Celebis. h

6. *albus*, aculeis caudicis reflexis, spadice divaricato recto. C. rudentum, caule longissimo aequali, spinis inversis. Lour. coch. p. 260. Rumph. 5. p. 122. t. 52. Vulgatissima species.

7. *equestris*, aculeis candidis erecto-patentibus, frondium uncinatis, foliolis ellipticis utrinque attenuatis, spadice erecto. Willd. p. 204. Rumph. 5. t. 56. et t. 57. f. 1. Hab. in humidis saxosis Amboinae. h

8. *Zalacca*, aculeis patentibus, spadice radicali. W. Gaert. de fr. et sem. 2. p. 267. t. 139. f. 2. Hab. in sylvis humentibus Javae orientalis, Balegae et Bandae. Fruct. trispermus.

846. *IUNCUS*. *Cal.* 6-phyllus, persistens. *Cor. o. Stigmata* 3. *Caps.*

1-locularis, 3-valvis. *Sem.* plurima.

\* *Culmis nudis*, (*panicula ut plurimum late. ali.*)

1. *acutus*, culmo nudo tereti mucronata, panicula terminali, involucri diphyllo spinoso, caps. subrotundis mucronatis. Smith. brit. 1. p. 324. Barel. ic. t. 203. f. 2. Hab. in arenosis maritimis. Caps. triquetrum-subrotunda.

2. *maritimus*, culm. nudo tereti, panic. terminali prolifera, involucr. diphyllo spinoso erecto, caps. oblongis. Smith. l. c. p. 375. Moris. s. 8. t. 10. f. 15. Cum priore. Caps. prismatica, oblonga.

3. *conglomeratus*, culmo nudo stricto, panicula laterali coarctato-capitata, flor. triandris. Leers. herb. t. 13. f. 1. Fl. dan. t. 1094. Hab. in Europae uliginosis, in pascuis, etc.

4. *effusus*, culmo nudo stricto, panicula laterali, flor. oblongis, caps. obtusa. Flor. dan. t. 1096. Leers. t. 13. f. 2. Hab. in Europae et Americae uliginosis. ¶

5. *glaucus*, culmo nudo glauco apice inflexo, panicula laterali effusa, ramis elongatis, flor. et caps. acuminatis. Willd. p. 206. Flor. dan. t. 1159. Engl. bot. t. 665. Hab. in udibus. ¶

6. *inflexus*, culmo nudo, apice membranaceo incurvo, panicula laterali. Moris. s. 8. t. 10. f. 25. Barr. ic. 204. Hab. in Europa australi. Planta obscura. ¶ †

7. *rigidus*, culm. nudo superne incurvo pungente, panic. laterali elongata, pedunc. compressis nodosis, cal. mucronato. Desf. Atl. 1. p. 312. In arenis ad maris littora. Caps. ? Fol. ?

8. *arcticus*, culmo nudo stricto, umbella laterali, pedunc. multifloris, flor. sessilibus. Willd. p. 206. Fl. dan. t. 1095. Hab. in alpinis Norvegiae, Lapponiae. J. Jacquini similimus. ¶

9. *filiformis*, culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali, bracteata subim-plici, caps. subrotundis. Smith. brit. 1. p. 372. Pluck. Phyt. t. 40. f. 8. In Europae uliginoso-podulosis turfosis, alpinis. Habitat praecedentium sed minor. Rad. valde repens. Sm.

10. *setaceus*, culmo nudo filiformi nutante, umbel. laterali composita pauciflora, pedunc. multifloris, petal. subulatis. Rostock de Junco. Berol. 1801. p. 13. t. 1.

f. 2. Hab. in Pennsylvania. Affinis priori, sed pedunc. ramosis, etc. differt.  $\overline{\text{L}}$

11. *capillaceus*, culmo nudo capillaceo, panicula laterali brevissima, caps. calyce majoribus. Lam. enc. 3. p. 266. Hab. in Brasilia prope Monte-Video.

12. *grandiflorus*, culmo nudo unifloro, fol. teretibus, foliolis calycinis linearisubulatis longissimis inaequalibus. Lam. enc. 3. p. 266. Lin. suppl. 209. Forst. in Comment. Goett. 9. p. 27. t. 5. Hab. in freto Magellanico inque Terra del Fuego. Flos culmum terminans, unicus, magnus.

13. *magellanicus*, culmo nudo unifloro, fol. planiusculis angustissimis culmo longioribus, flore laterali. Lam. l. c. 3. p. 266. Hab. in freto Magellanico. Culmi filiformes angulosi nudi. Germen subrotundum atrum.

14. *rubens*, culmo nudo basi vaginis vestito, involucri spathaceo multifloro terminali. Lam. p. 266. Hab. in Brasilia prope Monte-Video. Capitula sunt e flor. binis vel tribus composita, et squamis totidem longitudine fere florum munita. L.

15. *trifidus*, culmo nudo, fol. floribusque tribus terminalibus. L. Flor. dan. t. 107. Hab. in alpinis. Fol. longa, stricta.

16. *monanthos*, culm. folioso 1-floro, fol. subulatis. Hoffm. germ. 1. p. 165. Jacq. obs. n.º 33. s. 4. f. 1.

17. *squarrosus*, culmo nudo, fol. setaceis subulatis, capitulis terminalibus glomeratis aphyllis. Flor. dan. t. 430. Hab. in arenosis, uliginosis. Fol. rigida, squarrosa.  $\overline{\text{L}}$

18. *cymosus*, culm. nudo subanguloso, fol. planis, panic. terminali cymosa, involucri bivalvi. Lam. enc. 3. p. 267. Hab. ad Cap. b. spei. Culm. 8-9-uncialis. Panic. subumbelliformis.

19. *pygmaeus (pallens)*, caespitosus, fol. linearis-setaceis, capitul. pedunculatis: primario sessili, flosc. linearibus obtusis. Thuill. Flor. Paris. Hab. in uliginosis. Culm. nudus, basi ruber. Involucri. 1-2-phyllum, alterum longius.

20. *capensis*, culmo aphylo compresso, capitulis sessilibus pedunculatisque. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{L}}$

21. *marginatus*, fol. planis glabris, corymbo terminali simpliciter prolifero, capit. sub-10-floris, petal. caps. obtusam aequantibus. Rostk. Junc. p. 30. t. 2. f. 3. Hab. in Pennsylvania.

22. *nodosus*, fol. nodoso-articulatis teretibus, corymbo simplice, capitul. globosis, caps. acuminatis corol. longioribus. Rostk. l. c. t. 2. f. 2. Hab. in America boreali.

23. *polycephalus*, fol. nodoso-articulatis, capit. globosis multifloris subpaniculatis, flor. linearib. 3-andris. Michaux. t. p. 192. Var. fol. crassioribus compressis et (*tenuifolius*) fol. subfiliformibus. Hab. in Georgia et Carolina.

24. *alpinus*, humilis, fol. articulatis, panic. simplicissimam subaequantibus, capit. laterali terminalique subpedunculata. Villars. Delph. 2. p. 233. Hall. helv. n.º 1321. J. articulatus.  $\beta$ . Willd. p. 217. Hab. in Helv. et Delphin. alpinis, cum quoque legi in uliginosis in Monte aureo (Mont'or ea Auvergne). Flor. nigricant. Culm. 5-6-pollicaris. Caps. obtusae.  $\overline{\text{L}}$

#### \*\* Culmis foliosis.

25. *punctorius*, culmo nudo tereti, folio tereti articulo mucronato, panicula glomerata. Lin. suppl. 208. Conf. Lam. l. c. p. 269. Affinitas J. articulati sed omnia robustiora. L.

26. *aquaticus*, culmo ascendente, fol. nodoso-articulatis compresso-teretiusculis, panicula composita, petal. (foliolis calycinis) aequalib. obtusiusculis. Willd. p. 217. (J. articulatus.) I. *aquaticus*. Roth. germ. p. 403. I. *obtusiflorus*, fol. nodoso-articulatis, flor. obtusis. Hoffm. germ. p. 166. Hab. in Europae aquis.  $\overline{\text{L}}$

27. *sylvaticus*, culmo erecto, fol. nodoso-articulatis teretibus, panicula supradecomposita, petalis aristatis interioribus longioribus. Willd. I. *acutiflorus*, fol. nodoso-articulatis, flor. acutis. Hoffm.  $\beta$ . *utriculosa*, flor. in fol. excrecentibus. Gramen junceum folio articulo cum utriculis. Bauh. prod. 12. Hab. in nemoribus humidis, in uliginosis.  $\overline{\text{L}}$

28. *verticillatus*, culmo decumbente radicante, fol. setaceis, flor. glomeratis verticillatis, glomerulis foliosis. Willd. p. 212. I. *uliginosus*. Roth. Flor. dan. t. 817.  $\beta$ . *autans*, caul. longiss. radicante. Lam. enc. 3. p. 26. Mich. p. 191. J. *stolonifer*. Wobleben. Flor. Hallens. suppl. p. 13. c. ic. Wulf. in Jacq. Collect. 3. p. 31.  $\gamma$ . *supinus*, culmo erecto humiliore, dichotomo, fol. canaliculatis filiformibus, capitulo triphylo. Moench. bass. Fl. dan. t. 1099. Hab. in Europa et America boreali, locis uliginosis et pallidibus,  $\gamma$  in siccioribus.  $\overline{\text{L}}$

29. *acuminatus*,

27. *acuminatus*, culm. folioso erecto, fol. subnodoso-articulatis, panic. terminali composita: glomerulis pedunculatis sessilibusque, flor. acuminatis triandris. Michaux. Flor. 1. p. 192. Hab. in Carol. inferiore. Facie J. articulati.

— 28. *Tenageja (Vaillantii)*, culmo ramoso paniculato, flor. solitariis sessilibus, petalis ovato-oblongis, capsula subglobosa. Lin. suppl. p. 208. Flor. dan. t. 1160. Vaill. par. t. 20. f. 1. J. Vaillantii. Thuill. par. Hab. in paludosis exsiccatis. ☉

29. *aristatus*, rad. bulbosa, culm. folioso erecto compresso, fol. angustis subcanaliculatis, panic. composita, flor. triandris, cal. bracteisque aristatis. Michaux. l. c. Hab. in Georg. et Carolina. Facie J. bulbosi. Petala exteriora aristata.

30. *bulbosus*, culmo subcompresso indiviso, fol. linearibus canaliculatis, corymbo terminali, petal. obtusis capsula subrotunda obtusa brevioribus. Willd. p. 213. l. fol. linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. L. Flor. dan. t. 431. l. compressus. Jacq. Moris. s. 8. t. 9. f. 11. Hab. in pascuis, humidis ad vias. Rad. bulbosa? ☿

31. *multiflorus*, culm. inferne nodoso folioso, fol. teretibus, panic. terminali elongata erecta, pedunc. inaequalibus multifariam decompositis fasciculatis. Desf. Atl. 1. p. 313. t. 91. Hab. in Barbariae paludibus. Flor. J. effusi s. glauci. D.

32. *foliosus*, culm. nodoso ramoso folioso, fol. canaliculatis, panic. terminali erecta, lacin. cal. aciformibus. Desf. p. 313. t. 92. Hab. in Algeriae paludibus. Flor. J. buiformi.

33. *tenuis*, culm. folioso simplice teretiusculo, fol. canaliculatis, corymbo terminali dichotomo bract. breviori, caps. oblonga obtusa petal. breviori. Rostk. lunc. p. 24. t. 1. f. 3. J. bicornis, fol. radicalib. subsetaceis, culm. nudo, involuer. setaceo a-phylo, etc. Michaux. 1. p. 191. Hab. in Georgia Carolina. Cal. acutissimis. M.

34. *bufonius*, culmo dichotomo, fol. angulatis, flor. oblongis solitariis sessilibus. L. Flor. dan. t. 1098. Hab. in inundatis, ad vias.

35. *cephalotes*, culmo aphylo tereti, fol. canaliculatis, capitulis subumbellatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cep. b. spei. †

36. *stygicus*, fol. setaceis depressiusculis, pedunculis geminis terminalibus, glumis solitariis subbifloris. L. Smith. l. c. p. 112. f. 1.

p. 55. Hab. in Succ. paludibus. Culmi epithamei, simplices. Folia altitudine culmi, erecta. Petala exteriora purpurascens, interiora pallida. Stigm. reflexa. L.

37. *triceps*, fol. canaliculatis basi ventricosis, capitulis tribus multifloris involucri terminalibus. Rostkow. p. 48. t. 1. f. 4. Hab. in Sibiria. Involucr. 2-valve, capitul. quodlibet basi cingens, illoque 3-plo longius. Petal. castanea. R.

38. *castaneus*, fol. planis amplexicaulis, capit. terminali subgeminis multifloro basi foliato, bract. acutis. Smith. brit. 1. p. 383. Hab. in Scotiae alpib. paludosis. Rad. laxo repens, sarmentosa.

39. *Jacquini*, culm. 1-folio, fol. canaliculatis, capit. terminali solitario multifloro. Rostk. l. c. p. 49. Willd. p. 215. Jacq. Flor. austr. 3. t. 221. J. nigricans. Lam. Cresc. in alpibus. Capitul. splendeus, nigricans.

40. *biglumis*, folio subulato, gluma biflora terminali. L. Flor. dan. t. 120. Hab. in alpibus helv. et scoticis. ☿

41. *triglumis*, fol. planis, gluma triflora terminali. L. Flor. dan. t. 132. Hab. in alpibus. ☿

42. *pilosus*, fol. planis pilosis, corymbo subsimplici, pedunc. unifloris nutantibus, petal. capsula brevioribus ovatis acutis. Willd. p. 289. Curt. Lond. ic. Leers. herb. t. 13. f. 19.


β. *vernalis*, fol. planis pilosis, pedunc. simplicibus, inferioribus reflexis. Hoffm. germ. p. 168. Hab. in sylvis. Vere. ☿

43. *maximus* (nemorosus), fol. planis pilosis, corymbo decomposito, pedunculis elongatis divaricatis subtrifloris, petal. aristatis longitudine capsulae. Willd. p. 117. l. *maximus*, fol. planis pilosis. Retz. Fl. dan. 441. l. *maximus*. Roth. germ. l. p. 157. l. latifolius. Wulf. in Jacq. Coll. 3. p. 59. l. sylvaticus. Curt. lond. ic. Smith. brit. p. 385. Hab. in montosis sylvaticis. ☿

44. *spadiceus*, fol. planis glabris, vaginis pilosis, corymbo decomposito divaricato, pedunc. subquadrifloris, petal. mucronatis capsula acuta brevioribus. Willd. p. 218. Villars. delph. 2. p. 236. t. 6. Habit. in alpibus et montosis. ☿

45. *parviflorus*, fol. planis vaginisque glabris, corymbo decomposito erecto, pedunc. unifloris, calyc. foliolis acutis muticis. Willd. p. 219. Rostkow. de Junc. p. 26. t. 1. f. 1. Ehrh. Beit. 6. p. 139. Hab. in Lapponiae. ☿

B b



46. *glabratus*, fol. planis culmoque glaberrimis, corymbo decomposito divaricato, pedunc. subunifloris, cal. ciliatis, petal. acuminatis. Rostko. l. c. p. 28. Habit. in alpb. salisburgensib. Simil. J. maximo, sed fol. glabris et pedunc. plerumque unifloris diversus. R.

47. *luteus*, fol. planis, vaginisque glabris, corymbo composito conferto, pedunculis multifloris, petal. acutiusculis splendentib. Willd. Allion. ped. n°. 2085. Villars. l. c. Hab. in alpbibus.

48. *serratus*, fol. ensiformibus planis serratis sultus canis, paniculae vaginis subulatis perfoliatis. Lin. suppl. p. 208. Hab. ad Cap. b. speci. Panic. conglomerata.

49. *albidus*, fol. planis pilosis, corymbo decomposito, pedunc. subquadri-floris, calyc. foliolis mucronatis, interioribus paulo longioribus, radice fibrosa. Willd. Hoffm. germ. l. angustifolius. Wulff. in Jacq. Collect. 3. p. 56. l. niveus. Leers. herb. t. 13. f. 6. et plurium autorum. Hab. in nemorosis.

50. *niveus*, fol. planis pilosis, corymbo composito, pedunc. subquinq. floris, calyc. foliolis acutis, interioribus duplo longioribus, radice repente. Willd. p. 770. Scheuch. gram. 320. t. 7. f. 7. Moris. s. 8. t. 9. f. 39. Hab. in alpbibus et montosis sylvaticis. Flor. majores quam in priore, elegantius nivei.

\* *brevifolius*, fol. linearibus canaliculatis pilosis, corymb. composito glomerato, fol. subaequali, capit. subdecemfloris, petal. obtusis: interioribus duplo longioribus. Rostk p. 35. Hab. in montib. Lusitaniae. Petal. alba, splendentia. An var. prioris?

51. *campestris*, fol. planis pilosis, spicis pedunc. ovatis subcernuis; intermedia sessili, calycinis foliolis mucronatis capsula obtusa longioribus. Willd. p. 221. Leers. t. 13. f. 5. Hab. in Europae pascuis siccioribus. ¶

52. *pediformis*, fol. plano-carinatis pilosis, flor. oblongis, spica labata nutante. Villars. Dauph. 2. p. 238. Hab. in montibus Delphinatus et Redemonte. Balbis. Caul., in meo specimine, altus, nudus.

53. *congestus*, pilosus, culmo stricto erecto, capitul. congestis, sessilibus, cal. ovatis aristato-acuminatis. Thuill. Paris. p. 179. Junc. villosus, panic. compacta. Vaill. bot. p. 119? Hab. in sylvaticis, subhumida.

54. *erectus*, vagin. pilosis, spicis ovar. inaequaliter pedunculatis strictis, petal. caps. dimidio fere longioribus. J. multiflorus. Hoffm. germ. 1. p. 169. J. intermedius. Thuill. Hab. in sylvaticis. Spic. fusciscentes, intermediae breviter pedunculatae.

55. *sudeticus* (nigricans), fol. planis glabris vaginis pilosis, spicis pedunculatis umbellatis, intermedia sessili, petalis mucronatis longitudine capsulae. Willd. l. spicatus. Krock. siles. n°. 559. t. 52. Hab. in sudetis Silesiae summis humidis. Spic. subsecundae nigrae. ¶ +

56. *spicatus*, fol. planis, spica racemosa nutante, basi composita, caps. acutis. Smith. brit. 1. p. 386. Flor. lapp. t. 10. f. 4. Flor. dan. t. 270. l. alpinus latifolius, panic. racemosa nigricante pedicula. Till. pis. gr. Hab. in Lapp. et Scetiae alpbibus. ¶ +

847. APHYLLANTHES. Cal. persistens, glumaceus imbricatus. Cor. 6-partita limbo patente. Caps. supera, 3-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *monspeliensis*. Lin. Lam. ill. gen. t. 252. Moris. s. 5. t. 25. f. 12. Desf. Atl. 1. p. 285. Hab. in Europ. australi et Barbar. collib. arenosis. Facie Junci. Caul. fere pedalis, nudus.

848. LEONTICE. Cal. 6-phyllus, deciduus. Cor. 6-petala. Nect. 6-phyllum, unguibus corollae insidens, limbo patens.

1. *Chrysogonum*, fol. pinnatis: foliol. verticillatis lanceolatis acutis tricuspidatis. Willd. Sp. II. p. 148. L. fol. pinnatis: petiolo communi simplicibus. L. Hort. cliff. 122. Moris. s. 3. t. 15. f. 7. Habit. inter Graecias segetes. ¶

2. *Leontopetalum*, fol. radicalibus bitermatis, caulinis ternatis, fructu ovato. Willd. L. fol. decompositis: petiolo communi trifido. L. Moris. s. 3. t. 15. f. 6. Hab. in Apulia, Hetruria, Creta. ¶

3. *vesicaria*, fol. hibernatis, fructibus obovatis inflatis. Willd. Pall. it. 3. app. n°. 84. t. V. f. 2. Hab. in Sibiria. Vere.

4. *altaica*, fol. radicalibus decompositis: caulinis quinatis, foliolis lanceolatis. Willd. p. 149. Pall. in Act. Petrop. 1779. p. 257. t. 8. f. 1-3. Hab. in montib. Altaicis. Bract. ellipticae. ¶

839. CAULOPHYLLUM. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-petala, cal. opposita. *Anthera* localis margine dehiscens. *Drupa* 1-sperma.

1. *Thalictroides*. Michaux. Flor. 1. p. 205. t. 21. Leontice. Willd. Sp. II. p. 148. n. 5. Hab. in montosis amer. septentr. Subpedale. Epimedio sub simile. Fol. terna, pinnato-lobata. Flor. paniculati.

850. DIPHYLLIFIA. *Cal.* 3-phyllus, deciduus. *Cor.* 6 petala, cal. opposita. *Anthera* membrana a basi ad apicem solubili dehiscens. *Bacca* 1-locularis. *Semina* 2-3, subrotunda.

1. *cymosa*, glabra, fol. subpalmatis, anguloso-serratis, cyma multiflora. Mich. l. c. p. 203. t. 19-20. Hab. in rivulis montium Carol. septentrion. Fl. Majo. Statura Podophylli pelati.

851. BERBERIS. *Cal.* 6-phyllus. *Pet.* 6, ad ungues glandulis 2. *Stylus* o. *Stigm.* umbilicatum. *Bacca* 1-locularis, 2-4-sperma. (Filam. primo glandulis adhaerentia, dein elastice eriguntur.

1. *vulgaris*, racemis simplicibus pendulis, fol. obovatis ciliato-dentatis. Willd. Sp. II. p. 227. Blackw. t. 163. (p. *asperma*, baccis aspermis. Canadensis aculeis triplicibus, serraturis foliorum remotis. Hab. in Europae sylvis, Oriente, Libano, atque in America boreali. h

2. *ilicifolia*, racemis simplicibus corymbosis, fol. obovatis coriaceis spinoso-dentatis. Willd. p. 228. Lin. suppl. 210. Hab. in Terra del Fuego in rupium fissuris. h

3. *microphylla*, pedunc. trifloris, fol. obovatis integerrimis submucronatis, spinis trifurcis. Forst. in Comm. goett. 9. p. 29. Cum priore.

4. *monosperma*, racem. multifloris nantibus, fol. ovalibus obovatis mucronatis, acul. trifidis. Flor. Peruv. 3. p. 52. Hab. in Tarmae praeruptis. *Bacca* nigra 1-sperma, sem. orbiculatum. h

5. *flexuosa*, racem. aggregatis inaequalibus paucifloris, fol. obovatis inermibus, aculeis ternis coalitis. Flor. Peruv. l. c. t. 281. f. a. Hab. in Andium praeruptis calidis. Bac. nigra, 4-5-sperma. h

6. *lutea*, pedunc. pluribus aggregatis 1-floris, fol. obovatis mucronatis et subtricuspidatis. Flor. Per. 3. p. 51. t. 280. Cum priore. Caul. rimosus, cinereo-lutescens. Lign. luteum, amarum. Flor. plures 5-andri.

7. *virgata*, flor. subternis 5-andris, fol. parvis obovato-cuneiformibus mucronatis, acul. tricuspidatis parvis. Flor. Per. l. c. t. 281. f. b. In Andium nemorib. Bac. ovali-oblonga.

8. *latifolia*, pedunc. 3-6-nis, flor. hexandris, fol. oblongo-obovatis mucrone minimo, acul. parvis tricuspidatis. Flor. Per. p. 52. t. 282. Bac. atra, 3-4-sperma, stigm. pedicellato rostrata.

9. *tomentosa*, pedunc. ternis 1-floris inaequalibus, fol. ovalibus dentato-spinosis mucronatisque. Flor. Per. l. c. t. 282. Ad Conceptionis urbis tractus. Bacc. 2-3-sperma, rostrata.

10. *cretica*, pedunc. subbifloris, fol. lanceolato-obovatis integerrimis submucronatis. Willd. p. 229. Lycium creticum. Alp. exot. 21. t. 20. Hab. in Creta.

11. *sibirica*, pedunc. unifloris solitariis, fol. obovatis ciliato-dentatis. Willd. arb. 35. Pall. ross. 2. p. 41. t. 67. Hab. in alpih. Altaicis, Sibiriae, h

12. *ruscifolia*, fol. lanceolatis coriaceis? utrinque unidentatis integrisque, flor. racemosis. Ex Herb. Juss. Lam. ill. gen. t. 223. f. 2. Hab. in Montevideo.

13. *buxifolia*, fol. inermibus ovato-lanceolatis ovatisque integerrimis pedicel. 1-floris. Lam. ill. t. 251. f. 3. Ex Herb. Juss. Cum priore. Commers. Fol. parvula, venosa.

14. *empetrifolia*, fol. linearibus angustis, flor. solitariis. Juss. Lam. l. c. f. 4. Hab. ad fretum magellanicum. Fol. juniperiformibus facile distinguenda.

15. *inermis*, fol. ramisque inermibus, flor. solitariis. Juss. Hab. in Fret. Magell. Pedicelli sublongi.

852. PRINOS. *Cal.* 6-fidus. *Cor.* 1-petala, rotata. *Bacca* 6-sperma.

1. *verticillatus*, fol. obovato-lanceolatis acuminatis duplicato-serratis, venis subtus pilosiusculis. Willd. Sp. II. p. 225. P. Gronovii. Michaux. Flor. l. p. 236, qui hoc genus ad Dioeciam amandavit. Hab. in Virginiae paludibus. h

b h 2

2. *montanus*, fol. ovatis serratis utrinque nitidis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 622. Hab. in fruticetis montium Jamaicae. h

3. *dioicus*, fol. oblongo-ovatis subserratis glabris coriaceis, pedunc. axillaribus subunifloris, flor. dioicis tetrandris Vahl. eclog. 2. p. 25. t. 14. Habit. in insula Montserrat. h

4. *nitidus*, fol. oblongo-ovatis serratis nitidis membranaceis, pedunc. axillaribus unifloris, flor. tetrandris. Vahl. eclog. 2. p. 26. Cum. priore.

5? *glaber*, fol. cuneato-lanceolatis obtusiusculis glabris apice serratis. Ait. Kew. 1. p. 478. Conf. Michaux. 2. p. 236. Hab. in Canada. Arbor. Pedunc. uniflori, axillares. Cal. et Cor. ut in precedentibus. Willd. p. 226. h

6. *lucidus*, fol. ellipticis acuminatis laevibus apice subserratis. Ait. Kew. 1. p. 478. Hab. . . . h

7. *Sideroxyloides*, fol. subrotundis integerrimis. Swartz. prod. 59. Fl. ind. occ. 1. p. 624. Hab. in ins. Caribaeis. h

8. *ambiguus*, fol. ovalibus utrinque acuminatis, flor. quadrifidis: masculis ad imos ramulos congestis, foemininis solitariis. Michaux. 2. p. 236. An Cassine caroliniana. Walt.? Hab. in Carolina.

853. *COSSINIA*. Cal. inferus, 5-partitus. Cor. 4-s. 5-petala. Caps. 3-locul. apice dehiscens, loculis subtrispermis. (Flor. paniculato-racemosi.)

1. *triphylla*, fol. ternatis subtus tomentosis: foliolis oblongis obtusis. Lam. enc. 2. p. 132. t. 256. et ill. gen. Cossignea. Willd. p. 226. Jussieu. Hab. in ins. Borbonia. h

2. *pinnata*, fol. pinnatis: foliol. quinis lanceolatis, subtus tomentosis. Lam. l. c. t. 256. Hab. in ins. Mauritii.

854. *NANDINA*. Cal. inferus, polyphyllus, imbricatus. Cor. 6-petala. Bacca exsucca, disperma.

1. *domestica*. Thunb. jap. 147. Lam. ill. t. 261. Banks. ic. Kaempf. t. 13. 13. Hab. in Japonia. Fol. composita, foliolis lanceolatis ternis. Panic. terminalis. h

855. *LINDERA*. Cal. o. Cor. 6-petala, infera. Stigm. 2. Caps. 2-locularis.

1. *umbellata*. Thunb. jap. 145. t. 27. Lam. ill. t. 263. Hab. in Japonia. Flor. subumbellati. h

856. *CAPURA*. Germen superum. Cal. o. Cor. 6-fida. Stam. intratubum. Stigma globosum. Bacca.

1. *purpurata*. L. Mant. 225. Habit. in India. Arbor ramis brachiatis. Fol. opposita, ova. a. Flor. axillares. L. h

857. *LORANTHUS*. Cal. o. s. margo brevis, concavus. Cor. 6-fida, revoluta, inferne agglutinata: lacin. lineari-spathulatis. Stam. ad apices petalorum. Bacca infera, 1-sperma, umbilicata s. cal. coronata. (Frutices parasitici. Cor. etiam 5-5-7-fida. Stam. 4-5.)

1. *Scurruia*, pedunc. unifloris congestis, fol. obovatis. L. Willd. Sp. II. p. 232. Roxb. Corom. n°. 140. Pet. gaz. t. 63. f. 8. Hab. in China. Flor. 4-andrii. h

2. *tetrapetalus*, flor. ad articulos quatuor verticillatis tetrapetalis, fol. oblongis oppositis subsessilibus. Lin. suppl. p. 221. Forst. prop. n°. 156. Hab. in N. Zeelandia. Fol. elliptica coriacea.

3. *glaucus*, pedunc. axillarib. unifloris, fol. ovatis glaucis. Thunb. prod. 58. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *biflorus*, fol. ovato-subrotundis, pedunc. axillaribus bifloris, cor. tubulosa arcuata. Lam. enc. 3. p. 600. Hab. in Ind. orientali.

5. *cuneifolius*, flor. axillarib. 1-3-nis, bract. cyathiformi 3-gona 3-dentata, fol. cuneiformib. acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 46. t. 256. In Peruviae vallibus. Cor. punicea. Bacc. nigra. h

6. *dichotomus*, pedunc. geminis dichotomus, bract. semicyathiformi, fol. 3-4-nis verticillatis oblongis. Flor. Peruv. p. 45. t. 274. In Peruv. Andium nemorib. Cor. inferne punicea, superne lutea.

7. *Buddleioides*, fol. ovatis, flor. congestis axillaribus quadrifidis, calyce truncato, fruct. turbatus. Lam. enc. 3. p. 600. Hab. in India. h



*Obs.* Inflorescentia simillima Buddlejæ diversifoliae, sed distinguitur a Buddleja germine infero, cor. tubo incurvo, et laciniis profunde divisis inaequalibus. Lam.

8. *nodosus*, fol. ovato-rotundatis, pedunc. axillaribus fasciculatis, cor. tubo longissimo, articulis notosis. Lam. enc. 3. p. 607. l. c. Hab. in Peru. Pedunc. in dichotomia caulis.

9. *clavatus*, fol. ovatis obtusis, flor. congestis lateralibus subsessilibus longe tubulosis. Lam. enc. 3. p. 572. Hab. in ins. Madagascar. h

10. *parvifolius*, pedunc. axillaribus trifidis, pedicellis unifloris, fol. ovatis integris. Swartz. Fl. ind. occid. t. p. 628. Hab. in montibus Jamaicae supra ramos arborum. h

11. *falcatus*, racem. paucifloris axillaribus, fol. linearibus obtusis lateraliter falcatis glaucis. Lin. suppl. p. 211. Hab. Madras in arboribus. Flor. falcati fulvi.

12. *uniflorus*, racemis simplicissimis longitudine foliorum, pedunc. unifloris elongatis, fol. obovato-obtusis mucronatis. Willd. p. 233. Jacq. amer. 98. t. 69. Ed. picta. t. 100. L. parviflorus. Lam. enc. 3. p. 595. Hab. in Domingo sylvaticis. h

13. *europaeus*, racem. simplicibus terminalibus, flor. dioicis. Jacq. Flor. aust. t. 30. Habit. in Austriae quercubus parasiticus et in Sibiria. Statura Visci albi. Flor. dioici. Bacca flavescens.

14. *acutifolius*, flor. racemosis, pedicell. 1-3-floris, bract. minima orbiculata, fol. lanceolatis acutissimis. Flor. Peruv. p. 48. t. 274. In Peruviae praeruptis calidis. Caul. ramosissimus. Bacca nigra.

15. *sarmentosus*, racem. brevibus, flor. ternis sessilibus, bract. ovatis, fol. oblongo-lanceolatis carinatis. Flor. Peruv. 49. t. 278. In Andium nemoribus. Petal. lutescentia. Bacc. viscosa, grisea.

16. *acuminatus*, racem. axillarib. bract. minimis concavis, fol. ovatis longe acuminatis. Flor. Per. l. c. Cresc. cum anteceden. cui affinis, sed differt: ram. non radicalibus, fol. subaveniis, et Stigm. capitato-peltato. l. c.

17. *retroflexus*, racem. compositis, flor. retroflexis subternis minimis, bract. foliisque ovatis. Flor. Peruv. p. 49. t. 279. Hab. cum prioribus. Caul. saepe punctatus. Rad. tortuosa, ferruginea.

18. *lanceolatus*, flor. racemosis hexandris, pedicel. 3-floris, bract. ovata reflexa, fol. lanceolato-oblongis. Flor. Peruv. 3. p. 47. t. 278. Hab. in Andium nemoribus. Cor. lutea.

19. *punctatus*, racem. longissimis, pedicellis subverticellatis trifloris, flor. 6-apdris, bract. obovata, fol. obovatis. Flor. Per. t. 277. Cum priore. Rami oppositi, saepe verticillato-terni.

20. *heterophyllus*, flor. racemosis 6-andris, pedicell. trifloris, bract. ovata scabra, fol. polymorphis. Flor. Per. p. 48. t. 273. Hab. in R. chilensis sylvis, praesertim supra Myrti species. Cor. albidopurpurens.

21. *longiflorus*, corymb. axillaribus, flor. pentandris nutantibus, fol. ovato-lanceolatis obtusis venosis. Willd. p. 235. Lam. enc. 3. p. 572. Hab. in Ind. orientali. h

22. *elasticus*, corymbis axillaribus, flor. pentandris nutantibus, fol. oblongis utrinque attenuatis nervosis. Willd. L. cor. junioribus medio fenestratis. Lam. l. c. Rheed. 10. t. 3. Cum priore, hab. in India orientali. h

23. *grandiflorus*, flor. corymboso-racemosis pentandris pendulis, bract. ovata-concava, fol. ovalibus subternis. Flor. Per. 3. p. 45. t. 273. Hab. in Peruv. Andium nemorib. Bac. caerulea.

24. *americanus*, racemis subramosis cymosis, flor. nutantibus, fol. ovatis difformibus. Swartz. obs. 132. Jacq. amer. 97. t. 67. Ed. picta. t. 98. Hab. in Amer. arbor. maritimis. h

25. *glaucus*, flor. racemoso-corymbosis 5-andris, bract. lanceolata, fol. ovato-lanceolatis. Flor. Per. t. 275. In Peruvia. Flor. secundi. Bac. atropurpurea.

26. *ellipticus*, flor. corymboso-umbellatis 7-andris, pedic. 3-floris, bract. ovata reflexa, fol. ellipticis. Flor. Per. 3. p. 47. t. 276. Cor. 7-petala, lutea.

27. *occidentalis*, racemis simplicibus, flor. irregularibus. L. Amoen. acad. 5. p. 396. Viscum laetiusculum et subrotundis foliis, flore purpureo. Sloan. jam. 168. hist. 2. p. 92. t. 200. f. 2. Hab. in Amer. arboribus. h

28. *tetrandrus*, flor. aggregato-umbellatis 4-andris, bract. 3-partita ciliata, fol. ovatis. Flor. Per. 3. p. 46. t. 275.

B b 3

Periclymenum, etc. Few. Obs. 2. pl. 45. Hab. in R. chilensis sylv. Adhibetur ad tingendum pulchro colore nigro. h

29. *verticillatus*, flor. aggregato-capitatis subverticillatis 6-andris, bract. ovatis, fol. ternis lanceolatis. Flor. Per. l. c. Cor. punicea semiquinquefid. Bac. purpureo-nigra.

30. *Loniceroides*, flor. aggregata capitatis, fol. ovato-lanceolatis petiolatis. Lin. Willd. p. 236. Rheede 7. t. 29. Periclymenum, etc. Pluck. alm. t. 212. Hab. in Asia. Fol. saepius 5-andri.

31. *pedunculatus*, fol. ovato-cordatis, racemis simplicibus solitariis, flor. ternis pedunculatis. Jacq. amer. 98. Hab. in Carthagenae arboribus marium inundatis. Racemi axillares fol. breviores. Flor. parvi.

32. *sessilis*, fol. ovatis, racemis simplicibus solitariis, flor. ternis sessilibus. Jacq. amer. 99. Habit. in sylv. Carthag. Rami diffusi fragiles. Flor. insident pedunc. partiali incrassato. Jacq. h

33. *marginatus*, fol. ovatis subacuminatis margine scariosis, racemis solitariis axillaribus, pedicellis trifloris. Lam. enc. 3. p. 566. Hab. in Brasilia. Fol. integerrima. h

34. *stelis*, racemis trichotomis, pedunc. trigonis, flor. aequalibus. L. Hab. in Cumanae arborib. h

35. *pauciflorus*, racemis tripartitis fol. brevioribus, fol. obovatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 627. Hab. in arboribus Jamaicae interioris. h

36. *brasiliensis*, hexapetalus, fol. lanceolato-ovatis, cor. ante florescentiam longe tubulosis rectis clavatis. Lam. enc. 3. p. 570. Hab. in Brasilia. h

37. *pentandrus*, racemis simplicibus, flor. quinquefidis racemosis, fol. alternis petiolatis. L. Hab. in India. Ramis ad folia dilatatis. Fol. alterna, subnervia, figura Lauri. L. h

38. *spicatus*, spicis quadrangularibus, fol. oppositis. Jacq. amer. 97. t. 68. Ed. picta. t. 99. Hab. Carthagenae. h

39. *ovalifolius*, spic. solitariis geminisque brevibus, flor. confertis hexandris minimis, fol. ovalibus subaveniis carnosiss. Flor. Per. 3. p. 50. Affinis L. *spicato*. Pet. purpurea.

40. *longibracteatus*, spic. terminalibus, bract. floriferis, flor. pentandris, fol. lan-

ceolatis nerviis. Lam. enc. 3. p. 599. Hab. in Peru. Flor. e fovea bractearum.

41. *cucullaris*, fol. lato-lanceolatis falcatis nervosis, bract. cordatis cucullatis subtrifloris. Lam. in Journ. d'Hist. natur. n°. 12. p. 444. t. 23. Hab. in Guiana. h

42. *polystachyus*, spic. ternis laxis, flor. sessilibus minimis, fol. ovato-lanceolatis amplis. Flor. Per. l. c. Pet. purpurea. Bac. luteo-fusca.

43. *emarginatus*, spic. axillaribus, fol. cuneato-ovatis emarginatis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 625. Hab. in montib. Hispaniolae. h

58. CLEOME. *Glandula* nectariferæ 3, ad singulum sinum calycis singulae, excepto infimo. Cal. 4-phyllus. *Petala* omnia adscendentia. *Caps.* siliquosa pedicellata, unilocularis, bivalvis. (*Stam.* 4-6-12-20 et plura, subtetradymama.)

\* *Fol. non manifestis.*

1. *juncea*, fruticosa, aphylla, corymbis lateralibus, genitalibus elongatis gynandris octandris, siliqua lineari tomentosa. Lin. suppl. p. 300. Willd. Sp. III. p. 564. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. vix ulla, nisi parvas squamulae. L. h

\*\* *Fol. compositis* : 3-5-7-tenis.

2. *heptaphylla*, flor. gynandris, fol. subseptenatis, caule aculcato. L. Habit. in Indiis. ☉

3. *pentaphylla*, flor. gynandris, foliis quinatis, caule inermi. Jacq. hort. t. 24. Rheed. 9. t. 24. Hab. in India. ☉

4. *triphylla*, flor. gynandris, fol. ternatis, caule inermi. L. Herm. lugdh. t. 565. Hab. in Indiis. ☉

Obs. Tres praecedentes (2, 3, 4.) eadem planta olim prognatas evincunt folia imprimis floralia sessilia, vix itaque species sunt sufficienter diversae. L.

5. *polygama*, flor. superioribus masculis tetrandris, fol. ternatis, foliolis sessilibus margine subaculeatis. L. Willd. Sp. III. p. 565. Sloan. hist. t. p. 124. t. 124. f. 1. Hab. in Jamaica. ☉

6. *icosandra*, flor. icosi-tetrandris, fol. quinatis. L. Rumph. t. 96. f. 3. Burm. zeyl. t. 99. Hab. in Zeylona. ☉

7. *viscosa*, flor. dodecandris, fol. quinatis ternatisque. L. Mort. Rheed. g. t. 23. Hab. in Zeylona, Malab. Stam. 10 ad 15. ☉

8. *dodecandra*, flor. dodecandris, fol. ternatis. L. Burm. zeyl. 216. t. 100. f. 1. Sloan. hist. 1. p. 149. t. 124. f. 1. Hab. in Indiis. Caul. viscoso-pubescente. Stam. 10-14. Siliqua sessiles, subinflatae. ☉

9. *uni glandulosa*, fol. sparsis ternatis lanceolatis integerrimis, flor. 1-glandulosi dodecandris. Cav. ic. 4. p. 3. Hab. in N. Hispan. praesertim in Acapulco. Caul. villosus. Cor. alba. Stam. 14-16.

10. *felina*, polyandra hispida, fol. ternatis cuneiformibus strigosis, flor. axillaribus solitariis pedunculatis, filiquis linearibus compressis. Lin. suppl. p. 300. Hab. in Zeylona. Folia linguam referunt felinam. L.

11. *Chelidonii*, polyandra hirsuta, foliolis quinis 8, septenis cuneiformibus scabris, racemis terminalibus, siliquis filiformibus. Lin. suppl. p. 300. Hab. prope Transchaure. Cor. rubra Chelidonii hybridi. Siliqua filiformis.

12. *gigantea*, flor. hexandris, fol. septenatis, caule inermi. Jacq. obs. 4. p. 1. t. 76. Hab. in Guinea. Sexpedalis et ultra sempervirens. Racemus terminalis. Qualitas saporis urentissima, odoris virosissima. L.

13. *aculeata*, flor. hexandris, fol. ternatis integerrimis, stipulis spiniscentibus. L. Hab. in Amer. Flor. solitarii, parvi.

14. *spinosa*, flor. hexandris, fol. septenatis quintisque, caule spinoso. Jacq. amer. Marogr. bras. 33. t. 34. Hab. in Amer. meridionali. Rami divaricati. ☉

15. *serrata*, flor. hexandris, fol. ternatis: foliolis lineari-lanceolatis serratis. L. Jacq. amer. 190. t. 190. f. 43. Hab. in America meridionali. ☉

16. *ornithopodioides*, flor. hexandris, fol. ternatis: foliolis ovali-lanceolatis. L. Dill. elth. 359. t. 266. f. 345. Buxb. cent. 1. p. 6. t. 9. f. 24. Hab. circa Peram in agris. Flor. flavi. ☉

17. *violacea*, flor. hexandris, fol. ternatis solitariisque: foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. L. Barr. ic. 865. Hab. in Lusitania. Petala atropurpurescentia atomis flavis. Lateralia 2 cordata. ☉

18. *arabica*, flor. hexandris, fol. glandulosi inferioribus ternatis lanceolatis ob-

tusis, siliquis fusiformibus viscoso-scabris. Lin. dec. 3. t. 8. Desf. Atl. 2. p. 39. Shaw. afr. f. 558. Hab. in Arabia et Barbaria. Petala lutea, apice purpurea. ☉

19. *tenella*, flor. hexandris, fol. ternatis lineari-filiformibus. Willd. p. 570. Retz. obs. 4. p. 28. Pluck. phyt. 1. 224. f. 3. Hab. in aridis arenosis orientalis. Cor. lutea. ☉

20. *filifolia*, flor. hexandris, fol. septenatis ternatisque filiformibus. Vahl. symb. 1. p. 48. C. *angustifolia*. Forsk. descr. 120. Hab. in Arabia felici ad agrorum margines. Caul. debilis. ☉

\*\*\* *Fol. simplicibus.*

21. *guyanensis*, flor. hexandris, foliis lineari-filiformibus sessilibus. Willd. Aubl. Guian. 2. t. 173. Flor. axillares flavi.

22. *monophylla*, flor. hexandris, fol. simplicibus ovato-lanceolatis petiolatis. L. Burm. zeyl. 217. t. 100. f. 2. Rheed. g. t. 34. Hab. in India. ☉

23. *capensis*, flor. hexandris, fol. simplicibus sessilibus lineari-lanceolatis, caule angulato. L. Hab. ad Cap. b. spei et in India. Caul. facie Epilobii. Fol. Genistae.

24. *procumbens*, flor. hexandris, fol. simplicibus lanceolatis petiolatis, caulibus procumbentibus. L. Jacq. amer. 189. t. 120. Sloan. hist. 1. t. 123. Hab. in Jamaicae et Hispaniolae aridis sabulosis. ¶

Obs. Genus hoc ex Capparidis familia a Linnaeo ad classem Tetradynamiam est amandandum.

859. *STEPHANIA*. *Cal.* campanulatus, bilobus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* bina, inferiora longiora. *Germen* pedicellatum. *Stylus* o. *Stigma* capitatum. *Caps.* ?

1. *Cleomoides*. Willd. Sp. II. p. p. 239. Capparis paradoxa. Jacq. Schoenb. 1. p. 58. t. 111. Hab. ad Caraccas Amer. Frutex 6-petalis. Flor. axillares solitarii. *Cal.* aurantiis bilobus ventricosus. *Cor.* flava calyce paulo longior, petalis rectis. Cum Capparidibus nil commune habet, praeter germen pedicellatum. W.

\* RUBIACEAE 6-andrae. Genera 860-865.

860. *HILLIA*. *Cal.* duplex, inferus, 6-phyllus, superus 2-4-phyllus. *Cor.* 6-fida, tubo cylindrico longior. B b 4

gissimo. *Antherae* intra tubum faucem corol. sessiles. *Sem.* comosa.

1. *longiflora*, cor. sexfolia, laciniae lanceolatis revolutis, fol. ovatis acutis. Swartz. obs. 135. t. 5. f. 1. Willd. p. 239. Andrew. t. 145. H. parasitica. L. Jacq. amer. Ed. picta. t. 97. Hab. in fruticetis humidis montium Jamaicae et in Brasilia. Flor. flavi. Non est parasitica. Sw. h

2. *tetrandra*, cor. quadrifida, laciniae ovatis, fol. obovatis. Sw. Fl. ind. occid. 1. p. 630. In montib. altis Jamaicae.

861. *COUTAREA*. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* magna, infundibuliformis, 6-fida, tubo incurvo ventricosus. *Filam.* tubi basi inserta. *Stigm.* sulcatum. *Caps.* infera 2-locularis, 2-valvis, polysperma. *Sem.* imbricata, margine membranaceo. (Flor. basi bracteati, interdum 7-andri. A.)

1. *speciosa*. Aubl. Guj. p. 314. t. 122. Juss. gen. pl. Portlandia hexandra. L. Willd. Sp. 1. p. 936. Jacq. amer. ed. pict. p. 35. t. 65. Hab. in Cartagenae fruticosis et in Guiana. Flor. pulchri, suaveolentes fere tripollicares, carneo-albi. J.

862. *ISERTIA*. *Cal.* superus, 6-dentatus. *Cor.* infundibuliformis, 6-fida. *Stigma* 6-fidum. *Pomum* 6-loculare, polyspermum.

1. *coccinea*, fol. lanceolato-ellipticis subtus villosis-incanis acuminatis utrinque acutis, pedunc. racemosis bifidis. Vahl. eclog. 2. p. 27. Willd. p. 240. Lam. ill. t. 219. Guettaria coccinea. Aubl. guj. 1. p. 317. t. 123. Hab. in sylvis Cajen. Gujan. Arbor 10-12-pedalis, ramis tetragonis. Panicula terminalis. h

2. *parviflora*, fol. oblongis: inferioribus subcordatis, thyrsis ovato. Vahl. p. 28. t. 15. Hab. in ins. Trinitatis. Fol. glabra, interdum subtus subvillosa. V.

863. *RICHARDIA*. *Cal.* 6-partitus, persistens, superus. *Cor.* infundibuliformis, 6-fida. *Stigm.* 3; capitata. *Fructus* 3-partibilis. *Sem.* 5, truncata. (Capit. radiata foliolis. Una pars floris passim demitur. Flor. Peruv.)

1. *scabra*, caul. hispido brachiato, fol.

ovato-lanceolatis scabris. Lin. Sp. pl. p. 470. Lam. ill. t. 251. Hab. in Vera-Cruz. Caul. erecti? pilis reflexis.

2. *pilosa*, fol. oblongo-lanceolatis: floralibus geminis quaternisque, flor. capitulato-umbellatis. Flor. Peruv. 3. p. 50. In ruderalis et segetibus. Cercado et Lima. Fl. toto anno. Caul. procumbens, rami inferiores brachiati. Anther. et Stigm. pilosa.

864. *STEVENSIA*. *Cal.* bifidus, deciduus. *Cor.* tubulosa: limbo plano 6-7-fido. *Antherae* (6-7) in cor. fauce sessiles. *Caps.* 2-locularis, polysperma, apice quadrifariam dehiscens.

1. *buxifolia*. Poiteau in Annal. d. Mus. Cah. 21. p. 233. t. 60. Cresc. in ins. St. Dominica septentrionali. Flor. solitarii albi, odorati, externe subtomentosi. Fol. subtus alba, reticulata. h

865. *PSATHURA*. *Cal.* superus, 6-dentatus. *Cor.* campanulata, intus barbata, 6-fida. *Stigm.* lamellatum. *Drupa* sicca, striata, coronata, 6-locularis: loculis 1-spermis.

1. *borbonica*. Willd. Sp. II. p. 229. Lam. ill. gen. t. 260. Hab. in ins. Borbonia. Rami nodosi fragiles. Flor. corymbosi. h

866. *CANARINA*. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-fida, campanulata. *Stigmata* 6. *Caps.* infera, 6-locularis, polysperma.

1. *Campanula*. Lin. Lam. ill. t. 259. Campanula canariensis. L. fol. oppositis hastatis dentatis petiolatis. L. Syst. veg. Pluck. alm. 76. t. 276. f. 1. Hab. in ins. Canariis. Fol. petiolata, hastata. Flor. edichotomia. T.

867. *FRANKENIA*. *Cal.* 5-fidus, infundibulif. *Petala* 5. *Stigma* 2-3-partitum. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis.

\* *Herbaceae*.

1. *laevis*, flor. solitariis, petalis subrepandis obtusis, fol. linearibus basi ciliatis. Willd. Sp. II. p. 241. Hab. in Eur. australis maritimis et circa Astracae.

**Obs.** Ab Illicitanis, in Hispania, ut praestans remedium habetur in mitigandis symptomatibus calculosis. — Cav. ic. pl. 2. p. 15.

2. *Nothria*, flor. fasciculatis, petalis acutis, fol. linearibus basi ciliatis. Willd. *Nothria repens*. Berg. cap. 171. t. 1. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

3. *hirsuta*, flor. fasciculatis, petalis subrepandis obtusis, fol. linearibus oblongis, caule hirsuto. Willd. Hab. in Apulia, Creta, in Sibiria. ♂

4. *pulverulenta*, flor. solitariis, petalis subrepandis, fol. subrotundo-ovatis subtus pulverulentis. Hab. in litoribus. ☉

\*\*\* *Fruticosae*.

5. *corymbosa*, fruticosa, fol. linearibus pulverulentis margine reflexis, flor. corymbosis. Desf. Atl. 1. p. 315. t. 93. Hab. ad maris littora prope Arzean in Barb. Fol. *F. laevis*, perennans.

6. *thymifolia* (ericoides), fruticosa erecta ramesissima, fol. (cinereis) linearibus confertis brevissimis, flor. axillaribus. Desf. p. 316. Barrel. t. 714. Hab. in Barbar. arenosis, et in Hispan. prope Arangues quoque inventa a D. Thibaud. Ericam refert. Fol. quasi crustosa, vix ciliata. Flor. subsecundi.

7. *microphylla*, fruticosa levis, fol. oppositis quadrifariam imbricatis subteretibus, flor. solitariis subterminalibus. Cav. ic. 6. p. 77. t. 537. f. 1. Hab. in America meridion. Née. Cor. albida. Caul. ramosissimi decumbentes. ♀

868. **FLOERKEA**. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Stylus* bifidus. *Utriculus* dicoccus.

1. *lacustris*. Fl. proserpinacoides. Willd. in Act. Soc. Nat. cur. Berolin. v. 3. 1801. Hab. in Pensylvanicae lacubus, et paludosis.

869. **PEPLIS**. *Cal.* campanulatus: ore 12-fido. *Petala* 6 (aut 0.), calyci inserta. *Caps.* 2-ocularis, polysperma.

1. *Portula*, flor. hexandris axillaribus solitariis subpetalis, fol. petiolatis subrotundo-ovatis. Willd. Sp. II. p. 241. P. flor. apetalis. L. Flor. dan. t. 64. Lam. ill. t. 262. Hab. in inundatis. ☉

2. *indica*, flor. tetrandris spicatis brac-

teatis, fol. ablongo-obovatis sessilibus. Willd. Hab. in India: Caul. adscendens.

870. **GAHNIA**. *Cal.* gluma 1-valvis, 2-5-flora. *Cor.* gluma 2-valvis. *Stylus* dichotomus. *Sem.* 1.

1. *procera*, paniculis spicatis pluribus elongatis, flosc. hexandris. Forst. prod. n°. 358. Lin. suppl. 211. Hab. in N. Zeelandiae collibus.

2. *schoenoides*, culmis flexuosis, paniculis compositis spicatis rigidis subsolitariis. Forst. prod. n°. 159. Hab. in ins. Tahiti.

871. **BAMBOS**. *Squamae* tres spiculas subquinquefloras tegentes. *Cal.* 6. *Cor.* gluma 2-valvis. *Stylus* 2-fidus. *Sem.* 1.

1. *arundinacea*, panicula ramosa divaricata. Willd. p. 245. (Bambusa) Retz. obs. 5. p. 24. Roxbourg. corom. 1. p. 55. t. 79. Nastus. Juss. Rhed. 1. t. 16. Hab. in India utraque. ♀

2. *verticillata*, spica terminali simplici verticillata. Willd. Kumph. amb. (B. stricta. Roxb. l. c. t. 80. ? Verticill. sessilis globularis, congestus. R.) Hab. in India. ♀

872. **EHRHARTA**. *Cal.* gluma 2-valvis, abbreviata, uniflora. *Cor.* gluma duplex, utraque bivalvis, exterior compressa acinaciformis, transversim sulcata. (*Styl.* 1-2.)

1. *cartilaginea*, culmo indiviso, panicula simplici, cor. exteriori retula submutica, foliorum margine cartilagineo crispo. Smith. ic. ined. p. 33. Thunb. prod. 66. Eh. Mnemateja. Lin. suppl. p. 209. Eh. nutans. Lam. enc. 2. p. 346. Habitant omnes species ad Cap. b. spei. Gramen pulchrum.

2. *bulbosa*, culmo indiviso, panicula ramosa multiflora, cor. exteriori emarginata aristata. Smith. loc. cit. E. aristata. Thunb. Trochera striata. Richard. Panic. simplex laxa. Th. prodr. append. p. 188.

3. *longiflora*, culmo simplici, panicula ramosa multiflora, cor. exteriori mucronata tuberculato-hispida, flor. triandris. Smith. p. 32. t. 32.

4. *panicea*, culmo diviso, panicula subramosa, flor. erectis digynis. Smith. t. 9. Eh. erecta. Lam. enc. 2. p. 347. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

5. *calycina*, culmo ramoso, panicula subsimplici, calyce colorato cor. aequante. Smith. ic. 1. p. 33. t. 33. E. glum corollinis exterioribus subpilosis. Thunb. prodr. app. p. 1188. Aira capensis. Lin. suppl. 108.

6. *ramosa*, cor. glabris muticis, panic. coarctata, culm. ramoso. Thunb. prodr. corrig. Melica ramosa. Ejusd. p. 21.

7. *melicoides*, cor. glabris muticis, panic. patentissima, fol. subfiliformibus. Th. 1. c. Mel. capensis. Ejusd. l. c.

8. *gigantea*, cor. hirsutis aristatis, panic. verticillata, culm. erecto. Thunb. prodr. sub Melica.

9. *geniculata*, corol. hirtis, panicula coarctata, culm. decumbente. Thunb. sub Melica.

## DIGYNIA.

873. ORYZA. Cal. gluma 2-valvis, 1-flora. Cor. 2-valvis, subaequalis, semini adnascens.

1. *sativa*. L. Willd. p. 247. Catesb. car. 1. p. 14. t. 14. *β. mutica*, glum. absque aristis. *γ. glutinosa*, sem. glutinosi. Lourc. Colitur in Indiae paludosis, hinc inde etiam in Europa. Var. quoad seminis formam; vid. Willd. l. c.

874. NECTRIS. Cal. 6-partitus, lacinii 3-interioribus minoribus obtusis. Cor. o. Caps. subcarnosae, stylis coronatae, uniloculares, 1-2-spermae.

1. *aquatica*. Willd. Cabomba aquatica. Aubl. guj. 1. p. 321. t. 124. Mich. Flor. 1. p. 206. Lam. ill. t. 265. Hab. in stagnis et rivulis Cajen. Gujanae, et Carolinae. Fol. inferiora capillaceo-multifida, superiora nantantia peltata. Flor. flavi. Sem. globosa.

875. ATRAPHAXIS. Cal. 2-phyllus. Petala 2, sinuata. Stigmata capitata. Sem. 1.

1. *spinosa*, pamis spinosis. L. l'Herit. stirp. nov. 1. p. 27. t. 14. Dill. eld. 47. t. 40. f. 47. Hab. in Media et Sibiria. Sem. compressum.

2. *undulata*, inermis, fol. undulatis. Polygonum undulatum. Berg. cap. 135. Polygonum. Thunb. prod. 77. Dill. eld. 36. t. 32. f. 36. Hab. ad Cap. b. spec. Pet. o. Sem. subrotundum. L. h

## TRIGYNIA.

876. RUMEX. Cal. 3-phyllus. Petala 3, conniventia. Sem. 1-triquetrum.

\* Flor. hermaphroditis. Valvulis granulato notatis.

1. *Patientia*, valvulis integerrimis; unica granifera, fol. ovato-lanceolatis. L. Willd. Sp. II. p. 249. Hab. in Italia, in Germania. Col. in hortis.

2. *sanguineus*, valvulis integerrimis; unica granifera, fol. cordato-lanceolatis. L. Blackw. t. 49a. Hab. in Virginia. Fol. venis rubris succo sanguineo.

3. *purpureus*, valv. dentatis graniferis, fol. cordatis: petiolis venisque purpureis. Enc. bot. 5. p. 63. R. sanguineus. *β. latifolius*. Hort. Paris. Hab. . . R. sanguineum refert, sed fol. multo latioribus, praesertim valvul. dentatis differt.

4. *spatulatus*, fol. obovatis obtusis, valvul. graniferis. Thunb. prod. 67. Hab. ad Cap. b. spec.

5. *verticillatus*, valvul. integerrimis: omnibus graniferis, fol. lanceolatis: vaginis cylindricis. L. Hab. in Virginia.

6. *Britannica* (*xanthorhiza*), valvulis integerrimis: omnibus graniferis, fol. longo lanceolatis: vaginis obsolete, laceris. L. Michaux. 1. p. 217. R. bienn. Moench. meth. p. 354. Hab. in Virginiae et Carolinae aquis nec in Europa.

7. *Hydrolapathum*, valvul. integerrimis graniferis, fol. lanceolatis strictis glabris acutis integerrimis basi attenuatis. Ait. Kew. 1. p. 483. R. aquaticus. Smith? et plurium autorum. Hab. in fossis, ad fluviorum ripas.

8. *crispus*, valv. integris omnibus graniferis, fol. lanceolatis undulatis acutis. Hab. in Europae humosis.

9. *Nemolapathum* (*conglomeratus*), valvulis linearibus obtusis integerrimis omnibus graniferis, verticillis glomeratis, fol. inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis undulatis. Lin. suppl. p. 212. R. *conglomeratus*. Roth. germ. I. II. 422. R. limosus. Thuill. ? R. crispus. *β. Pollich.* Hab. in nemoribus humilis, ad rivulos, in paludibus. A priore satis diversus. Rami divaricati. Flor. ad dimidium minores.

10. *persicarioides*, valvulis dentatis : omnibus graniferis, fol. lanceolatis undulatis. L. Hab. in Virginia. Valv. dentibus utrinque tribus longis. ☉

11. *aegyptiacus*, valvul. trifido-setaceis : unica granifera. L. Till. pis. 43. t. 37. f. 1. Hab. in Aegypto. ☉

12. *dentatus (multiflorus)*, valvulis dentatis, omnibus graniferis, fol. lanceolatis. L. caps. seminibus alba et crenata. Dill. elth. 191. t. 158. f. 191. Hab. in Aegypto. Humilis. Rami verticilli multiflori. Fol. obliqua. ☉

13. *maritimus*, valvul. deltoideis setaceo-dentatis graniferis, fol. linearibus, verticillis confertis. Smith brit. 1. p. 253. Petiv. brit. t. 2. f. 8. R. aureus. Withering. Hab. in paludosis, praesertim maritimis.

14. *palustris (aureus)*, valv. lanceolatis graniferis basi dentatis, fol. linearilanceolatis, verticill. distantibus. Smith. l. c. p. 594. Bocc. mus. t. 104. Curt. Lon. 3. t. 23. Petiv. l. c. f. 7. Hab. in paludosis et ruderalis humidis. Rad. intus rubra. Curt. Fol. acuta : radicalis maxima. Sm.

15. *crispatus*, valvul. obtuse cordatis dentatis graniferis, cristato-dentatis, fol. inferioribus lanceolatis, margine crispatis, spic. sphyllis. Michaux. Flor. 1. p. 217. Hab. in Kentucky. Aññ. C. persicarioid. Facie R. acuti. M.

16. *divaricatus*, valv. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis obtusis pubescentibus. L. Till. pis. 93. t. 37. f. 2. Hab. in Italia. ☉

17. *acutus*, valv. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis acuminatis. Hab. in Europae succulentis. ☿

18. *obtusifolius*, valvul. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis obtusiusculis erenulatis. Hab. in pratis.

19. *pulcher*, caul. ramosissimo, valv. dentatis : subunica granifera, fol. radicalibus panduriformibus. L. Hall. helv. n<sup>o</sup>. 1593. Till. pis. 93. t. 37. f. 2. Moris. s. 5. t. 37. f. 13. Hab. in ruderalis, ad vias. Rami floriferi recurvati.

\*\*\* Valvul. granulo destitut. s. nudis.

20. *bucephalophorus*, valvul. dentatis nudis, patelicellis planis reflexis, incrassatis. L. Coll. cephr. 1. p. 141. t. 150. Hab. in Italia. ☉

21. *aquaticus*, valvulis integerrimis

nudis, fol. late cordatis glabris acutis. L. Hab. ad ripas fluviorum et paludum, passim. ☿

22. *Lunaria*, valvul. laevibus, caule arboresco, fol. subcordatis. L. Pluck. alm. 8<sup>o</sup> t. 252. f. 3. Hab. in Canariis. Panic. oppositifolia. ♀

23. *imbriatus*, cal. laciniato - imbricatis subplumosis, fol. cordatis, rad. tuberosa. Enc. bot. 5. p. 65. D. repandus Bosc. Hab. ad Cap. b. sp. Panic. terminalis, flor. albidis pendulis.

24. *vesicarius*, valv. omnibus maximis membranaceis reflexis, fol. indivisis. L. Moris. s. 5. t. 28. f. 7. Hab. in Africa. Valv. rubellae, venosae. ☉

25. *roseus*, valvulae fructus alterius ala maxima membranaceae reticulata, fol. erosis. Lin. Desf. Atl. 1. p. 320. R. fol. subcarnosis laciniato-hastatis panduraeformibusque petiolatis. R. *lacerus*. Balbis Misc. bot. p. 19. Hab. in Aegypto et Barbar. arvis. ☉

26. *tingitanus*, valvul. cordatis obtusis integerrimis, fol. hastato-ovatis erosis. Moris. s. 5. t. 28 f. 8. Shaw. specim. n<sup>o</sup>. 5. ic. Hab. in Barb. Hisp. Fol. petiolata, subsabra, basi subhastata et erosa.

27. *scutatus*, fol. cordato-hastatis, caule tereti. (β. *Rumex glaucus*, flor. hermaphroditis, valvulis nudis, fol. cordato-hastatis obtusis glaucis, caule suffruticoso. Jacq. ic. rar. 1. t. 67. Collect. 1. p. 64. Hab. in Helvetia, Gallia, inter acervos lapidum.

28. *nervosus*, valv. integerrimis nudis, fol. oblongis tri-nerviis. Vahl. symb. 1. p. 27. Hab. in montibus Hadiensib. Rami striati, articulis apice fuscis. Cal. reflexus. ♀

29. *digynus*, flor. digynis, fol. orbiculatis emarginatis. L. Fl. lapp. p. 132. Flor. Jacq. Collect. 2. p. 30. Moris. s. 5. t. 36. f. penult. Hab. in alpinis.

30. *lanceolatus*, fol. lanceolatis reflexo-marginatis, caule angulato. Thunb. prod. p. 67. Hab. ad Cap. b. spei. +

\*\*\* LAPATHUM. Floribus declinis.

31. *alpinus*, flor. hermaphroditis sterilib. femineisque : valvul. integerrimis nudis, fol. cordatis obtusis maximis. Blackw. t. 262. Hab. in Helv. et Galliae montosis. Fol. magnitudine Rhei. ♂

32. *spinosus*, flor. androgynis : cal

femineas monodhyllis reflexo-uncinatis. Nibo spinosa. Moench. meth. p. 318. Beta cretica, semine spinoso. Bauh. hist. 2. p. 962. Hab. in Creta, et in subhamidis juxta Tingidem. Schousb.

33. *tuberosus*, flor. dioicis, fol. lanceolato-sagittatis; hamis patentibus, radice tuberosa. Hab. in Italia. Affinis R. Acetosae sed Folia hamis postice magis hiantia et Stipulae longiores. T.

34. *multifidus*, flor. dioicis, fol. hastatis: auriculis palmatis. Bocc. mus. 2. t. 126. In alpinis Calabriae, Ilietruiae, Orientis.

35. *Acetosella*, flor. dioicis, fol. omnibus petiolatis lanceolato-hastatis: auricul. integris. Flor. dan. t. 1161.  $\beta$ . R. multifidus, Thuill. Hab. in arenosis, sylv.

36. *thyrsoides*, caul. simplici, fol. hastatis, panic. coarctata. Desf. Atl. 1. p. 321. Hab. in Barbaria. Priori affinis. Cal. foliola colore rosea.

37. *Acetosa*, flor. dioicis, caul. elongato, fol. oblongis sagittatis. L. Engl. bot. t. 127. Hab. in pascuis, sylvaticis.

38. *aculeatus*, flor. dioicis, fol. lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis: valv. ciliatis. L. Bauh. prodr. t. 55. Hab. Creta, Hispania. Similis R. Acetosellae. Flor. femineorum interiores valvulae ciliatae aculeis minimis. L.

39. *luxurians*, flor. dioicis, fol. cordato-hastatis, caulibus angulatis diffusis, valvulis exterioribus subulatis, interioribus orbiculatis. Lin. suppl. p. 212. Bocc. mus. 165. t. 126. Hab. in alp. Bonosiensibus. Radix tuberosa. T.

40. *arifolius*, flor. dioicis, fol. omnibus petiolatis hastatis, auriculis simplicibus divaricatis, caule erecto. Ait. K-w. 1. p. 487. Lin. suppl. p. 212. R. abyssinicus. Jacq. hort. 3. p. 48. t. 98. Hab. in Abyssinia. h

41. *bipinnatus*, flor. dioicis, fol. bipinnatis. Lin. suppl. p. 211. Hab. in Marocco. Flor. androgyni. Valv. cordatae nudae, margine venis sanguineis pictae. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 170.

877. FLAGELLARIA. Cal. 5-partitus. Cor. o. Bacca 3-1-sperma.

1. *indica*. Lin. Lera. ill. t. 266. Rumph. 5. t. 59. f. 2. Rheed. 5. t. 53. Hab. in India et Guinea. Humanam altitudinem superans. Fol. terminata cirrho.

878. SCHEUCHZERIA. Cor. 6-partita. Cal. o. Antherae lineares. Stigm. sessilia, lat. raliae. Caps. inflata, distinctae, subdispermae.

1. *palustris*. L. Fl. lapp. t. 10. f. 1. Lam. ill. gen. t. 268. Flor. dan. t. 76. Hab. in paludosis, etiam in Canada.

879. TRIGLOCHIN. Cal. 3-phyllus. Petala 3, calyciformia. (Cal. 6-phyllus, foliolis 3-superioribus cum inferioribus alternantibus. Cor. o. Roth.) Stylus o. Caps. basi dehiscens.

1. *palustre*, capsulis trilobularibus lac-vibus linearibus basi attenuatis. Willd. p. 264. Flor. dan. t. 490. Hab. in uliginosis.  $\sigma$

2. *bulbosum*, radice bulbosa fibris ob-tecta. L. Jacq. ic. rar. 2. t. 454. Hab. ad Cap. b. spei. Tr. palustri simile. Styli protracti et patententes, qui in T. palustrifolii et obsoleti. L.

3. *striatum*, caps. subrotundis trigonis trilobularib. scapo nudo striato, spic. simplici coarctata. Flor. Peruv. l. c. Hab. in Peruv. lacubus et inundatis. Rad. fusiformis, scapes plures protrudens.

4. *ciliatum*, caps. ovatis trigonis trilobularibus, culm. apice contorto, spica composita. Flor. Peruv. 3. p. 72. Hab. in Peruv. collib. frigidis. Flor. bract. 2, ovatis, ciliatis stipati.

5. *triandrum*, fol. subsetaceis scapum subaequantibus, flor. trifidis triandris, caps. trigono-subrotundis. Mich. Flor. 1. p. 208. Hab. in inundatis in Amera boreali.

6. *maritimum*, capsulis sexlobularibus ovatis. L. Flor. dan. t. 306. Roth. germ. II. p. 418. Hab. in maritimis, et pascuis, etiam in America.

880. WURMBEA. Cal. o. Cor. infera, 6-partita: tubo hexangulato. Filam. fauci inserta. Styli subconniventes. Caps. oblonga, 3-quetra. Sem. rotunda.

1. *capensis*. Thunb. Diss. bot. t. p. Andrew. t. 221. Lam. ill. t. 270. Melant. Wurmbia Thunb. prodr. Hab. in collib. arenosis Cap. b. spei. Fol. lanceolata, cucullata.



*Obs.* Dantur nonnullae hujus plantae varietates ab Thunbergio ut tales fixae, quas Willdenowius Sp. pl. II. p. 265. tanquam distinctas species exhibuit.

881. *MELANTHIUM*. Polygamum.

*Cal. o. Cor.* rotata, 6-partita: laciniis basi biglandulosis. *Filam.* ex elongatis unguibus cor. *Caps.* subovata (tricoeca), apice subtrifida, 3-locularis. *Sem.* plura, alato-membranacea. (Fol. elongata, debilia.)

1. *virginicum*, flor. paniculatis, petalis ovalibus. Michaux. Flor. 2. p. 251. Willd. Sp. II. p. 266. Hab. in Amer. boreal. humidis. Panic. pyramidalis. Flor. albidolividi.

2. *racemosum*, panic. racemoso-oblonga, petal. orbiculatis. Michaux. Hab. in alius montib. Carol. septentrion. Flor. obsolete pallidi. Priore minus altum. An *M. laetum*. Ait. Kew. 1. p. 448. Willd. p. 267.

3. *sibiricum*, flor. paniculatis, petalis sessilibus acutis, fol. linearibus. Willd. p. 267. Hab. in Sibiria.  $\mathcal{T}$

4. *capense*, flor. racemosis, petalis punctatis, fol. lanceolatis cucullatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

5. *triquetrum*, fol. triquetris glabris caule longioribus, flor. spicatis. Lin. suppl. 213. Thunb. prod. 67. Cum priore.

6. *ciliatum*, petalis unguiculatis, fol. basi cucullatis: ensiformibus cartilagineo-ciliatis, flor. spicatis. Lin. suppl. 213.

7. *junceum*, fol. lineari-subulatis, superioribus basi dilatatis, spica flexuosa, petalis unguiculatis. Willd. p. 268. Jacq. ic. rar. 2. t. 451. Collect. suppl. p. 105. Ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

8. *secundum*, fol. linearibus, spica secunda, petalis unguiculatis. Willd. Enc. bot. 4. p. 29. t. 269. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

9. *phalangoides*, fol. linearibus canaliculatis, racemo multifloro, pedunculis flore longioribus, petalis sessilibus. Willd. Enc. 4. p. 28. Anthericum subtrigynum. Jacq. ic. rar. 2. t. 419. Collect. 3. p. 273. Hab. in Carolina.  $\mathcal{T}$

10. *indicum*, petalis lineari-lanceolatis, fol. linearibus. L. Hab. in Tranqueb. Radix

bulbosa. Statura Ornith. lutei. Flor. atropurpurei. Petala angusta. Fol. angustolinearia.

11. *viride*, fol. ovato-lanceolatis vaginantibus, cor. reflexis. Thunb. prod. 67. Andrew. t. 233. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. viridipurpurea.

12. *uniflorum*, fol. lineari-lanceolatis caule subunifloro longioribus, petalis lanceolatis subunguiculatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 450. Collect. 4. p. 100. Ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

13. *eucomoides*, fol. oblongo-lanceolatis cucullatis, caule trifloro, petalis subhastatis unguiculatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 452. Collect. suppl. 104. Ad Cap. b. sp.  $\mathcal{T}$

14. *pumilum*, fol. lanceolatis basi barbatis, caule subtrifloro, petalis sessilibus. Willd. p. 270. Forst. in Comm. goett. 9. p. 30. t. 6. Hab. in Tierra del Fuego. Caul. cespitosus. Cor. alba, inflexo-cucullata.

15. *gramineum*, acaule, fol. imbricatis graminatis, flor. sessilibus. Cav. ic. 6. p. 64. t. 587. f. 1. Hab. cum sequente prope Moya-dor. Broussonet. Pet. nervosa.

16. *punctatum*, acaule, fol. imbricatis carinatis lanceolato-acuminatis, flor. sessilibus punctatis. Cav. l. c. t. 588.

882. *VERATRUM*. *Cal. o. Cor.* 6-petala, eglandulosa. *Caps.* 3, polyspermæ. In flor. masc. Pistilli rudimentum.

1. *nigrum*, fol. ovalibus plicatis, racem. composito, cor. patentibus, bract. linearibus. Jacq. Flor. t. 336. Moris. 2. 12. t. 4. f. 1. Hab. in Sibir. et Hungar. apricis siccis.

2. *album*, fol. ovalibus plicatis, racemo supradecomposito, corol. erectis, bract. lanceolatis. Lin. Jacq. Flor. austr. 4. f. 335. Flor. dan. t. 1120. Habit. in Europæ et Amer. borealis montosis ad rivulos.  $\mathcal{T}$

3. *parviflorum*, fol. subovalibus lanceolatisque planis glabris, panic. ramulis filiformibus, cor. stellatis: laciniis ovali-lanceolatis acutis. Michaux. Flor. 2. p. 250. Hab. in Carol. montibus altis. Cor. viridis. Intermedium inter hoc et antecedens genus. M.

4. *luteum*, racem. simplicissimo, fol. sessilibus. Lin. Reich. syst. 4. p. 297. Hab. in Virginia, Canada. Fol. angusta, lanceolata. Rad. bulbosa,  $\dagger$

883. ZIGADENUS. *Cor.* hexaphyllus, patens: laciniis supra basin angustatam biglandulosis. *Stam.* ad contactum ovarii inserta. *Styl.* 3, contigui. *Caps.* membranacea, 3-locularis. *Sem.* plurima, aptera.

1. *glaberrimus*, fol. lineari-lanceolatis angustis recurvis longis. Michaux. 1. p. 214. t. 22. Hab. in Carol. infer. herbosis, humidis. Caul. subpedalis. Flor. Veratri albi.

*Obs.* Stamina situ et cor. figura Veratro affine, et glandulis Melanthio, sed fructu braeprimis discrepat ab utroque hocce genus. M.

884. MEDEOLA. *Cal.* o. *Cor.* 6-partita, revoluta. *Bacca* 3-sperma.

1. *virginica*, caul. lanuginoso, fol. verticillatis, ramis uermibus. L. Michaux. 1. p. 214. Pluck alm. 401. t. 328. f. 4. Hab. in Virginia. Fol. in apice caul. 3.

2. *asparagoides*, fol. alternis ovatis, basi subcordatis obliquis. Ait. Kew. 1. p. 489. Dracaena medeoloides. Lin. suppl. p. 203. Hab. in Aethiopia. An hujus generis? Fol. alterna pinnata. Flor. penduli e pedicello unifloro.

3. *angustifolia*, fol. alternis ovato-lanceolatis. Ait. Kew. p. 490. Till. pis. 17. t. 12. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

885. TRILLIUM. *Cal.* patens, 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 3-locularis.

1. *cernuum*, fol. ovalibus, basi angustatis, flor. pedunculato cernuo. L. Michaux. Flor. 1. p. 216. Willd. Sp. II. p. 216. Hab. in Carol. Styl. distinctus.

2. *erythrocarpum*, foliis subcordatis abrupte subpetiolatis, flor. erectiusculo, *Bacca* oblonga. Michaux. p. 216. In Carol. septentrion. montib. et in Canada. Bacc. coccinea.

3. *rhomboideum*, fol. lato rhomboideis, pedunc. inclinato. Michaux. Flor. 1. p. 213. *f. erectum*, flor. pedunculato erecto. Lin. Flore atropurpureo. *f. album*, flor. minore albo. *f. grandiflorum*, flor. amplissimo exalbido. Hab. in Carol. montib. excelsis.

4. *pusillum*, fol. ovali oblongis obtusis

sessilibus, pedunci erecto, petal. interioribus sublongioribus. Hab. in Carol. infer. Petala carnosa.

5. *sessile*, fol. lato-ovalibus, flore sessili erecto. L. Catesb. car. 1. p. 50. t. 50. Hab. in Virgin. Carol. Bacc. globoso-depressa.

886. COLCHICUM. *Spatha. Cor.* 6-partita: tubo radicato. *Anth.* incumbentes. *Caps.* 3, connexae, inflatae.

1. *autumnale*, fol. planis lanceolatis erectis, petal. ovatis. Engl. bot. t. 153. Willd. p. 873. *f. C. vernum*, petalis foliisque angustioribus, simul crescentibus. Hab. in pratis humidioribus. Flor. autumnno et fol. una cum fructu vere profert, excepta var. *β*, quae rara.

2. *montanum*, fol. linearibus patentissimis, petal. lineari-lanceolatis. Allion. pedem. 1. t. 74. f. 2. Fol. una cum floribus autumnno erumpunt. L.

3. *variegatum*, fol. undulatis patentibus, petal. ovato-lanceolatis variegatis. Hab. in Oriente. Petal. maculata fere ut in Fr. Meleagride.

887. MERENDERA. *Spatha. Cor.* campanulata, 6-partita. *Anth.* rectae, sagittatae. *Caps.* 3, basi connexae, latere interiore dehiscentes.

1. *Bulbocodium*. Ramond in Bull. Soc. philom. n. 8. 47. t. 12. f. 4. Les Liliacées. t. 25. Bulbocodium vernum. Desf. Alt. Hab. in Pyreneis et in Barbaria.

*Obs.* Medium tenet inter antecedens et Bulbocodium genus et quoad antheras Croco affinis est.

888. HELONIAS. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Styli* 3, distincti. *Caps.* 3-locularis, 3-cornis, oligosperma.

1. *latifolia*, fol. lanceolatis acuminatis, scapo subaphyllo, spica flor. brevissime pedicellatis confertis. Michaux. Flor. 1. p. 212. H. bullata. Lin. Willd. p. 273. Les Liliacées. t. 13. Mill. ic. t. 272. (mala). Hab. in Pennsylvaniae et Marylandiae paludosis. Spica purpurascens Bistortae, fol. Orchidis.

**Obs.** Nomen *bullata* ex aliena Plucknetii phrasi deduxerat Linnaeus. M. l. c.

2. *angustifolia*, fol. angustissimis, scapo inferne folioso, spica laxiuscula, sem. linearibus. Michaux. l. c. Hab. in herbos. et fruticetis Carol. inferioris. Flor. exalbidi. Caps. oblongiuscula. Fol. longissima. M.

3. *erythrosperma*, fol. lineari-longissimis, scapo folioso, caps. abbreviata, seminibus ovatis. Michaux. Hab. in umbrosis rivul. Carol. inferioris. Flor. virescentes. Sem. arilata?

4? *dubia*, fol. angustissimis gramineis, scapo nudo, spica gracili, flor. parvis sessilibus. Michaux. p. 213. Hab. in Georg. et Florid. sabulosis.

5? *pumila*, fol. lanceolatis enerviis. Jacq. ic. rar. 3. t. 453. Coll. 2. p. 260. Hab. in Carol. Gaul. foliosus. Spic. capitata. Germ. *inferum*. Willd.

890. XEROPHYLLUM. Cor. rotata. Filam. basi contigua. Stigm. 3, revoluta, basi subconnata. Caps. subglobosa, apice triplici rima dehiscens, 3-locularis 2-sperma.

1. *setifolium*, fol. subulato-setaceis. Michaux. l. c. p. 210. Helon. Asphodeloides. L. Pluck. mant. t. 342. f. 3. Hab. in Pennsylvania. Fol. arida, subgraminea. Spic. racemiformis. M.

890. TOFIELDIA. Cal. trifidus. Petala 6. Caps. superæ, tres, basi conjunctæ, polyspermæ.

1. *palustris*, scapo foliolo oblecto petal. lineari-obovatis. T. palustris. Huds. Smith. brit. 1. p. 397. Engl. bot. t. 536. Heloneas borealis. Willd. II. p. 274. Heritiera anthericoides, var. *ramosa*. Com. de Sternberg, in Bot. Zeitung. 1. p. 83. c. ic. Erlang. 1802. 2? *borealis*, scapo toto? nudo. Anthericum cabyculatum. Lin. Hab. in turiosis alpinis.

**Obs.** An genuinum Anth. calyculatum. Lin. diversum est? A nonnullis hæc species male cum Narthecio conjungitur.

2. *pubescens*, spica oblonga interrupta, petal. lanceolatis acutis. Narthecium. Michaux. Flor. 1. p. 209. Anth. calycul. Gronov. Hab. in Carol. inferiore. Caps. subglobosa.

3. *pumila*, tota glabra, spica conglobata bracteata. Narthec. Michaux. l. c. Cresc.

ad lacus Mistassius. Fol. brevissima. Scap. filiformis.

4. *falcata*, fol. falcatis striatis distichis, flor. racemoso-spicatis. Iridogalvia falcata. Flor. Peruv. 3. p. 68. t. 302. Hab. in Andium montib. altis. Scap. squam. ovatis oblectus. Cor. albidopurpurea.

5? *glutinosa*, scapo glutinosa-scabro, spica fasciculis paucis alternantibus. Michaux. p. 210. Cresc. a Quebec usque ad lacum Mistassius. Habitu Anth. ossifragi. Caps. ovoidea. M.

891. NOLINEA. Cor. 6-partita; patens. Stylus brevissimus. Caps. 3-gona, membranacea, 3-locularis, dissepimentis bipartilibus dehiscens. Sem. solitaria, hinc convexo-incurva.

1. *georgiana*. Michaux. Flor. 1. p. 208. Hab. in Georgia. Fol. undique versæ, coriaceo-gramineæ. Scap. racemiflorus, ramus, flor. parvulis albis.

**Obs.** Genus hinc Phalangio, inde Helonice affine est. M.

892. SABAL. Flor. hermaphroditi. Spathæ partiales. Filam. libera, basi incrassata. Bacca (Drupa?) 1-3-sperma (per abortum). Semen osseum. Embryo lateralis.

1. *minor* s. *Adansonii*. Guernsent observat. sur le sabal d'Adanson in Bull. de la soc. Philom. n°. 67. t. 25. Corypha minor. Jacq. hort. vind. 3. p. 8. t. 8. Chamærops acaulis. Michaux. Flor. 1. p. 207. Hab. in Amer. boreali. Frond. palmatas flabelliformes. Stipes inermis.

893. CHAMÆROPS. Polygama. Spatha compressa. Spadix ramosus. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala. Filam. submonodelpha. Drupæ 3, monospermæ. Flor. masculi dioici. (Ovarium 3-loculare, locul. 1-spermis, 2-abortantibus. Michaux.)

1. *Palmetto*, caul. arboresc., stipitibus inermibus. Michaux. Flor. 1. p. 206. Corypha Palmetto. Walt. Hab. in Amer. borealis maritimis.

2. *serrulata*, caul. repente, stipitibus (minutim) aculeato-serrulatis, drupis ovoideis. Michaux. l. c. Cum priore.

3. *humilis*, acaulis, frond. palmatis plicatis, stipitib. spinosis. Lin. Desf. Atl. 2. p. 436. Phoenix-humilis. Cav. ic. 2. p. t. 115. Hab. in Hispania et in Barbaria. Filam. basi in urceolum coalita. Radices et pars inferior caud. juniorum sub terra recondita comeditur. Dioica?

β. *arborescens*, candice 14-16-pedali, quae in Hort. parisiensi colitur, cum haec species in loco natali nullum caulem protrudit.

4? *excelsa*, frond. palmatis nervosis serratis, stipit. inermibus. Thunb. jap. p. 130. Rhapis flabelliformis. Ait. Kew. 1. p. 473. L'Her. stirp. 2. t. 100. Hab. in Japonia. Stylus 1. An Corypha?

894. HYDROGETON. *Scapus* radicalis. *Cor.* 3-petala. *Filam.* basi dilatata. *Fistilla* 3, simplicia. *Caps.* 3, membranaceae. 2-spermæ. *Semina* parieti caps. adnata.

1. *fenestralis*. Fol. lineari-elliptica, obtusa, perforata. Rad. magna, edulis. Nomen vernaculum *Ovirandra* (Mirbel. Hist. natur. d. plant. v. 4. p. 117.) i. e. radix edulis, haec tuberosa est et aquatica. Sequenti generi affine. Hab. in Madagascariae aquosis. (Ex. observ. D. Dupetit-Thouars.)

895. APONOGETON. *Amentum* e squamis compositum. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Capsulae* 4, trispermæ. (Stam. passim 7 et 12.)

1. *monostachyon*, spica simplici, fol. cordato-ovalibus. Lin. suppl. 214. Thunb. diss. Nov. Pl. gen. 4. p. 78. c. ic. Willd. Spec. II. p. 927. *Spathium*. Lour. Conch. 1. p. 173.

β. *lineare*, spica simplici, fol. linearibus. Vahl. symb. 3. p. 51. Hab. in Indiae orient. inundatis, inter *Oryzam*. Radix bulbosa. Fol. radicalia natantia.

2. *crispum*, spica simplici, fol. ensiformibus crispis. Thunb. Diss. Nov. Pl. gen. p. 73. Radix fibrillosa.

3. *distachyon*, spica bifida, fol. lineari-oblongis natantibus, bracteis integris, flor. polyandris. Ait. Kew. 1. p. 495. Thunb. Hab. in rivulis Cap. b. spei. Radix bulbosa. Stam. 6-12. Bulbi assati eduntur.

4. *angustifolium*, spica bifida, foliis lineari-lanceolatis erectis, bracteis bipar-

titis, flor. hexandris. Hab. ad Cap. b. spei. Bract. albae basi rubrae.

## HEXAGYNIA.

896. WENDLANDIA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-petala, succulenta. *Styl.* reclinatus. *Caps.* 6, uniloculares, monospermæ.

1. *populifolia*. Willd. Sp. II. p. 275. Wendl. Hort. Herrenb. Fasc. 3. t. 16. Hab. in Carolina. Caesalpinia smilacea. Angl. Fol. alterna cordato-ovata, pendula integerrima. Racemi simplices supra axillares. Flor. parvi albi. Willd. h

897. OTTELIA. *Spatha* 1-phylla, 5-alata. *Cal.* superus, 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 10-locularis, polysperma.

1. *alismoides*. *Damasonium indicum*. Willd. p. 276. *Stratiotes alismoides*, fol. cordatis. L. Rheed. 11. t. 46. Hab. in aquis Ind. orientalis. Scap. uniflorus.

898. DAMASONIUM. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Styli* 6. *Caps.* (Nuces?) acuminate, 1-3-spermæ, stellatim patentes.

1. *stellatum*. Dalech. hist. Juss. gen. pl. *Alisma*. L. Willd. p. 277. n. 4. Curt. Lond. 1. 28. Habit. in fossis et stagnis passim.

## POLYGYNIA.

899. ALISMA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Caps.* plures, monospermæ.

1. *Plantago*, fol. ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. L. Flor. dan. t. 561. β. *angustifolia*, fol. lanceolatis. Hab. in aquosis. ¶

2. *flava*, fol. ovatis acutis, pedunculis umbellatis, fructib. globosis. L. Hab. in America meridionali. ¶

3. *sagittifolia*, fol. sagittatis, fructib. obovatis obtusis. Willd. Sp. II. p. 277. Hab. in Guinea. ¶

4. *cordifolia*, fol. cordatis obtusis, flor. dodecandris, seminibus uncinato-muricatis. L. Sp. pl. 487. Swartz obs. 119. Moris. s. 15. t. 4. f. 6. Plum. spec. 7. ic. 234. f. 2. Hab. in Amer. australi et septentrionali. ¶

5. *paruasifolia*,

5. *parnassifolia*, fol. cordatis subrotundis acutis, capsulis aristatis. Hab. in paludibus.  $\overline{\text{L}}$

6. *repens*, caul. subrepentibus adscendentibus, ad nodos inferiores radicosis et foliosis, fol. lanceolatis petiolatis, verticillis simplicibus. Lam. enc. 2. p. 515. Cav. ic. 1. p. 41. t. 55. Hab. in humidis Hispaniae et Barbariae.

7. *natans*, fol. ellipticis obtusis, pendunc. solitariis. L. Vaill. act. act. 1719. p. 29. t. 4. f. 8.

8. *ranunculoides*, fol. lineari-lanceolatis, fructib. globoso-squarrosis, 5-gonis. Flor. dan. t. 122. Engl. bot. t. 316. Hab. in paludosis, fossis.  $\overline{\text{L}}$

9. *subulata*, fol. subulatis. L. Hab. in Virginia.

M O N O G Y N I A.

Guettardae quaedam species. Genipa. Schradera. Tectonia grandis. Amyrus zeylanica. Limonia trifoliata. Lythrum lineare, Parsonsia, Hyssopifolia. Cassia glandulosa. Trientatis europaea. Polygona quaedam. Lauri nonnullae species. Dodonaea viscosa. Bocconia frutescens. Mimosa hexandra. Chloria imperfoliata. L. Gaura tripetala.

D I G Y N I A.

Swertia difformis. Velezia rigida. Leersia hexandra.

# C L A S S I S VII.

## H E P T A N D R I A.

### M O N O G Y N I A.

900. TRIENTALIS. *Cal.* 7-phyllus. *Cor.* 7-partita, æqualis, plana. *Bacca* exsucca. (Stam. 5, 6 et 7.)

1. *europaea*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis. Flor. dan. t. 86. Engl. bot. t. 15.  
 2. *americana*, fol. angusto-lanceolatis. Michx. 1. p. 220. Hab. in sylvis et juniperetis. ¶

901. DISANDRA. *Cal.* subseptem-partitus. *Cor.* rotata, septem-partita. *Cal.* 2-locularis, polysperma.

1. *prostrata*, prostrata. Lin. suppl. 214. Sibthorpia peregrina, fol. reniformibus crenatis, pedunc. geminis. L. Sp. pl. 2. p. 880. Lam. ill. t. 275. 2. *africana*, fol. orbiculatis integris crenatis, pedunc. solitariis. L. Habit. in Oriente et insula Madera. ¶

902. PISONIA. *Cal.* campanulatus quinquefidus. *Cor.* o. *Bacca* 1-locularis monosperma.

#### \* *Aculeatae.*

1. *aculeata*, spinis axillaribus horizontalibus, fol. ovatis utrinque attenuatis, corymbis axillaribus. Willd. Sp. p. 283. Lam. ill. t. 861. Pluck. alm. 318. t. 108. f. 2. Sloan. list. 2. p. 25. t. 167. Habit. in Amer. meridionali. ¶

2. *villosa*, spinosa, fol. ovato-obtusis, pedunc. subdivaricatis villosis. Poir. in Enc. bot. 5. p. 347. Hab. in Ind. occid. Sonner. Flor. racemosi.

#### \* \* *Inermes.*

3. *subcordata*, fol. cordato-subrotundis, fruct. siccis subclavatis pentagonis, angulis apice muricatis. Swartz. prod. 60. Fl. ind. occid. 2. p. 641. Hab. in Antigua. ¶

4. *nigricans*, fol. ovatis acuminatis, flor. cymosis erectis, fructibus baccatis. P. inermis. H. Hab. in Jamaicae, Hispaniolae sylvestribus. ¶

5. *coccinea*, fol. lanceolato-ovatis; pedunc. terminalibus laxis, flor. nutantibus, fruct. baccatis. Swartz. prod. 60. l. c. 2. p. 945. Hab. in fruticetis Hispaniolae. ¶

6. *mitis*, fol. ovatis, flor. axillaribus. Willd. p. 284. Hab. in India orientali. ¶

903. TÓVARIA. *Cal.* 7-phyllus, *Cor.* 7-petala. *Discus* planus, 7-gonus, stellæformis, cui *Stam.* inserta. *Stigm.* peltatum. *Bacca* 1-locularis, pulposa. *Sem.* compressa. (Numerus partium passim octonarius.)

1. *pendula*, fol. ternatis, racem. longissimis, flor. secundis. Flor. Per. 3. p. 73. t. 306. Hab. in Peruviae runcationib. et fluviumque ripis. ¶

904. PETIVERIA. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* o. *Stylus* lateralis. *Stigma* penicilliforme. *Sem.* 1; aristis quatuor reflexis apice instructum. (Stam. 6-8.)

1. *alliacea*, flor. hexandris. L. Trem. Ehr. 33. t. 67. P. fol. oblongo-ovatis, spicis longis terminalibus. Brown. jam. 274.

*β. octandra* Jacq. amer. 101. Plum. gen. 50. ic. 219. Hab. in Jamaic. nemorosis aridis. h

905. **PANCOVIA.** *Cal.* campanulatus, 4-partitus. *Pet.* 5, unguiculata, plicato-crispa, dentata, cucullata. *Stam.* adscendentia; calyce longiora.

1. *bijuga*. Willd. Sp. II. p. 285. Hab. in Guinea. Arb. ramulis ferrugineo-pubescentibus. Fol. alterna, pari-pinnata. Racemi interfoliacei multiflori. W. h

906. **ÆSCULUS.** *Cal.* 1-phyllus, ventricosus. *Cor.* 4. s. 5-petala, inæqualis, pubescens, calyci inserta. *Caps.* 3-locularis. *Sem.* magna castaneaformia.

\* *Capsulis echinatis, cor. 5-petala planiuscula.*

1. *Hippocastanum*, fol. digitatis septenis, cor. pentapetalis patulis. Willd. Sp. p. 285. *β. inermis*, fruct. nudiusculo, fol. variegatis. Enc. bot. 3. p. 712. Hab. sponte in Asia septentrionaliore. Flor. polygami. h

\*\* *PAVIA, cor. 4-petala, connivente, caps. laevibus.*

2. *Pavia* (rubra), fol. quinis glabris petalis obovatis, unguibus longitudine calycis. Ait. Kew. 1. p. 404. *Pavia*. Boerh. lugdb. 2. p. 260. t. 260. Trew. ehret. *Pavia* rubra. Enc. bot. 5. p. 94. Hab. in Carol., Florida, Brasilia. h

3. *lutea*, fol. quinatis subtus ad costam pubescentibus aequaliter serrulatis, corollis tetrapetalis, petalor. unguibus calyce longioribus. Willd. p. 285. (Ac. flava.) Ac. *lutea*. Wangenh. Act. Soc. Berol. 8. p. 133. t. 6. Hab. in Carolinae montib. excelsis. In solo pingui ad altitudinem Ae. Hippocastani assurgit. Michaux.

4. *macrostachys*, humilis, foliol. quinis subtus subtomentosis, spica tenui longissima. Michaux. Flor. 1. p. 220. Ae. parviflora. Walt. Ae. nana. H. P. Hab. ad ripas Ammis Savannah. 3-4-petalis. Flor. albi, plerumque heptandri. Arbusc. stolonifera. M.

907. **PETROCARYA.** *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 14, quorum 7-sterilia. *Drupa* carnosae, cribrosa. *Nux* bilocularis, loculis monospermis.

1. *montana*, foliis ovatis acuminatis.

Willd. p. 287. *Parinari montana* magno fructu. Aubl. guj. 1. p. 514. t. 204, 205. Hab. in sylvis interioris Gujanae. h

2. *campestris*, fol. cordatis acuminatis. Willd. *Parinari* fructu parvo. Aubl. p. 517. t. 206. Hab. in sylvis Gujanae. h

908. **IONESIA.** *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. tubo clauso carnosae, limbo 4-fido. *Nectar.* annulus faucis tubi corollae insertus, staminiferus. *Legumen.*

1. *pinnata*. Roxb. Asiat. Researches. 4. p. 355. Rheed. 5. t. 59. Habit. in India orientali. Arb. mediocri. Flor. auranti cymosi. Legum. acinaciforme. h

## DIGYNIA.

909. **LIMEUM.** *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, aequalia. *Caps.* globosa, 2-locularis.

1. *africanum*, fol. oblongis petiolatis. Lin. suppl. 214. Hab. ad Cap. b. spei, cum 2 sequentibus. Statura *Corrigiolae* s. *Tephelii*. T

2. *capense*, fol. ovatis sessilib. Thunb. prod. p. 68. L. aphyllum. Lin. suppl. 214.

3. *aethiopicum*, fol. lineari-lanceolatis. Thunb. prod. 68.

## TETRAGYNIA.

910. **ASTRANTHUS.** *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriformis, limbo 14-fido. *Sem.* 1, parvum, superum.

1. *cochinchinensis*. Loureiro cochin. 1. p. 274. Willd. Sp. II. p. 291. Hab. in Cochinchina. Arbor. ramis paucis adscendentibus. Fol. ovata serrata lanuginosa alterna. Spicae longae simplices axillares. L.

911. **SAURURUS.** *Cal.* amentum squamis 1-floris. *Cor.* o. *Germ.* 4. *Baccæ* 4, 1-spermae.

1. *cernuus*, caule folioso polystachio. Lam. ill. t. 1. Mathuskea. Gm. syst. p. 589. Pluck. alm. 343. t. 117. f. 3. 4. Hab. in Virginia. Stamina vix numerantur, nisi deflorato amento persistentia. L.

## HEPTAGYNIA.

912. **SEPTIAS.** *Cal.* 7-partitus. C c 2

*Petala 7. Germina 7. Caps. 7, polyspermæ.*

1. *capensis*. L. Andrew. t. 90. Lam. ill. t. 276. *Crassula Septas*, fol. connatis crenatis subrotundis, caule subaphyllo umbellifero. Thunb. prod. 57. Hab. ad Cap. b. spec. Rad. tuberosa.

913. **ACTINOPHYLLUM**. *Cal. margo integer. Cor. calyptræformis, desiliens. Bacca 7-angularis, 7-locularis. Sem. solitaria subossea. (Flor. conglomerati. Styl. 5-7. Stam. etiam 5, 6, 8, 9.)*

1. *angulatum*, arboreum, foliosis 7-11-nis, cor. obovatis angulatis truncatis. Flor. Per. 3. p. 73. t. 307. Hab. in Peruviae collib. nemoros. Arb. spectabilis.

2. *pedicellatum*, scandens, foliol. 9-13-nis, racemis septenis, flor. pedicellatis umbellatis, cor. hemisphaericis. Flor. Per. l. c. t. 303. In Peruviae nemorib. ad Munna tractus. Gummi crystallinum uti ex priore exsudat. h

3. *canicum*, scandens, foliol. 7-13-nis, racem. ternis binisque, corol. conicis. Flor. Peruv. p. 75. t. 309. In Peruv. nemoribus. Bacca globosa, hyacinthina.

4. *acuminatum*, scandens, foliol. 7-11-nis, racem. 2-5-nis, corol. acuminatis: acumine obliquo. Flor. Peruv. t. 310. Cum priore. Frut. scandens. Recept. flor. favosum.

5. *pentandrum*, erectum, foliol. 7-11-nis, racemis solitariis ternisque, corol. conicis obtusis. Flor. Per. p. 73. t. 311. Bacca 5-gona, albicans.

914. **GILIBERTIA**. *Cal. 7-dentatus. Cor. 7-petalus. Stigm. patentia, ovata. Caps. loculamenta, 1-sperma, in stellæ formam disposita. Sem. oblonga. (Numerus partium interdum 8-9-narius.)*

1. *umbellata*, fol. oblongis obsolete denticulatis. Flor. Peruv. 3. p. 75. t. 312. Hab. in Peruviae nemorib. Munna. Arb. 3-ulnaris. Caps. et cortex parum aromatica. *Polysciue* Forst. valde affine genus. l. c.

## M O N O G Y N I A.

*Cassia. Pelargonium. Dracontium, Calla, Houltuynia, secundum Willdenow.*

## D I G Y N I A.

*Polygonum orientale et alia. Aponogeton. Lin.*

## H E P T A G Y N I A.

*Phytolacca stricta,*



C L A S S I S V I I I .  
O C T A N D R I A .

M O N O G Y N I A .

915. *TROPEOLUM*. *Cal.* 1-phyl-  
lus, 5-fidus, calcaratus. *Pet.* 5,  
inaequalia. *Nuc.* coriacaë, sulcataë.  
*Sem.* 1, subrotunda.

1. *minus*, fol. peltatis subrepandis mucronatis, petalis acuminato-setaceis. L. Willd. Sp. II. p. 268. Curt. mag. t. 68. Hab. in Peru. Var. flor. pleno, quae perennat. ☉ T

2. *majus*, fol. peltatis, repandis, petalis obtusis. E. Peru in Europam venit 1684.

3. *hybridum*, fol. subpeltatis, quinquelobis integerrimis, petalis variantibus. L. Mant. p. 64. Berg. act. holm. 1764. p. 32. t. 1.

*Obs.* A praecedente orta Holmiae semine varius, sed ramis propaganda planta. Fol. latius cuneata, nutantia, margine omni ascendente, hinc fere cucullata. L.

4. *peruvianum*, fol. peltatis palmato-quinquelobis basi excavatis, petal. inferioribus ciliatis, superioribus incisissimis. Flor. Peruv. 3. p. 75. Jacq. Schoenbr. 1. p. 51. t. 68. Hab. in Peru ubi ornamenti gratia colitur. Flor. in Peruvia non dentata. l. c. ☉

5. *bicolorum*, fol. peltatis septem-lobis basi transversim truncatis, petal. inciso-ciliatis. Flor. Per. l. c. t. 313. Hab. in Andium nemorib. humidis. Petal. 2-superiora lutea minora, 3-inferiora coccinea punicea.

6. *dipetalum*, fol. supeltatis sextemlobis, cor. dipetala, petal. spathulatis crenulatis.

Flor. Per. 3. p. 77. t. 313. In Andium montibus. Succosum, subglaucum. T

7. *tuberosum*, fol. peltatis quinquelobis basi transversim truncatis, petal. dentatis cal. fere longitudine. Flor. Per. t. 314. Copiose in Peruviae praeruptis incolae radices, tuberoso-pendulas, coctas quotidie comedunt.

8. *ciliatum*, fol. peltatis palmatis sexlobis, stipul. bracteolisque ciliatis, petal. integerrimis cal. subaequantibus. Flor. Per. p. 77. Hab. in R. chilensis sylvis. Caul. filiformis, nitidus, ramosissimus.

9. *pentaphyllum*, fol. digitato-quinatis : foliol. ovalibus integris subpetiolatis, petal. omnibus sessilibus brevibus acutis integerrimis. Lam. enc. t. p. 605. Ejusd. ill. t. 277. f. 2. Hab. ad Monte-Video. Pet. cal. breviora.

10. *polyphyllum*, caul. prostrato, petiol. elongatis alternis polyphyllis (fol. digitato 5-10-phyllis). Cav. ic. 4. p. 65. t. 365. Hab. in chilensi Monte-Cordillera. Foliola in orbem expansa : majora dentata. Pet. cal. longiora. ☉

916. *MAGALLANA*. *Cal.* 3-partitus, calcaratus. *Petala* 5, inaequalia. *Fruct.* trialatus, monospermus (per abortum). *Sem.* oblongum. (*Filam.* basi breviter coallita.)

1. *porifolia*, caul. herbaceo scandente, fol. alternis trifidis, flor. axillaribus. Cav. ic. 4. p. 51. t. 374. Hab. in Amer. meridionali. Flor. lutei. Hoc genus navigatori celeberrimo Ferd. Magallano consecratum est.

917. *OSBECKIA*. *Cal.* 4-fidus: lobis squama ciliari interstinctis. *Cor.* 4-5-petala. *Antherae* rostratae. *Caps.* 4-5-locularis, calycis tubo truncato cincta. *Receptac.* compressum, semi-ovatum. *G.* (Stam. 8-10.)

1. *chinensis*, fol. sessilibus, calycib. glabris. Willd. Sp. II. p. 300. O. pedunc. trifloris bracteatis. Lin. suppl. p. 215. Lam. ill. gen. t. 283. Osbeck. it. 213. t. 2. Hab. in China. Caul. brachiatus. Fol. angusto-lanceolata, trinervia.

2. *zeylanica*, fol. petiolatis, cal. hispidis. Willd. O. pedunc. unifloris nudis. Lin. suppl. O. chinensis. Gaertn. de fr. 2. p. 202? Pluck. alm. 142. t. 173. f. 4. Hab. in Zeylona. Fol. lineari-lanceolata, ut tota planta, strigosa. W.

*Obs.* Osbeckiae a Rhexiis differre videntur germine infero, quum capsula Rhexiae calyce inclusa. Willd., a *Melastomis* non satis distinctae, et potius cum iis conjugendae. Lam. enc. bot. 4. p. 647.

918. *RHEXIA*. *Cal.* urceolatus, 4-5-fidus. *Pet.* 4, calyci inserta, obliqua. *Antherae* declinatae. *Caps.* setosa, 4-locularis, intra ventrem calycis. *Receptac.* sub-lunatum. *Sem.* numerosa, cochleata. (Stam. etiam 10.)

\* *Foliis sessilibus plerisque.*

1. *virginica*, caul. alato subpiloso, fol. sessilib. sub-lanceolatis trinerviis serrato-ciliatis, calycib. glanduloso-ciliatis. Willd. Sp. II. p. 301. Michaux. Flor. p. 222. Pluck. alm. 235. t. 202. f. 8. *β. septemnervia.* Walter, statura majore, fol. 5-7-nerviis (in inundatis). Hab. in Amer. boreali. Caul. angulis membranaceis. T.

2. *mariana*, caul. hirsutissimo, fol. sessilibus lanceolatis trinerviis villosis-ciliatis, cal. stellato-pilosis. Willd. Michaux. t. p. 221. Lam. ill. t. 283. f. 1. Pluck. mant. 123. t. 428. f. 1. Hab. in Marilandiae pratis. Var. fol. purpureis et rubellis, fol. plus minusve latioribus.

3. *trichotoma*, flor. solitariis axillaribus terminalibusque, fol. sessilibus oppositis lanceolatis hirsutis. Vahl. symb. 2. p. 48. Roth. pl. surinamensis. p. 9. tab. 5. Hab. Surinami. T.

*β. exaltoida*, fol. linearibus, flor. pallidis. Michaux. R. lanceolata. Walter.

4. *petiolata*, fol. subovatis trinerviis ciliatis petiolatis, caps. globosis, anther. nullis. Walt. corol. p. 130. Hab. in Carolina.

5. *ciliata*, caul. subquadrangulo glabro, fol. parvulis subpetiolatis ovalibus subtus glabris, supra parce hispidulis, margine ciliatis, flor. involucria. Michaux. l. c. Hab. in Carol. infer. Flor. violaceo-purpurei. Affin. priori.

6. *lutea*, caul. 4-angulo hirsuto, fol. inferioribus cuneato-oblongis obtusis; superiorib. lanceolatis. Michaux. p. 222. Walt. l. c. Hab. in Florida et Georgia. Flor. lutei. Anth. breviusculae uti in priore. M.

7. *Alifanus*, foliis subovatis cauleque erecto sublaevibus, cal. corollaeque glanduloso-pilosis. Walt. corol. p. 130. Hab. in Carolina.

8. *glabella*, caul. cylindraceo glabro, fol. sessilibus erectis lanceolatis laevibus glabris integris, flor. brachiato-subpaniculatis, cal. hirsuto-glutinosus. Michaux. t. p. 223. In Carol. et Georgiae sylv. Flor. majusculi, dilute purpurascentes. Priori affinis.

9. *Jussiacoides*, pubescens. fol. lanceolatis alternis constatis margine scabris. Lin. suppl. 215. Hab. in Surinamo. Fol. margine scabra ex minutissimis serraturis. T.

10. *bivalvis*, decandra, fol. sessilibus glabris ovatis obtusis trinerviis, capsula bivalvi. Willd. p. 302. Vahl. eclog. t. p. 38. Melastoma bivalvis. Aubl. guj. t. p. 404. t. 155. f. 4. Hab. in pratis paludosis Gujanac. ©

11. *trivalvis*, decandra, fol. sessilibus glabris lineari-lanceolatis acutis, obsolere trinerviis, capsula trivalvi. Willd. Vahl. eclog. t. p. 39. M. trivalvis. Aubl. guj. t. p. 406. t. 155. f. 6. Hab. in pratis paludosis Gujanac. ©

\*\* *Fol. petiolatis.*

12. *hypericoides*, decandra, villosissima, fol. ovatis acutis integerrimis brevissimis petiolatis septemnerviis, panicula terminali. Willd. p. 303. M. villosa. Aubl. guj. t. p. 428. t. 168. Hab. in pratis humidis Cajennae. Facies Hyperici montani. ©

13. *glutinosa*, fol. oppositis trinerviis laevibus, flor. thyrsoides. Lin. suppl. p. 216. Mutis. amer. v. t. 6. Hab. in N. Granada. Melastomis similis, ramulis articu-

latis. Summitates ramulorum et calyces glutinosi. L.

14. *quinquenervis*, fol. ovatis acutis quinquenerviis, pedunc. dependentibus subcorymbosis, petal. convolutis. Flor. Peruv. 3. p. 83. t. 318. f. 6. Hab. in Peruviae montibus et collibus. Petal. violacea. h

15. *rosmarinifolia*, fol. subpetiolatis oblongo-linearibus trinerviis, margine revolutis, pedunc. 3-5-floris pendulis, petal. convolutis. Flor. Peruv. t. 318. Hab. in collib. ventosis, aridiusculis. Petal. violacea, nocte et mane patentia.

16. *lutescens*, fol. ovatis trinerviis rugosis, pedunc. trifloris pendulis, petal. convolutis. Flor. Peruv. p. 84. t. 319. Cresc. in montibus, locis pluviosis. Flor. latescentes passim 10-andri. h

17. *dicrananthera*, fol. ovatis 5-nerviis, pedunc. subcorymbosis, petal. patentibus. Flor. Peruv. t. 320. Hab. in Peruviae sylvis. R. villosae affinis. Petal. rosea.

18. *echinata*, fol. ovatis 5-nerviis subtus lanuginosis supra echinatis, pedunc. 1-3-floris: petal. magnis patentissimis. Flor. Peruv. 3 p. 85. t. 319. Hab. in collib. albis, ventosis. Flor. violacei, 10-andri. h

19. *recurva*, fol. petiolatis ovatis minimis, caul. 4-angulari articulato apice recurvo, flor. terminalibus subsolitariis. Poirr. in Enc. bot. 6. p. 6. Hab. in Cajenna. Stam. exserta. Anth. versatiles.

20. *flexuosa*, hirsutissima, fol. lanceolatis serrulatis 5-nerviis, pedunc. corymboso-dichotomis, petal. reflexis. Flor. Peruv. p. 85. t. 320. In Peruv. runcationibus. Pet. parva, alba.

21. *ochypetala*, hirsuto-hispida, foliis lanceolatis 5-nerviis, pedunc. trifloris, petal. patentissimis acuminatis. Flor. Peruv. p. 86. t. 321. Hab. in montibus apertis, praeceptis. Petal. purpurea acumine parvo. Flor. bract. 2, caducis tecti, 10-andri. h

22. *glomerata*, foliis petiolatis ovatis integerrimis trinerviis villosis, flor. terminalibus glomeratis. Willd. p. 304. Rothb. pl. surinamens. p. 8 t. 4. Hab. in Surinami pratis depressis.

23. *longifolia*, decandra, pilosa, foliis lanceolatis integerrimis quinquenerviis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis fol. brevioribus. Hab. in America meridionali.

24. *aspera*, decandra, foliis petiolatis ovatis quinquenerviis, calyce squamoso-bracteato. Willd. Tibouchina aspera. Aubl. guj. 1. p. 446. t. 177. Hab. in arilib. Gujanae. Calyx squamis imbricatis tectus. h

25. *uniflora*, fol. petiolatis ovatis serratis, flor. axillaribus solitariis decandris, caule alato dichotomo. Hab. in Cajenna. Caul. herbaceus, viscosus. Fol. margine e pilis glandulosis ciliato serrata. Capsulae Coriandri.

26. *inconstans*, fol. ovatis hispidis, setis adpressis, subtus incanis trinerviis, pedunc. terminalibus subunifloris. Osbeckia ornata. Swartz Fl. ind. occid. 2. p. 647. Hab. in summo monte Montansery St. Christophori. h

27. *latifolia*, fol. petiolatis subrotundis acutis quinquenerviis hirsutis, pedunculis terminalibus unifloris. Willd. p. 305. Aubl. gujan. 1 p. 336. t. 129. f. 2. Hab. in pratis Gujanae.

28. *villosa*, fol. petiolatis subrotundo-ovatis acutis quinquenerviis villosis, flor. geminis terminalibus subsessilibus. Willd. Aubl. 1. c. p. 334. t. 129. f. 1. Cum priore in pratis.

29. *aquatica*, foliis oppositis cordatis crenulatis hirsutijsculis, panic. terminalibus trichotomis, ramulis filiformibus patentissimis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 650. Melastoma aquatica. Aubl. p. 430. tab. 169. Hab. in inundatis Cajennae, Surinami, Jamaicae, Dominicae. h

ONACRÆ. (Gen. 918-922.) Cal. superus, tubo longo distinctus: limbo 4-5 persistente, aut deciduo. Petala summo calyci inserta, flaccida. Stam. numero varia: 2, 4, 6, 8, 10 et plura. Fructus plerumque inferus, est vel capsula, aut bacca, aut drupa, ut plurimum polysperma, 1-multilocularis. Fol. alterna, aut opposita. Caul. herbaceus vel frutescens.

919. OENOTHERA. Cal. tubulosus: 4-fidus, laciniis deflexis deciduis. Petala 4, cal. inserta. Stigm. 4-fidum. Caps. 4-locularis, 4-valvis, infera. Sem. nuda, receptaculo centrali, 4-gono affixa.

\* Caps. elongatis teretibus sessilibus.

1. *biennis*, fol. ovato-lanceolatis planis caule muricato-villoso, caps. conicis deor-

culm subturgidis. Mill. ic. t. 89. f. 2. Flor. dan. 446. Lam. ill. t. 219. f. 1. Hab. in Virginia. unde 1614. nunc vulgaris in Europa. Stam. coroll. breviora. W. ♂

2. *suaveolens*, foliis ovato-lanceolatis obsolete dentatis, caps. elongatis crassitudine subaequalibus, cor. magna. Hab. in America. Col. in hort. ob odorem aurantium et magnitudinem florum. Oen. grandiflora. Ait? Antecedente omnib. partibus major. Caps. sulcatae, deorsum subcrassiores.

3. *parviflora*, foliis ovato-lanceolatis planis, caule laevi subvillosa, staminibus cor. longioribus. Willd. Sp. II. p. 306. Mill. ic. 189. f. 1. Hab. in America septentrionali. Fructus apex margine octifido, nec quadrifido. Caul. ruber, scaber. L. ♂

4. *muricata*, fol. lanceolatis planis, caule purpurascens muricato, stamin. longitudine corollae. Willd. Murr. in N. Comment. Goett. VI. p. 24. t. 1. Habitat in Canada. Similis antecedenti, sed fructus os non 8-fidum. L. ♂

5. *longiflora*, fol. denticulatis, caul. simplicibus pilosis, petalis distantibus bilobis, flor. tubo longissimo. Jacq. hort. t. 172. Curt. magn. 305. Habitat in agro Bonariensi. Petala flava, biloba, post anthesin rubescunt. Caps. hirsutae. ☉ ♂

6. *mollissima*, fol. lanceolatis undulatis, tomentosis. Dill. elth. 297. t. 219. f. 286. Hab. in agro Bonariensi, et R. Chilensis campis. Petal. primo flava dein purpurea. ☉

7. *nocturna*, fol. lanceolatis repandodentatis pubescentibus, caule tereti pubescente. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 455. Collect. 3. p. 205. Lam. ill. t. 279. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Fruct. ovato-oblongus. Cor. praecedentis, petalis flavis, dein rubicundis. ☉

8. *villosa*, fol. lanceolatis villosis, caule angulato hirsuto. Thunb. prod. 75. Cum priore. †

9. *prostrata*, fol. sublanceolatis acutis dentato-sinuatis, caps. linearib. obtuse 4-gonis coronatis-curvatis. Flor. Per. p. 79. t. 315. Hab. inter Peruv. segetes. Petal. latea purpureaque, obtordata. Affinis videtur Oc. sinuata.

10. *sinuata*, decumbens mollior pubescens, fol. lanceolatis dentato-sinuatis (incisis), flor. axillaribus villosis. Michaux. Flor. t. p. 224. Murray in comm. Goett. 5. t. 9. In Amer. bor. aridis.

11. *tenella*, fol. linearis-obovatis, caps. cylindricis curvatis. Flor. Per. t. 316. Cav. ic. 4. p. 66. t. 366. f. 2. Hab. in R. Chil. campis. Pet. purpurea, cal. duplo longiora.

12. *odorata*, fol. linearilanceolatis subdentatis undulatis, caule villosa suffruticoso. Jacq. ic. rar. 3. t. 456. Collect. suppl. 107. Hab. in Patagonia. Fol. rigida. Flor. magnitudine Oc. longiorae. W.

13. *tenuifolia*, fol. inferiorib. oblongis, superiorib. linearibus, caps. cylindricis rectis, petal. crenulatis. Flor. Per. p. 81. t. 317. Cav. ic. 4. p. 67. t. 397. Onagra linearifolia. Few. 3. t. 34. Hab. in collib. siccis, campis. Pet. albedo-purpurea. Flor. Per., luteo-rubra. Cav.

14. *dentata*, fol. sublinearibus denticulatis, cap. cylindricis angustissime curvatis. Flor. Per. p. 82. t. 317. Oc. caps. tenuissimis tetragonis. Cav. ic. 4. p. 67. t. 392. Hab. in arvis, segetib. locis arenosis. Pet. obovata, obsolete crenulata lutea.

\*\* Caps. ventricosae angulatis quibusdam pedicellatis.

15. *acaulis*, fol. pinnatifidis: lacinia terminali majore denticulata. Cav. ic. 4. p. 60. t. 399. Oc. *grandiflora*, fol. interrupte pinnatis pinnatifido-lyratisque, caps. sessilibus obovatis 4-gonis alatis. Flor. Peruv. 3. p. 78. t. 318. Hab. in N. Chilensis arvis et ruderalis. Pl. initio florescentiae acaulis, postea caulescens. Pet. alba. Fl. Per. l. c. ♂

16. *virgata*, fol. lyratis lanceolatisque dentatis, caps. pedunculatis clavatis. Flor. Per. p. 29. t. 315. Hab. in Peruviae segetib. et ruderalis. Flor. subpaniculati, purpurei. Var. fol. vix incisae.

17. *tetraptera*, (mutabili) fol. lanceolatis basi pinnatifido-dentatis, capsulis pedicellatis obovatis quadrilatis. Willd. p. 399. O. foliis alternis subpinnatis crispis, flore mutabili, fructu tetraptero. Cavan. ic. 3. p. 40. t. 279. Hab. in Sotoluca N. Hispaniae. Flores maximi, candidi, post florescentiam purpurei. ¶

18. *glauca*, fol. lato-ovalibus repandodentatis laevigatis glaucis, caps. ovato tetragona. Michaux. 1. p. 224. Hab. in Americae boreal. sylvis.

19. *hybrida*, caul. erecto villosa, fol. utrinque pubescentibus lanceolatis remote dentatis undulatis, caps. subsupicatis ovato-tetragonis subsupiciatis. Michaux. p. 225. Hab. in Carol. superiore.

20. *fruticosa*, fol. lanceolatis subdentatis acutis, capsulis pedicellatis oblongo-clavatis angulatis. Willd. p. 310. Curt. mag. t. 332. Hab. in Virginia. Flor. magni, aurei. Cal. purpurascens. Flor. lutei.

21. *pumila*, fol. lanceolatis integerrimis obtusis, capsulis pedicellatis elliptico-obovatis angulatis. Willd. Curt. mag. t. 355. Hab. in America septentrionali. Petala lutea, obcordata, lineata. Caps. octangulares.  $\frac{1}{2}$

22. *rosea*, fol. ovatis utrinque attenuatis dentatis, capsulis pedicellatis oblongo-obovatis angulatis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 3. Oe. purpurea. Enc. bot. 4. p. 554. Oe. rubra. Cav. ic. 4. p. 68. t. 400. Hab. in Peru. Pet. rubra.  $\frac{1}{2}$

23. *purpurea*, fol. glaucescentibus glabris lanceolatis integerrimis utrinque attenuatis obtusis, caps. sessilibus ovatis angulatis. Willd. O. foliis ovato-lanceolatis glaucescentibus integerrimis, caps. sessilibus, stigm. atropurpureo. Curt. mag. t. 352. Hab. in America boreali. Pet. purpurea. Caul. semipedalis. Folia glauco-viridia. W.

24. *pusilla*, minutum pubescens, caul. simplici, fol. lanceolato-oblongis obtusiusculis integris, caps. sessilibus obovato-turbinate subaequaliter 8-gonis. Michaux. 225. Hab. in rupibus ad lacus Mistassins. Pl. 4-6-uncialis. Flor. ad summitatem axillares. M.

25. *chrysantha*, caul. debili subpubescente, fol. lanceolatis obtusiusculis planis integris, caps. sessili clavata acutangula. Michaux. p. 225. Cresc. a Quebec ad sinum Hudsonis, Subpedal. Flor. parvi aurei. M.

26. *linearis*, pubescens gracilis, fol. linearibus, caps. stipitatis subrotundo-4-gonis villosis. Michaux. Hab. in Carol. superiore.

27. *subulata*, fol. subulatis, caps. clavatis 4-gonis superne alatis. Flor. Per. 3. p. 82. t. 316. Hab. in Chili apricis, arvis. Petal. bifida, purpureo-rubra.

29. *GAURA*. Cal. 4-fidus, tubulosus. Cor. 4-petala, ascendens versus latus superius. Nux. infera, 1-sperma.

1. *biennis*, fol. lanceolatis dentatis, pet. obovatis ascendentibus patulis, stylis staminibusque deflexis, caule herbaceo.

Willd. Sp. II. p. 311. Michaux. Flor. 1. p. 226. Curt. mag. t. 339. Flor. spicato-corymbosi, rubelli. Hab. in Virginia, Pennsylvania.  $\frac{1}{2}$

2. *angustifolia*, fol. linearibus confertis, repando-undulatis, spicae fructib. dissitis oblongo-4-gonis utrinque acutis subcandicantibus. Michaux. l. c. Hab. in Carol. inferiore. Flor. duplo minores.

3. *fruticosa*, fol. lineari-lanceolatis denticulatis, petalis obovato-lanceolatis ascendentibus adpressis, stylis staminibusque rectis, caule fruticoso. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 457. Collect. 1. p. 142. Hab. in Amer. meridionali.  $\frac{1}{2}$

4. *mutabilis*, fol. ovatis dentatis, pet. ovatis acutis cruciatim patentibus, stylis staminibusque rectis, caul. fruticoso. Willd. Cav. ic. rar. 3. p. 30. t. 258. Curt. mag. t. 388. Hab. in N. Hispania. Cor. flava post anthesin rubescit. An a priore specie diversa?

5. *tripetala*, fol. lanceolatis subdentatis, flor. hexandris. Cav. ic. 4. p. 66. t. 346. f. 1. G. hexandra. Ortega. Hab. in Mexico. Pet. 3, coccinea. Nux 3-gona.

291. *EPILOBIUM* M. Cal. 4-fidus; tubulosus. Petala 4. Caps. oblonga, infera. Sem. comosa. (Flor. rubelli.)

\* *Staminibus declinatis.*

1. *spicatum*, caul. elongato simplici, fol. alternis lanceolatis glabris venosis, pedunc. ebracteis, spica pyramidata. Lam. enc. 2. p. 373. E. *angustifolium*. Willd. Sp. II. p. 313. et plur. autor. Flor. dan. t. 289. Curt. Lond. ic. E. *antonianum* quorumd.

2. *latifolium*, fol. alternis lanceolato-ovatis subdentatis breviusculis aveniis, flor. inaequalibus axillaribus et terminalibus. Flor. dan. t. 565. E. frigidum. Retz. Scand. ed. 2. n. 459. Act. Haf. 10. t. 8. f. 23. Hab. in Europ. septentrionalis uliginosis?

Obs. Rad. densa, compacta. Caul. pedalis fere. Fol. vix unc. 1. longa, avenia, infima squamiformia. Flor. prioris sed non spicati.

3. *angustifolium*, caul. ramosissimo, fol. sparsis anguste linearibus aveniis, pedunc. unibracteatis. Lam. l. c. 374. F. *angustissimum*. Ait. Willd. rosmarinifolium. Haenke. Moris. 6. 3. t. 11. f. 2. Hab. in Groenlandia, inque alpinis.  $\frac{1}{2}$

**\*\* *Staminibus erectis regularibus.***

4. *hirsutum*, caul. ramoso, fol. oppositis lanceolatis serratis decurrenti-amplexicaulibus. L. Flor. dan. t. 326. Curt. Lond. ic. E. amplexicaule. Lam. enc. l. c. Hab. ad latera rivulorum. Cor. calyce duplo major. Stigm. crassum 4-fidum.

\* *incanum*, totum incanum, caul. ramossissimo, fol. subamplexicaulibus lanceolatis dentatis, stigm. crasso 4-fido. E. *tomentosum*. Vent. Hort. Cels. p. 90. t. 90. Habit. ad margin. rivulorum in oriente. Præter canitiem albicantem et patriam alienam a priori non diversum. An tantum varietas?

5. *pubescens*, fol. (mediis) oppositis lanceolatis subpetiolatis pubescentib., caul. villosio simplicissimo. Roth. germ. II. 435. Flor. dan. t. 347. E. villosum. Curt. Lond. ic. E. parviflorum. Hoffm. E. molle. Lam. enc. 2. Moris. 6. 3. t. 11. f. 4. Hab. ad fossas et in pratis. T.

6. *villosum*, fol. alternis lanceolatis serratis hirsutis. Thunb. prod. 75. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *montanum*, fol. subpetiolatis oppositis ovatis dentatis, stigm. 4-partito. Smith. brit. 1. p. 410. Flor. dan. t. 922. Curt. l. c. t. 14.

β. *alpestre*, foliis oppositis alternisque ovatis denticulatis subsessilib. glabris, caul. simplicissimo obtusangulo, flor. axillaribus subsessilibus, caps. utrinque attenuatis tetragonis. Schmidt. bohém. n°. 377. Hab. in montosis, nemorosis, ad muros etc.

γ. *trigonum*, caul. simplice obsolete trigono, fol. ternis ovatis dentatis sessilibus. Hab. in Silesia et in Helvetia. Ludw. E. alpestre? Schleicher. An E. *alpestre* Schmidt bohém. diversum?

8. *roseum*, fol. oppositis alternisque ovato-lanceolatis petiolatis serratis glabris. Roth. germ. 2. p. 458. Schreb. Sp. p. 147. E. *roseum*, fol. petiolatis ovatis dentatis, caul. subtetragono, stigm. indiviso. Smith. brit. 1. p. 411. Hab. in uliginosis ad margines rivulor. Caul. (ramosus), superne villo candido obiectus. R., incanus. S. Flor. parvi carnei. Stigm. clavatum. S.

9. *glabellum*, fol. oblongis dentatis obtusis, imis oppositis, caule teretiusculo erecto. Forst. prod. n°. 160. Hab. in N. Zealandia.

10. *denticulatum*, fol. sublanceolatis

denticulatis: inferiorib. oppositis, petal. aequalib. bifidis. Flor. Per. 3. p. 78. t. 314. Hab. in Peruv. et chilens. ripis. Pet. rosea. Suffruticosum.

11. *rotundifolium*, fol. oppositis subrotundis denticulatis. Forst. prod. n°. 161. Hab. in N. Zealandia.

12. *tetragonum*, fol. lanceolatis denticulatis, imis oppositis, caule ramoso tetragono, stigm. indiviso. Smith. p. 412. Flor. dan. t. 1029. Curt. Lond. 23.

β. *obscurum*, fol. oppositis alternisque, lanceolatis glabris serratis basi decurrentib. Schreb. Hab. in palustribus. Stigm. clavatum. S.

13. *palustre*, fol. sessilibus lanceolatis subdenticulatis, caul. tereti ramoso, stigm. indiviso. Smith. brit. 1. p. 413. Engl. bot. t. 346. Hab. in palustribus. Stigm. lineare, indivisum.

14. *origanifolium*, fol. oppositis ovatis acutis subdentatis, caul. basi erecto glabro. Lam. enc. 3. p. 576. Hab. in alpestribus Sequente, quacum confunditur, major. Fol. ferme aequalia, infima minora.

15. *alpinum*, fol. oppositis ovato-lanceolatis integerrimis, siliquis sessilibus, caule basi repente. L. Flor. dan. t. 322. Lignif. scot. t. 10. f. 1. E. *anagallidifolium*. Lam. Hab. in alpinis ad rivulus. Racem. subtriflorus.

β? *pumilum*, caul. simplici basi incurvo subpubescente, fol. oppositis sessilib. ovato-lanceolatis acute serratis. Hab. in subalpinis. Caul. spithameus. Fol. sensim angustiora, magis rugosa. Flor. terminales, pauci.

922. FUCHSIA. Cal. infundibuliformis, coloratus, superni, deciduus. Petala (Nectar. L.) 4, fauci calycis insidentia, ejusque laciniis alternantia. Nect. glandula octosulcata. Stigm. capitato-tetragonum. Bacca oblonga, obtuse 4-gona, 4-locularis. Sem. numerosa, obovata, dissepimentis adhaerentia. (Flor. penduli.)

1. *coccinea*, pedunc. 1-floris axillaribus, cor. convoluta, fol. ternis lanceolatis. Willd. Sp. II. p. 340. Duham. Traité d'arbres. Ed. nov. t. 13. Hab. sponte in R. chilensi et ad fret. Magellanicum. Cor. violacea. β? F. *triphylla*. L.

2. *serratifolia*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. 3-4-oppositis oblongis serratis. Flor. Peruv. 3. p. 86. t. 323. Hab. in Peruv. locis subhumidis et subumbrosis. Cal. villosus, roseo-ruber. Pet. punicea.  $\bar{h}$

3. *denticulata*, pedunc. axillaribus 1-floris, fol. ternis oblongo-lanceolatis denticulatis. Fl. Peruv. p. 87. t. 325. f. a. Cresc. in ripis et praeceptis calidis. Cal. purpureus. Pet. punicea obovata.  $\odot$

4. *ovalis*, pedunc. axillarib. racemosis foliosis, fol. 3-nis oppositisque ovalibus utrinque pubescentibus. Flor. Per. l. c. t. 524. Hab. in Munnae nemorib. Flor. punicea.  $\bar{h}$

5. *corymbiflora*, pedunc. terminalib. ternis corymbosis foliosis, fol. oblongo-lanceolatis. Flor. Per. l. c. t. 325. f. b. Hab. in nemoribus, loc. umbrosis.

6. *macrostema*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. ternis ovatis subsinuato-dentatis, petal. patentibus obovatis. Flor. Per. p. 88. t. 325. f. b. Thilco. Feuill. Hist. 3. t. 47. Hab. in Chili uliginosis. Pet. caerulea. Stam. passim. 10.  $\bar{h}$

7. *decussata*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. ternis oppositisque lanceolatis obsolete denticulatis. Flor. Per. p. 88. t. 323. f. b. Cresc. in umbrosis et subhumidis. Cal. roseo-puniceus.

8. *lycioides*, fol. pedunc. axillarib. cal. laciniis reflexis, fol. ovato-lanceolatis subternis. Andrew. t. 120. Hab. in Amer. septentrionali. Bac. subglobosa nigrescens?  $\bar{h}$

9. *simplicicaulis*, pedunc. terminalib. quaternis 1-floris involucreis, fol. quaternis lanceolato-linearib. Flor. Peruv. p. 89. t. 322. Hab. in Peruviae sylvis. Bacc. pubescens. Cal. roseus pubescens.

10. *rosea*, fol. fasciculatis inaequalib. alternisque lanceolatis integerrimis. Flor. Per. p. 88. In R. chilensis praeceptis. Fol. ex eodem centro 8. Flor. rosei.

11. *excorticata*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. ovatis alternis (longe petiolatis.) Lin. suppl. p. 217. Lam. enc. 2. p. 566. Skinnera. Forst. prodr. n. 2. 161. Hab. in N. Zeelandia. Fol. subtus canescentia, enuissime serrata.

12. *apetala*, pedunc. terminalibus corymboso-umbellatis, fol. sparsis ovatis acuminatis integerrimis. Flor. Per. 3. p. 89. t. 321. Flor. magni. Cresc. in nemoribus.

923. MEMECYLON. Cal. supernus, fundo striato, margine integerrimo. Cor. 1-petala. Antherae insertae lateri apicis filamenti. Bacca coronata calyce cylindrico.

1. *capitellatum*, fol. ovatis petiolatis, umbellulis capitatis axillaribus subsessilibus. Willd. II. p. 347. Lam. (Desrousseaux) enc. 4. p. 88. et ill. t. 284. f. 1. Hab. in Zeylona.  $\bar{h}$

2. *tinctorium*, fol. oblongo-ovatis petiolatis, corymbis axillaribus. Willd. M. ramiflorum. Lam. enc. 4. p. 86. Hab. in India orientali. Fol. flavo-viridia.  $\bar{h}$

3. *grande*, fol. acuminatis. Retz obs. 4. p. 26. Hab. in India orientali. Arb. Fol. opposita. Pedunc. axillares.

4. *cordatum*, fol. coriatis subsessilibus, umb. compositis axillaribus pedunc. Lam. enc. 4. p. 89. et ill. t. 284. f. 2.  $\beta$ ? fol. minoribus amplexicaulis, fructu globoso. Lam. l. c. Habit. in insula Mauritii, in India orientali.  $\odot$

924. COMBRETUM. Cal. 4-dentatus, campanulatus, supernus. Cor. 4-petala, calyci inserta. Stam. longissima. Caps. quadrangularis: angulis membranaceis, 1-locularis. Sem. 1, oblongum. (Flor. quidam 10-andri.)

1. *laxum*, fol. oppositis, racemis laxis ebracteatis, cal. interne villosis. Willd. Sp. p. 319. Lam. ill. gen. t. 282. f. 1. Hab. in Amer. meridionali.  $\bar{h}$

2. *secundum*, fol. oppositis, racemis secundis ebracteatis, cal. glabris. Lam. ill. t. 282. f. 1. Jacq. amer. t. 176. f. 30. Ed. pict. t. 260. Hab. in fruticetis Carthag. Rami fructi et fol. fricata male olent.

3. *purpureum*, fol. ovato-oblongis calycibus nudis, spicis simplicibus secundis. Vahl. symb. 3. p. 51. C. coccineum, flor. decandris, spicis laxis paniculatis. Lam. enc. 1. p. 734. ill. t. 282. f. 2. Cristaria. Sonnerat II. 2. t. 140. Hab. in Madagascar.  $\bar{h}$

4. *decandrum (album)*, fol. oppositis oblongis acuminatis, racemis laxis bracteatis, flore longioribus, flor. decandris distichis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 43. t. 59. Hab. in montosis sylvaticis Ind. orient.  $\bar{h}$

5. *alternifolium*, fol. alternis, flor. decandris. Jacq. amer. Ed. pict. t. 260. (C. *decandrum*). Hab. in Carthageria. Fruct. ad 20 pedes scandit. h

*Obs.* Forte melius novum et distinctum efficit genus. Cal. et Cor. 5-fida. Caps. 5-alares, non rigidae. Jacq.

925. *VISMANNIA*. Cal. 4-fidus, Cor. 4-petala. Nect. squama ad basin filamentorum. Nux semilunata, compressa, monosperma.

1. *elliptica*. Vahl. symb. 3. p. 51. t. 60. Samadera. Gaertn. de fr. et sem. 2. p. 352. t. 156. f. 3. Hab. in India orientali. Arb. Fol. alterna elliptica. Flor. umbellati. h

926. *GRISLEA*. Cal. 4-fidus. Pet. 4, ex incisuris calycis. Filam. longissima, adscendentia. Caps. globosa, supera, 1-locularis, polysperma.

1. *secunda*, fol. petiolatis glabris, corymbis axillaribus secundis. Willd. p. 320. Hab. in America calidiore. h

2. *tomentosa*, foliis sessilibus subtus tomentosis. corymbis axillaribus patulis. Willd. p. 321. Roxb. corom. 1. p. 20. t. 31. Lythrum fruticosum. Lin. Hab. in collibus Indiae et Chinae. Cortex lacerus. h

927. *ROXBURGHIA*. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala. Nectar. foliola 4 lanceolata, medio petalorum inserta. *Antherae* geminae, e basi folii nectarii dependentes. Caps. unilocularis, bivalvis, polysperma. Sem. receptaculo spongioso inserta.

1. *Gloriosa*. R. gloriosoides. Roxb. corom. 1. p. 20. s. 32. Willd. Sp. p. 321. Habit. ad radices montium Indiae orientalis. Planta scandens media inter Liliaceas et Asclepiadaceas. Radix tuberosa. Fol. petiolata cordata. Cal. flavus cor. purpurea major. W.



*SAPINDI*. Cor. his 3-4-5-petala, quibusdam in medio villosa, s. glandulosa, aliis petal. inferiore ad unguem aucta, stam. 6-10, plerumque 8, cum petalis disco inserta. Styl. numero varius 1 aut 3. Fruct. est vel drupa, vel capsula 1-3-occa: coccul. monospermis. Plantae

sunt vel frutices aut arbores, varius herbae, fol. alternis, plerumque 1-2-3-ternatis aut pinnatis distinctae.

928. *ORNIOTROPHE*. Cal. 4-partitus. Cor. 4-petala, medio barbata. *Germen* didymum. *Bacca* 2, monospermae.

1. *integerrima*, fol. ternatis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis simplicibus. Willd. Sp. II. p. 322. Lam. ill. t. 309. f. 1. Jus. gen. pl. Hab. in insula Borbonia. h

2. *serrata*, polygama, foliis ternatis scabris, foliolis petiolatis ovatis acuminatis serratis, rac. mis simplicibus. Willd. Roxb. corom. 1. p. 44. t. 61. Hab. in montosis Indiae orientalis. h

*Obs.* In locis altis arbor evadit, in depressis frutex. Bacca comeditur, et radix adstringens contra diarrhoeam adhibetur. R.

3. *Cobbe*, fol. ternatis, foliolis petiolatis ovatis acutis serratis, subtus pubescentibus, racemis simplicibus, pedunculo tomentoso. Willd. Rhus Cobbe, fol. ternatis, foliolis ovatis acuminatis serratis, pedunc. tomentosis. L. Sp. pl. 382. Hab. in Zeylona. h

4. *Cominia*, fol. ternatis, foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis subtus pubescentibus, racemis compositis. Willd. p. 323. Schmie delia *Cominia*. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 667. Rhus *Cominia*. Sloan. hist. 2. p. 100. t. 208. f. 1. Hab. in montosis Jamaicae occident. h

5. *occidentalis*, fol. ternatis, foliolis subsessilibus, racemis simplicibus. Willd. Schmie delia. Swartz. l. c. *Allophylus* racemosus. Swartz. prod. 62. Hab. in frutetis montosis Hispaniolae. Foliola lateralia basi obliqua, subtus leviter tomentosa. h

6. *Schmie delia*, fol. ternatis, foliol. petiolatis subserratis nudis, racem. simplicibus. Schmie delia racemosa. Lin. Willd. Sp. II. p. 435. Burm. ind. t. 32. f. 1. Hab. in Ind. orient. Ram. flexuosi. Flor. digyni.

7. *rigida*, fol. simplicibus denticulato-spinosis, flor. racemosis. Sw. Fl. ind. occid. sub Schmie delia. Hab. in montosis aridis Hispaniolae. h

8. *Allophylus*, fol. ovalibus acuminatis integerrimis. *Allophylus* Zeylanicus. Lin. Hab. in Zeylona. Arb. Perscae facie. Racem. brevissimi ex alijs. L.



929. *EUPHORIA*. *Cal.* 5-phyllus. *Pet.* 5, reflexa, medio intus subvillosa. *Baccæ* 2 (altera plerumque abortiva) corticosa, tuberculata, 1-locularis, 1-sperma. (*Stam.* 6, sæpius 8. Juss. *Stam.* 7. Lam.)

1. *punicea* (Litschi), fol. pinnatis, foliol. ovato-lanceolatis utrinque glabris, baccis scabris puniceis. Lam. enc. 3. p. 573. et ill. t. 306. Litschi chinensis Sonner. it. t. 129. Dimocarpus. Willd. Sp. II. p. 346. Scytalia. Gaertn. de fr. 1. 147. Sapiindus edulis. Ait. Hab. in Ind. orient. Fruct. edulis, sapore gratus. Arb.

2. *longana*, foliolis ovato-oblongis: nervis lateralibus subtus eminentib., bacc. laeviusculis luteis. Lam. l. c. p. 575. Buchoz. ic. color. t. 99. Hab. in China. Arb. Antecedente multo procerior. Fruct. vero minores, minus boni.

930. *CUPANIA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, apice cucullata. *Stylus* 3-fidus. *Caps.* 3-locularis 3-valvis, loculis submonospermis. *Sem.* arillata.

1. *tomentosa*, foliis pinnatis, foliolis obovatis retusis, inferne ferrugineo-tomentosis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 657. Willd. Sp. II. p. 327. Trigonis tomentosa. Jacq. amer. 102. Hab. in montosis sylvaticis Hispaniolæ. Petal. 3-angularia, intus hirsuta. Jacq. h

2. *glabra*, fol. pinnatis, foliolis ovatis obtusis crenatis glabris. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 659. Hab. in montosis Jamaicae, Hispaniolæ. h

3. *Saponaria*, fol. pinnatis: foliolis oblongis attenuatis integerrimis, subtus scabris pubescentibus. Swartz l. c. 2. p. 661. Hab. in India occidentali. h

4. *laevis*, fol. pinnatis bijugis, corymbis paniculatis, fructibus obovato-truncatis triquetris. Willd. p. 329. sub Molinaea. Lam. illust. t. 305. f. 1. Hab. in insula Borbonia. Caps. obovatae triquetro-alatae.

5. *canescens*, fol. pinnatis bijugis, racemis paniculatis, fructibus ovatis. Roxb. Corom. t. p. 43. t. 60. Willd. l. c. Hab. in montosis Indiae orientalis. Panic. axillaris. Caps. trisulcata, non alata.

6. *alternifolia*, fol. pinnatis, foliolis alternis retusis, panicula coarctata. Willd.

Lam. illust. t. 305. f. 2. Hab. in ins. Borbonia. h

7. *lentiscifolia*, caul. fruticoso, fol. alternis abrupte pinnatis: pinnulis lanceolatis integerrimis, flor. paniculatis. *Guioa* lentiscifolia. Cav. ic. pl. p. 50. t. 373. Hab. in Amer. insul. Babae. Caps. 3-alatae.

*Obs.* Secundum observationes posteriores ill. Jussieu, genus Molinaea ab eo constitutum, Cupaniis inseri debet, quibus etiam adjicienda *Toulicia Aubletii*?

931. *THOUINIA*. *Cal.* 4-partitus. *Petala* 4, medio villosa. *Stigm.* 3-fidum. *Caps.* 8, monospermae, alatae.

1. *simplicifolia*, fol. simplicibus sinuato-dentatis. Poiteau in Annal. d. Mus. d'hist. natur. Fasc. 13. p. 71. Hab. in ins. Dominica. Frut. ramosissimus. Fol. castaneaeformia.

2. *trifoliata*, fol. ternatis. Poiteau, l. c. Hab. cum priore. Herb. Juss. Flor. spicati, axillares uti in priore.

932. *EPHIELIS*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala, basi squamis 2 appendiculata. *Caps.* oblonga, 1-locularis, disperma.

1. *guyanensis*. E. fraxinea. Willd. Sp. II. p. 328. Mataiba gujanensis. Aubl. guj. t. p. 331. t. 128. Lam. ill. gen. t. 298. Hab. in Gujanae sylv. Arb. 50-60-pedalis. Fol. abrupte pinnata. Panic. divaricatae.

933. *MELICocca*. *Cal.* 3-partitus. *Petala* 4, reflexa infra calycem. *Stigma* subpeltatum. *Drupa* corticosa.

1. *bijuga*. Lam. ill. t. 306. Jacq. amer. 108. t. 72. Ed. pict. t. 109. Comm. hort. t. 94. Hab. in Amer. meridionali. Arb. proceræ, elegans. Nuces comeduntur h

934. *KOELREUTERIA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 4-petala irregularis. *Nect.* squamæ 4, bifidae. *Caps.* inflata, 3-locularis, loculis dispermis.

1. *paniculata*. Duham. arb. ed. nov. t. 36. K. paullinoides. Herit. sert. angl. 18. t. 19. Sapiindus chinensis, fol. pinnatis,

foliolis lacinistis. Lin. Hab. in China. Arbuscula 8-12-pedalis. Flor. flavi.

*Obs.* Vidi in Herbario Jussieui alteram speciem, fol. ternis simpliter serratis, distinctam, prope diem cum nonnullis aliis hac ex familia, ab illo describendam.

335. HEDWIGIA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* tubulosa, 4-fida. *Caps.* tri-coeca, 3-locularis. *Nuces* solitariae.

1. *balsamifera*. Swartz. Flor. ind. occident. 2. p. 672. An *Tetragastris* ossea Gaertn. de fr. 2. p. 130. t. 2. hujus loci. Hab. in montosis sylvaticis Hispaniolae Arh. excelsa, fol. pinnatis. Racemi terminales.

*Obs.* Species tantummodo generis *Burserae* videtur, a quo solummodo numero part. fructificat. differt. Et nomen *Hedwigia* inter muscos conservandum ob viri immortalis merita in illustrandam hanc plantarum familiam.

936. AMYRIS. *Cal.* 4-dentatus. *Petala* 4, oblonga, patentia. *Stigma* subcapitatum. *Bacca* drupacea, 1-sperma, per abortum.

1. *polygama*, caule arboreo, fol. simplicibus sparsis lanceolato-ovatis integerrimis. Cavan. ic. 3. p. 20. t. 239. Willd. Sp. II. p. 333. Hab. in K. Chilensi. h

2. *Elemifera*, foliis ternatis quinato-pinnatisque subtus tomentosis. Lam. enc. 1. p. 359. Plum. ic. 100. Hab. in Carolina, et ins. Antill. h

3. *syloatica*, fol. ternatis crenatis acutis. Jacq. amer. Ed. picta. t. 188. Hab. Carthagenae, in sylvis maritimis. h

4. *maritima*, fol. ternatis crenulatis obtusis. Jacq. amer. 107. Hab. in America, in rupestris maritimis. Frut. nanus.

5. *Katuf*, fol. ternatis, apice serratis, pedunc. confertis bifidis. Vahl. symb. 1. p. 28. Forsk. descr. 80. Hab. in Arabia. h

6. *gileadensis*, fol. ternatis integerrimis, pedunc. unifloris lateralibus. L. Vahl. symb. 1. p. 28. t. 11. A. *Opobalsamum*. Forsk. aegypt. p. 79. Hab. in Arabia felice. Var. sequentis? h

7. *Opobalsamum*, fol. pinnatis: foliolis sessilibus. L. Alp. aegypt. 48. t. 60. Balessan. Bruce itin. cum ic. β. *Balsamea mecca-*

nensis. Gleditsch. Act. Soc. Nat. Berol. 3. p. 127. t. 3. f. 2. Hab. in Arabia. h

8. *toxifera*, fol. pinnatis: foliol. petiolatis 7-tenis ovatis acuminatis planis, panic. axillaribus elongata. Willd. Toxicodendrum. Catesb. 1. t. 40. In Carol.

9. *Protium*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis quinis oblongis acutis undulatis, racemis axillaribus. Willd. p. 337. *Protium javanicum*. Burm. ind. 88. Rumph. amb. 7. p. 54. t. 23. f. 1. Hab. in India orientali. Nectar. e receptaculo marginato. h

10. *dentata*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis novenis ovatis acuminatis dentatis, racemis axillaribus. Willd. Cum priore. Ab omnibus fol. margine dentato distincta. Pedunc. uniflori, elongati. W. h

11. *anisata*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis tredecimis ovato-lanceolatis obsolete dentatis inaequalibus, paniculis axillaribus. Willd. Hab. in Guinea. Similis praecedenti. Panic. corymb. pedunc. multiflori. h

12. *zeylanica*, fol. pinnatis petiolatis glabris, racemis interruptis axillaribus, flor. involucreis hexandris. Retz. obs. 4. p. 25. Hab. in Zeylone. h

13. *oleosa*, foliis pinnatis subtrijugis, flor. racemosis, bacc. ovatis ex caeruleo nigris. Lam. enc. 1. p. 362. Rumph. 2. t. 54. Cresc. in Moluccis. †

14. *balsamifera*, fol. bijugis. L. arboreus, fol. bijugatis ovatis glabris, racemis laxis terminalibus. Brown. jam. 208. Lucinium. Pluck. alm. 227. t. 201. f. 3. Sloan. jam. t. 168. f. 4. Hab. in Jamaica. h †

ICICA. *Cal.* 4-5-dentatus. *Petala* 4-5, oblonga, basi conniventia. *Stigma* capitatum, 4-sulcatum. *Drupa* coriacea, 2-4-valvis, 2-4-sperma.

15. *enneandra*, fol. ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis basi attenuatis reticulato-venosis, panic. axillaribus terminalibus racemosis. Willd. p. 335. *Icica enneandra*. Aubl. guj. 1. p. 345. t. 134. Hab. in sylvis Gujanac. h

16. *heterophylla*, fol. ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis simpliciter venosis, racemis simplicibus. Willd. *Icica Aracouchini*. Aubl. p. 343. t. 133. Cum priore.

17. *gujanensis*, fol. pinnatis, foliolis quinis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis congestis axillaribus. Aubl. guj. 1.

2. 131. *J. viridiflora*. Lam. enc. 3. p. 225. Hab. ad maris littora, in sylvis Gujanæ. h

18. *ambrosiaca*, fol. pinnatis, foliolis septenis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis multifloris subcorymbosis axillaribus. Willd. Lin. suppl. 216. Icaica heptaphylla. Aubl. t. 130. Cum priore. h

10. *decandra*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis quinque oblongis utrinque acuminatis, panic. axillaribus divaricatis. Willd. Icaica. Aubl. guj. 1. p. 346. t. 135. Hab. in sylvis maritimis. h

20. *altissima*, fol. pinnatis, foliolis septenis petiolatis oblongo-obovatis acuminatis, racemo simplici axillari. Icaica. Aubl. guj. 1. p. 342. t. 132. Le Cèdre blanc. p. ligno magis rubro. Le Cèdre rouge incol. Hab. in sylvis Gujanæ. h

937. *CEDROTA*. Cal. 6-partitus, laciniis concavis. Cor. o. Germen glandula cinctum. Fruct...

1. *longifolia*. Willd. p. 338. Aniba gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 327. t. 126. Lam. ill. t. 298. Hab. in sylvis desertis Gujanæ. Arbor. excelsa. Fol. lanceolata; reticulato-venosa. Panic. axillaris.

938. *XIMENIA*. Cal. 4-fidus. Petala 4, pilosa, revoluta. Drupa monosperma.

1. *americana*, spinosa, fol. oblongis, pedunc. multifloris. L. multiflora. Jacq. amer. 106. t. 277. f. 31. Ed. picta. t. 107. Plum. gen. 6. ic. 261. f. 1. Lam. ill. gen. t. 297. Aubl. guj. 1. p. 324. t. 125. Hab. in Amer. Flor. albidis, odore suavissimi. Fruct. lutei.

2. *elliptica*, caule inermi, fol. elliptico-lanceolatis, pedunc. multifloris. Forst. prod. n.º 162. Hab. in N. Caledonia. h

3. *inermis*, fol. ovatis, pedunc. unifloris. L. Amyris arborescens, fol. ovatis glabris; vetustioribus confertis, petiolis submarginatis, flor. solitariis. Brown. jam. 209. Hab. in Jamaica. h

939. *DODONÆA*. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Filam. brevissima. Anther. oblongæ. Caps. 3-locularis, tripartita. Sem. bina.

1. *viscosa*, foliis oblongis obtusis basi angustatis viscosis. Willd. Sp. p. 343. Trew. chret 12. t. 9. Cav. ic. pl. 4. p. 14. t. 327.

*Ptelea viscosa*. L. Sp. pl. 2. p. 173. Hab. in Jamaica et Amer. calidiore. Cal. 3-4-5-phyllus.

2. *triquetra*, fol. lanceolatis, utrinque attenuatis, ramul. triquetris, flor. dioicis. Andrew. t. 230. Willd. l. c. ? D. *triquetra*, caule fruticoso triquetro glabro, fol. alternis lanceolatis glabris, flor. cymosis axillaribus. Wendl. obs. bot. 1. 44. Hab. in N. Hollandia. Anth. (in flor. masc.) flavae. Styl. longus, rubellus. h

3. *angustifolia*, fol. linearibus margine revolutis. Lin. suppl. p. 218. Hab. ad Cap. b. spei, in India australi et in montib. Jamaicae. h

940. *VALENTINIA*. Cal. 5-partitus, coloratus, patens. Cor. nulla. Caps. baccata, tetrasperma, pulposa.

1. *illicifolia*. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 689. Plum. ic. 167. f. 2. Pluck. alm. t. 196. f. 3. Hab. in petrosis Hispaniolæ et in Cuba. Fol. alterna ovato-lanceolata, margine undulato-spinosa. Flor. subumbellati coccinei. Sw. h

941. *LAUSONIA*. Cal. 4-fidus. Petala 4. Stamina 4- parium. Caps. 4-locularis, polysperma. Sem. angulata.

1. *inermis*, ramis inermibus. L. Desf. atl. 1. p. 325. *α. alba*, fol. sessilib. ovatis utrinque acutis, petalis albis patentibus. Lam. enc. 2. p. 106. Cyprus, Henna, Alcanna. Rauw. itin. 60. t. 60. (bona.) Hab. in India, Aegypto, et Barbaria. h

Obs. Est Cyprus antiquorum, et tincturae croceae inservit, qua entis et pedum et manuum phalanges a mulieribus cantur.

β. *spinosa*, ramis sub-spinosis. L. Lam. ill. t. 226. Cyprus. Rumph. amb. 4. p. 42. t. 17. Rheed. 1. t. 40. Hab. in India. Flor. racemosi, axillares.

Obs. L. *inermis* et *spinosa* eadem species certo, quæ junior inermis, vetusta vero spinescit ramis induratis. Desf. Atl.

2. *Acronychia*, inermis, fol. longe petiolatis cuneiformibus. Lin. suppl. p. 219. Acronychia Jacq. Forst. gen. n.º 27. Hab. in N. Caledonia. Differt fol. ad insertionem subarticulatis, calyce minimo. h

3 ? *purpurca*, fol. subsessilib. lanceolatis, petalis erectis purpureo-coeruleis. Lam.

enc. 3. p. 107. Rheed. 4. t. 57. Hab. in India orientali. Flor. corymbosi terminales. h

*Obs.* Genus aliud, hinc Stam. 4, et Cor. 2-petala. Desf. l. c. p. 326.

942. MELICOPE. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Nect.* glandulæ 4, didymæ, germina cingentes *Caps.* 4, monospermæ.

1. *ternata*. Forst. prod. Forst gen. n<sup>o</sup>. 28. Lam. ill. t. 294. Entagium laevigatum. Gaertn. sem. 1. p. 351. t. 59. f. 6. Hab. in N. Zeelandia. h

943. HAGENIA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala plana. *Nect.* foliola 5, petalis quadruplo breviora. *Caps.* ?

1. *abyssinica*. Willd. Sp. II. p. 331. Lam. ill. t. 311. Cusso Bruce iter, cum ic. Hab. in Abyssinia. Arb. Fol. interrupte pinnata cum impari. Panic. nutans.

944. CARAPA. *Cal.* 4-partitus. *Pet.* 4. *Nectar.* cylindricum, octodentatum, antheras gerens. *Caps.* unilocularis, quadrivalvis. *Nuces* difformes, angulatæ, numerose.

1. *gujanensis*, fol. multijugis, foliol. oblongis acuminatis. Lam. enc. 1. p. 621. Aubl. guj. 2. p. 32. t. 337. Lam. illust. t. 301. Willd. Sp. II. p. 331. Habit. in Gujanæ sylvis. Arbor simillima Guarcæ, ex maximis. Ex nucibus oleum: *huile de carapa* præparatur.

2. *molluccensis*, fol. subtrijugis, foliol. ovato-acutis. Lam. l. c. Rumph. 3. p. 92. t. 61.  $\beta$ . fol. acutioribus. t. 62. Hab. in ins. Molucc. ad oras maris. Fruct. granata refert. +

945. GUAREA. *Cal.* 4-dentatus. *Petala* 4. *Nectar.* cylindricum, ore Antheras gerens. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* solitaria.

1. *trichilioides*. Lin. Cavan. diss. 7. p. 366. t. 200. Jacq. amer. 126. t. 176. f. 37. Hab. in Brasilia et in Ind. occidentali Flor. racemosi. Fol. pinnata, nitida. Arb.

946. XYLOCARPUS. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* 8-fidum, cui *Filam.* inserta.

*Drupa* exsucca, magna, 4-5-sulcata. *Nuces* 8-10, difformes.

1. *cranatum*. Koenig, im Naturforscher (Promtuar. hist. nat. Halæ Saxon. editum.) Fasc. 20. p. 2. Willd. Sp. II. p. 322. Rumph. 3. t. 61. Hab. in Ind. orient. littoribus. Arb. Fol. opposita, integerrima. Flor. racemosi.

947. HONCKENIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* staminiformia. *Caps.* echinata, 5-locularis, 5-valvis, polysperme. *Sem.* arillata.

1. *scifolia*. Willd. Sp. II. p. 325. Uster. delect. 2. p. 201. t. 4. Hab. in Guinea. Fol. alterna subtus tomento fulvo tecta. Flor. terni coerulesco-violacci. Valde æmuis Aubletiae. W. h

948. MIMUSOPS. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 16-phyllum. *Drupa* acuminata.

1. *Elenzi*, foliis alternis ovatis acuminatis. Willd. II. p. 325. Roxb. corom. 1. p. 15. t. 14. M. stylis cor. longitudine. Lam. enc. 4. p. 186. Ej. ill. gen. t. 300. Elengi. Rheede. 1. t. 20. Rumph. 2. t. 63. Hab. in India. h

2. *hexandra*, foliis alternis obovatis emarginatis, flor. hexandris. Willd. p. 326. Roxb. corom. 1. p. 16. t. 15. Hab. in montib. Circarsensibus Indiae. h

3. *obtusifolia*, fol. alternis remotis obtusis, stylis cor. longioribus. Lam. enc. l. c. M. Kauki. Willd. p. 326. Binectaria. Forsk. Rumph. 3. t. 8. Hab. in India. h

949. NIOTA. *Cal.* quadrifidus. *Petala* 4-5. *Anth.* sagittatæ. *Stigm.* acutum. *Cap.* lignosa, 1-sperma.

1. *tetrapetala* (Commersoni), petalis 4. Poir. in Enc. bot. 4. p. 490. Lam. ill. gen. p. 299. Hab. in Ind. orient. Comm. Arb. fol. alternis, ovalibus integerrimis. Flor. subumbellati in pedunc. longissimo pendulo.

2? *pentapetala*, petal. 5, flor. pentandris. Poir. l. c. Rheed. 6. t. 18. Hab. in Malabaria. Januar. flor. Arb. 30-petalis. Fol. prioris cum fruct. valde amara.

950. JAMBOLIFERA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala, infundibulif. *Filam.*

*Filam. planiuscula. Stigma simplex. Fruct...*

1. *pedunculata*. L. Vahl. symb. 3. p. 52. t. 61. Dryand. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 232. Chr. Lam. enc. 3. p. 195. et Juss. gen. pl. Hab. in India.

*Obs.* Arbor ad Myrtum accedens a Juss. ad Onagras relata, inter plantas dubias aut obscuras pertinet.

951. *ACER. Cal. 5-fidus. Petala 5. Samar. 2, basi unite, superæ, 1-spermæ, alatæ. (Flor. nonnulli masculi, et interdum dioici.)*

1. *tataricum*, fol. cordatis indivisis serratis: lobis obsoletis, flor. racemosis. L. Pallas Flor. ross. p. 9. t. 3. Hab. in Tartaria. Racem. compositus, erectus. Flor. albi.

2. *Pseudo-Platanus*, fol. quinquelobis inaequaliter serratis obtusis, racem. pendulis subtomentosis. Duham. arb. 1. t. 36. f. 1. Engl. bot. t. 363. Hab. in sylvis, ad sepes. Var. fol. variegatis.

3. *platanoides (lactescens)*, fol. quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, flor. corymbosis erectiusculis glabris. L. Duham. t. 10. f. 1. Habit. in sylvaticis montosis. Petioli abrupti lactescunt. Caps. glabrae.

β. *laciniatum*, fol. laciniatis crispis.

4. *rubrum*, fol. quinquelobis subdentatis subtus glaucis, flor. dioicis, umbellatis sessilib. L. Mill. ic. t. 8. f. 2. Duham. t. 10. f. 5. Hab. in Amer. boreali, in uliginosis. Floret primo vere, antequam frondescit. Flor. rubri. Germ. glabrum.

5. *dasycarpum*, fol. quinquelobis acuminatis subtus pubescentibus, flor. dioicis glomeratis, germinis tomentosis. Ehrh. Beytr. 4. p. 24. A. eriocarpum. Michaux. Flor. 1. p. 253. A. tomentosum. H. Par. Hab. cum priore. Flor. Aprilis. Arb. procera.

6. *saccharinum*, fol. quinquepartito-palmatis acuminato-dentatis, subtus pubescentibus. L. Duham. t. 11. f. 3. Hab. in Amer. boreali. Flor. apetalis, racemosi. Richard Syst. 4. p. 332. Caps. turgidae. Flor. autumnum rubescunt.

7. *dissectum*, fol. multipartito-palmatis: laciniis subpinnatifido-serratis. Thunb. Flor. jap. p. 160. Hab. in Japonia cum 4 sequentibus. Rami 2-3-chotomi. Var. fol. rubris. Th.

8. *japonicum*, fol. multipartito-incisis villosis, flor. subumbellatis. Thunb. jap. p. 181. Fol. subrotunda, 13-partita, serrata.

9. *palmatum*, fol. palmatis serratis glabris, flor. umbellatis. Thunb. 1. c.

10. *septemlobum*, fol. 7-lobis glabris: labis acuminatis aequaliter acute serratis. Thunb. jap. p. 162.

11. *pictum*, fol. septemlobis glabris: lobis acuminatis integris. Thunb. jap. p. 162. Rami cinerei.

12. *striatum*, caul. lineis albicantibus striato, fol. trilobis acuminatis serratis, racem. pendulis, petal. ovalibus. Lam. enc. 2. p. 381. A. *pensylvanicum*. Lin. ? A. canadense H. Par. Duham. 1. t. 12. f. 11. Erable jaspé Gal. Hab. in Canada, passim in montibus alleghanis, Pensylv. et Carol. Arb. mediocri altitudine, sed pulchra.

13. *spicatum*, fol. trilobis quinquelobisque acuminatis inaequaliter serratis subtus pubescentibus, racem. spiciformib. erectis, petal. linearibus. Lam. 1. c. A. montanum. Willd. arbor. berol. p. 7. A. *parviflorum*. Ehrh. 1. c. p. 25. Hab. in Amer. septentrion. Flor. omnium parvuli.

14. *campestre*, fol. quinquelobis obtusis glabris, racem. erectis, cortice suberoso rimoso. Engl. bot. t. 364. Hab. ad sepes, in sylvaticis. Caps. rubicundae, alis patentib.


15. *Opalus*, fol. rotundatis lobatis obtuse dentatis subtus glaucis, caps. subglabris: alis semipatentibus. Lam. enc. 2. p. 382. (A. rotundifolium.) A. Opalus. H. Par. Hab. in Italia. Frut. arborescens, ramossissimus, ram. junior. rubicundi. Flor. subcorymbosi, erectiusculi, albi. Caps. subglobosae.

*Obs.* *Apolifolium*, foliis quinquelobis subrotundis obtuse dentatis, fruct. cymosis: alis approximatis. Vill. Dauph. 3. p. 802. A. *montanum*. C. B. pin. p. 431. Hab. in Delphin. Helvetiae montosis, a priore forte non diversum.

16. *monspessulanum*, fol. trilobis integerrimis glabris annuis. L. Duham. 1. t. 10. f. 8. A. trifolium. Bauh. Hab. Monspeli, Italia et Germania. Fol. juniora pubescentia.

17. *creticum*, fol. coriaceis trilobis integerrimis pubescentibus perennantibus. L. Duham. 1. t. 10. f. 9. Hab. in ins. Creta. Fol. Aegion. Hepaticae: juniora integra.

D d



*Obs.* Lamark hanc prioremque speciem sub nomine *A. trilobatum*, conjunxit. An sequens tantum var. junior?

\* *sempervirens*, fol. ovatis integerrimis sempervirentibus. Lin. Mant. p. 128. Species dubia, a nemine, praeter Millerum, descripta. †

18. *trifidum*, fol. indivisis trifidisque integris. Thunb. jap. p. 163. Hab. in Japonia.

19. *Negundo*, fol. impari-pinnatis, flor. dioicis. Duham. t. 1. 11. f. 10. Hab. in Pensylvan. ad Carolinam. Arb. magna, fol. fraxiniformibus, ab omnibus distincta.

952. *CHLORA*. *Cal.* 8-10-phyllus. *Cor.* 1-petala, 8 fida. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *perfoliata*, fol. perfoliatis. L. Willd. Sp. 11. p. 340. Gentiana fol. radicalibus ovatis, caulinis triangularibus. Hal. Moris. Hab. in collibus siccis. Fol. glauca. ☉

2. *mascaresiensis*, cor. duplo majoribus 9-10-partitis, stam. 8-10. Desf. Atl. 1. p. 327. Ad rivulos prope Mascari.

3. *quadrifolia*, fol. quaternis. Hab. in Europa australi. Pedunc. terminales, quinque: singulis in medio bractee 2, oppositae. L.

4. *sessilis*, acaulis, flor. quadrifidis. Willd. p. 341. Gentiana sessilis. L. Feuil. peruv. 3. p. 20. t. 14. Hab. in R. chilensi.

4? *imperfoliata*, cor. sexfidis. Hab. in Italia. Fol. sessilia ovata. Filam. sex. Styli duo conglutinati. Fruct. ignotus. L.

953. *MICHAUXIA*. *Cal.* multifidus. *Cor.* rotata, 8-10-partita, revoluta. *Nect.* 8-valve, stamiferum. *Caps.* 8-10-locularis, polysperma.

1. *strigosa*, fol. radicalibus pinnatifidis, caul. strigoso. Ait. Kew. 2. p. 8. Herit. monograph. Mindium. Adans. Juss. Campanula fol. radicalibus dentato-pinnatis, caulinis cordatis sessilibus. Gron. virg. 19. Moris. s. 5. t. 3. f. 31. Hab. in Oriente, Syria, Libano. ♂

2. *laevigata*, fol. radicalibus ovatis serratis, caulinis oblongatis semialexicaulibus, caul. laevi glaberrimo. Vent. Hort. Cels. p. 87. t. 87. Hab. in Persia, in monte Albourg. Fol. pilosa.

954. *JEFFERSONIA*. *Cal.* 5-phyllus, coloratus, deciduus. *Cor.* 8-petala, incurvo-patentia. *Stam.* ovarium ambientia. *Caps.* obovata, substipitata, 1-locularis, infra apicem dehiscent. *Sem.* plura, oblonga, ad basin arilata.

1. *diphylla*. Barton in Act. Philad. J. Bartonis. Michaux. Flor. 1. p. 237. Podophyllum diphyllum. Lin. syst. veg. ed. 15. p. 523. Hab. in montib. occidentalib. Tennessee. Acaulis; pedunc. nudus, 1-florus. Fol. conjugata.

955. *ANTICHORUS*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* supera, subulata, 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* plurima.

1. *depressus*. L. fasc. pl. p. 3. t. 2. Lam. ill. t. 295. Jussiea edulis. Forsk. Hab. in Arabia. Flor. axillares, bini. Fruct. reflexi. Planta pusilla.

956. *BUGINVILLÆA*. *Cal.* 6. *Cor.* tubulosa, medio coarctata. *Stam.* receptaculo insidentia, inclusa. *Fruct.*... (Flos tubulosus bractee majusculae s. involucri insidens.)

1. *bracteata*. B. spectabilis. Willd. Sp. 11. p. 348. Lam. ill. t. 294. Hab. in Brasilia. Fr. it. facie Pisoniae, sempervirens, aculeatus. Fol. ovato subrotunda, integerrima.

957. *NEÆA*. *Involucr.* 2-3-phyl-lum, squamiforme. *Cor.* tubulosa. *Stam.* cor. breviora, alternantia longiora. *Drupa* monosperma, coronata. *Nucleus* tunicatus.

1. *verticillata*, fol. quaternis lanceolatis. Ruiz. et Pavon Syst. veg. Pl. Peruv. p. 90. Hab. in Peruviae nemoribus. Fruct. 3-orgyalis.

2. *oppositifolia*, fol. oblongo-ovalibus acuminatis. Ruiz. et Pav. l. c. p. 91. In Peruv. sylv. Flor. sero autumnio; uti prior, quadriorgyalis. ♀

*Obs.* Ad Familiam Nyctagineam secundum cl. Jussieu in Annal. d. Museum, cab. x. p. 275. c. priore genere pertinet.

958. *BORONIA*. *Cal.* 4-fidus, persistens. *Petala* 4, ovata. *Nectar.* coronatum. *Filam.* ciliata, incurva. *Stigm.* capitatum. *Caps.* 4, 2-valves. *Semina* subsolitaria, arillata.

1. *pinnata*, fol. imparipinnatis linearibus, pedunc. axillarib. dichotomis, filam. apice obtusis glandulosis. Andrew. t. 59. Vent. Hort. Malmais. p. 38. Cresc. in N. Hollandia. Cor. Febr. Maj. E. Fam. Rutacea. Cor. rubella.

959. *CORREA*. *Cal.* campanulatus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis dissiliens: locul. 1-2-spermis.

1. *alba*, fol. ovatis obtusis subtus albidis, flor. terminalib. subumbellatis, petal. basi conniventibus. Venten. Malmais. p. 13. t. 13. Andrew. t. 18. Willd. Sp. II. p. 324. Hab. uti sequentes, in N. Hollandia.

2. *rufa*, fol. subrotundis subtus ferrugineis, flor. solitariis axillaribus et terminalib. Vent. l. c. Mazentoxeron rufum. Labillard. Voyag. à la recherche de la Peyrouse. 2. p. 11. t. 17.

3. *reflexa*, fol. ovatis reflexis, cor. cylindricis. Vent. Maz. reflexum. Labillardiere. l. c. t. 19.

4. *revoluta*, fol. lanceolatis serrulatis, margine revolutis Vent. l. c. — Hoc genus Rutaceis affine est.

960. *TETRATHECA*. *Cal.* 4-dus, inferus. *Cor.* 4-petala. *Anth.* 4-loculares. *Caps.* 2-loculares, 5-valvis: valv. medio septiferis. *Sem.* subbina.

1. *juncea*, glabra, fol. alternis lanceolatis, caul. acutangulo, ramis elongatis nudiusculis. Smith. N. Holl. 1. p. 5. t. 2. Willd. Sp. II. p. 321. Hab. in N. Hollandia, cum seq.

2. *oppositifolia*, fol. subsparis lanceolato-linearibus oppositis: flor. erectis.

3. *ericæfolia*, fol. verticillatis linearibus, flor. cernuis.

*Obs.* Duas has species vidi in Herbario D. Thibaud, a cl. Néé in Australasia collectas.

961. *OXYCOCCLUS*. *Cal.* superus, 4-fidus. *Cor.* 4-partita: laciniis sublinearibus revolutis. *Filam.* conniventia. *Anth.* tubulosæ, bipartitæ. R. *Bacca* polysperma.

1. *palustris* (europæus), foliis ovatis integerrimis revolutis, caule filiformibus repenti. nudis. *Oxycoccus*, s. *Vaccinia* palustris. J. Baub. 1. p. 525. ic. *Vaccinium*. L. Flor. dan. t. 80. Lam. ill. t. 286. f. 3. Scollera Ro'h. germ. 2. p. 442. c. bon. descr. Hab. in uliginosis, sphagnosis, sempervirens. *Bacca* purpurea.

β ? *macrocarpus*, foliis integerrimis ovali-oblongis planis obtusis, caule repenti filiformi. *Vac. macrocarpum*. Ait. Kew. 2. p. 13. t. 7. Lam. ill. t. 286. f. 4. *V. oxycocc.* β. oblongifolius. Michaux. Flor. 1. p. 228. Hab. in Canadæ turfosis paludosis.

2. *hispidulus*, fol. subrotundo-ovalibus acuminatis, caule repenti. hispidis. Lin. Willd. Sp. II. p. 355. Michaux. l. c. t. 23. sub *Vaccinio*. *Arbutus thymifolia*. Ait. A. filiformis. Lam. enc. Hab. in Amer. bor. cupressetis humidis. Caule ferrugineo-hirsutus. *Bacca* nivea, edulis.

3. *erythrocarpus*, fol. ovalib. acuminatis serrulatis ciliatisque, caul. erecto. Michaux. p. 227. sub *Vacc.* Hab. in Carol. septent. montib. altis. Cor. ante anthesin longa, conoidea. *Anth.* exsertæ. *Bac. coccinea*. h

*Obs.* Habitu, loco natali, praesertim cor. forma a *Vacciniis* (quæ ob stamina utrinum 10, ad decandriam sunt relata), differt hoc genus.

962. *MENZIESIA*. *Cal.* monophyllus. *Cor.* monopetala, ovata. *Filam.* receptaculo inserta. *Caps.* supera, quadrilocularis, dissepimenta e marginibus inflexis valvularum. *Sem.* numerosa, oblonga.

1. *ferruginea*, flor. foliisque terminalibus fasciculatis lanceolatis planis, subtus laevibus. Jussieu in Annal. du Mus. d'hist. nat. 1. p. 57. Smith ic. ined. 1. p. 56. t. 56. Willd. p. 355. Lam. ill. t. 285. Hab. in Amer. boreali. h

2. *polifolia*, flor. terminalib. racemosis, fol. alternis ovatis revolutis subtus incano-tomentosis. Juss. l. c. *Andromeda Daboecia*. Lin. Syst. veg. *Erica Daboecia*.

Ej. Sp. pl. Willd. p. 385. Smith. brit. r. p. 420. Engl. bot. t. 35. Hab. in montib. Hiberniae occidentalis. h

3? *pilosa*, fol. pilosis apice niveis. Lin. ill. gen. p. 494. Journ. d'hist. nat. 1. p. 410. conf. Jus. Annal. 1. c. p. 56. Hab. in Amer. bor.

963. *ERICA. Cal. 4-phyllus*, persistens. *Cor. 4-fida*, persistens. *Filam. receptaculo inserta. Antheræ bifidae. Caps. membranacea*, 4-8-locularis. *Dissepimenta* e valvularum margine. *Sem. singulis loculis plura.*

† *ARISTATAE. \* fol. oppositis.*

1. *glutinosa*, antheris aristatis pistilloque inclusis, corol. globoso-ovatis, fol. oppositis sparsisque ciliato-glandulosis linearib. Willd. Sp. pl. II. p. 356. Thunb. Diss. de Erica n. 48 Icon. horti Kewens. t. 17. E. droseroides. Lam. enc. 1. p. 489. Andromeda droseroides, racemis secundis, foliis linearibus pilosis viscidis. L. Mant. 239. Petiv. mus. t. 161. Hab. ad Cap. b. spei in planitie montis Tabularis. Cor. ovata violacea, collo airopurpureo, limbo minuto albo.

*Obs.* Omnes fere species, quae parvi frutices sunt, ad Cap. bon. spei afric. crescent, hinc ad plurimas indicatio loci natalis in spatii compendium omissa est.

2. *lutea*, anth. aristatis styloque inclusis, corol. oblongo-ovatis, flor. terminalibus, fol. linearibus trigonis glabris oppositis, ramis flexis. Willd. p. 357. Lam. ill. t. 287. f. 2. Wendland de Erica. p. 13. t. 4. Andrews Erica. n. 11. c. Icon. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. subrostrata lutea. h

\* *foliis ternis.*

3. *paniculata*, aristata, fol. ternis trigonis glabris, flor. lateralibus aggregatis, caule erecto. Pluk. alm. 136. t. 279. f. 2. Steh. mus. 2. p. 46. t. 44. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *depressa*, anth. aristatis inclusis, cor. campanulatis, stylo incluso, flor. raris, fol. ternis, caule depresso. L. Mant. 230. Thunb. Diss. n. 50. t. 6. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei in lateribus rupium et planitie montis Tabularis. Cor. campanulata rubra. h

5. *halicacaba*, anther. aristatis, stylo incluso, cor. campanulato-ovatis inflatis, flor. terminalibus solitariis, foliis ternis linearib. trigonis. Willd. p. 358. Thunb.

Diss. n. 51. Icon. horti Kewens. t. 2. Lam. ill. t. 288. f. 2. (mala). Hab. in rupibus praeruptis cum priore. Cor. magna, flavo-virescens. h

6. *Monsoniana*, anth. aristatis inclusis, stylo incluso, cor. oblongo-ovatis, calyce duplici colorato, flor. terminalibus sub-solitariis, fol. ternis oblongis obtusis. Willd. Thunb. Diss. n. 52. t. 1. fol. 2. Icon. horti Kewens t. 7. Hab. in montibus Hottentots Holland. Flor. maga. albi. h

7. *discolor*, anth. aristatis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis, calyce duplici, flor. terminalibus ternis, fol. ternis glabris. Willd. p. 359. E. discolor. Andrews Erica. n. 3. c. Icon. mala. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. pallide purpurea, apice virescens. h

8. *densifolia*, anth. aristatis inclusis, stylo incluso, cor. tubuloso-clavatis pubescentibus, flor. axillaribus, fol. ternis oblongis imbricatis. Willd. Cor. pubescens. h

9. *cruenta*, anth. aristatis inclusis, stylo exserto, cor. tubulosus incurvis, calyce simplici glanduloso-dentato, flor. axillaribus verticillatis, fol. ternis margine scabris. Willd. p. 360. Icon. horti Kewens. t. 13. Andrews Erica. ic. Cor. punicea cylindracea uncialis, parum incurva, glabra. h

10. *nigrita*, anth. aristatis, cor. campanulatis, stylo incluso, calycibus imbricatis trifloris sessilibus, cap. tomentosa. E. larin-cina. Berg. cap. 94. Seba mus. 2. p. 11. t. 9. f. 7. Hab. in summitate montis Diaboli. Flores albi. Antherae obtusae, nigrae. h

11. *phylicoides*, anth. aristatis inclusis, stylo incluso, cor. campanulatis calyce paullo longioribus, flor. axillaribus nuntantibus, fol. ternis sexfariam imbricatis. Willd. p. 361. Habitus Phyllicae ericoidis. h

12. *regerminans*, anth. aristatis, cor. ovatis, stylo incluso, cal. acutis, flor. racemosis. L. Thunb. Diss. n. 54. Caulis, ramis junceis. Cor. ovato-globosa rubra, ore obtuso. Ramus spicam continuat. L. h

13. *urceolaris*, anther. aristatis, cor. ovato-conicis villosis, stylo incluso, cal. lanceolatis, flor. umbellatis, fol. ternis. Ait. Kew. 2. p. 15. Icon. horti Kewens. t. 16. F. pentaphylla. Lin. Syst. veg. 302. E. castra. Lin. Sp. pl. Edit. 1. et 2. Seba mus. 1. p. 32. t. 21. f. 2. h

14. *marifolia*, anth. aristatis, cor. ovato-conicis, stylo mediocri, fol. ternis ovatis, pubescentibus, subtus albidis. Ait. Kew. 2.



p. 15. Icon. horti Kewens. t. 14. Rami pilosi. Folia subtus alba. Flores umbellati. h

15. *planifolia*, anth. aristatis exsertis, cor. campanulatis, fol. ternis quaternisve ovatis acutis glanduloso-ciliatis. Willd. p. 362. E. thymifolia. Wendl. obs. p. 48. Pluk. mant. 69. t. 347. f. 1. Rami pilis apice glanduliferis. h

16. *hirta*, aristata, fol. ternis linearibus hispulis, flor. umbellatis, cal. scabro rudi. Thunb. Diss. n.º. 56. t. 2. f. 3. Corollae globosae subvillosae, longe pedunculatae. Willd. h

17. *bicolor*, aristata, fol. ternis ovatis scabris, flor. ternis cernuis glabris, cal. villosa colorato. Thunb. Diss. n.º. 51. h

18. *articularis*, anth. aristatis inclusis, cor. globosis cal. colorato multo minoribus, fol. ternis linearibus margine membranaceis. Willd. p. 363. Thunb. Diss. n.º. 58. E. pulchella Andr. E. n.º. 51. c. 1c. Cal. ovatus incarnatus. Cor. alba. Stylus atropurpureus. Stigma coeruleus. h

19. *viridipurpurea*, anth. aristatis, cor. campanulatis, stylo incluso, fol. ternis, flor. sparsis. L. Syst. veg. p. 301. Lin. Diss. n.º. 9. cum fig. flor. E. pelviformis. Salisb. l. c. p. 376. Thunb. Diss. n.º. 51. Hab. in Lusitania. Variat fol. quaternis. h

\*\*\* foliis quaternis.

20. *catervaeifolia*, caul. angulato pubescente, tubo anguste obovato, anther. foraminosis. Salisb. in Act. Soc. Lin. 6. p. 372. E. pubescens. β. villosa. Thunb. In monte Tafelsberg.

21. *pubescens*, fol. laminis parum replicatis sinuatis, cor. lineari pubescente, limbo erecto, caps. glabra. Salisb. Andrew. Eric. n.º. 60. ic. E. luteiflora. Curt. mag. t. . n.º. 481. E. pubescens, var. hispida. Th. Fol. quaterna.

22. *tardiflora*, cal. adpresso ovato-cuneato, cor. lineari pubescente, limbo brevissimo recurvo, cap. hirta. Salisb. p. 373. E. pubescens. Curt. mag. n.º. 480.

23. *parviflora*, cal. adpresso rhombeo-cuneato, cor. lineari pubescente, calcarib. auricularibus, caps. glabra. Salisb. E. pubescens. Lin. Diss. de Erica. n.º. 19. E. parviflora. Lin. Sp. pl. p. 606.

24. *exigua*, cal. adpresso ovato connato, cor. lineari pubescente: tubo ovali, limbo brevissimo, calcar. lineari-attenuatis, peric. glabro. Salisb. E. pubescens, var. parviflora. Thunb. Fol. 3-na, saepius 4-na.

25. *persoluta*, aristata, fol. ternis quaternisque trigonis glabris, flor. umbellatis calyce ciliato. Thunb. Diss. n.º. 62. E. strigosa. Willd. p. 365. Wendl. de Er. fasc. 2. p. 25. ic. E. subdivaricata. Berg. cap. p. 114. Hab. in campis arenosis Cap. b. spei. Cor. alba. h

26. *gracilis*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. campanulatis, calyce colorato, lacin. linearib. glabris, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearibus glabris adpressis, caule glaberrimo. Willd. p. 365. Wendl. obs. bot. p. 47.

27. *strigosa*, anth. aristatis, cor. campanulatis glabris, stylo exserto, fol. quaternis pubescentibus ciliatis. Ait. Kew. 2. p. 17. E. axillaris. Salisb. l. c. p. 325. Cor. pallide rubens. Anth. inclusae oblongae nigricantes. Stigm. nigro-purpureum. Ait. h

28. *arborea*, anth. aristatis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. ternis, ramulis incanis. L. Syst. veg. 302. E. scoparia. Thunb. E. procera. Salisb. l. c. p. 328. Hab. in Europa australi. Fior. Convallariae, albi. Caul. incani. l. h

β. *stylosa*. Rudolphi. in bot. Journ. 1800. p. 233. E. arborea quorumd. E. castra. Lin. Cresc. cum antecedente. Styl. cor. multo longior. Stigm. depresso-capitatum.

29. *stricta*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. ovatis, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearibus glabris horizontalibus. Willd. Donn. Catal. horti Caniab. p. 45. Hal. ad Cap. b. spei et in insula Corsica legit G. Jony. Cal. viridis. Cor. rubra ovata, laciniis reflexis. h

30. *florida*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. globosis, cal. villosa reflexo, flor. terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus pilosis. Willd. p. 367. Thunb. Diss. n.º. 64. t. 6. f. 1. h

31. *mucosa*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. globosis mucosis, pedunc. ternis terminalibus flore longioribus, fol. quaternis linearib. margine cartilagineo serratis. Willd. Andrews Erica. ic. Icon. horti Kewens. t. 15. Berg. cap. 112. Hab. ad Cap. b. spei inter urbem et Bay falso. Calyx scariorum mucosus. Cor. mucosa. h

32. *pilulifera*, aristata, fol. quaternis linearibus ciliatis, umbellatis, calyce naviculari apice ciliato glabro. Thunb. Diss. n.º. 65. Habit. in montibus versus Bay falso. h

33. *amoena*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. campanulatis, calyce colorato villosa, flor. axillaribus verticillatis. fol.

quaternis linearibus imbricatis villosis. Willd. p. 368. Wendl. obs. p. 48. h

34. *Tetralix*, anth. aristatis, cor. ovatis, stylo incluso, fol. quaternis ciliatis, flor. capitatis. Lin. Flor. dan. t. 81. Hab. in Europa boreali. h

35. *inflata*, aristata, fol. quaternis linearibus glabris, flor. umbellatis ventricosus, cal. subulato glabro. Thunb. Diss. n°. 67. t. 2. f. 2. Cor. ventricosa pallide sanguinea, subpollicaris. h

36. *gilva*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. cylindricis, calycinis foliolis membranaceis, flor. axillaribus verticillatis, fol. quaternis linearibus glabris cartilagineo-inuolutis. Willd. p. 369. Wendl. obs. 48. Cor. magna, sordide flavescens, apice virescens. h

37. *verticillata*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. cylindricis supra basin contractis, flor. pen-lulis verticillatis, foliis quaternis patentibus. Willd. p. 370. Andrews Erica. n°. 21. c. Icon. Cor. coccinea supra basin contracta. h

Obs. Cl. Salisbury (l. c. p. 366.) hanc ut varietatem sequentis respicit.

38. *Pattersonia*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavata, flor. horizontalibus terminalibus, foliis quaternis quinque glabris: junioribus conferiissimis. Willd. p. 355. Thunb. prodr. suppl. p. 189. E. Pattersonia, Andrews Erica. n°. 7. c. Icon. Wendl. Ericarp. 15. t. 5. Cor. flava. Anth. inclusae.

\*\*\*\* *foliis senis.*

39. *mammosa*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. clavato-cylindraceis, flor. umbellatis, fol. subsenis linearibus reflexis. Willd. E. abietina. Thunb. Diss. 68. auctoritate ejus specim. Salisb. Buxb. Cent. 4. p. 25. t. 41. 42. E. abietina. Willd. p. 369. excl. syn. Lin. Hab. ad Cap. b. spei. Caulis rigidulus, lineis albis subulatis a cicatriculis foliorum decurrentibus. Cor. sanguinea, longissima. Antherae cor. longiores. h

40. *empetrifolia*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. campanulatis, flor. verticillatis, fol. senis linearibus pilosis. Willd. p. 371. Thunb. Diss. n°. 70. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. ut Lycopodii, quasi spiraliter, unde numerus eorum difficilis. Th. h

41. *mollensis*, cal. 4-fido, cor. lineari laevi: tubo urceolari, limbo recurvato-patentissimo, caps. hirsuta. Salisb. p. 370.

E. *empetrifolia*. Schneevogt. n°. 17. c. 12. Habitu praecedentis, sed flor. diversi. S.

42. *spicata*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis, flor. in ramorum apice verticillatis, fol. quaternis senise linearibus glabris. Willd. Thunb. Diss. n°. 71. t. 4. f. 3. Wendl. Eric. 2. p. 27. E. sessiflora. Lin. suppl. 222. Hab. ad Cap. b. spei in montibus inter Nordhock et Bay falso. Frutex fuscus. Cor. saepius cernua.

\*\*\*\* *foliis octonis.*

43. *octophylla*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. cylindraceis ventricosus, flor. umbellato-capitatis, fol. linearibus octonis truncatis. Willd. p. 372. Thunb. Diss. n°. 72. t. 3. f. 1. E. fascicularis. Lin. suppl. 210. Hab. in montibus Hottentots-Holland. Cor. grossa purpurea. Anth. longitudine cor.

Obs. Has duas sub nomine E. *radiflorae* conjunxit Salisb. l. c. p. 860.

44. *fascicularis*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. cylindricis clavatis, flor. numerosis verticillatis horizontalibus, foliis octonis linearibus glanduloso-denticulatis. Willd. p. 373. Icon. horti Kewens. t. 6. E. coronata. Andrews Erica. Cor. uncialis, sanguinea, apice viridis. Anth. inclusae.

++ CRISTATÆ. \* *foliis sparsis.*

45. *obliqua*, anth. cristatis, stylo incluso, cor. ovatis viscosis, flor. terminalibus umbellatis, fol. suboppositis sparsis linearibus arcuatis truncatis. Willd. p. 373. Thunb. Diss. n°. 73. t. 1. f. 3. Icon. horti Kewens. t. 3. Pedunc. flore longiores colorati visci, bracteis 3 instructi. W.

\*\* *foliis oppositis.*

46. *vulgaris*, anth. aristatis, cor. campanulatis subaequalibus, calycibus duplicatis, fol. oppositis sagittatis. L. Fl. dan. t. 627. Hab. in campestribus sterilibus, sylvaticis arenosis. Var. fol. hirsutis et squarrosis. vid. Willd.

Obs. Hanc stirpem, si quae alia in toto ordine proprium debet constituere genus, jure antiquiore profecto suum nomen retinisset, sed cum tot aliae stirpes, apud omnes Botanicos jam eodem cognomine gaudeant, satius duxi hanc unam novo insignire titulo: itaque *Callunum* appellavi, ob usum, ejus frequentissimum in scopis conficiendis. *Essentia generis* qua differt ab Erica, est in pericarpio (capsulae) valvis, ad latera loculorum dehiscentibus, septis axi relictis, habitus, absque ullo rudimento petiolis pedunculis, omnino sessilis. Salisb. l. c. p. 317.

\*\*\* *foliis ternis.*

47. *gnaphalodes*, anth. cristatis, cor. ovatis tectis, stylo incluso, fol. ternis, stigm. quadripartito. Berg. cap. p. 119. Thunb. Diss. n°. 75. Pluck. mant. 68. t. 346. f. 11. Houttuyn. t. 2. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei in collibus arenosis. h

48. *corifolia*, anth. cristatis, cor. ovatis, stylo incluso, col. turbinatis, fol. ternis, flor. umbellatis. Berg. cap. 108. Thunb. Diss. n°. 77. Seb. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 3. Pet. gaz. 7. t. 3. f. 7. Hab. in campo sabuloso infra Taffelsberg et Sternberg. Cor. purpurea. Stigm. capitatum.

49. *calycina*, anth. cristatis, stylo incluso, cor. ovatis magnitudine cal. colorati patentis, fol. ternis adpressis. Willd. p. 375. Thunb. Diss. n°. 78. Andrews Erica. ic. Seb. mus. 2. p. 13. t. 11. f. 7. Hab. in summitate montis Tabularis.

50. *bracteolaris*, anth. cristatis inclusis, cor. prismaticis, bract. numerosis imbricatis purpureis flor. obvolventibus, fol. ternis, flor. fasciculatis. Lam. enc. 1. p. 482. Facie Diosmae. †

51. *triflora*, anth. cristatis, cor. globoso-campanulatis, styl. incluso, fol. 3-nis, flor. terminalib. Lin. Mant. p. 374. Thunb. Diss. n°. 79. t. 5. f. 2.

52. *pyrolaeiflora*, foliorum laminis cuneatis, calyce ovato-cuneato, cor. bilineari, tubo 4-angulo, spaeico, calcarib. late auricularibus. Salisb. l. c. p. 351. E. triflora. Willd. Sp. pl. exclusis synonym. Persimilis praecedenti, sed differt, tubo cor. apice intus sub sinibus limbi, in tot carinas canaliculatas, extremitate pilis aliquot minutis barbatis, prominente. Salisb.

53. *scoparia*, anth. cristatis, cor. campanulatis, stigmate exserto peltato, fol. ternis. L. Syst. veg. 302. E. *fucata*. Thunb. Willd. p. 387. E. *scoparia*, ramis virgatis, fol. ternis patentib. flor. triplo longiorib., cal. viridibus. Rudolphi in Bot. Journ. 1801. p. 232. E. major scoparia, fol. deciduis. Bauh. pin. 465. E. coris folio IV. Clus. hist. 1. p. 42. Hab. Monsp. in Hisp., Eur. australi. h

54. *Bergiana*, cristata, fol. ternis lanceolatis scabris, flor. subternis, cal. reflexo ciliato. Thunb. Diss. n°. 81. E. *quadriflora*. Willd. Sp. II. p. 379. Wendl. Er. fasc. 2. p. 29. c. Icon. Hab. in Roode Sands Kloof. Cor. campanulata purpurea obtusa.

55. *formosa*, cristata, fol. ternis ovatis integris glabris, flor. umbellatis sulcatis,

cal. patenti integro. Thunb. Diss. n°. 82. t. 3. f. 3. Fol. obtusa patentia. Cor. albidia, globosa. Anth. stylusque inclusus.

56. *rubens*, cristata, fol. ternis linearib. integris glabris, flor. umbellatis globosis, cal. lanceolato brevi, ramis glabris. Thunb. Diss. n°. 83. Cor. sanguinea, magnitudine piperis. Anth. stylusque inclusus.

57. *incarnata*, cristata, fol. ternis ovatis integris glabris, flor. umbellatis ovatis, cal. integro, ramis villosis. Thunb. Diss. n°. 84. Obs. E. *incarnata* hortulanor. diversa est. Cal. foliola glabra, adpressa purpurea. Cor. oblonga alba. Anth. inclusae.

58. *cinerea*, anth. cristatis, cor. ovatis, stylo subexserto, fol. ternis, stigm. capitato. Flor. dan. t. 38. Curt. Lond. fasc. 1. t. 25. bon. Hab. in Eur. media, inque Oriente, (copiose circa Parisios.) Flor. exsiccati caerulei.

59. *australis* anth. cristatis, cor. cylindricis, stylo exserto, fol. ternis patentibus. L. Syst. veg. 303. Thunb. Diss. n°. 86. Wendl. de Er. fasc. 9. p. 13. ic. Hab. in Hispania. Cor. obtusa, calyce triplo longior, lacin. cor. canescentes. L.

\*\*\* *foliis quaternis.*

60. *ramentacea*, anth. cristatis, stylo incluso, cor. globosis, flor. umbellatis, fol. quaternis linearibus trigonis patentib. glabris. Willd. p. 379. Lam. ill. t. 287. f. 3. Andrews Erica. Wendl. de Er. p. 17. t. 6. Cor. purpurea.

61. *lateralis*, anth. cristatis, cor. globoso-campanulatis, cal. adpressis ciliatis, flor. terminalib. et axillarib. secundis, fol. quaternis glabris horizontalibus. Willd. p. 380. Var. E. *rubens humilis* Wendl. Er. fasc. 3. p. 13. c. Icon. Fol. acerosa, linearitrigona. Flor. numerosi, purpuri.

62. *margaritacea*, anth. cristatis, stylo exserto, cor. globoso-campanulatis, flor. terminalib. subumbellatis, fol. quaternis linearitrigonis glabris erectis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 20. Flor. terminales. Cor. alba, tubus urceolatus. Filam. apice inflexa. Stigma subquadrilobum. A.

63. *baccans*, anth. cristatis, stylo incluso, cor. globosis cal. colorati magnitudine, flor. umbellatis terminalibus, fol. quaternis linearitrigonis margine cartilagineis glabris imbricatis. Willd. p. 381. Andrews Erica. Thunb. Diss. n°. 88. Seb. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 3. Hab. in collibus arenosis Cap. b. spei. Pedunc. purpurei. Cor. campanulato-subglobosa, rubra.

64. *pendula*, anth. cristatis, stylo in-

cluso, cor. ovatis, umb. multifloris terminalib., fol. quaternis quinisve glabris oblongis margine revolutis, ramis pendulis. Willd. Wendl. obs. 48. Cor. ovata. Anth. stylusque inclusus.

65. *physodes*, cristata, fol. quaternis linearibus, flor. umbellatis viscosis, cal. ovato brevi. Thunb. Diss. 89. Andrews Eric. 44. c. icon. Hab. in planitie montis Tabularis. Cal. ovatus. Cor. viscida.

66. *laxa*, cristata, fol. quaternis linearibus, flor. umbellatis glabris, cal. ovato ciliato. Thunb. prodr. suppl. p. 189.

67. *cernua*, cristata, fol. quaternis ovatis ciliatis, flor. capitatis, cal. ciliato. Thunb. Diss. n.º 90. E. cernua. Montin Act. ups. 2. p. 291. t. 9. f. 3. mala. Hab. in Koude Bokkeveld. h

68. *lanceolata*, cristata, flor. capitatis cernuis, fol. quaternis lanceolatis erectis glabris. E. cernua lanceolata. Wendl. de Er. fasc. 8. p. 13. ic.

69. *retorta*, anth. subcristatis, fol. quaternis recurvis, cor. ovato-oblongis, stylo mediocri. Lin. suppl. p. 220. Andrews Eric. n.º 15. Lam. ill. t. 238. f. 1. Hab. in montibus Hottentots - Holland. Cor. inflata, viscida. Filam. linearia, membranacea.

+++ MURIC. \* *foliis oppositis*.

70. *tenuifolia*, anth. muticis inclusis, cor. calyceque sanguineis, fol. oppositis. L. Seb. mus. 1. p. 157. t. 73. f. 6.

\*\* *foliis ternis*.

71. *albens*, anth. muticis inclusis, cor. ovatis oblongis acutis, racemis secundis, fol. ternis. L. Mant. 231. Curt. bot. mag. n.º. 440. c. Icon. Flor. subspicati, albi. L. ochroleuci?

72. *bracteata*, mutica, fol. ternis lanceolatis glabris, flor. umbellatis bracteis petiolatis coloratis obvallatis. Thunb. Diss. n. 3. Hab. in montibus Platte Kloof. Flor. umbellati bract. obvallati. Bract. interiores totae sanguineae. Th.

73. *Thunbergii*, anth. muticis mediocribus, cor. plavis, tubo globoso, stylo exserto, fol. ternis. Lin. suppl. p. 220. Thunb. Diss. n. 4. Mont. Act. ups. 2. p. 290. t. 9. f. 2. mala. Hab. in Koude Bokkeveld. Caul. rufescens. Flor. terminales pedunculati. Cor. tubus subglobosus. Anth. purpureae, bifidae.

74. *tetragona*, mutica, fol. ternis lanceolatis, flor. racemosis secundis tetragonis.

Thunb. Diss. n. 5. t. 4. f. 2. Lin. suppl. 225. Flor. lutei.

75. *umbellata*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. ternis acerosis. L. Syst. veg. 306. Icon. horti Kewens. t. 5. Loeffl. it. 138. Hab. in Lusitania. Anth. basi gibboso-caudatae. Cor. coeruleo-lescentes.

76. *nudiflora*, anth. muticis exsertis, cor. cylindricis, stylo exserto, fol. ternis, ramis tomentosis. L. Mant. 229. Smith. ic. ined. 1. p. 57. Thunb. prodr. suppl. Caul. hispido tomentosus. Th.

Obs. Ab. E. ramosa differt, fol. ternis glabris, calyce glabro. Willd. Fol. ciliata dicit Thunb. L. c.

77. *petiolata*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis calyce colorato bracteato parum longioribus, flor. terminalibus, fol. ternis lanceolatis glabris. Willd. p. 366. E. mutica, fol. ternis lanceolatis glabris, flor. umbellatis campanulatis, caule decumbente. Thunb. Diss. n. 7. t. 6. f. 2. bona. Facies Rosmar. offic. Lin. Hab. in mont. Tabulari.

78. *Bryantha*, anth. muticis, stylo exserto, cor. campanulata, flor. racemosis corymbosis, fol. ternis oblongis obtusis. Willd. Thunb. Diss. n. 8. Andromede. L. Mant. 238. Pall. ross. 2. p. 57. t. 14. f. 1. Bryanthus repens serpillifoli, flor. roseo. Gmel. sib. 4. p. 133. t. 57. fig. 3. Hab. in Sibiria ad portum Ochotenfem, in Camtschatca et in insula Bergii. Planta densis caespitibus uti Serpillum provenit.

79. *Stelleriana*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. campanulatis, flor. terminalibus geminis, fol. subternis oblongo-linearibus obtusis. Willd. p. 387. Pallas. ross. 2. Hab. in Camtschatca. Simillima praecedenti.

80. *axillaris*, mutica, fol. ternis trigonis glabris, flor. racemosis globosis, ramis tomentosis. Thunb. Diss. n. 10. Hab. ad Cap. b. spec. Flor. axillis foliorum solitarii, pedunculati, globosi, minuti.

81. *imbricata*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, cal. imbricatis, stylo exserto, fol. ternis. Syst. veg. 306. Lin. Diss. n. 53. cum fig. flor. Hab. in collibus arenosis.

82. *sexfaria*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis cal. colorato imbricato brevioribus, flor. ternis terminalibus, fol. ternis lineari-trigonis glabris sextariam imbricatis. Willd. p. 368. Icon. horti Kewensis t. 11. Tota glabra. Flor. tres

Brevissime pedunculati, albi. Cal. foliola subrotunda.

83. *melanthera*, anth. muticis medioeribus, cor. campanulatis calyce 4-fida duplo longioribus, stylo longe exserto, pericarpio sericeo, fol. ternis. Lin. Mant. 232. *E. lysimachiaeflora*. Salisb. l. c. p. 332.

84. *cristaeflora*, anth. muticis, fol. ternis trigonis glabris, flor. umbellatis, calycib. 4-phyllis, limbo tubo triplo longiore, basi integro, caps. laevi. Salisb. p. 332. *E. mesanthera*. Thunb. Diss. n. 12.

85. *leucanthera*, mutica, foliis ternis trigonis glabris, flor. umbellatis, anth. exsertis albis. Willd. Sp. II. p. 389. Lin. suppl. 223. Cor. alba.

86. *taxifolia*, anth. muticis inclusis, cor. ovata calyce colorato tecta, flor. umbellato-corymbosis, fol. linearibus trigonis margine cartilagineis. Willd. p. 389. Icon. horti Kewens. t. 19. Wendl. Eric. fasc. 11. p. 19. c. Icon. Caul. ramis cistricatis. Cor. tubo carneo, laciniis purpureis. Filam. alba. Anth. flavae, ovatae.

87. *spumosa*, anth. muticis inclusis, cor. ternis calyce communi obiectis, stylo exserto, fol. ternis. Willd. Sp. pl. II. p. 390. Hab. ad Cap. b. spei in planitie montis Tabularis. Cal. imbricatus, sanguineus. Cor. campanulatae flavicantes. Stylus longissimus nutans. L.

88. *capitata*, anth. muticis inclusis, cor. globoso-campanulata cal. lanato tecta, flor. sessilibus, fol. ternis linearibus obtusis villosis. Willd. p. 390. Wendl. Eric. ic. Petiv. gaz. 5. t. 2. f. 10. Seba mus. 1. p. 30. t. 20. f. 1. Andrews. Er. 34. c. Icon. Cal. lanugine flavesciente dense obsitus.

89. *Bruniades*, anth. muticis exsertis, cor. campanulata cal. lanato tecta, flor. umbellatis, fol. ternis linearibus obtusis pubescentibus. Willd. p. 391. Andrews Eric. ic. L. Syst. veg. p. 306. *E. capitata*. Thunb. Diss. n. 15. Pluck. mant. 69. t. 347. f. 9. optima. Cal. alba lana obiectus tegit totam cor. subtruncatam. L.

90. *carbasina*, anth. muticis exsertis, cor. campanulata, cal. dense lanato 4-phylo multo longiore, flor. sparsis, nect. sericeo. Salisb. l. c. p. 333. *E. Brunia*. Lin. mant. p. 378. Fol. praecedentis latiora et magis tomentosa. S.

91. *calyculata*, anth. muticis exsertis, cor. subarceolata brevi glabra, flor. ramulorum terminalibus umbellatis, foliis ternis acuminatis ciliatis subulatis imbricatis.

Wendl. de Er. fasc. 4. p. 5. c. ic. Cor. albo-ferruginea. Styl. exsertus.

92. *tenuissima*, anth. aristatis inclusis, cor. minima obovata obtusa glabra, stylo inclusio, flor. ramul. terminalibus umbellatis erectis et cernuis, fol. 3-4-nis linearifiliformibus glabris subimbricatis Wendl. de Er. fasc. 6. p. 9. c. ic.

93. *Passerina*, mutica fol. ternis ovatis glabris, flor. subsolitariis, cal. tomentosis. Thunb. Diss. n. 26. Lin. suppl. 221. Petiv. Gaz. t. 3. f. 7. Cor. campanulata. Germen albo-tomentosum.

94. *totta*, mutica, fol. ternis oblongis hispidis, flor. ternis, cal. ciliatis. Thunb. Diss. n. 17. Rami hispidi. Flor. ultimis ramulis terminales, solitarii, cernui, albidii.

95. *absynthoides*, anth. muticis inclusis, cor. ovato-campanulatis viscidis, stylo exserto, stigmatibus pelatis, fol. ternis. L. Syst. veg. 304. Thunb. prodr. suppl. Mant. 66. *E. virgata*. *E. hispida*. Willd. suppl. 112. p. 394. ex Salisbury. 8. Thunb. Diss. n. 12. Pluck. mant. 68. t. 347. f. 14. In monte Tabulari et in dunis versus Bay falso. Frutex statura Absynthii paniculatus caule rufo. Cor. pallidae. L.

96. *ciliaris*, anth. muticis inclusis, cor. ovatis grossis, stylo exserto, fol. ternis ciliatis racemis secundis. Syst. veg. 304. Curt. bot. mag. n. 484. c. Ic. bon. Loeff. it. 138. Hab. in Lusitania et in Gallia (Depart. d. Landes.) Bipedalis. Cor. magna, ore contracto.

97. *pilifera*, anth. muticis, fol. ternis glabris mucronato-piliferis, flor. terminalibus aggregatis. Thunb. prodr. suppl. p. 188.

98. *scariosa*, anth. muticis, fol. ternis linearibus glabris, flor. racemosis campanulatis, bract. remotis. Thunb. l. c.

99. *caerulea*, anth. muticis inclusis, stylo inclusio, cor. ovatis, pedunc. terminalibus quaternis quinisque flore nutante multo longioribus, fol. ternis linearibus obtusis cartilagineo-denticulatis. Willd. p. 363. Anemone caerulea. L. Sp. pl. 563. *A. taxifolia*. Pall. rois. 2. p. 54. t. 72. f. 2. Fl. lapp. t. 1. f. 5. Gmel. sib. 4. p. 131. t. 57. f. 2. In alpebus Norvegiae, Lapponiae, inque Siberia.

100. *Petiverii*, anth. muticis exsertis, cor. cylindraceis, calycinis foliolis subrotundis bracteatis, flor. pedunculatis solitariis terminalibus, fol. ternis squarrosopotentibus. Willd. p. 394. Lam. ill. t. 289. f. 3. Thunb. Diss. n. 21. Flor. solitarii, terminales. Cor. lutea. Similis *E. Pluckentii*,

<sup>ed</sup> Cal. duplex. Cor. luteae, acute quadrifidae. Fol. squarroso-imbricata. Lin.

101. *Banksii*, anth. muticis exsertis, cor. cylindrica limbo revoluta, cal. foliolis coloratis oblongis obtusis bracteatis, flor. sessilibus geminatis terminalib., fol. ternis linearibus glabris erectis. Willd. p. 395. Andrews Erica. n. 26. c. Icon. Caul. decumbens. Fol. lineari-trigona. Cor. viridilutea. Stigma viride. W.

102. *Sebana*, anth. muticis exsertis, cor. clavata incurvata, calycinis foliolis scariosis oblongis obtusis bracteatis, flor. ternis terminalib., fol. ternis linearib. squarropatentibus. Willd. Donn. index horti cantab. 45. Icon. horti Kewens. t. 30. E. Plukenetii. Berg. cap. 91. descriptio. Seba mus. 1. p. 32. t. 21. f. 4.

103. *monadelpha*, anth. muticis exsertis, cor. cylindrico-ovata, cal. foliol. coloratis obtusis bracteatis, flor. ternis terminalib., fol. ternis linearib. obtusis adpresso-erectis. Willd. p. 396. Andrews Erica. n. 22. c. Icon. Filam. dilatata margine leviter cohaerentia. W.

104. *Plukenetii*, anth. muticis longissimis exsertis, cor. cylindricis, stylo exserto, cal. simplicibus, fol. ternis. L. Syst. veg. 325. Thunb. Diss. n. 22. Icon. horti Kewens. t. 9. optima. Chamaepithys aethiopica, fol. laete virentibus, flore oblongo phoeniceo plusquam eleganti. Pluck. mant. 45. t. 344. f. 3. Seba mus. 2. t. 25. f. 5.

Obs. Plures varietates vid. apud Wendl obs. bot. p. 45-46. et Willd. Sp. p. 396.

105. *versicolor*, anth. muticis subexsertis, cor. clavato-tubulosus glabris, flor. pedunculatis terminalibus, fol. ternis linearibus ciliatis. Willd. p. 397. Andrews Erica. Cor. tubus aurantiaco-sanguineus superne flavus, lacinis limbi viridibus. W.

106. *perspicua*, anth. muticis inclusis, cor. tubulosus villosis, flor. sessilibus terminalibus solitariis, fol. ternis linearibus ciliatis. Willd. p. 397. Wendl. Erica. p. 7. t. 1. Er. Linnaei Hortulan. Cor. albidodiaphana. W.

107. *Aitoni*, anth. muticis inclusis, cor. hypocrateriformi, flor. umbellatis, foliis ternis linearibus patentibus erectis. Willd. p. 398. E. Aitonia. Andrews Erica. n. 21. c. Icon. Cor. figura et magnitudine Jasmini officinalis. Tubus sanguineus, viscosus. Limbus albus plenus.

\*\*\* *foliis quaternis, quinis et senis, pluribusve.*

108. *cephalotes*, anth. muticis inclusis,

stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis, cal. pubescentibus, flor. capitato-verticillatis, fol. senis linearibus. Willd. p. 398. Thunb. Diss. n. 23. Cor. purpurea.

109. *pulchella*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-campanulatis, cal. glabris, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus. Willd. p. 398. Thunb. Diss. n. 24. t. 4. f. 1. E. retroflexa. Wendl. de Er. fasc. p. 3. c. ic. Er. argutifolia. Salisb. l. c. p. 364.

110. *vestita*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. pubescentibus tubulosis curvatis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis adpressis linearibus margine carilagineis scabris. Willd. p. 399. Andrews Erica. Var. flor. albis et purpureis.

β. *longifolia*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. pubescentibus tubuloso-clavatis, flor. axillaribus verticillatis, fol. subdenis linearibus margine carilagineis scabris. Willd. p. 399. Donn. ind. horti cantab. p. 42. Icon. horti Kewens. t. 4. E. pinea. Wendl. Erica p. 11. t. 3.

Obs. Hanc cum priore conjunxit sub nomine *E. longiflorae* cl. Salisbury.

111. *pinea*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. glabris clavato-curvatis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearilanceolatis. Willd. Thunb. Diss. n. 26. Cor. alba, pollicaris.

112. *Leea*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. glabris tubuloso-clavatis subtetragonis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis rigidis. Willd. p. 400. Andrews Erica. n. 20. c. Icon.

113. *coccinea*, anth. inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavata pubescente, cal. villosis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus, basi margine glandulosus, subpubescentibus. Willd. p. 400. Wendl. Er. 3. p. 9. c. Icon. Er. abietina. Lin. Sp. pl. et Hort. Cliff. p. 148. n. 9. auctoritate ipsius speciminis. Salisb. l. c. p. 364. Seb. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 4. Cor. pubescentes. Flor. copiosi.

114. *purpurea*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. tubulosa glabra, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearib. Willd. Andrews Erica. n. 4. c. Icon.

115. *concinna*, anth. muticis inclusis, cor. cylindricis basi attenuatis, flor. terminalibus umbellatis, fol. subsenis glabris. Ait. Kew. 2. p. 23. Er. abietina. Andrews Erica. n. 64. c. Icon. Cor. carnea, extus villosiuscula. Germen turbinatum concavum, margine crenulato. L.

116. *grandiflora*, anth. muticis exsertis, cor. cylindraceis subincurvis glabris, stylo elongato, flor. axillaribus pedunculatis, fol. subnatis acerosis glabris. Willd. p. 104. Icon. horti Kewens. t. 8. Curt. mag. 189. c. Icon. *β. exurgens*. Andrews Erica. ic. Flos maximus aurantio-flavus.

117. *cylindrica*, mutica, fol. quaternis trigonis glabris, flor. terminalibus cylindricis glabris. Thunb. Diss. n. 29. Cor. alba, glabra semipollicaris.

118. *curvisflora*, anth. muticis, cor. curvato-clavatis glabris, flor. solitariis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. p. 402. Wendl. 1. Er. 3. p. 7. c. Icon. Andrews Eric. n. 40. c. Icon. Seb. mus. 2. t. 19. f. 5. Hab. ad rivulorum latera prope Drakenstein. Cor. sanguinea glabra.

119. *simpliciflora*, anth. muticis exsertis, cor. tubuloso-clavatis rectis, flor. terminalibus solitariis sessilibus, fol. quaternis lineari-trigonis glabris. Willd. Donn. catal. hort. cantab. 45. Er. curvisflora. L. Syst. veg. 305. auctoritate ipsius speciminis. Salisb. l. c.

120. *tubiflora*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubulosis pubescentibus, flor. terminalibus solitariis sessilibus, fol. quaternis lineari-trigonis pubescentibus. Willd. L. Syst. veg. 305. Seb. mus. 2. t. 19. f. 5.

121. *lanata*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis pubescentibus, flor. terminalibus subsolitariis, fol. quaternis linearibus villosis imbricatis erectis. Willd. Wendl. obs. 45. Ej. Er. fasc. 5. p. 5. c. ic. Simillima praecedenti, cor. magis curvata, brevior.

122. *spuria*, cal. ovato cuneato, cor. 7-8-lineari pubescente, tubo cylindrico urceolari, limbo revoluti, pericarpio obpyramidalis. Andrews Er. n. 46. ic. E. culticaeflora. Salisb. p. 357. Facie antecedentis.

123. *ignescens*, anth. muticis subexsertis, cor. cylindrica glabra, apice hirta, styl. exserto, flor. racemoso-pyramidalibus, fol. quaternis linearibus villosis patentibus. Wendl. de Er. fasc. 8. p. 3. c. ic. Cor. luteo-ignescens.

124. *splendens*, anth. muticis exsertis, cor. tubulosa clavata pubescente, styl. exserto, flor. terminalibus racemosis, fol. quinque plurimisque linearibus glabris obtusis. Wendl. l. c. p. 5. c. ic.

125. *procerus*, anth. muticis inclusis, styl. exserto, cor. tubulosis basi ventricosis, flor.

subsolitariis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis pubescentibus erectis. Willd. Wendl. obs. 45.

126. *conspicua*, anth. muticis subinclusis, cor. cylindricis curvis longissimis pilosis, limbo revoluti, stylo exserto, fol. quaternis glabris. Willd. Sp. pl. II. p. 404. Ait. Kew. 2. p. 22. Icon. horti Kewens. t. 12. Andrews Eric. n. 29. c. Icon. Cor. flava longe tubulosa, incurva, pubescens.

127. *glandulosa*, mutica, fol. quaternis linearibus glanduloso-pilosis, flor. clavatis glabris, cal. hispidis. Thunb. Diss. n. 32. Cor. cylindrico-clavata, sanguinea, pollicaris.

128. *transparens*, mutica, fol. quaternis trigonis ciliatis, flor. terminali-subsolitariis. Willd. Sp. pl. I. p. 404. Filamenta in hoc calcarata. Thunb. prod. 71. E. cerinthoides.

129. *cerinthoides*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. tubuloso-clavatis piloso-viscosis, flor. verticillatis nutantibus, fol. quaternis linearibus reflexis villosis glandulosis. Willd. Sp. pl. II. p. 405. Andrews Eric. n. 25. c. Icon. E. coris folio. Breyn. cent. 25. t. 13. Seb. mus. 2. p. 22. f. 4. et t. 34. f. 6.

130. *pectinifolia*, fol. laminis angusto ovato cuneatis, pectinatis, cal. rhombico spatulato, cor. 5-7-lineari, intus lanata. Salisb. l. c. p. 367. E. Cerinthoides. Thunb. Diss. 53.

131. *Sparmanni*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubulosis strigoso-villosis, calyce lanato, flor. sessilibus quaternis, fol. quaternis oblongis ciliatis imbricatis. Willd. p. 405. Lin. suppl. 219. Act. holm. 1778. p. 24. t. 2. Singularis capitulis florum semper divis in flores quatuor. Th.

132. *Massoni*, anth. muticis inclusis, cor. cylindricis grossis, flor. capitatis, fol. octofariis imbricatis pubescentibus. Willd. II. p. 406. Icon. horti Kewens. t. 18. Curt. mag. 306. c. Icon. Thunb. Diss. n. 35. t. 3. f. 2. Andrews Erica. n. g. c. Icon. Hab. in montib. Hottentots Holland. Flor. in capitulo terminali sessiles. Cor. cylindrica grossa.

133. *ventricosa*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. oblongo-ovatis, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearibus ciliatis. Willd. Sp. pl. II. p. 426. Thunb. Diss. n. 36. t. 1. f. 1. Andrews Erica. n. 2. c. Icon.

134. *ampullacea*, anth. muticis inclusis,

stylo exserto, cor. striatis basi globoso-ovatis, superne cylindraceis, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearib. ciliatis reflexis. Willd. p. 406. E. ampullacea. Curt. mag. 303. c. Icon. Cor. pallide purpurea, lineis saturatioribus longitudinalibus, basi globoso-ovata, superne elongata cylindracea. W.

135. *fastigiata*, anth. muticis inclusis, cor. hypocrateriformibus fasciculatis, stylo incluso, fol. quaternis. Syst. veg. 305. Lin. Diss. 44. c. fig. flor. Thunb. Diss. n. 17. Limbus subtus ruber, supra albus, lacinii subcordatis.

136. *incurva*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis, flor. terminalibus capitatis, fol. quaternis incurvis ciliatis. Willd. p. 407. Wendl. obs. 47. Accedit ad E. empetrifoliam.

137. *inflexa*, anth. muticis, fol. quinis trigonis incurvis glabris, flor. racemosis ovatis, cal. viridi. E. *incurva*. Thunb. prodr. suppl. p. 188.

138. *globosa*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. campanulatis, cal. imbricatis, flor. terminalibus globoso-capitatis, fol. quaternis linearibus cartilagineo-dentatis, apice callosis. Willd. p. 408. +

139. *comosa*, anth. muticis inclusis, cor. ovato-oblongis, stylo incluso, fol. quaternis, flor. congestis. L. Mant. 234. Thunb. Diss. n. 38. Icon. horti Kew. t. 18. Cor. ovato-cylindrica: limbo plano.

140. *denticulata*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. ovatis, cal. fol. membranaceis ciliato-dentatis, flor. terminalibus sessilibus, fol. quaternis linearis-trigonis glabris. Willd. p. 408. L. Mant. 229. E. *dentata*. Thunb. Diss. n. 30. Caul. distort. E. vulgaris. Cor. subinfundibuliformis.

141. *Muscari*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. ovatis subtetragonis, cal. foliolis lanceolatis integerrimis, flor. terminalibus sessilibus, fol. quaternis linearis-trigonis glabris. Willd. p. 409. Andr. Er. Icon. Cor. pallide flavae, subtetragonae.

142. *viscaria*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. campanulatis glutinosis, cal. fol. acicis ciliatis, flor. subracemosis, foliis quaternis linearibus glabris. Willd. p. 409. Icon. horti Kewens. t. 1. Thunb. Diss. n. 40. Cor. campanulata valde mucosa purpurascens.

143. *pyramidalis*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. hispidis campanulato-infundibuliformibus, flor. umbellatis, fol.

quaternis linearis-triquetris pubescentibus. Willd. p. 410. Ait. Kew. 3. p. 491. Curt. mag. 366. c. Icon. Cor. campanulato-infundibuliformis pilis brevissimis tecta.

144. *mediterranea*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. cylindraceo-campanulatis, flor. axillaribus, pedunc. flore brevioribus, fol. quaternis linearibus glabris. Willd. Curt. bot. mag. n. 471. c. Icon. Thunb. Diss. n. 41. Baub. hist. 1. p. 356. Hab. in Eur. australi. Caul. ramis albicantibus angulatis.

145. *multiflora*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis, flor. axillaribus, pedunc. longitudine floris, fol. quinis linearibus glabris. Willd. p. 411. Thunb. Diss. n. 42. E. juniperifolia. Gard. aix. 160. t. 32. Hab. in Anglia, G. Narbonne, Oriente et Redemont. Caul. 2-3-pedal. Cor. potius ovata. Balbis.

146. *herbacea*, anth. muticis exsertis, cor. oblongis, stylo exserto, fol. quaternis, flor. secundis. L. Syst. veg. 306.  $\beta$ . carnea. L. Jacq. austr. t. 32. Hab. in Europa australiori.

Obs. Flores autumno col. herbacei, oblongi sunt, vere amoene rubri: anth. fuscis prominulis.

147. *purpurascens*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. quaternis, flor. sparsis. L. Syst. veg. p. 306. E. procumbens dilute purpurea. Bauh. pin. 486. Hab. in Europa australi.

Obs. Haec cum praecedente a Salisbury. l. c. conjuncta est sub nomine E. *saxatilis*.

148. *vagans*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. quaternis, flor. axillaribus confertis. Smith. Engl. bot. t. 3. E. multiflora. Hud. Hab. in Africa, Tolosae et in ericetis Cornubiae.

149. *cubica*, anth. muticis inclusis, cor. campanularis acutis, stylo incluso, fol. quaternis patentibus. Lin. Andrews Eric. 32. (ic. mala.) Thunb. Diss. n. 46. Flor. terminales corymbosi. Cal. scariosus. Cor. purpurea, basi pallida.

150. *racemosa*, mutica, fol. quaternis lanceolatis villosis, flor. racemosis globosis, calycib. tomentosis. Thunb. l. c. n. 47. t. 3. f. 1. Rami verticillati et elongati, pubescentes. Flor. incarnati subnantes in ramulis racemosi. Thunb. Inflorescentia in axillis *simplex* non racemosa. Salisb. l. c. p. 343.



++++ *Obs.* Numerosae sequentes species seorsim hic enumerantur, cum auctor haud animadvertit, quibus divisionibus sint inserendae.

151. *spiculifolia*, pedunc. ebracteatis, cal. breviter 4-fido, cor. 1-lineari, laevi, tubo cyathiformi 4-angulo, filamentis muticis. Salisb. Trans. of the Linnean society. Vol. VI. p. 316. Hab. in monte Olympo. Singularis ob defectum bractearum. S.

152. *asperifolia*, folior. laminis linearibus, cor. lineari viscido, tubo sphaerico, filamentis saepius calcaratis, pericarpio (caps.) lanato. Salisb. l. c. E. *setacea*. Andrews. Hab. in Hottentots Holland.

153. *oxycoccifolia*, caule decumbente, filiformi, folior. laminis ovatis, cor. lineari campanulata hirsuta, filamentis muticis. Salisb. l. c. p. 325. Cum priore in humilis. Simillima Vaccinio oxycocco. L.

154. *sicaefolia*, folior. laminis mucronatis, cor. lineari extus hirsuta, tubo cyathiformi, calcaribus linearibus-attenuatis, pericarpio glabro. Salisb. Hab. in Hottentots Holland.

155. *fausta*, folior. laminis setosis, cor. 2-3-lineari, extus pubescente, tubo urceolari, calcaribus aurito-attenuatis, valde serratis. Salisb. p. 326.

*Obs.* Similis Er. hirtae Thunb. sed differt fol. basi latioribus, antheris linearibus, quae in E. hirta versus apicem sensim angustatae. S.

156. *tomentosa*, folior. laminis angusto linearibus, cal. planiusculo, cor. lineari, utrinque tomentosa, calcaribus longis recurvis. Salisb. p. 327.

157. *auricularis*, folior. laminis lineari lanceolatis, cor. 2-lineari, extus pubescente, tubo ovato, calcaribus minutis, auricularibus. Salisb.

158. *helianthemifolia*, fol. binis, laminis obovatis planiusculis, cor. lineari, utrinque pubescente, calcaribus longis. Salisb. p. 328.

159. *polytrichifolia*, caule tomentoso, bracteis remotis, cal. basi sensim angustato, cor. lineari, calcaribus cuneatis. Salisb. l. c. p. 329. Hab. prope Lisboa. Banks.

*Obs.* Similis Er. scopariae. Sed flores inodori, cor. oblonga: tubo poculiformi, stigma fibulaeformae, nec petatum, pericarpium pyriforme. S.

160. *tenuis*, caule divaricato, foliorum laminis linearibus, cor. lineari, campanulata, laevi filamentis brevissimis, calcaribus lineari-attenuatis. Salisb. p. 329. Hab. . . .

161. *glomiflora*, folior. laminis angustocuneatis, cal. bracteis imbricato, cor. 2-lineari viscido, tubo sphaerico, calcaribus villosissimis. Salisb. l. c. p. 330.

162. *cardusifolia*, folior. laminis setosis, pedunc. longis, cor. 2-lineari laevi, tubo globoso, filam. brevissimis. Salisb. l. c.

163. *tubercularis*, cor. lineari, tuberculis aspera, tubo globoso, filamentis muticis, pericarpio longe stipitato. Salisb. l. c. Hab. . . .

164. *campanularis*, caule glabro, folior. laminis angustis, cor. 2-lineari campanulata laevi, filamentis brevissimis muticis. Salisb. l. c. E. *tenuifolia*. Hortul. Flos Convall. majalis, luteus.

165. *blanla*, flor. glomeratis, cor. lineari, limbo tubo dimidio longiore, laciniis semiorbicularibus, stigmate lato. Salisb. p. 331.

166. *scriphtifolia*, foliolis minute ciliatis, cor. lineari, limbo basi integro obtuso, filam. muticis. Salisb. p. 331. E. cubica. Thunb. Diss. n. 46.

167. *lavandulaefolia*, caule incano, bracteis juxta calycem, cor. bilineari, tubo 4-angulo, limbo incurvo, filam. inferne latissimis. Salisb. Habit. in Hottentots Holland. h

168. *humifusa*, fol. binis, laminis ovalibus, cor. lineari, limbo amplo, stylo longe exserto. Salisb. p. 332.

169. *corydalis*, folior. laminis lanceolato-cuneatis, cor. bilineari, limbo basi integro, antheris dorso alatis. Salisb. p. 334. Hab. ad Cap b. spei. h

170. *asaleaefolia*, folior. laminis lanceolatis, cor. lineari, hirta, antheris exsertis, pene totis foraminosis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

171. *vesicularis*, fol. vesiculis nigris adspersis, cor. lineari, viscido-pubescente, calcaribus parallelis cuneatis, pericarpio sericeo. Salisb. l. c. p. 335. E. *conacea*. Hortulan.

172. *verniciiflua*, fol. viscidis, cor. bilineari, limbo recurvo, calcaribus curio cuneatis hirtis, pericarpio laevi. Salisb.

173. *Lachneaeifolia*, foliorum laminis ovalibus pubescentibus, cor. bilineari, limbo recurvo, calcaribus longis, anguste cuneatis. Salisb. l. c. p. 335. E. *Lachnaea*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

174. *lyrigeria*, fol. lucidis, cor. lineari, limbo recurvo, calcaribus serratis, antheris lyracformib., pericarpio tomentoso. Salisb. l. c. p. 336.

175. *salax*, fol. lividis, cal. adpresso, cor. lineari, filam. brevissimis, pericarpio laevi, stigmate lato. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

176. *cumuliflora*, fasciculis 7-12-floris, cal. incano, cor. bilineari, limbo inferne ciliato, pericarpio hirta, stigmate angusto. Salisb. l. c. p. 336. Hab. in Hottentots Holland.

177. *genistaefolia*, fasciculis 3-floris, cal. viscido, cor. bilineari, limbo inferne ciliato, pericarpio laevi, stigmate lato. Salisb. l. c. p. 337. Hab. . . .

178. *periplocaefolia*, folior. laminis lanceolatis cuneatis, pedunc. longis, cal. brevi orbiculari, cor. 1-2-lineari, stigmate angusto. Salisb. l. c. p. 337.

179. *lucida*, cal. minute ciliato lucido, cor. lineari, calcarib. auricularibus, incisio-serratis, stigmate angusto incluso. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

180. *munda*, bracteis cal. — que integerrimis, cor. lineari, calcaribus auricularib. ciliatis, pericarpio hirsuto. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

181. *fabrilis*, fol. dense imbricatis, cor. lineari, cal. vix longiore, calcaribus integerrimis, antheris minutis, pene didymis. Salisb. l. c. p. 338. Hab. in Hottentots Holland. h

182. *dianthifolia*, fol. binis longis, cal. ovato-cuneato, cor. trilineari, calcaribus serratis, pericarpio glabro. Salisb. l. c. Hab. ad Cap. b. spec. h

183. *brevifolia*, folior. laminis ovatis, cor. lineari, cal. longiore, calcarib. linearibus attenuatis, seminibus striatis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

184. *chlamydiflora*, foliorum laminis linearibus hirsutis, cor. bilineari, cal. vix longiore, calcaribus auricularibus, seminibus ovatis. Salisb. Hab. in Hottentots Holland. h

185. *selaginifolia*, caule tomentoso,

cor. lineari laevi, tubo globoso, calcaribus latissimis orbicularibus. Salisb. l. c.

186. *pannosa*, folior. laminis parum reduplicatis, cor. bilineari lanata, filam. latis breviter calcaratis, stylo exserto. Salisb. p. 339. Hab. in Hottentots Holland.

187. *ciliciflora*, fol. ternis minutis, cal. pilosissimo, bracteis distincto, cor. lineari hirta tetrandra, filam. muticis. Salisb. Anther. pene didymae, valde barbatae. An *Blaeria*, uti 5 sequentes? P.

188. *xeranthemifolia*, fol. ternis, laminis valde incurvis, cal. lanato, imbricato, cor. lineari lanata tetrandra. Salisb. Hab. in Hottentots Holland.

189. *nodiflora*, fol. ternis, cal. infundibuliformi villosissimo, cor. lineari hirta tetrandra, anth. breviter foraminosis. Salisb. l. c. p. 340.

190. *rosculosa*, cal. imbricato, cor. lineari, tubo angustissimo, superne repente dilatato tetrandra, filamentis angustissimis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

191. *exilis*, fol. quaternis, cal. infundibuliformi glabro, cor. lineari glabra, tetrandro, filamentis muticis. Salisb. l. c. E. *scabra*. Thunb. prodr. p. 72.

192. *labialis*, fol. ternis, laminis glabris, cal. bilabiato imbricato, cor. lineari, 2-bilabiata, 4-5-andra. Salisb. Hab. in Hottentots Holland.

193. *barbigera*, cal. bracteis imbricato, profunde 4-fido barbato, cor. bilineari, glabra, 4-5-andra, filam. muticis, stylo angustissimo. Salisb. l. c. p. 341. Hab. in Hottentots Holland. h

194. *bruniaefolia*, fol. longis, bracteis juxta calycem: exteriore longissima, cor. lineari hexandra, filam. calcaratis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

195. *turmalis*, pedunc. brevissimis, cal. minuto adpresso, cor. bilineari, 4-5-andra, filam. muticis, anth. latis. Salisb. l. c. p. 342. Facies antecedentis, sed penitus distincta, cal. triplo minore. S.

196. *equisetifolia*, fol. ternis, fasciculis 3-5-floris, pedunc. longis glabris, cor. lineari, 4-5-andra, filam. muticis. Salisb. E. *articularis*. Hortulan. Hab. . .

197. *diotaeflora*, cal. late cuneato, cor. lineari, tubo amphoraeformi, anth. parum exsertis, pericarpio pubescente. Salisb. p. 352.

198. *manipuniiflora*, caule inaequali, flor. in axillis interruptis, cor. lineari, tubo cyathiformi, anth. in sertum erectis. Salisb. p. 344. E. verticillata. Forst. f. p. 210. Hab. juxta Bujuchiar.

199. *padibunda*, fol. 3-4-nis, cor. bilineari, viscida, tubo ovato, anth. latis, exsertis hirtis, pericarpio turbinato hirtio. Er. *nutans*. Wendl. Er. fascic. 3. p. 5. e. icon.

200. *filiformis*, bracteis juxta calycem, cor. lineari glabra, limbo recurvo, anth. longe foraminosis, stigmate angusto, fol. ternis. Salisb. l. c. p. 345. Hab. in Hottentots Holland. h

201. *turgida*, pedunc. brevissimis, cor. lineari, hirta, tubo modiali, calcarib. cuneatis: anth. brevissimis. Salisb. p. 345. Hab. . . .

202. *vestiflua*, folior. laminis incurvo patentibus, juniorib. pilosis, flor. solitariis, cor. 7-9-lineari, tubo cylindraceo. Salisb. p. 346. Hab. . .

203. *socciflora*, folior. laminis recurvo-patentibus, cor. 4-6-lineari, tubo ovato-pyramidalis, pericarpio ovato. Salisb. Er. *sebana*. (p. viridis. Andr. Er. n°. 59. c. Icon. E. *Pettiverii* Hortulan.

204. *follicularis*, folior. laminis patentibus, floribus solitariis, cor. 5-7-lineari, basi inflata, nectario plinthiformi. Salisb. l. c. Er. *Pettiveriana*. Andr. Er. n°. 25. c. Icon. Var. (p. Er. *melastoma*. Andr. Er. n°. 43.

205. *penicilliflora*, cor. bilineari, cal. obducta, tubo sphaerico, anth. in penicillum auctum convergentibus. Salisb. E. *Pettiverii* vera. Hortulan.

206. *placentaeiflora*, fol. obtusissimis, cor. calyce obducta, tubo rapaeiformi, filam. sensim dilatatis, stigmate angusto. Salisb. l. c.

207. *squamaeiflora*, bracteis supra medium pedunculi sparsulis, cor. lineari, cal. breviori, anth. acuminulatis, pericarpio late ovato. Salisb. p. 349. Hab. prope Bay Falso. h

208. *caesia*, cal. bracteis imbricato, cor. lineari, cal. breviori, anth. obtusis, septo lato, pericarpio ovato. Salisb.

209. *flexuosa*, bracteis supra medium pedunculi sparsulis, cor. lineari, cal. longiore, anth. obtusis septo angusto, nectario grandi. Salisb. l. c. p. 349. E. *flexuosa*. Andr. Er. n°. 33. c. Icon.

210. *lasciva*, cal. bracteis imbricato, cor. lineari, cal. parum breviori, anth. a basi foraminosis, stigmate peltato. Salisb. l. c. p. 349. E. *imbricata*. Thunb. Diss. n°. 117. auctoritate ejus speciminis. Facile dignoscas antheris longe foraminosis. S.

211. *stylosa*, pedunc. longis, bracteis juxta calycem sparsulis, cor. lineari calyce parum longiore, anth. acuminulatis, pericarpio ovali. Salisb. l. c. Stylus longissimus. Hab. . .

212. *diosmaefolia*, fol. lividis, cor. bilineari, laciniis imbricatis, filam. angustissimis, calcaribus exquisite attenuatis serrulatis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

213. *palliflora*, caule angulato, folior. laminis lanceolato cuneatis, cor. lineari calyce parum longiore, calcarib. auricularibus glabris. Salisb. l. c. p. 351. Hab. in Hottentots Holland.

214. *regulaefolia*, folior. laminis ovalib. pubescentibus, cor. lineari, tubo parum 4-angulo turbinato, calcaribus grandibus orbicularibus. Salisb. l. c. p. 351. Hab. in Hottentots Holland.

215. *modesta*, fol. parvis dense imbricatis, cor. 3-lineari tomentosa, tubo late ovato, limbo recurvo, calcaribus lineari-attenuatis. Salisb. l. c. p. 352.

216. *holosericea*, folior. laminis argute reduplicatis, cor. 3-lineari, holosericea, tubo ovato, anth. hirtis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

Obs. Species pulcherrima, ab omnibus hucusque cognitis cor. sua holosericea facile dignoscenda. S.

217. *glauca*, fol. ternis glaucis succulentis, cor. 3-lineari extus rorida, calcaribus suborbicularibus. Salisb. p. 353. Andrews Er. 47. cum Icon.

218. *versicolor*, cal. incurvo erecto, cor. 8-lineari, tubo plus minus 6-costato, filam. muticis, basi dilatatis. Salisb. l. c. Andrews Eric. n°. 12. c. Icon. Var. fol. viridibus et glaucis, cor. parum vel saturate coccinea: E. *costata*. Andrews Eric. n°. 46. c. icon.

219. *decora*, cal. plano, marginibus crassis, cor. 8-10-lineari, viscido-pubescentibus, tubo clavato, calcaribus longis pubescentibus. Salisb. Erica Eweri. Hortulan. Hab. . . .

220. *nana*, caule humifuso, fol. obtusis, cor. 9-11-lineari, extus rorulenta, tubo

clavato compresso, calcarib. longis. Salisb. *Er. depressa*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

221. *sacciflora*, cal. late ovato acuminiato, cor. 6-8-lineari glabra: tubo cylindraceo, calcaribus longis, anth. linearibus valde papulosis. Salisb. Habit. in Hottentots Holland. h

222. *cylindriflora*, fol. ciliatis, setis decompositis, cal. recurvulo, cor. 9-lineari glabra, tubo cylindraceo. calcarib. brevibus. *E. serratifolia*. Andrews Er. n. 36. c. Icon. Salisb. l. c. p. 356.

223. *cyrillaeflora*, caul. tenui, cor. 2-3-lineari pubescente, tubo anguste campanulato, limbo brevi, filamentis muticis. Salisb. l. c. p. 357. Habit. in Hottentots Holland. h

224. *velitaris*, cor. 2-3-lineari pubescente, tubo obovato, limbo recurvo patente, calcarib. longis argute cuneatis perum serratis. Salisb. Hab. . .

225. *cuspidigera*, pedunc. glabris, cal. ovato-cuspidato, cor. 11-12-lineari, pubescente, limbi interstitiis basi lanceolatis, anth. hirtis. Salisb. p. 358.

226. *bibax*, (*Ammea*), cal. foliolis imbricatis inaequalibus, cor. 8-lineari pubescente, tubo valde clavato, laciniis basi imbricatis. Salisb. *E. curviflora*. Thunb. Diss. 30. *E. Ammea*. Hortulan. Hab. ad Cap. b. spec. h

227. *buccinaeflora*, pedunc. pubescentibus, cor. 9-10-lineari pubescente, limbo recurvo patente, filamentis pubescentibus. Salisb. p. 359. *E. tubiflora*. Thunb. Diss. n. 31. Hab. . . †

228. *stagnalis*, folior. laminis hirsutis, pedunc. glabris, cor. 10-11-lineari hirsuta, anth. rectis papulosis. Salisb. Hab. . .

229. *longiflora*, pedunc. glabris, cal. recurvo patente basi extus convexa, cor. 18-20-lineari pubescente, limbo obtuso. Salisb. l. c. p. 359. *E. elata*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

230. *sordida*, ramis sparsis lanatis, flor. saepius solitariis, cal. adpresso basi extus convexo, cor. 12-lineari, rare lanata. Andrews Erica. n. 56. c. Icon. *Er. laniflora*. Wendl. Er. 2. p. 23. c. Icon. Salisb. l. c. p. 360.

231. *exurgens*, folior. laminis recurvis acutis, cor. 13-15-lineari viscida, tubo infundibuliformi, laciniis ovato-cuneatis.

Andrews Er. n. 13. c. Icon. *Er. pharitraeformis*. Salisb. l. c. p. 361. Dignoscenda ab omnibus aliis, cor. laciniis versus apicem attenuatis bifidulisque. S.

232. *cerviciflora*, cor. 5-6-lineari pubescentula, tubo angusto urceolari, limbo patente, filam. minute calcaratis. Salisb. l. c. p. 362. *E. inaperta*. Hortulan.

233. *calamiformis*, cal. adpresso, cor. 9-10-lineari glabra, tubo cylindraceo-urceolari, limbo recurvo, pericarpio laevi. Salisb. l. c. p. 362. *E. radiata*. Andrews Er. n. 53. c. Icon.

234. *pulviniformis*, folior. laminis attenuatis serrulato ciliatis, flor. in rudimentis ramulorum longiusculis, cor. 7-9-lineari viscida, tubo cylindraceo urceolari. Salisb. l. c. p. 364. Hab. in Hottentots Holland.

235. *sceptriflora*, caul. stricto, pedunc. brevissimis, cal. calloso, foliolis late spatulatis inciso serratis, cor. 7-10-lineari rorulenta. Salisb. p. 365.

236. *clavaeflora*, pedunc. brevissimis, cal. foliolis orbiculato-spatulatis, integerrimis, cor. 10-12-lineari rorulenta. Salisb. p. 365.

237. *alveiflora*, pedunc. glabris. cor. 7-9-lineari rorulenta, tubo cylindraceo urceolari, inferne 5-angulo. Salisb. l. c. p. 366. *E. gelida*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

238. *brachialis*, cor. 6-8-lineari utrinque hirsuta, tubo curvo pyramidalis, anth. inclusis longissimis. Salisb. l. c. p. 367. Hab. in Hottentots Holland. h

239. *dolitiflora*, fol. hirsutis, bracteis juxta calycem, cor. 4-5-lineari viscida, tubo urceolari, calcarib. brevibus cuneatis. Salisb. l. c. p. 368. *Er. mammosa*. Thunb. Diss. n. 60. c. fig.

240. *pyxidiflora*, cal. quadrifido, cor. bilineari laevi, tubo obovato limbo incurvo patente, pericarpio hemisphaerico glabro. Salisb. l. c. p. 371. *E. empetroides* Hortulanis. Flores odorem cerae spirant.

241. *notaeiflora*, cal. tetraphyllo; cor. 2-lineari laevi, tubo calathiformi, limbo recurvo patente, stigmato inclusio. Salisb. p. 371. Hab. in Hottentots Holland. h

242. *sesta*, caule valde angulato, fol. 4-nis, cor. bilineari viscida, tubo angusto urceolari, filamentis muticis. Salisb. l. c. p. 371. Hab. in Hottentots Holland. h

243. *fallax*,

243. *fallax*, cor. bilineari viscida, tubo urceolari parum costato, filamentis longitudine tubi calcaratis, pericarpio viscido. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

244. *parilis*, 3-lineari viscida, tubo urceolari parum costato, filam. vix longitudine tubi minute calcaratis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

245. *pubigera*, cal. patente ovato acuminato, cor. lineari pubescente, limbo longiusculo recurvo, pericarpio hirt. Salisb. p. 372.

246. *pusilla*, cal. adpresso late ovato-cuneato, cor. lineari pubescente, tubo calathiformi, limbo longitudine tubi, pericarpio glabro. Salisb. l. c. p. 374. Hab. ad Cap. b. spei. h

247. *tragulifera*, cal. imbricato, cor. bilineari tubo urceolari, limbo recurvo, calcaribus hirsutis, anth. latissimis foraminosis hirsutis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

248. *curvirostris*, folior. laminis linearibus, cal. adpresso, cor. lineari, tubo sphaerico, calcaribus pubescentibus, stylo sursum curvo. Salisb. p. 375. E. *declinata*. Hortulan. Flores gravem, fere nauseosum odorem spirant.

249. *gracilis*, cal. minuto, cor. lineari, tubo ovali, limbo recurvo, calcarib. lineari attenuatis hirtis. Salisb. l. c. p. 375. E. *imbecilla*. Hortul. Hab. . . .

250. *intervallaris*, caule tenui, fol. verticillis remotis, 1-2-lineari tubo ovato cylindraco orelato, pericarpio hirtou. Salisb. l. c. p. 375. Hab. . . .

251. *quadraeflora*, caule glabro, cor. lineari, tubo poculiformi, limbo erecto, calcarib. lanceolato-cuneatis integerrimis. Salisb. l. c. p. 375. Habit. in Hottentots Holland. h

252. *turrigera*, fol. angustis, cal. recurvo horizontali, cor. bilineari, tubo haemisphaerico, laciniis basi imbricatis. Salisb. l. c. p. 377. E. *cupressina*. Hortulan.

253. *turbinaflora*, caule glabro, cor. lineari laevi, tubo turbinato 8-angulo, limbo incurvo, calcaribus auricularibus, glabris. Salisb. l. c. p. 377.

254. *blenna*, folior. laminis ovato-cuneatis, cor. 4-5-lineari viscida, tubo urceolari, laciniis basi imbricatis, filam. latissimis. Salisb. l. c. p. 379. Habit. in Hottentots Holland. h

255. *verecunda*, fol. 4-nis, spicis coar-

tatis, cor. bilineari laevi, tubo amphoraeformi, limbo crenulata. Salisb. l. c. E. *cernua*. Andrews Eric. n° 48. c. Icon.

256. *pulchella*, cor. bilineari glabra, tubo urceolari, parum 4-gono, calcarib. cuneatis hirsutis, anth. hirsutis. Salisb. Hab. in Hottentots Holland. h

257. *embothriifolia*, folior. laminis lineari lanceolatis, spicis coarctatis, cor. 4-lineari, tubo superne admodum ventricosos, anth. exsertis. Salisb. l. c. p. 379.

258. *curvifolia*, fol. ternis, laminis recurvis, spicis coarctatis, cor. 4-lineari viscida, tubo ovato pyramidali, calcaribus lineari attenuatis. Salisb. l. c. p. 380. Hab. in Hottentots Holland. h

259. *squarrosa*, cor. 5-6-lineari viscida, tubo ovato pyramidali limbo obtuso, calcaribus marginalibus, anth. laevibus. Salisb. l. c. p. 380.

260. *capax*, folior. laminis ovato cuneatis, cor. 9-11-lineari viscida, tubo late ampullaeformi, limbo recluso. Salisb. l. c. p. 381. Hab. in Hottentots Holland.

261. *lagenaeformis*, fol. ternis, cor. 12-14-lineari viscida, tubo ovato apice ventricosos, limbo tubo 4-plo brevior ovato. Salisb. p. 382. E. fol. 4-nis erecto-petulis, cor. lagenaeformi viscida limbi laciniis ovatis, tubo 4-plo breviorib. Vent. Malma. t. 33. E. *jasmiflora*. Andrews Erica. n° 49. Icon.

262. *pagetiaeflora*, pedunc. brevissimis, cor. 5-6-lineari, limbo intus farinoso, filamentis juxta apicem antherae calcaratis. Salisb. Hab. ad Cap. b. spei. h

263. *fistulaeflora*, cal. minute ciliato, cor. 5-6-lineari, tubo angusto-cylindraco urceolari, limbo brevissimo, filam. muticis. Salisb. p. 383. E. *cylindrica*. Thunb. Diss. n° 39.

264. *nidiflora*, caule pubescente, cal. obcuneato serrato, cor. 3-lineari, limbo tubo timido brevior, calcaribus minutissimis auricularibus. Salisb.

265. *Walkeria*, caule glabro, cal. anguste lanceolato serrato, cor. 4-5-lineari, limbo duplo brevior, anth. breviter foraminosis. Andrews Erica. n° 45. c. Icon. Er. *pulchra*. Salisb. l. c. p. 384.

266. *daphnaeflora*, caule ovato cuspidato vix serrato, cor. 4-lineari, limbo tubo duplo brevior recurvo flexo, filamentis muticis. Salisb. p. 384. Hab. in Hottentots Holland. h

267. *pellucida*, caule gracili, cal. spatulato serrato, cor. 5-6-lineari, limbo tubo triplo brevior, glan. mucis. Salisb. Hab. in Hottentots Holland. h

268. *borbonicaeflora*, fol. binis, cal. 3-lineari, late ovali acuminulata, cor. 3-lineari, tubo ovato, pericarpio obovato. Salisb. p. 386.

269. *hyssoipifolia*, folior. lamineis pubescentibus ciliatis, cor. bilineari, versus apicem hirsuta, laciniis crispis retusis. Salisb. p. 387. Hab. ad Cap. L. spec. prope Bay Falso. h

964. *OPHIRA*. *Involucr.* 2-valve, 3-florum. *Cor.* 4-petala, supera. *Bacca* 1-locularis.

1. *stricta*. Lam. ill. gen. t. 293. Hab. in Africa. Fol. opposita, ovato-linearia. Flor. laterales. h

965. *GRUBBIA*. *Involucr.* 2-valve, triflorum. *Cor.* 4-petala, infera. *Stigma* simplex.

1. *rosmarinifolia*. Berg. cap. 90. t. 2. f. 3. Hab. ad Cap. bon. Spec. Flor. axillares, conglomerati, hirsuti. B. h

966. *LAGETTA*. *Cor.* supera, caudica, tubulosa, quadridentata, glandulis 4, petaliformibus. *Cor.* fusertis. *Drupa* pilosa, pisiformis, 1-sperma, infera. *Lam.*, tecta.

1. *lutearia*. Lam. enc. 3. p. 326. Ej. ill. t. 289. *Daphne* Lazetto. Swartz. Flor. ind. occid. 2. p. 680. Willd. p. 419. Hab. in montib. Jamaic. et ad St. Domingo. Cort. interior est compositus e reticulo linteaeformi, unde nomen *bois-dentelle* apud incolae. Flor. spicati. h

*Obs.* Non solum genere a *Daphne* differt sed et familia, quae *Elacagni* est. L.

~~~~~  
THYMELAE (Gen. 967-972.) instructae sunt cor. (sed potius cal. colorato) 1-petala, infera, tubo in plurimis longo tenni, piloso, ore nunc nuda, nunc squamulis petaloideis aut glandulis obsita. Stam. 2-4-8-10, ut plurimum duplici serie inserta. Pistillum simplex. Fructus est drupa, vel semen 1, nudum, arillatum aut cor. part. inferiore tectum. Caul. plerumque lignosus, frutescens. Fol.

simplicia, integerrima plerisque, et communiter alterna.

967. *DAPHNE*. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida, corollacea, marcescens, *Stamina* includens. *Drupa* 1-sperma.

* *Floribus lateralibus.*

1. *Mezereum*, flor. sessilib. ternis caulinis fol. lanceolatis deciduis. L. Flor. dan. t. 268. Hab. in sylvis. Var. flor. albis. h

2. *Thymelaea*, flor. sessilibus axillari-bus, fol. lanceolatis, ramis simplicissimis. Vahl. symb. 1. p. 28. D. fol. lanceolatis glaucis utrinque glabris. Lam. encycl. 3. p. 434. *Thymelaea alpina* glabra, flosculis subluteis ad folior. ortum sessilibus. Pluk. alm. 366. t. 229. f. 2. Hab. in Hispania et Mospeli. h

3. *pubescens*, flor. sessilibus lateralibus aggregatis, fol. lanceolato-linearibus, caule pubescente. L. Mant. 66. Hab. in Austria. Flor. angusti, tubo filiformi. Diversa videtur a D. *Thymelaea*. L. h

4. *vermiculata*, flor. sessilibus lateralibus solitariis glabris, fol. linearilanceolatis villosis. Vahl. symb. 1 p. 28. Barr. ic. 231. Hab. in Arragonia.

5. *villosa*, florib. sessilibus lateralibus solitariis, fol. lanceolatis planis ciliatis pilosis confertis. L. Sp. pl. 510. Tournet. inst. 504. Hab. in Lusitania et Hisp. Fol. polygoni, utrinque pilis albis remotis oblecta. Flor. angusti, parvi. h

6. *Tartonraira*, flor. sessilibus lateralibus aggregatis, basi squamis imbricatis, foliis obovatis nervosis sericeis. Vahl. symb. 3. p. 53. Lam. ill. gen. t. 290. f. 2. *Tarton-Raire* galloprovinciae mospeliensis. Lob. ic. 371. Barr. ic. 227. Hab. in Galloprovincia. Flor. passim solitarii dioici? h

7. *tomentosa*, flor. sessilibus axillari-bus, col. oblongis obtusis utrinque sericeo-tomentosis. Lam. enc. 3. p. 436. An Tili. Pis. 165. t. 29. f. 2. ? Hab. in Oriente. Antecedenti affinis, sed major.

8. *nitida*, flor. lateralibus aggregatis sessilibus basi nudis, fol. linearilanceolatis sericeis enerviis. Vahl. symb. 3. p. 51. S. argentata. Lam. enc. 3. p. 436? Hab. in mont. calcareis Tuncet. h

9. *alpina*, florib. sessilibus aggregatis

sublateralibus, fol. lanceolatis obtusiusculis, subtus tomentosis. L. β . Pluck. alm. 366. t. 229. f. 3. Hab. in albis. h

10. *coridifolia*, flor. axillaribus sessilibus solitariis confertis-spicatis, fol. lineari-subulatis nudis. Lam. l. c. Ej. ill. gen. t. 290. f. 3. Hab. in Hispan., Gallicia. Herb. Juss. Parva, facie Ericae.

11. *thesioides*, flor. axillarib. sessilibus subgeminis, fol. linearibus glabris, ramulis simplicibus. Lam. l. c. p. 437. et Ej. ill. f. 4. Cresc. cum priore?

12. *Laureola*, racemis axillaribus quinquefloris, fol. lanceolatis glabris. Lam. Jacq. Flor. austr. t. 183. Laureola. Dod. Blackw. t. 62. Hab. in sylv. Europ. australioris. Sempervirens. Flor. virescentes.

13. *pontica*, pedunc. lateralibus bifloris, fol. lanceolato-ovatis. L. Andrew. Repos. t. 73. Tournef. itin. 3. p. 180. t. 180. Hab. in Ponto in oriente. Flor. penduli, acuti, flavi. h

14. *pendula*, capitul. lateralibus pedunculatis involucrentibus nutantibus, fol. lanceolato-ellipticis alternis glabris. Smith. ic. ined. t. p. 34. t. 34. Willd. Sp. p. 410. Scopolia composita. Lin. suppl. 409. Hab. in Java. Arb. Stipulae nullae. Pedunc. in axillis foliorum positorum casum solitarii nutantes filiformes. S.

* * *Floribus terminalibus.*

15. *tinifolia*, racem. compositis erectis, flor. terminalibus confertis, fol. oblongis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 683. Habit. in montib. Jamaicae.

16. *Gnidium*, racem. terminalibus paniculatis, fol. lineari-lanceolatis acuminato-cuspidatis. Willd. p. 420. Hab. in Hisp., Italia, G. Narbonensi, et in Barbaria, in locis aridis. Flor. parvi, odorantes, albicantes.

17. *rotundifolia*, hirsuta, flor. terminalibus congestis sessilibus, fol. oppositis ellipticis subpetiolatis obtusis glabris. Lin. suppl. 223. Hab. in ins. Namoka. Rami tomentosi. h

18. *foetida*, glabra, flor. terminalibus congestis sessilibus, fol. oppositis petiolatis ovato-oblongis acutis. Lin. suppl. 223. Hab. in insula Tahiti. An distincta a priore?

19. *indica*, capitulo terminali pedunculato, fol. oppositis oblongo-ovatis glabris. L. Hab. in China. Odor gratissimus. †

20. *odora*, capitulo terminali subsessili multifloro, fol. sparsis oblongo-lanceolatis glabris. Ait. Kew. 2. p. 26. Banks ic. Kaempf. t. 16. Hab. in China, Japonia. Flor. albi, odorati. An eadem ac *indica*?

21. *occidentalis*, pedunc. axillaribus, flor. terminalibus umbellulatis dioicis, fol. alternis lanceolatis glabris. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 685. Hab. in mont. Jamaicae australis. h

22. *Cneorum*, flor. fasciculatis terminalibus sessilibus, fol. lanceolatis nudis mucronatis. L. Pollich. Flor. pal. t. 1. f. 4. Jacq. Fl. austr. t. 426. Duham. arb. 2. t. 94. Hab. in montosis et subalpinis. Caul. humifusi. Flor. suaveolentes, rubri. Vere et aestate denuo floret. h

23. *altaica*, flor. terminalibus subsessilibus, fol. oppositis oblongo-lanceolatis obtusis basi angustatis glabris. Willd. Pall. ross. 1. p. 51. t. 35. Hab. in Sibiria, in alpibus Altaicis. Flor. albi, in capitulum congesti. h

24. *squarrosa*, flor. terminalibus pendunculatis, fol. sparsis linearibus patentibus mucronatis. L. Burm. afr. 134. t. 49. f. 1. Hab. in Aethiopia, et in Cap. b. spici. h

25. *glomerata*, flor. subsessilibus glomeratis terminalibus, fol. ovato-lanceolatis glabris involucriformibus, caule simplici. Lam. enc. 3. p. 435. Hab. in Oriente. Flor. albi. h

26. *oleoides*, flor. geminis terminalibus sessilibus, fol. elliptico-lanceolatis glabris. L. Schreb. dec. 13. t. 7. D. salicifolia. Lam. enc. 3. l. c. Alp. exot. 44. t. 43. Hab. in Creta. Flor. parvi, albi, 2-3.

27. *collina*, flor. fasciculatis terminalibus, fol. obovatis obtusis supra glaberrimis subus villosis. Smith spicil. t. 18. Duham. ed. nov. t. 1. t. 11. D. *sericea*, flor. aggregatis terminalibus sessilibus, fol. lanceolatis subtus villosis, laciniis corollae obtusis. Vahl. symb. 1. p. 28. D. *oleaefolia*. Lam. l. c. p. 440. Habit. in collibus Italiae australis, et in Creta. h

28. *DIRCA*. Cal. o. Cor. tubulosa limbo obsoleto. Stam. tubo longiora. Bacca 1-sperma.

1. *palustris*. L. Lam. ill. t. 293. Duham. arb. 1. t. 212. Hab. in Virginiae paludosis. h

969. GNIDIA. *Cor.* infundibuliformis, 4-fida: squamis 4-8-petaloideis ad faucem. *Nux* subdrupacea. (Semen subbaccatum.)

1. *pinifolia*, fol. sparsis trigonis, flor. umbellato-capitatis. Thunb. prod. p. 76. Willd. p. 424. Ramis verticillatis. Andrew. t. 52. Wendl. obs. bot. p. 15. t. 2. f. 11. Lam. ill. t. 291. f. 1. Hab. ad Cap. b. spri, cum speciebus sequentibus, quae sunt Fl. involucrat, albi Anth. quatuor supra faucem pilis cinctae. h

2. *juniperifolia*, fol. lineari-subulatis planis laevibus, ramulis glaberrimis, flor. solitariis binisve glabris terminalibus. Lam. enc. 2. p. 765. G. *pinifolia*. Lin. f. suppl. p. 225.

3. *radiata*, fol. subulatis triquetris acutis, capitulis terminalibus sessilibus radiatis, bracteis lanceolatis. L. Wendl. l. c. t. 2. f. 12. Scaber, prolifer. Petala pilosa. h

4. *carinata*, fol. lanceolatis obtusis carinatis glabris, floribus capitatis. Thunb. prod. 76.

5. *scabra*, fol. lanceolatis acutis scabris, flor. capitatis. Thunb. prod. 76.

6. *simplex*, foliis omnibus linearibus acutis, flor. terminalibus sessilibus. Lin. Andrew. t. 70. Breyn. cent. 10. t. 6. Flor. ex apice rami villosa, lutei.

7. *capitata*, fol. sparsis lanceolatis glabris, flor. capitatis, bracteis obvallatis, pedunc. nudo. Lin. suppl. p. 224. Thunb. prod. 76. Flos Passerinae similis. †

8. *laevigata*, fol. oppositis ovatis glabris, quadrifariam imbricatis, flor. terminalibus subcapitatis. Thunb. prod. 67. Wendl. obs. p. 17. t. 2. f. 14. Andrew. t. 89. Lam. ill. t. 291. f. 2. Flor. flavi.

9. *biflora*, fol. sparsis lanceolatis glabris, flor. lateralibus binis, ramis divaricatis. Thunb. prod. p. 76.

10. *racemosa*, fol. obovato-lanceolatis laxis glabris, flor. racemosis axillaribus. Thunb. prod. p. 76.

11. *tomentosa*, foliis sparsis ovato-oblongis glabris, margine scabris. Lam. G. pubescens. Berg. cap. 124.

12. *argentea*, fol. sparsis obovatis tomentoso-argenteis, flor. capitatis Thunb. prod. p. 76.

13. *imbricata*, fol. oblongis quadrifariam imbricatis sericeis, flor. terminalibus in axillis foliorum. Lin. suppl. 225.

14. *sericea*, fol. oppositis ovatis tomentosis, flor. terminalibus. Thunb. prod. p. 76. Wendl. obs. p. 16. t. 2. f. 13. Lam. ill. t. 291. f. 3. Passerina sericea. L. Faux floris coronata filis 8 coloratis. L.

15. *oppositifolia*, fol. oppositis lanceolatis ovatisque tomentosis, flor. terminalibus. Thunb. prod. p. 76. Andrew. t. 225. β. *Passerina laevigata*, fol. ovatis glabris acutis, flor. obtusis. L. Spec. pl. 2. p. 513. Nectandra laevigata. Berg. cap. 134. Squamulae 8. Burm. afr. p. 137. t. 49. f. 3.

16. *daphnaefolia*, decandra, fol. oblongis planis integerrimis, capitulo terminali pedunculato involucrato, floribus quinquefidis. Lin. suppl. 225. Hab. in Madagascar. Var. fol. hirsutis et nudiusculis, et flor. magnitudine. Involucr. ut in Daide, sed pentaphyllum. h

970. S'TELLERA. *Cal. o. Cor.* 4-fida, medio ventricosa. *Stam.* fauci inserta, brevissima. *Nux* 1, rostrata.

1. *Passerina*, fol. linearibus, flor. axillaribus quadrifidis. Willd. Sp. II. p. 429. Hab. in agris, inter segetes. Facie Theii.

2. *altaica*, fol. lanceolatis acutis, fl. r. capitulo-racemosis quadrifidis. Hab. in montib. altaicis. Thiebaud.

3. *Chamaejasme*, fol. lanceolatis, flor. terminalibus racemosis nudis quinquefidis. Willd. Amm. ruth. 16. t. 2. Hab. in Sibiria.

971. PASSERINA. *Cal. o. Cor.* 4-fida, nuda. *Stylus* filiformis, lateralis, longus. *Stam.* tubo imposita. *Nux* 1, corticata.

1. *filiformis*, fol. linearibus convexis quadrifariam imbricatis, ramis tomentosis. L. Wendl. obs. p. 18. t. 2. f. 15. Willd. Sp. II. p. 430. Breyn. cent. 10. t. 6. Hab. in Aethiopia, ad Cap. b. spri. h

2. *hirsuta*, fol. carnosis extus glabris, caulib. tomentosis. L. Wendl. l. c. t. 2. f. 16. P. *Meinau*. Forst. Hab. in Galliprovincia, Italia, Oriente et Barbaria. h

3. *salsolaefolia*, fol. subulatis hirsutis, tubo elongato superne incrassato tomentoso. Poirret Enc. 5. p. 41. Hab. . . Herb. Lam.

4. *ericoides*, fol. linearib. laevibus subimbricatis, cor. globois. L. Hab. ad Cap. b. spei. Facies tota Ericae. L. h

5. *nervosa*, fol. lanceolatis glabris tricostratis, flor. capitatis. Thunb. prod. 75. Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *cephalophora*, fol. trigonis quadrifariis, capit. lanatis. Thunb. prod. 75. Hab. ad Cap. b. spei. h

7. *capitata*, fol. linearibus glabris, capit. pedunc. tomentosis. L. Wendl. p. 18. t. 2. f. 17. Lam. ill. gen. t. 291. f. 3. Burm. afr. t. 48. f. 3. Habit. ad Cap. b. spei. Stam. supra faucem 16, quorum 8 interiora castrata. h

8. *globosa*, fol. suborbiculatis cymbiformibus interiorib. glabris, superiorib. hirsutissimis, flor. glomeratis. Poir. l. c. p. 42. Lam. ill. gen. t. 291. f. 4. Burm. afr. t. 46. f. 3? Hab. ad Cap. b. spei. h

9. *orientalis*, fol. lanceolatis subcarnosis obtusiusculis glabriusculis, flor. axillarib. Willd. p. 431. Hab. in Oriente et in Hispania. h

10. *ciliata*, fol. oblongo-lanceolatis ciliatis, flor. axillaribus, caule villosulo. Willd. Burm. afric. 129. t. 47. f. 2. Seh. mus. 2. t. 12. f. 9. Hab. ad Cap. b. spei. Flores purpurei. h

11. *doica*, flor. axillaribus geminis, fol. lineari-lanceolatis glabris. Lin. suppl. p. 223. Gouan. illustr. p. 17. t. 17. f. 1. Lam. enc. 3. p. 439. sub *Daphne*. Hab. in Pyrenaeis. Flor. axillares, bini, albo-flavescentes. h

12. *calycina*, flor. axillarib. solitariis calyculatis, fol. lineari-lanceolatis glabris, caulib. prostratis. Lapeyrouse. Mem. p. 2. t. 15. Lam. l. c. Ej. ill. t. 200. f. 3. Willd. p. 416. Sub *Daphne*. Cum priore.

13. *nivalis*, ramis prostratis, fol. linearibus obtusiusculis carnosiusculis, flor. axillarib. dioicis. Ramond in Bullet. d. scienc. n°. 41. p. 131. f. 4. Hab. in summis Pyrenaeis, circa Mont-Perdu. Rad. crassa, ramosa. Flor. flavescentes. An a priore satis diversa?

14. *tinctoria*, fol. linearib. obtusiusculis, flor. axillarib. sessilibus. Pourret Chlor. narbon. p. 27. Hab. in G. Narbonn. a Baccellone ad Mont-Ferrat. Flor. flavi. Tincturae inservit.

15. *nitida*, fol. confertis enerviis linearibus obtusiusculis sericeis, flor. axillarib.

glomeratis sessilibus. Desf. Atl. t. p. 331. t. 94. *Daphne nitida*. Vahl. symb. 3. p. 53. Habit. in montosis incultis in Barbaria. Magnitudine variat. Flor. pallidi.

16. *virgata*, ramis virgatis villosulo-tomentosis, fol. lanceolatis villosis obtusis, flor. axillarib. aggregatis sessilibus. Desf. l. c. t. 95. Hab. in oris Barbariae prope Flemsen. Flor. albidis.

17? *striata*, fol. ovatis acutis argute striatis, flor. subaggregatis: limbo patulo. Poir. enc. bot. 5. p. 44. Lam. ill. f. 291. f. 2. Hab. . . Fruct. ignotus.

18. *uniflora*, fol. linearibus oppositis, flor. terminalibus solitariis, ramis glabris. L. Wendl. obs. p. 19. t. 2. f. 19. Lam. ill. t. 291. f. 1. Hab. in Aethiopia. h

Obs. Antherarum rudimenta 8 latent in fundo floris. Lin., quae secundum Wendl. squamae glandulaeformis sunt, ut in quibusdam *Gnidiis*, quare haec species, uti putat, potius ad hoc genus transferri posset.

19. *grandiflora*, glaberrima, fol. oblongis acutis concavis extus rugosis, flor. terminalibus sessilib. solitariis. Lin. suppl. p. 226. Hab. in Africa. Rami uniflori.

20. *canescens*, fol. oblongis quadrifariam imbricatis lanato-tomentosis, flor. terminalib. lanatis. Willd. p. 432. Hab. in Marocco. h

21. *spicata*, fol. ovatis villosis, flor. lateralibus solitariis. Lin. suppl. p. 226. Wendl. t. 2. f. 19. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequentibus; refert spicam foliosam.

22. *laxa*, fol. ovatis sparsis, flor. capitatis, ramis laxis cernuis. Lin. suppl. p. 226. Wendl. t. 2. f. 20. Similis *P. ericoidi*.

23. *stricta*, fol. ovatis hirsutis, flor. capitatis, ramis rigidis. Thunb. prod. 75.

24. *Anthylloides*, fol. ovatis villosis, flor. capitatis hirsutis. Lin. suppl. p. 226. Flor. extus albi, intus lutei.

25. *pentandra*, fol. ovatis hirsutis, spicis ovatis terminalib. Thunb. prod. p. 76.

Obs. Hoc genus *Daphnis* valde est affine; fructu tamen differt. Ab eo vero Pimeleae nisi staminum numero diversae videntur.

972. LACHNÆA. Flor. capitato-conglomerati. Cal. o. Cor. 4-fida: limbo inaequali. Filam.

E c 3

longa, situ subæqualia. *Nux* subdrupacea.

1. *Eriocephala*, capitulis solitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis. L. Willd. p. 434. Andrew. t. 104. Lam. ill. gen. t. 202. f. 3. Thunb. prod. 75. sub *Paserina*. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei, cum sequentib. Capitula cincta lana candida, bracteisque membranaceis.

2. *conglomerata*, capitulis confertis, fol. laxis. L. *phylicoides*, foliis linearisubulatis glabris laxè imbricatis, capitul. parvis confertis tomentoso-albis. Lam. enci. 3. p. 374. ill. gen. t. 202. f. 2.

3. *buxifolia*, fol. ovalibus sessilib. glaberrimis, flor. capitatis tomentoso-lanatis. Lam. J. c. p. 373. ill. t. 202. f. 1. *Gnidia* filamentosa. Lin. suppl. p. 224.

D I G Y N I A.

973. *GALENIA*. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Caps.* subrotunda, 2-sperma.

1. *africana*, erecta fruticosa, fol. linearibus sub-arnosis. Lin. suppl. p. 227. Willd. Sp. II. p. 436. Lam. ill. t. 314. Hab. in Africa. Flor. sessiles, pallidi, minuti, in panicula dichotoma.

2. *procumbens*, procumbens, fol. ovatis canaliculatis apice patulo recurvato. Lin. suppl. l. c. Thunb. prod. p. 77. Hab. ad Cap. b. spei.

974. *WEINMANNIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 2-locularis, birostris.

* *Foliis compositis*.

1. *glabra*, fol. pinnatis, foliol. obovatis crenatis laevibus. Lin. fl. suppl. Lam. ill. gen. t. 313. f. 1. W. pinnata. L. Sp. pl. 515. Hab. in Jamaica. Fol. pinnata, petiolo communi alato, articulis subovatis. Racemi terminales. h

2. *trichosperma*, fol. impari pinnatis, petiol. communi alato: articulis quadrangularib., r. cem. axillarib. Cav. ic. 6. p. 45. t. 567. Hab. in San Carlos de Chilaë.

3. *hirta*, fol. pinnatis, foliolis ovatis serrato-crenatis, subtus racemisque birsutis. Swartz. Fl. ind. occ. a. p. 691. Hab. in altis montibus Jamaicæ australis. Articuli petioli communis subcordati. h

4. *tomentosa*, foliis pinnatis, foliolis ovatis integerrimis subtus tomentosis, stipulis caducis. Lin. suppl. p. 227. Hab. in

N. Granada. Arb. valde ramosa. Petiol. communis articulis obovatis. Racemi versus apicem densissimi, quasi spicae.

5. *trifoliata*, fol. ternatis, foliol. elliptice lanceolatis serratis glaberrimis, panic. compositis. Lin. suppl. p. 227. Lam. ill. t. 313. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

** *Foliis simplicibus*.

6. *racemosa*, fol. simplicibus obovato-ellipticis obtusis dentatis, racemis glabris. Willd. p. 418. Stipulae nullae. Lin. suppl. p. 227. Hab. in N. Zeelandia.

7. *parviflora*, fol. simplicib. ovatis serratis subsessilibus, racemis terminalibus ternis quinisque. Forst. Hab. in ins. Tabeiti.

8. *ovata*, fol. simplicib. ovatis crenato-dentatis, flor. racemosis. Cav. l. c. p. 45. t. 566. Hab. in fossis in Peruv. Arb. 18-petalis. Germ. auctum disco 8-glanduloso, uti in præcedente. C.

9. *paniculata*, fol. simplicib. lanceolatis serratis, flor. paniculatis. Cav. ic. 6. p. 44. t. 565. Hab. in R. Chilensi ad litora. Arboresc. Flor. nonnulli 5-petali, trigyni. C.

975. *CODIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Receptaculum* commune involucreatum. *Involucreum* 4-phyllum.

1. *montana*, montana. Lin. suppl. 288. Forst. gen. n°. 10. Lam. ill. t. 314. Hab. in N. Caledonia. Fol. opposita elliptica. Capitula globosa, h

976. *MOEHRINGIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* 1-locularis, 4-valvis.

1. *muscosa*. L. Lam. ill. t. 314. Alsine, fol. linearibus connatis. Hall. Scheuch. alp. 503. t. 6. Pluck. alm. 13. t. 75. f. 1. Hab. in alpinis et montosis in sylvis muscosis et ad fontes et scaturigines. L

β. *sedoides*, seu dasiphylla, fol. brevioribus, crassioribus, caul. elongato nudo? — Balbis Miscell. bot. p. 20. t. 5. Hab. prope Turin ad rupes, locis siccis. A distincta species? Sedum dasiphyllum referre dicitur.

POLYGONÆ. Stamina calyci s. corol. calycinae insident, definita. Fructus 2

semen unicum, nudum aut calyce tectum, cujus embryo perispermio farinaceo est immersus. Fol. alterna, vagina stipulari distincta. Caul. plerisque herbaceus, etiam arborescens. Propter sequentia 3 genera huc etiam pertinent Rumex, Rheum, Astragalus et Eriogonum?

T R I G Y N I A.

977. POLYGONUM. Cal. o. Cor. 5-partita, calycina. Sem. 1. angulatum, tectum. (Stam. et styli numero incerti.)

* *Atraphaxoides caule frutescente, flor. racemosis.*

1. *frutescens*, caule fruticoso, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, ochrea lanceolata internodiis brevioribus, petalis binis exterioribus minoribus reflexis. Willd. Sp. II. p. 440. P. caule fruticoso, calycinis foliolis duobus reflexis. L. Gmel. sib. 3. p. 68. t. 12. f. 2. Lam. ill. t. 315. f. 2. Hab. in Sibiria, Dauria. h

2. *grandiflorum*, caule fruticoso, fol. ovato-oblongis acutis, ochrea lanceolata internodiorum longitudine, pet. aequalib. erectis. Willd. Hab. in Oriente. Facie Polygalae Chamaebuxi. Flor. axillares pedunculati maximi hujus generis, Myrti communis fere magnitudine. W.

3. *polygamum*, caul. ramosissimo, fol. spatulatis, cor. obovatis patentibus, ochreis integris. Vent. Hort. Cels. p. 63. t. 63 Polygonella parvifolia. Michaux. Flor. 2. p. 240. Hab. in Carol. aridis. Flor. racemosi polygami. V., spicati dioici. M. h

** *Flor. axillaribus.*

4. *maritimum*, flor. octandris trigynis axillaribus, fol. ovali-lanceolatis sempervirentibus, caule suffrutescente. Hab. in littoribus. h

* *littorale*, fol. crassis succulentis, caul. minus ramoso. Link in Schrad. bot. Journ. 1800. p. 54. P. marinum. Roj. Syn. p. 147. exc. synonym. Smith. brit. 1. p. 429.

5. *aviculare*, caul. decumbente, herbaceo, flor. octandris trigynis axillaribus, fol. lanceolatis, margine scabris, stipul. nervis remotis. Smith. brit. p. 429. Lam. ill. t. 325. f. 1. P. caul. procumbente herbaceo. L. Hab. in cultis ruderalis ad vias. Var. fol. latis, et caul. erecto: P. *erectum*. Roth. germ. II. p. 458.

* *monspeliense*, erectum, fol. ellipticis crenulatis, caul. erecto, stipulis scariosis incis. Hab. Monspeli. Thiebaud. Distincta species videtur.

6. *arenarium*, flor. 8-andris trigynis, spicis terminalib. aphyllis, fol. lanceolato-linearibus, caulibus angulatis declinatis herbaceis. Plant. rar. Hungar. p. 60. t. 67. Cresc. in arena mobili in Hungaria. Cal. corollinus magnus, primo purpureus, dein albo-rubellus, tandem atrosanguineus. P. avicul. affn. l. c.

7. *ramosissimum*, flor. triandris, trigynis, caulib. strictis ramosissimis striatis, stipul. abbreviatis margine laceris, fol. lanceolatis. Michaux. Flor. 1. p. 238. Hab. in regione Illinoensi. Facie P. avicularis.

8. *tenue*, pumilum, caul. gracili ramoso acutangulo, fol. longis linearibus strictis acuminatis, stipul. tubulosis apice villosis, flor. alternis subsolitariis. Mich. p. 238. Hab. in Canada. Stip. castaneae.

9. *Bellardi*, erectum, flor. axillaribus octandris trigynis, fol. elliptico-lanceolatis, vaginis ciliatis. Aillon. pedem. n°. 2052. t. 50. f. 2. Hab. in agro Pedemontano, in Gallia et prope Lisbon.

10. *setosum*, flor. octandris trigynis, axillaribus, fol. subulato-linearib., stipulis setaceo-laceris, caul. subfruticoso. Jacq. obs. bot. 3. p. 8. t. 57. Hab. in Armenia. h

11. *erectum*, flor. octandris trigynis axillaribus, fol. ovalibus, caul. erecto herbaceo. L. Hab. in Philadelphia. ©

*** *Flor. spicatis, spicis teretibus.*

12. *Bistorta*, caule simplicissimo monostachyo, fol. ovatis in petiolum decurrentibus. L. Flor. Dan. Engl. bot. t. 509. Hab. in montibus et pratis humidis. h

13. *viviparum*, caule simplicissimo monostachyo, fol. lanceolatis, margine revolutis. Smith. brit. 1. p. 428. Flor. dan. t. 13. P. fol. nervosis, radicalibus ovato-lanceolatis, caulibus linearibus. Hall. helv. n°. 1558. Pluck. t. 151. f. 2. Hab. in subalpinis, pascuis duris.

14. *lapathifolium (pallens)*, floribus hexandris digynis, stipulis muticis, pedunc. scabris, seminibus utrinque concavis. Ait. Kew. 2. p. 30. P. pennsylvanicum. Curt. lond. ic. P. scabrum. Moench. meth. Hab. promiscue cum sequente, pro cuius varietate ut plurimum habetur, spica pallida et pedunc. scabris distinctum. h

* *nodosum*, caul. elongato maculato ad geniculos nodoso, vaginis nudis, fol. ovato-lanceolatis, spica ramosa. Hab. in humidis, in ruderatis rarius. Caul. 3-petalis, unc. 1. crassus. Fol. margine et ad petiolos scabra. An a *Persicaria* specie diversum?

15. *Persicaria*, flor. hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, fol. lanceolatis, pedunc. laevibus, stipul. ciliatis. L. Flor. dan. t. 702. Curt. lond. ic. Hab. in humidis et ad vias. Flor. rubri. Var. fol. viridibus et nigro-maculatis.

β. *incanum*, flor. hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, fol. oblongo-lanceolatis subius pubescentibus. Willd. Schmidt. bohem. n°. 391. P. tomentosum. Schrank. bar. 1. p. 669. t. 3. 669. Pet. H. Brit. t. 3. f. 8. Hab. in agris.

16. *minus*, flor. hexandris submonogynis, fol. lineari-lanceolatis planis, spic. erectiusculis, caul. basi repente. Ait. Kew. 2. p. 31. Curt. lond. ic. P. *angustifolium*. Roth. germ. II. p. 453. P. strictum. Allion. ped. n°. 2051. t. 67. f. 1. Moris. s. 3. t. 29. f. 5. Hab. in agris et pascuis. Spica rubra.

17. *amphibium*, flor. pentandris semidigynis, spica ovata. Flor. dan. t. 282. Engl. bot. t. 456. α. *natans*, fol. ellipticis natantibus. β. *terrestre*, fol. hirsutis lanceolato-acuminatis. Hab. in stagnis. β. in humidis rarius florens. T.

18. *Hydropiper*, flor. hexandris semidigynis, fol. lanceolatis undulatis, spic. filiformibus, nutantibus, caul. erecto, stipulis submuticis. Blackw. t. 119. Curt. Lond. ic. Hab. in subhumidis ad fossas, gregarie.

19. *mite*, flor. 8-andris semitrigynis, fol. anguste lanceolatis hirsutis, stipul. hirsuto-ciliatis, spic. linearib., bract. ciliatis subimbricatis. P. *Hydropiperoides*. Mich. Flor. 1. p. 239. Hab. in Amer. boreali. Facie antecedentis, non *acre*. Flor. purpurascens. M.

20. *hirsutum*, flor. 8-andris semitrigynis, fol. lanceolatis, pedunc. elongato distachyo, spic. linearibus, caul. adscendente hirsuto. Michaux. l. c. Hab. in Carol. inferior. herbosis udis.

21. *ocreatum*, flor. pentandris trigynis, fol. lanceolatis. L. *Persicaria* spicis longis copiosissimis, fol. ex lineari lanceolatis, vaginis debilibus. Cmel. sib. 3 p. 51. n°. 39. t. 8. Hab. in Sibiria. Vaginae integrae, ventricosae, ampliores caule. Folia revoluta. L.

22. *filiforme*, flor. pentandris digynis, spicis filiformibus, fol. ovatis, stipulis ciliatis. Thunb. jap. 163. Hab. in Japonia. Caul. lineis elevatis obsolete, villosus, pilis adpressis, ferrugineus. Stipulae intrafoliaceae inflatae.

23. *glabrum*, flor. hexandris digynis, spicis virgatis, ochreis truncatis nudis, fol. lanceolatis acuminatis glabris. Willd. p. 447. Hab. in Ind. orientali. A sequente distinctum; fol. lanceolatis valde acuminatis glabris. Var., stam. A. P. filiformi fol. longioribus triuncialibus. W.

24. *barbatum*, flor. hexandris trigynis, spicis virgatis, ochreis truncatis setaceo-ciliatis, fol. oblongis acutis glabrisculis. Willd. Sloan. jam. 48. hist. 1. p. 17. t. 3. f. 1. Rheed. 12. t. 77. Hab. in China. Caul. rufus.

25. *tinctorum*, flor. hexandris trigynis, spic. virgatis, stipul. glabris truncatis ciliatis, fol. ovatis acutiusculis glabris. Ait. 2. p. 51. Willd. p. 445. Hab. in China. Flos ruberrimus. Spic. longae, ramosae.

26. *virginianum*, fol. ovalibus, spic. longissimis, flor. remotis inaequalibus 5-andris digynis. Michaux. Flor. 1. p. 258. Willd. Sp. II. p. 442. Hab. in Amer. bor. sylv. umbrosis. Flor. pallidi. Styl. prolongatus, recurvus, persistens. T.

27. *australe*, fol. lanceolato-linearib., stipulis longo-barbatis, spica filiformi, flor. approximatis. Hab. in N. Hollandia. Née. (Ex herb. Thiebaud.) Bract. deltoideae, ciliato-aculeatae.

28. *tomentosum*, flor. hexandris trigynis, spicis virgatis, ochreis truncatis hispidis setaceo-ciliatis, fol. ovatis acuminatis utrinque incano-tomentosis. W. Houttuy. Syst. t. 49. f. 1. Pluck. alm. 288. t. 210. f. 7. Hab. in Zeylona. Var. β. Fol. inferiora utrinque scabra, nec albicania tomentosa.

29. *orientale*, flor. heptandris digynis, fol. ovatis, caule erecto, stipulis hirtis hypocrateriformibus. L. Curt. mag. t. 213. Hab. sponte in Oriente et India. In hortis ornamentis causa colitur. Omnium specierum facile altissimum. flor. rubris, passim albis, pulchris distinctum.

30. *pensylvanicum*, flor. octandris digynis, pedunc. hispidis, fol. lanceolatis, stipulis muticis. L. Sp. pl. p. 519. Pedunc. scabri, setis rigidiusculis apice gluten secernentibus. Spicae subracemosae flosculis pedicellatis. L.

*** *Flor. paniculato-racemosis*, fol. linearibus aut ovatis nec basi excisis.

31. *articulatum*, fol. octandris trigynis, spic. articulatis paniculatis, stipul. vaginalibus truncatis integris, fol. linearibus. L. Willd. p. 450. Hab. in Canada. Spicae filiformes, imbricatæ bract. turbinatis, panicul. terminant. L.

32. *divaricatum*, flor. octandris trigynis racemoso-paniculatis, fol. lanceolatis laevibus, caule divaricato patulo glabro. Willd. p. 451. Buxb. cent. 2. p. 31. t. 31. Hab. in Sibiria.

33. *alpinum*, flor. octandris trigynis racemoso-paniculatis, fol. ovato-lanceolatis glabris margine ciliatis, caule ramoso, geniculis barbatis. Willd. p. 451. Allion. pedem. t. 68. f. 1. Boc. mus. 2. t. 27. Hab. in albis, et in insula Corsica. ¶

34. *undulatum*, flor. octandris trigynis racemoso-paniculatis, fol. lanceolatis undulatis superne scabris, subtus pubescentibus, caule ramoso inferne pubescente, geniculis ciliatis. Willd. Murr. in Comm. goett. 1774. p. 34. t. 5 P. sibiricum. Lin. suppl. p. 228. Gmel. sib. 3. p. 56. t. 10. Hab. saxosis humidiusculis in Sibiria. ¶

35. *sericeum*, flor. octandris trigynis racemosis, fol. ovatis incano-pubescentibus, caule decumbente. Willd. Pall. it. ed. min. 3. p. 233. P. flor. pedunculatis in spicis laxissimis. Gmel. sib. 3. p. 58. t. 9. f. 2. Hab. in Sibiria ad lacum Baical. ¶

36. *serratum*, fol. crenatis. L. Hab. in Mauritania. †

*** *Helxine fol. subcordatis, s. basi excisis.*

37. *corymbosum*, flor. octandris trigynis, pedunc. glanduloso-pilosis, fol. oblongo-lanceolatis subsessilibus, bracteis membranaceis ciliatis. Willd. p. 452. Hab. in Java. Sequenti affine.

38. *chinense*, flor. octandris trigynis, pedunc. scabris, foliis petiolatis ovatis, bracteis s. fol. summis cordatis. L. Burm. ind. go. t. 30. f. 3. Hab. in India, China. Fol. ovato-cordata.

39. *sagittatum*, fol. sagittatis, caule aculeato. Gmel. sib. 3. p. 63. t. 13. f. 2. Flor. capitatis 8-andris. Michaux. 1. p. 241. Hort. cliff. 151. t. 12. Hab. in Virginiae, Merilandiæ et Carol. madidis.

40. *arifolium*, fol. hastatis, caule retrorsum aculeato. L. Pluck. amalth. 67.

t. 308. f. 3. Hab. in Virginiae, Floridae et Carolinae montib. Flor. 6-andri, semidigni.

41. *acetosae-folium*, flor. 8-andris trigynis, fol. hastato-lanceolatis crassiusculis, caul. laevi volubili, fructu subbaccato. Vent. Hort. cels. p. 88. t. 88. Coccoloba sagittifolia. Ortega Dec. p. 60. Hab. in Brasilia. ¶

42. *crassifolium*, fol. hastatis, inferioribus ovatis, reliquis lineari-lanceolatis, caule decumbente glabro. Willd. Murr. Comment. goett. 1774. p. 37. t. 6. Hab. in Sibiria locis apricis.

43. *perfoliatum*, fol. triangularibus, caule retrorsum aculeato, stipulis perfoliato-foliosis patentibus subrotundis. Burm. ind. go. t. 31. f. 2. Lam. ill. t. 316. f. 3. Hab. in India. Pedunc. pauciflori, aculeati.

44. *tataricum*, fol. cordato-sagittatis, caule inermi erecto, seminib. subdentatis. L. Gmel. sib. 3. p. 64. t. 13. f. 1. Hab. in Tataria. ○

45. *emarginatum*, fol. cordato-sagittatis, caule erecto inermi, seminibus apice truncatis emarginatis, alis cartilagineis Roth. Catal. bot. 1. p. 48. Hab. in China. ○

46. *Fagopyrum*, fol. cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus. L. Mart. Flor. rust. 1. 46. Hab. in Asia, nunc ut frumentum quibusdam in arenosis regionibus colitur. ○

47. *Convovulus*, fol. cordato-hastatis, caule volubili angulato, flor. obtusis. L. Flor. dan. t. 744. Curt. Lond. ic. Hab. in Europae et Amer. agris. Anth. violaceae.

48. *cilinode*, subpubescens, caul. angulato debili, stipulis subacutis basi ciliatis, fol. cordatis, fructib. apteris. Mich. Flor. 1. p. 241. Hab. in Canada. Priori affine.

49. *dumetorum*, fol. cordatis, caule volubili laevi, flor. carinato-alatis. L. Flor. dan. t. 759. Hab. in Europae sylvis, frutices scandens. Anth. albae.

50. *scandens*, fol. cordatis, caule volubili, flor. carinatis. L. Pluck. alm. 143. t. 177. f. 7. Sloan. jam. 46. hist. 1. p. 138. t. 50. f. 1. Hab. in Americae sylvis. Flor. 8-andri, trigyni, cal. fruct. majusculi, tripteris. Mich. ¶

51. *multiflorum*, fol. cordatis, caule volubili, angulato, florum panicula ramosa, Thunb. jap. 169. P. chinense. Houttuy. Syst. 6. t. 49. f. 3. Hab. in Japonia. ¶

978. *BRUNICHIA*. *Cal.* 1-phyllus, demum coriaceus, angulatus, 5-fidus : lacin. revolutis. *Cor.* o. *Caps.* supera, 1-locularis, 1-sperma. *Sem.* inversum lobatum. (*Stam.* 8-10.)

1. *cirrhuosa*, caul. scandente, fol. cordato-sagittatis. Gaertn. de fr. et sem. 1. p. 214. t. 45. f. 2. Hab. in Bahama. Col. in H. P. Cal. inferne ventricosus et elongatus in pelunc. planum, arcuatum, basi attenuatum. G.

979. *COCCOLOBA*. *Cal.* 5-partitus. coloratus, demum baccatus. *Cor.* o. *Bacca* calycina, monosperma.

1. *uvifera*, foliis cordato-subrotundis nitidis. L. Willd. Sp. 11. p. 45. Jacq. amer. 112. t. 73. Lam. ill. t. 316. f. 2. Catesb. car. 2. p. 96. t. 96.

β. *leoganensis*, fol. subrotundis integerrimis nitidis planis, racemis fructuum erectis. Jacq. amer. 113. t. 178. f. 33. Hab. in America. Arb. magna, pulchra.

α. *latifolia*, fol. integris latissimis basi coarctatis. Enc. bot. 6. p. 61. Lam. ill. t. 316. f. 4. Ex Amer. meridion. Priori affinis. Fol. tenuiora, membranacea fere, cordato-orbiculata.

3. *australis*, fol. cordato-ovatis acutis, flor. polygamis. Forst. prod. n°. 176. Hab. in N. Zelandia. h

4. *pubescens*, fol. orbiculatis pubescentibus. L. Sp. pl. 523. Mill. dict. n°. 2. C. *grandifolia*, fol. subrotundis integerrimis rugosis. Jacq. amer. 113. Pluck. phyt. 222. f. 8. Hab. in America. Arbor praealta, a 60-80 ped. Lignum durissimum. Fol. maxima, rugosa, subtus pubescentia.

5. *diversifolia*, fol. ramusculorum ovatis, ramorum ovato-cordatis. Jacq. amer. 114. t. 76. Hab. in Domingo. Arb. 10-12-pedalis.

6. *flavescens*, fol. ellipticis obtusis mucronatis, basi coadatis. Willd. p. 458. Jacq. amer. 114. t. 75. Hab. in Domingo. Magnitudine prioris.

7. *excoriata*, fol. oblongo-ovatis acutiusculis basi cordatis, racemis pendulis. Plum. ic. 146. f. 1. Hab. in America. h

β. fol. breviorib. ovato-subacutis, racemis praelongis pendulis. Poir. enc. 6. p. 62. Hab. in Porto-Ricco. Ledr.

8. *nivea*, fol. oblongis acuminatis venosis, supra nitidis, racemis erectiusculis. Swartz. Flor. ind. occid. 2. p. 693. Hab. in montosis aridis Jamaicae. Arb. 20-pedalis.

9. *punctata*, fol. lanceolato-ovatis. L. Jacq. Am. Ed. pict. t. 114. Hab. in Amer. Racem. breves, recti.

10. *obtusifolia*, fol. oblongis obtusissimis. Jacq. amer. 117. t. 74. Hab. in Carthagena. h

11. *microstachya*, fol. ovatis obtusis glaberrimis, racemis nutantibus. Hab. in India occidentali. Rami cinerei. Fol. petiolata, fere sesquiuncialis. Racemi brevissimi. W. h

12. *emarginata*, fol. coriaceis subrotundis exciso-emarginatis. L. Jacq. obs. 1. p. 181 t. h. Hab. in America calidiore. Fructificatio? h

13. *barbadensis*, fol. cordato-ovatis undulatis. L. Jacq. obs. 1. t. 8. Hab. in Barbados. h

14. *tenuifolia*, fol. ovatis membranaceis. Lam. ill. t. 14. f. 3. Brown. jam. 210. f. 3. In Jamaica. h

980. *PAULLINIA*. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 4-phyllum, inaequale. *Caps.* turbinata, trigona, 3-locularis : loculis monospermis. *Receptac.* centrale. *Sem.* ad diuini arillata. (Fol. ternata aut pinnata.)

* *Caps. pyriformibus : valv. nudis aut carinato-alatis.*

1. *Cururu*, capsulis pyriformib. obtusis, foliis ternatis, foliolis oblongis dentato-serratis subacuminatis, petiolis alatis. Schumacher in Act. Hist. Nat. Haf. 3. p. 2. t. 121. Willd. p. 460. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 61. f. 4. Cururu. Plum. gen. 34. ic. 111. f. 2. Hab. in America calidiore. Caul. glaber subangulatus. h

2. *pinnata*, caps. pyriformibus tricornibus, fol. pinnatis, foliolis oblongis obtuse serratis acuminatis, petiolis marginatis. Schumacher. l. c. p. 121. Lam. ill. t. 318. f. 2. Jacq. l. c. t. 62. f. 12. Hab. in Brasilia, in Antilles.

** *Capsulis ovatis.*

3. *Meliaefolia*, fol. pinnatis : foliol. trijugis subsessilibus lauceolatis remotis

dentatis, subtus pubescentib., fruct. alis apice prominulis. Juss. in Annal. d. Musaeum. Cah. 23. p. 357. t. 66. f. 2. Hab. in Brasilia. Caul. scandens. h

4. *Thalictrifolia*, fol. subtripinnatis summis simplicibus, foliol. ovatis parvis integris aut subdentatis, caps. triolata. Juss. l. c. t. 66. f. 1. Cum priore. Petiol. communis et caul. subtomentosus. Pedunc. spiralis. h

5. *acutangula*, fol. pinnato-quinatis: foliol. oblongo-ovatis acuminatis denticulato-serratis, caps. obovatis triangulo-alatis. Ruiz et Pavon. l. c. p. 93. Sub *Semariaria* uti sequens, cum qua iisdem in locis crescit.

6. *obovata*, fol. pinnato-quinatis, foliolis lanceolatis serratis, caps. obovatis. Ruiz et Pavon syst. Pl. Flor. Peruv. et Chil. p. 93. Hab. in Peruv. nemoribus. Scandens. h

7. *tetragona*, caps. tricarınatis tricorınibus, fol. pinnatis, foliolis ovatis subserratis acutis glabris, petiolis nudis. Schumacher. Act. Hist. Nat. Haf. 3. p. 2. t. 122. Aubl. guj. 1. p. 355. Hab. in Cajenna. Caul. 4-gonus. Antecedenti affinis.

8. *Vespertilio*, caps. alatis, alis horizontalibus, fol. pinnatis, foliolis ovatis apice inciso-serratis, petiolis nudis. Schumacher. Act. Hist. Nat. Haf. 3. p. 122. t. 11. f. 1. Hab. in insula St. Christophori Americæ. Caul. vix angulosus, laevis.

9. *curassavica*, caps. valvulis semiohordatis, fol. biternatis, foliolis crenatis ovalibus imparibus ovato-cuneatis, petiolo intermedio marginato. l. c. p. 123. t. 11. f. 2. Jacq. t. 61. f. 8. Plum. gen. 34. ic. 111. f. 1. Hab. in Curassao. Caulis sulcatus, angulis villosis ferrugineis. Sch. h

10. *barbadensis*, caps. valvulis semiovatis villosiusculis, fol. biternatis, foliolis ovalibus integerrimis serratisque coriaceis, petiolis submarginatis. Schum. p. 123. Jacq. t. 62. f. 9. Hab. in Barbados. h

11. *polyphylla*, caps. valvulis capsularum semiohovatıs, fol. supradecompositis, foliolis ovato-cuneatis, apice crenatis supra glabris subtus petiolisque villosis. Schum. l. c. p. 124. Willd. p. 461. Jacq. l. c. t. 61. f. 10. Hab. in Amer. australiore. Cirrh. axillaris. h

12. *tomentosa*, fol. pinnatis: foliolis ovato-rhombeis repandis obtusis capsulisque tomentosis, petiol. marginatis. Schum. l. c. p. 121. Jacq. obs. t. 61. f. 13. Hab. in

Amer. Fol. ovato-oblonga, remote-crenata.

13. *senegalensis*, caps. ovatis, fol. pinnatis: foliol. sessilibus ovatis remote crenatis, impari majore: petiol. marginatis, caul. angulato subtomentoso. Juss.

14. *sphaerocarpa*, fol. pinnatis: foliol. subsessilibus ovatis glabris remote crenatis acumine obtuso, petiolo nudo, caul. teretis. Juss. l. c. Hab. in Guinea. Rich.

15. *subrotunda*, fol. pinnato-quinatis: foliol. oblongis superne serratis, caps. subrotundis. Ruiz et Pavon syst. l. c. p. 92. (Semariaria.) Hab. in Peruv. nemoribus. Frut. scandens. Arillus edulis.

* * * Fructibus ignotis. †

16. *nodosa*, fol. ternatis, petiol. nudis, foliol. medio obovato. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 62. f. 3. Willd. p. 460. Hab. in America.

17. *carthagenensis*, foliis biternatis, petiol. omnibus marginatis, caul. inermi. Jacq. l. c. t. 62. f. 6. Hab. Carthagenae in Amer. h

18. *caribaea*, fol. biternatis, petiol. omnibus marginatis, ramis aculeatis. Jacq. l. c. t. 62. f. 7. Hab. in Caribæis.

Obs. Ob ramos aculeatos et petiolos secundum ill. Jussieu *Sapindis* minus affinis species est, sed uti et sequens alia ad genera forte amandanda.

19. *cauliflora*, fol. pinnatis, pinnula infima ternata, petiolo ad apicem marginato, basi nudo, flor. corymboso-capitatis axillaribus et terminalibus. Willd. p. 463. Jacq. ic. rar. 3. t. 450. Collect. 4. p. 176. Hab. in America ad Caracas.

20. *japonica*, foliis quinato-pinnatis petiolulatis marginatis, caule herbaceo inermi. Thunb. jap. 170. Hab. in Japonia. Foliola infima ovata subsessilia inciso-bifida vel trifida, pollicaria. Th. 15

21. *diversifolia*, fol. supradecompositis, petiolis marginatis: infimis pinnatis reliquis ternatis. Jacq. l. c. t. 62. f. 14. Hab. in America. h

22. *Cupanaefolia*, fol. pinnatis: foliol. bijugis sessilibus ovato-oblongis remote crenatis glaberrimis, pedunc. cirrhosis. Juss. l. c. Hab. in sylv. Gujanæ. Rich.

23. *connarifolia*, fol. pinnatis: foliol. bijugis sessilibus coriaceis ramisque ferrugineis, petiol. nudis, pedunc. acirrhosis. Juss. Cnm priore.

24. *fibulata*, fol. pinnatis: foliol. breve petiolatis ovatis subcoriaceis subdenticulatis ferrugineis inferne subtomentosis, pedunc. cirrhi incrassatis fibuliformibus floriferis. Juss. Hab. in sylvat. ad ripas in Guiana. Rami ferruginei.

25. *rufescens*, foliol. bijugis subpetiolatis ovato-lanceolatis remote crenatis subtus tomentoso-ferrugineis, supra nigro-virentibus. petiol. nudis, ramis subangulatis ferrugineis. Juss. l. c. Cresc. ubi antecedens. Pedunc. cirrhi aut acirrhosi. J.

26. *Ingaefolia*, fol. magnis pinnato-5-jugis: foliolis atro-virentibus obtuse acuminatis, petiol. basi nudo, ultra marginatis, ram. striatis punctato-scabris. Juss. l. c. p. 350. Hab. in Guianae sylvis, flumin. Amazoni conterminis. Pedunc. nunc ramoso-paniculati, nunc simplices ultra medium cirrhosi et floriferi. J.

981. **SERIANA.** *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 4. Nectar. 4-phyllum. *Samarae* 3, longitudinaliter connatae, globosae, inferne in alam membranaceam dilatatae.

1. *sinuata*, alis capsular. postice dilatatis, fol. ternatis, foliolis ovato-lanceolatis dentato-sinuatis. Schum. in Act. Haf. 3. p. 2. p. 126. t. 12. f. 1. Willd. p. 467. Paulinia Seriana. L. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 61. f. 2. Lam. ill. t. 318. f. 1. Hab. in America calidior. h

2. *divaricata*, fol. biternatis, foliolis ovatis integerrimis subacutis lucidis petiolatis, petiolis nudis. Schum. l. c. t. 11. f. 2. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 656. sub Paulinia. Hab. in sylvis Jamaicae. h

3. *caracasana*, alis caps. postice rotundatis, foliis biternatis, foliolis oblongis utrinque acutis remotissime dentatis, petiolis nudis. Willd. p. 465. Jacq. hort. Schoenh. 1. p. 52. t. 99. sub Paulinia. Hab. ad Caracas. h

4. *racemosa*, alis caps. postice dilatatis antice subsinuatis, fol. biternatis, foliolis ovatis profunde serratis. Schum. p. 127. t. 12. f. 3. Hab. in Vera Cruce. h

5. *spectabilis*, alis caps. postice dilatatis, fol. biternatis, foliol. obovatis terminalibus retusis, petiolis alatis. Schum. t. 12. f. 4. Hab. in America. Foliola integerrima; terminale emarginatum. W.

6. *mexicana*, foliis biternatis, foliolis obovatis integerrimis omnibus emarginatis,

petiolis alatis, racemis compositis. Willd. Schum. t. 11. f. 3. Paulinia fol. ternatodecompositis, caule aculeato. L. Hort. cliff. 152. Hab. in Mexico. Fruct. ignotus. †

7. *angustifolia*, fol. biternatis, foliol. linearilanceolatis integerrimis acutis, petiolis alatis. Willd. Paull. mexicana. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 61. f. 5. Plum. gen. 34. ic. 113. f. 1. Hab. in Amer. calidior. h

8. *lupulina*, alis caps. semiovalibus, fol. biternatis crenatis subtus ferrugineis, foliol. terminalibus subrhombis lateralibus ovatis, petiolis subulatis. Schum. p. 127. t. 12. f. 5. Hab. in America. h

9. *lucida*, alis caps. semiovalibus, fol. biternatis, foliol. ovatis acutis serratis petiolis subnudis. Schum. l. c. p. 2. t. 123. Hab. in insula St. Crucis. Fol. apice lucida.

10. *triternata*, fol. triternatis, foliol. ovatis obtusis repandis, petiolis alatis, racemis paniculatis. Willd. p. 466. Paull. l. Mant. 236. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 61. f. 11? Plum. gen. 34. ic. 112. Hab. in Amer. in ins. St. Dominica, ubi ab incolis demominatur. Liane à poisil. Ad pisces, eos venenando, capiendos adhibetur.

982. **CARDIOSPERMUM.** *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. Nectar. 4-phyllum, inaequale. *Caps.* 3, connatae, inflatae.

1. *Halicacabum*, caule, petiolis, foliolisque inciso-dentatis glabris. Willd. Sp. II. p. 764. Lam. ill. t. 317. Rumph. 6. t. 24. f. 2. Hab. in Indiis. ☉

2. *hirsutum*, caule petiolisque hirsutis, foliolis dentatis glabris. Willd. Habit. in Guinea. Caul. quadripedalis et ultra scandens. Fol. simpliciter et grosse dentata. W. Simile priori, sed triplo majus. W.

3. *Corindum*, fol. subtus tomentosis. L. G. villosum, fol. incisus obtusis, petiolis brevibus. Mill. dict. n. 3. Hab. in Brasilia. ☉

7. *grandiflorum*, foliis pubescentibus, capsulis acuminatis maximis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 698. Hab. in fruticetis sepiisque Jamaicae. T.

983. **SAPINDUS.** *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* carnosae, connatae, ventricosae.

1. *Saponaria*, inermis, fol. pinnatis,

foliolis ovato-lanceolatis, rachi alata. Ait. Kew. 2. p. 35. Willd. p. 468. Comm. hort. 1. p. 183. t. 94. Hab. in America juxta littora in Georgia. Michaux. Fruct. glabrosi, teretibus. M.

2. *longifolius*, fol. pinnatis, foliolis lanceolatis glabris, unico terminali, rachi simplici. Vahl. symb. 3. p. 53. Hab. in India orientali? h

3. *spinosus*, fol. abrupte pinnatis, caule spinosissimo. L. Brown. jam. 207. t. 20 f. 2. Hab. in Jamaica. h

4. *laurifolius*, fol. pinnatis, foliolis ovato-oblongis attenuatis glabris, rachi simplici, petalis margine tomentosis. Vahl. symb. 3. p. 54. Rheed. 4. t. 19. Hab. in Malabar. h

5. *emarginatus*, fol. pinnatis, foliolis oblongis emarginatis subtus villosis, rachi simplici, petalis margine tomentosis. Vahl. 1. c. Hab. in India orientali. h

6. *rubiginosus*, fol. pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acutis subtus villosis, rachi simplici, petalis glabris. Willd. p. 469. Roxb. corom. 1. p. 44. t. 62. Hab. in montosis circassiensib. Arb. utilis.

7. *tetraphyllus*, fol. pinnatis, foliolis lanceolato-oblongis glabris, rachi simplici, racemis subsimplicibus, petalis glabris. Vahl. 1. c. Hab. in India orientali. h

8. *rigidus*, fol. pinnatis, foliol. ovato-oblongis, rachi simplici, cor. fructibusque glabris. Vahl. 1. c. Gaertn. de sem. 1. p. 341. t. 70. f. 3. Pluck. alm. 255. t. 217. f. 7. Hab. in America. Racemus supradecompositus pedalis. V. h

9. *arborescens*, fol. pinnatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, panicula axillari simplici. Willd. Aubl. guj. 1. p. 359. t. 139. Hab. in sylvis Gujanæ. h +

10. *frutescens*, foliis pinnatis, foliolis alternis lanceolatis acuminatis glabris, panicula axillari simplici. Willd. Aubl. p. 355. t. 138. Hab. in sylvis Gujanæ. h +

984. *PONAEA*. Cal. 5-partitus. Cor. 4-petala. Caps. trilobularis, triala : loculis monospermis.

1. *saponarioides*. Willd. Sp. II p. 470. Toulucia gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 359. t. 140. Lam. ill. t. 317. In sylvis Gujanæ. Fol. abrupte pinnata. h

985. *CORNIDIA*. Cal. obtuse trigonus, integerrimus, semisuperus, germine accretus. Cor. 4-petala. Styli divergentes. Caps. 3-corniculata, 3-locularis, 3-valvis. Semina numerosa.

1. *umbellata*. Ruiz et Pav. syst. veg. Fl. Per. p. 91. Arb. excelsa, fol. oblongis. Cresc. in Peruv. nemoribus.

TETRAGYNIA.

986. *PORLIERA*. Cal. 4-phyllus, æqualis. Petala obovata, conniventia. Squamæ nectariferæ s. Stamina æqualia, dorso neetarii inserta. Drupæ 4, connatæ. (Guajaco affine genus.)

1. *hygrometra*, fol. abrupte pinnatis, foliol. linearibus. Ruiz et Pavon. Flor. Per. et Chil. prodr. p. 55. t. 9. et syst. vegetab. p. 94. Hab. in Peruv. ruderatis et apricis. Lignum sudorificum et antirheumaticum. Fol. hygrometrio inserviunt.

987. *FRANCOA*. Cal. 4-partitus, persistens. Cor. 4-petala. Stylus o. Stgm. plana. Caps. 4, basi connatæ, carinatæ. Semina numerosa, suturis carinarum affixa.

1. *appendiculata*, acutis, fol. cordatis ovatis obtuse angulatis, petal. foliol. appendiculatis. Cav. ic. 6. p. 77. t. 566. Hab. in ins. San Carlos, etc. Flor. racemosi.

Obs. Auctor putat, quod *Slaupanke* amplissimo sonchi folio. Fenil. Peruv. 2. p. 44. t. 31. alteram hujus generis efficit speciem, qualis planta vero a cl. Willd. Sp. pl. II. p. 487. ad *Panke* Molinæ relata est. *Panke tinctoria*. Mol. et Willd. secundum Flor. Peruv. 1. p. 29. *Gunneræ* species est.

988. *GALVESIA*. Cal. 4-phyllus. Petala sessilia. Stam. 4. alternantia breviora. Corpus glandulosum sub germine. Drupæ 4.

1. *punctata*, fol. lanceolatis oblongisque serratis punctato-pellucidis. Ruiz et Pavon syst. veg. 1. c. p. 97. Hab. in R. Chilensis nemorib., et stagnatis, etc. Fol. fragrantia, aromatica.

989. *CALANCHOE*. Cal. 4-phyllus.

Cor. hypocrateriformis, 4-fida : lacin. acutis, tubo ventricoso, *Squamæ nectarif.* 4 ad basin germinum lineares. *Capsula* 4, superæ, 1-loculares, polyspermæ. (Plantæ succulentæ. Fol. plus minusve iucisa. Flor. flavi.)

1. *lanceolata*, foliis lanceolatis apice serratis, panic. villosa. Cotyledon lanceolatum. Vahl. symb. 2. p. 51. Hab. in Arabia.

2. *laciniata*, fol. laciniato-pinnatifidis : summis integris. Decand. Pl. grass. ic. Cotyledon laciniata. Lin. Rumph. 5. t. 95. Hab. in ins. Java, Bourbon et Moluccis.

3. *aegyptiaca*, fol. spathulato-subrotundis concavis. Pl. grass. ic. Cotyl. nudicaulis. L. syst. veg. 14. p. 351. Willd. Sp. pl. II. p. 258. Pluckn. Alm. t. 228. f. 3. (maia.) Hab. in Aegypto in monte Melhan. Forsk. Flor. aurenti.

* *spathulata*, fol. spathulato-subrotundis crenatis planiusculis. Plant. grass. ic. Cotyl. hybrida. H. Par. Hab. in China? Affinis valde antecedenti.

4. *Verea*, fol. ovatis repando-crenatis, flor. corymboso-paniculatis. *Verea crenata*. Andrew. i. 21. *Verea*. Willd. Sp. II. p. 471. Cotyledon crenatum Vent. Malm. t. 49. Hab. in Sierra Leone. Subfruticosa. Cor. flava : ore aurantiaco.

5. *pinnata*, fol. quinato-pinnatis, foliol. obovatis crenatis : crenis filamentis barbatis, flor. longis pendulis. Lam. enc. 2. p. 141. Hab. in ins. Francinae. 3-4-pedalis. Panic. ramosa. Flor. penduli. Fol. crenarum sili radículas referunt. Lam.

β. *floripendula*, fol. subconcavis crenis nudis. Lam. l. c. *Crassuvia floripendia*. Commers. Lam. l. c.

6? *alternans*, fol. orbiculato-spathulatis integerrimis. Vahl. symb. 2. p. 51. sub Cotyledon. Hab. in Arabia.

Obs. Nomen *Kalanchoë* jam prius ab Adansonio (Fam. d. Pl. 2. p. 248.) his plantis, erat impositum. Cotyledoni generi, quidem affines, sed præter stam. numerum etiam cor. forma ab eo discrepant.

990. PARIS. *Cal.* 4-phyllus. *Petalata* 4, angustiora. *Antherac*

filam. medio adnexæ. *Bacca* 4-locularis.

1. *quadrifolia*, fol. quaternis. L. Flor. dan. t. 139. Herba Paris. Mauth. Hab. in nemoribus. Var. fol. 3-5.

991. ADOXA. *Cal.* 2-3-fidus, inferus. *Cor.* 4-s. 5-fida, superæ. *Bacca* 1-locularis. 4-s. 5-sperma, calyce coalita. (Flor. laterales 9-10-andri.)

1. *Moschatellina*. L. Engl. bot. t. 753. Curt. Lond. ic. Lam. ill. t. 320. Hab. in nemoribus. Vere. Flor. virescentes, odorati.

992. ELATINE. *Cal.* 4-phyllus. *Petalata* 4. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis, depressa, polysperma : dissepimenta suturis opposita.

1. *Hydropiper*, fol. oppositis, flor. alternis. Hoffm. germ. p. 186. Schuhr Handb. t. 109. Vaill. paris. 5. t. 2. f. 2.

β. *triandra*, fol. floribusque oppositis. Hoffm. l. c. Schuhr t. 109. Vaill. l. c. Hab. in inundatis. ☉

2. *Alsinastrum*, foliis verticillatis. L. Lam. ill. t. 320. f. 1. Hab. in fossis. Facie fere Hippuridis. Fol. emersa quaternæ, ovata.

993. HALORAGIS. *Cal.* 4-phyllus, superus. *Petalata* 4, caduca. *Drupa* sicca. *Nux* 4-locularis.

1. *Cercodia*, fol. serratis, florib. verticillatis. Ait. Kew. 2. p. 17. Willd. Sp. II. p. 473. H. *Tetragonia*. L'Herit. stirp. nov. 1. p. 82. H. *alata*, fructu quadriculato. Jacq. ic. rar. 1. t. 69. *Cercodia erecta*. Murray in Comm. goett. 1780. p. 3. t. 1. Lam. enc. 1. p. 682. Ej. ill. gen. t. 319. *Tetragonia ivaeifolia*. Lin. suppl. 257. Fol. ovato-lanceolata, venosa. Pedunc. scabri, demum reflectuntur infra folia.

2. *prostrata*, fol. integerrimis, flor. solitatis axillaribus. H. fructib. globosis. F. rst. prod. n.º 799. L'Herit. stirp. nov. 1. p. 82. Hab. in Botanicis insula et in N. Caledonia. Facie Ammanniæ. Rami glabri. ¶

M O N O G Y N I A.

Bais octandra. Richardia scabra. Vaccinia nonnulla. Andromeda octandra, ericoides lycopodioides. Elaeocarpus serratus. Diospyri quaedam. Rivina octandra. Jussieuae plures species. Rutae flor. laterales. Fagara octandra, Elaphrium. Rhizophora Mangle. L. Ammannia sanguinolenta, octandra. Melastomae plures species. Trichilia pallida. Portulaca quadrifida, meridiana. Zygophyllum Morgsana. Cleome juncea. Capparis ferruginea. Monotropa Hypopithys (quoad flor. laterales). Caseariae nonnullae species. Petiveria alliacea. Limonia monophylla. Aesculus Pavia. Quivisia ovata, heterophylla. Samidae quaedam.

D I G Y N I A.

Ulmus effusa. Chrysopenia (flor. lateral.) Polygon. pensylvanicum.

T R I G Y N I A.

Hortensia speciosa.

T E T R A G Y N I A.

Myriophyllum verticillatum. Forskoleae secundum Murray, Willdenow.

P E N T A G Y N I A.

Sedum pusillum, pulchellum, ternatum. Michaux.

O C T O G Y N I A.

Phytolacca octandra.

C L A S S I S I X.

E N N E A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

994. LAURUS. Cal. 4-6-partitus.

Nectar. glandulis 3, bisetis, germen cingentibus. *Filam.* interiora quorum 2-alterna sterilia glandulifera. *Drupa* 1-sperma. (Stam. 3, 5, 6, 7, 8 et 14. Flor. passim dioici.)

1. *Cinnamomum*, fol. suboppositis trinerviis ovato-oblongis, nervis versus apicem evanescentibus, panic. terminali. Lam. enc. 3. p. 441. Willd. Sp. II. p. 477. Blackw. t. 354. Burm. zeyl. 62. t. 27. Hab. in Zeylona et in America. Dioica. Arb. 18-24-pedalis.

2. *Cassia*, fol. triplinerviis lanceolatis. L. panic. laxis sublateralibus. Lam. l. c. p. 444. Ej. ill. t. 321. f. 2. Burm. zeyl. 63. t. 28. Blackw. t. 319. Carua. Rheed. 1. t. 57. Hab. in Malabar, Sumatra, Java. h

3. *Culiban*, fol. triplinerviis suboppositis. Lin. Rumph. 2. t. 14. Lam. l. c.

4. *Malabratum*, fol. suboppositis prae-longis utrinque acutis triplinerviis transverse venosis. Lam. p. 445. Katon-Karua. Rheed. 5. t. 53. Malabratum. Lohel. ic. 308. Hab. in montosis Malabaricae. Prima specie altior, cui affinis. Flor. paniculati, termin.

5. *Camphora*, foliis sub-triplinerviis lanceolato-ovatis, panic. latentibus. Lam. p. 446. Jacq. Coll. 4. p. 221. t. 3. f. 2. Blackw. t. 347. Hab. in Japonia. h

6. *montana*, fol. triplinerviis ovato-acuminatis perennantibus, flor. racemoso-paniculatis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 200. Hab. in altis montibus Jamaicae australis. Habitu L. Camphorae simillima. S. h

6. *Chloroxylon*, foliis trinerviis ovatis coriaceis: nervis apicem attingentibus. L. Brown. jam. 187. t. 7. f. 1. Hab. in Jamaica. h

7. *cupularis*, fol. ovatis glabris, panic. sessilibus subterminalib., fruct. glandiformibus cal. cupulari exceptis. Lam. l. c. p. 447. t. 321. Aubl. Guian. 1. p. 363. Hab. in ins. Mauriti, et Borbonia. Var. fol. latissimis.

8. *glauca*, fol. nervosis lanceolatis perennantibus, ramulis tuberculatis, flor. solitariis. Thunb. jap. 173. Hab. in Japonia. Folia acumine obtuso, margine reflexo, subtus glauca vel lutea in ramulis sparsi, solitarii. Oleum fructuum pro candelis inservit. Th.

9. *pedunculata*, fol. oppositis nervosis oblongis integerrimis, flor. solitariis pedunculatis. Thunb. jap. 177. Cum priora. Caul. fruticosus. Flor. versus apicem ramulorum sparsi.

10. *caustica*, fol. ovalibus rugosis perennantibus, flor. quadrifidis. Willd. p. 479. Hab. in Chili. Arbor. venenata.

11. *nobilis*, foliis lanceolatis coriaceis subundulatis venosis perennantibus, flor. subquadrifidis dioicis. Hab. in Italia, Hispan. et Oriente. h

12. *indica*, fol. venosis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis cicutricibus, flor. racemosis pubescentibus. L. Wendl. obs. bot. p. 21. t. 3. f. 22. Pluck. alm. 210. t. 304. f. 1. Seb. thes. 2. p. 90. t. 84. f. 6. Hab. in Madera, et in Canariis. Cal. 6-partitus.

13. *foetens*, fol. venosis ellipticis acutis perennantibus, axillis venarum subtus villosis,

losis, racemis elongatis compositis paniculiformibus. Ait. Kew. 2. p. 39. L. maderiensis. San. Hab. in ins. Canariis et in Madera. h

14. *Persea*, fol. ovatis coriaceis transverse venosis perennantibus, flor. corymbosis. Jacq. obs. 1. p. 38. Swartz. obs. 152. Hab. in America calida. Stam. 6. Fructus magnus pyriformis graticissimus.

15. *Borbonia*, fol. lanceolatis perennantibus, calycib. fructus baccatis. L. excl. synonym. Catesb. Borbonia. Plum. gen. 4. Hab. in Carolina, Virginia. h

16. *caroliniensis*, fol. perennantibus ovali-lanceolatis inferne subglauces, pedunc. simplicib., flor. fasciculo subcapitato terminatis, cal. lacin. exterioribus duplo brevioribus. Michaux. Flor. 1. p. 243. Catesb. car. 1. p. 63. t. 63. In Carol. et Ludovisia. Bacc. subglobosa, atroacervula. Var. ramul. et fol. glabris et pubescentibus.

17. *Catesbaei*, fol. perennantibus lato-lanceolatis ramulisque glabris, panic. brevipedunculatis, cal. subrotati lacin. subaequalibus. Michaux. p. 244. Catesb. 11, t. 28. Frut. 6-9-pedalis. Stam. perfecta 6. Bacc. ovata nigra. h

18. *martinicensis*, fol. oblongis acuminatis coriaceis perennantibus planis, racemis paniculatis, pedunc. calycibusque tomentosis. Willd. p. 481. Jacq. Collect. 2. p. 109. t. 5. f. 2. Hab. in sylvis Martinicae. Ad L. coriaceam accedere videtur. W.

19. *exaltata*, fol. lanceolato-ovatis subcoriaceis perennantibus planis, flor. racemoso-corymbosis, fructu calyce urceolato glabro semitecto. Swartz. Fl. ind. occident. 2. p. 702. Hab. in sylvis montium Jamaicae occidentalis. h

20. *alpigena*, fol. ovatis obtusis convexiusculis coriaceis, subtus venosis glaucescentibus, racemis erectis folio longioribus. Swartz. l. c. Hab. in summis montibus Jamaicae australis. h

21. *triandra*, foliis lanceolata - ovatis acuminatis membranaceis planis, floribus triandris, fructu calyce fere tecto. Swartz. Fl. ind. occident. 2. p. 706. Hab. in montibus Jamaicae occident. Flor. numerosi decidunt steriles. Sw.

22. *sanguinea*, fol. lanceolato - ovatis acuminatis, subtus venoso-reticulatis, racemis terminalibus. lateralibusve erectis folio brevioribus, calyce turbinate fructum basi cingente. Swartz. l. c. Nectandra. Roth. pl. surin. 10. Hab. Surinam. h

23. *surinamensis*, fol. lanceolato-ovatis acuminatis, ramis patentissimis, racemis filiformibus. lateralibus axillaribusve. Swartz. p. 708. Willd. p. 482. Nectandra bijuna. Hab. in sylvis Gujanae, Surin. etc. h

24. *hexandra*, fol. lanceolatis, racemis axillaribus, flor. hexandris. Swartz. l. c. Ajocea gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 311. t. 120. Hab. in sylvis interioribus. Gujanae. h

25. *salicifolia*, fol. lanceolatis acuminatis planis perennantibus coriaceis, racemis. Swartz. p. 709. Hab. in India occidentali. h

26. *globosa*, fol. ovatis glabris, cym. pedunculatis axillaribus, drupa globosa. Lam. enc. 3. p. 751. Aubl. Gujan. p. 363. Sloan, hist. 2. p. 21. t. 166. f. 1. Hab. in Jamaica, St. Domingo.

27. *coriacea*, fol. ovatis acuminatis planis reticulato-venosis subcoriaceis, racemis erectis fol. brevioribus. Swartz. 5. p. 710. L. parvifolia. Lam. enc. 3. p. 451? Hab. in montib. Jamaicae. h

28. *Leucoxylo*n, fol. oblongo-lanceolatis planis perennantibus, racemis axillaribus folio brevioribus, cal. fructiferis pedunculisque incrassatis verrucosis. Swartz. 2. p. 711. Hab. in sylvis montium Jamaicae. Cal. tumidus ex albedo-verrucosus. Sw. h

29. *membranacea*, fol. oblongis acuminatis venosis margine convexis coriaceo-membranaceis, racemis erectis folio brevioribus. Swartz. 2. p. 713. Hab. in montib. excelsis Jamaicae, Hispaniolae. L. Borboniae proxima. h


30. *patens*, foliis-oblongis utrinque acuminatis planis membranaceis, racemis erectis folio longioribus, ramisque patentibus diffusis. Swartz. l. c. p. 715. Hab. in Jamaicae montosis. ☉

31. *parviflora*, foliis oblongo ellipticis acuminatis planis membranaceis, racemis terminalibus axillaribusve folio brevioribus erectis confertis subpaniculatis. Swartz. p. 717. Cum priore cresc. Quoad figuram folior. et racemorum L. Leucoxylo similis. Sw.

32. *pendula*, fol. oblongis apice brevi attenuato venosis membranaceis subtus glaucescentibus, racemis laxis, fructibus pendulis nudis. Swartz. p. 719. Habit. in sylvis montium Jam. occident.

33. *floribunda*, fol. ovato-lanceolatis planis membranaceis venosis, racemis axillari-terminalibus folio longioribus paniculatis, pedunc. longissimis. Swartz. p. 721. Hab. in sylvis montium Jam. australis. h

Ff



34. *lucida*, fol. oblongis serratis, ramulis ternis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus. Thunb. jap. 174. Hab. in Japonia. h.

35. *umbellata*, fol. ovatis serratis, ramulis umbellatis, flor. racemosis. Hab. in Japonia. h.

36. *aestivalis*, fol. venosis oblongis acuminatis, utrinque glabris, annuis, subtus rugosis, ramis supra axillaribus. L. Mill. dict. n.º 8. Hab. in Virginia ad ripas rivulorum. Frut. 8-10-pedalis. h.

37. *Diospyrus*, fol. oblongo-ovalibus inferne subtoментosis, flor. glomerato-umbellatis dioicis, pedicell. villosis. L. diospyroides. Michaux. Flor. 1. p. 243. L. mellissaefolia. Walt. ? Hab. in Amer. boreali. Virgata humilis, nudiflora ut plerumque species Amer. frigidioris. M. T.

38. *geniculata*, ramis divaricatis flexuosis, fol. deciduis lanceolatis, basi subtus barbatis, flor. umbellatis polygamis. Michaux. p. 244. Conf. L. axillaris. Lam. enc. 3. p. 453. Hab. in aquis stagnantibus Carolinae.

39. *Benzoin*, foliis enerviis ovatis utrinque acutis integris annuis, flor. glomeratis lateralib. Comm. hort. 1. p. 189. t. 97. Arbor benzoinum redolens. Pluk. alm. 42. t. 139. f. 3. 4. L. *Pseudo-Benzoin*. Michaux. Fl. p. 243. Hab. in Virginia. h.

Obs. Succus, odore quidem *Benzoin*, sed hanc resinam non profert, quae forte a Terminali Benzoin provenit.

40. *Sassafras*, fol. deciduis integris trilobisque flor. dioicis. L. Michaux. p. 244. Trew. Ehret. t. 59. 60. Catesb. car. 1. p. 55. t. 55. Amer. boreali. Stam. flor. mas. 9, foem. 6. brevissima. M. Remedium optimum sistit sudorificum, aperiens.

995. *ANACARDIUM*. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5, reflexa. *Anther.* 9, filam. decimo castrato. *Nux* reniformis, supra receptaculum carnosum, s. pedunc. ampliatus pyriforme.

1. *occidentale*. L. Jacq. amer. 124. t. 181. f. 35. Blackw. t. 369. Cassuvium. Lam. ill. t. 322. Rumph. 1. t. 69. Rhed. t. 54. Hab. in Indiis. Fol. simplicia magna. Flor. panicul. Pedunc. spongiosus esculentus. (Pomme d'acajou.)

Obs. Est planta polygama dioica. Fila-

mentum longius in apertis floribus sterile est, in clausis vero Antheram gerit magnam, torosam. Rotz.

996. *PLEGORHIZA*. *Cal.* 6. *Cor.* monopetala. *Caps.* 1-locularis, 1-sperma.

1. *adstringens*. Willd. Sp. II. p. 487. Enc. bot. 5. P. Guajcuru. Molin. chil. Hab. in Chili provinc. borealiorib. Fol. radical. caespitosa. Flor. terminales pedunculati plurimi. Semen unic. oblongum subcompressum. M. h.

997. *CASSYTA*. *Cor.* calycina, 6-partita. *Nect.* glandulis 3, truncatis, germen cingentibus. *Filam.* interiora glandulifera. *Drupa* 1-sperma.

1. *filiformis*, filiformis lava. L. Lam. ill. t. 32. Volutella aphylla. Forsk. desc. 84. Calodium cochinchinense Loureiro. Fl. ed. Wild. 1. p. 303. Rumph. 5. t. 184. f. 4. Herba cuscuteae; fructificatio lauri. L.

2. *corniculata*, ramis lignosis spinosis. L. Burm. ind. 93. t. 33. f. 1. Hab. in Celebis montib. inter truncos putridos. Fol. lanceolato-linearia. h.

998. *PALOVEA*. *Cal.* duplex: exterior urceolatus, 2-lobus, interior infundibuliformis coriaceus, 4-5-lobus. *Petala* 3? *Legumen*.

1. *guyanensis*. Aubl. 1. p. 365. t. 141. Lam. ill. t. 323. Ginannia Schreb. Gen. p. 231. Hab. in Guyana. Fol. simplicia. Flor. spicati bracteati, legum. longum.

Obs. Genus ulterius examinandum, cuius filament. decimum forte sterile; ac potius in Decandriam pone Bauhiniam collocandum; cfr. Juss. gen. pl.

999. *ERIOGONUM*. *Cal.* subcampanulatus, 6-fidus. *Cor.* 6. *Sem.* 1, triquetrum, cal. tectum. (Flor. pedicellati e communi involucro campanulato proveniunt.)

1. *tomentosum*, caul. herbaceo dichotomo, fol. ternis verticillatis obovatis. Michaux. Flor. 1. p. 246. t. 24. Hab. in aridis, pinetis Carol. et Georgiae. Flor. albid. Genus Polygonum, sed vagina stipulari destitutum. M.

TRIGYNIA.

1000. *RHEUM*. *Cal.* o. *Cor.* 6-fida, persistens. *Sem.* 1, triquetrum.

1. *rhaponticum*, fol. obtusis glabris, venis subtus pilosiusculis, sinu baseos dilatato, petiolis supra sulcatis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. p. 41. *Willd. Sp. II.* p. 488. *Sabb. hort.* 1. t. 34. Hab. in Thracia, etc.

2. *undulatum*, fol. subvillosis, petiolis aequalibus, *Lin. Syst. veg.* 385. *Amoen. acad.* 3. p. 312. t. 4. Hab. in China, Sibiria. *h*

3. *palmatum*, fol. palmatis acuminatis. *Lin. fasc.* 7. t. 4. Hab. in China.

4. *compactum*, fol. sublobatis obtusissimis lucidis argute denticulatis glaberrimis. *L.* Hab. in Tartaria, China. *Fol.* coriacea s. compacta, petiol. sulcati. *T*

5. *tataricum*, fol. cordato-ovatis integris planis glaberrimis, petiolis semiteretibus angulatis, panic. sulcata. *Lin. suppl.* p. 229. Hab. in Tataria minore. *Fol.* magna radicalia humo incumbens. *L.*

6. *Ribes*, fol. obtusissimis subverruculosis, venis subtus spinulosis, petiolis supra planis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. p. 42. *Desf. in Annal. d. Mus. p. r.* t. 49. *Dill. elth.* 191. t. 158. f. 192. (*folium.*) Hab. in Persia, Libano, Carmelo.

7. *hybridum*, fol. supra glabris, subtus pilosiusculis sublobatis acutis, sinu baseos angustato, petiolis supra obsolete sulcatis

margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. p. 42. *Murr. Comm. goett.* 1779. p. 7. t. 1. Hab. in Asia boreali. *Petiol.* plani. *h*

8. *leucorhizum*, fol. transverse ovalibus depressis, panic. seminifera divaricata, cal. foliolis binis multoties majoribus. *Pall.* in *N. Act. petrop.* 1792. p. 381. Hab. in montosis deserti Songarici in Sibiria. *Fol.* radicalia ad terram oppressa, per oram asperata denticulis minutissimis cartilagineo-rigidis. *Petuli compressi laeves succul.* *P.*

1001. *PLÆA*. *Cor.* 6-partita, patens. *Caps.* subrotundo-trigona, (tres conjunctæ?) trilocularis: septo non manifesto. *Sem.* numerosa, oblonga, margini valvularum adnexa. (*Spica* spathis 1-floris.)

1. *tenuifolia*, fol. ensiformi-attenuatis longissimis. *Michaux.* 1. p. 248. t. 25. Hab. in ulis sylv. *Car. inferioris.* *Spath.* convolutae amplexantes.

Obs. An cum *Toffieldia*, potius conjungendum genus? à quo staminum numero solummodo differre videtur.

HEXAGYNIA.

1002. *BUTOMUS*. *Cal.* o. *Petal.* 6. *Caps.* 6, polyspermæ.

1. *umbellatus*, *L. Engl. bot.* t. 651. *Flor. dan.* t. 604. *Curt. lond. ic.* *Juncus floridus.* *Bauh.* *Habit.* in aquis.

MONOGYNIA.

— *Amyris* (*Iceia*) enneandra, *Gardenia Thunbergia*, *Guetarda speciosa*, *Brownaea cuneandra*.

C L A S S I S X.

D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

LEGUMINOSÆ, filamentis distinctis, cor.
nunc regulari, nunc irregulari, &
papilionacea. (Gen. 1003-1033.)

1003. SOPHORA. Cal. 5-dentatus,
campanulatus; superne gibbus.
Cor. papilionacea: alis longitu-
dine vexilli. Legum moniliforme.
(Fol. pinnata: foliol. plerum-
que numerosa.)

1. *tetraptera*, foliis pinnatis, foliolis
lanceolato-oblongis villosiusculis, legumi-
nibus membranaceo-quadrangulis, caule
arboreo. Ait. Kew. 2. p. 43. Lam. ill. gen.
t. 325. f. 3. Willd. Sp. II. p. 499. Hab. in
N. Zeelandia. Arb. 10-12-petalis, floret
primo vere, antequam frondescit. h

2. *microphylla*, fol. pinnatis, foliol. mi-
nutis obovatis villosiusculis, leguminibus
membranaceo-quadrangulis, caule arboreo.
Ait. K. l. c. p. 43. Lam. ill. t. 325. f. 1. S.
tetraptera. Lin. suppl. 230. Habitat cum
priore.

3. *flavescens*, glabra, fol. pinnatis, foli-
olis oblongis glabris, caule herbaceo. Ait.
p. 43. Hab. in Sibiria. Fruct. torulosus,
glaber.

4. *alopescuroides*, fol. pinnatis, foliol.
oblongis villosis, caule herbaceo. L. Mill.
dict. n.º 1. Kniph. cent. 10. n.º 94. Dill.
elth. 136. t. 112. f. 136. Buxb. cent. 3. p. 25.
t. 46. Hab. in Oriente. T

5. *tomentosa*, fol. pinnatis, foliol. sub-
rotundis tomentosis. L. Herm. lugdb. 163.
t. 171. Lam. ill. t. 325. f. 2. Hab. in Zey-
lona. h

6. *occidentalis*, fol. pinnatis, foliolis
subrotundis incanis subtomentosis. Swartz.
obs. 154. Trev. Ehret. 27. t. 59. Hab. in
America. An var. præcedentis? Fol. minus
tomentosa, et fere subius tantum subto-
mentosa. Sw.

7. *obliqua*, fol. abrupte pinnatis, subtus
ferrugineis, foliol. parvulis basi obliquis,
pedunc. verrucosis. Hab. in Amer. australi?
(Herb. D. Thibaud.) Pedicelli villosi et
fol. subtus subvillosa, hæc quasi quadran-
gula, superiora ovata. Legum. longum to-
rulosum in pedicellis squamosis.

8. *retusa*, fol. pinnatis, foliol. retusis,
junioribus leguminibusque tomentosis. Hab.
in insula Franciæ. Commer. Foliol. ovato-
lanceolata apice emarginata. Flor.?

9. *japonica*, fol. pinnatis, foliol. plu-
ribus ovatis glabris, caule arboreo. L.
Hab. in Japonia. Arbor alta, fol. nitidis.
Petal. chroleuca (alba. L.) unguicul. ru-
bellis. Flor. aestate.

10. *heptaphylla*, fol. pinnatis, foliol.
septenis glabris. L. Rumph. amb. 4. p. 60.
t. 22. Hab. in India. h

11. *monosperma*, fol. impari-pinnatis,
pinnis 5-jugis, leguminibus monospermis,
caule arboreo. Swartz. Fl. ind. occid. 2.
p. 272. Podalyria. Enc. bot. 5. p. 440. Hab.
in insulis Indiarum occidentalis. Arbuscula de-
cempetalis cort. albid. Rami ferrugineo-
tomentosi. Panic. terminales, ramosae. Cor.
magna, coerulea, odorata. Sw.

12? *argentea*, petiol. diphyllis spinis-
centibus, pedunc. racemoso-multifloris ter-
minalibus. Pall. in Act. petrop. 2. 1792.
p. 373. t. 2. Podalyria. Willd. Sp. II. p. 502.
Hab. in Sibiria. Flores? Legum. planum
1-spermum. h

1004. VIRGILIA. *Cal.* 5-dentatus, gibbus. *Cor.* papilionacea. *Alv.* nervillo breviores. *Legum.* compressum, aut subteres, polyspermum. (Fol. pinnata.)

1. *capensis*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis subtus incanis, legum. tomentosis, caul. fruticoso. Lam. ill. gen. t. 326. f. 2. Sophorn. Lin. Podalyria. Willd. p. 501. Hab. ad Cap. b. sp. Flor. albi. Fur. Amorrhæ. C.

2. *aurea*, fol. pinnatis, foliol. ellipticis acutiusculis, inferne subnullis, legum. glabris. Willd. sub. Podalyria. Lam. ill. t. 326. f. 1. L'Her. Stirp. nov. 1. p. 157. t. 75. Cresc. in Abyssinia. h

3. *secundiflora*, caul. fruticoso, fol. sparsis impari-pinnatis, flor. racemosis secundis. Cav. ic. 5. p. 1. t. 401. Broussonetia. Ortega decad. 5. p. 61. t. 7. Hab. in N. Hispania. *Cor.* caerulea. *Legum.* tomentosum.

1005. PODALYRIA. *Cal.* subbilabatus, 5-fidus. *Cor.* papilionacea, alæ vexilli longitudine. *Legumen* læve, ventricosum, polyspermum.

1. *australis* (caerulea), fol. ternatis petiolatis, fol. obovato-lanceolatis obtusis, stipulis lanceolatis petiolo duplo longioribus. Willd. Vent. Hort. Cels. p. 56. t. 56. S. caerulea. Tr. Pl. rar. t. 14. S. australis. L. Hab. in Amer. *Legum.* acuminata. Flor. caerulei.

2. *tinctoria*, fol. ternatis petiolatis, foliolis subrotundo-obovatis obtusis mucronatis, stipulis obsoletis oblongis acutis petiolo multoties brevioribus. Willd. *Legum.* parvis longius stipitatis. Mich. Lam. ill. gen. t. 327. f. 1. Hab. in Amer. septentr. Flor. lutei. Rad. tincturam nigram præbet.

3. *alba*, ramis divaricatis flexuosis; fol. ternatis petiolatis, foliolis oblongis obtusis, stipulis subulatis petiolo brevioribus, legum. obovatis. Michaux. p. 264. Sophora alba. L.

4. *villosa*, pubescens, fol. subsessilibus, foliol. ovali-oblongis obtusis; stipul. linearib., spica terminali. Michaux. Flor. 1. p. 27. In Car. septentrion. Flor. pallidi. Calyc. subsemi-quadrifidi. M.

5. *mo.*, pubescens, foliol. subrhomboido-lanceolatis, stipul. foliaceis lanceolatis, spic. terminali. Michaux. Hab. in Carol. super. e. Flor. lutei.

6. *lupinolia*, fol. ternatis petiolatis,

foliol. elliptico-lanceolatis obtusis pubescentibus, stipulis lanceolatis petiolo longioribus. Willd. p. 504. Lam. ill. t. 327. f. 2. Sophora lupinoides. L. Pall. it. 2. p. 676. Hab. in Camtschatca. Flor. lutei. Stipulae ensiform. magnæ.

7. *myrtyllifolia*, fol. simplicib. obovatis utrinque sericeis obtusis cum acumine, pedunculis inifloris, calycibus basi intrusis tomentosis. S. *rotundifolia*, fol. simplicib. obovatis sericeis, flor. axillaribus, pedunculis longitudine foliis. Thunb. prod. 79. Sub Sophora. Retz. obs. 1. p. 86. In Cap. b. spei.

8. *biflora*, fol. simplicibus obovatis subtomentosis, pedunc. bifloris. L. Hab. ad Cap. b. spei. Flores purpurascens.

9. *pedunculata*, fol. simplicibus ovatis tomentosis, flor. axillaribus, pedunc. folio longioribus. Sub Sophora. P. *buxifolia*. Willd. p. 565. Lam. ill. t. 317. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. Tomentum rufum. Flor. solitarii pedunc. longo insidentes. h

10. *hirsuta*, fol. simplicibus hirsutis, superioribus ovatis, inferioribus subrotundis, ramis teretibus, laciniis calycinis lanceolatis longitudine alarum. Ait. Kew. 2. p. 46. Sub Sophora. Hab. ad Cap. b. spei. h

11. *obcordata*, fol. simplicib. obcordatis sericeis candicantibus, floribus solitariis subsessilibus, legum. minimis 1-spermis. Lam. enc. 5. p. 445. Ill. gen. t. 327. f. 5. Hab. in Senegal. Flor. ignoti. An Ononis?

12. *cuneifolia*, fol. cuneiformib. emarginatis sericeis, pedunc. fol. brevioribus, cal. basi intrusis. Vent. Hort. Cels. p. 99. t. 99. Hab. ad Cap. b. spei. Arb. elegans, fol. sericeis et flor. lacteis distincta.

13. *perfoliata*, foliis suborbiculato-perfoliatis, flor. solitariis axillarib., leguminib. subglobosis. Michaux. Flor. 1. p. 263. *Crotalaria perfoliata*. L. Habit. in Carolinae aridis. Flor. lutescentes.

14. *uniflora*, pubescens, flor. solitariis axillaribus pedunculatis, foliol. lanceolatis, stipulis setaceis. Mich. 1. c. Sophora lanceolata. Walt. 7. Hab. in Carol. et Georg. Flor. sessilia. Flor. lutescentes.

Obs. *Gompholobium*. Smith. in Act. soc. Linn. IV. idem genus, saltem ob fructum, videtur.

1006. PULTENÆA. *Cal.* 5-dentatus, utrinque appendiculatus. *Cor.* papilionacea, alis vexillo

F f 3

brevioribus. *Legumen* uniloculare, dispermum! (Fol. simplicia.)

1. *stipularis*, fol. linearibus mucronatis subciliatis, stipulis solitariis binerviis laceris. Smith. Nov. Holl. 1. p. 35. t. 12. Willd. p. 566. Totum genus provenit in Nova Hollandia seu Australasia.

2. *paleacea*, fol. linearibus mucronatis glabris, capitulo terminali, bracteis oblongo-acuminatis dentatis flore longioribus. Willd. h.

3. *linophylla*, fol. linearib. obtusis mucronatis strigosis, capitulis terminalibus paucifloris, bracteis scariosis bifidis calyce multobrevioribus. Willd. l. c. Sert. hannov. p. 28. t. 18. h.

4. *daphnoides*, fol. obovatis glabris mucronatis, floribus terminalibus capitatis. Willd. Wendl. obs. 43. Ej. Hort. Herrenh. p. 7. t. 18.

5. *villosa*, fol. oblongis pilosis, florib. axillaribus, caule villosa. Willd. h.

6. *tuberculata*, fol. imbricatis ovato-linearibus glabris, tuberculis minutis exasperatis, flor. axillaribus fol. aequantibus. Ex Herb. D. Thibaud.

Obs. A praecedente, quantum ex brevi diagnosi divinare licet, diversa est. Stipulae scariosae, margine villosae. Fol. conferta, convexa, summa parum ciliata, flor. obtegentia.

1007. DAVIESIA. *Cal.* angulatus, simplex (s. nudus), quinquefidus. *Cor.* papilionacea. *Legum.* compressum, monospermum.

1. *ericoides*, hirsuta, fol. sparsis linearibus, margine revolutis, flor. axillaribus. *Pultenaea* ericoides. Vent. Malm. p. 35. t. 35. Hab. ut sequens in Australasia.

2. *junceae*, petiol. teretibus: primordialis foliosis, fol. ternatis lanceolatisque deciduis superiorib. nudis longissimis. Vent. Choix de pl. 1. p. 6. t. 6. (D. *denudata*.) *Sophora junceae*. Sert. Hannoveran. p. 9. t. 3. *Pultenaea junceae*. Willd. Fol. distincta rarius observantur.

1008. ANAGYRIS. *Vexillum* aequae carina brevioris in corolla papilionacea. *Legumen.*

1. *soetida*. L. Lam. ill. t. 328. Hab. in

Europ. austral. montibus. Folia alternata ternata. Flores subracemosi. Willd. h.

1009. CERCIS. *Cal.* 5-dentatus, inferne gibbus. *Cor.* papilionacea: vexillo sub alis brevi. *Legumen.* (Fol. integra.)

1. *Siliquastrum*, fol. orbiculatis cordatis. L. Lam. ill. t. 328. F. Duham. Ed. nov. t. 7. Hab. in Europ. australi.

2. *canadensis*, fol. cordatis acuminatis pubescentibus. L. Mill. ic. 2. Hab. in Virginia. Fol. ad axillas nervor. villosa. Flor. parvuli. M. h.

1010. BAUHINIA. *Cal.* 5-fidus, irregularis, deciduus. *Petala* patula, oblonga, unguiculata: superiore magis distante, omnia calyci inserta. *Legumen* longum, pedicellatum, sublanceolatum. (Filam. in nonnullis basi unita. Fol. biloba.)

1. *scandens*, caule cirrhifero. L. Willd. Sp. 11. p. 508. Rheed. 8. t. 29. Hab. in Malabar, Amboina, Cumana. h.

2. *parviflora*, racemis axillaribus terminalibus nutantibus, petalis linearibus, lobis foliorum rotundatis glabris. Vahl. symb. 3. p. 55. Hab. in India orient. Circhi nulli. h.

3. *racemosa*, flor. triandris extus staminibusque basi hirsutis, fol. subtus sericeis, lobis rotundatis. Vahl. symb. 3. p. 56. t. 62. Lam. enc. 390. In India.

4. *aculeata*, caule aculeato. L. Jacq. Amer. 119. t. 177. f. 2. Plum. gen. 23. ic. 14. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. h.

5. *divaricata*, fol. ovatis, lobis divaricatis. J. Hort. cliff. t. 15. Lam. ill. t. 824. f. 3. Hab. in Amer. Stam. diadelphe. L. h.

6. *aurita*, fol. basi subtransversis, lobis lanceolatis porrectis trinerviis, petalis lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 48. Fol. ovato-cordatis lobis longissimis parallelis. Mill. ic. 4. t. 61.

7. *porrecta*, fol. cordatis, lobis porrectis trinerviis, petalis lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 48. Jacq. hort. Schoen. f. p. 52. t. 100. Hab. in Jamaica, Hispania. Flor. diadelphe subdecandri.

8. *ungulata*, fol. ovatis, vis parallelis. L. Hab. in America.

9. *variegata*, calyc. monophyllis rum-
pentibus, petalis sessilibus ovatis, folior.
lobis ovatis obtusis. Ait. l. c. p. 48. Rheed. 1.
t. 32. Hab. in Malabaricae, Maderae are-
nensis. Petal. rosei, luteo-purpureoque va-
riegati. h

10. *candida*, fol. cordatis subtus pubes-
centibus, lobis ovatis obtusis, calycibus
superne attenuatis elongatis. Ait. Hab. in
India orientali. h

11. *purpurea*, flor. triandris, foliorum
lobis ovalibus obtusis. Ait. Kew. 2. p. 49.
Rheed. 1. t. 33. Hab. in Indiae arenosis.
Flor. purpurascens.

12. *tomentosa*, fol. cordatis, lobis semi-
orbiculatis tomentosis. L. Burm. zeyl. 44.
t. 18. Rheed. 1. t. 35. Hab. in India. Cor.
campanulata, albo-flavescens. h

13. *acuminata*, fol. ovatis, lobis acumi-
natis semi-ovatis. L. Rheed. 1. t. 33. Habit.
in India orientali. Cor. campanulat., albae.
Stamina diadelphe. L.

14. *gujanensis*, fol. binatis, foliol. acu-
minatis, caule cirrhoso. Willd. B. foliis
petiolum divisiss, foliol. acutis. Lam. enc.
p. 391. *β Outimouta*, caule cirrhifero,
fol. coriiformibus bipartitis, subius aureis.
Aubl. guj. 1. p. 375. t. 144. Hab. in sylvis
Gujanæ. h

15. *diphylla*, fol. binatis, foliol. inae-
qualibus obtusis 5-nerviis, cirrho simplici
lateralis. Symes it. ad Regn. avam. 3. Lond.
1800. t. 7. Hab. in India.

16. *rubescens*, fol. ad petiolum usque
divisis, foliol. semiorbiculatis obtusis. Lam.
E. c. illust. gen. t. 329. f. 2. Hab. in Africa.
Caul. nudus. h

17. *Pes caprae*, caul. arboreo, fol. cor-
datis glabris, lobis apice divergentibus, flor.
racemosis. Cav. ic. 5 p. 3 t. 404. Collecta
c. sequentibus in Amer. australi a cl. Née.
Stam. diadelphe. h

18. *latifolia*, caul. fruticoso, fol. cor-
datis rotundato-bilobis, flor. racemosis gla-
bris. Cav. l. c. p. 4. t. 405. Petal. alba. Caul.
inermis. h

19. *rotundifolia*, fol. alternis subro-
tundis, lobis semiorbiculatis subtus tomen-
tosis, flor. racemosis. Cav. t. 406. B. *tomen-
tosae* affinis, sed stam. diadelphe et cor.
campanulata. †

20. *lunaria*, fol. glabris cordatis, lobis
subrotundis, flor. racemosis tomentosis. Cav.

t. 407. Aff. B. *racemosae*. Stam. diadelphe
Cor. rubra.

21. *Pauletia*, caul. fruticoso aculeato,
fol. ovatis bilobis, lobis obtusis, flor. ge-
minis, in racemum foliosum dispositis,
Pauletia aculeata. Cav. l. c. p. 6. t. 410. Cresc.
in Panamæ vicinis. Petal. undulata et lu-
teo-rubra uti in sequente.

22. *inermis*, inermis, caule arbores-
cente, fol. ovatis, lobis acutis, flor. race-
mosis terminalibus. Pauletia *inermis*. Cav.
p. 6. t. 409. Hab. in Acapulco vicinis.

Obs. Beat. auctor ex hac et antecedente
specie genus peculiare constituit: ob cal.
persistentem, petal. *linearia*, filam. *basi
connexa*, in corpus crassum etc. et no-
mine viri probi nec non meriti condeco-
ravit: sed characteres, quibus à Bauhinia,
L. differunt, vix sufficere videntur, ut ab
iis removeri possint.

23? *latisiliqua*, caule fruticoso, fol.
lobis acutis, legum. latissimis. Cav. l. c.
p. 5. t. 406. Hab. in Ins. Philippicis. Legum.
semipedal. An *Hymenaea*?

1011. HYMENÆA. Cal. turbinatus
coriaceus. 5-partitus. Petala 5,
subæqualia. Stylus intortus. Le-
gumen magnum, dilatatum, re-
pletum pulpa farinacea. (Fol.
conjugata.)

1. *courbaril*, foliol. coriaceis subaveniis
basi inaequalibus, paniculae flor. peduncu-
latis. Vahl. eclog. 2. p. 30. Willd. Sp. II.
p. 512. Lam. ill. gen. t. 330. f. 1. Pluk. alm.
96. t. 82. f. 3. Hab. in Amer. meridionali.
Arb. resinosa, utilissima.

2. *venosa*, fol. membranaceis venosis,
basi subæqualibus, paniculae flor. subse-
silibus. Vahl. l. c. p. 31. Hab. in Cajenna. h

3. *verrucosa*, foliol. venosis basi inae-
qualibus, panic. flexuosa divaricata, pe-
dunc. multifloris, legum verrucoso. Willd.
Gaert. sem. 2. p. 306. t. 139. f. 7. Lam. ill.
t. 330. f. 2. Hab. in Madagascar. h

1012. AFZELIA. Cal. tubulosus,
limbo quadrifido, deciduo. Pe-
tala 4, unguiculata: summo
maximo. Filamenta 2-suprema
sterilia. Legum. multiloculare.
Semina basi arillata.

1. *africana*. Smith. in Act. soc. Linnaen.
v. 4. Hab. in Africa æquinoxiali. Arb. fol.

F f 4

alterna abrupte pinnata. Flor. racemosi, sanguinei. Legum. lignosum. Sem. nigra: arillo coccineo. S.

1013. CYNOMETRA. Cal. 4-phyllus. *Anthera* bifida. Legum. carnosum lunatum, 1-spermum. (Fol. conjugata.)

1. *cauliflora*, trunco florifero. L. Willd. Sp. II. p. 539. Rumph. t. 52. Lam. ill. t. 331. Hab. in Indiis. Arb.

2. *ramiflora*, ramis floriferis. Rumph. t. 63. Rheed. 4. t. 31. Cresc. in India. Arb. praecedente altior. Legum. minora.

1014. CASSIA. Cal. 5-phyllus. *Petalata* 5, aequalia. *Anthera* supremae 3, steriles; infimae 3, rostratae, in filam. longioribus incurvis. Legum. membranaceum, 2-valve.

1. *aphylla*, caule fruticoso dichotomo aphylo. Cav. ic. 6. p. 41. t. 567. Hab. in Amer. boreal. 2-petalis. Legum. lineare.

2. *diphylla*, fol. conjugatis; stipulis cordato-lanceolatis. Cav. ic. 5. p. 80. t. 600. f. 1. Hab. in India. ☉

3. *lanceolata*, fol. 11-jugis obovatis venosis, stipul. lanceolatis appressis, foliol. subaequantibus. Hab. in Ceyenne. (Herb. Lamark.) Legum. longe pedicellatum, glabrum, stipul. longae.

4. *rotundifolia*, fol. 2-jugis subrotundis, stipul. parvis ovato-acuminatis, petiol. subaequantib., caule subvillosa. Hab. in Amer. austr. (Herb. Juss.) Flor. axillares solitarii, pedicel. longis instructi.

5. *Absus*, pilosa, fol. 2-jugis obovatis, gland. duabus subulatis inter infima. L. Senna quadrifolia, siliqua plana hirsuta, flore aureo sanguineo. Burm. zeyl. 212. t. 97. Hab. in Ind a, Aegypto. ☉

6. *viminea*, fol. 2-jugis ovato-oblongis acuminatis, glandula oblonga inter infima, spinis subpetiolaribus obsoletis tridentatis. Sloan. jam. 2. p. 49. t. 189. f. 6. 7. Hab. in Jamaicae montibus altissimis interioris sylvaticis. h

7. *Apocouita*, arborescens, fol. 2-3-jugatis amplis ovali-oblongis, racem. axillaribus. Aubl. Gujan. p. 379. t. 146. Hab. in Gujana. Arb. satis alta.

8. *Tagera*, procumbens. fol. 3-jugis glandula petiolaris, stipulis ciliatis cordatis acuminatis. L. Rheed. mal. 2. p. 103. t. 527. Hab. in India.

9. *Tora*, erecta, fol. 3-jugis obovatis, exterioribus majoribus, glandula subulata inter inferiora. L. C. *limensis*, Lam. Dill. elth. 72. t. 83. f. 73. *C. humilis*, siliquis foeni graeci. Plum. Spec. 18. t. 72. f. 2. Hab. in India. ☉

10. *bicapsularis*, fol. 3-jugis obovatis glabris: interioribus rotundioribus, glandula interjecta globosa. L. Merian. sur. t. 33. Plum. spec. 18. t. 76. f. 1. Hab. in India. h

11. *emarginata*, fol. sub-4-jugis ovalis subintegris, florib. racemosis irregularibus, caule arboreo. Swartz. obs. 157. Sloan. hist. 2. p. 44. t. 180. f. 1. 2. 3. 4. Hab. in Caribaeis. h

12. *obtusifolia*, fol. 3-jugis ovalis obtusiusculis. L. Dill. elth. 71. t. 62. f. 72. Hab. in Cuba et Jamaicae ruderalis.

13. *sennoides*, fol. 3-jugis, foliol. averse ovalis, glandula obtusa inter infima, stipulis subulatis, caule arboreo. Jacq. ic. rar. 1. t. 70. Collect. 1. p. 74. W. Hab. in India orientali h

14. *acuminata*, fol. 3-jugis, foliol. ovato-acuminatis, glandula sessili inter foliola. Willd. p. 517. *C. apocouira*. Aubl. guj. 1. p. 379. t. 146. Hab. in Gujanae sylvic. h

15. *corymbosa*, fruticosa, fol. 3-jugis lanceolatis subfalcatis glabris, glandula inter infima, corymbis pedunculatis axillaribus, leguminibus cylindricis. Lam. enc. 644. Hab. in Bonaria. *C. falcata* hortulanorum. h

Obs. Sub nomine *C. falcata* frequens hic colitur, a qua tamen diversa. C. crassifolia et corymbosa? Orteg. decal. 10. p. 122-124, ab hac non differre videntur.

16. *longisiliqua*, fol. 4-jugis, foliol. extimis lanceolatis, glandula subulata infra infima interque extrema. Lin. suppl. p. 216. Hab. in America. Legum. tetragonum, hirtum brevius. h

17. *falcata* (herbacea?) fol. 4-jugis ovato-lanceolatis retrofalcatis, glandula basos petiolorum. L. Hort. cliff. 159. Hab. in America. ☉ +

18. *sericea*, fol. sub-4-jugis ovalis hirsutis, glandula subulata inter foliola, peduncul. 4-floris, leguminibus tetragonis. Swartz.

Flor. 2. p. 724. *C. sensitiva*. Jacq. ic. rar. 3. t. 459. Collect. 2. p. 362. Hab. in gramin. subalpinis Jamaicae. ☉

19. *occidentalis* (*foetida*), fol. sub-5-jugis ovato-lanceolatis margine scabris, exterioribus majoribus, glandula baseos petiolorum. L. *C. americana foetida*. Tourn. institut. Comm. hort. 1. p. 51. t. 26. Sloan. jam. hist. 2. t. 176. 3. 4. Pedunc. multiflori. Hab. in America. Legum. angusta linearia falcata. Michaux. ☉

20. *linearis*, herbacea glabra, fol. sub-6-jugis lanceolato-ovalibus acutissimis, gland. basilari, pedunc. subbifloris, legum. linearib. rectis. Michaux. Flor. I. p. 261. Hab. in Carol. Praecedenti nimis affinis, floratione praecocior. ☉

21. *grandiflora*, fol. 5-jugis ovatis margine pubescentibus, pedunc. axillarib. brevibus subtrifloris, gland. globosa sessili. *C. chinensis*. Lam. enc. 1. p. 644. Rumph. t. 23. Hab. in China. Flore magno, flavo memorabilis. L. ☿

22. *ornithopoides*, fol. 4-jugis, foliol. ovato-cuneiformibus mucronatis, pilosoferrugineis, legum. linearibus articulatis erectis tomentosis, mucrone recurvo terminatis. Lam. l. c. Hab. in Amer. meridion. Gland. conico-globiformis ad singulum fol. par. L.

23. *torosa*, fol. 5-jugis, foliol. ovato-oblongis, gland. subpedicellata baseos petiolorum, legum. cylindricis, utrinque juxta suturas torulosis, torulis transversalibus. Cav. Descr. de Lss. plant. p. 131.

24. *Canca*, fol. sub-6-jugis, foliol. ovato-lanceolatis subciliatis, gland. sessili in petiolor. basi, flor. subumbellatis, legum. subquadrangularibus. Cav. l. c. Hab. in Cumana.

25. *planisiliqua*, fol. 5-jugis ovato-lanceolatis glabris, glandula baseos petiolorum. Plum. Sp. t. 77. Hab. in Amer. calidiore. ♀

26. *patula*, fol. 5-6-jugis oblongis acutiusculis, glabris, glandula baseos petiolorum, racemis laevibus. Ait. Kew. a. p. 51. Hab. in India occidentali. ♀

27. *atomaria*, fol. 5-jugis ovatis subtomentosis, petiolis teretibus eglandulatis. L. Hab. in America. Petioli atomis subferrugineis adpersi. Fol. utrinque viridia, tactu tomentosa. L.

28. *lineata*, fol. 5-jugis oblongiusculis subtus pubescentibus subaequalibus, gland. obsoleta sub infimis, peduncul. unifloris.

Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 726. Hab. in ruderaus et cultis Jamaicae. ☿

29. *pilosa*, fol. 5-jugis eglandulatis, stipul. semicordat. acuminatis, caule stricto piloso. L. Hab. in Jamaicae austr. aridis. Flor. pentandri.

30. *arborescens*, fol. sub-5-jugis ellipticis glabris, glandula oblonga inter inferiora, stipulis subulato-falcatis, racemis axillaribus. Vahl. symb. 3. p. 56. Hab. in India orientali. ♀

31. *Senna*, fol. sejugis subovatis, petiolis eglandulatis, legum. reniformibus. Hab. in Aegypto. ☉

32. *orientalis*, fol. 5-jugis lanceolatis aequalib., gland. supra basi petiolorum. Cassia lanceolata. Forsk. Aegypt. 85. n.º 58. Lam. enc. 1. 646. Cassia orientalis. Tabern. ic. 507. *Senna alexandrina*, fol. 4-jugis lanceolatis acutis. Mill. Hab. in Oriente. Legum. arcato. Cum priore confusa; videtur *Senna vera* officinarum. Saltem antecedente multo efficacior est.

33. *ruscifolia*, fol. subsejugis ovato-lanceolatis glabris, glandula ad petioli basin, tomento compresso marginato. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 71. Collect. 1. p. 43. Hab. in Maderae rupibus. ♀

34. *biflora*, fol. 6-jugis oblongiusculis glabris, inferioribus minoribus, glandula subulata inter infima, pedicellis subbifloris. L. Hort. cliff. 159. Plum. spec. 18. ic. 78. f. 1. Hab. in America. ♀

35. *chinensis*, fol. pinnatis ex quatuor ad septem parib., foliol. lanceolatis, gland. supra basin costae, legum. transversim costato. Jacq. ic. rar. 1. t. 73. Collect. 1. p. 64. Hab. prope Peking in China. ♀

36. *multiglandulosa*, fol. 6-jugis ovali-oblongis obtusis pilosis, exterioribus majoribus, gland. subulatis omnium parium, siliquis linearibus. Ait. Kew. a. p. 52. Jacq. ic. rar. 1. t. 72. Collect. 1. p. 62. Hab. in ins. Teneriffa. ♀

37. *hirsuta*, fol. 6-jugis late-ovatis acuminatis lanatis. Linn. suppl. 231. Hab. in America.

38. *glauca*, fol. 6-jugis, foliol. ovatis infra glaucis et venosis, gland. oblongis pluribus, legum. linearibus rostris compressis et mucronatis. Lam. enc. 1. p. 647. Rheed. 6. p. 17. t. 9. et 10. Hab. in Pondichery.

39. *tomentosa*, fol. 6-8-jugis, foliol. oblongo ovatis, basi obliquis mucronatis subtus tomentosis, gland. pluribus subulatis, racemis axillaribus, legum. tomentos. Lam. l. c. et Lin. suppl. p. 231? Rami quoque flavo-tomentosi. Hab. in Brasilia.

β? *albida*, fol. 2-7-jugis, oblique ovalibus sericeis, gland. subulatis, pedunc. subquadrifloris, legum. obsolete 4-gonis hirsutis. Ortega. dec. p. 92. Hab. in N. Hispania.

40. *serpens*, fol. 7-jugis, flor. pentandris, caul. filiformibus prostratis herbaceis. L. Hab. in Jamaicae pascuis aridis. ☉

41. *mexicana*, fol. 7-jugis, foliol. obtusiusculis pubescentibus ciliatis, glandula cylindrica inter infima. Willd. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 41. t. 203. Habitat in Mexico.

42. *angustifolia*, fol. 7-jugis lanceolatis, extimis majoribus, petiolis eglandulatis, caule fruticoso. Vahl. symb. 1. p. 29. Hab. in Arabia. A. C. Senna differt legum. non curvatis. V. h

43. *ligustrina*, fol. 7-jugis lanceolatis, extimis minoribus, glandula baseos petiolorum. L. Dill. elih. 350. t. 259. f. 338. Hab. in Virginia, Bahama. h

44. *florida*, fol. 7-jugis ovali-oblongis glabris emarginatis eglandulosis, flor. racemosis, bract. spathulatis mucronatis. Vahl. symb. 3. p. 57. Hab. in India orient.

45. *stipulacea*, fol. sub-8-jugis ovato-lanceolatis, glandula inter inferiora, stipul. ovatis maximis. Ait. Kew. 2. p. 52. Frut. peruv. 3. p. 56. t. 42. Hab. in Chili. h

46. *alata*, fol. 8-jugis obovati-oblongis, exterioribus minoribus, petiolis eglandulatis, stipulis patulis. L. Veget. 328. Swartz. obs. C. *herpetica*, Jacq. obs. 2. p. 24. t. 45. f. 2. Rumph. 7. t. 8. Legum. margine crenato-membranaceo. Fol. magna emarginata. Hab. in Amer. calidiore. E

47. *siamea*, fol. 8-9-jugis ovato-oblongis obtusis glabris, petiol. eglandulatis, corymb. pedunculatis axillaribus terminalibusque. Lam. enc. 1. p. 548. Hab. prope Siam. Comm. Legum. planum marginatum. †

48. *marilandica*, fol. 8-jugis ovato-oblongis aequalibus, glandula baseos petiolorum, flor. spicato-paniculatis. L. Dill. elih. 351. t. 250. f. 339. Hab. in Amer. boreali. Legum. lineare arcuatum.

49. *fastigiata*, fol. 9-jugis oblongis gla-

bris, gland. pedicellata inter omnia foliola, flor. racemosis. Vahl. symb. 3. p. 57. Hab. in India. h

50. *frondosa*, fol. 9-jugis ovali-oblongis glabris obtusiusculis, glandula cylindrica inter inferiora, petiola basi eglandul. Ait. Kew. 2. p. 35. C. *crista*, Jacq. ic. rar. t. 74. Collect. 1. p. 82. Hab. in India occidentali. h

51. *tenuissima*, fol. 9-jugis oblongis, glandula subulata inter infima. L. Hab. in Havana. h

52. *virgata*, fol. 10-jugis ovato-lanceolatis villosis, glandula petiolaris pedicellata, pedunc. unifloris foliolis longioribus. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 728.

53. *angustisiliqua*, fol. 10-jugis ovato-oblongis acutis aristatis, gland. pedicellata inter infima, legum. angustis et compressis. L. l. c. p. 649. Burm. amer. t. 78. f. 2. Hab. in America australiore. Flor. magni, racemosi. h

54. *sophera*, fol. 10-jugis lanceolatis, glandula baseos oblonga. L. Burm. zeyl. 213. t. 98. Rumph. 5. t. 97. f. 1. Reed. 2. t. 52. Hab. in India umbrosis. Cor. albedo-flavescentis venis fuscis. Legum. subfalcatum, lineare.

55. *bracteata*, fol. 10-jugis oblongis obtusis eglandulatis, racemosis elongatis, bract. magnis ovatis tumidis imbricatis, legumine quadrangulati compresso. Lin. suppl. 232. Hab. in Surinamo. Fol. petalis. Racem. maximus. Bract. magnae imbricatæ nervosae, caducae. L.

56. *auriculata*, fol. 12-jugis obtusis mucronatis, glandulis subulatis pluribus, stipulis reniformibus herbatis. L. Pluk. alm. 341. t. 314. f. 4. Hab. in India.

57. *brevifolia*, ramosissima subglabra, fol. 12-jugis obovatis, pedunc. lateralibus unifloris, fol. longioribus. Lam. encycl. 1. p. 652. Hab. in Malagascar. Commers. Fol. minutissima, approximata. h

58. *angustissima*, fol. multijugis, foliol. perexiguis aristatis tomentosis, stipul. lanceolato-setaceis, pedunc. bipartitis, caul. hirsuto. Lam. l. c. p. 651. Hab. in ins. Java. Commers.

59. *niaricans*, fol. 14-jugis lineari-oblongis obtusissimis mucronatis, glandula baseos sessili. Vahl. symb. 1. p. 30. Hab. in Arabia felici. h

60. *polyphylla*, fol. multijugis, foliol.

ellipticis obtusis ciliatis, glandula oblonga, sessili inter infima, pedunc. subbifloris. Willd. p. 527. Jacq. ic. rar. 3. t. 460. Collect. 4. p. 104. Hab. in insula Portorico. h

61. *Chamaecrista*, fol. multijugis, glandula petiolari subpedicellata, stipulis ensiformibus. Hab. in Jamaica, Barbados, Virginia. Flor. subgemini. Fol. pennaeformia. Petala 2-superiora macula purpurea. Legum. pubesc.

62. *glandulosa*, fol. multijugis multiglandulatis, stipulis subulatis. L. Breyn. cent. 64. t. 24. Hab. in Jamaica, Guadeloupe. Flor. hexandri, anth. 2-longissimis. L.

63. *mimosoides*, fol. multijugis linearibus: glandula baseos petiolorum obsoleta, stipulis setaceis. L. Hab. in Zeylona. Stip. lanceolatae, seta terminatae. Stam. 2, quorum 7 cum antheris oblongis. Legumina linearia. L.

64. *fasciculata*, glabrescens, fol. subjugis, gland. sessili, fascic. multifloris, legum. glabellis arcuatis adscendentibus. Michaux. Flor. 1. p. 262.

65. *microphylla*, fol. multijugis linearibus mucronatis, gland. inter infima, stipulis lanceolatis mucronatis, pedunc. solitariis unifloris, caule ramoso virgato. Willd. p. 529. Hab. in ins. St.-Crucis. Loment. compressum, lineare, affinis praecedenti, W. +

66. *pumila*, fol. multijugis, basi ciliatis mucronatis, gland. petiolari pedicellata, caul. ramosissimo hirsuto. Lam. l. c. p. 651. Pluk. alm. 251. t. 120. f. 1. Hab. in Ind. orient. Flor. minimi. Legum. compressum, subvillosum.

67. *flexuosa*, fol. multijugis, stipul. dimidiato-cordatis. L. Breyn. cent. 65. t. 23. Hab. in Brasilia. ☉

68. *capensis*, fol. multijugis, foliol. linearibus, caule flexuoso-erecto villosulo. Thunb. prod. 79. Hab. ad Cap. b. apet.

69. *nicticans*, tota pubescens, fol. multijugis, flor. pentandris, caule erectiusculo. Pluk. alm. 341. t. 314. f. 5. Rumph. 6. t. Gr. f. 1. Hab. in Ind. bor. Flor. minuti, immaculati. ☉

70. *procumbens*, fol. multijugis eglandulatis, caule filiformi procumbente. L. Roth. Catal. 2. p. 43. Comm. petrop. t. 11. Pet. sic. 243. Hab. in Indiis, apricis siccis. Stam. 10, glandula in fol. aetate evanescit. Roth. ☉

1015. *CATHARTOCARPUS*. Cal. 5-partitus, deciduus. Cor. regularis, 5-petala. Filam. inferiora arcuata. Legum. longum, teres, lignosum, pluriloculare: loculis pulpa farctis.

1. *Fistula*, fol. 5-jugis ovatis acuminatis, petiolis eglandulosis, petalis planis ovatis, Cassia *fistula*. Lin. Gaertn. de Fr. 2. p. 313. Lam. ill. t. 332. Rumph. 2. t. 21. Hab. in India, Aegypto et America. Arb. magna, Juglandem referens, flor. pulchros proferit.

Obs. Usus fructus ejusque pulpae notissimus, unde nomen huic generi a reliquis Cassiis diverso inditum.

2. *Bacillus*, fol. 2-jugis ovatis obliquis, glandula inter infima. Gaertn. l. c. Houst. Reliq. t. 17. Cassia bacillaris. Lin. Suppl. p. 231. Willd. Sp. II. p. 514. Hab. in Surinamo. Frut. 12-pedal. Racem. axillares. Legum subcurvum, acum., filiformi terminatum. L.

3. *grandis*, fol. 20-jugis oblongis obtusis, subholosericeis eglandulatis. Lin. Suppl. p. 230, sub Cassia. Cassia *brasiliensis*. Lam. enc. t. p. 649-650. C. *mollis* Vahl. Willd. p. 526. Breyn. cent. t. 21. Hab. in Surinamo, Brasilia et St.-Domingo. Arbor robusta, legum. 1-semi-pedale, ultra unc. latum, superne canaliculatum, venis prominulis, pulpa ingrata, amara. L.

4. *javanicus*, fol. 12-15-jugis, foliolis ovatis obtusis glabris, legum. subcylindricis longissimis. Lam. l. c. sub Cassia. Vahl. symb. 3. p. 58. Willd. Sp. II. p. 527. Comm. hort. 1. p. 217. t. III. C. *Fistula sylvestris*. Rumph. Amh. 2. p. 88. t. 22. Hab. in Java et in ins. Moluccens. Fruct. pulpa molli destitutus dicitur. Fol. eglandulosa, basi obliqua. V.

1016. *PARKINSONIA*. Cal. 5-fidus. Petala 5, plana, ovata: superiore ovato-subrotundo, ungue erecto longissimo. Legum. torosum.

1. *aculeata*. Lin. Lam. ill. t. 336. Jacq. amer. Ed. pict. t. 129. Hab. in Amer. calidiore. Arb. 12-petalis, elegantissima. Fol. rachis compressa, lata, cui adhaerent foliol. minutissima.

1017. *TACHIA*. Cal. turbinatus, 5-partitus. Cor. 5-petala, subaequalis. Stam. calyci inserta,

longa, omnia foecunda, tria superiora breviora. *Legumen*.

1. *paniculata*, fol. pinnatis, foliol. oppositis. Cubaea. Schreb. Willd. p. 530. Tachigali paniculata. Aubl. guj. t. p. 372. t. 143. f. 1. Lam. ill. t. 339. Hab. in sylvis Gujanæ cum sequente. *h*

2. *trigona*, fol. pinnatis, foliol. alternis. Aubl. t. p. 374. t. 143. f. 2. Praecedentis varietas?

Obs. Nomen Cubaea cum Cobaea nimis est consonum, ut assumi possit.

1018. CÆSALPINIA. *Cal.* 5-partitus, lacinia infima majori subfornicata. *Petala* 5. *Stam.* basi lanata, omnia foecunda. *Legum.* compressum.

* *Inermis.*

1. *elata*, inermis, foliol. linearib. obtusis cum acumine. corymbis compositis, calycibus coriaceis tomentosis, petalis fimbriatis, *stam.* longissimis. Swartz l. c. Hab. in India. Filam. atropurpurea, basi villosa.

2. *coriaria*, inermis, foliol. linearibus obtusis, racemis paniculatis, calycibus glabris, staminib. corolla duplo longioribus. Willd. p. 532. Poinciana coriaria. Jacq. amer. 133. t. 175. f. 36. Ed. pict. 250. f. 35. Hab. in maritim. Curacao et Carthagenæ. *h*

Obs. Legum. matura ab incolis, quibus *Libidibi* audiunt, ad condensenda curia adhibentur. *J.*

3. *brasiliensis*, inermis, foliol. ovato-oblongis, rachidibus pubescentibus, calycibus tomentosis, staminibus corolla brevioribus. Swartz. Hab. in Carolina, Jamaica, et Brasilia. *h*

* * *Aculeatae.*

4. *bahamensis*, ramis aculeatis, foliol. obovatis emarginatis, flor. albidis. Lam. enc. t. p. 461. Catesb. Carol. 2. p. 51. t. 51. Hab. in ins. Bahama et Jamaica. Fol. duplicato-pinnata.

5. *vesicaria*, caule aculeato, fol. obcordatis subrotundis, racem. apicatis. Lam. enc. t. p. 461. Lin. Sp. pl. p. 545. *C. bijuga*. Swartz. Willd. Sp. II. p. 530. Poinciana bijuga. Lin. Sloan. hist. 2. p. 50. t. 181. f. 2, 3. Pluk. t. 167. f. 4. Hab. in Jamaica. Legum. nigra, sulcata. *h*

6. *pulcherrima*, aculeata, foliol. ob-

longo-ovalibus emarginatis, calycibusque glabris, corymbis simplicibus, petalis fimbriatis, staminib. longissimis. Swartz. obs. p. 166. Poinciana pulcherrima. L. Jacq. amer. 122. et ed. pict. t. 120. Lam. ill. t. 333. Hab. in Indiis. Flor. speciosi, e croceo et coccineo variegati, aut solum crocei. Stam. longissima incurva. Frutex 12-pedalis.

7. *echinata*, caule ramisque aculeatis, foliol. ovatis obtusis, leguminib. echinatis. Lam. enc. t. p. 461. Pseudo-Santalum rubrum. s. arbor Brasilia. Bauh. pin. p. 393. Hab. in Brasilia. Arb. grandis (*Bois de Bresil*), cujus lignum tincturae communi rubrae inservit. *h*

8. *Sappan*, caule aculeato, foliol. oblongis, inaequaliteralibus (obliquis) emarginatis. Roxb. corom. t. p. 17. t. 16. Lam. ill. t. 335. f. 1. Lignum Seppan. Rumph. 4. t. 21. Rheed. 6. t. 2. Hab. in Indiis. Arb. 10-15-pedalis, cujus lignum coctum tincturam praebet, primo nigram, sed, alumine admixto, amoene rubram.

9. *Crista*, aculeata, foliol. ovalibus, racem. simplicibus, petalis ovatis, calyce glabro brevioribus, staminibus calyce longioribus. Swartz. l. c. Plum. gen. t. 68. Hab. in Jamaica. *h*

10. *mimosoides*, caule petiolis pedunculisque aculeatis, foliol. oblongis obtusis parvis, leguminibus lanuginosis. Lamarck. enc. t. p. 462. Ej. ill. t. 335. f. 2. Rheed. 6. t. 8. Hab. in India. Est sensitiva ut nonnullae Mimosae. Racem. hispidulus. Flor. magni, flavi. *L.*

1019. HOFFMANSEGGIA. *Cal.* 5-partitus, persistens. *Petala* 5, unguiculata patentia, superiore latiore, basi glandulosa. *Filam.* pilosoglandulosa. *Stigm.* clavatum. *Legumen* lineare, compressum, polyspermum. (Petioli axillis glandulis pedicellatis.)

1. *falcaria*, caul. suffruticoso decumbente, fol. bipinnatis, pinnul. ovatis glaucis. Cav. ic. 4. p. 64. t. 392. Larrea glauca. Orteg. Hab. in montibus altis Amer. meridionali. Legum. arcuatum.

2. *trifoliata*, subcaulis, petiolis radicalibus trifoliatis, fol. pinnatis. Cav. l. c. p. 65. t. 393. f. 1. Hab. in Amer. meridion. acidis. Legum. rectum, villosum.

1020. POMARIA. *Cal.* turbinatus, 5-partitus, caducus. *Petala* 5, sub-

unguiculata : superiore concavo brevior. *Filam.* inferne hirsuta. *Stigm.* capitatum. *Legum.* 1-loculare, dispermum.

1. *glandulosa*, caule fruticoso, fol. tota glandulis nigri obsita. Cav. ic. 5. p. 2. t. 402. Hab. in N. Hispania. Fol. bipinnata, alternata. Flor. racemosi, lutei. h

1021. *ZUCCAGNIA*. *Cal.* persistens, 5-partitus. *Petala* 5, ovata : superiore concavo. *Filam.* inferne pilosa. *Stigm.* infundibuliforme. *Legum.* subovatam compressum, 1-loculare, 1-spermum.

1. *punctata*, fol. pinnatis, pinnul. ellipticis alternis punctatis glutinosi, flor. racemosi terminalibus. Cav. ic. 5. p. 2. t. 403. Hab. in montib. chilensibus. *Legum.* crinitum. h

Obs. An tria hæc Caranillesii genera, inter se et priori nimis affinia, potius in unum conjungi debent?

1022. *GUILANDINA*. *Cal.* 1-phyllus, hypocrateriformis. *Petala* calycis collo inserta, subæqualia. *Legumen* subrhomboideum, 1-loculare. *Sem.* dnra.

1. *Bonduc*, aculeata, pinnis ovatis, foliol. aculeis solitariis. L. Lam. enc. 1. p. 434. et ill. t. 336. Rumph. 5. t. 48. Hab. in Indiis. h

2. *Bonduccella*, aculeata, pinnis oblongo-ovatis, foliol. aculeis geminis. L. Lam. l. c. Rumph. 5. t. 49. f. 1. Rheed. 2. t. 22. Hab. in Indiis. h

3. *Nuga*, caule inermi, fol. petiolo primario subtus aculeis geminis. L. Rumph. 5. t. 50. Hab. in Amboina. +

4. *paniculata*, ramis petiolisque aculeatis, florib. paniculatis ebracteatis, leguminibus monospermis lævib. Lam. enc. 435. Rheed. 6. t. 19. Hab. in Malabar et N. Hibernia. h

5. *axillaris*, aculeata, fol. pinnatis, flor. axillaribus subsolitariis, leguminibus monospermis villosis. Lam. l. c. Rheed. 6. t. 20. Hab. in India.

1023. *MORINGA*. *Cal.* 5-partitus. *Petala* calyci inserta, inæqualia. *Capr.* longissima, 3-valvis. *Semina* alata.

1. *zeylanica*, flor. semidecandris, fol.

subbipinnatis, foliol. inferioribus ternatis, leguminibus trigonis. Willd. Sp. II. p. 536, et Vahl. symb. 1. p. 30. Sub nomine generico *Hyperanthera* utriusque species. M. *oleifera*. Lamarck. enc. 1. p. 398, et ej. ill. gen. t. 337. Jacq. ic. rar. 3. t. 461. Collect. 2. p. 371. Rumph. 1. t. 74, 75. Hab. in Zeylona, America et Agypto, locis arenosis. Arb. cujus radix et legum. comeduntur. Oleum ex seminib. expressum non rancidum fit. *Legum.* longissimum, trigetrum. h

2. *arabica*, florib. semidecandris, fol. bipinnatis, apice simpliciter pinnatis. Vahl. symb. 1. p. 30. (*Hyper.* semidecandria.) *Gymnocladus arabica*. Lam. enc. 1. p. 733. Hol. in Arabia. *Stam.* s. fertilia, caps. cylindrica.

1024. *ADENANTHERA*. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Antheræ* apice exteriore glandulæ globosæ affixæ. *Legum.* membranaceum.

1. *pavonina*, fol. decompositis utrinque glabris, foliol. alternis. L. Willd. Sp. II. p. 550. Jacq. coll. 4. p. 212. t. 23. Lam. ill. t. 334. Hab. in Ind. h

2. *falcata*, fol. decompositis subius tomentosis. L. Rumph. 3. t. 111. Cum priore. h

3. *scandens*, fol. pinnatis bijugis, foliol. ovatis obliquis glabris, cirrhis terminalibus bifidis. Forst. prodr. n° 1117. Hab. in ius. Mallicollo. h

1025. *CADIA*. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, æqualia, obcordata. *Legumen* polyspermum.

1. *purpurea*. Forsk. descr. p. 90. L'Herit. in Magaz. encycl. 5. p. 29. Spaendonck tamarindifolia. Desfont. in Decad. philos. 7. p. 259. Hab. in Arabia felici. Fol. imparipinnata, foliol. numerosissimis. Cor. recens alba dein rosca.

1026. *PROSOPIS*. *Cal.* hemisphæricus, 4-dentatus. *Petala* 5, linearis-lanceolata, apice recurva. *Filamenta* petalor. basi adnata, capillacea. *Stigma* simplex. *Legumen* polyspermum, longum.

1. *spicigera*, L. Burm. ind. 102. t. 25. f. 3. Roxb. corom. 1. p. 45. t. 63. Lam. ill. t. 340. Hab. in India. Arb., ramis spinosis. Fol. alterna conjugata, foliol. pinnatis, sine impari. Flor. parvi. *Legum.* lineare teretiusculum, edule. R.

1027. EPFRUA. *Cal.* monophyllus, limbo 4-partito. *Petalum* 1, subrotundum, laterale basi convolutum. *Filam.* basi incrassata, barbata, 5-sterilia. *Legumen*.

1. *falcata*. Aubl. guj. 1. p. 369. t. 142. Lam. ill. 338. Panzera. Willd. Sp. pl. p. 540. Hab. in sylvis Gujanac ad ripas. Arb. 60-pedalis. Fol. pari-pinnata. Panic. e racemis simplicibus elongata.

1028. HEMATOXYLON. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Caps.* lanceolata, 1-ocularis, 3-valvis: valvis navicularibus.

1. *campechianum*. L. Lam. ill. t. 340. Willd. Sp. II. p. 547. Catesb. car. 3. p. 66. t. 66. Hab. in Campeche Americæ. Fol. abrupte pinnata, foliol. obcordatis, flor. spicati parvi. h

-1029. CRUDIA. *Cal.* monophyllus, limbo 4-fido. *Cor.* o. *Filamenta* basi dilatata. *Samara* subdisperma, orbiculata.

1. *spicata*, fol. pinnatis, foliol. oblongo-lanceolatis acuminatis. Willd. p. 539. Apaltona spicata. Aubl. guj. 1. p. 383. t. 147. Hab. in sylvis Gujanac. h

2. *aromatica*, fol. simplicibus ellipticis acuminatis. Willd. Touchiroa aromatica. Aubl. guj. 1. p. 385. t. 148. Lam. ill. t. 339. Hab. in sylvis Gujanac. Racemi axillares ut in præcedente, cui simillima. W

1030. DETARIUM. *Cal.* 4-fidus. *Petala* o. *Filam.* alterna breviora. *Drupa* orbiculata, mollis. *Nux* compressa, 1-sperma, fibris reticulata.

1. *senegalense*. Gmel. Syst. II. p. 700. Juss. gen. pl. p. 402. Arb. fol. alterna, impari-pinnata. Flor. racemosi. Hab. ad Senegal.

1031. COPAIFERA. *Cal.* o. *Petala* 4. *Legumen* ovatum. *Semen* 1, arillo ovato.

1. *officinatis*. L. Jacq. amer. Ed. pict. Lam. ill. t. 342. Hab. in Brasilia, Antillis. Fol. alterna, impari-pinnata. Arb.

1032. MYROXYLON. *Cal.* campanulatus, 5-dentatus. *Petala* 5, supremo reliquis majore. *Ger-*

men corolla longius. *Legumen* apice monospermum.

1. *peruiferum*, fol. abrupte pinnatis bi-jugis, foliol. suboppositis. Willd. p. 546. Lin. suppl. p. 233. Hern. mex. p. 51. cum ic. Hab. in America meridionali. Arbor pulcherrima, balsamum peruvianum præstat. Racemi axillares. Calyx viridi-canescens, cinctus extra orificium petalis antherisque albis, intra continens legumen viride, quod singularem faciem representat. L.

2. *pedicellatum*, fol. impari-pinnatis subquinquejugis, foliol. alternis, legumine pedicellato. Willd. Myrospermum pedicellatum, leguminibus pedicellatis. Lam. enc. 4. p. 191. illust. t. 341. f. 1. Hab. in Peru. h

3. *frutescens*, fol. impari-pinnatis septemjugis, foliol. alternis, legumine sessili. Willd. Myrosp. frutescens. Lam. l. c. f. 2. Jacq. amer. pict. t. 118. Hab. Carthagenæ. Frut. 8-10-pedalis. Cor. exalbido-rosea. Fruct. scatet balsamo ingrato et forti. J.

1033. SCHOTIA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, calyci inserta, lateribus invicem incumbentibus, clausa. *Legumen* pedicellatum.

1. *speciosa*. Jacq. ic. rar. 1. t. 75. Collect. 1. p. 93. Guajacum afrum, fol. multijugis acutis. L. Hab. in Senegal et ad Cap. b. sp. Fol. octojuga. Foliol. ovato-oblongo, perennia. Stipulae ramis adpressæ. Semina ab incolis comeduntur. h

1034. TOLUIFERA. *Cal.* 5-dentatus, campanulatus. *Petala* 5, infimo maximo, obcordato. *Styl.* nullus.

1. *balsamum*. Hab. in America.

РУТАОХАХ (gen. 1035-1042.) præcipue distinguuntur petal. 4-5, foliol. calycinis alternis, fructu supero lobato, s. pluricapsulari, et embryone plano in perispermio carnoso. Fol. sunt sæpius opposita, plerumque composita, nunc nuda, nunc stipulis donata. Nonnullæ odore forti resinoso distinctæ.

1035. GUAIACUM. *Cal.* 5-fidus, inæqualis. *Petala* 5, calyci inserta. *Caps.* angulata, 3 s. 5-ocularis.

1. *dubium*, fol. conjugatis oblongo-lan-

sciolatis obtusis. Forst. prod. n.º. 186. Willd. p. 558. Hab. in insula Tongatabu. h

2. *affetinale*, foliol. bijugis obtusis. L. Lam. ill. t. 342. Sloan. hist. 2. p. 133. t. 222. f. 3. Hab. in Hispaniola, Jamaica, Antill. Arb. ligno duro; caps. triangulares.

3. *sanctum*, foliol. multijugis obtusis. L. Blackw. t. 350. f. 3, 4. Comm. hort. p. 171. t. 88. Pluk. alm. 139. t. 95. f. 4. Hab. in Am. Caps. 4-angulares. Fol. sub-8-juga, ovato-oblonga mucronata. Lam. enc. 2. p. 615.

4. *verticale*, fol. subquinquejugis ovali-oblongis brevicauminatis, petal. verticalib. Orteg. Dec. p. 93. Hab. in N. Hispania. Ramosissimum: Pet. caerulea, unguib. contortis. Pericarp. turbinatum, pedicellatum. Sem. funiculo appensa. O.

1036. ZYGOPHYLLUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Filam. basi squamulosa: squamis germinem conniventibus. (Nectarium 10-phyllum. L.) Caps. ovato-pentagona, 5-locularis.

1. *simplex*, fol. simplicibus sessilibus cylindricis. L. Portulacoides. Forsk. flor. aegypt. p. 88. et ej. ic. t. 12. B. Hab. in Arabia.

2. *cordifolium*, fol. simplicibus oppositis sessilibus subrotundis. Ait. Kew. 2. p. 60. Lin. suppl. 232. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *Fabago*, fol. conjugatis petiolatis, foliol. obovatis, pedunc. erectis, calyce glabro, petalis indivisis, caule herbaceo. Willd. Sp. II. p. 560. Lam. ill. t. 345. f. 1. Hab. in Syria, Mauritania, Sibiria. Caps. prismaticeae. h

4. *foetidum*, fol. petiolatis, foliol. obovatis, flor. nutantibus, petalis reflexis incis. Schrad. et Wendl. sert. hannov. p. 17. t. 9. Ad Cap. b. sp. Pet. subaurantia basi purpurea. h

5. *retrofractum*, fol. conjugatis petiolatis, foliolis ovatis, caule fruticoso ramisque retrofractis. Thunb. prod. 80. Hab. ad Cap. b. spei. h An u priore diversum?

6. *maculatum*, fol. conjugatis petiolatis, fol. lineari-lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 60. Cum priore. Petala lutea, macula cordata rubra ad basin, omnium distincta.

7. *coccineum*, fol. conjugatis petiolatis, foliol. cylindricis carnosissimis laevibus. L. Z. desertorum. Forsk. chl. ic. t. 11. Shaw. afr. f. 231. Hab. in Africa, Sibiria.

8. *album*, fol. conjugat. petiolatis, foliol. clavatis carnosissimis arachnoideo-incanis. L. Lin. dec. 1. t. 8. Desf. atl. 1. p. 338. Forsk. it. t. XII. f. A. Hab. in Aegypto, Barbar. et Canariis. Procumbens cano-album. Petala lato-lanceolata.

9. *Morgana*, fol. conjugatis subpetiolatis, foliol. obovatis, caule fruticoso, caps. subtetraptera. Lam. enc. 2. p. 442. Burm. afr. 7. t. 3. f. 2. Dill. elth. t. 116. f. 141. Hab. ad Cap. b. spei, cum 5 sequentibus. Caulis articulatus. h

10. *capense*, fol. conjugatis sessilibus; foliol. obovatis, caule fruticoso. Lam. enc. 2. p. 443. Flor. rubris et fol. sessilibus a seq. differre dicitur. +

11. *microphyllum*, fol. conjugatis, subsessilibus, foliol. ovatis laevibus, caule fruticoso. Thunb. prod. 80. Foliol. ovalibus minutis, capsulis emarginatis. Lin. suppl. p. 232. Fol. subpetiolata. Petal. capillares solitarii. Petala flava. Caps. retusa. L.

12. *prostratum*, fol. conjugatis scabris, caul. decumbente, genicul. hirtis. Thunb. prod. app. p. 139.

13. *sessifolium*, fol. conjugat. sessilibus, foliol. lanceolato-ovalibus margine scabris, caule fruticoso. L. Dill. elth. t. 116. f. 142. Burm. afr. 4. t. f. 1. Petala crenata. h

14. *spinosa*, fol. conjugatis sessilibus, foliolis linearibus, carnosissimis supra planis, caule fruticoso. L. Burm. afr. 5. t. 2. Folia quaterna, linearia, carnosissima, supra plana, subtustere: uscula. Corollae nutantes, luteae. An a priore satis distinctum?

15. *aestuans*, fol. conjugatis sessilibus, foliol. obovatis retusis. L. Hab. in Surinamo. Caulis diffus. Stipulae quinque, reflexae. L.

16. *arboreum*, fol. pinnatis, caule arboreo. Jacq. amer. 130. t. 83. Ed. pict. t. 24. Hab. in Amer. calidiore. Arb. 40-pedalis, speciosissima, ejus lignum durum et sub terra sepultum non corrumpitur, et veluti in lapidem mutare fertur. J.

17. *lanatum*, fol. ternatis, foliol. subtus papillois; florib. pentagynis, caule flexuoso articulis lanato. Willd. Hab. in Sierra Leone. Foliola subrotunda mucronata. Pedunc. axillares. W. +

1037. FAGONIA. Cal. 5-phyllus. Petala 5, cordata. Caps. 5-locularis, 10-valvis: loculis 1-spermis. Sem. compressa.

1. *cretica*, spinosa, fol. ternatis, foliol.

lanc. L. Lam. ill. t. 346. Hab. in Creta, et in montib. prope Mascar. Desf. Caul. patens, dichotomus, nedoso-geniculatus.

2. *hispanica*, inermis. L. Mill. dict. Hab. in Hispania. Planta dubia, an var. prioris? ☉

3. *arabica*, spinosa, foliol. linearib. convexis subvillosis apic. brevioribus. L. Lam. enc. 2. p. 447. Hab. in Arabia et Barbaria. Facie Ulicis.

4. *indica*, fol. simplicibus ovalibus, spinis geminis. L. Burm. ind. 102. 34. f. 1. Hab. in Persia. †

1038. *TRIBULUS*. Cal. 5-partitus. Petala 5, patentia. Stylus 0. Caps. 5, gibbæ, plerumque spinosæ, polyspermae.

1. *maximus*, fol. subquadrangulis: exterioribus majoribus, pericarpis decaspermis natis. L. Jacq. ic. rar. 3. t. 462. Collect. 4. p. 110. Willd. p. 566. ill. t. 346. f. 2. Hab. in Jamaicae aridis.

2. *lanuginosus*, fol. subquinquejugis subaequalibus, seminibus licornibus. L. Burm. zeyl. 265. t. 106. f. 1. Hab. in Zeylous.

3. *terrestris*, foliol. sexjugatis subaequalibus, seminibus 4-cornibus. L. Lam. ill. t. 346. f. 1. Moris. 2. t. 8. f. 9. Hab. a semitis arva in Europ. australi et Barbaria. ☉

4. *cistoides*, foliol. octjugat. subaequalibus. L. Jacq. Schoenbr. 1. p. 54. t. 103. Coll. suppl. p. 109. Pluck. alm. t. 67. f. 4. Hab. in Amer. australiore. ☿

1039. *LARREA*. Cal. 5-phyllus, deciduus. Petala 5, unguiculata. Germen 5-sulcatum. Noces 5, 1-spermae.

1. *nitida*, caule fruticoso, fol. oppositis pinnatis nitidis, fructib. glabris. Cav. ic. 6. p. 40. t. 559. Hab. cum sequentib. in Amer. meridion. Flor. axillares, solitarii, luteo-virentes.

2. *divaricata*, fol. oppositis sessilib. bilobis lobis divaricatis. Cav. l. c. t. 560. f. 1. Fol. villosa. Stip. in tuberculum incrassatae.

3. *cuneifolia*, fol. oppositis subsessilib. cuneatis apice bilobis: setula inter lobulos prominente. Cav. l. c. p. 41. t. 560. f. 2. Fol. villosa.

1040. *DICTAMNUS*. Cal. 5-phyllus. Petala 5, patula. Filamenta punctis glandulosis adspersa. Caps. 5, coalitæ.

1. *Fraxinella*. α. *albus*. β. *purpureus*. Lam. ill. t. 344. Fraxin. Rencal spec. 122. t. 121. Hab. in Germania, Gallia, Italia. Flores ut plurimum purpurei. ☿

1041. *RUTA*. Cal. 4-5-partitus. Petala concava. Receptac. punctis melliferis decem cinctum. Caps. lobata. (Petala quibusdam 4 et Stam. 8.)

1. *graveolens*, fol. supradecompositis, foliol. oblongis, terminali obovato, petal. integerrimis. Willd. Sp. 2. p. 542. Lam. ill. 345. t. 1. Blackw. t. 7. Hab. in Europa australi, Alexandria, Mauritania. Flos primarius 5-fidus, reliqui quadrifidi.

2. *montana*, fol. supradecompositis, foliol. omnibus linearibus, petal. integerrimis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 57. R. tenuifolia. Desf. atl. 1. p. 336. R. leguina. Jacq. ic. rar. 1. t. 76. collect. 1. p. 74. Sylvestris. Mill. Thuill. paris. Hab. in collibus Helvetiae, Eur. austral. et Barbariae.

3. *chalepensis*, fol. supradecompositis, foliol. lanceolatis, petal. ciliato-dentatis. Hab. in Arabia. Simillima R. graveolenti. ♀

4. *angustifolia*, fol. inciso-pinnatifidis, laciniis linearibus cuneatis, flor. corymbosopatulis, petal. ciliatis. Mor. hist. 2. S. p. t. 35. f. 8? Hab. in ruderatis Monspeli. (Thiebaud.) R. montanae quoad fol. sub-similis.

5. *pinnata*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis, basi attenuatis serrato-crenatis, petal. integerrimis. Ait. Hab. in Canariis.

6. *patavina*, fol. ternatis, sessilibus linearibus integerrimis, basi attenuatis. Willd. Mich. N. gen. pl. 22. t. 19. Hab. prope Patavium. Petala plana, integra. ♀

7. *linifolia*, fol. simplicibus lanceolatis glabris, filamentis ciliatis, caule simplici herbaceo. Willd. Lam. ill. t. 345. f. 2. Barck. t. 1186. Hab. in Hispania, in rudera, et in agro Tuncano. ♀

8. *villosa*, fol. lanceolatis petiolatis cauleque villosis, petal. oblongis, filam. basi lanatis Tableau de la côte occid. de la mer Caspienne, n°. 15. R. fruticulosa. Delabillard. Willd. In Oriente. ☿

tuberculata,

6. *tuberculata*, fol. linear-lanceolatis, subtus caulibus, capsulisque tuberculatis. Forsk. arab. p. 86. Hab. in Aegypto. (Herb. Juss.) Caul. ramosissimus. h

10. *rosmarinifolia*, fol. linearib. subtus punctatis, caul. ramosissimo. Hab. in Hispania. Herb. Juss. Rad. fusiformis. T

1042. *ERIOSTEMON*. Cal. 5-partitus. Petala 5, sessilia. Filam. plana, ciliata. Anth. pedicellatae terminales. Stylus e basi germinis. Caps. 5, nectario toruloso insidentes. Sem. arillata.

1. *australasium*, fol. lanceolatis subrugosis. Smith. in Act. soc. Linn. v. 4. Hab. in Australasia. h

2. *capense*, fol. ovato-linearibus, subtus glandulosis. Dioscorina uniflora. L. Vid. hujus operis, p. 247. Hab. ad Cap. b. sp. h

1043. *CROWEA*. Cal. 5-partitus. Petal. 5, sessilia. Filam. plana subulata, pilis connexa. Anth. filam. adnatæ. Styl. e basi germinis. Caps. 5, coalitæ. Semina arillata.

3. *suligna*, fol. lanceolatis glabris, flor. axillarib. rubris. Andrew Repot. t. 79. C. *saligna*, caul. ramisque triquetris glabris, pl. alternis lanceolatis integerrimis flor. olitaris axillaribus. Vent. Hort. Malmaise. 7. Hab. in Australasia. h

1044. *QUASSIA*. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Nect. 5-phylhum. Drupæ 5, distantes, bivalves, monospermæ, receptaculo carnosio insertæ. (Flor. etiam monoici aut 5-andri.)

1. *amara*, flor. racemosis hermaphroditis, l. impari-pinnatis; foliol. oppositis sessibus, petiol. articul. alato. Lin. suppl. 235. Sm. ill. t. 343. f. 1. Hab. in Surinamo. utex nec arbor. W. Petiolus more citri utus.

Obs. Lignum Quassiae venale non ex hoc stice venit, sed ab excelsa, quæ minus rara. Vid. Willd. l. c.

1. *Simaruba*, flor. paniculatis monoicis, abrupte pinnatis, foliol. alternis subpatis, petiol. nudo. Lin. suppl. 234. Lam. t. 343. f. 2. *Simarouba amara*. Aubl. 2. p. 859. t. 331, 332. Hab. in locis

arenosis Amer. australioris. Cortex lætescens amarus. Panic. axillares amplæ. Drupæ ovatae, subnigrae, receptaculo carnosio lateraliter affixæ.

3. *excelsa*, flor. polygamis pentandria paniculatis. fol. impari-pinnatis, foliol. oppositis petiolatis, petiolo nudo. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 742. Hab. in submontosis Jamaicae et Caribaeorum. h

1045. *SIMABA*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Filam. basi dilatata, pilosa. Caps. 5, coriaceæ, 1-spermæ, receptaculo carnosio insertæ.

1. *guyanensis*. Aubl. guj. 1. p. 466. t. 153. *Zwingeria amara*. Willd. Sp. II. p. 569. Hab. in sylvis Gujanæ. Frut. octopedalis. Folia alterna impari-pinnata. Pedunculi triflori, axillares. Flor. albid. W.

1046. *GOMPHIA*. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Antheræ subsessiles. Drupæ 2 s. 5, monospermæ, receptaculo subrotundo, carnosio insertæ.

1. *angustifolia*, fol. lanceolat. extrorsum serratis, panicula terminali, petalis calyce longioribus. Vahl. symb. 2. p. 49. Willd. p. 570. Hab. in India orientali. h

2. *nitida*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis serratis, panicul. terminalib., calycib. corollæ aequalibus. Vahl. symb. 2. p. 49. Hab. in sylvis Jamaicae. h

3. *jabotapita*, racemis terminalib., petalis calyce triplo longioribus, drupis receptaculo immersis, foliis ovato-lanceolatis serratis. Willd. Ochna jabotapita. L. Plum. amer. 42. ic. 153.

4. *laevigata*, fol. lanceolatis obtusissimis, integerrimis emarginatis, panicula terminali. Vahl. l. c.

5. *laurifolia*, racem. terminalibus, drupis receptaculo superimpositis, fol. oblongis utrinque acuminatis integerrimis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 741. Hab. in montib. Jamaicae. h

1047. *THRYALLIS*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 3-coeca. Sem. mucronato-incurva.

1. *brasiliensis*. L. Marcgr. bras. 97. f. 3. Hab. in Brasilia. Ramis articulatis. Fol. opposita, ovata. Stipulae setaceæ. Flor. parvi lutei.

1048. CODON. *Cal.* 10-partitus.
Cor. campanulata, 10-fida. *Caps.*
bilocularis, polysperma.

1. *Royeni*. L. Hab. ad Cap. b. sp. *Fol.*
alterna, ovato-cordata.

1049. POTALIA. *Cal.* turbinatus,
5-partitus. *Cor.* 1-petala, 10-
fida. *Filam.* annulo nectarifero
inserta. *Bacca* sexsulcata, 3-
locularis, polysperma.

1. *amara*. Aubl. gujan. 1. p. 394. t. 15r.
Lam. ill. t. 348. Nicandra. Willd. II. p. 541.
Hab. in Guian. sylv. Corymb. pauciflorus.
Cor. alba. *Fr.*

Hesperidex Decandrae (gen. 1050-
1055).

1050. LIMONIA. *Cal.* 5-partitus.
Petala 5, *Bacca* 3-locularis.
Sem. solitaria.

* *Spinosa*.

1. *monophylla*, fol. simplicib., spinis
solitariis. L. Willd. p. 541. Roxb. Corom. 2.
p. 59. t. 83. Hab. in India orientali. Folia
oblonga-ovata. Pedunc. axillares. *h*

2. *trifoliata*, fol. ternatis, spinis gemi-
nis. L. Jacq. ic. rar. t. 463. Collect. 3. p. 176.
Andrew. t. 143. *Fr.* inermis, foliis sessilibus.
Willd. Sonnerat. it. p. 103. t. 63. Hab. in
India orientali. Flor. trifidi.

3. *acidissima*, fol. pinnatis, petiolis ala-
tis, spinis solitariis. L. Lam. enc. 3. p. 517.
Rump. 2. t. 43. Hab. in India. *h*

4. *crenulata*, foliol. bijugis oppositis,
petiol. alatis foliaceis. Roxb. l. c. Rheed. 4.
p. 31. t. 14. Hab. in oris Coromandelicis. *h*

* * *Inermes*.

5. *lucida*, inermis, fol. simplicibus,
pedunc. axillaribus. Forst. prod. n. 191.
Hab. in insula Mallicollo.

6. *mauritiana*, fol. subternatis, foliolis
ovatis integris subacuminatis, panic. axilla-
ribus. Lam. enc. 3. p. 517. Hab. in insula
Mauritii. Habitus Rhois. *h*

7. *arborea*, fol. alternis quinatis, foliol.
linearibus serratis laevibus. Roxb. l. c. Hab.
in Coromandelia.

8. *pentaphylla*, inermis, fol. subqui-
natis, ovatis integris. Retz, obs. 5. p. 34.

Roxb. l. c. p. 60. t. 84. Hab. in India. Racemi
breves compositi. *h*

9. *madagascarensis*, fol. pinnatis, fo-
liolis alternis subquaternis lanceolatis den-
tatis, panic. brevib. axillaribus. Lam. Hab.
in Madagascar. Khus refert.

10. *minuta*, inermis, fol. pinnatis, ra-
cemis corymbosis terminalibus. Forst. prod.
n. 190. Cresc. in ins. Amicorum. *h*

1051. FERONIA. *Cal.* 5-partitus,
planus. *Pet.* 5, oblonga. *Filam.*
basi dilatata, villosa, disco hy-
pogynio elevato inserta. *Bacca*
corticosa, multilocularis: locu-
larne spongiosa obvolutis.

1. *elephantum*. Roxb. corom. p. 21. t. 19r.
Correa in Act. Soc. Lin. 5. p. 224. Hab. in
Indiae sylvis et montosis.

1052. HEISTERIA. *Cal.* 5-fidus.
Petala 5. *Drupa cal.* colorato
maximo.

1. *coccinea*. Jacq. amer. 126. t. 8r. El.
pict. p. 64. t. 122. Hab. in Martinicae sylv.
ad torrentes.

1053. MURRAYA. *Cal.* 5-parti-
tus. *Cor.* 5-petala, campanulata.
Nect. germen cingens. *Bacca*
1-sperma.

1. *exotica*. Murr. comment. goett. 9.
p. 186. t. 1. Chalcas. Mant. p. 68. Burm. ind.
p. 104. Lam. ill. t. 352. Rumph. 5. t. 18. f. 2.
Hab. in India orientali. Fol. impari-pia-
nata. *h*

1054. KOOKIA. *Cal.* 5-dus, infe-
rus. *Cor.* 5-petala, aequalis,
infera. *Pomum* 5-loculare: lo-
culis 1-spermis.

1. *punctata*. Willd. Sp. II. 538. Jacq.
Schoenbr. 1. p. 53. t. 101. Lam. ill. t. 354.
Hab. in China. Arb. ramul. petiolisque ver-
rucoso-punctatis. Panic. divaricata. Fol. pin-
nata. *h*

1055. BERGERA. *Cal.* 5-partitus.
Cor. 5-petala. *Stigma* turbida-
tum. *Bacca* 2-sperma.

1. *Koenigii*. L. Roxb. Corom. 2. p. 9.
t. 112. Rumph. 1. p. 149. t. 53. f. 1. Hab.

in India orientali. Arb. Fol. alterna, pin-
natae. impari. Corymbi terminales.

1056. GÆRTNERA. *Cal.* 5-parti-
tus. *Cor.* 5-petala, lacero-ciliata.
Filam. basi sub cohærentia : uni-
cum reliquis longius. *Samara*
monosperma, quadrialata : alis
inæqualibus.

1. *racemosa*. Roxb. Corom. 1. p. 19. t. 18.
Molina *racemosa*. Cavan. Diss. 9. p. 435.
t. 263. Lam. ill. t. 349. Hiptage *Madablota*.
Gaert. sem. 2. p. 169. t. 116. Banisteria ben-
ghalensis. L. B. unicapsularis. Lam. enc. 1.
p. 36. Hab. in Ind. orient. h

1057. TRIGONIA. *Cal.* 6-partitus.
Petala 5, inæqualia : supremum
basi intus foveolatum. *Nectarium* :
squamæ 2, ad basin germinis.
Filam. quædam sterilia. *Caps.*
leguminosa, trigona, 3-locularis,
3-valvis.

1. *villosa*, fol. obovatis subtus tomen-
tosis. Vahl. Ecl. amer. 2. Aubl. gujan. p. 188.
t. 149. Lam. ill. t. 347. Hab. in Cajenna.

2. *laevis*, fol. oblongis utrinque glabris
nitidis. Vahl. l. c. Aubl. p. 390. t. 150. Hab.
in Gujana.

Obs. Cum Vahlis rectius ad Monodel-
phiam referendum est hoc genus.

1058. ADENOSTEMUM. *Cor.* 6-
petala. *Stamina* triplici serie,
gradatim minora. *Glandule* 2 ad
basim singuli filamenti. *Stigm.*
2-3. *Drupa* 1-locularis. *Nux* du-
rissima, 2-3-locularis. *Nuclei*
compressi.

1. *nitidum*, fol. oblongo-lanceolatis ni-
tidis. Syst. veg. Flor. peruv. et chil. p. 108.
Lucuma Keale. Molin. hist. chil. p. 202.
Hab. in R. Chil. nemorib. Arb. procera,
semperflorens. Fol. resinosa et fruct. sapi-
dissimi. Lignum ponderosum, venis pul-
cherrimis variegatum.

Obs. Auctores libri allegati hoc genus
Gomortexam nuncupant in honorem
G. Ortegæ, ad quem vero planta quædam
jam a Linnaeo denominata extat.

1059. GODOVIA. *Cal.* 5-phyllus,
coloratus. *Nectar.* cilia in 5-
series. *Anth.* poris geminis de-

hiscentes. *Caps.* 5-angularis.
Semina imbricata, alata.

1. *obovata*, fol. obovatis crenatis. Go-
doy. Syst. veg. Flor. Per. etc. p. 101. Cresc.
in Peruv. nemorib. Arb. pulchra, 2-ulnaris,
ligno durissimo.

2. *spathulata*, fol. spathulatis crenatis,
floribus polyanthis. L. c. p. 102. Arb. sta-
mina 40 fere. Lignum variis utensilibus in-
servit. h

MELTACKÆ. (Gen. 1060-1066.) Dignos-
cuntur petalis 4-5, ungue latiusculo et
stam. filamentis in urceolum, apice den-
tato-antheriferum (Nectarium. L.) coa-
lis. Genera illa hinc potius Monodelpha.
Stylo simplici. Fruct. est vel bacca aut
capsularis, quæ sæpe valde grandescit,
multilocularis. Fol. simplicia, aut com-
posita, exstipulacea.

1060. TREMANTHUS. *Cal.* cam-
panulatus, inferus. *Petala* revo-
luta, punctata. *Nect.* tubulosum.
Anth. post dehiscentiam punctis
setaceo-stellatis asperæ. *Drupa*
obovata. (*Foveolaria*. Ruiz et
Pavon. *Strigilia*. Cavan.)

1. *cordata*, fol. cordato-ovatis acutis
(subtus helvolis), foveolis glanduliferis.
Syst. veg. Flor. peruv. et chilens. p. 99.
Sub Foveolaria utique sequentes. Hab. in Peruv.
nemorib. Arb. procera.

2. *ovata*, fol. ovato-oblongis acuminatis
glabris, foveol. minimis glanduliferis. Syst.
veg. l. c. p. 100. Cum priore Arb. excelsa.

3. *oblonga*, fol. oblongis acuminatis gla-
bris, racem. 1-2-nis erectis. Syst. veg. l. c.
Arbor 30-ulnaris.

Obs. Fol. in tribus hisce speciebus foveol.
glanduliferis sunt instructa.

4. *ferruginea*, fol. oblongis brevi-acu-
minatis subtus lanuginosis glandulatis,
racemis solitariis erectis. L. c. Hab. in
nemoribus alius trigilis. Lanugo duplex,
stellato-penisilliformis, exterior ferruginea
decidua, interior alba.

Obs. *Strigilia racemosa*. Cav. diss. 7. p. 353.
t. 201. Willd. Sp. II. p. 351, eadem ac ul-
tima species videtur.

1061. QUIVISIA. *Cal.* 4-5-dentatus.

Cor. 4-5-petala. *Nectar.* cylindricum, truncatum. *Antherae* margini nectarii insertae. *Caps.* 4-locularis: loculis submonospermis.

1. *racemosa*, *decandra*, fol. alternis oblongis integris utrinque attenuatis racemis axillaribus. Gilibertia *decandra*. Willd. Sp. II. p. 551. *Decandra*. Cavan. diss. 7. p. 367. t. 211. Hab. in insula Mauritiu. h

2. *ovata*, fol. alternis-obovatis obtusis integris, pedunculis unifloris axillaribus, fructibus tomentosis. Willd. Cavan. diss. 7. p. 368. t. 212. Hab. in ins. Borbonia. h

3. *heterophylla*, fol. ovatis integris aut sinuato-pinnatifidis, floribus axillarib. binis. Cav. l. c. t. 213. f. 1. 2. *Quercifolia*. Cum priore.

4. *oppositifolia*, fol. oppositis ovatis integerrimis glabris, flor. axillarib., pedunc. trifloris. Cavan. diss. 7. p. 369. t. 214. Hab. in insula Mauritiu. h

1062. TRICHILIA. *Cal.* sub-5-dentatus. *Petala* 5. *Nectarium* dentatum, cylindricum, in apice dentium *Antheras* gerens. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis. *Semina* baccata.

1. *hirta*, fol. pinnatis, foliol. pauciorib. ellipticis acuminatis glabris, racemis confertis. Swartz. obs. p. 171. Willd. Sp. II. p. 552. Sloan. hist. 2. t. 220. f. 1. Hab. in Jamaica. h

2. *spondioides*, fol. impari-pinnatis subhirsutis; foliol. numerosis, inferiorib. majoribus, racemis axillaribus. Swartz Fl. ind. occid. 2. p. 710. Jacq. Schoenb. 1. p. 54. t. 122. Sloan. hist. 2. p. 103. t. 210. Cum priore. Hab. in sylvaticis montosis Amer. calidior. h

3. *emetica*, fol. pinnatis subtus villosis, foliol. ellipticis. Vahl. symb. 1. p. 31. Hab. in montib. Arabiae felicis. h

4. *glabra*, fol. pinnatis glabris, foliolis extimis majoribus. L. T. havanensis. Jacq. amer. 129. n°. 2. t. 175. f. 38. Hab. in Havanae sylvis montosis. h

5. *pallidum*, fol. impari-pinnatis membranaceis, racemis axillaribus terminalibusque, flor. octandris, caps. bivalvibus. Sw. Fl. ind. occ. 2. p. 713. *Portesia ovata*. Cav. diss. 7. p. 369. t. 215. Lam. ill. t. 302. f. 1. Hab. in fruticetis montosis Hispaniolae. h

6. *capensis*, fol. impari-pinnatis marginibus undulatis, panic. axillaribus. Ekebergia *capensis*. Thunb. Willd. Sp. II. p. 549. Lam. ill. t. 358. Hab. in Cap. bon. sp. h

7. *moschata*, fol. alternim pinnatis, racemis axillaribus, florib. subdecandris monopetalis, caps. monospermis. Swartz 1. l. c. p. 735. Hab. in Jam. borealis sylvis. h

8. *spectabilis*, fol. pinnatis, foliol. obovatis, racemis axillaribus compositis. Forst. prod. n°. 188. Hab. in Nova Zeelandia. h

9. *alliacea*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis acutis, racemis axillaribus supradecompositis. Forst. prod. n°. 189. Hab. in insula Namoka. h

10. *heterophylla*, fol. pinnatis ternatisque, foliol. ovatis acuminatis, racemis axillaribus octandris. W. *Portesia mucronata*. Cavan. diss. 7. p. 370. t. 216. Lam. l. c. f. 2. Hab. in Madagascar. h

11. *trifoliata*, fol. ternatis, foliol. obovatis nitidis. Vahl. symb. 1. p. 31. Jacq. amer. 129. t. 82. Ed. pict. t. 123. Hab. in Amer. merid. h

12. *nervosa*, fol. ternatis, foliol. ovatis. Vahl. l. c. Hab. in Java. h

13 ? *spinosa*, fol. simplicibus ovatis emarginatis, ramis spinosis. Willd. p. 554. T. *virens*. Hellenius in Act. holm. 1788. p. 294. t. 10. f. 1. Hab. in India. Bacca tri-locularis. Medium tenet inter *Trichiliam* et *Limoniam*. W.

1063. TURRÆA. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* longum, cylindricum, ore inter dentes *antheras* gerens. *Caps.* 5-coccos. *Semina* bina.

1. *virens*, fol. elliptico-lanceolatis emarginatis glaberrimis, calycib. fructibusque sericeo-villosis. Willd. Sp. II. p. 555. Hab. in Ind. orientali. Arb. flor. laterales, congesti in spicam minimam. An diversa a *Quivisia decandra*? +

2. *pubescens*, fol. ovatis emarginatis subtus pubescentibus, calycibus villosis. Willd. Hellen. in Act. holm. 1788. p. 269. t. 10. f. 3. Hab. in ins. Hainam. Fructus ignotus. h

3. *maculata*, fol. ovatis acutis-glabris, calycib. ciliatis. Willd. Smith. ic. ined. 1. p. 11. t. 11. T. *glabra*. Cav. diss. 7. p. 360. t. 204. Hab. in Madagascar, cum a sequentibus. h

4. *sericea*, fol. ovatis obtusiuscul. utrinque tomentosis, calycib. peduncul. petalisque villosis. Willd. Smith. ic. ined. p. 12 t. 12. T. tomentosa. Cavan. l. c. p. 361. t. 265. f. 2.

5. *lanceolata*, fol. lanceolatis utrinque rotundilobis glabris, lacinii calycinis longissimis lanceolatis. Willd. Cav. l. c. t. 205. f. 1.

1064. SANDORICUM. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindricum, truncatum, ore *antheras* gereus. *Drupa* magna, nucibus 5-freta.

1. *indicum*. Cav. diss. 7. p. 357. t. 202 et 203. Lam. enc. 3. p. 69. ill. t. 350. Hab. in Philippinis et Moluccis. Arb. centro rubro. Fol. ternata. Panic. axillaris. Affine Trichiliae nervosae. W. h

1065. SWIETENIA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindricum, ore *antheras* gereus. *Caps.* 3-5-locularis, lignosa, magna, 3-5-valvis. *Sem.* imbricata, alata.

1. *Mahagoni*, fol. pinnatis subquadrijugis, foliol. ovato-lanceolatis basi aequalibus, paniculis axillaribus. Willd. Sp. II. p. 557. Cavan. diss. 7. p. 365. t. 209. Jacq. amer. 127. Ed. pictat. etc. Catesb. car. 2. p. 81. t. 81. Hab. in Amer. meridionali, in petrosis. *Caps.* basi dehiscens. Arb. magna, cujus lignum est illud Mahagone, s. Acajou.

2. *febrifuga*, fol. pinnatis subquadrijugis, foliol. elliptico-subrotundis emarginatis, basi inaequalibus, panicula terminali divaricata. Willd. Roxb. Corom. 1. p. 18. t. 17. In montibus Indiae orientalis. h

3. *Chloroxylon*, fol. pinnatis multijugis, foliol. dimidiato-cordatis obtusis, panicula terminali patent. Willd. Roxb. l. c. t. p. 46. t. 64. Hab. cum priore. *Caps.* apice dehiscens. R. h

4? *senegalensis*, octandra, fol. abrupte pinnatis subtrijugis, fructu quadrivalvi. Desrouss. in Enc. bot. 4. p. 679. Hab. in Senegal. Fruct. pomiformis, recept. centrali 4-gono. h

1066. MELIA. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindraceum, dentatum, fauce *antheras* gereus. *Drupa* nuce quinqueloculari.

1. *Azedarach*, fol. bipinnatis, foliolis lacribus ovatis dentatis. Willd. p. 658. Cav.

diss. 7. p. 363. t. 207. Lam. ill. t. 352. Hb. 1. in Syria, Zeylona, et Eur. austr. Pulpafructus venenata est.

2. *sempervirens*, fol. bipinnatis, foliol. rugosiusculis subseptenis. Swartz. Flor. 2. p. 737. Comm. hort. t. 176. Hab. ad sepes in Jamaica. Priore minor.

3. *composita*, fol. pinnatis, foliol. infimis ternatis, flor. tomentosis. Willd. Sp. II. p. 559. Hab. in Ind. Ramul. nigricantes, juniores tomentosi. Fruct. ignotus. †

4. *Azadriachta*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis acuminatis sublaetatis. Cav. Desf. 7. p. 364. t. 208. Burm. zeyl. t. 15. Rheed. 4. t. 52. Hab. in India. Arb. sempervirens. Flor. pallidi.

1067. MONOTROPA. *Cal.* 0. *Petala* 10, horum 5 exteriora basi excavato-mellifera. *Caps.* 5-valvis.

1. *Hypopithys*, florib. glabris lateralibus octandris. L. Flor. dan. t. 232. Hab. in sylvis, umbrosis, etiam in Amer., quae minor.

2. *lanuginosa*, caul. spicifloro, bract. floribusque lanuginosis. Mich. Flor. 1. p. 206. Hab. in sylv. Carol.

3. *Morisoni*, caul. elongato striato, 1-floro, squamis distantibus. Mich. l. c. Moris. 2. t. 16. f. 5. In Carol. sylv. umbrosis.

4. *uniflora*, maximo cernuo, squamis oppositissimis. Michaux. l. c. Catesb. car. 1. p. 36. t. 36. Hab. in Amer. boreali. Caul. crassus. ‡

1068. DIONEIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 6. *Caps.* 1-locularis, gibba, polysperma.

1. *Muscipula*. L. Vent. Malmis. t. 29. Hab. in Carolinae uliginosis. Folia sunt sensibilia, ut dum insectum irrepit aut insident folio, se claudant.

ONAGRACEAE Decandreae. (Gen. 1063-1072.)

1069. JUSSIEUA. *Cal.* 4-5-partitus, supernus, persistens, patens. *Pet.* 4-5, ovata, patentia. *Caps.* 4-5-locularis, oblonga, angulis dehiscens, cal. coronata. *Sem.* numerosa minuta, receptaculo angulato centrali adnexa. (Stam. 8-10.)

1. *grandiflora*, rad. repente, caul. erectis

pendulic. calycibusque villosis, fol. integerrimis inferiorib. spatulatis superiorib. lanceolatis, flor. decandris. Michaux. Flor. t. p. 267. Hab. in Georgiæ paludosis. h

2. *repens*, caul. repente, fol. spatulatis, floribus pentapetalis decandris. L. Willd. Sp. Pl. p. 574. Lam. enc. 3. p. 330. Rheed. 2. t. 51. *β. adscendens*. L. Mant. p. 69. Hab. in Indiæ humidis. h

3. *inclinata*, erecta glabra, flor. 4-petalis octandris pedunculatis. Lin. suppl. p. 235. Hab. in America præsertim meridionali. Priori valde affinis.

4. *tenella*, glabra, flor. pentapetalis subsessilibus, fol. oppositis lineari-lanceolatis. Burm. ind. 103. t. 34. f. 2. Hab. in Java. †

5. *linearis*, fol. linearibus sessilibus hispidis, flor. tetrapetalis octandris. Willd. p. 575. Hab. in Guinea. Caul. erectus, ramos. Rami divaricati, pilis sparsis. Fol. longissima. Germen hispidum. W.

6. *linifolia*, fol. laciniisque calycinis lineari-lanceolatis glabris, flor. sessilibus octandris. Vahl. p. 32. Hab. in Amer. merid. Caul. inferne tetragonus. Rami alterni, subfiliformes, patentissimi. V.

7. *peruviana*, erecta, flor. pentapetalis, pedunc. bracteatis, fol. oblongis utrinque attenuatis subtus pubescentibus. Willd. Fw. peruv. 716. t. 9. Hab. in Lima. Fol. emollientia.

8. *hirta*, erecta hirsuta, fol. lanceolatis attenuatis subtus hirtis, flor. pedunculatis octandris. Oenothera hirta. Plum. spec. 7. ic. 174. f. 2. Hab. in America calidiore. h

9. *octovalvis*, erecta, flor. tetrapetalis octandris pedunculatis, caps. multivalvibus, fol. lanceolatis. Swartz. obs. 142. J. *octonervia*. Lam. enc. 3. p. 332. Oenothera octovalvis. Lin. Hab. in Antill. Fructus 4-valvis non 8-valvis, sed striis 8 distinctus. Lam.

10. *angustifolia*, glabra, fol. alternis lineari-lanceolatis, flor. 4-petalis, caps. longiusculis pedunculatis. Lam. enc. 3. p. 331. Herba Vitiligum. Rumph. 6. t. 27. f. 1? Hab. in ins. Java et Molucc.

11. *caryophyllacea*, glabra, fol. lanceolatis, flor. 4-petalis, caps. brevibus subsessilibus. Lam. l. c. Herm. lugd. 396. Rheed. 2. t. 4. *β. Maderaspatana*. Pluck. alm. 236. t. 203. f. 5. Hab. in India.

12. *villosa*, tomentosa, fol. lanceolatis, flor. 4-petalis, caps. longiusculis curvis ses-

silibus. Lam. l. c. J. *suffruticosa*. Lin.? Rheed. 2. t. 50 (non 49).

13. *erecta*, glabra, fol. lanceolatis, flor. tetrapetalis, caps. sursum subattenuatis sessilibus. Lam. l. c. p. 332. Gaertn. de Fr. p. 159. t. 31. Burm. amer. t. 175. f. 2. Hab. in Amer. meridion. Rad. napiformis.

14. *pubescens*, erecta villosa, florib. 5-petalis decandris sessilibus. L. Sloan. jam. 85. Cum priore. †

1070. CACUCIA. Cal. campanulatus, limbo dilatato, 5-fido, deciduo. Petala 5. Caps. subbaccata, ovata, 5-angularis, 1-locularis, 1-sperma.

1. *coccinea*. Auhl. gujan. 1. p. 450. t. 179. Gmel. Syst. p. 693. Lam. ill. t. 389. Schousboea. Willd. Hab. in Gujana. Frut. sarmamentos. Flor. spicati, bracteati.

1071. GUIERA. Cal. oblongus, gracilis, 4-dentatus. Petala 5. Stam. exserta. Caps. longa angusta, villosissima, 1-locularis, subquinqesperma.

1. *senegalensis*. Juss. gen. pl. Lam. ill. gen. t. 360. Hab. in Senegal. Fol. opposita. Flor. capitati, involucri 4-phyllis cincti. h

1072. PETALOMA. Cal. urceolatus, 5-dentatus. Petala 5, calyci inserta. Stamina margin. calycis insidentia. Bacca 1-locularis, coronata.

1. *myrtilloides*, pedunc. solitariis 1-floris, fol. subsessilibus ovatis attenuatis basi obliquis. Swartz. Flor. 2. p. 833. Willd. p. 542. Sloan. hist. 2. p. 78. t. 187. f. 3. In sylvis Hispaniol. et Jamaic. h

2. *Muriri*, pedunc. confertis axillaribus, fol. petiolatis ovatis acuminatis. Swartz. l. c. p. 836. Mouriria gujanensis. Auhl. 1. p. 453. t. 180. Lam. ill. t. 366. Hab. in Gujanae sylvis. Bacc. 4-sperm.

1073. QUISQUALIS. Cal. 5-fidus, filiformis. Cor. tubus longissimus. Petala 5. Drupa 5-angularis.

1. *indica*, fol. ovatis. *β. pubescens*, fol. subcordatis pubescentibus. Burm. ind. t. 35. f. 2. Rumph. 5. t. 38. Lam. ill. t. 357. Hab. in Indis. h

1074. DAIS. *Involucrum* 4-5-phyl-
lum. *Cor.* 4. s. 5-fida. *Stigm.*
capitatum. *Bacca* 1-sperma.
(*Stam.* etiam 8.)

1. *cotinifolia*, fol. obovatisobtusis, florib.
quiquefidis villosis. Willd. Sp. II. p. 579.
Lam. ill. t. 368. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *disperma*, flor. octandris decandris-
que, fol. ovato-lanceolatis enerviis. Forst.
prod. n^o. 192. Hab. in ins. Tongatabu. h

3. *octandra*, fol. ovato-lanceolatis ven-
osis, florib. glabris quadrifidis octandris.
Willd. Burm. ind. t. 33. f. 2. Hab. in India. h

4. *laurifolia*, flor. decandris, fol. lan-
ceolatis acutis. Jacq. ic. rar. 1. t. 77. Col-
lect. 1. p. 146. Var. D. octandrae secundum.
Willd. Hab. in India. h

* *linifolia*. Lam. enc. 2. p. 255. Ej. ill.
gen. t. 368. f. 3. est *Gnidia capitata*. L. vid.
Buj. lib. p. 436.

* *madagascariensis*. Lam. l. c. p. 254.
et ill. l. c. f. 2. *Gnidia daphnaefolia* var.
glabra. L.

* *pubescens*. Lam. l. c. p. 255. S. Gn.
daphnaef. β hirsuta. L. Suppl. Tres hae
Gnidiae L. ob involucr. potius Daidies sunt.

1075. CERATOPETALUM. *Cal.* 5-
partitus, staminiferus, persistens.
Petala 5, pinnatifida. *Antherae*
calcaratae. *Caps.* in fundo calycis
tectae, bilocularis.

1. *gummiferum*. Smith. N. Holl. 1. p. 9.
t. 3. Hab. in Australasia. Arbor procera.
Fol. opposita ternata. Panic. terminalis. Pet.
flava. W. h

MELASTOMEA (Gen. 1076-79.) *cal.* ha-
bent campanulato-tubulosum in quibusd.
squamis cinctum persistentem, cui *Petala*
et stamina inserta. *Filam.* 8, 10, 12,
apice saepius bisetosa aut bicauriculata.
Anth. longae, rostratae, incumbentes.
Fruct. est vel bacca, vel capsula, aut
cal. coarctato tectus, aut inferus, multi-
locularis, polyspermus. Caul. ut plurimum
frutescens. Fol. opposita, simplicia, ner-
vosa. Juss.

1076. MELASTOMA. *Cal.* 5-fidus,
campanulatus. *Petala* 5, calyci
inserta. *Antherae* longae, arcuatae.
Bacca 3-locularis, calyce obvo-
luta. (*Stam.* etiam 8 et 13. Fol.

plerisque eleganter nervosa - ve-
nosa.)

* *Fol. trinerviis.*

1. *calyptata*, fol. elliptico-lanceolatis
attenuatis trinerviis glabris obsolete denti-
culatis, flor. paniculatis dodecandris. Willd.
Sp. II. p. 581. Hab. in ins. Montserrat. Flor.
calyptati, petala flava. V. h

2. *crenata*, hispida, fol. subcordatis ob-
longis crenatis acuminatis, racemis axilla-
ribus paucifloris longitudine petioli. Vahl.
eclog. 1. p. 41. Ej. ic. ecl. ill. t. 24. Hab. in
Amer. meridionali. h

3. *rigida*, fol. trinerviis subdenticulatis
subcordato-ovatis rigidis, subtus scabris,
racemis terminalibus paniculatis ferrugineo-
hirtis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 768. Hab.
in montibus caeruleis Jamsicae. h

4. *montana*, fol. trinerviis subdenticulat.
glabrisusculis, racemo terminali, pedunc.
tripartito-trifidis patulis, petal. retusis, cal.
truncato. Swartz. l. c. p. 766. Hab. in mont.
Jamaic. australis. h

5. *procera*, arborea, fol. trinerviis sub-
denticulatis glabris, racemo terminali, pe-
dunc. trifidis erectis, calycibus truncatis.
Swartz. l. c. p. 764. Hab. in altis montibus
Jamaicae. h

6. *adscendens*, fol. trinerviis denticulat.
ovatis acutis glabris, racemo ovato termi-
nali, racemulis floribus subsecundis, caule
scandente. Swartz. l. c. p. 772. Hab. in sylvis
mont. Jam. h

7. *aspera*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis
trinerviis scabris, flor. terminalibus
subcorymbosis. Willd. p. 583. L. Sp. pl. 560.
Burm. zeyl. t. 72. Rumph. 4. t. 43. Hab. in
India. h

8. *ledifolia*, villosa, fol. ovato-lanceo-
latis integerrimis trinerviis, flor. axillari-
bus terminalibusque bracteatis. Lam. enc. 4.
p. 48. Hab. in Peru. Bractae lineae sub
calyce. L. h

9. *strigosus*, fol. integerrimis trinerviis
strigosis ovatis, flor. solitariis. Lin. suppl. 236.
Hab. in N. Granada. Caul. strigis adpressis
scaber. Cal. strigosus. Cor. purpurea. L. h

10. *aromatica*, fol. ovatis nitidis, subtus
subpilosis, nervis cauleque strigosis, calycib.
bas. bract. imbricatis. Vahl. eclog. M. Ti-
bouchina. Lam. enc. 4. p. 48. Tibouchina
aspera. Aubl. 1. p. 445. t. 177. Hab. in
Guiana. Fol. 3-nervia. Lam. l. c.

11. *holosericea*, fol. oblongo-ovatis in-

tegerimis subtus canis, apicis racemosis bipartitis, floribus conferis biseriatis. Vahl. eclog. 1. p. 42. L. Sp. pl. 559. Pluk. mont. 4. t. 252. f. 2. Hab. in Brasilia, Surinamo. h

12. *velutina*, fol. trinerviis integerrimis sessilibus ovatis acutis villosis-sericeis, racemis brachiatis, ramis bipartitis, caule acute quadrangulo. Willd. p. 584. Hab. in Jam. Brasilia. h

13. *sessilifolia*, fol. integerrimis trinerviis spathulatis sessilib. subtus subtomentosis. L. Brown. jam. 219. t. 29. Pluk. alon. 50. t. 249. f. 2. Hab. in Jamaica. h

14. *ramiflora*, fol. trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis scabrisculis, ramis floriferis, flor. pedunc. subconferis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 775. Hab. in St.-Thomae locis paludosis. h

15. *glabra*, fol. integerrimis trinerviis oblongis acuminatis glabris, panic. terminali, calycib. circumscissis. Willd. Forst. prod. n. 194. Hab. in Societat. insulis. h

16. *involucrata*, glabra, fol. ellipticis obtusiusculis serrulatis trinerviis, flor. hiariis axillaribus involucreatis. Lam. enc. 4. p. 35. Hab. ad St.-Domingo.

17. *diffusa*, pilosa, fol. ovatis trinerviis serrulatis, flor. ad axillas ramulorum solitariis, caul. paniculato. Lam. l. c. p. 38. Hab. in Cayenne. Ramuli apice glandulosi.

18. *punctata*, fol. lanceolatis integerrimis subtus ochroleucis excavato-punctatis, panic. composita terminali. Lam. l. c. p. 50. Hab. ad St.-Domingo.

19. *cornifolia*, glabra, fol. ovato-acuminatis trinerviis integris, cal. striato infundibuliformi, panic. terminali. Lam. p. 81. Hab. in ins. Martinica. Fol. eleganter ex viridi subflavescent.

20. *myricoides*, laeviuscula, fol. ovatis subacuminatis denticulatis trinerviis, panic. terminalibus, trunc. granuloso. Enc. l. c. Hab. in Antillis. Rami nodoso-articulati.

21. *chrysophylla*, glabra, fol. ovatis acutis trinerviis integerrimis subtus aureo-virentibus, panic. terminali. Lam. enc. 4. p. 50. Hab. in Madagascar. Fol. subtus flavo-viridia. h

22. *quadrangularis*, fol. trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis glabris, nervis subtus coloratis, ramis tetragonis, racemo stricto terminali. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 770. Hab. in Jamaicae montib. altis. h

23. *trinervia (bipartita)*, fol. trinerviis

absque marginali, integerrimis utrinque glabris tenuioribus, racemis terminalibus, racemulis bipartitis, flor. sessilibus. Swartz. l. c. p. 774. Cum priore.

24. *repens*, fol. obovatis glabris trinerviis subintegerrimis, florib. solitariis terminalib. caule repente. Lam. l. c. p. 54. illust. gen. t. 362. f. 2. M. octandra. Retz. obs. 4. p. 25. Hab. in China. h

25. *glabrata*, fol. trinerviis sublenticulatis ovatis acutis glabris coriaceis, pedunc. terminalibus solitariis unidorsis, florib. octandris. Swartz. p. 806. Hab. in alpinis Jamaicae australioris. h

26. *glandulosa*, fol. trinerviis integerrimis ovatis, superne strigoso-scabris, subtus hirsuto-hispidis glandulosis, racemis terminalibus, flor. conferis octandris. Swartz. 2. p. 799. Hab. in summ. montib. Jamaic. h

27. *hirtella*, fol. trinerviis integerrimis, margine hispido-pilosis, pedunc. brevissimis axillaribus trifloris, florib. octandris. Sw. 2. p. 810. Hab. cum priore. h

28. *triflora*, fol. trinerviis elliptico-lanceolatis integerrimis, ramis petiolis calycibusque strigosis, floribus axillaribus subpedunculatis ternis. Vahl. eclog. 1. p. 46. Hab. in Caribaeis. h

29. *octandra (zeylanica)*, fol. integerrimis trinerviis ovato-lanceolatis glabris, margine nervisque subtus hispids, floribus terminalibus. Willd. Hab. in Zeyloza. h

30. *divaricata*, fol. trinerviis integerrimis ovatis acutis subtus pubescentibus, panic. terminali divaricata, floribus octandris. Willd. Hab. id India orientali. Rami seniores nigricantes, juniores ferrugineo-tomentosi. Cal. urceolat. h

31. *tetrandra*, fol. trinerviis integerrimis oblongis basi emarginatis convexiusculis glabris, racemo erecto terminali, flor. tetrandris. Swartz. l. c. p. 795. Hab. in mont. Jamaicae australis. h

32. *fascicularis*, fol. integerrimis ovatis acutis scabris, ramis floriferis, flor. conferis pedunculatis octandris. Swartz. 2. p. 801. Hab. in mont. Jamaicae interioris. h

33. *angustifolia*, fol. trinerviis linearilanceolatis integerrimis subtus incanis, ramis virgatis, panic. terminalibus, flor. erectis octandris. Swartz. 2. p. 796. Hab. in Jamaica inque insula St.-Johannis. h

34. *purpurascens*, fol. trinerviis integerrimis oblongis acutis striatis glaberrimis,

racemis lateralibus tripartitis patulis, flor. octandris. Swartz. p. 804. Hab. in Jam. mont. excelsis.

35. *alpina*, fol. trinerviis integerrimis ovatis coriaceis glabris, panic. simpliciter trichotomis, flor. distinctis 8-andris. Swartz. l. c. p. 800. Habit. in insulae Guadeloupe muscosis.

36. *hirsuta*, fol. trinerviis subdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis hirsutis, pedunc. axillaribus divaricatis trifidis, flor. 9-andris. Swartz. Flor. 2. p. 801. Hab. in Jamaica, ad thermas prope Bath.

37. *microphylla*, fol. trinerviis subdenticulatis ovatis obtusis superne hispidis, subtus tomentosis ferrugineis, pedunc. trifidis axillaribus, flor. 8-andris. Swartz. l. c. p. 803. Hab. in Jam. australi. Priori affinis.

38. *micrantha*, fol. trinerviis-denticulatis oblongis utrinque acutis glabris, racemis axillaribus redinatis, florib. acuminatis 9-andris. Swartz. Hab. in montib. Jamaicae occidentalis.

39. *capillaris*, fol. trinerviis subdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis glabris, pedunc. capillaribus trifloris, flor. 8-andris. Swartz. p. 808. Hab. in mont. Jam. austral.

40. *rubens*, fol. trinerviis denticulatis ovato-lanceolatis glaberrimis, ramis petiolisque coloratis, racemo terminali, flor. dioicis 8-andris. Swartz. l. c. 2. p. 797. Hab. in alpib. Jam. australis. Purpurascens.

**** Fol. triplinerviis.**

41. *Grossularioides*, fol. subrotundo-ovatis acuminatis denticulatis triplinerviis glabris. Willd. p. 585. Pluk. alm. t. 245. f. 4. Hab. in Surinamo. h

42. *parviflora*, fol. ovato-lanceolatis utrinque attenuatis denticulatis triplinerviis glabris, panicula terminali trichotoma. Willd. p. 586. Aubl. guj. 1. p. 433. t. 171. Enc. bot. 4. p. 62. Habit. in paludosis Cajennae, Gujanae. Tincturam nigram praebet. h

43. *succosa*, fol. ellipticis acutis integerrimis triplinerviis hirsutis subtus tomentosis, flor. lateralibus sessilibus, petalis denticulatis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 418. t. 162. Hab. in sylvis Gujanae, Cajennae. h

44. *arborescens*, fol. subrotundo-ovatis acutis integerrimis triplinerviis glabris, corymbis bracteatis lateralibus, petalis biungiculatis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 420. t. 163. Cum priore,

45. *longifolia*, fol. lanceolatis glabri^s trinerviis. ad summam caulis quaternis, flor. parvis allis paniculatis, fructu parvo caeruleo. Aubl. guj. 1. p. 432. t. 170. Hab. in Gujan. ad ripam amnis Galibienis. h

46. *prasina*, fol. triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis glabris, panic. terminali patentissima. Swartz. 2. p. 777. M. laevigata. Aubl. 1. p. 412. t. 159. Hab. in America boreali.

47. *trichotoma*, laeviuscula, fol. lato-ovalib. acuminatis triplinerviis integerrimis, panic. trichotomis ampliter terminalibus. Lam. enc. 4. l. c. Hab. . .

48. *staminea*, laeviuscula, fol. ovatis subacuminatis integerrimis 5-nerviis: nervis fuscis, cal. turbinato striato. Lam. p. 53. Hab. in Brasilia. Priori affinis.

49. *acuminata*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis undato-subdentatis triplinerviis, panic. terminalibus. Lam. p. 54. Hab. Guadeloupa. Panic. bract. nullis.

50. *marginata*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis triplinerviis marginato-ciliatis, pedunc. brevibus paucifloris, cal. echinato. Lam. enc. v. 4. p. 32. Hab. in Brasilia. Cal. fructus Dauci relert.

51. *multiflora*, glabra, fol. lanceolatis serratis, triplinerviis, panic. lateralibus, cal. turbinato subtruncato. Lam. l. c. p. 33. Hab. ad St.-Domingo. Panic. divaricata.

52. *amygdalina*, glabra, fol. angustolanceolatis complicatis serratis, panic. breviusculis lateralibus, cal. cylindrico. Lam. l. c. Cresc. cum priore, cui affinis.

53. *lanceolata*, fol. angustolanceolatis triplinerviis margine denticulato-scabris subtus ferrugineis, panic. terminali. Lam. l. c. p. 42. Hab. ad St.-Domingo.

***** Fol. triplinerviis.**

54. *verticillata*, fol. triplinerviis oblongis attenuatis denticulatis villosis, supra scabris, racemis axillaribus, flor. verticillatis. Vahl. eclog. 1. p. 47. Hab. in Caribaeis. h

Obs. Flores in hac uti in sequentib. speciebus hujus divisionis 8-andri sunt.

55. *cinnamomifolia*, fol. subintegerrimis triplinerviis lanceolatis acuminatis. Jacq. collect. 2. p. 111. t. 6. M. *acuminata*. Vahl. Willd. p. 597? Hab. in Montserrat. h

56. *lateriflora*, fol. obovatis acuminatis setaceo-subseratis glabris, pedunc. infra-

foliaceis aggregatis unifloris. Vahl. l. c. p. 48. Hab. in mont. ins. Montserrat. h

57. *elacagnoides*, fol. triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis subtus albidotomentosis, pedunc. terminalibus trichotomis, flor. solitariis. Swartz. Fl. 2. p. 815. Hab. in ins. St.-Johann. Amer. h

58. *scabrosa*, fol. triplinerviis denticulatis ovatis scabris hirsutis, flor. axillaribus aggregatis sessilib. octandris. Swartz. obs. 174. Brown. jam. 219. t. 24. f. 3. Hab. in Jam. montibus. h

59. *virgata*, fol. triplinerviis integerrimis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, ramis virgatis floriferis, racemis decussatis diffusis sparsis, flor. octandris. Swartz. 2. p. 816. Hab. in Jamaic. sylvestribus montium. h

**** *Fol. quintuplinerviis.*

60. *agrestis*, villosa, fol. ovato-lanceolatis denticulatis quintuplinerviis, corymbo terminali. Willd. p. 587. Aubl. guj. 1. p. 425. t. 166. Hab. ad ripas et in muris antiquis Cajennae. Fol. ferrugineo-villosa. h

61. *scandens*, fol. ovatis subserratis hirsutis quintuplinerviis, corymbo terminali capitato, caule scandente. Willd. Aubl. guj. 1. p. 435. t. 172. Hab. in sylvis Gujanæ. h

62. *alata*, fol. ovatis utrinque acuminatis integerrimis quintuplinerviis subtus pubescentibus, capit. paniculatis terminalibus, caul. alato. Willd. Aubl. guj. 1. p. 410. t. 158. Hab. in campestribus Cajennae, Gujanæ. h

63. *flavescens*, fol. obovato-acutis integerrimis quintuplinerviis subtus pubescentibus, corymb. bracteatis lateralibus. Willd. Aubl. guj. 1. p. 423. t. 164. Hab. in sylvis Gujanæ. h

***** *Fol. quinquenerviis, aut 7-ner-viis (ob spec. affinitatem).*

64. *hirta*, fol. denticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis, caul. hispido. L. Pluk. alm. 40. t. 264, 265, f. 1. Hab. in America meridionali. Var. flor. dodecandris, bacca seculoculari. Sw.

65. *spicata*, fol. subdenticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis villosis, spicis axillaribus. Willd. p. 588. Aubl. 1. p. 423. t. 165. Hab. in pratis Gujanæ. h

66. *acinodendron*, fol. ovatis acuminatis denticulatis quinquenerviis, cymis axillarib.

Willd. Plum. ic. 142. f. 2. Hab. in Amer. calidiore. h

67. *cymosa*, fol. cordatis acuminatis quinquenerviis serrulatis pubescentibus, cyma terminali, calycinis lacinii subrotundis, staminib. quinque sterilibus. Willd. M. fol. septemnerviis. Schrad. et Wendl. sert. hannov. 18. t. 8. Hab. in Amer. meridionali. h

68. *grandiflora*, fol. cordatis acuminatis quinquenerviis serrulatis pilosis, pedunculo terminali bifido, calycinis lacinii linearisubulatis, staminibus quinque sterilibus. Willd. Vahl. symb. 3. p. 59. Aubl. guj. 1. p. 414. t. 160. Hab. in pratis Cajennae et Gujanæ. h

69. *elegans*, hispida, fol. cordatis inaequaliter crenato-dentatis, racemis dichotomiæ terminalibusque paucifloris. Vahl. eclog. 1. p. 44. Aubl. guj. 1. p. 427. t. 167. Hab. in Cajenna in muris antiquis. h

70. *rufescens*, fol. cordatis crenulatis scabris subtus tomentosis, floribus terminalibus glomerato-spicatis. Willd. M. foliis crassis rugosis cordatis subtus tomentosis subsessilibus. Aubl. guj. 1. p. 408. t. 157. Hab. in locis campestribus Gujanæ. h

71. *rubra*, fol. cordatis subcrenatis subtus ferrugineo-tomentosis, flor. axillaribus et lateralibus solitariis sessilibus. Willd. Aubl. guj. 1. p. 416. t. 161. Hab. ad ripas Gujanæ. h

72. *majeta*, fol. obovatis quinquenerviis subcrenulatis pilosis: basi ad petiolum vesiculosis, flor. solitariis axillaribus sessilibus, calyce squamoso. Willd. Majeta gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 443. t. 176. Hab. in sylvis Gujanæ. Fol. alterum duplo minus. h

73. *heterophylla*, pilosa, foliis oppositis disparibus denticulatis, petiolis superne vesiculosis, panic. brevissimis lateralib. Lam. l. c. 4. p. 34. Hab. in Peru. Fol. alterum minus, sessile cordatum vix vesica donatum. Lam. h

74. *physiphora*, fol. ovatis attenuatis denticulatis ciliatis, petiolis hispidis apice vesiculosis. Vahl. eclog. 1. p. 45. Tococa gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 438. t. 174. Hab. ad viarum margines in Cajenna et Gujana. Racemus terminalis. h

75. *purpurea*, foliis ovato-lanceolatis acuminatis quinquenerviis pilosis subdenticulatis, ramis bifidis paniculatis terminalibus. Willd. p. 590. Aubl. guj. 1. p. 404. t. 154. Hab. ad ripas rivulorum Gujanæ. h

76. *argentea*, fol. quinquenerviis subdea-

5. *scutellatis ovatis glabris*, subtus tomentosis candidis, panic. terminalibus patetibus. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 779. Sloan. hist. 2. p. 84. t. 196. f. 1. Hab. ad litus Mosquito-shore Americes. *h*

77. *elata*, fol. quinquenerviis serrato-denticulatis oblongis coriaceis, subtus ferrugineo-tomentosis, panic. terminalibus patentibus, flor. sessilibus. Swartz. l. c. 2. p. 781. Hab. in montib. elevationibus Jamaicae, etc. *M. argentea proxima*. Sw.

78. *impetolaris*, fol. quinquenerviis denticulatis subsessilibus oblongis acuminatis coriaceis, subtus tomentoso-ferrugineis, panic. terminalib. axillaribusque erectis, flor. sessilibus. Swartz. l. c. p. 789. Hab. in India occidentali. *h*

79. *fragilis*, fol. quinquenerviis ovatis reticulatis serratis, racemis brachiatis terminalibus, pedunc. inferioribus trifidis, pedicellis subbifidis. Vahl. eclog. 1. p. 44. Lin. suppl. 236. Hab. in America australi. Fructus pisiformes, umbilico excavato; minores umbilico clauso squamis quinque. *L. h*

80. *coriacea*, fol. quinquenerviis cartilagineo-denticulatis ovatis rugosis glabris coriaceis, ramulis petiolisque strigosis, panic. ramis tetragonis, florib. subsessilibus. Sw. l. c. 2. p. 790. Hab. in summitate montis la Soufrière ins. Guadeloupe. *h*

81. *patens*, fol. quinquenerviis cordatis hirsutis subdenticulatis, racemo terminali patulo, flor. 12-andris. Swartz. p. 291. Hab. in Jam. montib. Hirsuties fusco-rubra. *S.*

82. *grossa*, fol. integerrimis quinquenerviis subcordatis scabris. Lin. suppl. 236. Hab. in N. Granada. Arb. ramis hispidis. Cal. validus, pilis strigosus. *L. h*

83. *malabathrica*, foliis integerrimis, quinquenerviis lanceolato-ovatis scabris. *L.* Burm. zeyl. 155. t. 73. Lam. ill. t. 361. f. 1. Fragarius niger. Rumph. 4. t. 72. Hab. in India. Cal. squamoso-cellosus. *h*

Obs. Hae species generis nomen ansam dedit cum fructus comelentum os, uti bacc. vacc. myrtilli, atro inquinat.

84. *strigillosa*, fol. quinquenerviis subdenticulatis acuminatis, superne strigosopilosis subtus tomentosis, racemis axillaribus, flor. pedicellatis confertis. Sw. Fl. 2. p. 793. Hab. in Jamaica.

85. *tamonea*, fol. quinquenerviis oblongo-lanceolatis acutis integerrimis subtus tomentoso-incanis, racemis terminalib. compositis, racemulis brachiatis, pedunc. um-

bellalutis, bract. geminis. Swartz. l. c. 2. p. 783. *M. Fothergilla*. Enc. bot. 4. p. 45. *h* ? *M. dodecandra*. Ej. operis. Fothergilla mirabilis. Aubl. guj. 1. p. 441. t. 175. Hab. in Amer. meridionali. *h*

86. *mucronata*, fol. lato-ovalibus mucronatis 5-nerviis subtus tomentoso-ferrugineis, cal. truncato ciliato. Lam. p. 46. Hab. in Cayenne.

87. *savosa*, fol. ovatis subdenticulatis basi emarginatis 5-nerviis, subtus cellulosis, panic. terminali corymbosa. Lam. p. 47. Hab. ad St.-Domingo.

88. *Lima*, scabra, fol. ovatis serrulatis triplinerviis, bullato-tuberculosis, flor. axillarib. terminalibusque subpaniculatis. Lam. l. c. Cum priore, cum qua affinitatem habet.

89. *papillosa*, fol. ovalibus subcordatis crenulatis septemnerviis rugoso-papillois, panic. terminalib. vix bracteatis. Lam. l. c. p. 48. Hab. in Peruvia. Fol. tuberculis polygoneis aspera.

90. *latifolia*, pilosa, fol. lato-ovatis acuminatis ciliatis septemnerviis, panic. axillaribus subgeminatis fol. brevioribus. Lam. enc. 4. p. 31. Hab. in Antillis.

91. *dichotoma*, hispidula, fol. cordatis 7-5-nerviis acutis denticulatis, panic. foliosis. ramis lateralibus dichotomis. Lam. l. c. p. 41. Hab. in Brasilia.

92. *laxa*, fol. cordato-ovatis 7-nerviis serrulatis rugosis, panic. laevis foliosis terminalibus. Lam. l. c. Hab. in Peruvia.

93. *nivea*, fol. cordatis 7-nerviis acuminatis denticulatis subtus tomentoso-niveis, panic. terminali, caul. hispido. Lam. p. 42. Hab. ad St.-Domingo. Fol. uti in urtica nivea.

94. *pyramidalis*, fol. ovato-acuminatis denticulatis quinquenerviis subtus villosisculis, panic. pyramidalis terminalibus. Enc. l. c. Hab. in Antillis.

95. *nicotianaefolia*, fol. lato-ovatis acutis subdentatis longe petiolatis quinquenerviis, panic. brachiata terminali. Enc. l. c. Hab. ad St.-Domingo. Fol. magna 7-unc. longa, 4-lata.

96. *pauciflora*, pilosa, fol. ovatis subacuminatis crenulatis, 5-nerviis, racemulis axillarib. terminalibusque paucifloris. Lam. enc. 4. p. 39. Hab. in Brasilia.

97. *ferruginea*, fol. ovato-acutis obsolete crenatis subciliatis 5-nerviis supra glabris, panic. terminalibus. Lam. l. c. p. 42. Hab. ad St.-Domingo. Cor. albo-rosea.

98. *granulosa*, fol. ovato-lanceolatis integris quinquenerviis, supra granulosis, panic. terminalibus, caul. alato. Lam. p. 44. Hab. in Brasilia. Frut. 10-pedalis, ramis 4-gonis. Cor. magnus.

99. *clavata*, fol. cordato-ovalibus sessilibus integerrimis sericeo-argenteis, panic. terminali, cal. clavato. *M. argentea*. Enc. bot. 4. p. 45. Hab. in Brasilia. Cal. forma aequat Caryophyll. aromat. flores.

100. *albicans*, fol. quinquenerviis integris ovatis acutis, supra glabris, subtus tomentosis albidis-ferrugineis, racemis terminalibus erectis, flor. confertis sessilib. Swartz. l. c. p. 86. Hab. in montib. Jamaicae inque Brasilia. h

101. *capitata*, fol. quinquenerviis lato-lanceolatis integerrimis, capitulis terminalibus involucreis, ramis tetragonis, filament. appendiculatis. Vahl. eclog. 1. p. 45. Hab. in India occidentali. h

102. *splendens*, fol. quinquenerviis integris oblongis acuminatis utrinque glabris, superne nitidis, panic. terminalibus erectis, flor. subumbellatis. Swartz. l. c. 2. p. 789. Plum. spec. 18. t. 140. Hab. in sylvis montium Jamaicae. h

103. *laevigata*, fol. integerrimis quinquenerviis ovato-oblongis laeviusculis acuminatis, margine laevibus. L. Habit. in America. Cfr. *M. laevigata* Enc. bot. 4. p. 52. Racemi terminales, flor. minutis.

104. *crispata*, fol. integerrimis quinquenerviis quaternis, ramis crispatis. L. Rumph. 5. t. 35. Hab. in Amboina. † h

105. *nodosa*, fol. ellipticis serrulato-ciliatis quinquenerviis coriaceis, corymb. bracteatis, ramis nodosis. Enc. bot. 4. p. 55. Hab. in Antillis. Nigricans. Corymb. trichotomus.

106. *crocea*, fol. ovatis subserratis glabris, nervis ad petiolum barbatis, panic. terminali. Enc. l. c. Hab. in Peruvia. Stam. 14-15.

107. *racemosa*, fol. ovatis quinquenerviis glabriusculis serrulato-ciliatis, petiol. supra villosis, panic. terminali subracemosa. Enc. l. c. Aubl. 1. t. 156. M. decussata. Vahl. Willd. p. 582.

108. *articulata*, fol. ovato-lanceolatis denticulato-ciliatis, petiol. villosis, panic. ramis dichotomis articulatis. Lam. enc. l. c. p. 56. Hab. Cayennae. Priori affinis. Ramis 4-goni. Fol. nervi 2-laterales obsoleti.

109. *umbrosa*, fol. quinquenerviis lato-ovatis acuminatis utrinque hirtis, ramul. floriferis, racem. dichotomis patentib. flor. 8-andris. Swartz. Flor. ind. occid. 2. p. 817. Hab. in Amer. meridion. Fl. maxima.

110. *hispida*, fol. 5-nerviis subdenticulatis ovatis acutis, superne strigoso-hirsutis, subtus reticulato-tomentosis, panic terminalibus divaricatis, flor. 8-andris. Swartz. p. 821. Hab. in Jain. montibus.

111. *sessiliflora*, villosa-subtomentosa, fol. 5-nerviis lanceolato-ovatis denticulatis subpetiolatis, flor. axillarib. subverticillatis Vahl. eclog. 1. p. 46. Ej. ic. ecl. ill. 1. 15. Hab. in Amer. meridion. h

112. *pilosa*, fol. quinquenerviis subdenticulatis oblongis acutis, nervis subtus, ramulis racemisque lateralibus piloso-hirsutis, flor. octandris. Swartz. Fl. 2. p. 819. Hab. in sylvis montium Jamaicae. *M. micranthae* proxima. h

113. *discolor*, fol. quinquenerviis subintegerrimis oblongis acuminatis glabris subtus flavo-incanis, racemis cymosis, flor. octandris. Swartz. obs. 178. Plum. ic. t. 42. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. h

114. *coccinea*, fol. quinquenerviis elliptico-ovatis acuminatis glabris integerrimis, thyrso terminali, pedunc. pedicellisque nodosis hispidis. Vahl. l. c. p. 48. Ej. ic. ecl. illustr. t. 16. Hab. in ins. Montserrat. Variis flore albo. V. h

1077. **TRISTEMMA.** Cal. 5-fidus, prope limbum bifariam ciliatus. *Petala* 5, unguiculata. *Racca* ovata, compressa, subangulata, tecta, 5-locularis.

1. *mauritanum*. Juss. gen. pl. Melast. virusana. Commers. Fol. ovata. Flor. capitati. An a Melastomis, quarum habitum refert satis distinctum?

1078. **MICONIA.** Cal. 5-dentatus. *Petala* 5. *Nect.* squam. 5. *Stamina* declinata. *Antherae* plicatae, calcaratae. *Caps.* 5-locularis. *Semina* subobiformia.

1. *pulverulenta*, fol. ovatis quinquenerviis crenatis, acum. obtuso. Flor. per. Syst. p. 104. Hab. cum sequentibus in Peruv. nemorib., Chinchao, et Cuchero, etc. Flor. plurimi 6-petali, nonnulli 7-8-petali. h

2. *triplinervis*, fol. oblongis triplinerviis acuminatis integerrimis. Syst. Fl. per. p. 105. h

β. *lanuginosa*, fol. oblongis quinquenerviis integerrimis obtuse acuminatis. Syst. etc. l. c.

3. *emarginata*, fol. cordatis emarginatis quinquenerviis. L. c. p. 106.

1079. *MERIANIA*. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. *Petala* 5, calyci inserta. *Stam.* declinata. *Caps.* 5-locularis, polysperma.

1. *leucantha*, fol. oblongis nitidis, flor. bracteis geminis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 826. Willd. Sp. II. p. 600. Sw. prod. 61. Hab. in montib. Jamaicae. h

2. *purpurea*, fol. ovato-lanceolatis, flor. bracteis quaternis. L. c. p. 829. *Rhexia purpurea*. Swartz. prod. 61. Cum priore.

1080. *ACISANTHERA*. *Cal.* ventricosus, 5-fidus. *Petala* 5. *Anth.* sagittatae, versatiles. *Caps.* coronata, 2-locularis, polysperma.

1. *quadrata*. *Rhexia Acisanthera*. Lin. Willd. Sp. II. p. 303. *Acisanthera* ramulis quadratis, foliol. 3-nerviis ovatis crenatis oppositis, flor. (axillaribus) singularibus. Brown. jam. t. 22. f. 1. Hab. in Jamaica. Etiam famil. naturali a Rhexiis differt. Vid. Juss. gen. pl.

1081. *GETONIA*. *Cal.* superus, 5-phyllus, persistens. *Filam.* alternatim latiora, 5 in calycis ore. *Sem.* crustatum, oblongum, 5-striatum, cal. coronatum.

1. *floribunda*. Roxb. Corom. p. 64. t. 87. Hab. in Coromand. sylvis. Scandens. Fol. opposita, ovata. Flor. paniculati. Bract. lanceolatae. h

Obs. Calycopteris. Lam. ill. t. 357, alteram hujus generis speciem efficere videtur.

RHODORACKIA (gen. 1083-84), *Ericia* affines, ab his vero discrepant antheris non bicornib. et valvis fructus introflexis. Juss.

1083. *KALMIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis: limbo subtus quinquecorni, in quorum foveis anth. incumbunt. *Caps.* 5-locularis.

1. *latifolia*, fol. ovato-ellipticis coriaceis petiolatis ternis sparsisque, corymbis termi-

nalib. subviscosis. Ait. Kew. 2. p. 64. Willd. Sp. II. p. 600. Lam. ill. t. 363. f. 1. Trew. Ehret. t. 38. f. 1. Hab. in America boreali. Flor. vere. Frut. 4-pedalis.

2. *angustifolia*, fol. lanceolatis, corymbis lateralib. subvericillatis. L. β. oleifolia. Catesb. car. 3. p. 17. t. 17. f. 1. Trew. Ehret. t. 38. f. 2. Hab. in Amer. boreali. Fol. subtus subferruginea.

3. *cuneata*, fol. sparsis sessilib. cuneato-oblongis, subtus pubentibus subaristatis, corymb. lateralib. paucifloris. Mich. Flor. 1. p. 257. Hab. in Carol. Cor. albidia, fundo purpureo. M.

4. *glauca*, fol. oppositis oblongis laevigatis subtus glaucis, margine revolutis, corymbis terminalibus, ramul. arcepiuib. Ait. Kew. 2. p. 64. t. 8. Hab. in Terra Nova. β ? *rosmarinifolia*. Bot. cult. 2. p. 250. Cresc. in Carolina. h

5. *hirsuta*, suffruticosa, fol. sublanceolatis revolutis alternis, flor. solitariis axillaribus. Lam. enc. 3. p. 333. Curt. bot. mag. t. 138. Hab. in Carolina meridionali. h

1083. *LEDUM*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* plana, 5-partita. *Caps.* 5-locularis, basi dehiscens. (Stam. etiam 5.)

1. *palustre*, fol. linearibus margine revolutis subtus tomentosis. Ait. Kew. 2. p. 65. β. *decumbens*, spithameum decumbens. Ait. l. c. Cfr. Mich. Hab. in Europae septentrional. uliginosis, β. in sinu Hudsonis. h

2. *latifolium*, fol. ellipticis margine revolutis subtus tomentosis, florib. subpendandris. Ait. Kew. 2. p. 65. Jacq. ic. rar. 3. t. 464. Collect. 2. p. 308. Lam. ill. t. 363. L. groenlandicum. Retz. scand. ed. 2. no. 493. Hab. in uliginosis Groenlandiae et Americae.

† *LEIOPHYLLUM*. *Caps.* apice dehiscens. *Fol.* utrinque glabra..

3. *thymifolium*, fol. ovalibus obtusis utrinque glabris, umbel. terminalibus sessilibus capitato-congestis. Lam. enc. 4. p. 459. Ej. ill. t. 363. f. 2. L. buxifolium. Ait. Michaux. Flor. 1. p. 260 ? Hab. in Carol. et N. Caesares. Facie a Ledi recedit.

1084. *RHODORA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* declinata. *Caps.* 5-locul.

1. *canadensis*. Herit. stirp. nov. 1. p. 141. t. 68. Lam. ill. t. 364. Hab. in Canada et Terra

NOVA. Flor. terminales umbellati. A sequente genere satis diversum?

1085. **RHODODENDRON.** *Cal.* 5-partitus. *Cor.* subinfundibuliformis, subobliqua. *Stam.* declinata. *Caps.* 5-locularis.

1. *ferrugineum*, fol. glabris subtus leprosis, corollis infundibuliformibus. Jacq. Flor. austr. t. 255. Hab. in alpinis. Petala inferiora angustiora.

2. *minus (punctatum)*, fol. ovali-lanceolatis, subtus ferrugineo-punctatis, flor. infundibuliformibus, caps. elongatis. Mich. In montibus Carol. superioris. Flor. t. p. 258. Rh. *punctatum*. Willd. p. 607? Vent. Cels. t. 15.

3. *dauricum*, fol. glabris punctatis nudis corollis rotatis. L. Andrews repos. t. 4. Hab. in Dauria. Cor. violaceae, fol. ampliores. h

4. *camtschaticum*, fol. ciliatis nervosis, coroll. rotatis, calycib. foliaceis. Pall. ross. t. p. 48. 33. Hab. in Camtschatca locis montosis lutosi. h

5. *hirsutum*, fol. ellipticis acutiusculis ciliatis subtus punctatis, corollis infundibuliformibus. Willd. p. 604. Jacq. Flor. austr. t. 98. Hab. in alpinis. h

6. *chamaecistus*, fol. ellipticis acutiusculis glanduloso-ciliatis nudis, cor. rotatis, petalis obtusis. Willd. l. c. Jacq. t. 217. Hab. in Baldo et Austria.

7. *caucasicum*, fol. scabris subtus ferrugineo-tomentosis, umb. terminalibus, cor. rotatis, petalis subrotundis. Willd. Pall. ross. t. p. 46. t. 35. Hab. in summis alpinis Caucasi. h

8. *chrysanthum*, fol. oblongis scabris, subtus discoloribus glabris, umbellis terminalibus, cor. rotatis, petalis obovatis irregularibus. Willd. Lin. suppl. 237. Pall. it. 3. p. 369. app. t. N. f. t. 2. Gmel. sib. 4. p. 121. t. 54. Hab. in Sibiriae alpinis, etc. Frutex parvus diffusus. Fol. venoso-reticulata. Rami squamis stipulaeformibus ferrugineis tecti. Flos luteus. L.

9. *ponticum*, fol. oblongis glabris utrinque concoloribus, corymbis terminalibus, cor. campanulato-rotatis, petalis lanceolatis. Willd. Jacq. ic. rar. t. 78. Pall. ross. t. p. 43. t. 29. Lam. ill. t. 364. Hab. in Oriente et Gibraltariae subhumidis umbrosis.

Obs. Cal. lacin. brevissimae, acutae. M. Plerumque in hortis haecce species, nec sequens, colitur.

10. *maximum*, arborescens, fol. subcuneato-oblongis coriaceis glabris, cal. lacinii ovatis obtusis, cor. subcampanulata. Mich. t. p. 259. Cfr. L. et Willd. p. 607. Hab. in Amer. boreali. Fol. subtus pallidiora, laevia, juniora subtomentosa. Flor. magis congesti. Frut. tener.

11. *catabiense*, fol. brevioralib. utrinque rotundato-obtusis, cor. campanulata, cal. lacin. elongatis. Michaux. Flor. t. p. 258. Hab. in montib. excelsis Carol. septentrion. juxta originem amnis Catayba.

ERICOIDEA, s. bicornia Decandra.
(Gen. 1086-92.)

1086. **VACCINIUM.** *Cal.* superus. *Cor.* urceolata aut campanulata, 4-5-fida: lacinii reflexis. *Filam.* germini inserta. *Bacca* 4-5-locularis, polysperma. (*Stam.* quibusdam 8.)

* *Flor. subsolitariis.*

1. *Myrtillus*, pedunc. 1-floris, fol. serratis ovatis deciduis, caul. angulato. L. Engl. bot. t. 456. Hab. in ericetis, sylvaticis arenosis. Var. *bacca alba*. *Stam.* 8-10.

2. *myrtilloides*, pedunc. 1-floris, fol. lanceolatis integris, margine pubescentibus membranaceis. Michaux. t. p. 234. Hab. in Amer. boreali. Facie praecedentis.

3. *uliginosum*, pedunc. 1-floris, fol. obovatis lanceolatisque glabris, ramis teretibus. Engl. bot. t. 681. Flor. Dan. t. 231. Hab. in paludosis montosis. *Stam.* 8-10. Caul. erectus.

* *sednense*, pedunc. 1-floris, fol. obovalibus integris, caul. decumbente ramosissimo. Hab. in montosis, siccis graminosis, (in monte Danzel et de Seyne, dép. Basses-Alpes). Clarion. A *V. uliginoso* specie differre videtur. Fol. nonnulla subemarginata.

4. *caespitosum*, pusillum multicaule, flor. solitariis subsessilibus, fol. obovalibus serratis. Michaux. l. c. Hab. circa sinum Hudson. Frut. 2-4-uncialis. *Stam.* 8.

5. *cereum*, pedunc. 1-floris, cor. 5-angulatis, fol. ovato-subrotundis, serratis. Forst. Lin. suppl. p. 238. sub Androm. Hab. in ins. Tahiti.

6. *hirtum*, pedunc. unifloris, fol. ovatis serratis, ramis teretibus divaricatis. Hab. in Japonia. Ramosissimum. Ramuli apice villosi. Cor. campanulata.

7. *stamineum*, pedunc. solitariis nudis unifloris, antheris cor. longioribus. foliis oblongo-ovatis acutis integerrimis, subtus glaucis. Ait. Andrew. t. 263. Mich. Flor. 1. p. 227. Hab. in America septentr. Fol. albicantia ovalia. R. h

8. *album*, pedunc. simplicibus, fol. integerrimis ovatis subtus tomentosis. L. Hab. in Pennsylvania. Flor. duo vel tres ad apices ramorum. L.

9. *mucronatum*, pedunc. simplicissimis unifloris, fol. ovatis mucronatis glabris integerrimis. L. Hab. in Amer. septentr. Frut. ram. glaucis.

10. *dumosum*, fol. ovatis acutis glabris pedunc. unifloris bracteatis, cor. urceolatis. Andrew. t. 112. Hab. in America bor. Cor. subalbida.

11. *diffusum*, pedunc. solitariis nudis unifloris, fol. ovatis acutis obsolete serratis villosiusculis. Ait. Kew. 2. p. 11. Hab. in Carolin. australi. h

12. *angustifolium*, peduncul. solitariis unifloris, fol. elliptico-lanceolatis glabris obsolete serrulatis. Ait. l. c. Hab. in Terra Nova et Labrador. h

**** Flor. corymbosis aut racemosis.**

13. *corymbosum*, flor. corymbosis ovatis fol. oblongis acuminatis integerrimis. L. V. disomorphum. Michaux. 1. p. 231. et V. *amoenum*. Ait. Kew. 2. p. 22? Andr. t. 138. Hab. in America septentrionali. Fol. nervis subtus villosis. Cor. cylindraceo-ovatae, longiores quam in reliquis.

14. *bracteatum*, racem. foliatis, foliis serratis acutis. Thunb. jap. p. 156. Hab. in Japonia. Fol. margine revoluta, utrinque glabra. Cor. cylindrica alba. h

15. *ciliatum*, racem. foliatis, fol. ovatis integerrimis hispidis. Thunb. jap. 156. Cum priore. Fol. ramca hispida. Cor. rubra.

16. *fuscatum*, racem. nudiusculis, cor. cylindrico-ovatis, calycibus acutis. fol. ellipticis acutis integerrimis, venis subtus villosiusculis. Hab. in Amer.

17. *frondosum*, racem. bracteatis, pedicellis bracteolatis, cor. subcampanulatis, fol. obovato-oblongis integerrimis deciduis. Andr. t. 100? Hab. in Amer. septentrion.

18. *venustum*, racem. bracteatis, pedicellis bracteolatis, cor. subcampanulatis, fol. ellipticis integerrimis deciduis glabris. Hab. in Amer. bor. h

19. *ligustrinum*, racem. nudis, caule fruticoso, fol. crenulatis oblongis. L. Hab. in Pennsylvania. Flor. in racemis, destituti bracteis. L.

20. *resinosum*, racem. bracteatis, cor. ovatis, fol. ellipticis acutiusculis integerrimis deciduis, atomis resinosis irroratis. Ait. Kew. 2. p. 12. *Andromeda baccata*. Wangenh. amer. 11. t. 30. f. 69. Habit. in America boreali. h

21. *glaucum*, fol. sublanceolato-cuneatis integerrimis dilute glaucis, subtus resinosis, racem. laxis, cor. globosis. Mich. Flor. 1. p. 231. Lam. enc. 1. p. 73. Hab. in Pennsylvania, Carolina. Affine V. *resinoso*. Bacca glauco-nigra, edulis. M. h

22. *arborescens*, fol. petiolatis obovatis mucronatis, racem. bracteatis, cor. campanulata, anth. dorso-aristatis. Michaux. p. 230. Hab. in Amer. bor. sylv. subaridis. Arb. 15-20-pedalis. Fol. lucida, punct. glandulosis.

23. *pallidum*, racem. bracteatis, cor. cylindraceo-campanulatis, fol. ovatis acutis serrulatis glabris deciduis. Ait. Hort. 2. p. 18. Hab. in Amer. boreali. h

24. *parviflorum*, fol. lanceolatis undulatis venosis, flor. racem. pedunc. longissimis bracteatis, cor. conica striata. Andrew. t. 125. h

25. *formosum*, fol. integerrimis oblongis acutis glabris, flor. racemoso-fasciculatis subcylindraceis castatis, cal. adpressis. Andrew. t. 97. h

26. *virgatum*, fol. oblongo-ovatis serrulatis, flor. racemoso-fasciculatis axillaribus subcylindraceis, cal. apice-reflexis. Andr. t. 181. Hab. cum 2 antecedentib. in Amer. boreali. h

27. *carnosum*, fol. ovatis serratis crassiusculis, flor. subumbellatis campanulatis. Andr. t. 105. Hab. in Carol.

28. *pennsylvanicum*, fol. sessilib. ovali-lanceolatis serrulatis lucidis, flor. fasciculatis subterminalib. ovatis. Mich. p. 233. Hab. in Pensylv., Georg. Frut. ramosiss.

29. *myrsinites*, fol. sessilib. ovalibus mucronatis subserratis, subtus punctatis, flor. corymbosis sessilib. Lam. enc. 1. p. 73. Mich. p. 233. Hab. in aridis Floridae. Frut. erectus, ramosiss. microphyllus. Cor. purpurea. M.

30. *tenellum*, racem. bracteatis sessilib., cor. ovato-cylindraceis, fol. oblongo-ellip-

tici subeuneiformibus serrulatis deciduis subglabris. Cfr. *V. galczans*. Mich. p. 232. Hab. in America bor. h

31. *Arctostaphylos*, flor. racemosis, fol. crenulatis ovatis acutis, caule arboreo. L. Andrew. t. 30. Tournef. it. 2. p. 223. t. 223. β *cappadocium*, maxima, mespili folio, flore variegato. Tournef. cor. 42. Hab. in Cappadocia et Madera. h

32. *meridionale*. fol. ovato-oblongis acutis serratis perennantibus planis lucidis, racem. terminalib. erectis, cor. prismaticis. Ait. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 676. Hab. in montibus caeruleis Jamaicae. Fruct. *V. Vitis idaeae* sapidus.

33. *Vitis idaea*, racemis terminalibus nutantibus, fol. obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. L. Engl. bot. t. 598. Flor. dan. t. 40. Hab. in sylvis montosis, locis petrosis. h

Obs. *Vaccinia* ab *Andromedis* fructu tantum differunt.

1087. CERATOSTEMA. *Cal.* turbinatus. 5-fidus: laciniis majusculis. *Cor.* coriacea, tubo longo, limbo recto. *Antherae* longae, erectae bipartitae s. bifurcatae. *Bacca* globosa, truncata, coronata, 5-locularis.

γ . *peruvianum*, fol. sessilibus ovalibus, flor. panic. laxa. Hab. in Peru. Flor. magni. Pedunc. bracteati. Just. h

1088. ANDROMEDA. *Cal.* 5-partitus, inferus. *Cor.* ovata: ore 5-fido, reflexo. *Caps.* 5-locularis, valvulis dissepimento contrariis. (Flor. quidam 8-andri.)

* *Foliis oppositis.*

γ . *tetragona*, pedunc. solitariis lateralib., cor. campanulatis, fol. oppositis imbricatis obtusis revolutis. L. Prill. ross. 2. p. 56. t. 73. f. 4. Fl. lapp. 166. t. 1. f. 4. Willd. Sp. II. p. 607. Hab. in alpinis Lapponicis, Sibiricis. h

α . *ericoides*, fol. imbricatis convexis margine setaceo-ciliatis, pedunc. solitariis axillaribus, corollis globosis. Willd. Pall. ross. 2. p. 56. t. 73. f. 3. Hab. in C. mtschatca, in Sibiria. et in summis alpinis Davuriae. *Caps.* 4-5-locularis, 4-5-valvis. h

* *Foliis sparsis.*

3. *hypnoides*, pedunc. solitariis termi-

nalibus, cor. campanulatis, fol. confertis subulatis. L. Flor. dan. t. 10. Fl. lapp. 165. t. 1. f. 1. Hab. in alpinis Lapponicis, Sibiricis. h

4. *lycopodioides*, pedunc. solitariis geminatisque lateralibus, flor. campanulatis octandris, fol. quadrifariam imbricatis. Gmel. sib. 4. t. 57. f. 1. Hab. in Camschatcae montibus circa mare Ochot et in insula Beringii. h

5. *prostrata*, caul. fruticoso humifuso, fol. ovato-acutis glabris sparsis subseratis, pedunc. axillaribus solitariis. Cav. ic. 6. p. 43. t. 562. L. Hab. in Amer. australi.

6. *Myrsinites*, fol. minutis ovato-lanceolatis serratis sparsis, pedunc. solitariis axillaribus brevissimis unifloris. Lam. enc. ill. gen. t. 365. f. 2. *Arbutus Microphylla*. Forst. in Comm. Götting. q. p. 32. Willd. Sp. II. p. 619. Hab. in freti Magellanici sylvaticis, montosis. h

*** *Foliis alternis.*

7. *mariana*, pedunc. aggregatis ramis, cor. ovato-cylindricis, fol. oblongo-ovatis integerrimis deciluis. Duham. ed. nov. p. 177. t. 37. Jacq. ic. rar. 2. t. 465. Collect. 2. p. 326. β . *latifolia*. Hab. in Amer. boreali. In Europa culta ab anno 1736.

8. *ferruginea*, pedunc. aggregatis axillaribus, corollis subglobosis, fol. ellipticis integerrimis subtus squamoso-farinosis. Ait. Kew. 2. p. 67. Hab. in Amer. boreali. h

α *arborescens*, fol. confertiorib. revolutis convexis, flor. numerosis. Michaux. Flor. 1. p. 252.

β . *fruticosa*, ramis saepius flexuosis, fol. distantibus planiusculis, subtus reticulatis, flor. paucioribus. Michaux.

9. *cassinesolia*, pedunc. aggregatis, cor. campanulatis, fol. ovatis dentatis utriusque glabris. Vent. Hort. Cels. p. 60. t. 60. A. speciosa. Michaux. Flor. 1. p. 256. Hab. in Florida.

β . *pulverulenta*, pulvere albo conspersa, qui candor certe morbus est. Michaux. Bertram. it. t. 3. f. 2. Willd. p. 610.

10. *fasciculata*, pedunc. aggregatis, fol. alternis ovato-lanceolatis obtusis subcrenatis coriaceis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 836. Hab. in montib. Jamaicae australioris. h

11. *jamaicensis*, pedunc. aggregatis cor. ovatis dispanis, foliis alternis lanceolatis

lanceolatis obtusis interprimis subtus cinctis. Swartz l. c. p. 138. Hab. in summis montibus Jamaicae. *h*

12. *octandra*, pedunc. aggregatis, cor. cylindricis quadrifidis, fol. alternis ovato-lanceolatis integris. Swartz l. c. p. 840. Cum antecedente. *+*

13. *polifolia*, pedunc. aggregatis, cor. ovatis, fol. alternis lanceolatis revolutis. L. Fl. dan. t. 54. Duham. t. 38. Hab. in uliginosis.

α. latifolia, fol. oblongis, cor. ovatis incarnatis, lacinii calycinis patentibus ovatis albis interdum apice rubicundis. Ait. Kew. 2. p. 68. Hab. in Canada.

β. media, fol. lanceolatis, cor. oblongo-ovatis rubicundis, lacin. calyc. magis erectis. Ait. Hab. in Russia, Siberia.

γ. angustifolia, fol. lanceolato-linearibus, lacinii calycinis oblongis rubris. Ait. Kew. 2. p. 68. Hab. in Terra nova et litt. Labrador. *h*

δ. subulata, fol. linearis-subulatis. Duham. p. 183. Cum priore.

14. *rhomboidalis*, ramis floriferis triquetris, fol. rhomboidalibus lanceolatisque integerrimis cartilagineis glabris, gland. terminatis, pedunc. axillarib. aggregatis. Duham. l. c. p. 192. Hab. in Carolina et Florida.

15. *salicifolia*, racemis secundis nudis, cor. subcylindricis, fol. lanceolatis acutis integerrimis trinerviis. Lam. enc. 1. p. 158. Hab. in ins. Mauritiis. Fol. Lauri sassafr. fere, subtus alba, trinervia. *h*

16. *buxifolia*, racemis secundis nudis, cor. subcylindricis, fol. cordato-ovatis integerrimis mucronulatis (erectis). Smith. ic. ined. t. p. 59. t. 59. Lam. l. c. Hab. in insula Borboniae. Frut. 6-7-pedalis. Panic. pubescens.

17. *pyrifolia*, orborecens, cort. striato-sulcato, fol. ovato-acuminatis. Cresc. cum antecedente. Arb. 20-pedalis. Flor. unicolores obscure purpurei. Panic. glabra. Aubert.

18. *ilicifolia*, fol. cordatis latis coriaceis subdentatis, flor. racemoso-paniculatis. Hab. in Peruvia (mis. D. Lagasca). Fol. breviter petiolata, juniora ovata, integerrima, majora versus basin dentibus distantibus. Fract. non vidi. *h*

19. *rubiginosa*, fol. ovatis compactis integerrimis obtusis subtus pubescentibus. ju-

niorib. rubiginosis, racem. lateralib. erectis, cor. cylindricis. Hab. in ins. St.-Thomae. Fol. superne venis prominulis, quadrantibus referunt fol. Sal. Capr. ae. *h*

20. *japonica*, racemis secundis paniculatis terminalibus, fol. lanceolato-obovatis acutis apice serrulatis. Willd. Habit. in Japonia. *h*

21. *arborescens*, panic. terminalibus, cor. subpubescentibus, fol. ellipticis acuminatis denticulatis. Ait. Kew. 2. p. 63. Arb. 50-60-pedalis. Habit. in Virginia, Carolina. Var. fol. glabris et villosis. Anth. muticae.

22. *paniculata*, flor. paniculato-racemosis terminalib. pubescentib. nudiusculis, fol. ovatis-acutis integris. A. paniculata. Michaux. p. 254. et Aiton? A. parabolica. Duham. ed. nov. p. 191. Flor. conferti, parvi, subrotundi. Var. fol. subtus pubescentibus. Hab. in Virginia, Carolina. An hoc A. racemosa L.? sed flor. non racemosi, uti in sequente.

23. *racemosa*, racemis secundis bracteatis simplicibus nudis, cor. gibboso-cylindricis, fol. alternis oblongis serratis. L. Michaux. p. 256. A. paniculata. Duham. l. c. Hab. in Pennsylvania et Marylandia. Cor. cernuae, oblongae, ut in A. axillari tere. *h*

24. *axillaris*, racemis axillarib. simplicibus, cor. oblongis, fol. ovatis acutis serrulatis. Duham. arb. ed. nov. p. 186. t. 39. A. Catestaei. Walt. Willd. p. 613. Hab. in Virginia, Carolina. *h*

25. *acuminata*, racemis axillarib. simplicibus, fol. ovato-lanceolatis acuminatis serratis integrisque, cor. cylindricis. Duham. l. c. t. 32. Ait. 2. p. 70. A. lucida. Jacq. ic. rar. 1. t. 79. Collect. 1. p. 95. A. populifolia. Lam. enc. Hab. in America bor. *h*


26. *marginata*, ramis triangularibus, fol. ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis marginatis nitidis, pedunc. axillarib. aggregatis simplicibus. Duham. p. 188. t. 70. A. coriacea. Ait. A. lucida. Lam. Hab. in Car. et Florida prope rivos. *h*

27. *rupestris*, racemis simplicissimis bracteatis, cor. campanulatis, fol. alternis oblongis serrulatis. Forst. prod. n.º. 195. Hab. in N. Zeelandia. *h*

28. *calyculata*, racemis secundis foliaceis, cor. subcylindricis, fol. alternis lanceolatis obtusis punctatis. L. Lam. ill. t. 365. f. 4. Hab. in Amer. septent.

29. *latifolia*, cor. oblongo-cylindraceis, fol. oblongo-linearibus obtusis. Duham. l. c. p. 189. t. 31. Cresc. in Terra nova.

h h



Y. angustifolia, cor. oblongo-ovalibus, fol. oblongo-lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 70. Hab. in Amer. boreali inque Sibiria. h

29. *anastomosans*, fol. ovatis subseratis, subtus anastomosibus punctatis. Lin. suppl. 237. Hab. in N. Granada. Caul. villosus. Fol. rigida, venosa.

30. *bracteata*, fol. ovato-acutis, racem. terminalibus bracteatis, caul. hirsuto. Cav. ic. 6. p. 42. t. 562. f. 1. Cum sequente in Amer. australi, in monte Chinborago. Flor. hirti.

* *glomerata*, fol. ovato-acutis, racem. axillaribus glomeratis, cor. glabris, bract. pedunc. longiorib. Cav. l. c. Auct. in dubio est, an eadem sit ac 29. species.

31. *eriphylla*, racem. secundis terminalibus bracteatis, cor. ovatis, fol. subrotundo-ovatis utrinque tomentosis, glandul. terminatis. Vandelii Flor. Lusit. et Bras. Specim. Hab. in Brasiliæ montosis.

1089. *EPIGÆA*. *Cal.* exterior 3-phyllus: interior 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis. *Caps.* 5-locularis: *Recept.* 5-partito.

1. *repens*, fol. cordato-ovatis integerrimis reticulatis, cor. cylindricis. Willd. p. 615. Andrew. Repos. t. 102. Lam. ill. t. 367. f. 1. Hab. in Virginiae, Canadae pinetis. Flor. fragranter. h

2. *cordifolia*, fol. cordatis subrotundis serratis convexis hispidis rigidis, cor. ovatis. Swartz prod. 73. Fl. ind. occid. 2. p. 842. Lam. ill. t. 367. f. 2. Hab. in mont. Guadeloupæ, inque Cajenna. h

1090. *GAULTHERIA*. *Cal.* exterior 2-phyllus: interior 5-fidus. *Cor.* ovata. *Nectar.* mucronibus 10. *Caps.* supera, 5-locularis, vestita calyce interiore baccata.

1. *procumbens*, fol. oblongo-ovatis mucronatis dentatis confertis, caule procumbente flexuoso glabro. Andrew t. 116. Lam. ill. t. 367. Fol. Thæe succedaneum. Hab. in Canadae sterilibus arenis. h

2. *erecta*, fol. ovatis mucronatis, caul. erecto, flor. racemosis. Vent. Hort. Cels. p. 5. t. 5. Hab. in Peru. Viscoso-glandulosa. Fol. margine revoluta, subdenticulosa. h

3. *buxifolia*, fol. subrotundo-ovatis dentatis subtus punctato-cabris, pedunc. solitariis axillarib., ramis hirtis erectis. Willd.

in N. act. soc. Berol. 4. Hab. in summo monte Caracas, cum asequentibus.

4. *scabra*, fol. ovato-cordatis acutis dentatis scabris, racem. axillarib. bracteatis. Willd. l. c. Sempervirens. Cal. baccas ater. h

5. *odorata*, fol. obovatis obtusis serratis subtus punctato-scabris, racem. terminalib. bracteatis. Willd. l. c. Semperv. Fol. beneolentia. h

6. *antipoda*, fol. sparsis subrotundis serratis dentatis glabris, caule fruticoso diffuso, ramis pubescentibus. Forst. prod. n°. 196. Hab. in N. Zealandia. h

1091. *ARBUTUS*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ovata, basi pellucida. *Bacca* supera, 5-locularis.

1. *Unedo*, caule arboreo, fol. glabris obtuse serratis, panicula terminali, baccis polyspermis. Lin. Lam. ill. t. 366. f. 1. Mill. dict. t. 48. f. 1. 2. *β. turbinata*, fructu turbinato. Tournef. Hab. in Europæ australis et Orientis sylvis. h

2. *laurifolia*, arborea, fol. oblongis utrinque acuminatis acute serratis glabris, racem. axillarib. secundis sessilib. solitariis. Hab. in America septentrionali. Similima A. Unedoni. h

3. *Andrachne*, caul. arboreo laevi, fol. glabris integerrimis serratis, baccis polyspermis, panicul. nuda. Lam. enc. t. p. 226. Ehret. act. angl. vol. 67. t. 6. Hab. in Orient. Caul. epidermide denudatus. h

4. *integrifolia*, caul. arboreo, fol. ovatis integerrimis mucronatis, racem. terminalib. foliosis. Lam. enc. t. p. 227. A. folio non serrato. Bauh. Tournef. Cor. 41. *Andrachne* veterum. Hab. in Candia, ad montem Ida. Ram. cortice deciduo demum denudati, nisi in antecedente. † h

5. *ferruginea*, arborecens, fol. oblongis obtusis glabris integerrimis, racemis terminalibus. Hab. in America. Cor. magis elongata fere ut in *Andromeda*.

6. *acadiensis*, caul. procumbentibus, fol. ovatis subserratis, flor. sparsis, baccis polyspermis. L. Cfr. A. *lanceolata*. Lam. l. c. Hab. in Acadia. h

7. *alpina*, caul. procumbentibus, fol. rugosis serratis. L. Fl. dan. t. 83. Light. Scot. t. 11. f. a. b. Hab. in alpinis petrosis. Bac. 9-spermae.

8. *Uva ursi*, caul. procumbentibus, fol. integrerrimis. L. Fl. lapp. t. 6. f. 3. Fl. dan. t. 33. Hab. in Europa frigida, Canada. Baccae 5-spermae. h

9. *mucronata*, caule fruticoso, fol. alternis ovatis serratis mucronatis, pedunc. axillaribus unifloris. Lam. ill. t. 366. f. 2. Hab. in Tierra del Fuego. Frut. rigidissimus. Flor. cernui. h

10. *pumila* (empetrifolia), caulih. diffusis, fol. alternis distichis oblongis integerrimis, flor. lateralibus solitariis. Lin. suppl. 239. *Andromeda empetrifolia*. Lam. Willd. p. 609. Cum priore. Forst. in Comm. goett. g. p. 32. Fol. fere Empetri. h

11. *phyllireae-folia*, caul. ramosissimo, fol. lanceolatis acuminatis acute serratis, flor. axillaribus. Hab. in Peru. Herb. Juss. Fol. parvula. h

1092. CLETHRA. Cal. 5-partitus, persistens. Petala 5. Stylus apice 3-fidus, persistens. Caps. 3-locularis, 3-valvis, cal. cineta. (Flor. spicati.)

1. *scabra*, fol. latis obcordatis scabris, subtus villosis. Hab. in Amer. (Herb. Juss.)

2. *alnifolia*, fruticosa, fol. obovato-lanceolatis, racemis spiciformibus, calycib. acutis, bract. flor. breviorib. persistentibus. Ait. Kew. 2. p. 73. Lam. ill. t. 369. Doham. arb. 1. p. 176. t. 71. Hab. in Amer. boreali.

3. *incana*, fol. ovatis acuminatis, subtus incano-tomentosis. C. tomentosa. Lam. enc. 1. p. 46. C. alnifolia. β . pubescens. Ait. An tantum prioris var.?

4. *acuminata* (glauca), arborescens, fol. ovalib. aut basi cuneatis acuminatis serratis, subtus glaucis, spicis subsolitariis, bract. flor. longioribus deciduis. Michaux. Flor. 1. p. 260. Hab. in Carol. montib.

5. *paniculata*, fol. lanceolato-obovatis serratis glabris, panic. angustata bracteata. Willd. Ait. Kew. 2. p. 73. Cum priore. h

6. *arboorea*, arboorea, fol. oblongo-lanceolatis utrinque glabris serratis racem. spiciformibus, calycib. obtusis. Kew. 2. p. 73. Veni. Hort. Malmaison. t. 40. Hab. in Madera. Frut. 6-8-pedalis.

7. *tinifolia*, arboorea, fol. oblongo-lanceolatis integerrimis subtus incanis, racem. paniculatis spiciformib. tomentosis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 845. Tinus occidentalis. Lin. Brown. jam. 214. t. 21. f. 1. Sloan. hist. 2. t. 198. f. 2. Hab. in montib. Jamaic. australis. h

1093. CUELLARA. Cal. 5-partitus. Petala 5, aequalia. Stylus 3-gonus. Caps. trigona, 3-locularis. Semina imbricata, membranacea.

1. *revoluta*, fol. oblongis denticulatis, basi revolutis excavatis. Syst. veg. Flor. Per. et Chil. p. 103. Hab. in Peruv. nemorib. Arb.

2. *ferruginea*, fol. oblongis integerrimis acuminatis basi laeviter excavatis. l. c. Frutex crescens in montib. frigidis et nemorosis.

3. *obovata*, fol. obovatis rugosis denticulatis. Syst. l. c. p. 104. Arb. excelsa, ligno valde duro.

1094. PYROLA. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 5-locularis, angulis dehiscens.

1. *rotundifolia*, fol. obovalibus, staminibus adscendentibus, pistillo declinato. L. Flor. dan. t. 110. Lam. ill. t. 367. f. 1. Hab. in sylvaticis.

2. *azarifolia*, fol. reniformibus, pistillo declinato. Michaux. Flor. 1. p. 251. Hab. in Amer. boreali. Scap. squamis convolutis.

3. *minor*, floribus racemosis dispersis, staminib. pistillisque rectis. L. Flor. dan. t. 55. Engl. bot. t. 158. Hab. in sylvaticis. Priore rarior.

4. *secunda*, racemo unilaterali, pistil. recto. Gmel. sib. 4. p. 129. t. 56. f. 2. Fl. dan. t. 402. Hab. in Europae bor. sylvis. h

5. *uniflora*, fol. suborbiculatis, scapo unifloro. L. Fl. dan. t. 8. Engl. bot. t. 146. Hab. in sylvis abietinis. Flor. odorati. h

6. *umbellata*, fol. lanceolatis, pedunculis subumbellatis. L. Lam. ill. t. 367. f. 2. Hab. in Europae, Asiae et Amer. septentrionalis sylvis. h

7. *maculata*, fol. oppositis subpetiolatis, pedunc. bifloris. L. Pluk. mant. 157. t. 349. f. 4. Hab. in Amer. septentrion. sylvis. Fol. maculis albidiorib. picta. h

1095. STYRAX. Cal. campanulatus, subinteger, inferus. Cor. 5-7-partita: tubo brevi, cal. inserta. Drupa 1-2-sperma, coriacea. (Stam. 6-16, cor. tubo inserta. Anth. oblongae lineares.)

1. *officinale*, fol. ovatis subtus villosis, h h 2

racemis simplicibus folio brevioribus. Ait. Kew. 2. p. 75. Willd. Sp. II. p. 623. Cavan. Diss. 6. p. 338. t. 182. f. 2. Lam. ill. t. 369. Hab. in Syria, Judea, Italia. *h*

2. *grandifolium*, fol. obovatis subtus villosis, pedunc. inferioribus axillaribus solitariis unifloris. Ait. Kew. 2. p. 75. S. officinale. Walt. carol. 140. Hab. in Carolina australi. *h*

3. *Benzoin*, fol. oblongis acuminatis subtus tomentosis, racemis compositis longitudine foliorum. Dryand. in Act. angl. 77. p. 308. t. 10. Hab. in Sumatra. Ex hac arbore resina Benzoin dicta. Willd. *h*

4. *laevigatum*, fol. oblongis utrinque glabris dentatis, pedunc. axillarib. unifloris solitariis binisve. Ait. Kew. 2. p. 75. S. glabrum. l. c. 188. f. 1. S. americana. Lam. enc. 1. p. 8. f. 5. Hab. in Carolina australi. Stam. 8. *h*

1096. INOCARPUS. *Cal.* bifidus. *Cor.* infundibuliformis, lacin. lineares. *Stam.* duplici serie. *Drupa* monosperma, maxima.

1. *edulis*. Lin. suppl. 239. Forst. N. gen. n^o. 33. Lam. ill. t. 362. Rumph. 1. t. 65. Hab. in India. Arb. Fol. alterna subcordata. Spicae axillares, hirsutae. Flor. parvi, bracteis suffulti. L.

1097. SAMYDA. *Cal.* 5-partitus, coloratus. *Cor.* nulla. *Nectar.* campanulatum, staminiferum. *Caps.* intus baccata, 4-valvis, 1-locularis. *Semina* nidulantia. (Stam. 8, 12 et plura.)

1. *nitida*, flor. octandris, fol. cordatis glabris. L. Willd. p. 624. Brown. jam. 217. t. 23. f. 3. Hab. in America. *h*

2. *macrophylla*, flor. octandris, fol. ovatis acutis glabris, axillis venarum subtus villosis, corymbo terminali. Willd. p. 625. Hab. in India orientali. Stigma pilosum. Fruct. ignotus. *h*

3. *multiflora*, flor. octandris, fol. oblongis dentatis utrinque attenuatis, subtus tomentosis, pedunc. unifloris aggregatis axillaribus. Willd. Cavan. ic. 1. p. 48. t. 67. Hab. in ins. St. Dominici. *h*

4. *villosa*, flor. decandris, fol. oblongis subseratis basi obliquis, sericeis, sulcis villosis, pedunc. solitariis axillarib. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 758. Hab. in montibus Jamaicae. *h*

5. *glabrata*, flor. decandris, fol. ovato-lanceolatis integerrimis nitidis, pedunc. axillaribus unifloris. Swartz. l. c. 2. p. 760. Hab. in montib. Jamaicae australis. Cum S. nitida non confundenda. Sw. *h*

6. *spinescens*, flor. decandris terminalibus, fol. lanceolato-ovatis obtusis crenatis glabris, ramis patulis spinescentib. Swartz. l. c. 2. p. 762. Hab. in Hispaniola. *h*

7. *pubescens*, flor. dodecandris, foliis ovatis subtus tomentosis. L. Hab. in America. *h* +

8. *serrulata*, flor. dodecandris, foliis ovato-oblongis serrulatis. L. Jacq. Collect. 2. p. 328. t. 17. f. 1. Plum. gen. 4. ic. 146. f. 2. Hab. in America. *h*

9. *polyandra*, flor. polyandris. Willd. p. 626. Melissaurum distichum. Forst. gen. n^o. 72. Hab. in N. Caledonia. *h* +

1098. CASEARIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Nectar.* 4-5-phyllum, cum staminibus alternans. *Caps.* intus baccata, 3-valvis, 1-locularis. *Sem.* nidulantia. (Stam. quibusdam 8.)

* *Flor. octandris.*

1. *spinosa*, flor. octandris, fol. ovatis serratis glabris, pedunc. axillarib. unifloris, ramis spinosis. Willd. Sp. II. p. 626. Hab. in montosis Domingo. *h*

2. *nitida*, flor. octandris, fol. ovatis crenatis glabris, cymis pedunculatis axillarib. Willd. Jacq. amer. ed. picta. Act. helv. 8. p. 58. t. f. 4. Hab. in Carthagenae fruticetis. *h*

3. *ramiflora*, flor. octandris, fol. ellipticis serratis utrinque glabris, ramis floriferis. Iroucana gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 320. t. 127. Lam. ill. Athenaea. Schreb. Hb. in ins. St. Crucis, et ad littora maris Gujanicae, Cajennae. *h*

4. *hirta*, flor. octandris, fol. ovatis serratis subtus hirtis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 756. Hab. in pascuis sylvaticis Jamaicae. *h*

** *Flor. decandris.*

5. *parviflora*, flor. decandris, fol. oblongis acuminatis crenulatis utrinque glabris nitidis, pedunc. confertis axillarib. unifloris. Willd. p. 627. Samyda parviflora. L. Sloan. list. 2. p. 108. t. 211. f. 2. Hab. in fruticetis Amer. calidioris. *h*

6. *parvifolia*, flor. decandris, fol. ovatis acuminatis serratis glabris, pedunc. unifloris aggregatis lateralibus. Willd. C. decandra. Jacq. amer. t. 133. t. 85. Hab. in montib. sylvaticis Martinicae. Divers. a praecedente. h

7. *sylvestris*, flor. decandris, fol. ovatis acuminatis integerrimis, ramis virgatis, pedunc. axillaribus confertissimis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 752. Hab. in sylvis montosis Indiae occidentalis. h

8. *macrophylla*, flor. decandris subtomentosis, fol. elliptic. acuminatis subcrenatis. Pitumba cujanensis. Aubl. guj. 2. app. 29. t. 385. Hab. in Cajenna. Rami griseo punctati. h

9. *serrulata*, flor. decandris, fol. ovato-lanceolatis obtusis serrulatis, ramul. flexuosis, pedunc. axillaribus confertissimis. Sw. Fl. ind. occid. 2. p. 754. Hab. in Indiae occidentalis insula Nevis. h

10. *elliptica*, flor. decandris, fol. elliptico-lanceolatis obtusis subseratis, juniorib. subtus pubescentibus, pedunc. axillaribus confertis. Willd. Anavinga lanceolata. Lam. enc. 1. p. 146. Ejusd. ill. gen. t. 355. f. 1. Hab. in India orientali. h

11. *Anavinga*, fol. alternis ovatis acuminatis serrulatis, baccis globosis pedunculo aequalib. Lam. 1. c. sub Anavinga. Rheed. 4. t. 49. Hab. in India orientali. Flores octandri? h

12. *hirsuta*, flor. decandris, fol. ovatis acuminatis dentato-serratis hirtis, subtus villosis, pedunc. lateralibus confertis. Sw. Fl. ind. occid. 2. p. 755. Hab. in montibus Jamaicae et Hispaniolae. h

1099. CRATERIA. Cal. 5-partitus.

Cor. o. Nectarium crateriforme, setis 10, distinctum hirtis coronatum, et cui stamina, alterna breviora, inserta. Stigmata 3. Fruct. ...? (Pericarp. 1-loculare? exsuccum?)

1. *fasciculata*, fol. oblongis serratis acuminatis, flor. fasciculatis. Chaetocrater. Syst. veg. Flor. Peruv. et Chilens. p. 106-107. Hab. in Peru in Chinchao. Arb. 4-orgyalis. Fol. sulamara, col. ochraceum suppeditat.

2. *capitata*, fol. oblongis serratis acuminatis, flor. capitatis. Chaetocrater capitatum. 1. c. p. 109. Cum priore. Arb. triorgyalis.

Obs. A priore genere praesertim nectario, quod in hoc setis decem, nec lacinis 5-ovatis uti in *Casaria* distinguitur, forte et fructu differt, qui nondum observatus.

1100. AQUILARIA. Cal. campanulatus, 5-fidus. Cor. o. Nectar. campanulatum. 5-fidum, interne staminiferum. Caps. 2-locularis, 2-valvis, lignosa. Sem. solitaria.

1. *ovata*. Cavan. diss. 7. p. 377. t. 224. A. malacensis. Lam. enc. 1. p. 49. * 2. p. 603. Ej. ill. gen. t. 356. Hab. in montibus Malacca. h

1101. AUGEA. Cal. 5-partitus. Cor. o. Nectar. 10-dentatum. Caps. 10-locularis.

1. *capensis*. Thunb. prod. 80. Hab. ad Cap. b. spei.

ELMAGNET, *decandri* (Gen. 1102-1105.) Flor. sunt incompleti. Cal. tubulosus, superus, cui stamina inserta. Styl. 1. Fruct. baccatus, aut drupaceus 1-spermus. Frutices vel arbores sunt, fol. plerumque alternis.

1102. BUCIDA. Cal. 5-dentatus, superus. Cor. o. Bacca 1-sperma, coronata.

1. *Buceras*, spicis elongatis, fol. cuneiformib. glabris. Vahl. eclog. 1. p. 50. Lam. ill. t. 356. Hab. in Jamaica. Fruct. saepe in cornua longa spongiosa excrescunt. h

2. *capitata*, flor. capitato-spicatis, fol. cuneiformib. margine villosis-ciliatis. Vahl. eclog. 1. p. 50. t. 8. Hab. in Montserrat. h

1103. TERMINALIA. Cal. 5-fidus, intus villosus, patens. Cor. o. Drupa infera, compressa, carinata, 1-sperma. (Flor. racemosi.)

1. *Catappa*, fol. obovatis crenulatis subtus tomentosis. Lam. enc. 1. p. 348. Rheed. 4. t. 3. et 4. Hab. in Malabar. Arb. procera, pyramidalis.

2. *moluccana*, fol. obovatis integerrimis utrinque glabris. Lam. 1. c. p. 349. Catappa. Rumph. 1. t. 68. Hab. in Moluccis, Java. Arb. praecedenti affinis.

3. *mauritianae*, fol. oblongo-lanceolatis obsolete crenatis glabris, stam. calyce longioribus. Lam. 1. c. Hab. in ins. Mauriti et Bourboniae, ubi inter arbor. maxima, et resinosa. Commers. *Le faux Benjoin* incolis.

4. *Benzoe*, fol. angusto-lanceolatis subrepandis pilosis sanguineo-venosis. Lam.

H h 3

l. c. T. angustifolia. Jacq. hort. vind. 3. t. 100. Croton Benzoe. Lin. Hab. in Ind. orientali. Arb. succum lacteum stillans, et resinam Benzoin sistens.

5? *Vernix*, fol. lanceolato-linearibus glabris. Lam. p. 350. Rumph. anal. 2. p. 259. t. 86. Hab. in montosis Chinae, Molluc. Ex hac vernix Chincensium.

6. *Chebula*, fol. ovatis integerrimis nudis, petiol. superne biglandulosi. Retz. obs. 5. p. 31. Hab. in Ind. montibus. Pedunc. racemosi, flor. verticillatis.

7. *arbuscula*, fol. ovato-lanceolatis integris pubescentibus, ramis dichotomis, racemis erectis. Swartz. prodr. p. 68. Hab. in Amer. meridion.

1104. **CHUNCHOA**. *Cal.* 5-fidus, campanulatus, superus, deciduus. *Cor.* o. *Drupa* 1-sperma, inaequaliter alata. (Cfr. Juss. gen. pl.)

1. *obovata*, fol. obovatis acuminatis, spicis pendulis, caps. 5-alatis. *Gimbernatio* obovata. Flor. Per. et Chil. Syst. p. 274. Hab. in Peruviae nemorib. Arb. 40-ulnaris, ligno durissimo.

2. *oblonga*, fol. oblongis, spicis congestis, caps. dipteris. *Gimb.* oblonga. Flor. Per. etc. p. 375. Cresc. in Poguzo nemorib.

1105. **TANIBUCA**. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, basi 1-bracteatus. Fruct. compressus orbicularis, alatus?

1. *gujanensis*. Aubl. gujan. t. 128. Juss. gen. pl. Arb. Flor. spicato-racemosi. (Vidi fructum, in Herb. ill. Juss., satis magnum, orbicularem.)

D I G Y N I A.

1106. **ROYENA**. *Cal.* urceolatus. *Cor.* 1-petala, limbo revoluta. *Caps.* 1-locularis, 4-valvis.

1. *lucida*, fol. ovatis scabriusculis. L. Willd. Sp. II. p. 631. Lam. ill. t. 370. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequentibus. h

2. *villosa*, fol. cordatis oblongis subtus tomentosis. L. Rami villosi.

3. *pallens*, fol. oblongo-obovatis obtusis glabris. Willd.

4. *glabra*, foliis lanceolatis glabris. L. Comm. hort. 1. p. 125. t. 65.

5. *cuneata*, fol. subcuneato-oblongis pubescentibus nerviis, caul. subvillosi. Lam. enc. 6. p. 322. Hab. in India? Flor. solitarii. Cal. albidus. Cor. purpurea.

6. *hirsuta*, fol. oblongo-lanceolatis villosiusculis. Willd. Lam. ill. l. c. f. 2. Jacq. coll. suppl. 110. t. 13. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h

7. *polyandra*, fol. ellipticis, flor. polyandris polygamis. Lin. suppl. 240.

8. *ambigua*, fol. obovatis villosiusculis coriaceis, flor. pedunculatis polyandris polyginis, cor. 6-7-fidae lacin. obtusis. Vent. Malmis. t. 17. Flor. fulvi, lacin. reflexi.

8. *angustifolia*, fol. lanceolatis acutis subtus pilosiusculis. Willd. Cum priorib.

1107. **HYDRANGEA**. *Cal.* superus, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* 2-locularis, 2-rostris, foramine inter cornua dehiscens.

1. *vulgaris*, (*arborescens*. L.) fol. ovatis glabris, staminib. alternis longioribus, flor. conformibus. Smith. ic. pictae. t. p. 12. Lam. ill. t. 370. f. 1. H. vulgaris. Michaux. Flor. 1. p. 268. Hab. in Virginia et Carolina. Nullatenus arborescit.

2. *nivea*, fol. cordatis, subtus niveo-tomentosis, flor. radiatis. Michaux. l. c. H. *radiata*. Willd. p. 614. Lam. l. c. f. 2. Cum priore.

1108. **CUNONIA**. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* bilocularis, acuminata, polysperma. *Styli* flore longiores.

1. *capensis*. L. Lam. ill. t. 371. Burm. afr. 259. t. 96. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. opposita, pinnata. Racemi terminales, bini. h

1109. **TRIANTHEMA**. *Cal.* sub apice mucronatus. *Cor.* o. *Stam.* 5 s. 10-12. *Styli* 1-2. *Germen* retusum. *Caps.* circumscissa, 2-locularis: loculis 2-spermis. (Flor. axillares.)

1. *monogyna*, flor. pentandris monogynis. L. Lam. ill. t. 375. f. 1. Herm. par. 213. t. 213. Hab. in Jamaica, Curassao. ☉

2. *crystallina*, flor. pentandris monogynis congestis, fol. ovalibus, caule fruticoso. Popularis. Forsk. descr. 69. Hab. in Arabia et in India orientali. h

3. *pentandra*, flor. pentantris digynis. L. Lam. ill. t. c. f. 2. Hab. in Arabia. Fol. petiolata, elliptica. Flores plures. ☉

4. *humifusa*, monogyna, fol. lanceolatis, caule frutescente tereti. Thunb. prot. 80. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

5. *anceps*, monogyna, fol. lanceolatis, caule frutescente ancipiti. Thunb. prod. 80. Cum priore.

6. *decandra (glinoides)*, flor. sublecanthis digynis. L. Zalcia. Burm. in l. 110. t. 31. f. 3. Hab. in India. Statura Glini. Filam. 10, rarius 1. Fruct. in congeneribus.

1110. **CHRYSOSPLENIUM**. Cal. 4-
s. 5-fidus, coloratus. Cor. o.
Caps. birostris, 1-locularis,
polysperma. (Flor. laterales 8-
andri.)

1. *alternifolium*, fol. alternis. L. Flor. dan. t. 366. Hab. in opacis humentibus, sylvis. Vere.

2. *oppositifolium*, fol. oppositis. L. Flor. dan. t. 365. Hab. ad rivulos in montosis.

1111. **SAXIFRAGA**. Cal. 5-partitus.
Cor. 5-petala. Caps. 2-rostris,
1-locularis, polysperma.

* *Fol. indivisis radicalibus, caule subnudo.*

1. *pyramidalis*, fol. radicalibus rosulatis lingulatis latiorib. obovatis serratis parulis, panic. composita recta. Lapeyrouse. Flor. d. Pyrenæes. (Saxifr.) 1. p. 32. t. 11. f. 2. S. *Cotyledon*? L. Willd. Sp. II. p. 638. Flor. dan. t. 241. Lam. ill. t. 372. f. 3. Hab. in alpinis.

2. *recta*, fol. radicalib. rosulatis strictis glaucis supinis: incisuris cartilagineo-argenteis, panic. simplici. Lapeyr. l. c. p. 33. Moris. s. 12. t. 9. f. 19. fig. mala. Pluck. Phytog. t. 221. f. 1. Hab. in rupium fissuris.

3. *Aizoon*, fol. radicalib. rosulatis cartilagineo-serratis brevibus rotundatis verticillibus, flor. cymosis. Lapeyr. p. 33-34. Jacq. austr. 5. t. 438. Borel. ic. t. 1310. Hab. cum præcedentibus. Cal. glaber.

4. *longifolia*, fol. radicalibus rosulatis linearisublanco-latis integris longissimis, basi subieretibus, caul. paniculato nutante. Lapeyr. p. 26. t. 11. Hab. in Pyrenæis, ad præcipitia. Caul. 1-3-pedalis, multiflorus. Petal. alba punct. purpureis.

Obs. Quatuor hae species sub S. *Cotyledone* L. olim confundi sunt.

5. *mutata*, fol. radicalibus aggregatis lingulatis margine cartilagineis repandis, caul. racemoso folioso, calycib. glanduloso-pilosis, petalis linearis-lanceolatis. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 466. Curt. mag. 351. Hab. in alpinis. Fol. basi ciliato-plumosa. Lapeyr. S. *Cotyledoni* affinis, sed flores quadruplo majores, crocei nec albi. W.

6. *caliciflora*, fol. radicalibus rosulatis ligulatis integerrimis, petal. staminibusque intra cal. clausis. Lapeyr. l. c. p. 28. t. 12. Hab. in Pyren. saxis calcareis. S. *media*. Gouan. obs. p. 27. altitud. 1-5-uncialis. Petal. rosca rotundata, cal. breviora. L.

7. *Arctioides*, fol. radicalibus rosulatis integris, flor. capitatis, petal. linearib. obtusis crenulatis. Lapeyr. l. c. Cresc. in rupum fissuris. Caul. 1-2-unc. Petal. flava. Facie Arctiae. An huc S. *Aizoides*? L.

8. *luteopurpurea*, fol. radicalibus rosulatis integris, flor. paniculatis, cal. campanulato, petal. integris connatis. Lapeyr. p. 29. Hab. in saxis calcareis. Petala lutea. Cal. purpurea. Non est hybrida.

9. *pennsylvanica*, fol. lanceolatis denticulatis, caule nudo paniculato, flor. subcapitatis. L. Hab. in Amer. boreali. Fol. subpilis articulatis tecta.

10. *hieracifolia*, fol. oblongo-lanceolatis glabris repando-dentatis, caule nudo, pedunculis unifloris aggregatis. Willd. p. 641. Walst. et Kitaib. Plantae rar. Hungar. f. 17. t. 18. Hab. in alpin. Carpathicis, loc. uliginosis. Simillima præcedenti: Fol. tenuissima ciliata, pilis brevibus articulatis. Cal. et cor. flava patentissima. W.

11. *androsacea*, fol. lanceolatis obtusis pilosis, caule nudo bifloro. L. Jacq. austr. t. 389. S. alpina, habitu androsaces, villosa. Hall. Hab. in alpinis. W.

12. *caesia*, fol. linearibus perforato-punctatis aggregatis recurvatis, caul. multifloro. Jacq. austr. t. 374. Scop. carn. t. 15. S. recurvifolia. Lapeyr. l. c. p. 30. Hab. in alpinis. Fol. basi ciliata.

13. *burseriana*, fol. aggregatis imbricatis triquetris subulatis laevibus (glabris), caule subnudo unifloro. L. W. in Jacq. misc. t. p. 152. t. 17. Segu. ver. 3. p. 201. t. 5. f. 2. Hab. in Taurero Rastadiensi, montib. Lessanensibus. Facies Sedi minoris. Caul. rufescenti-hispidus. Fl. lactei, lincis pallidis. L.

H h 4

10. *spinosa*. R. *Burseriana*, fol. rosulatis imbricatis spinoso-ciliatis triquetris, flor. fastigiatis, petal. crispis-reflexis. Lapeyr. p. 35. t. 17. f. 1. Rarissime in Pyrenæis.

11. *tenella*, fol. lanceolatis mucronatis basi ciliatis imbricatis, caule nudiusculo paucifloro, calycibus mucronatis. Willd. p. 643. Wulfen in Jacq. Collect. 3. p. 144. t. 17. Hab. in Carinthiae alpinis. T.

Obs. Accedit ad sequentem sed flor. quadruplo minores, cal. mucronatus et germ. inferum glandulosopilosum. Willd.

12. *bryoides*, fol. lanceolatis mucronatis margine cartilagineis ciliatis, caul. nudiusculo paucifloro, calycibus obtusis. Willd. Jacq. misc. 2. p. 46. t. 5. f. 1. Lapeyr. saxifr. p. 35. t. 8. Hab. in alpinis. Petala flava, maculis fulvis.

13. *sedoides*, fol. aggregatis alternis oppositisque subancolatis, flore pedunculato. L. Jacq. misc. 2. p. 134. t. 21. f. 22. S. muscoides. Allion. ped. n. 1528. t. 61. f. 2. Hab. in alpinis. Trideminis, Carinthiacis. T.

14. *stellaris*, fol. subrhomboides serratis, caule nudo ramoso, petal. aequalibus. L. Jacq. Coll. 1. p. 202. t. 13. Comosa, panicula foliacea. Fl. Japp. 175. t. 2. f. 3. Hab. in montosis alpinis ad latera rivulorum.

15. *leucanthemifolia*, hirsutissima, fol. elongatopathulatis, acute dentatis, caulibus divaricato-dichotomis, panic. capillaribus. petal. inaequalibus. Michaux. Flor. 1. p. 268. Lapeyr. Saxifr. p. 49. t. 13. S. *Clusii*. Gouan. Hab. in Carol. alpinis et in Pyrenæis. Cal. reflexus.

16. *virginica*, pubens, fol. ovalibus obtusis subpetiolatis crenatis, caul. subnudo paniculato, cal. erectis. Michaux. p. 269. Pluck. t. 229. f. 5. Hab. in Amer. bor. Facie *Stellaris*. Affin. S. punctatae.

17. *crassifolia*, fol. ovalibus retusis obtuse serratis petiolatis, caule nudo, panic. conglomerata. Linn. dec. 2. p. 27. t. 14. Gmel. 5. h. p. 166. t. 66. Hab. in alpinis Sibiriae. Fol. bica, palmaria, coriacea. Petala rubra. Flor. vere.

18. *nivalis*, fol. obovatis crenatis subaequilobis, caule nudo, floribus congestis. L. Flor. dan. t. 28. t. 12. Hab. in summis alpinis Spitzbergensis, Lapponicis, Arvonicis, inque Virginia, Canada.

19. *Bellarlii*, acaulis, fol. subrotundis repandis, flore sessili. Willd. Allion. ped.

n. 1536. t. 88. Hab. in rupib. humidis Pedemontanis. T.

20. *davurica*, fol. cuneiformi-rhombicis apice dentatis glabris petiolatis, caule nudo. Willd. Hab. in summis alpinis Davuriae, sub nive. T.

21. *sarmentosa*, fol. subrotundis dentatis pilosis, stolonib. reptantibus, petalis duobus elongatis. Ait. Kew. 2. p. 79. S. *stolonifera*. Jacq. ic. rar. 1. t. 80. Hab. in China, Japonia. Sarmenta ramosa e singulis fol. radicalium, alis copiosa radicantia propaginibus. T.

22. *punctata*, fol. subrotundis dentatis longius petiolatis, caule nudo. L. Moris. hist. 3. p. 478. t. 12. t. 9. f. 17. Hab. in Sibiria. T.

23. *umbrosa*, fol. obovatis subretusis cartilagineo-crenatis, petiol. dilatatis, caule nudo paniculato. L. Mill. ic. 141. f. 2. Lapeyr. l. c. p. 44. t. 16. Hab. in montib. apud Cantabros et in Pyrenæis. Flor. inferi, albi aut rosei, punctati. Caps. ampullaceae. Lapeyr.

24. *hirsuta*, fol. cordato-ovulibus retusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. L. Hab. in Pyrenæis. Cal. reflexus.

25. *cuneifolia*, fol. cuneiformibus obtusissimis repandis, caule nudo paniculato fragili. J. Plant. rar. long. p. 43. t. 44. Lapeyr. Saxifr. p. 45. Hab. in alpinis. Petiol. cartilaginei. Cal. reflexus. Petal. candida, basi macula flava. Stam. per paria eriguntur, et anth. stigmatibus applicant, polline emisso divaricantur. Pl. l. c.

26. *Ceum*, fol. reniformibus dentatis utrinque pilosis aveniis, caule nudo paniculato. L. Lapeyr. p. 46. t. 14. Moris. f. 12. t. 9. f. 12. 65. mala. Hab. in alpinis. Cal. reflexus.

** *Fol. indivisis, caul. folioso.*

27. *caerulea* (*oppositifolia*. L.) fol. confertis ovatis ciliatis oppositis (subalternisque) staminibus pistillisque cor. brevioribus. Lapeyr. Saxifr. p. 36. t. 16. Flor. dan. t. 34. (mediocr.) Hab. in alpinis super saxa, prope nives et gelu. In surculis sterilibus fol. alternata etiam vidi.

28. *biflora* (*rosea*), fol. obovatis omnibus oppositis distantibus, cor. pistillisque cal. duplo superantibus. Lapeyr. l. c. p. 37. t. 18. Allioni pedem. 2. t. 21. f. 1. Willd. p. 648. Cum priore. Flor. 1-3, rosei.

29. *retusa*, fol. imbricatis acutis trigonis basi ciliatis, pistil. staminibusque exsertis.

Lapeyr. p. 38. t. 18. Gouan. Obs. t. 18. f. 1. S. purpurea. Allioni. l. c. t. 21. f. 2. Hab. in Pyrenaeis et alp. pedem. Petala dilate violacea.

33. *spatulata*, fol. spatulatis obtusis ciliatis, caul. prostrato, pedicell. axillariib. unifloris. Desf. atl. t. p. 342. t. 46. f. 2. Hab. in cacum. Atlantis. Cal. ciliatus. Cor. alba, obovata.

34. *aspera*, fol. caulinis lanceolatis alternis ciliatis, caulib. procumbentibus. L. Jacq. aust. 5. p. 44. app. t. 31. Hab. in alpiib. Petala alba ungue luteo. T.

35. *Hirculus*, fol. caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto. L. Flor. dan. t. 200. Gmel. sib. 4. t. 65. f. 3. Hirculus qui Chamae Gistigenus. Clus. cur. 5. Hab. in alpestribus.

36. *autumnalis*, fol. caulinis linearibus alternis ciliatis: radicalibus aggregatis. L. S. Aizoides. L. Smith. brit. 1. p. 432. Hab. in humentibus Borussiae, Angliae, Helvetiae. T.

37. *rotundifolia*, fol. caulinis reniformibus dentatis petiolatis, caule paniculato. L. Lapeyr. p. 50. t. 26. Hab. in alpiib. et montosis ad latera rivulorum. Flor. inferi.

*** *Fol. lobatis aut partitis.*

38. *granulata*, fol. caulinis reniformib. lobatis, caule ramoso, radice granulata. L. Flor. dan. t. 514. Hab. in Europae apricis. Var. flor. pleuis, culta. T.

39. *bulbifera*, fol. palmato-lobatis: caulinis sessilibus, caule ramoso bulbifero. L. Fl. dan. t. 390. Moris. s. 12. t. 9. f. 24. Hab. in Italiae pratis saxosis, inque Norvegia.

* *veronicaefolia*, fol. inferioribus subrosulatis cordatis crenatis, petiol. breviusculis dilatatis, caulin. sessilib. inciso-dentatis acutis, cauleque simplicissimo subvillosa, flor. 2-3-subcapitatis. Hab. in Hisp. et Helv. Rad. subtuberosa. Veron. arvens. refert.

40. *cernua*, fol. caulinis palmatis petiolatis, caule simplicissimo unifloro bulbifero. Flor. dan. t. 22? Fl. lapp. 172. t. 2. f. 4. Hab. in alpiibus Laponicis.

♂? *retusa* petal. retusis. Smith. Brit. 2. p. 453. Engl. bot. t. 664. An ob petala diversa?

41. *rivularis*, fol. caulinis palmatis: summo florali ovato, caule simplicissimo bifloro. L. Flor. dan. t. 118. Hab. ad alpium Laponicarum latera et rivulos. Parvula. ☉

42. *Cymbalaria*, fol. caulinis cordatis trilobis integrisque, caulib. procumbentibus. L. Buxb. cent. 2. p. 40. t. 45. f. 2. Tournef. Cor. 18. t. 32. Hab. in Oriente.

43. *hederacea*, fol. caulinis ovatis lobatis, caule filiformi flaccido. L. Hab. in Creta. ☉

44. *orientalis*, fol. subrotundis quinquelobis, caule ramosissimo procumbente. Willd. Jacq. obs. 2. p. 9. t. 34. Habit. in Oriente. An satis distincta a S. hederacea? W.

45. *cuneata*, fol. inferioribus petiolatis cuneiformibus quinquelobis, caulinis sessilib. lanceolatis, caule ascendente paniculato. Willd. p. 658. Cav. ic. 3. p. 25. t. 248. Hab. in Hispania. Petioli longi.

46. *pentadactylis*, fol. quinquelobis: lobis elongatis linearib. obtusis, stylis subulatis. Lapeyr. Fl. p. 64. t. 40. Hab. in Pyrenaeis ad saxa umbrosa. Pl. duriuscula.

47. *ladaniflora*, fol. multilobis integris, petiol. compressis amplexicaulibus, flor. tubulosis, cal. conicis. Lapeyr. p. 65. S. quinquefida. Lam. Hab. in Pyrenaeis. Tota planta gummi rubescente aromatico oblecta.

♂. *minor*, fol. omnibus trifidis, scapo nudo simplici, flor. capitatis.

48. *palmata*, fol. palmatis enerviis glandulosis, petiol. basi marginatis, flor. tubulosis. Lapeyr. p. 64. t. 41. Cum priorib. ad praecipitia, locis humentibus. Priori affinis sed multo minor. Gland. argenteo-lucidae.

49. *geranioides*, fol. radicalib. reniformibus quinquelobis multifidis, petiol. simplicibus, flor. tubulosis, cal. urceolatis. Lapeyr. p. 66. t. 43. Gouan. obs. t. 18. f. 2. Hab. in alpinis ad saxa humida, ubi cespitem latum efficit.

Obs. Var. scapo simplici nudo, flor. capitatis, et fol. laevissimis, etiam viscosa et odorata ac rigidior occurrit. Lap.

50. *ajugaefolia*, fol. radicalibus palmato-tri-quinquepartitis, caulinis linearib. indivisis, caulib. ad cendentibus multifloris. L. S. scapis lateralibus adscendentibus subbifloris. Lapeyr. p. 56. t. 31. Hab. in Gallio provinciae montibus, et in Pyrenaeis. Scap. 1-2-unc. rubescens. Fol. parva, lacin. lanceolata.

51. *sibirica*, fol. reniformibus palmatis pilosis, caule pedunculisque filiformibus. L. Hab. in Sibiria. Flos majusculus, albus, inferus.

52. *petraea*, fol. petiolatis palmato tripartitis, laciniis subtrifidis, caule flaccido ramosissimo tecumbente, pedunc. longissimis unifloris, petalis marginatis. Wulfen in Jacq. Coll. 1. p. 200. Jacq. ic. rar. 1. t. 81. *S. rupestris*. Willd. p. 653. Hab. in Carinthiae alpinis. ☉

53. *Tridactylites (annua)*, fol. caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. L. Curt. Lond. 2. t. 28. *S. annua*. Lapeyr. p. 39. Hab. in arenosis ad muros. Primo vere. Quoad loca variat. ☉

54. *adscendens*, caul. erecto firmo foliisque subcoriaceis cuneiformibus, apice tri aut quinquedentatis villosis-viscidis. Wulf. in Jacq. Collect. 1. p. 197. t. 11. et 12. f. 1. 2. Lapeyr. Flor. p. 48. t. 11. *S. petrosa*. Vahl. Willd. p. 64. *S. Scopoli*. Villars pr. Hab. in alpinis. Affinis *S. tridactyliti*, etiam viscidis, sed caulis ramosissimus. Fol. lata, palmata. Cor. quadruplo majores. C.

55. *aquatica*, fol. palmato-quinque-partitis, lobis multifidis, caul. paniculato, flor. majoribus, pistill. clavatis. Lapeyr. p. 53. t. 28. *S. adscendens*. Willd. p. 655. *S. petraea*. Gouan. obs. 1. 18. f. 3. (β. caul. virgato, fol. lobis acutis subpinnatis. L. t. 29. Hab. in alpestribus, in aquosis. Caul. succulentus. Planta junior a pastoribus commeditur, etiam a pecoribus appetitur.

Obs. Nomen a Cl. Lapeyrouse huic speciei inditum, utpote loc. ejus natale optime exprimens, praefertur duxi, cum plures species sub nomine *S. adscendens* confundi sint.

56. *capitata*, caul. capitato sphaerico, pedunc. lateralibus inferis, fol. pubentibus rosulatis profunde trilobis: lobo intermedio tridentato. Lapeyr. p. 55. t. 30. Hab. in Pyrenaeis, inter carices et juncos, in aquosis. Caul. 2-3-unc. longa, adscendens. Pedunc. radicalis sub fol. oriens. L.

57. *pedemontana*, caul. erecto subnudo, fol. trilobis et tridentatis, caul. palmatis. Allioni. pedem. 1. t. 21. f. 4. Hab. in montibus pedemontanis. Distincta species. Fol. congesta. Petala ovata.

58. *tricuspidata*, fol. radicalibus congestis cuneiformibus ciliatis tricuspidatis, caul. ascendentibus multifloris. Retz. scand. Ed. 2. Flor. dan. t. 976. Hab. in Groenlandia.

59. *leptophylla*, procumbens, glabra, fol. longe petiolatis trifidis quinquefidisque: laciniis linearib. divaricatis. *S. procumbens* et *hypnoides*. Herb. Juss. cfr. Willd. Sp. II. p. 658. n. 49. Hab. in alpinis. †

60. *Hypnoides (gemmifera)*, caespitosa, caul. erecto subnudo glabro, fol. confertis trifidis, fol. in surculis, apice in gemmam convolutis villosis. *S. hypnoides*. Lapeyr. p. 57. t. 32. Villars Delph. 3. p. 674. t. 45. Hab. in Pyrenaeis, Delphinati, et in Monte auro.

Obs. Linnaeus dicit de sna *S. hypnoides*, quod caul. procumbens et viscidis sit!

61. *g'obuliferà*, caul. bulbifero, fol. nervosis, imis spatulatis integerrimis, superiorib. palmatis 3-5-fidis, caulinis linearib. Desf. atl. 1. p. 347. t. 96. f. 1. Hab. in cacumine Atlantis. Facie *S. Hypnoides*. Caul. basi prostratus. Cor. alba.

62. *decipiens*, fol. pilosis palmatis 5-6-fidis trifidisque, caul. folioso paniculato, petal. subrotundis. *S. palmata*. Smith. brit. t. p. 456. Engl. bot. t. 455. *S. decipiens*. Ehrh. Hab. in Germaniae et Angliae rupibus sub-alpinis.

63. *nervosa*, fol. lobatis utrinque nervosis, cal. globosis, cor. patentibus, pist. subulatis. Lapeyr. p. 63. t. 30. *S. exarata*. Vill. Delph. 3. p. 674. t. 45. *S. Hypnoides*. All. pedem t. 21. f. 4. exclus. synonym. Hab. in alpestribus inter muscos. Surc. lignosi. Caps. grandis. Nervi in fol. siccis inferiorib. distincti. Var. (β. hirsuta.

Obs. An a priore satis diversa?

64. *intricata*, fol. rosulatis cuneato-incisis nervosis, surcul. elongatis superioribus intricatis, petal. ovatis, pistil. subulatis. Lapeyr. p. 58. t. 33. Hab. in saxis altis humidis. An prioris var.? sed herbacea. L.

65. *moschata*, fol. radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque una cum caule glutinosi hirsutis (odoratis), florib. longe pedunculatis. Wulf. in Jacq. misc. 2. p. 128. t. 21. f. 21. Hab. in alpinis. Petal. elliptica, cal. longiora. Lapeyr. p. 61.

66. *groenlandica* (lasiostigma), fol. imbricatis cuneato-palmatis ciliatis, petal. rotundis, stig. complanatis lanatis. Lapeyr. p. 39. t. 19. *S. caespitosa*. Gunn. Norv. t. 7. f. 1. Hab. in alpinis. Pet. majuscula, trinervia, pallida. Styli divaricati.

67. *mixta*, fol. digitatis (trifidis) minutis nervosis subhirsutis, anth. sagittatis, stig. pileatis reflexis, caul. subviscoso, 2-3-floro. Lap. p. 41. t. 20. *S. caespitosa*. L. All. et Villars.

(β. *elongata*, major, scapo elongato ramoso, fol. petiolatis multifidis. Flor. dan.

t. 71. Hab. cum priore. Caul. subviscosus a-3-florus.

68. *muscoides*, fol. subintegris linearib' carnosulis pubescentibus, scapo filiformi subunifloro, petal. cal. subaequantibus. *S. caespitosa*. Lapeyr. p. 59. t. 34. Hall. it. helv. t. 1. *S. muscoides*. Jacq. misc. 2. p. 123. *S. pyrenaica*. Villars. Hab. in alpinis. Flor. citrini. Caul. inferne rubiginosus. Var. β . surcul. erectis elongatis, fol. omnibus integris. Lap. t. 34.

β . *integrifolia*, fol. omnibus integris linearibus, surculis erectis elongatis. Lapeyr. t. 34.

γ . *hemispherica*, ramis congestis hemisphaericis, fol. brevibus imbricatis. Lapeyr. t. 36.

69. *cymosa*, piloso-viscosa, caul. erecto, fol. ensiformib. 3-5-fidis: caul. 3-partitis, flor. cymosis, stylo cal. longiore. Plant. rar. hongar. *S. caespitosa*. Wulf. in Jacq. coll. 1. p. 290. Hall. hist. n° 989. Hab. in Hungaria, in Austria, in alpinis. Cor. alba lineata.

Obs. *S. pedemontana*. All., quam cl. auctores huc allegant, secundum specimen a D. Balbis Turino benevole missum, quoad folia omnino differt, quae cuneata s. flabelliformia.

70. *magellanica*, fol. congestis viscoso-pubescentibus. inferiorib. trifidis superiorib. simplicibus, flor. subbinatis subsessilibus. Hab. ad Fretum magellanicum in alpinis. (Herb. Juss.) Pl. caespitosa. Petal. obovata.

Obs. Amplum hoc genus, tamen naturale, si forte excipias *S. crassifoliam* et *sarmentosam*, familiam plantarum, *Saxifragacearum*. Juss., cum quatuor praecedentib. et duobus sequentibus generibus, nec non cum *Heuchera*, *Adoxa*, *Weinmannia* et *Hortensia*? efficit, quae inter alios characteres, capsula birostra mox dignosci potest.

1112. *TIARELLA*. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala, calyci inserta: petalis integris. Caps. 1-locularis, 2-valvis: valvula altera majore.

1. *cordifolia*, fol. cordatis. L. Lam. ill. t. 353. Hab. in Amer. et Asia septentrionali. Petal. cal. longiora. \mathcal{T}

2. *trifoliata*, fol. ternatis. L. Hab. in Asia boreali.

3. *bitemata*, fol. bitematis, flor. racemoso-paniculatis. Vent. Malmis. t. 54. Hab. in Amer. septentrionali.

1113. *MITELLA*. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala, calyci inserta: petalis pinnatifidis. Caps. 1-locularis, 2-valvis: valvulis aequalibus.

1. *diphylla*, fol. cordatis subtrilob. dentatis, scapo diphylo. Willd. Sp. II. p. 659. Lam. ill. t. 373. f. 1. Hab. in America septentrionali. \mathcal{T}

2. *cordifolia*, fol. cordatis ciliato-dentatis, scapo nudo. Lam. enc. 4. p. 185. ill. t. 373. f. 3. Michaux Flor. 1. p. 270. Hab. in Canada, circa Quebec.

3. *prostrata*, fol. rotundato-cordatis, caul. prostratis foliosis. Mich. l. c. Hab. in Canad. meridian. Sublobata.

4. *nuda*, fol. reniformibus repandis ciliatis, scapo nudo. Willd. Lam. l. c. ill. t. 373. f. 2. M. petalis fimbriatis. Gmel. sib. 4. p. 175. t. 63. f. 2. Hab. in Asia boreali. \mathcal{T}

1114. *SCLERANTHUS*. Cal. 1-phyllus; cui Stamina inserta. Cor. nulla. Sem. 1-2, calyce inclusa.

1. *annuus*, calycibus fructus patulis. L. Flor. dan. t. 504. Hab. in arvis praesertim calcareis.

2. *perennis*, calycib. fructus clausis obtusis. β . cocciferus. Hab. in campis apricis arenosis. Cal. laciniae albedo-marginatae. \mathcal{T}

3. *polycarpus*, calycib. fructus patentissimis spinosis, caule subvillosus. L. Col. ecphr. 1. p. 295. t. 294. Hab. Monspelii et in Italia. \odot

CARYOPHYLLAE. (Gen. 1115-1129.) Cal. in hac familia valde naturali ut plurimum persistit. Petala ejusdem laciniae alterna, unguiculata, integra aut saepius incisa. Fructus simplex est capsularis, polyspermus, receptaculo centrali libero distinctus. Caul. ut plurimum herbaceus, nodosus, stipulaceus aut nudus. Fol. opposita, basi connata, integra. — Genera quaedam naturalia, in aliis species aliquae ob stylorum numerum male dispersae occurrunt.

1115. *GYPSOPHILA*. *Cal.* 1-phyllus, campanulatus, angulatus. *Petala* 5, ovata, sessilia. *Caps.* globosa, 1-locularis, polysperma.

1. *repens*, fol. linearibus, staminibus cor. emarginata breviorib. L. Jacq. austr. 5. p. 4. t. 407. Lam. ill. t. 375. f. 2. Hab. in Sibiria, Austria, Helvetia, Gall. meridional. Pyrenaeis. ☞

2. *prostrata*, fol. lanceolatis laevibus, caulib. diffusis, pistillis cor. campanulata longioribus. L. Pluk. alm. 22. t. 75. f. 2. Hab. in alpinis.

3. *paniculata*, fol. lineari-lanceolatis, inferioribus scabris, staminibus minutis, stylis cor. longioribus. Ait. Kew. 2. p. 84. Jacq. austr. p. 26. t. app. 1. Hab. in Sibiriae, Tatariae desertis sabulosis.

4. *viscosa*, fol. ovato-lanceolatis laevib. basi cordatis amplexicaulis, internodiis ramorum medio viscosis, petalis reusis. Ait. Kew. 2. p. 85. Murr. comm. goetting. 1783. p. 9. t. 3. Hab. in Oriente. ☉

5. *adscendens*, fol. lanceolato-linearib., caulibus prostratis, cor. staminibus et pistillis ejusdem longitudinis. Jacq. hort. 2. t. 138. Hab. ...

6. *altissima*, fol. lanceolatis subtrinerviis, caul. rectis. L. Gmel. sib. 4. p. 443. t. 60. Boc. mus. 23. t. 5. f. 3. Habit. in Sibiria.

7. *compressa*, caul. erecto hinc compresso, fol. subulato-lanceolatis striatis, pedicell. calycibusque pubescentibus. Desf. Atl. 1. p. 343. t. 97. Hab. in Barhar. arvis arenosis. Vere. Petala subtus venis violaceis variegata.

8. *arenaria*, fol. linearibus subcarnosis glabris planis, caule corymboso, petal. integris. Willd. Waldst. et Kitaib. pl. rar. Hung. p. 40. t. 41. Hab. in arenosis Hungariae. Cor. rarissime subemarginata. Cal. nullis squamis tectus. Caps. globosa.

9. *Struthium*, fol. linearibus carnosis: axillarib. confertis teretibus. L. Barr. rar. 64. t. 119. Boc. mus. 2. p. t. 122. Hab. in Hispania. ☞

10. *fastigiata*, fol. lanceolato-linearib. obsolete triquetris laevibus obtusis secundis. L. Gmel. sib. 4. p. 144. t. 61. f. 1. Hab. in Gotlandiae, Borussiae, Helvetiae, Haryanae rupibus.

11. *perfoliata*, fol. ovato-lanceolatis semiamplexicaulis. L. Dill. elth. 368. t. 276. f. 357. β . tomentosa. L. Barr. ic. t. 1002. Hab. in Hispania et Oriente. Fol. subcarnosa.

12. *muralis* (*agrestis*), fol. linearibus planis, calycibus apyhyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. L. Lam. ill. t. 375. f. 1. Hab. ad vias, muros, et inter stipulas.

13. *rigida*, fol. linearibus planis, caule dichotomo, peduncul. bifloris, petal. emarginatis. L. Hab. Montepelii.

14? *Saxifraga*, fol. linearibus, calycibus angulatis: squamis quatuor, coroll. emarginatis. L. Dianthus Saxifragus. L. Lam. enc. Hab. in Austria, Helvetia, Gallia. Calyx cinctus foliolis 4, tubo dimidio brevioribus.

1116. *SAPONARIA*. *Cal.* tubulosus, 1-phyllus, nudus. *Petala* 5, unguiculata. *Caps.* oblonga, 1-locularis.

1. *officinalis*, calycib. cylindricis, fol. ovato-lanceolatis. L. Willd. p. 667. Lam. ill. t. 376. Flor. dan. t. 543. Hab. ad vias.

2. *Vaccaria*, calycib. pyramidalis quinquangularibus, fol. ovatis acuminatis sessilibus. L. Hab. inter segetes. Petal. parva, rubra. ☉

3. *cretica*, calycib. quinquangularibus striatis, caule erecto subdichotomo, foliis subulatis. L. Hab. in Cretae aridis. Petala parva, integra.

4. *porrigens*, calycib. cylindricis pubescentibus, ramis divaricatis, fructib. pendulis. L. Jacq. hort. 2. p. 49. t. 103. Hab. in Oriente.

5. *illyrica*, calycibus subcylindricis, caule erecto viscido purpureo: ramis alternis, cor. punctatis. L. Ard. spec. 2. p. 24. t. 9. Hab. in Illyria. Viscoso-pubescent. Fol. lineari-lanceolata. Pet. alba: punctis 3 purpureis.

6. *Ocymoides*, calycib. cylindricis villosis, caulib. dichotomis procumbentibus, fol. ovato-lanceolatis. L. Jacq. austr. 5. p. 39. app. t. 23. Cav. ic. 2. p. 29. t. 134. Hab. in Europ. petrosis, umbris, et in Atlante.

7. *orientalis*, calycib. cylindricis villosis, caule dichotomo erecto patulo, fol.

lineari-lanceolatis. Dill. elth. 205. t. 167. f. 204. Hab. in Oriente, Carniola.

8. *lutea*, calycib. teretib. cauleque hirtis, petal. obovatis integerrimis, flor. corymbosis, fol. lineari-lanceolatis canaliculatis. Smith. spicil. bot. t. 5. Allign. pedem. t. 23. f. 1. Hab. in alpinis. Cor. flava. Stam. violacea.

9. *bellidifolia*, calycib. teretib. hirtis, caule glabro, petal. linearibus crenatis, fol. spatulatis. Smith. l. c. Rocc. mus. 2. p. 75. t. 62. f. 1. Hab. in Italiae mont. altissimis. Fol. radicalia Globulariae similima. Stam. flava. $\overline{\text{T}}$

116. **DIANTHUS.** *Cal.* cylindricus, longus coriaceus. 1-phyllus: basi squamis 4-8. *Petala* 5, unguiculata. *Caps.* cylindrica, 1-locularis, apice dehiscens.

* *Florib. aggregatis, quibusdam involucrentis.*

1. *barbatus*, flor. (versicoloribus) aggregatis fasciculatis squamis calycinis ovato-subulatis tubum aequantibus, fol. lanceolatis. L. Willd. Sp. II. p. 671. β . *angustifolius*, fol. linearibus, flor. majoribus unicoloribus. rubris. Hab. in Carniola, Germania. $\overline{\text{T}}$

2. *carthusianorum*, flor. subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucre oblongo aristato capitulo brevioribus, fol. linearibus trinerviis. Willd. Hab. in apricis sylvaticis. Sequentes 3 subpecies tantummodo sunt.

* *collinus*, flor. bifasciculatis, squam. calyc. ovato-subulatis tubo brevioribus, fol. lanceolato-linearibus 5-nerviis scabris. Pl. hongar. p. 36. t. 38. Cresc. in Hongar. collibus et fruticetis.

* *atrorubens*, flor. aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucre ovato aristato longitudine capituli, fol. connatis lineari-lanceolatis enerviis. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 467. Segu. veron. 1. p. 434. t. 7. f. 2. Habitat in Italiae et Tauriae aridis apricis. Cor parva. $\overline{\text{T}}$

* *alpestris*, flor. aggregatis sublimis, squam. calycin. 4, duabus interioribus latis, mucronatis, corol. emarginatis. Bulbis in Mém. de Turin t. 1. Hab. in pascuis alpinis.

3. *ferrugineus*, flor. aggregatis, petalis bifidis: laciniis tridentatis. L. Barr. rar. 648.

t. 497. Hab. in Aprutio Italiae. Fl. fasciculati cal. communi scarioso. $\overline{\text{O}}$

4. *Armeria*, flor. aggregatis fasciculatis: squamis calycinis lanceolatis villosis tubum aequantibus. L. Flor. dan. t. 230. Hab. in sterilibus.

5. *japonicus*, flor. aggregatis fasciculatis, squamis calycinis acutis ciliatis tubo brevioribus, fol. ovatis. Thunb. jap. 183. t. 23. Hab. in Japonia.

6. *spinosus*, fruticosus procumbens, fol. rigidis subulatis spinoscentibus, flor. capitatis breviter. Desf. in annal. de Mus. 1. p. 198. t. 16. f. 1. Hab. in Persia. Petal. linearia.

7. *prolifer*, florib. aggregatis capitatis, squam. calycinis ovatis obtusis mucronatis tubum superantibus. L. Flor. dan. t. 221. Hab. in collib. et pascuis sterilibus. \odot

* *Flor. dispersi in caul. ramoso.*

8. *diminutus*, flor. solitariis, squamis calycinis octonis flor. (cor.) superantibus. L. Hab. in Germania, Helvetia et Algeria. Cal. oblongus pallens. Var. praecedentis?

9. *Caryophyllus*, flor. solitariis, squam. calycinis subrhombicis brevissimis, petalis crenatis imberbibus, fol. lineari-subulatis canaliculatis glaucis. Smith. in Act. Soc. Lin. 7. p. 299.

10. *sylvestris*, flor. solitariis, squamis calycinis brevissimis ovatis, exterioribus acutis, interioribus obtusissimis, pet. crenatis imberbibus. Willd. p. 675. Wulf. in Jacq. Coll. 1. p. 237. Jacq. ic. rar. 1. t. 82. Segu. veron. t. 7. f. 3. Hab. in Helvetia, Carniola, Carinthia.

11. *fruticosus*, caul. fruticoso, fol. sublinearibus crassiusculis, cal. squamis pluribus imbricatis. L. Willd. Sp. p. 684. Tournef. it. 1. p. 187. t. 9. Hab. in Graecia. Col. in hortis. Cal. attenuatus.

12. *juniperinus*, caul. fruticoso multifloro, fol. subulatis pungentibus, squamis calycin. subquaternis obovatis mucronatis, tubo duplo brevioribus. Smith. in Act. Lin. 2. p. 303. An versus *D. arboreus*, fol. subulatis. Lin. Sp. pl. p. 500. Cresc. cum priore. Caul. inferne lignosus, tortuosus. Flor. parvuli. *D. arboreus*. Herb. Juss.

13. *pomeridianus*, flor. solitariis, squam. calycinis ovatis acutis brevissimis, tubo apice tantum striato, petal. emarginatis subintegerrimis. Smith. Act. Soc. Lin. 2. p. 300. Hab. Constantinopoli et in Palaestina. Simil.

D. Caryophyllo. Petala lateribus revoluta. Flos aperitur meridie et clauditur noctis hora decima. L.

14. *procumbens*, squamis calycinis quaternis lanceolatis subpungentibus, patulis tubo brevioribus, caule procumbente dichotomo. Vent. Hort. Cels. p. 49. t. 34. (D. monadelphus.) Hab. in Oriente. Caul. glaucus, fragilis, nonnunquam valde elongatus. Cor. alba, subtus cinerea, margine purpureo.

15. *pungens*, flor. solitariis, caulibus paucifloris, squamis calycinis brevissimis mucronatis patentibus, tubo gibbo, petal. integris. Smith. *β. hispanicus*, squamis calycinis ovatis, petal. linearibus integerrimis. Asso synop. n°. 371. t. 3. Hab. in Hispaniæ maritimis.

16. *virginicus*, fol. cespitosus, flor. solitariis, caulibus paucifloris, squamis calycinis brevissimis obtusissimis, lacinis distantibus, petalis crenatis. Smith. Jacq. aust. 5. p. 34. app. t. 15. D. rupestris. Lin. suppl. 240. Hab. in Gallia, Austria et Sibiria. Cor. rubra.

17. *attenuatus*, flor. solitariis, squamis calycinis brevibus lanceolatis acuminatis subnatis, tubo attenuato, petal. crenatis. Smith. Hab. in maritimis Galliae meridionalis. Caul. diffusi basi tortuosi ramosissimi. Fol. subulata. Flor. carnei, inodori.

18. *furcatus* caul. bifloro, pedunc. oppositis distantibus, squamis calycin. oppositis subnatis tubo multo brevioribus. Ballis in Mém. de l'Acad. de Turin. Hab. ad margines agrorum in montib. prope Tendam. Molinieri. Situ flor. mox distinguitur.

19. *purpureus*, caule subbifloro, floribus solitariis, squamis calycinis latis tubo limidio brevioribus acutis, petal. integerrimis. Enc. bot. 4. p. 523. Lam. ill. t. 376. f. 2. Habitu recedit. Loc. natal. ignotus. †

20. *ochroleucus*, caule elongato submultifloro gracili, squamis calycin. ovato-lanceolatis ultra tubi dimidium, petal. ob-ovato-linearibus subintegris. Hab. in Oriente. Col. in hort. Cels. Caul. subgeniculatus, fol. brevia, linearibus subulata. Flor. minuti. Cor. albedo-pallens.

21. *albans*, flor. solitariis, squamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, cor. emarginatis. Ait. Kew. 2. p. 90. D. floribus solitariis, squamis calycinis quaternis ovatis brevissimis, petal. integris. Thunb. prod. p. 81. Hab. ad Cap. b. spei. Petala alba, apice utrinque violacea absque circulo purpureo. ‡

22. *crenatus*, flor. solitariis, squamis calycinis senis lanceolatis, cor. crenatis. Thunb. prod. 81. Hab. ad Cap. b. spei.

23. *chinensis*, flor. solitariis, squamis calycinis subulatis patulis foliaceis tubum aequantibus, petal. crenatis. fol. lanceolatis. Smith. l. c. Mill. ic. 81. f. 2. Hab. in China. ○

24. *deltoides*, flor. solitariis, squamis calycinis ovato-lanceolatis acutis subnatis, fol. obtusiusculis subpubescentibus, petalis crenatis. Smith. l. c. Hab. in arenosis sylvaticis.

26. *glaucus*, flor. solitariis squamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, cor. crenatis (albis). L. Hort. cliff. 164. Tunica ramosior, flore candido cum corona purpurea. Dill. elth. 400. t. 208. f. 348. Passim cum priore, cujus var. secundum cl. Smith.

25. *libanotis*, flor. subsolitariis, squamis calycinis senis lanceolatis patulis tubo brevioribus, petalis multifidis barbatis, foliis lanceolatis, caule erecto. Willd. Billard. pl. syriacae 1. p. 14. t. 5. Hab. in altis montib. Libani. ‡

27. *crinitus*, flor. solitariis, squamis calycinis ovalibus mucronatis subdivergentibus, tubo triplo brevioribus, petalis multifidis imberbibus. Smith. l. c. Hab. in Oriente. Fol. angustissima. Flor. 2-4 in caul. erecto. S.

28. *monspeliacus*, flor. solitariis, squamis calycinis subulatis rectis tubo paullo brevioribus, cor. multifidis, caul. erecto. Smith. l. c. D. squamis calycinis subulatis longitudine tubi. L. Hab. Monspeli, Veronae. Flor. rubri. ‡

29. *plumarius*, flor. solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis obtusissimis muticis, cor. multifidis fauce pubescentibus. L. Tunica fol. glaucis patentibus, flor. serratis, faucibus lanuginosis. Hall. herb. n°. 897. Hab. in pascuis nemorosis. Fol. rore caesio glauca. L. ‡

* *moschatus*, cespitosus, squamis minutis ovatis obtusis, corol. multifidis, foliis filiformibus subulatis. Gmel. S. N. L. II. p. 711. Poir. enc. bot. 4. p. 521. Col. praesertim in hortis ad areas ornandas. Flor. vere. Var. prioris?

* *saxatilis*, cespitosus subdecumbens, caul. bi-trifloro, squamis ovatis mucrone longiusculo distinctis tubo brevioribus, pet. multifidis, fauce glabris. Hab. ad rupes, prope Clermont non infrequens. D. *plumarius* quorundam, sed fol. quae linearis

non glauca, cor. fauc. non pubescens, nec squamæ obtusae.

30. *superbus*, flor. paniculatis subfastigiatis, squam. calycinis brevibus ovatis mucronatis, petal. ultra medium multifloro-capillarib. fauce pilosis, caul. erecto. Flor. dan. t. 578. Hab. in pratis, sylvaticis. Cal. uno latere purpurasc.

*** *Caul. 1-floro.* (Spec. parvulae subcespitosae.)

31. *arenarius*, caulib. subunifloris, squam. calycinis ovatis obtusis, cor. multifidis, fol. linearibus. L. Hab. in Europae frigidioris arena mobili. Pl. dubia. Pet. ultra medium disci divisa, basi macula livida et pilis purpurascenrib. adpersa. L. An sequentes a eadem species?

* *Hongaricus*. D. *arenarius*, caulib. subunifloris, squam. calycinis brevissimis subrotundis acuminatis, cor. (albis) multifidis, fol. subulatis glaucis ciliatis. Townson Travels in Hungary. t. 16. Caul. adscendentes, angulati, glauci. Cal. viridis lividusque. T.

* *gallicus*, caul. unifloro brevissimo, fol. ciliatis imbricatis, squamis cal. ovatis mucronatis, cor. dentato-submultifidis. Hab. in Galliae meridionalis arena mobili. Thore. Petala 1/3 incisa. Cal. squamæ margine tenui cinctae.

32. *tener*, caul. unifloro, cor. fimbriatis, squam. calycin. tubum subaequantibus, fol. linearib. subulatis. Balbis in Mém. de Turin. t. 3. Hab. ad agrorum margines prope Tendum. Cor. rosea.

33. *serrulatus*, fol. lanceolatis serratis, pedunc. unifloris, squam. imbricatis acutis tubo brevioribus, petal. fimbriatis. Desf. atl. t. p. 346. Hab. in Tuneti arenis. Cal. squamæ 7-8. Cor. duplo minor D. *plumarii*, pallide rosea. D.

34. *pulchellus*, caul. 1-floro, squam. calyc. ovatis mucronatis appressis, cor. crenatis, fol. brevibus planis linear-acuminatis. Hab. . . . +

Obs. Mihi missus sub nomine D. *Plumieri*. Forte, uti nonnullae aliae in hoc genere valde naturali cultura a D. coronario ortus. Caul. palmares plures ex cespite, aut subsolitarius. Cal. purpurascens, suburgidus. Cor. rubella.

35. *repens*, caul. unifloro, squam. calycinis binis ovatis acuminatis patulis longius non fere tubi, petal. dentatis, radice repente. Willd. p. 681. Hab. in Siberia.

36. *caesius*, caul. subunifloris, squam. calycinis subrotundis brevibus, petal. crenatis pubescentibus, fol. margine scabris. Smith. p. 302. engl. bot. t. 62. Dill. elth. 40r. t. 298. t. 385. Hab. in montosis Angliae, Helvetiae. Caul. simplices quadranguli. Cal. squamæ tubo triplo breviores.

37. *cespitosus*, caul. unifloris, cor. integris, calycin. squamis quatuor lanceolatis, fol. trigonis. Thunb. prod. 81. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequente. T.

38. *scaber*, caul. unifloris, squam. calycinis quaternis lanceolatis, petal. crenatis. Thunb. prod. 81.

39. *alpinus*, caul. unifloro, petal. crenatis, squam. calycinis exterioribus foliaceis (foliiformibus) tubum aequantibus. Smith. l. c. D. caespitosus. Poir. enc. bot. 4. p. 525? Jacq. austr. t. 52. Caryophyllus sylvestris 2. Clus. hist. t. p. 281. f. 1. bon. Hab. in alpestribus. Cor. magna, dentib. numerosis crenata, fauce parum villosa.

β. *glacialis*, flor. solitariis subcaulibus, squamis calycinis elongatis acuminatis tubum superantibus, fol. linearibus flore longioribus. Haenke in Jacq. Collect. 2. p. 84. Var. prioris secundum Willd. sed cor. vix prominet. Hab. in Siria, Austria.

40. *pumilus*, caespitosus acaulis, fol. linearibus. Vahl. symb. t. p. 32. D. uniflorus. Forsk. Hab. in Arabia felici. Flor. sessiles solitariae. Pet. dentata. T.

TRIGYNIA.

1117. *CUCUBALUS*. Cal. inflatus, ant. campanulatus. Petala 5, unguiculata, nudas coronata ad faucem. Caps. 3. locularis.

1. *Behen*, fol. ovatis, caul. dichotomo, calycib. sublobosis reticulato-venosis, caps. trilobularibus, cor. subnudis. L. Flor. dan. t. 914. Engl. bot. t. 164. Hab. in pascuis, ad vias. Fol. subovata glabra aut ciliata. T.

β. *rotundifolius*, flor. rotundiorib. subvillosis aut glabris, flor. purpurascens. Allioni specim. t. 5. f. 3. γ. *angustifolius*, fol. parvulis ovato-linearibus, flor. albo. In alpinis.

2. *alpinus*, pedunc. erectis unifloris, petal. bipartitis subcoronatis, fol. lanceolatis glaucis laevibus. Lam. enc. 2. p. 220. Hab.

in alpinis. Flor. magni albi. Fol. non ciliata, basi connata.

3. *maritimus*, flor. paniculatis erectiusculis, petal. furcatis sub limbo dilatatis, fol. ovali-acuminatis canesque villosis. Lam. l. c. Hab. in Galliae meridionalis maritimis. Cal. ovalis albicans, vix venosus. L.

4. *littoralis*, caul. decumbente, fol. lanceolato-linearibus, flor. subsolitariis, calyc. glabris reticulato-venosis, petal. coronatis. Smith. brit. 2. p. 468. *Silene maritima*. Willd. Sp. p. 700. Hab. in maritimis arenosis, etiam ad fluv. alpinos. Styl. interdum 4-5. Sm.

5. *sabarius*, fol. obovatis carnosiss. L. Bocc. Mus. t. 92. Hab. in Sicilia ad littora.

6. *spergulisfolius*, petal. bifidis, calyc. inflatis striatis glanduloso scabris, panic. secunda, fol. linearib. verticillatis. Willd. p. 690. Sub *Silene*. Hab. in Armenia.

7. *stellatus*, fol. quaternis ovato-lanceolatis, petal. multifidis. L. Mich. Flor. 1. p. 271. Hab. N. Anglia et in montib. alpehanis. Pl. pulcherrima. Cor. patens alba.

8. *bacciferus*, cal. campanulatis, petal. distantibus, ramis divaricatis, fol. ovatis. Mill. ic. t. 112. *Silene baccifera*. W. Hab. in nemorosis. Caps. mollis, nigrescens.

9. *pumilio*, caul. unifloro, cal. ventricoso campanulato-hirsuto, fol. caespitosis linearilanceolatis. Jacq. austr. 5. app. t. 2. Lam. ill. t. 377. f. t. Hab. in alpinis.

Obs. Ob calycem turgidum nonnullae *Silenes* huc quoque referri possent; aut duo haecce genera naturalia, potius conjungenda. Ceteras *Cucubali* species cal. haud inflato distinctas, affinibus speciebus in sequente genere appropinquavi.

1118. *SILENE*. Cal. oblongus teres cylindricus aut conicus. Petala 5, unguiculata, nuda, aut coronata ad faucem. Caps. 3-locularis.

* Flor. spicatis aut racemosis.

1. *anglica*, hirsuta, petal. integerrimis, flor. erectis (glabris?), fructib. reflexis pedunculatis alternis. L. Dill. elth. 417. t. 309. f. 398. Vaill. paris. 121. t. 16. f. 12. Hab. in Anglia, Gallia. Cal. non pilosi, sed angulis muricatis, aculeis reflexis vix conspicuis. L. ☉

2. *lusitanica*, hirsuta, petalis dentatis indivisis, flor. erectis, fructib. divaricato-

reflexis alternis. L. Dill. elth. t. 311. f. 401. Hab. in Lusitania. Cor. crenata, incarnata. L. ☉

3. *quinquevulnera*, hirsuta, petal. integerrimis subrotundis, fructib. erectis alternis. L. Hab. in Europ. australi et Siberia. Petala obtusa, macula atro-purpurea. ☉

4. *ciliata*, petal. bipartitis obtusis, calycib. clavatis pubescentibus, apice ciliatis alternis erectis. Willd. p. 692. Hab. in Creta. Cal. decemstriatis. Pet. bipartita, laciniis obovatis. W. †

5. *nocturna*, florib. spicatis alternis, secundis sessilibus, petalis bifidis. L. ☉ *Cucubalus reflexus*. L. Dill. elth. t. 310. f. 400. Moris. s. 5. t. 36. f. 7. Hab. in Hispania, Gallia et Pensylvania. ☉

6. *gallica*, hirsuta. Flor. subspicatis alternis secundis, petalis integris fructibus erectis. L. Dill. elth. t. 310. f. 399. Vaill. paris. t. 16. f. 12. Hab. in Helvetia, Gallia. Sequenti similis.

7. *cerastoides*, hirsuta, petal. emarginatis, fructificationibus erectis, calycib. subsessilibus subpilosis. L. Dill. elth. t. 309. f. 307. Hab. in Eur. australi. ☉

8. *mutabilis*, pet. bifidis, calycib. angulatis pedunculatis, fol. lanceolato-linearibus. L. Hab. in Eur. australi. Affinis *Cucubalo* reflexo. Lin.

9. *chlorantha*, petal. linearibus bifidis, flor. lateralibus secundis cernuis, fol. radicalib. mar. ine scabris. Willd. Ehr. Beitr. 7. p. 145. Dill. elth. t. 316. f. 408. Menz. pug. t. 2. f. 1. Hab. in Germania. ☐

10. *nutans*, petalis bifidis, florib. lateralibus secundis cernuis, panícula nutante, fol. caespitosis, lanceolatis. L. Flor. dan. t. 242. Engl. bot. t. 465. Hab. in pratis, sylvis. Var. flore rubro.

11. *amoena*, petalis bifidis, coronula subcoadunata, flor. secundis, pedunc. oppositis trifloris, ramis alternis. L. Hab. in Tataria. Caul. diffus. ☐

12. *paradoxa*, flor. racemosis, calycib. decem-sulcatis viscidis, flor. aliis staminibus exsertis, aliis inclusis. L. Jacq. hort. vind. 3. t. 84. Smith. brit. 2. p. 467. Zanon. hist. t. 109. Hab. in Italia et Anglia. Cor. noctu explicatae et odorae. Petala bifida subcrenata. L. Pet. limbus obcordatus. Sm.

13. *multiflora*, petal. bifidis, caule simplicissimo, corymb. multifloris oppositis, calycib.

calycib. clavatis striatis, fol. scabris, caulinis linearib., radicalib. spatulatis. Willd. p. 687. Plant. rar. hong. p. 55. t. 56. sub Cucub. Ehr. Beytr. 7. p. 142. Hab. in Hungariae pratis. Flor. verticillati racemosi. Cal. scaber. Cor. fauc. plerumque nuda. l. c.

14. *altaica*, petalis bifidis revolutis nudis, pedunc. alternis unifloris, fol. linearilanceolatis, caule frutescente. Cucubalus fruticosus. Pall. itin. 2. app. n.º. 110. t. T. Willd. p. 687. sub *Cucubalo*. Hab. in montib. Altaicis Sibiriae. h

15. *caspica*, caul. basi lignescens, fol. spatulato-lanceolatis, calyc. cylindricis 10-striatis, petal. bipartito basi utrinque unidentato. S. *fruticulosa*. Bieberst. Tabulae etc. n.º. 17. Hab. passim in collib. aridis inter Kuban et Schamachiam. Aest. h

Obs. Habitu praecedentis s. Cucub. fruticosi Pall., sed faux coronata. Flor. et dichotomia caulis. B. h

16. *viscosa*, flor. lateralibus nodique decumbentibus, caule indiviso, fol. basi reflexis. L. sub Cucub. Tournef. it. p. 361. Hab. in Eur. australiori et Oriente. ♂

17. *tatarica*, petal. bipartitis, flor. secundis decumbentibus, pedunc. oppositis solitariis erectis, caule simplicissimo spicato. L. sub *Cucubalo*. Hab. in Tartaria, Russia. ♀

18. *Royen*, racemo verticillato, pedunc. oppositis brevissimis multifloris, petal. bifidis, fol. ovato-lanceolatis subundulatis. Bieberstein. l. c. n.º. 16. Royen. lydb. p. 448. (a Linnæo cum? ad priorem allegatum.) Hab. in planit. Kumukorum. Maj. ♂ +

19. *sibirica*, petal. emarginatis subverticillatis linearibus, flor. verticillis umbellatis apyillis. L. sub *Cucubalo*. Viscago fol. imis petiolatis ovatis. Hall. goett. t. p. 150. ic. Hab. in desertis Tacorow. Flor. parvi. Petal. obcordata.

20. *Osites*, petal. linearib. indivisis undulatis glabris, flor. verticillato-capitatis dioicis, pedunc. glabris, caule nudo. Willd. p. 688. Flor. dan. t. 518. sub *Cucubalo*. Hab. in arenosis. Flor. parvi.

21. *parviflora*, petal. linearib. indivisis ciliatis flor. dioicis, pedunc. pubescentibus, caule paniculato. Willd. Ehrh. Beytr. 7. p. 143. sub *Cucubalo*. Hab. in Hungaria. Priori affinis.

22. *imbricata*, caul. inferne piloso, fol. lanceolatis, flor. sessilib. secundis strictis

imbricatis longe racemosis. Desf. p. 349. t. 98. Hab. in arvis prope Mascat. Petal. alba, bifida. ♂

23. *hispida*, flor. racemosis confertis secundis, cal. hirsutissimis, petal. bifidis, caul. subsimplice. Desf. atl. t. p. 348. Hab. in Atlantide. ♂

24. *tridentata*, hirsuta, fol. angustolanceolatis, flor. racemosis distinctis sessilibus, cal. dentib. subulatis, caps. acuminatis erectis. Desf. l. c. Clus. hist. ago. ic. Hab. in Algeriae arvis, et in Hispania prope Aranguez. Thibaut. Petal. rosea, plerumque tridentata. ♂

* * *Caul. paniculato-dichotomo, flor. in pluribus ex dichotomia.*

25. *fruticosa*, petal. bifidis, caule fruticoso, fol. lato-lanceolatis, panic. trichotoma. L. Com. hort. t. 33. Hab. in Sicilia. Fol. mollia. h

26. *bupleuroides*, caul. virgato, petal. bifidis, flor. pedunculatis oppositis bracteis brevioribus, fol. lanceolatis acutis glabris. L. Desf. atl. t. p. 351. Hab. in Persia et Atlantide. Pet. inferne pallide violacea. ♂

27. *longiflora*, petal. bifidis, floribus paniculatis erectis, pedunc. oppositis bracteis longioribus, calycib. longissimis glabris. Willd. Ehr. Beytr. 7. p. 144. S. juncea. Roth. catal. t. p. 54. Cum priore saepe confunditur. Hab. in Hungaria. ♀

28. *longipetala*, fol. lanceolatis scabriusculis, pedunc. elongatis dichotomis, petalis bifidis retroflexis. Vent. Hort. Cels. p. 81. t. 83. Hab. circa Aleppo. Cor. albidolivida. ♂

29. *gigantea*, petal. bifidis, fol. radicalibus cochleariformibus obtusissimis, flor. subverticillatis. L. Walth. hort. 32. t. 11. Hab. in Africa. Fol. carnea, pubescentia. Cal. pubescentes. Cor. virides coronula ovato-olea. Flor. noctu explicati. L. ♂

30. *crassifolia*, petal. emarginatis, fol. suborbiculatis carnosissimis hirsutis, racemo secundo. L. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. firmus, hirsutus. ♂

31. *viridiflora*, petal. semibifidis, fol. ovatis scabriusculis acutis, panic. elongata subaphylla. L. Herin. parad. 199. t. 199. Hab. in Lusitania. Panic. brachiata pedunculatis dichotomis, paucifloris. ♂

32. *reticulata*, glabra viscosa, fol. angustolanceolatis, caul. dichotomo, pedunc.

subtrifloris, cal. clavato (venis purpurascens) reticulato, petal. linearib. emarginatis. Desf. atl. t. p. 350. t. 99. Hab. in Algeria. Cor. parva, rosea.

33. *picta*, glabra, caule dichotomo, fol. linearibus, caul. subsetaceis, cal. clavato petalisque venosis nervisque rubris reticulatis. S. bicolor. Thore. Hab. prope Dax (dépt. des Landes) Nunc in hort. colitur. Spec. elegans, priori similis.

34. *rugosa*, caul. dichotomo, fol. linearilanceolatis, cal. clavati nervis crenato-rugosis subasperis. Hab. Herb. Juss. Facie a-antecedentium, sed cal. a cacteris mox distinguitur.

35. *glutinosa*, petal. bipartitis, panic. dichotoma patentissima viscosa, fol. ovatis. Cucub. glutinosus. Retz. C. *catholicus*. Lin. Jacq. hort. t. 59. Hab. in Italia, Sicilia.

36. *mollissima*, petal. semibifidis, panic. dichotoma, caul. foliisque holosericeis: radicalibus spatulatis. L. sub *Cucubato*. Hab. in Italica maritimis. An cal. inflatus?

37. *italicus*, laevis pubescens, petal. semibifidis, cal. clavatus, panic. dichotoma: ramis longis patentibus, flor. erectis, fol. lanceolatis. Willd. Sp. II. p. 686. Jacq. obs. 4. t. 79. Sub *Cucubato*. Hab. in Italia.

38. *nicæensis*, villosa-viscosa, fol. linearib. obtusis, petal. semibifidis, fruct. ovatis. Allion. pedem. 2. p. 81. t. 44. f. 2. Hab. in agro Nicæensi. Cal. 10-striatus.

39. *conoidea*, calycib. fructus globosis acuminatis striatis, fol. glabris, petal. integris. L. Lychnis, flore amplo rubello. Moris. s. 5. t. 36. f. 6. Hab. inter segetes Eur. australior. ☉

40. *conica*, calycib. fructus conicis striatis, fol. mollib. lanceol., petalis bifidis. L. Jacq. austr. t. 253. Moris. l. c. t. 21. f. 33. Hab. in agris sylvaticis. Flor. parvi rubri. Cal. striae 30. Caps. lagenaria. ☉

41. *bellidifolia*, calycib. fructus ovatis villosis, fol. lanceolatis pilosis subasperis, petal. bifidis. Murr. syst. veg. Jacq. hort. 3. t. 81. Hab. Racem. geminati. ☉

42. *dichotoma*, calycib. ovatis viscoso-pilosis erectis, petal. bifidis, racem. geminatis terminalibus secundis, flore intermedio pedunculato, fol. petiolatis ovato-lanceolatis, basi ciliatis. Willd. p. 699. Plant. rara hong. p. 28. t. 29. Ehr. Beytr. 7. p. 144. Hab. in Hungaria, non procul a Buda, in agris. Fl. albi subcrenati. ☉

43. *vespertina*, petal. bifidis, nectario connato, flor. alternis, cal. clavato pubescente. Retz. obs. 3. p. 31. Willd. p. 699. Hab. ☉

44? *Behen*, calyc. glabris ovatis venoso-reticulatis, caps. trilocularibus. L. Hab. in Creta. Differt a Cucub. Behen corona corollae, cor. purpurascens. L.

Obs. An cum tribus sequentibus ob calycem ad Cucubalos potius referenda?

45. *stricta*, petal. emarginatis, calycib. glabris reticulato-venosis acuminatis pedunculo longioribus, caule dichotomo stricto. L. Amoen. acad. r. p. 158. Hab. in Hispania et Tolosae.

46. *pendula*, calycib. fructiferis pendulis inflatis, angulis decem scabris. Hort. ups. 109. Hab. in Creta et Sicilia.

47. *procumbens*, calycib. ovatis inflatis erectis obsolete decemangularib., petal. subauriculat. bifidis, caul. procumbente. Murr. comm. goett. 1784 et 1785. p. 83. t. 2. Roth. catal. t. p. 55. Hab. in Sibiria. ☉

48. *noctiflora*, calycib. decemangularib. venosis, dentib. tubum aequantibus, caule dichotomo, pet. bifidis. L. Lam. ill. t. 377. f. 2. Engl. bot. t. 291. Hab. in sylvaticis arvis. Lychn. dioicae similis. Flor. paullo majores.

49. *ornata*, calycib. fructus oblongis carinatis pilosis, petal. bifidis, fol. lanceolatis pubescentibus viscosis planis, caul. viscido. Ait. Kew. 2. p. 96. Curt. mag. t. 382. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. sanguinea. ☉

50. *undulata*, calycib. fructus clavato-cylindricis pilosis, petal. bifidis, fol. lanceolatis pubescentibus undulatis, caule ascendente. Ait. l. c. Cum priore.

51. *laciniata*, fol. lanceolatis sessilibus, petal. quadrifidis, caps. unilocularib. Cav. ic. 6. p. 44. t. 534. Hab. in Amer. meridion. Cal. tubulosus villosus, 10-striatus. Cor. coccinea.

52. *virginica*, procumbens viscoso-pubescentis, fol. oblongis margine subasperis, panic. dichotoma, petal. bifidis, genitalib. exertis. Michaux. Flor. t. p. 278. Hab. in regione illinoensi. Cor. rubra.

Obs. Var. fol. lato-ovalibus, etiam caul. erecto, flor. subsfasciculatis. M.

53. *pennsylvanica*, humilis, viscidè pubens, fol. cuneatis, caul. lanceolatis, petalis leviter emarginatis subcrenatis. Mich.

in Pennsylvania. Caul. subsimplex. Petal. purpurascens.

54. *antirrhina*, fol. lanceolatis subciliatis, pedunc. trifidis, petalis emarginatis, calycib. ovatis. L. Dill. elth. t. 313. f. 403. Hab. in Virginia, Carolina. ☉

55. *rubella*, erecta laevis, calycib. subglobosis glabris venosis, cor. inapertis. L. Dill. elth. t. 314. f. 406. ♂ ? S. annulata. Thore. Hab. in Lusitania, Oriente. ☉

56. *sedoides*, glanduloso-pilosa, calycib. clavatis, petal. emarginatis, fol. oblongo-obovatis subcarnosis. Willd. Jacq. collect. suppl. 112. t. 14. f. 1. Hab. in Creta. ☉

57. *apetala*, calycib. ovatis pubescentibus, flor. apetalis, fol. lanceolatis pubescentibus. Willd. p. 703. Hab. . . . Cal. oblongo-ovatus decemstriatus.

58. *clandestina*, calycib. ovatis decemangularibus, petal. bifidis erectis cal. paullo longioribus, fol. oblongo-lanceolatis ciliatis. Willd. Jacq. coll. suppl. 111. t. 3. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Similis S. apetalae.

59. *inaperta*, caule dichotomo paniculato, calycib. laevibus, petal. brevissimis emarginatis, fol. glabris lanceolatis. L. Dill. elth. t. 315. f. 407. Hab. in Eur. australi. Stam. saepe 5.

60. *portensis*, caule dichotomo paniculato, calycib. striatis, petal. bifidis, fol. linearib. L. Hab. in Lusitania. Habitus S. inapertae. Pl. spinhamaea, brachiata. Cal. clavati, purpurascens. L.

61. *cretica*, erecta laevis, calycib. erectis decemangularibus, petal. bifidis. L. Viscago fol. interiorib. bellidis, superiorib. tunicae. Dill. elth. 422. t. 314. f. 404, 405. Hab. in Creta. Caulis patens, filiformis, articulis viscidis. Flor. amoene purpurei. L.

62. *bipartita*, fol. interioribus spathulatis, flor. racemosis secundis nutantibus, petal. bipartitis. Desf. atl. 1. p. 352. t. 100. Cresc. in arvis Sibiac. Caul. pubescens. Pet. rosea. ☉

63. *ramosissima*, pubesc. viscosa, fol. angusto-lanceolatis, pedunc. 1-3-floris, cal. ovatis, petal. bifidis, caps. intra cal. subsessilibus. Fe f. p. 354. Hab. ad maris litora. Petal. alba. Flor. numerosi. D. ☉

64. *arenaria*, villosa-viscosa, fol. linearilanceolatis obtusiusculis, flor. laxo racemosis, petal. bifidis, caps. intra cal. pedi-

cellatis. Desf. l. c. Cum priore in arenis. cui affinis. Flor. pauciores. h

65. *arenarioides*, pubescens, fol. angusto-linearibus, pedunc. 1-3-floris, cal. 10-striatis villosis, petal. bifidis, caps. terebithus pedicellatis. Desf. l. c. p. 355. Hab. in Barbariae arvis. Cal. purpurascens.

66. *cinerea*, fol. inferioribus ovatis, flor. racemosis subsessilib. solitariis 2-ternis, cal. pubescente 10-striato, petalis bifidis. Desf. l. c. In Algeriae arvis. S. nocturnam refert. Pet. lacin. angustae. Flor. in bifurcatione solitaria.

67. *patula*, viscosa, ramis paniculato-patentibus, fol. inferiorib. longe petiolatis ovatis acuminatis, pedunc. subtrifloris, cal. elongato, petal. semibifidis. Desf. p. 356. Hab. in Barbar. arvis. Cor. alba magnit. L. dioicae. L. Fol. pubescentia. Flor. circa vesperam odorati. ☉

68. *Muscipula*, petal. bifidis, caul. dichotomo, flor. axillaribus sessilibus, fol. glabris. L. Hab. in Hispania, G. Narbonensi, et Algeria. Viscosa.

69. *polyphylla*, fol. fasciculatis setaceis, ramorum florentium oppositis. L. Willd. Delph. 3. p. 609. Hab. in Pannonia. Austria. Bohemia, et Delphinatu. Rami multiflori, subdecumb. ☉

*** Flor. terminalibus fastigiatis, passim subsolitariis.

70. *Armeria*, flor. fasciculatis fastigiatis, fol. superioribus cordatis glabris, petalis integris. L. Flor. dan. t. 559. Hab. in apricis.

71. *Atocion*, petal. Filobis, basi utrinque dentatis, fol. laevibus, inferiorib. subrotundo-spathulatis, petiolis ciliatis. Ait. Kew. 2. p. 98. S. *orchidea*. Lin. suppl. 247. S. *Atocion*, cal. fructigeris clavatis, petalis semibifidis, fasciculo flor. terminali dichotomo, fol. obovatis. syst. veg. Jacq. hort. 3. p. 19. t. 32. Hab. in Oriente. Plant. pulchella. Cor. faux tantum prominet, nec coronula instructa.

72. *Pseudo-atocion*, flor. fasciculatis terminalibus, cal. clavatis, petal. linearib. integerrimis, fol. imis obovatis. Desf. atl. 1. p. 353. Hab. in Atlant. Facies prioris, an ejus varietas? D. ☉

73. *egyptiaca*, petalis emarginatis utrinque dentatis, fol. subtomentosis crassiusculis obovatis. Lin. suppl. p. 247. Hab. in Aegypto. Caul. brachiatus. Cal. clavatus. Petala incarnata cal. breviora. ☉

♂ ? *retroflexa*. Cucub. *aegyptiacus*, flor. erectis, petal. emarginatis retroflexis, utrinque denticulo notatis. L. Willd. p. 686. Fol. linearia. Cal. cylindricus, cor. æqualis. L. +

74. *Catesbaei*, flor. magnis purpureo-rubris, petal. lacinatis, calycib. cylindricis, panic. subtrichotoma, fol. laevib. lato-lanceolatis. Walt. carol. 141. Catesb. carol. 2. p. 54. t. 54. Hab. in Carolina. Pet. utrinque ad latus dente instructa. ¶

75. *cordifolia*, caul. simplici, fol. ovatis acutis, flor. subsessilibus terminalibus, pet. semibifidis. Allion. pedem. n°. 1581. t. 23. f. 3. Hab. in saxosis Pedemontani et Nicaeensis comitatus. ¶

76. *chloraefolia*, calycib. glabris clavatis, petal. semibifidis, fol. glaucis, inferioribus ovalibus summis cordatis amplexicaulibus. Smith. ic. ined. 1. p. 13. t. 13. Hab. in Armenia. Fol. Lysim. nummul. Caul. subdichotomus. Cal. clavatus. ¶

77. *alpestris*, petal. quadridentatis, caul. dichotomo, capsul. ovato-oblongis, fol. linearilanceolatis glabris erectis, peduncul. viscidis. Ait. Kew. 2. p. 98. Jacq. austr. 1. t. 96. Lychnis alpestris, pet. quadrifidis coronatis, fol. recurvis. Lin. suppl. 244. Hab. in Austriae alpinis. ¶

78. *quadridentata*, petal. quadridentatis (3-4-lobis), caul. dichotomo, fol. linearib. recurvis. L. Syst. veg. sub Lychn. Jacq. austr. 1. 120. Seg. suppl. 1. 5. f. 1. Hab. in alpib. Fol. margine sparsim pilosa. Styl. 4-5.

79. *rupestris*, caul. dichotomo multifloro, flor. erectis, petal. emarginatis, calycib. teretibus, fol. lanceolatis. L. Flor. dan. t. 4. Hab. in montibus, ad saxa. Gypsophylam refert. ♂

80. *polygonoides*, petal. emarginatis, cal. cylindræo 5-gono piloso, flor. capitatis, fol. ellipticis utrinque acutis. Willd. l. c. Lychnis flore albo cum circulo purpureo. Tournef. cor. 24. Hab. in ins. Naxo. Caul. decumbens. Fol. serpilli. W.

81. *dianthoides*, petal. bifidis nudis, calycib. striatis: terminalibus subsessilibus; lateralibus pedunculatis. Cucub. Saxifragus. Lin. Willd. p. 689. Schreb. Dec. 9. t. 5. Hab. in Oriente. Cal. inter 2 foliola sessilis, fere ut in Diantho. L.

82. *Saxifraga*, caulib. subunifloris, pedunc. longitudine caulis, fol. glabris, flor. hermaphroditiis semineis; petal. bifidis.

L. Jacq. coll. 2. p. 37. Segu. ver. t. 6. f. 1. Hab. in montib. cretaceis. Cal. clavatus.

83. *Campanula*, caul. erecto gracili 2-3-floro, flor. subcernuis, petal. nudis, cal. infundibuliformi. Cucub. *alpestris*. Allioni, sub quo nomine benevole missa a cl. Balbis. Priori affinis. Caul. spitham. longus, subfiliformis. Fol. linearia.

84. *repens*, rad. longo repente, caule simplice ascendente, cal. villosa, fol. linearibus. Habit. in Siberia prope lacum Baikal. Post meridiem flor. dormiunt, cor. involutis. Patrin.

85. *sericea*, flor. terminalib. subsolitariis peduncul., caul. basi ramoso, folisque linearilanceolatis sericeis. S. *sericea*, fol. acuminatis succulentis hirsutis lucidis, flor. carneo. Allioni Pedem. n°. 1573. t. 79. f. 3. Hab. in maritimis sabulosis pedemontanis. Sequentem refert. Cal. clavatus, striatus.

86. *vallesia*, caulib. subunifloris decumbentibus, fol. lanceolatis tomentosis longitudo calycis. L. Allion. pedem. n°. 1524. t. 23. f. 2. Lychnis pumila saxatilis alpina, flore carneo, fol. crasso mol. i. tomentoso. Amoen. acad. 1. p. 158. Bocc. mus. 65. t. 54. Hab. in alpinis Vallesiis, Valdensibus. Cal. clavatus stris 10 elevatis.

87. *acaulis*, cespitosa acaulis depressa, peduncul. elongatis nudis, petal. emarginatis. L. Flor. dan. t. 21. Allion. pedem. n°. 1583. t. 79. f. 1. Habit. in alpinis. Fol. caespitosa, graminea. Alpinum ornamentum. Fruct. oblongus. A.

* *norwegica*, fol. linearib. magis sparsis, caul. subfolioso. Hab. in Norwegia. Vahl. S. acaule nonnihil refert, sed caul. & pedunc. 2-phyllus. Var. ?

88. *exscapa*, cespitosa, flore sessili, fructibus subrotundis. Allion. pedem. 1584. t. 79. f. 2. Hab. in alpinis lapponicis, austriacis, pedemontanis, helveticis. Priori valde affinis. Fol. graminea.

1119. **STELLARIA**. Cal. 5-phyllus, patens, Petala 5, bipartita. Caps. ovata, 1-locularis, polysperma, apice 6-dentata.

1. *nemorum*, fol. cordatis petiolatis, panicula dichotoma. L. Flor. dan. t. 271. Engl. bot. t. 92. St. cordata. Syst. veg. XV. p. 452. Hab. in nemoribus montosis. ¶

2. *aquatica*, caul. diffuso, fol. cordatis flor. solitariis 4-5-gynis, fruct. pendulis

Cerastium aquaticum. L. Curt. t. 34. Engl. bot. t. 538. Hab. in aquosis, fossis. Priori speciei nimis affinis, ut genere di-jungi possit.

3. *latifolia*, fol. inferiorib. petiolatis subcordatis, caulinis ovatis subsessilib. caul. simpliciter dichotomo, pedunc. fructiferis reflexis. St. *Cerastium*. Syst. veg. ed. XV. in nota p. 452. Hab. in Germaniae sylvaticis montosis. St. *dichotoma* quorumd.

4. *ciliata*, fol. (parvulis) cordatis acutis subpetiolatis, petiol. ciliatis. Vahl. in Herb. Juss. Hab. in Peru. Caul. ramosus diffusus?

5. *dichotoma*, fol. cordato-ovatis sessilibus (subumplexicaulis), caule dichotomo, flor. solitariis, pedunc. fructiferis reflexis. L. Smith. ic. ined. t. p. 14. t. 14. Hab. in alpihus Sibiricis. Fol. subciliata, cordata.

6. *pubera*, pubens, fol. sessilib. ovatis ciliatis, pedicellis erectis breviuscul., petal. cal. longioribus. Michaux. Flor. 1. p. 273. Hab. in montibus sylvat. Carol. septentr. Cal. lacin. ovatae.

7. *radians*, fol. lanceolatis serrulatis, petalis quinquepartitis. L. Anom. ruth. 83. t. 10. Fol. subovato-lanceolata, sessilia, pubescentia, non manifeste serrata. Ex herb. Juss. Hab. in Sibiriae uliginosis.

8. *bulbosa*, fol. ovato-lanceolatis subtus aveniis, caule subramoso, pedunc. unifloro, radice filiformi repente bulbifera. Willd. Wulf. in Jacq. collect. 3. p. 21. Jacq. ic. rar. 3. t. 468. Hab. in alpih. Carinthiae, locis umbris humidis. Simill. Trientali europaeae. $\overline{\text{T}}$

9. *Holostea*, fol. lanceolatis serrulatis, petalis bifidis. L. Fl. dan. t. 698. Engl. bot. t. 54. Hab. in Europae nemoribus. Cal. nervius. Fl. Majo. $\overline{\text{T}}$

10. *graminea*, caul. diffusis, fol. linearibus integerrimis, flor. paniculatis divaricatis, petal. calycis longitudine. Willd. Fl. dan. t. 414. t. 415. S. arvensis. Hoffm. S. Dilleniana. Moench. Hab. in agris, ad sepes. Aestate.

11. *palustris*, fol. linearibus lanceolatis integerrimis glaucis, flor. paniculatis, petalis bipartitis calyce majoribus. Retz. Fl. scand. ed. 2. n. 548. S. glauca. Smith. brit. 2. p. 476. Hab. in paludibus. Cal. trinervis. $\overline{\text{T}}$

12. *crassifolia*, fol. oblongo-lanceolatis crassiusculis glaucis, pedunc. unifloris solitariis axillaribus, petal. calyce majoribus, caul. erecto. Willd. p. 712. Ehrh. Beytr. 3.

p. 60. Hab. in pratis humidis. Fol. subundulata.

* β ? *brevifolia*, fol. lanceolatis, pedunc. solitariis axillaribus fol. longioribus, petal. ultra medium bifidis cal. subaequantibus. Schum. Flor. Zeeand. p. 142. Flor. dan. t. 415. Hab. in maritimis. Fol. non 3-linearia.

13. *Alsine*, fol. oblongo-lanceolatis, pedunculis subgeminatis uni-multiflorisve, petalis calyce brevioribus, caule decumbente. A. *uliginosa*, Roth. germ. II. p. 489. S. *Alsine*. Hoffm. Willd. p. 113.

β . *hypericifolia*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis. Allion. Hab. in paludibus, ad rivulos.

14. *undulata*, fol. oblongis undulatis, caule angulato, flor. axilla ibus. Thunb. jap. 185. Ej. ic. pl. Jap. fasc. 3. Hab. in Japonia juxta vias. Caul. decumbens herbaceus.

15. *cerastoides*, fol. oblongis pubescentibus, caule decumbente, pedunc. unifloris geminatis erectis, petalis calyce majoribus. Willd. p. 714. Flor. dan. t. 92. Smith. ic. ined. 1. p. 15. t. 15. Jacq. coll. t. 1. 16. *trigynum*. Vill. delph. 3. p. 645. t. 46. Cer. Hab. in alpih. Petiol. infracti. Hall. Var. styl. 4-5.

16. *multicaulis*, fol. lanceolatis glabris, simplicissimis, pedunculo subsolitario terminali, petal. calyce majoribus. Willd. S. *cerastoides*. Wulf. in Jacq. Collect. 1. p. 254. t. 19. Hab. in alpihus Carinthiae. $\overline{\text{T}}$

17. *humifusa*, fol. ovatis subsecundis sessilibus, caul. procumbentibus tetragonis, pedunculis solitariis abbreviatis. Swartz. in N. Act. holm. 1799. p. 111. t. 4 f. 1. Fl. dan. t. 978. Hab. in alpihus Sueciae, Norvegiae. \odot

18? *biflora*, fol. subulatis, ramis bipartitis, petalis emarginatis, calycib. striatis. Swartz. l. c. 1788. p. 36. t. 1. f. 1. Willd. p. 715. Fl. dan. t. 12. Hab. in alpihus Lapponicis. Facie Saginae. Caul. digitales, filiformes.

Obs. Petala laeviter tantum emarginata, itaque Arenarii proxima, magnitudine calycis. Willd. -

19. *groenlandica*, caul. decumbentibus subbifloris, fol. linearibus basi subciliatis, petal. emarginatis, fructib. globosis. Retz. scand. ed. 2. n. 552. Hab. in Groenlandia. Pollicaris. Fol. subcarnosa. Flor. magni, vix emarginati.

20. *Arenaria*, fol. spathulatis, caule erecto bifido viscoso, ramis alternis, petal. emarginatis. L. Hab. in Hispania. Cerastium refert. Cal. substrigosus. Rami alterni, divaricati, longitudine fere caulis. Cor. campanulata. L.

21. *scapigera*, acaulis, fol. lineari-lanceolatis trinerviis, pedunculis radicalibus unifloris. Willd. p. 716. Hab. Flos magnitudine st. gramineae. W. †

1120. ARENARIA. Cal. 5-phyllus, patens. Petala 5, integra. Caps. 1-locularis, polysperma.

* *Fol. ovatis.*

1. *peploides*, fol. ovatis acutis carnosius. L. Honkenya peploides. Ehrh. Bryt. 2. p. 181. Hab. ad littora maris. Glandulae in receptaculo. An diversum genus? T

2. *tetraquetra*, fol. ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis, flor. subcapitatis. L. Allion. pedem. t. 89. f. 1. *β*. *Gypsophyla aggregata*. L. Sp. pl. 2. p. 581. Hab. in Pyrenaeis, Monspelii et Turini.

3. *biflora*, fol. obovatis obtusis, caulib. procumbentibus, pedunc. bifloris lateralib. L. Allion. ped. t. 44. f. 1. et t. 64. f. 3. Jacq. ic. rar. t. 89. Hab. in Eur. australis alpinis. T

4. *lateriflora*, fol. ovatis obtusis, pedunculo laterali bifloro. L. Hab. in Sibiria. Caul. filiformis, simplicissimus.

5. *trinervia*, fol. ovatis acutis petiolatis nervosis. L. Flor. dan. t. 429. Hab. in sylvis, etiam super salices.

6. *ciliata*, fol. oblongo-obovatis subpetiolatis ciliatis, cor. calyce majoribus, cal. foliol. lanceolatis subnerviis. Wulf. Jacq. Coll. t. p. 245. t. 16. f. 2. Flor. dan. t. 346. Hab. in alpinis. Fol. tuberculis aspera.

7. *balearica*, cespitosa repens, fol. ovatis lucidis subcarnosis, caule repente, pedunculis elongatis unifloris. L. L'Herit. stirp. t. p. 29. t. 15. A. muscosa. Medic. Hab. in insul. Balearibus. Plantula elegans, cespitem latum efficiens.

8. *multicaulis*, fol. pulposo-subcoriaceis ovato-lanceolatis sessilibus ciliatis, cor. calyce majoribus, cal. foliol. ovato-lanceolatis subnerviis. Jacq. Collect. t. p. 248. t. 17. f. 1. Hall. t. 17. Hab. in alpinis.

9. *serpillifolia*, fol. subovatis acutis sessilibus laevibus, corol. calyce brevioribus. L. Hab. in sylvis glareosis, agris.

10. *ruscifolia*, fol. (minimis) coriaceis ovatis acuminatis, flor. subpaniculatis dichotomis, cal. subcampanulatis acutis, petal. cal. longioribus. Poir. enc. p. 365. Hab. . . . Quoad fol. A. serpillifoliae similis.

11. *spathulata*, caul. erecto filiformi pubescente, fol. inferioribus spathulatis, petal. obovatis cal. longioribus. Desf. atl. t. p. 358. A. *cerastioides*. Poir. enc. 6. p. 363. Hab. in Barbariae arenosis et sylvaticis. Caul. et pedunc. viscosi. Flor. axillares subpaniculati.

* * *Fol. linearibus.*

12. *procumbens*, fol. lineari-lanceolatis, caulib. prostratis villosis, petal. calyce subbrevioribus. Vahl. symb. 2. p. 50. t. 33. A. geniculata, fol. linearibus, flor. paniculatis pubescentibus, petal. calyce brevioribus. Poir. A. *herniariaefolia*. Desf. atl. p. 359. Hab. in ruderalis Tuncet inque Aegypto.

13. *polygonoides*, fol. linearibus, caulib. procumbentibus, pedunc. bifloris terminalibus erectis, calyc. subviscidis enerviis. Wulf. in Jacq. Collect. t. p. 241. t. 15. Seg. veron. 3. p. 177. t. 4. f. 1. Hab. in alpinis Helvetiae, Carinthiae. ☉

14. *cerastioides*, caul. bifloro, fol. breviusculis subovatis glabris acuminatis, cal. ovato-lanceolatis, petal. ellipticis brevioribus. Hab. in Pyrenaeis. Mirb. Caespitosa. parvula. Cal. facin. subalbo-marginatis glabris.

15. *Villarsii*, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus subrigidis, caul. erecto trifloro. Balbis Miscell. bot. p. 21. A. *triflora*. Vill. Delph. 3. p. 623. t. 47. Hab. in Delphinatu et in alpinis vallis Pissii et Tendae. Molineri. Au potius *Stellariae* species? cujus habitus est. Petal. emarginata?

16. *montana*, fol. lineari-lanceolatis, caulib. sterilibus longissimis procumbentibus. L. Vent. Hort. Cels. t. 34. *β*? A. *linearifolia*. Poir. enc. 6. p. 366. Hab. in Europ. australiori montibus. Stellar. aut Cerast. refert. T

17. *calycina*, glaberrima, fol. gramineis brevibus, pedunc. longissimis subunifloris, petal. lanceolatis hyalinis, cal. multo brevioribus. Poir. enc. 6. p. 370. Hab. in Barbariae subhumidis. Facie Stellar. gramineae.

18. *bavarica*, fol. semicylindricis carnosius obtusis, petal. lanceolatis, pedunc. terminalibus subulnatis. L. Saxifraga bavarica. Raj. hist. 1013. Hab. in Bavaria, Baldo, Sibiria. Caul. stipulaceus? T

19. *gypsophiloides*, fol. linearibus: radica-
libus subetacris, panic. subpubescente
fastigiata, pet. lanceolatis, cal. ovaris lon-
gioribus. Willd. p. 723. Hab. in Oriente.
Statura *A. saxatilis*. Caul. semipedalis ad-
scendens. Panic. brachiata, subfastigiata,
pedicellis ultimis subvillosis. S.

20. *cucubaloides*, fol. linearibus margi-
ne scabris, panic. dichotoma pubescente,
petal. obovatis. Smith. ic. ined. 1. p. 17. t. 17.
Tournef. cor. 17. Hab. in Armenia. Cal. vis-
cosus. Pedic. glabri? $\overline{\text{L}}$

21. *dianthoides*, fol. linearibus margine
scabris, bracteis ventricosus pedunculos su-
perantibus. Smith. l. c. p. 16. t. 16. Hab. in
Armenia. $\overline{\text{L}}$

*** *Fol. lineari-subulatis.*

22. *triflora*, fol. lineari-subulatis basi
ciliatis: floralibus calycibusque ovato-acu-
minatis subjungentibus, caul. diffuso, ra-
mis erectis subtrifloris. Cav. ic. 3. p. 26.
t. 249. f. 2. Willd. p. 721. In Eur. australi-
ori. Petal. cal. striato duplo fere longiora.

23. *saxatilis*, fol. subulatis, caulibus
paniculatis, calyc. foliolis ovatis obtusis.
L. A. fol. subulatis, calycinis laciniiis inen-
drata ipsis latiore acutis obtusis. Guett.
stamp. 2. p. 281. Hab. in Europa. $\overline{\text{L}}$ \dagger

24. *verna*, fol. subulatis obtusiusculis ner-
vosis, caulib. subpaniculatis elongatis, cal-
ycib. acuminatis striatis. L. Ja q. austr. 5.
p. 2. t. 404. Hab. in Eur. australior. alpinis.
Petal. cal. longiora?

β . *cespitosa*, caul. basi ramosissimo ra-
dicato, fol. lineari-subulatis striatis, pe-
dunc. pubescentib. 1-2-floris subfastigiatis,
cal. foliol. ovatis striatis petal. aequantibus.
A. cespitosa. Ehrh. Hab. in Hercynia, Py-
renaeis. Cal. latere purpureo. Ab *A. verna*
non distincta dicitur; tamen in speciminib.
sub hoc nomine in Herbariis occurrentibus,
pedunc. vidi elongatos, 2-3-floros, et cor.
cal. multo longiorem.

Obs. A. Raccida et uti inosa Schleicheri
hujus aut *A. verna* varietates videntur. Cal.
et folia minus striata sunt.

25. *obtusata*, fol. linearib. obtusis, cal.
ovato-lanceolato viscido petal. subaequante.
Allion. l. c. p. 114. Hall. helv. 863. Hab. in
pascuis saxosis alpinis. Pet. ovata. \dagger

26. *recurva*, fol. radicalib. congestis re-
curvis subulatis, caul. simplice subtrifloro,
cal. ovatis striatis. Allion. pedem. n. 1713.
t. 89. f. 3. Wulf. in Jacq. Coll. 1. p. 244. t. 6.
f. 1. Hab. in alpinibus.

27. *glabra*, suberecta multicaulis, fol.
subulato-linearibus planis patulis, pedic.
elongatis divaricatis; cal. foliol. ovalibus
laevibus cor. brevioribus. Michaux. Flor. 1.
p. 274. Hab. in rupib. Car. septentrional.
Affin. Siell. 1-florae. Walt. dicitur.

28. *stricta*, multicaulis glabra stricta,
fol. subulato-linearib. erectis, cal. foliol.
ovali-lanceolatis striatis cor. breviorib. Mi-
chaux. In rupib. Amer. bor.

29. *scabra*, minuta, fol. lanceolato-acutis
patentibus scabris, pedunc. paniculatis di-
chotomis, cal. asperis corol. brevioribus,
caul. simplice brevissimi. Poir. l. c. Hab. in
alpinum rupibus aridis.

30. *echinata*, pumila, fol. filiformibus
subulatis, flor. subpaniculatis, calycib. pe-
dunculisque hispido-glandulosis, cor. cal-
licem aequante. Poir. enc. 6. p. 377. Hab.
in alpinibus. Fol. tantum subpubescentia.

31. *hispida*, fol. subulatis subtus his-
pidis. L. Hab. Monspelii. Habitus Sper-
gulae. Fol. subtus pilis hispida. Panic. pri-
mum dichotoma. L. \dagger

32. *verticillata*, fol. subulatis spinosis flo-
ribusque verticillatis. Willd. p. 725. Tournef.
cor. 18. Hab. in Armenia. Rami lignosi, no-
dosi. Pedunc. quadriflori subcapitati axil-
lares. Cal. foliola pungentia. Petala lan-
ceolata. W.

33. *austriaca*, fol. linearibus, ramis
erectis, pedunc. terminalib. longissimis bi-
nis, petal. obtusis emarginatis. Willd. p. 728.
Jacq. Flor. austr. 3. t. 270. Allion. t. 64. f. 2.
Hab. in Austriae et Italiae alpinibus.

* *Stellarioides*. *Stellaria biflora*, caulib.
prostratis ramosissimis, ramis annuis erectis
longissime bifloris, fol. linearib. acutis,
calycibusque dorso trinerviis, petal. calyce
longioribus crenato-bifidis. Jacq. Collect. 1.
p. 251. t. 18. Var. antecedentis. Willd.

34. *grandiflora*, fol. subulatis planis
striatis: radicalibus confertis, caulib. sub-
unifloris. L. Allion. ped. t. 10. f. 1. Allion.
spec. pedem. 49. t. 10. f. 1. Hab. in montib.
et alpinibus. $\overline{\text{L}}$

35. *cherlerioides*, caespitosa, repens,
fol. linearibus sulcatis imbricatis, calycinis
aequalibus. Vill. Dauph. 3. p. 626. *A. lan-
ceolata*. Allioni. Hab. in rupibus alpestris.
Cor. cal. brevior. Fol. subovata.

36. *liniflora*, caulib. erectis inferne ra-
mosis suffruticosis, fol. subulatis, flor. ge-
minis. Lin. suppl. p. 241. Jacq. Coll. 2.
p. 107. t. 3. f. 3. *A. striata*. Vill. delph. 3.

p. 630. t. 47. Hab. in Eur. australi. Caul. distorti. Cal. foliol. lanceolatis : striis 2. Cor. magnitudine Lini. L.

Obs. Differt ab *A. grandiflora*, fol. non plano-gramineis, cal. foliolis non multistriatis, caule multo longiore, basi que suffruticoso. L.

37. *Gerardi*, fol. lineari-subulatis trinerviis, flor. geminis terminalibus, calycin. foliolis acuminate marginemembraceis trinerviis. Willd. p. 729. A. liniflora. Jacq. aust. 5. t. 445. Gerardi. prov. 405. t. 15. f. 1. Hab. in Austr. et Gall. alpinis.

38. *juniperina*, fol. subulatis spinosis, caulib. erectis, calycin. striatis, capsulis oblongis. L. Smith. ic. ined. 1. p. 35. t. 35. Lam. ill. t. 378. f. 2. Hab. in Armenia. Flor. paniculati. Cal. oblongi, 5-nervi. Pet. lanceolata. L.

*** *Foliis setaceis.*

39. *sibirica*, fol. caespitosis setaceis longissimis, caul. subnudo umbellato-trifloris, cal. ovato obtuso cor. multo minoribus. A. capillaris. Poir. in Enc. bot. 6. p. 380. Hab. in Sibiria Patrini. Pl. elegans. Pet. ovalia.

40. *capillacea*, fol. setaceis rigidis glabris, flor. erectis, petal. cal. majorib. Allion. pedem. t. 86. f. 2. Hab. in agro pedemontano. †

41. *laricifolia*, fol. setaceis, caule superne nudifusculo, calycin. subhirsutis. L. Jacq. aust. 3. p. 39. t. 272. Magnol. hort. 11. t. 11. Hab. in montosis. Cal. oblongus, lineatus, cylindricus, pubescens. L.

42. *striata*, fol. linearibus erectis appressis, calycin. oblongis striatis. L. Allion. l. c. t. 26. f. 4. Cum priore saepe confunditur. An var.? Hab. in alpinis.

43. *patula*, pubens, caul. paniculatis multifloris, fol. setaceo-subulatis subfasciculatis patentibus, petal. submarginatis, cal. striato acuto sublongioribus. Michaux. Flor. t. p. 273. Hab. in rupibus circa Knoxville. Facie *A. tenuifoliae*. Cal. cor. brevior.

44. *tenuifolia*, fol. oppositis subulatis setaceis solitariis, cauleque ramosissimo dichotomo glabris, cal. subulatis striatis cor. longioribus. L. Lam. ill. t. 378. f. 1. Engl. bot. t. 219. Vaill. paris. t. 3. f. 1. Hab. in agris et ad muros. Pet. subovata. Fol. glabra. Caul. non stipulaceo ab *Als. segetali* differt.

45. *viscosa*, minor erecta piloso-viscida, fol. subulatis basi dilatatis striatis, cal. acu-

minatis. Thuill. Flor. paris. p. 219. Hab. in arenosis, praesertim in sylva prope Romainville. An diversa ab *Als. viscosa*?

46. *heteromalla*, caul. ramosissimo, flor. paniculato-fastigiatis, fol. setaceis fasciculatis secundis, cal. ovato acutis margine lato albo. *A. saxatilis* auctorum. Vaill. paris. 7. t. 2. f. 3. *A. setacea*. Thuill. Hab. in rupibus et in arenosis. Caul. basi lignosus, pubescens, fusco-ruber. Fol. basi ciliata. Flor. gypsoph. prostratae, cal. subcampanulatus.

47. *fasciculata*, fol. subulatis et fasciculatis setaceis, caul. erecto stricto subim-plice, flor. fasciculatis, cal. acuminatis, petalis brevissimis. Jacq. austr. 2. t. 182. Hab. Monspelii et in Austria. Non confundenda cum *Bufonia tenuifolia*. ☉

β. *rostrata*, caul. ramosissimo, subpaniculato, fol. setaceis internodiis subbrevioribus alternis subfasciculatis, cal. fol. conniventibus subulatis. *A. saxatilis*. Vill. Delph. 3. p. 631. Hab. in Gallia meridionali.

Obs. Media quasi inter heteromallam et *A. fasciculatam*. Caul. basi decumb. subfrutescens, ram. erectis tenuibus. Cal. albidus, dorso viridis, subcylindricus, longus rostriformis. Fol. non unum latus spectant.

48. *filifolia*, caulib. suffructosis dichotomis, fol. setaceis, pedunc. terminalibus simplicibus unifloris. Vahl. symb. 1. p. 33. t. 12. Hab. in Arabia.

SPERGULARIA. Habitu *Spergulae*. Flor. *Arenariae*. Caul. ad genicula stipulaceus (humifusus).

49. *rubra*, caul. prostratis glabris, fol. filiformibus internodio brevioribus, seminibus compresso-angulatis. *A. rubra* campestris. L. Roth. germ. 2. p. 481. Smith. brit. 2. p. 479. Hab. in agris, arenosis, subhumidis. Cal. caps. aequans.

50. *media*, caul. prostratis, fol. semicylindricis carnosius internodia aequantibus, seminib. compressis margine alatis. *A. media*. L. Willd. p. 722. Flor. dan. t. 740. *A. marina*. Roth. l. c. ? Hab. in pascuis et arenosis maritimis. Priore multo major. Cal. caps. brevior.

51. *canadensis*, fol. linearib. carnosius, internod. multo longioribus, staminib. 5, caps. globosa. *A. rubra*. β. Michaux. Flor. t. p. 274. Hab. in Canada ad flum. St.-Laurentii. Pedunc. reflexi. Caps. cal. longior.

52. *purpurea*, caul. erecto ? piloso ramis divaricatis, fol. subsetaceis internodiis

dimidio brevioribus. Habit. in Hispania. Thiebaut. Pl. pulchella, gracilis. Cor. amoene rubra.

Obs. Hae species aut *Spergulis*, ab iis enim styliorum numero tantum differre videntur, associandae, aut sub peculiari genere, cui *Alsine* segetalis L. addi posset, ab *Arenariis* separandae, cum quibus seriem haud naturalem efficiunt.

1121. *CHERLERIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Nectaria* 5, bifida, petaloidea. *Anther.* alternæ, steriles. *Caps.* 1 locularis, 3-valvis, trisperma. L. (polysperma. Sm.)

1. *sedoides*. L. Jacq. austr. t. 284. Lam. ill. t. 329. Smith. brit. 2. p. 483. Hab. in alpinis. Fol. triquetra, subulata. Flor. lutescentes. Petal. 0?

1122. *DEUTZIA*. *Cal.* campanulatus, 5-fidus. *Petala* 5, obtusa, indivisa. *Filam.* trifida. *Caps.* triaristata, 3-locularis, 3-valvis, basi dehiscens, polysperma.

1. *scabra*. Thunb. jap. p. 185. t. 24. Lam. ill. t. 380. Hab. in Japonia. Fol. opposita ovata scaberrima. Raccini terminales. W.

1123. *HORTENSIA*. Flor. diffformes: flor. solitarii *Cal.* 5-dentatus, minutus. *Cor.* 5-petala. Flor. cymam constituentium *Cal.* 4-5-phyllus, maximus, coloratus, petaloideus, persistens. *Cor.* minuta, subglobosa: petal. 4-5, concavis deciduis. *Fruct.* (Stam. 8, 10, 11.)

1. *speciosa*, fol. late ovatis serratis acuminatis, flor. cymosis. *Hydrangea hortensis*. Smith. ic. pict. 1. p. 12. t. 12. Willd. Sp. II. p. 613. Roth. N. bot. beytr. p. 202. H. opuloides, Lam. enc. 3. p. 136. Ej. ill. t. 380. Hab. sponte in India, nunc ornamentis causa ubique colitur.

Obs. Flor. primo albidio-virentes, tandem amoene rosei; ob sterilitatem, fructum enim nondum perfecerunt, longe durant, demum marcescunt. Var. flor. purpureo-violaceis. An potius *Hydrangeae* species? sed flor. trigyni. Nonnulli hoc genus, forte minus recte, ad familiam *Rhamnorum* retulerunt, forsitan ob florum similitudinem cum *Viburno opulo*.

1124. *GARIDELLA*. *Cal.* 5-phyllus, petaloidens. *Nect.* 5, bilabiata, bifida. *Caps.* 3, connexæ, polyspermae.

1. *Nigellastrum*. L. Lam. ill. t. 379. G. fol. tenuissime divis. Garid. prov. 203. t. 39. Hab. in Galloprovincia. ☉

MALPIGHIACEÆ (Gen. 1124-1129.) praesertim dignoscuntur petal. 5-ungiculatis a. pedicellatis, cal. lociniis persistentibus alternis, et cum staminibus 10 disco hypogyni inseru. Styli 1-3. Pericarp. est vel capsula vel baccæ, plerisque vero samara s. nux alata. Fol. sunt integra substipulacea. Fruticulosae sunt vel arbusculaeformes. J.

1125. *MALPIGHIA*. *Cal.* 5-phyllus, basi extus poris binis melliferis. *Petala* 5, subrotunda, unguiculata. *Filam.* basi coherentia, (aut libera.) *Drupa* 1-locularis tripyrena, nucibus monospermis.

1. *glabra*, fol. ovatis integerrimis glabris, pedunc. umbellatis. L. Mill. ic. t. 181. f. 2. Cav. diss. 8. p. 406. t. 234. f. 1. Willd. Sp. II. p. 731. Hab. in Amer. australi. Umbellae 4-florae.

2. *biflora*, fol. ovato-lanceolatis acutiss. pedunc. bifloris. Lam. enc. 4. p. 326. M. punicifolia. Cavan. l. c. p. 406. t. 234. f. 2. Hab. in sylvis Amer. calidioris. h

3. *punicifolia*, fol. ovatis integerrimis glabris, pedunc. unifloris. L. Lam. enc. l. c. Plum. gen. t. 166. f. 2. Hab. in Amer. meridionali. h

4. *saginea*, fol. oblongo-ovatis integerrimis, subtus sericeo-nitentibus, pedunc. tripartito-umbellatis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 850. Hab. in ins. Grenada Americae. h

5. *glandulosa*, fol. ovato-ellipticis acuminatis integerrimis glabris, basi biglandulosis, racem. axillaribus. Willd. p. 733. Flor. racemosis monogynis. Cav. l. c. p. 411. t. 239. f. 2.

β? *glandulifera*, fol. ovatis subintegerrimis, utrinque pilis decumbentib. obsessis, racemis axillaribus, pedicell. superne glandula truncata instructis. Jacq. ic. rar. 3. t. 469. Hab. in Antillis; β. in sylvis ad Caracas. h

6. *tuberculata*, fol. ovato-lanceolatis in-

tegerimis subpubescentibus, racem. lateralibus, ramis tuberculatis. Willd. Jacq. Schoenh. t. p. 54. t. 104. Hab. ad Caracas Americæ. h

7. *nitida*, fol. oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis axillarib., florib. monozynis. Willd. Cav. p. 411. t. 239. f. 1. Hab. in Jamaicae apricis cretaceis. Mon-gyua. h

8. *Armeniaca*, fol. ovato-oblongis acutis integerrimis coriaceis glabris, racem. axillaribus. Willd. Cavan. p. 410. t. 238. Hab. in Peruvia. Fructus refert Prunum Armeniacum h

9? *dubia*, fol. ovato-acutis cartilagineis glabris, florib. racemosis minimis, ramis punctatis. Cavan. l. c. p. 413. t. 242. Hab. in ins. St.-Dominici. Fructus ignotus. †

10. *urens*, fol. oblongo-ovatis: setis decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis. L. Mill. dict. ic. t. 181. f. 1. Cav. p. 407. t. 235. f. 1. Lam. ill. t. 381. f. 1. Hab. in Amer. calidiore.

11. *angustifolia*, fol. lineari-lanceolatis: setis utrinque decumbentibus rigidis, pedunc. umbellatis. L. Cav. p. 408. t. 236. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. h

12. *canescens*, fol. oblongis obtusis pubescentib., racem. axillarib. compositis. Ait. Kew. 2. p. 105. Hab. in India occidentali. h

13. *crassifolia*, fol. ovatis integerrimis obtusis subtomentosis, racem. terminalib. L. Aubl. guj. t. 182. β? *Mourelia*, fol. ovatis subtomentosis acutis? flor. luteis spicatis. Aubl. guj. t. p. 450. t. 183. Hab. in Amer. calidiore. An β. distincta? Arb. h

* *macrophylla*, fol. ovatis latissimis subtus ferrugineo-tomentosis. Hab. in Brasilia? (Herb. Juss.)

14. *spicata*, fol. lanceolatis subtus ferrugineis, spicis terminalibus, petalis hastatis Cav. diss. 8. p. 409. t. 237. Hab. in insula St.-Dominici. Arb. 30-pedalis. Cor. flava. Var. quoad folia. h

15. *altissima*, fol. ovato-oblongis subtus tomentosis, flor. albis spicatis. Aubl. guj. t. p. 455. s. 181. Cav. diss. 8. p. 413. Hab. in sylvæ Gujanæ. Arb. 60-80-pedalis. Priori affinis. h

16. *verbascifolia*, fol. lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus. L. Aubl. t. t. 184. Cav. 8. p. 411. t. 240. Hab. in Amer. calidiore. h

17. *lucida*, fol. obovatis cuneiformib. integerrimis aveniis nitidis, racemo terminali. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 852. Hab. in Ind. occid. h

18. *coriacea*, fol. ovatis acutis integerrimis utrinque glabris, racemis terminalib. spicatis. Swartz. l. c. 2. p. 854. Sloan. hist. 2. p. 20. t. 163. f. 1. Hab. in fruticetis mont. Jamaic. australis. h

19. *aquifolia*, fol. lanceolatis dentato-spinosis subtus hispidis. L. pl. 611. Cavan. diss. 8. p. 409. t. 236. f. 2. Plum. gen. 36. ic. 168. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. h

20. *coccifera*, fol. subovatis dentato-spinosis. L. Cavan. 8. p. 408. t. 235. f. 2. Jacq. ic. rar. 3. t. 470. Flor. rubelli. Hab. in America. h

Obs. Planta junior profert fol. elliptica absque dentibus: vid. Lam. ill. gen. t. 381. f. 2. Willd. quæ *M. microphylla* quorund.

† GALPRIMIA. Cavan. Cal. glandulis nullis. *Filam.* libera. *Stigm.* simplicia. *Fruct.* trilocularis. Cavan.

21. *glauca*, caul. fruticoso, fol. ovatis, flor. racemosis terminalibus. Cavan. ic. 5. p. 61. t. 489. Hab. in R. mexicano, cum sequentib. Cor. flava. Styli rubri.

22. *hirsuta*, caul. fruticoso, fol. ovato-acutis hirsutis, racem. terminalibus. Cav. l. c. p. 62.

23. *glandulosa*, caul. fruticoso glabro, fol. lanceolatis, petiolis biglandulosis. Cav. ic. 6. p. 43. t. 553.

1126. BANISTERIA. Cal. 5-partitus, basi extus poris binis melliferis. *Petala* subrotunda, unguiculata. *Filam.* basi coherentia. *Samaræ* 3, 1-spermæ ap. ce simpliciter alate. (Arb. aut Frut. ut plurimum scandentes.)

1. *angulosa*, fol. cordatis panduriformib. angulosis, petiolis biglandulosis, umbella terminali. Willd. p. 737. Cav. diss. 9. p. 436. t. 252. Hab. in America calidiore. h

2. *palmata*, caule volubili, fol. palmatis subtus tomentosis, petiolis biglandulosis. Cavan. l. c. 9. p. 430. t. 257. f. 2. Hab. in ins. St.-Domingo. h

3. *sagittata*, fol. hastato-sagittatis, lobis truncatis, subtus tomentosis, petiolis biglandulosis. Willd. Cavan. diss. 9. p. 430. t. 257. f. 3. Hab. ad St.-Domingo. h

4. *auriculata*, caule volubili, fol. sub-sagitat. glabris, lobis rotundatis, floribus umbellatis. Cav. l. c. p. 428. t. 255. Hab. in Brasilia prope Rio Janeiro. h

5. *ciliata*, fol. orbiculato-cordatis ciliato denticulatis glabris, petiolis biglandulosi, umb. terminali. Willd. Lam. enc. 1. p. 36 j. Cav. diss. g. p. 427. t. 254. Hab. in Brasilia. Commers. h

6. *emarginata*, fol. ovatis subcordatis apice emarginato-cuspidatis, desuper tomentosis, flor. racemoso-corymbosis. Cav. Hab. in America. Caul. dichotomus. W.

7. *Quapara*, fol. ovatis acutis, subtus tomentosis, umbella pedunculata axillari-Willd. Aubl. guj. 1. p. 464. t. 186. Cav. g. p. 425. t. 250. Hab. ad pratorum margines Gujanæ. h

8. *sinemariensis*, fol. ovatis acuminatis glabris setis adpressis tectis, umb. racemosis axillaribus. Willd. Fol. ovatis acuminatis, florib. luteis corymbosis. Aubl. 1. p. 402. t. 185. Cav. p. 425. t. 251. Cum priore.

9. *purpurea*, fol. subrotundo-ovatis obtusis glabris, racemis axillaribus terminalibusque, seminibus erectis. L. Cav. diss. g. p. 423. t. 246. f. 1. Hab. in America meridionali. h

10. *microphylla*, fol. ellipticis utrinque rotundatis glabris, racemis terminalibus subpaniculatis. Willd. Jacq. obs. 3. p. 7. t. 56. Hab. in Carolina? h +

11. *chrysophylla*, fol. ovato-oblongis acutiusculis, versus apicem obsolete sinuatis, subtus tomentoso-nitidis aurcis. Lam. enc. 1. p. 368. Cav. diss. g. t. 245. Jacq. Schoenb. 1. p. 55. t. 105. Hab. in Brasilia, et ad Caracas. h

12. *laurifolia*, fol. ovato-oblongis rigidis, racemis terminalibus. L. Hab. in Jamaicae et Hispaniolæ fruticetis montium. h

13. *caerulea*, fol. ovatis acutis, racem. axillaribus brachiatis, capsulis trinis monopteris divaricatis. Lam. enc. 1. p. 367. Cav. diss. g. p. 421. t. 243. Hab. in America calidiore. h

14. *nitida*, fol. ovato-oblongis integerrimis subtus nitidis, panicula terminali foliosa. Lam. enc. 1. p. 369. Cav. t. 244. Hab. in Brasilia. h

15. *muricata*, fol. ovatis subtus tomentosis, racemis paniculatis terminalibus, sa-

maris act. leatis. Willd. Cavan. l. c. p. 423. t. 246. f. 2. Hab. in Peru. h

16. *leona*, fol. ovato-oblongis acuminatis coriaceis reticulato-venosis glabris, ramis paniculatis terminalibus. Willd. Cavan. g. p. 424. t. 247. Lam. ill. t. 381. Hab. in Sierra Leone. h

17. *sericea*, ramis ancipitibus, fol. ovatis subtus tomentosis, petiolis biglandulosis, flor. racemosis. Cavan. diss. g. p. 429. t. 258. Hab. in Brasilia. h

18. *ferruginea*, fol. ovatis acuminatis subtus ferrugineis, racemis paniculatis, ramulis squamosis. Willd. Cavan. t. 248. Hab. in Brasilia ad Rio Janeiro. An diversa a *B. fulgente*. L. ? h +

19. *longifolia*, fol. oblongis acuminatis rigitis nitidis, panicula terminali, ramis patentissimis. Sw. Fl. ind. occid. a. p. 856. Hab. in Caribæis.

20. *macrocarpa*, fol. oblongis acuminatis, florum spica composita, fruct. alis latissimis obliquis rotundatis. Hab. in Martinica. (Herb. Juss.)

21. *dichotoma*, fol. ovatis, racemis dichotomis. L. *Convolvulifolia*, fol. ovatis acumine productis glabris, flor. umbellatis. Cav. diss. g. p. 428. t. 256 ? Hab. in America calidiore. h

22. *ovata*, fol. ovato-lanceolatis subtus subvillosis, petiolis biglandulosi, ramis divaricatis, umb. terminalibus. Willd. Cav. t. 257. f. 1. Hab. in ins. St.-Dominici. h

23. *fulgens*, fol. subovatis subtus tomentosis, racemis brachiatis, pedunc. umbellatis. L. Triopteris, fructu fulgente majore aureo. Pluk. mant. 185. Hab. in America. h

24. *heterophylla*, fol. subtus tomentosis orbiculato-cordatis, ramis divaricatis subrotundis, petiolis biglandulosi, umb. terminali sessili. Willd. Cav. l. c. p. 426. t. 253. Sloan. hist. 2. p. 27. t. 162. f. 2. Hab. in America meridionali.

25. *brachiata*, fol. subovatis, ramis brachiatis, seminibus introrsum angustioribus. L. Hab. in America.

1127. HIRÆA. Cal. 5-phyllus, absque poris melliferis. *Petala* subrotunda, unguiculata. *Filam.* basi coherentia. *Samaræ* 3, 1-spermae bialatæ.

1. *reclinata*, fol. simplicib. obovatis ob-

tusis superne pubescentibus, inferne glabris. Willd. Sp. II. p. 743. Hab. Carthagenae in sylvis. *h*

2. *odorata*, fol. simplicibus ovatis acutis superne glabris, inferne tomentosis. Willd. Hab. in Guinea. Fol. venosa superne atro-viridia, inferne tomento flavescenti villosa adpresso tecta.

3. *pinnata*, fol. impari-pinnatis, foliol. ovato-oblongis altern. utrinq. glabris. Willd. Flabellaris paniculata. Cav. diss. 9. p. 436. t. 264. Hab. in Sierra Leone. *h*

Obs. An cum sequente genere potius coniungi debet?

1128. **TRIOPTERIS**. *Cal.* 5. partitus, basi extus poris 2-mellisferis. *Petala* subrotunda, unguiculata. *Filam.* basi cohærentia. *Stigm.* 3-6. *Samaræ* 3, 1-spermae 3-aeatæ.

1. *jamaicensis*, fol. oblongis acuminatis venosis nitidis, racemis compositis terminalibus laxis, fructib. trialatis. Sw. obs. 183. Hab. ad sepes Jamaicae, Hispaniolae.

2. *indica*, fol. subrotundo-ovatis subcordatis acuminatis nitidis glabris, racemis compositis terminalibus, fructib. trialatis. Willd. p. 744. Hab. in India orientali. Ped. et calyces pubescentes. Samar. alae aequales venosae. *W.*

3. *ovata*, fol. ovatis obtusiusculis subcordatis glabris, petiolis biglandulosis, racemis compositis terminalibus, fructib. trialatis. Willd. Cav. l. c. p. 431. t. 259. Hab. in insula St-Dominici. *h*

4. *rigida*, fol. subrotundis acutis marginatis lineatis coriaceis, racem. compositis axillaribus, fructib. trialatis. Swartz. Fl. ind. occident. 2. p. 859. Hab. in fruticetis montosis Hispaniolae. *h*

1129. **TETRAPTERIS**. *Cal.* 5. partitus, utrinque biglandulosus. *Petala* limbriata, unguiculata. *Fructus* quadrialatus, alis 2-inferioribus minoribus.

1. *acutifolia*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, foliis paniculatis terminalibus. Cav. diss. 9. p. 433. t. 761. Triopteris. Willd. Sp. II. p. 744. Hab. in Cajenna. *h*

2. *mucronata*, fol. ovatis mucronatis glabris, floribus paniculatis. Cav. l. c. p. 434. t. 262. f. 2. Hab. in Cajenna. *h*

3. *buxifolia*, fol. ovatis subsessilib. paucis, flor. umbellatis terminalibus. Cav. l. c. t. 262. f. 1. Hab. in Antillis. *h*

4. *citrifolia*, fol. ovato-oblongis acutis glabris, umbellis axillaribus pedunculatis, fructibus quadrialatis, alis binis inferioribus brevioribus. Willd. p. 745. Swartz. Fl. ind. occident. 2. p. 857. sub Triopteride. T. inaequalis, fol. ovato-acutis sub cordatis glabris, flor. umbellatis, alis inferioribus brevioribus. Cav. t. 260. Hab. in sylvis montium Jamaicae. *h*

1130. **ERYTHROXYLON**. *Cal.* turbinatus. *Cor.* petalis basi squamula nectarifera emarginata. *S.am.* basi connexa. *Drupa* 1-locularis.

1. *areolatum*, fol. obovatis mucronatis, pedunculis lateralibus aggregatis flore duplo longioribus. Willd. Sp. II. p. 716. Jacq. amer. 134. t. 87. f. 1. Ed. pict. t. 129. Brown. jam. 278. t. 8 f. 2. Hab. in mariitimis circa Carthagenam Amer. *h*

2. *hypericifolium*, fol. obovatis emarginatis, pedunc. lateralibus subsolitariis, flore triplo longioribus. Willd. Lam. enc. 2. p. 394. Cavan. diss. 8. p. 403. t. 230. Hab. in insula Mauriti et Borbon. *h*

3. *buxifolium*, fol. obovatis integerrimis, nervo medio supra elevato, pedunc. axillaribus brevibus solitariis basi utriculatis. Lam. l. c. 2. p. 394. Cav. l. c. p. 403. t. 231. f. 1. Hab. in Madagascar. *h*

4. *ferrugineum*, fol. ovatis saepius emarginatis subtus ferrugineis, squamulis imbricatis, flor. solitariis. Cav. p. 404. t. 131. f. 2. Hab. cum priore.

5. *rufum*, fol. ovatis coriaceis inferne rufis, squamulis imbricatis, axillis multifloris. Cav. l. c. t. 232. Hab. in Amer. meridionali. *h*

6. *havanense*, fol. ovatis, squamulis imbricatis, flor. subsolitariis, drupa gibbosa. Cavan. t. 233. Hab. Havanae in rupetribus mariitimis. *h*

7. *Coca*, fol. oblongis obtusiusculis venosis, subtus irilineatis, pedunc. lateralibus sparsis flore brevioribus. Willd. Lam. enc. 2. p. 383. Cav. 3. p. 402. t. 229. Hab. in Peru. Fol. venosa.

8. *Syderoxyloides*, fol. ovato-oblongis obtusiusculis, ramis scabris apice compressis, pedunculis subternis axillaribus. Lamarck.

enc. 2. p. 393. Cav. diss. 8. t. 228. Pluk. amalb. 187. t. 442. f. 3. Hab. in ins. Bourbon. h

9. *squamatum*, fol. elliptico-lanceolatis acuminatis obtusis, ramulis squamosis floriferis. Vahl. symb. 3. p. 60. t. 63. Swartz. Flor. 2. p. 861. Hab. in Cajenna inque Caribaeis. h

10. *macrophyllum*, fol. ellipticis acuminatis, axillis multifloris, squamis lanceolato-subulatis semisimplexicaulibus striatis. Vahl. eclog. 2. p. 33. Cavan. p. 401. t. 227. Hab. in Cajenna. h

11. *laurifolium*, fol. lato-lanceolatis, squamis acutis concavis, flor. glomeratis terminalibus. Cavan. p. 400. t. 226. Hab. in insula Mauritii. h

12. *longifolium*, fol. oblongis crassis nitidis, squamulis acutis deciduis, floribus axillaribus. Cavan. p. 399. t. 225. Lam. l. c. p. 394. Hab. in Madagascar. h

13. *monogynum*, fol. ovato-lanceolatis, flor. axillaribus monogynis. Roxb. Corom. 1. 88. Hab. in India. Sigm. 3.

T E T R A G Y N I A.

1131. MICROPETALON. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* (minutissima), integra, aut nulla. *Caps.* ovata, cal. longior, 4-valvis. (Habitum *Stellariae*, *Spergulastrum*. Mich.)

1. *lanuginosum*, pubescens, fol. lanceolatis in petiolum angustatis, flor. apetalis. *Spergulastrum*. Michaux. Flor. 1. p. 275. Hab. in meridionalibus Amer. septentrional. Pedunc. subsolitarii, longi, demum reflexi.

2. *lanceolatum*, glabrum, fol. lanceolatis utrinque angustatis. Michaux. l. c. Hab. in Amer. boreali. Petala brevissima, ovalia. Flor. paniculati.

3. *gramineum*, glaberrimum, fol. linearibus, erectis. Michaux. p. 276. Hab. in Pennsylvania. Stell. gramineam exacte refert. Flor. corollati.

Obs. Hae plantae genus naturale cum *Stellariis* efficere videntur.

P E N T A G Y N I A.

TEREBINTHACEAE *Decandriae* 5-gynae (gen. 1132-37.)

1132. AVERROHA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5; superne patentia. *Stam.*

annulo nectarifero inserta, alterna breviora. *Bacca* 5-gona, 5-locularis.

1. *Bilimbi*, fol. pinnatis: foliol. ovato-lanceolatis, fructib. oblongis obtusangulis. Willd. Sp. II. p. 749. Lam. ill. t. 385. Cav. diss. 7. p. 373. t. 219. Rumph. 1. t. 36. Hab. in India. h

2. *Carambola*, fol. pinnatis, foliol. ovatis inaequalibus acuminatis, fructibus oblongis acutangulis. Willd. Cavan. diss. 7. p. 374. t. 220. Rumph. 1. t. 35. Hab. in India.

1133. TAFIRIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Caps.* pentacocca, unilocularis, 5-valvis, 5-sperma. Sem. arillata.

1. *guyanensis*. Aubl. guj. 1. p. 470. t. 188. Lam. ill. t. 386. *Jonquetia paniculata*. Willd. p. 750. Hab. in Gujanae sylvis. Arb. 50-pedalis. Fol. impari-pinnata. Flor. parvi paniculati.

1134. SPONDIAS. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo 5-loculari.

1. *Mombin*, fol. petiolo communi compresso. L. Willd. Sp. II. p. 750. S. *Myrobalanus*. Jacq. amer. 139. t. 88. Ed. pict. t. 88. Sloan. hist. 2. p. p. 126. t. 219. f. 3. 4. 5. Hab. in India occidentali. h

2. *Myrobalanus*, petiolis teretibus: foliolis nitidis acuminatis. L. S. *Mombin*, racemis terminalibus longitudine folia aequantibus. Jacq. amer. 138. Sloan. hist. 2. p. 125. t. 219. Mer. surin. 13. t. 13. Hab. in Amer. meridionali.

3. *Mangifera*, foliolis oblongis integerrimis panicula racemosa. Willd. *Mangifera* pinnata. Lin. suppl. 156. Hab. in India.

4. *dulcis*, petiolis teretibus, sexjugis, foliolis serratis, costatis. Forst. pro l. n.º. 198. *Cytherea*. Lam. enc. 4. p. 260. ill. t. 384. Sonn. it. 2. t. 123. Hab. in Societ. insulis et in ins. Mauritii. h

1135. POUPARTIA. *Cal.* minimus, 5-fidus. *Stamina* disco crenato inserta. *Styli* approximati. *Pericarp.* nuce 5-loculari.

1. *borbonica*. Fol. impari-pinnata: simplicibus nonnullis intermixtis. Flor. racemosi. Arb. *Bois de Poupard* dicta. Juss. gen. pl. Genus quoad nonnullos caracteres ulterius observandum.

1136. *ROBERGIA*. *Cal.* 5-partitus.
Petala 5. *Drupa* nuve monosperma, putamine bivalvi.

1. *frutescens*. Willd. Sp. II. p. 752. Rorea frut. Aubl. cuj. t. p. 467. t. 187. Hab. in sylvis Gujanæ. Fol. impari-pinnata. Panic. corymbosa. h

Obs. Discrepat caps. simplici, caeteris forsân abortivis, a sequente genere. Juss.

1137. *CNESTIS*. *Cal.* 5-partitus.
Petala 5. *Caps.* 5, bivalves, monospermae, leguminiformes, utrinque villosæ, latere dehiscences.

1. *glabra*, fol. pinnatis, foliolis ovatis petiolatis utrinque glabris, racemulis fasciculatis brevib. et tenuib. Lam. enc. 3. p. 21. et ej. illust. t. 387. f. 1. Willd. p. 752. Hab. in insula Mauritiî et Borbonia. h

2. *polyphilla*, fol. pinnatis, foliolis ovato-oblongis subvillosis brevissime petiolatis, racemulis tomentosis, capsulis obtusissimis. Lam. l. c. Fj. ill. gen. t. 387. f. 2. Hab. in Madagascar. h

3. *corniculata*, fol. pinnatis, foliolis oblongo-acuminatis, nervo medio villosa, capsulis oblongis acutis corniculatis tomentosis prurientibus. Lam. l. c. Hab. in Sierra Leone. h

4. *trifolia*, fol. ternatis, foliolis ovatis acuminatis superne laevibus, panic. terminali. Lam. enc. p. 24. Hab. in Africa. h

1138. *COTYLEDON*. (Umbilicaria) *Cor.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala. *Squamæ* nectariferæ 5, ad basin germinis. *Caps.* 5.

* *Foliis dilatatis, planis.*

1. *orbiculata*, fol. ovato-spathulatis obtusis cum acumine laevibus, flor. paniculatis. Ait. Kew. 2. p. 106. Willd. p. 753. Decan. l. Pl. grass. ic. Hab. ad Cap. b. spei cum trib. sequentibus. Cor. subcampanulata pulchra, coccinea. Var. fol. orbiculatis. h

2. *paniculata*, fol. oblongo-ovatis sessilibus, flor. divaricato-paniculatis, caule fruticoso ramoso. Thunb. prod. 83.

3. *fascicularis*, fol. cuneiformibus fasciculatis terminalibus, caul. incrassato, ramis carnosus subconicis. Ait. Kew. 2. p. 106. Burm. afr. 41. t. 18.

4. *cuneata*, fol. cuneatis carnosis hirtis, flor. paniculatis hirsutis. Thunb. prod. 83.

5. *serrata*, fol. ovalibus crenatis. Caul. spicato. L. Dill. elth. t. 95. f. 112. Hab. in Creta, Sibiria.

6. *Umbilicus*, fol. peltatis crenatis, caule subsimplici, flor. pendulis, bracteis integris. L. Lam. ill. t. 389. f. 1. Engl. bot. t. 325.

7. *peltatum*, caul. erecto maculato simplici, flor. racemosis pendulis, cor. cylindrica punctata. Wendl. obs. 40. Hab. in Lusitania, Hispania, Anglia. Rad. tuberosa. T

7. *lutca*, fol. dentato-crenatis: infimis peltatis, caule subsimplici, flor. erectis, bract. subdentatis. Huds. Smith. brit. 2. p. 484. C. *Lusitanica*. Lam. enc. 2. p. 140. Dodart. mem. 265. t. 73. Hab. in Europa australi, Oriente. T

8. *alternans*, fol. orbiculato-spathulatis integerrimis, flor. paniculatis glabris quadrifidis. Vahl. symb. 2. p. 51. C. *orbiculata*. Forsk. Hab. in Arabia. Cor. ovata, laciniis lanceolatis flavo-rubentibus. V.

9. *hemisphaerica*, fol. suborbiculatis surfure punctatis subtus convexis, flor. subsessilibus. Ait. Kew. 2. p. 107. Pl. grass. ic. Dill. elth. 112. t. 95. f. 111. Hab. in Aethiopia. h

10. *triflora*, fol. obovato-carnosis integris, flor. spicatis ternis sessilib. Thunb. prod. 83. Hab. ad Cap. b. spei.

11. *coccinea*, fol. obovatis acutis carnosis, spica foliosa terminali. Willd. Cav. ic. 2. p. 54. t. 170. Hab. . . . h

12. *Malacophyllum*, fol. lanceolat. acutis carnosis, spica cylindrica terminali aphylla. Willd. p. 756. Fall. it. 3. app. tab. O. f. 1. Hab. in Davuriae alpebus. Similis Crass. spinosae. W. ☉

13. *mamillaris*, fol. alternisterei-ovatis, flor. alternis subsessilibus. Lin. suppl. 242. Hab. ad Cap. b. spei. Cum praecedente ad sequentem divisionem potius pertinet?

** *Fol. teretibus.*

14. *spuria*, fol. spathulato-lanceolatis carnosis, caul. fruticoso. L. Willd. p. 754. C. *teretifolia*, fol. subteretibus carnosis obtusis basi angustioribus, caul. crasso frutescente. Lam. enc. 2. p. 139? Burm. afr. t. 19. f. 2. Moris. L. 12. t. 7. f. 40. Hab. in Africa, loc. petrosis. Flor. pulchri, pediculi, rubri.

15. *tuberculosa*, caul. frutescente, fol. subcylindricis lineari-oblongis acutis, flor. subpaniculatis, pedunc. caly.ibusque pubescentibus. Decand. Pl. grass. Lam. enc. 2. p. 139. Burm. afr. t. 20. f. 1. Ad Cap. b. sp. Flor. speciosi, subaurantiaci, tubulosi. Caul. crass. tuberculatus.

16. *ungulata*, fol. semi-cylindricis canaliculatis: apice margine calloso-purpureo. Lam. enc. 2. p. 139. Burm. afr. t. 22. f. 1. Hab. in Africa.

17. *purpurea*, fol. lineari-oblongis carnosis glabris, florib. paniculatis. Thunb. prod. 83. Hab. ad Cap. b. spei, cum 4 sequentibus.

18. *teretifolia*, fol. carnosis subteretib. hirsutis, flor. paniculatis, caule hirsuto. Thunb. prod. 83.

19. *calalioides*, fol. teretibus, florib. paniculatis, caule ruticoso. Thunb. Lin. suppl. 242. Flores lutei referunt Calaliam.

20. *reticulata*, fol. teretibus, floribus reticulato-paniculatis, caule fruticoso. Th. Lin. suppl. 242. Refert Sueticem reticulatam.

21. *papillaris*, fol. oppositis tereti-ovatis, flor. corymbosis. Lin. suppl. 242.

22. *hispanica*, fol. oblongis subteretibus, flor. tubulosis fasciculatis. Loeff. it. t. 1. Plant. grass. ic. C. pistorinia. Orteg. monogr. f. 2. Hab. in Africa, Oriente, et Hispania. Cor. infundibulif. longi, rubelli. ♂ ☉

23. *viscosa*, fol. teretibus, racem. terminalibus villos-viscosis, caule ramoso, cor. campanulata. Vahl. symb. 2. p. 51. C. Mucizonia. Orteg. Jacq. Coll. suppl. 112. t. 13. f. 2. C. hispida. Lam. enc. 2. p. 141. Plant. grass. ic. Hab. in montosis Hispaniae et in Barb. Caul. rubescens.

1139. SEDUM. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Squamæ nectariferæ 5, ad basin germinis. Caps. 5.

* *Planifolia*.

1. *verticillatum*, fol. quaternis, lanceolatis serratis. L. Amoen. acad. 2. p. 252. t. 4. f. 14. Willd. Sp. II. p. 760. Hab. in Europa australi et in Sibiria. Caul. pedalis erectus. Racemi axillares et flor. parvi.

2. *Telephium*, fol. planiusculis ovatis sparsis serratis, corymb. folioso, caul. erecto. L. Lam. ill. t. 3. o. f. 1. Decand. Pl. grass. ic. Flor. dan. t. 686. Hab. in agris petrosis syriaticis.

* *maximum*, fol. ovatis dentatis conjugatis, umbell. alaribus, flor. albicantibus. Hall. helv. n.º. 955. Hab. in alpiis.

3. *Telephioides (americana)*, fol. planis ovatis, utrinque subcutis dentatis, flor. corymboso-fasciculatis. Mich. Flor. 1. p. 277. Hab. in Amer. septentr. rupib. altissimis. Flor. purpurascens.

4. *Anacampseros*, fol. cuneiformib. integerrimis subsessilib. caulib. decumbentibus, florib. corymbosis. L. Plant. grass. ic. Hab. in Gallo-provinciae rupibus, et in Suecia. Flor. purpurei.

Obs. Fol. hyeme decidua. Lin., persistencia secundum alios.

5. *divaricatum*, fol. cuneiformi-rhombis emarginatis petiolatis, caulib. ramosis, paniculis terminalib. divaricatis. Ait. Rev. 2. p. 108. S. Aizoides. Plant. grass. ic. ? Hab. in Mar. ra. ♀

6. *Aizoon*, fol. lanceolatis serratis planis, caule erecto, cyma sessili terminali. L. Pl. grass. ic. Hab. in Sibiria.

7. *hybridum*, fol. cuneiformibus concavis subdentatis aggregatis, ramis repentibus, cyma terminali. L. Gmel. sib. 4. t. 67. f. 1. Murray in comm. nov. Goett. 6. p. 35. t. 5. Hab. in Tataria.

8. *populifolium*, fol. planis cordatis dentatis petiolatis, corymbis terminalibus. Ait. Kew. 2. p. 109. Plant. grass. ic. Curt. mag. t. 118. Hab. in Sibiriae alpiis.

9. *stellatum*, fol. planiusculis angulatis subrotundis, flor. lateralibus sessilibus solitariis. L. Camer. hort. p. 7. ic. 2. Hab. in Italia, Gallia, Helvetia. ☉

10. *alsinefolium*, fol. planis ovatis, caule paniculato, petalis obtusis. Hab. in umbrosis lapideis Pedemontii. Fol. tenuia venosa.

11. *Cepaea*, fol. planis sublinearib., caul. ramoso, floribus paniculatis, petal. acutis. Willd. p. 763. Hab. in umbrosis.

* *galiioides*, caule adscendente, fol. oppositis: inferioribus 3-4-nis. Allion. ped. n.º. 1742. t. 65. f. 3. Hab. in agris Pedemont. Flor. rubicundi.

12. *libanoticum*, fol. radicalibus fasciculatis spathulato-lanceolatis, caule subnudo simplicissimo. L. Hab. in Palaestina. Facies semperv. montani. Racem. terminalis, longitudine caulis. L.

13. *heptapetalum*, fol. ovato-oblongis plantiusculis, pedunc. subhirsutis, florib. paniculatis. Poir. enc. bot. 4. p. 630. *S. caeruleum*. L. ? Hab. ad Barbariae rupes, ad littora maris. Flor. caerulei. Habitu Sedi, sed stamina 12-15 Semperviv.

14. *ternatum*, pumilum, repens, fol. planis rotundato-spathulatis ternis, cyma subristachya. Michaux. Flor. 1. p. 277. Hab. in rupibus Amer. boreal. Flor. albi 8-dri: terminalis solitarius 10-ander. M.

* * *Teretifolia*.

15. *dasyphyllum*, fol. oppositis ovatis obtusis carnosius, caule infimo, flor. sparsis. L. Jacq. hort. t. 153. Pl. grass. ic. Engl. bot. t. 656. S. fol. semiglobosis subovat. sessilibus quadrifariam imbricatis. Wachend. ulr. 391. Hab. in Europ. australior. rupib. Flor. elbidi.

Obs. Stamina 10-12; styli 5-6. In planta culta rami elongati, flor. sparsis: β *gracile*. Decand.

16. *pulchellum*, caul. assurgentibus, fol. sparsis linearib. obtusis planiusculis, cym. polystachya, flor. sessilibus. Mich. l. c. Hab. in rupibus circa Knoxville. Spic. longae recurvatae: flor. unilaterales.

17. *reflexum*, fol. subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurvatis, flor. subcymosis primo recurvis. Hab. in sylvis. Cal. acutus.

18. *virens*, fol. subulatis sparsis basi solutis, flor. cymosis, petal. calyce lanceolato sequilongioribus. Ait. Kew. 2. p. 110. Hab. in Lusitania. \mathcal{E}

19. *rupestre*, fol. subulatis quinquefariam confertis basi solutis, flor. cymosis. L. Engl. bot. t. 170. Pl. grass. ic. Dill. elth. t. 256. f. 333. Hab. ad rupes. Fol. glauca. Cal. obtusiusculus, rubicundus basi 1-phyllus. Sm.

* 20. *altissimum*, flor. suboctopetalis, fol. sparsis: inferioribus teretibus; superiorib. depressis. Enc. bot. 4. p. 634. Plant. grass. ic. Semperviv. sediforme. Jacq. Hort. 1. t. 81. et Misc. austr. 1. p. 133. t. 6. Hab. in Europ. australi.

21. *saxatile*, fol. sparsis semiteretibus obtusis basi solutis, caule ramoso decumbente. Willd. p. 765. Allion. ped. n.º 1746. t. 65. f. 6. S. rupestre. Flor. dan. 59. Plant. grass. ic. S. alpestre. Villars. Hab. in alpinis et montosis ad rupes.

22. *rubens*, fol. ovatis alternis sessilibus remotis, caule prostrato basi ramoso, flor. terminalibus subumbellatis, pedunc. simplicissimis. Haenke it. sudet. p. 114. Hoffm. Flor. germ. p. 208. Hab. in sudetis. Var. prioris secundum Willdeow Caps. purpureasc.

23. *quadrifidum*, fol. sparsis teretibus obtusis, caule simplici, florib. umbellatis tetrapetalis. Willd. Falk. it. 3. app. n.º 90. t. P. f. 1. Hab. in rupibus Asiae borealis. \mathcal{E}

24. *hispanicum*, fol. linearibus teretibus depressis sparsis, cyma patula, flor. hexapetalis. Ait. Kew. 2. p. 111. Dill. elth. t. 256. f. 332. Hab. in Hispan. Gall. et Carinthia.

25. *lineare*, fol. tereti-linearib. oppositis, cyma trifida. Thunb. jap. 187. Hab. in Japonia.

26. *caeruleum*, fol. oblongis alternis obtusis basi solutis, cyma bifida glabra. Vahl. symb. 2. p. 51. Shaw. it. f. 550. S. azureum. Desf. atl. Hab. in fissuris rupium ad Manub Tuneti.

27. *album*, fol. oblongis obtusis teretiusculis sessilib. patentibus, cyma ramosa. L. Flor. dan. t. 66. Blackw. t. 428. Lam. ill. t. 390. f. 2. Hab. in muris antiquis.

28. *acre*, fol. alternis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. L. Pl. grass. ic. Curt. lond. ic. t. 32. Hab. in campis sterilissimis, ad muros antiquos. Flor. majusculi, aurei.

* *aestivum*, fol. ovato-teretiusculis obtusis, caul. bifido, flor. luteis sessilib. Allion. Fl. Pedem. Lob. ic. 378. Hab. in saxosis. Flores inter dichotom. sessilis. Pl. acida annua. \odot

29. *sexangulare*, fol. subternis teretiusculis, adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis, cyma trifida. L. Curt. lond. ic. Hab. in campis siccis, ad muros. Fol. subtus rubentia, insipida.

30. *annuum*, caule erecto solitario annuo, fol. ovatis sessilibus gibbis alternis, cyma recurva. L. Excl. syn. Raj. Hab. in Europa boreali. Simile S. antecedenti, sed Fol. rubicunda. Flor. lutei. L. \odot +

* *Guetardi*, fol. teretibus obtusis, basi solutis acutis, calycib. teretibus, petal. lanceolatis, caul. corymboso dichotomo. Vill. Delph. 3. p. 679. t. 45. Hab. prope Estampes. Flor. albi. Forte eadem est ac S. *anglicum* aut *rubens*.

31. *anglicum*,

31. *anglicum*, fol. subovatis adnato-ses-silibis gibbis subalternis, cyma ramosa bifida. Huds. Engl. bot. t. 171. Flor. dan. t. 82. Raj. synop. t. 72. f. 2. S. rubens. Lightf. Hab. in rupibus et maritimis Angliæ et Norvegiæ. Caul. basi procumbens. Petala acuminata alba: carina rubra. Sm.

32. *aristatum*, fol. teretibus utrinque acutis basi solutis radicalibus fasciculatis, petal. aristatis lanceolatis. Vill. l. c. p. 680. t. 45. Cresc. in Delph. prope Sigoyes. Flor. corymbosi, albid. Totum glabrum? +

33. *hirsutum*, fol. ovalibus obtusis planiusculis, margine pubescentibus, caul. ramoso erecto, petal. aristatis ovatis, stam. longioribus. Allion. pedem. n. 1754. t. 65. f. 5. Poir. enc. 4. p. 634. Hab. in Ital. al-pibus et in monte aureo. Fol. radicalia rosacea fasciculata. Caul. rubens. Pet. alba: linea purpurea, pubentis. Cal. hirsutus. A.

34. *nicaense*, fol. subulatis sparsis basi solutis, cyma bifida, flor. longe pedunculatis. All. l. c. 1752. t. 90. f. 1. Cresc. super saxa in comitatu Nicaensi. Flor. magni, albid, unilaterales. A. ☉

35. *atlanticum*, ramis filiformibus paniculatis villosis, fol. semiteretibus. S. hispidum. Dels. atl. t. p. 361. Hab. in Atlante. Cor. aurea. Stam. 10-12. D.

36. *pubescens*, fol. oblongis obtusis supra planiusculis, cyma bifida, petal. lanceolatis. Vahl. symb. 2. p. 52. Hab. in fissuris rupum Tuncti.

37. *villosum*, fol. oblongis supra planiusculis pedunculisque axillaribus subunifloris pubescentibus, petal. ovatis obtusiusculis. Vahl. symb. 2. p. 52. Fl. dan. t. 24. Engl. bot. t. 394. Pl. grass. ic. Hab. in pratis paludosis. Flor. purpurei. Stam. 7-8.

38. *palustre*, fol. brevi-linearibus, flor. cymosis. Sedum palustre subhirsutum purpureum. Baul. pin. p. 281. Cresc. in palustrib. montosis. Sed. villosa major. Flor. purpureo-caerulei, majusculi. Fol. latiora.

38. *monregalense*, fol. verticillatis linearibus, caul. procumbente paniculato, pedunc. villos-viscosis. Balbis Miscell. bot. p. 27. t. 6. Hab. in alpestribus ad rupes Pedemontii. Caul. plures ex radice. Flor. primo nutantes, albi.

39. *atratum*, caule erecto, flor. corymbosis fastigiatis. Jacq. aust. t. 8. Plant. grass. ic. Schenck. it. t. p. 48. t. 6. f. 33. Hab. in Helvetiæ, Galliæ et Italiæ alpinis.

Cal. atro-purpurascens. Petal. alba aut flava, ovata. Germina atro-purpurascencia.

40. *pusillum*, erectum, fol. alternis teretiusculis oblongis, flor. 8-andris alternis subpedicellatis. Michaux. Flor. 1. p. 276. Hab. in Carol. septentr. Flor. albi.

41. *nudum*, fol. sparsis oblongo-cylindraceis obtusis, caul. fruticosis ramosissimis, ramis tortuosis, cymis terminalibus. Ait. Kew. 2. p. 112. Hab. in Madera. h

Obs. In promontorio Cap. b. sp. plantarum succulentarum ceterum feraci nullae Sedi species, quantum scio, huc usque sunt detectae.

1140. PENTHORUM. Cal. 5-fidus. Petala nulla, aut quinque. Caps. 5-cuspidata, 5-locularis.

1. *sedoides*. L. Lam. ill. t. 390. Hab. in Amer. boreal. aquaticis. Pedunc. terminal. spicis revolutis.

1141. BERGIA. Cal. 1-phyllus, caducus, 5-dentatus. Petala 5. Caps. 1, globosa, 5-torulosa, 5-locularis, 5-valvis: valvulis petaloidicis. Sem. plurima. (Baeca ovalis: cortice crasso, 1-locularis, polysperma. Roxb.)

1. *verticillata*, fol. lanceolatis apice denticulatis, flor. verticillatis. Willd. p. 770. B. aquatica. Roxb. Corom. 2. p. 22. t. 142. B. capensis. Lin. Rheed. g. t. 78. Hab. in India orientali, nec ad Cap. b. sp.

2. *glomerata*, fol. obovatis crenulatis; flor. glomeratis. Lin. suppl. 243. Thunb. prod. 82. Hab. ad Cap. b. spei.


1142. SURIANA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Styli inserti lateri interiori germinum. Sem. 5, nuda.

1. *maritima*. L. Jacq. amer. 140. Ed. pict. p. 70. Lam. ill. t. 389. Hab. in Amer. calidioris maritimis. h

1143. GRIELUM. Cal. 5-fidus. Petala 5. Filam. persistentia. Pericarpia 5, monosperma.

1. *tenuifolium*. L. Lam. ill. t. 388. Geranium. Burm. afr. 88. t. 34. f. 1. Hab. in Aethiopia. Fol. incana multifida. Cor. lata, ca

Kk



1144. *OXALIS*. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* unguibus connexa. *Stam.* inaequalia, 5-breviora, exteriora basi connata. *Caps.* angulis elasticè dehiscens, 5-gona. *Sem.* subarillata.

* *Fol. simplicibus.*

1. *monophylla*, acaulis, scapo unifloro, fol. ellipticis obtusis, filamentis glabris. Willd. Sp. II. p. 772. Jacq. Oxal. Vien. 1794. n. 35. p. 56. t. 79. f. 3. Thunb. Diss. de Oxal. n. 1. p. 8. t. 1. f. 1. Fol. Bellidis. Flos O. Acetosellae.

Obs. Hab. paucis speciebus exceptis, quarum locus natalis indicatur, omnes fere ad *Cap. b. spei.* Fol. fere omnia, uti in Filicibus primo convoluta, et plus minusve irritabilia.

2. *lepidula*, acaulis, scapo unifloro, fol. obovatis subretusis, filamentis glandulosis pilosis simplicibus. Willd. Jacq. l. c. p. 55. t. 21. Cor. albida.

3. *rostrata*, acaulis, scapo unifloro, fol. obovatis retusis, filamentis interioribus apice rostratis piloso-glandulosis, antheris lateralibus. Cor. violaceo-albida. W.

** *Foliis binatis.*

4. *asinina*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis lanceolatis margine cartilagineis denticulatis, petiol. alatis. W. p. 773. Jacq. p. 59. t. 24. Cor. magna flava.

5. *lanceaefolia*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis ternatisque margine cartilagineis scabris, petiolis alatis. Jacq. p. 26. t. 26. Cor. flava.

6. *leporina*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis ellipticis emarginatis, margine cartilagineis denticulatis, petiolis alatis. W. Jacq. p. 60. t. 25. Cor. alba, margine rubicunda.

7. *crispa*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis subrotundo-obovatis emarginatis, margine undulatis petiol. subrotundo-alatis. Jacq. p. 58. t. 23. Cor. maxima, alba.

*** *Foliis ternatis.*

† *Acaulis, scapounifloro.*

8. *fabaeifolia*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis obovatis emarginatis mucronatis, petiolis alatis. W. p. 774. Jacq. p. 63. t. 27. Cor. ampla flava.

9. *laburnifolia*, foliolo medio sublanceolato, lateralibus oblique oblongis, stylis

longissimis, filamentis denticulatis. Jacq. p. 63. t. 28. Pubescens. Petioli compressi. Cor. flava.

10. *sanguinea*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis, foliol. intermedio basi attenuato, petiolo semitereti compresso, calycibus simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 775. Jacq. p. 64. t. 29. Filam. interiora hispida.

11. *ambigua*, stylis longissimis, foliol. immaculatis planis, calycinis foliol. aequalibus. Jacq. Oxal. n. 59. p. 80. t. 43. Cor. alba fundo flavescente.

12. *undulata*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis: foliol. oblongis obtusis undulatis; intermedio cuneiformi. calycinis foliol. pilosis punctatis, unico spatulato majore, stylis staminibus longioribus. W. Jacq. p. 81. t. 44. Fol. pilosiuscula. Cor. alba fundo flavo.

13. *fuscata*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis maculatis oblongis obtusis: foliolo intermedio cuneiformi-subrotundo, calycibus aequalibus interrupte bistriatis, stylis staminibus longioribus. W. p. 776. Jacq. p. 82. t. 45. Fol. subretusa maculata.

14. *glandulosa*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis: foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque glandulosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 83. t. 46. Glandulae pedicellatae. Cor. alba fundo flavo.

15. *tricolor*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis, foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Var. cor. interne flava. p. 84. t. 47. et alba. Jacq. p. 85. t. 48.

16. *rubro-flava*, acaulis, scapo unifloro foliis paullo longiore erecto, fol. ternatis lanceolato-oblongis retusis, foliolo intermedio cuneiformi, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 87. t. 50. Cor. flava, externe rubro-marginata.

17. *flaccida*, acaulis, scapo unifloro fol. duplo longiore nutante, fol. ternatis oblongis retusis, foliolo intermedio cuneiformi, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. p. 777. Jacq. p. 88. t. 51. Cor. alba fundo flava, externe rubro-marginata.

18. *exaltata*, acaulis, scapo unifloro fol. duplo longiore stricto, fol. ternatis ellipticis emarginatis subtus villosis: foliolo intermedio cuneiformi, styl. staminibus. exte-

rrioribus brevioribus. W. Jacq. p. 86. t. 49. Parvitate cor. et foliorum etiam ab antecedentibus distincta. W.

19. *sulphurea*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subrotundis, calycinis foliolis margine clavato-pilosis apice reflexis, stylis staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 100. t. 63. Fol. subtus sanguinea, aureo-punctata. Cor. pallide-sulphurea.

20. *variabilis*, acaulis, scapo unifloro fol. longiore flaccido, fol. ternatis subrotundis: foliolo intermedio cuneiformi, styl. staminibus exterioribus brevioribus. Jacq. p. 89. t. 52. Rubra, flore rubro. Jacq. p. 90. t. 53. In α . cal. foliola margine glandulosa, apice pilosa et cor. carnato-alba. In β . cal. simpliciter pilosi et cor. rosei coloris. W. p. 778.

21. *grandiflora*, acaulis, scapo unifloro fol. brevior erecto, fol. ternatis subrotundis: foliolo intermedio cuneiformi, petal. truncatis, styl. staminibus exteriorib. breviorib. W. p. 778. Jacq. p. 91. t. 54. Thunb. prodr. app. p. 189. Cor. candida, fundo flavescente.

22. *purpurea*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis subrotundis, petiol. teretibus, stylis staminib. interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 93. t. 56.

* *laxula*, stylis intermediis, filamentis denticulatis, petiolis teretibus, foliol. excisis saepe subtus purpurascens. Jacq. p. 94. t. 57. Thunb. prodr. app. p. 190.

23. *humilis*, scap. unifloris, fol. ternatis: foliol. subrotundatis ciliatis. Thunb. prodr. app. p. 190. †

24. *breviscapa*, acaulis, scapo unifloro petiolis duplo brevior, fol. ternatis subrotundis, petiolis compresso-planis, stylis staminibus interiorib. brevioribus. W. 779. Jacq. p. 95. t. 58. Fol. subtus sanguinea punctata.

25. *speciosa*, acaulis, scapo unifloro folior. longitudine, fol. ternatis subrotundis ciliatis, stylis staminib. interioribus longioribus. W. p. 779. Jacq. p. 97. t. 60. Thunb. prodr. app. p. 189. Ehret. pict. t. 10. f. 2.

β . *suggillata*, stylis longissimis, foliol. adultis subtus toxis et supra ad oras lividis. Jacq. p. 98. t. 61. Burm. afr. p. 67. t. 27. f. 3.

γ . *rigidula*, stylis longissimis, foliolis immaculatis. Jacq. p. 96. t. 59. Cor. majuscula, campanulata, purpurascens, Stigm. plumosa.

26. *Acetosella*, scapo unifloro, fol. ternatis obcordatis, radice dentata. L. Flor. dan. t. 980. Hab. in sylvis umbris, vere. β . *carulea*, minor subvillosa.

27. *magellanica*, scapis unifloris, foliol. subrotund. emarginatis carnosiss. Forst. comment. goett. p. p. 33. Hab. in Terra del Fuego, locis irriguis. T.

28. *marginata*, acaulis, scapo unifloro petiolis dimidio brevior, fol. ternatis obcordatis, calycin. foliol. clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 781. Jacq. p. 108. t. 68. Foliola inferne sanguinea, viridi marginata. Cor. alba fundo flavescens. W.

29. *pulchella*, acaulis, scapo unifloro petiolis triplo brevior, fol. ternatis obcordatis, calycinis foliolis clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 109. t. 69. Foliol. subtus sanguinea, aureo-punctata.

30. *obtusata*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis dense pilosis, calycinis foliol. apice rotundato-obtusis, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. p. 382. Jacq. p. 106. t. 75. f. 1. Cor. rubra. Filam. glabra. W.

31. *lanata*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis villosis, calycin. foliol. acutis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 104. t. 77. f. 2. Cor. alba. Filam. hirta.

32. *truncatula*, acaulis, scapo unifloro foliis duplo longiore, fol. ternatis foliolis triangularib. margine villosis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 99. t. 62. Foliola cuneiformia truncata. Cor. lilacina.

33. *strumosa*, acaulis, scapo foliis brevior, fol. ternatis obcordatis, stylis staminibus exteriorib. brevioribus sub apice strumosis. W. Jacq. p. 102. t. 64. Foliol. fusco-maculata. Cor. alba.

34. *punctata*, acaulis, scapo foliis longiore, fol. ternatis obcordatis punctatis, stylis staminibus exteriorib. breviorib. W. p. 783. Jacq. p. 105. t. 66. Thunb. Diss. t. 1. f. 3. Hab. in collib. arenosis.

35. *luteola*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis pilosis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 103. t. 65.

36. *macrogonia*, acaulis, scapo unifloro foliis brevior, fol. ternatis obcordatis ciliatis, styl. staminib. interiorib. longiorib. W.

K k 2

Jacq. p. 110. t. 70. Scapi articulus ad basin longior, quam in reliquis. W.

37. *sallax*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis pilosiuscul. ciliatis, styl. staminib. interiorib. breviorib. W. p. 784. Jacq. p. 107. t. 67. Simill. praecedenti: articulus scapi brevissimus.

38. *tenella*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis glabris, styl. staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 53. t. 19. Cor. pallide violacea, fundo flavo.

39. *minuta*, acaulis, scapo foliis longiore, fol. ternatis lineari-lanceolatis acutis, stylis staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. p. 65. t. 79. f. 2. Thunb. Diss. t. 2. f. 3.

40. *pusilla*, subcanescent, scapo unifloro longitudine foliorum, foliis ternatis lineari-cuneiformib. emarginatis, styl. staminib. interiorib. breviorib. W. p. 785. Jacq. p. 79. t. 42. Foliol. glauca. Cor. pallide incarnata.

++ *Scapo multifloro.*

41. *compressa*, acaulis, scapo bifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis, petiolis plantis compressis, styl. staminib. interiorib. longiorib. W. Jacq. p. 40. t. 78. f. 3. Lin. suppl. 243. Hab. in campis arenosis humidis Cap. h. spec. T.

42. *sericea*, acaulis, scapo umbellifero, foliis longiore, florib. nutantibus, fol. ternatis obcordatis sericeis, stylis staminibus interioribus brevioribus. Jacq. t. 77. f. 1. Lin. suppl. t. 243.

43. *articulata*, scap. umbelliferis, fol. ternatis tomentosis, calycib. apice callosis. Enc. bot. 4. p. 687. Hab. in Amer. meridion. Commers. Rad. longa, repens, nodosa.

44. *megalorhiza*, acaulis, scapo umbellifero fol. brevior, flor. erectis, fol. ternatis obcordatis, radice crassa multicipite. W. p. 786. Jacq. p. 33. O. bicolor. Enc. bot. 4. p. 687. Feuill. peruv. 2. p. 734. t. 25. Hab. in Peru locis montosis. T.

45. *virgosa*, scap. multifloris. fol. ternatis: foliol. ovatis, flor. verticillatis. Molina. chil. hist. p. 110. Enc. bot. 4. p. 685. Hab. in R. Chilensi. Omnium forte maxima. Scapi plures, 5-pedales. M. +

46. *tetraphylla*, acaulis, scapis umbelliferis, fol. ternatis et quaternatis: foliolis cordatis inferne glaucis. Cav. ic. 3. p. 19. t. 237. Hab. in Mexico. Cor. rubro-violacea. T.

47. *violacea*, acaulis, scapo bifido umbellifero, florib. nutantibus, fol. ternatis obcordatis glabris, stylis staminib. exterioribus brevioribus. Jacq. p. 35. t. 20. f. 2. Jacq. hort. 2. p. 84. t. 180. Flos solitarius in dichotomia. Stam. hirta.

48. *caprina*, acaulis, scapo umbellifero paucifloro, flor. erectis, fol. ternatis obcordato-bilobis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. t. 76. f. 1. O. *pes caprae*. L. Burm. afr. t. 28. f. 3. Cor. violacea, fundo flavo.

49. *cernua*, acaulis, scapo umbellifero multifloro, flor. cernuis, fol. ternatis obcordato-bilobis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 37. t. 6. Thunb. diss. t. 2. f. 2.

50. *dentata*, acaulis, scapo subbifloro, fol. ternatis obcordatis, calycin. foliol. apice tridentatis, stylis staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. Oxal. n°. 17. p. 83. t. 7. Cor. pallide incarnata.

51. *livida*, acaulis, scapo bifloro, fol. ternatis obcordato-bipartitis, styl. staminib. interioribus brevioribus. W. p. 788. Jacq. p. 39. t. 8. Cor. incarnata.

+++ *Caulescentes, pedunculis unifloris.*

52. *ciliaris*, caule erecto inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis longiore, foliis ternatis oblongis emarginatis, stylis staminibus interioribus longiorib. W. Jacq. p. 66. t. 30. Cor. purpurea, fundo luteo.

53. *arcuata*, caul. decumbente inferne nudo, pedunc. unifloris petiolorum longitudine, fol. ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis ciliatis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. Oxal. n°. 46. p. 67. t. 31. Cor. violacea.

54. *linearis*, caule decumbente inferne nudo, pedunc. unifloro, petiolis brevior, fol. ternatis linearib. emarginatis ciliatis, styl. staminib. interiorib. longiorib. Willd. p. 789. Jacq. p. 68. t. 32. Cor. violacea, fundo flavo.

55. *cuneata*, caule decumbente inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis brevior, fol. ternatis cuneiformib. emarginatis pilosis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 76. t. 40.

56. *cuneifolia*, caul. decumbente inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis brevior, fol. ternatis lineari-cuneiformibus pilosis emarginatis, styl. staminib. exteriorib. bre-

vioribus. W. Jacq. p. 77. t. 41. Differt a priore filamentis glandulosis, interioribus inaequalib. et stylis filamentis breviorib. W.

57. *glabra*, caule inferne nudo brevissimo erecto, pedunc. unifloro fol. duplo longiore, fol. lineari-cuneiformibus emarginatis ciliatis, stylis staminibus interioribus longiorib. W. Jacq. p. 78. t. 76. f. 3. Thunb. Oxal. t. 2. f. 1. Cor. purpurea, fundo flavo.

58. *bifida*, caul. inferne nudo erecto subramoso, pedunc. unifloro, fol. duplo longiore, fol. ternatis cuneiformibus emarginato-bifidis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. p. 790. Jacq. t. 79. f. 4. Thunb. Oxal. t. 1. f. 2. Hab. ad latera fossarum montis Diaboli. Foliol. biloba. Filam. hirta.

59. *flicaulis*, caul. inferne nudo decumbente subramoso, pedunc. unifloro, fol. duplo longiore, fol. ternatis cuneiformib. emarginato-bifidis, stylis staminibus interioribus breviorib. W. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 42. t. 205. Fol. biloba. Filamenta glabra.

60. *longiflora*, caule inferne nudo simpliciter, pedunc. unifloro, fol. ternatis bipartitis. Willd. p. 791. Scapo unifloro, fol. ternatis semibifidis, lobis lanceolatis. L. Hab. in Virginia. Flos unicus longus. +

61. *natans*, caule inferne nudo nutante, pedunc. unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis, styl. staminib. exterioribus breviorib. Jacq. t. 76. f. 2. Thunb. Oxal. t. 1. f. 4. Hab. in aquis Cap. b. spei. Caul. filiformis tenuissimus, apice foliosus. Pet. alba.

62. *convexula*, caule inferne nudo decumbente, pedunc. unifloro fol. longiore, fol. ternatis subrotundis punctatis, stipulis dilatatis acuminatis, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 92. t. 55. Cor. rosea, fundo flavo.

63. *versicolor*, caul. inferne nudo declinato, pedunc. unifloro foliis longiore, fol. ternatis linearibus emarginatis, apice bipunctatis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. p. 792. Jacq. p. 72. t. 36.

β. *sylvestris*, minor, staminib. edentulis. Jacq. t. 77. f. 4.

γ. *gracilis*, filamentis edentulis, stylis longissimis, cor. campanulatis. Jacq. p. 69. t. 33. Burm. afr. 66. t. 27. f. 2. Flor. hyeme. Cor. alba, angulis rubris. In γ. fol. paulo latiora et cor. pallide rosea.

64. *elongata*, caul. inferne nudo decli-

nato, pedunc. unifloro, fol. longiore. fol. ternatis linearib. emarginatis apice bipunctatis, stylis staminib. exteriorib. breviorib. W. p. 793. Jacq. p. 73. t. 37.

* *miniata*, filamentis edentulis, stylis brevissimis. Jacq. Oxal. n. 50. p. 71. t. 50.

* *amoena*, scapis unifloris, fol. ternatis linearibus, calycib. obtusis, filamentis denticulatis inaequalib., styl. brevissimis. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 42. t. 206.

65. *reclinata*, caule inferne nudo subramoso reclinato, pedunc. unifloro fol. longiore, fol. ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis apice bipunctatis, calycin. foliolis adpressis, styl. staminib. interioribus breviorib. W. Jacq. p. 70. t. 34. Cor. pallide miniata.

66. *polyphylla*, caul. inferne nudo erecto subramoso, pedunc. unifloro petiolis duplo longiore, fol. ternatis linearibus emarginatis, apice bipunctatis, calycin. foliolis apice reflexis, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 75. t. 39. Icon. rar. 3. t. 473. Burm. afr. t. 27. f. 1.

67. *tenuifolia*, caul. erecto folioso, pedunc. unifloro fol. triplo longiore, fol. ternatis breve petiolatis linearibus emarginatis, styl. staminib. exteriorib. brevioribus. W. p. 794. Jacq. p. 74. t. 38. Cor. alba, margine rubra.

68. *macrostylis*, caul. erecto folioso ramoso, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis sessilibus: foliol. linearibus emarginatis, cor. hypocrateriformib., styl. staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. p. 43. t. 9. Cor. purpurea fundo flavo; ungues cohaerent, elongatae.

69. *hirta*, caule erecto folioso ramoso, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis subsessilibus: foliol. lineari-cuneiformibus retusis, cor. campanulatis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 47. t. 13. et t. 77. f. 3. O. *sessifolia*. L.

β. *hirtella*, cor. campanulatis, stylis longissimis, filam. denticulatis inaequalibus. Jacq. 27. p. 48. t. 14.

70. *tubiflora*, caul. erecto subramoso folioso hirta, fol. ternatis subsessilib. lineari-cuneiformibus, pedunc. unifloro foliis multoties longiore, cor. hypocrateriformibus, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 44. t. 10.

β. *canescens*, cor. caryophyllacis, styl. brevissimis, filam. aequalib. Jacq. p. 45. t. 11

71. *secunda*, caul. folioso ramoso declinato, ramis secundis, pedunc. unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subsessilib. lineari-cuneiformibus, cor. hypocrateriformibus, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. p. 796. Jacq. p. 46. t. 12. Cor. lilacina. Filam. glabra.

72. *multiflora*, caule ramoso folioso erecto, pedunc. unifloris fol. multoties longioribus, fol. ternatis subsessilib. cor. campanulatis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 49. t. 15. Icon. rar. 3. t. 472.

73. *rubella*, caul. ramoso folioso erecto, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis subsessilib. lineari-cuneiformibus, cor. campanulatis obtusis, stylis staminib. interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 50. t. 16. Icon. rar. 3. t. 471. Burm. afr. t. 28. f. 2.

74. *rosacea*, caul. folioso simplici decumbente, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis subsessilib. oblongo-cuneiformibus, cor. campanulatis acutiusculis, stylis staminib. interiorib. breviorib. W. Jacq. p. 51. t. 17. Simillima praecedenti. Cor. rosea.

75. *repens*, caul. folioso ramoso decumbente radicante, pedunc. subbifloro petiol. longitudine, fol. ternatis obcordatis, stylis staminibus interioribus breviorib. W. Jacq. p. 32. t. 78. f. 1. Thunb. Diss. p. 16. t. 1. f. 5. Hab. locis aquosis Cap. b. spei, Madagascariae et Zeylonae.

76. *reptatrix*, caul. folioso erecto simplici, pedunc. unifloro foliis longiore, fol. ternatis subrotundis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 54. t. 20. Cor. alba, subincarnata.

77. *disticha*, caul. basi ramoso adscendente folioso, pedunc. unifloris foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis glabris, stylis staminib. interiorib. brevioribus. W. p. 798. O. cor. campanulatis, styl. intermediis, petiol. alate stipulatis. Jacq. p. 52. t. 18. Cor. pallide flava.

78. *incarnata*, caul. erecto ram. glabro folioso, pedunc. unifloris longitudine petiolorum, fol. ternatis obcordatis glabris, stylis staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 111. t. 71. Comm. hort. t. 22.

++++ *Caulescentes, pedunculis multifloris.*

79. *conorhiza*, caul. erecto folioso, pe-

dunc. foliis longiore bifloro, fol. ternatis obcordatis. W. p. 799. Jacq. p. 26. Feuill. peruv. 2. t. 24. Hab. in Paraguay in planitie ad septentrion. fluminis de la Plata. ☉

80. *crenata*, caul. folioso erecto, pedunc. umbellifero foliis longiore, fol. ternatis obovatis, cor. crenatis. W. Jacq. p. 27. Feuill. l. c. 3. p. 49. t. 24. Hab. in Peru. ☉

81. *lateriflora*, caul. basi nudo subramoso adscendente, pedunc. umbellatis-lateralibus, fol. ternatis: foliol. cuneiformib. emarginato-bilobis, cor. obtusis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. Schoenb. 2. p. 41. t. 204. Pedunc. longissimi. Filam. hispida.

82. *Dillenii*, caul. erecto folioso lito, pedunc. umbellifero, fol. longiore, foliis ternatis obcordatis, corollis emarginatis. W. Jacq. Oxal. p. 25. Dill. elth. 2. p. 298. t. 221. Hab. in Carolina, Guadeloupe. ☉

83. *stricta*, caul. erecto ramoso, pedunc. umbellifero, petiol. semiteretibus extipulatis, fol. ternatis obcordatis, cor. integris, stylis longitudine staminum interiorum. W. Jacq. p. 29. t. 4. Flor. dan. t. 873. Hab. in Virginia, Jamaica, et in cultis Europae.

84. *corniculata*, caule ramoso decumbente radicante, pedunc. subumbellato, petiol. stipulatis, fol. ternatis obcordatis, petal. emarginatis eros. Hoffm. germ. p. 210. Jacq. p. 30. t. 5. O. pusilla. Salisb. Hab. in cultis, etiam in Japonia. ☉

85. *tuberosa*, caul. ramoso, pedunc. umbelliferis fol. ternatis: foliol. ovatis, rad. tuberosa. Molin. chil. p. 109. Enc. bot. 4. p. 684. Hab. in R. Chilensi. O. corniculatae similis. Rad. Sol. tuberosi. M. +

86. *pentantha*, caul. erecto ramoso pedunc. umbellifero fol. brevior, fol. ternatis pilosis, foliol. lateralib. subrotundis emarginatis: intermedio petiolato obovato obtuso, stylis staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 21. t. 1. Hab. ad Caracas in Amer. Pedunc. quinqueflori.

87. *rhombifolia*, caul. erecto ramoso folioso, pedunc. umbellifero trifloro, fol. ternatis pubescentib. rhombico-ovatis: foliol. sessilib. styl. staminib. interiorib. longioribus. W. p. 802. Jacq. p. 22. t. 2. Hab. cum priore. Filam. interiora hispida.

88. *rosea (chilensis)*, caule erecto, foliol. obverse cordatis, pedunc. divisis racemosis. Jacq. p. 25. Feuill. peruv. 2. p. 733.

t. 23. *O. racemosa*, Savigny in Enc. bot. 4. p. 684. Hab. in Cludi locis humidis.

89. *Plumieri*, caul. erecto fruticoso folioso, pedunc. umbellifero quadrifloro folior. longitudoine, fol. ternatis ovatis : foliolo intermedio longe petiolato. Willd. *O. frutescens*. L. Thunb. Diss. n°. 22. Enc. bot. 4. p. 684. Plum. spec. 2. ic. 213. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. Flor. lutei, penduli.

90. *Barrelieri*, caule erecto fruticoso ramoso folioso, pedunc. longitudine folior. bifido racemoso, fol. ternatis ovato-lanceolatis : foliol. intermedio petiolato, styl. longitudine staminum interiorum. W. Jacq. p. 24. t. 3. Enc. bot. 4. p. 684. Barr. rar. 64. t. 1139. Bocc. mus. 2. p. 63. t. 51. Hab. in Gujana, Brasilia et ad Caracas. Priorem refert. Flor. parvi. Cor. albo-incarnata, petal. 3 superiorib. basi flavo-maculatis. W.

**** *Foliis digitatis, quinatis, 5. multifidis.*

91. *Burmanni*, acaulis, scapo umbellifero, fol. digitatis. W. p. 803. Jacq. p. 41. *O. bulbosa pentaphylla*, et hexaphylla flor. magnis luteis copiosis. Burm. afr. 74. t. 29. Hab. ad Cap. h. spei, cum 6 sequentibus.

92. *tomentosa*, acaulis, scapo unifloro petiolor. longitudine, fol. digitatis : foliol. lanceolato-cuneiformibus emarginatis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 119. t. 81. Pluk. amalth. t. 350. f. 3. Fol. tomentosa, foliola tomentosa, f. 2-20.

93. *lupinifolia*, acaulis, fol. digitatis lanceolatis acutiusculis, petiol. compressis, scapo longitudine petiolor. unifloro, stylis staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 115. t. 72. Filam. glandulosa.

94. *pectinata*, acaulis, scapo unifloro longitudine petiolor., fol. digitatis linearilanceolatis obtusis, calyc. foliolis aequalib. adpressis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 118. t. 75.

95. *flabellifolia*, acaulis, scapo unifloro petiolis longiore, fol. digitatis linearibus emarginatis, calyc. foliolis apice reflexis : unico majore spatulato, stylis staminibus interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 117. t. 74. Cor. flava.

96. *flava*, acaulis, scapo unifloro folior. longitudine, fol. digitatis linearibus canaliculatis acutis, styl. staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 116. t. 73. Burm. afr. 68. t. 27. f. 4. Hab. inter montem Leonis et Diaboli. T.

97. *enneaphylla*, scapis unifloris, petiol. enneaphyllis : foliol. cuneatis bifidis. Cav. ic. 5. p. 7. t. 411. Hab. in ins. Maclov. et Falklandi. Cor. rosea, lineis lutescentibus. Rad. s. stirps repens squam. roseis imbricata.

98. *lacinata*, scapis unifloris, fol. subduodecim partitis : lacin. linearibus. Cav. l. c. t. 412. Hab. in Amer. meridion. Cor. violacea. Rad. s. stirps repens squam. albicantibus tecta.

99. *mallobolba*, acaulis, scapis unifloris : medio bract. 2-subulatis, foliol. 5-ovatis, bulbis lanatis. Cav. ic. 4. p. 64. t. 393. f. 2. Hab. in Amer. merid. Bulb. piperis magnitudine lana rufa densissima textili obducta. Fol. minuta.

100. *Commersoni*. *O. sexenata*, caul. pluribus foliosis : fol. 6 tomentosis, foliol. obovatis integerrimis. Savigny. Enc. bot. 4. p. 687. Hab. in Montevideo. Commers. Tomentoso-lucana.

101. *quinata*, caulescens, fol. digitatis quinatis hirtis : fol. subemarginatis cuneiformibus. Enc. bot. 4. p. 688. Hab. ad Cap. h. sp. Caul. apice foliosus. Cor. campanul. limbo rubello, tubo flavo. †

***** *Fol. pinnatis.*

102. *sensitiva*, scapo umbellifero, fol. pinnatis. L. Jacq. p. 42. t. 78. f. 4. Rumph. 5. t. 104. f. 2. Rheed. 9. t. 19. Hab. in India orientali. Fol. valde irritabilia. Affinitatem habet cum vimosis.

CACTOPHYLLÆ *Decandree pentagynae.*
(Gen. 1145-48.)

1145. *AGROSTEMMA*. *Cal.* 1-phyllus, coriaceous. *Petala* 5, unguiculata : limbo obtuso, indiviso. *Caps.* 1-ocularis.

* *GITHAGO*. *Cal.* apice 5-phyllus, *Cor.* nuda.

1. *Githago*, hirsuta, calycib. cor. subaequantibus, petal. integris nudis. L. Flor. dan. t. 576. *Githago segetum*. Desf. atl. 1. p. 363. Hab. inter segetes. ☉

* *nicaeensis*, calycib. cor. multo longioribus, petal. albis. Willd. *Althioni*. Hab. in agro Nicaeensi.

** *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* fance coronata. *Petala* emarginata.

2. *Coronaria*, tomentosa, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. elongatis 1-floris, petal. 4

talís emarginatis coronatis serratis. L. Curt. mag. t. 24. Enc. bot. 3. p. 643. sub *Lychn.* Hab. in Italia, Helvetia. Canescens. ☉

3. *Flos jovis*, tomentosa, flor. umbellato-capitatis, petal. emarginatis. L. Bocc. mus. t. 42. Hab. in Helvetia, Palatinatu, et Gall. australi. Pedunc. breves, subramosi.

4. *Coeli rosa*, glabra, fol. lineari-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis. L. Moris. f. 5. t. 22. f. 32. Bocc. sicil. t. 14. f. 2. Hab. in Sicilia, Barbaria et Oriente. ☉

1146. *LYCHNIS*. Cal. 1-phyllus, oblongus, lævis. Petala 5, unguiculata: limbo subbifido. Caps. 1-5-locularis.

1. *chalconica*, flor. fasciculatis fastigiatis. L. Hab. in Russia. In hortis colitur. Var. quoad col. florum.

2. *Flos cuculi*, petal. laciniatis, caps. 1-loculari subrotunda. L. Flor. dan. t. 590. Lam. ill. t. 391. Hab. in pratis et humidis. Var. flor. pleno et albo. ☿

3. *coronata*, glabra, flor. axillarib. terminalibusque solitariis, petal. laciniatis. Thunb. jap. 187. L. grandiflora. Jacq. ic. rar. 1. t. 84. Coll. 1. p. 149. Hab. in China, Japonia. Flor. coccinei, pulchri.

4. *Viscaria*, caul. geniculis viscoso, petalis integris, caps. 5-loculari. Flor. dan. t. 1032. Hab. in pratis siccis, ad rupes. An genus distinctum?

5. *alpina*, glabra, flor. densis umbellato-capitatis, petal. bifidis. Lam. enc. 3. p. 640. Flor. dan. t. 65. Hall. helv. 1. 376. t. 7. Hab. in alpi. Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Pyrenaicis. Pet. incoronata. Fior. rubelli. Styli quatuor.

6. *dioica (alba)* caps. conicis 1-locularibus. Flor. dan. t. 799. *β. rubra*, hirsuta, flor. dioicis, caps. subrotundis. Hab. in pratis, sylvaticis; ad sepes.

Obs. Flos solitarius inter dichotomiam in individuis foemineis tantum observatur. Flor. in V. alba nocte suaveolent. Spec. distinctae?

7. *laeta*, petal. bifidis, flor. solitariis, fol. lineari-lanceolatis glabris, calycibus decemcarinatis. Ait. Kew. 2. p. 118. Hab. in Lusitania. ☉

8. *sibirica*, pet. bifidis, caul. dichotomo, fol. subhirsutis. L. Hab. in Sibiria. Statura *Silenes rupestris*. ☿

9. *magellanica*, subvillosa, fol. linearibus gramineis, petal. apice bifidis calyce campanulato vix longiorib. Lam. l. c. enc. 3. p. 641. Hab. in freto Magellanico. Cucub. referit.

10. *apetala*, cal. inflato, cor. calyce brevior, caul. subunifloro. L. Cucub. caule simplicissimo unifloro, cor. inclusa. Fl. lapp. 181. t. 12. f. 1. Hab. in alpi. Lapponicis, Sibiricis. ☿

Obs. Hoc genus omnium minus naturale ex pluribus compositum, quae tantum styliorum numero conveniunt.

1147. *CERASTIUM*. Cal. 5-phyllus. Petala bifida, aut emarginata, passim integra. Caps. 1-locularis, apice dentatim denticatus. (Stam. etiam 4-5.)

* *Capsulis oblongis.*

1. *perfoliatum*, glaberrimum, ol. connatis. Willd. Sp. II. p. 811. Gmel. sib. 4. t. 62. f. 1. Dill. elib. 295. t. 217. f. 284. Hab. in Graecia, Sibiria, et in Barbariae arenosis.

2. *sylvaticum*, diffusum repens, fol. inferiorib. ovatis, reliquis ovato-lanceolatis, cor. bifida cal. duplo longiore. Plant. rar. Hongar. p. 190. t. 97. Hab. in vallibus humidis et sylvaticis. Aest. Caps. cal. longior.

3. *vulgatum*, hirsutum subdiffusum, fol. sublanceolatis: infinis linearib., flor. subfasciculatis, cor. cal. subaequante. C. vulgatum. Curt. Lond. a. t. 34. Vaill. Par. t. 34. f. 1. C. viscosum. Smith. brit. 2. p. 497. Hab. in pratis, ruderalis et sylvis. Non est viscosum. Caul. plerumque fusco-purpurascens. ☿

4. *diffusum*, caul. ramosissimo villosio opaco diffuso, fol. ovato-lanceolatis tomentosis, flor. paniculato-dichotomis. Hab. in Scotia? Thiebaut. Cor. integra? cum caps. cal. aequans. †

5. *brachypetalum*, caul. erecto tomentoso dichotomo, fol. ovatis infimis rosaceis, flor. paniculatis, cal. villosio cor. longiore. Hab. in agris prope Cenomanum (Mans) et alibi. Desportes. Caul. basi subpurpurascens, nec viscosus.

6. *spathulatum*, caul. simplice subvillosio, fol. hirsutis: inferiorib. obovato-spathulatis petiolatis, caul. sessilib. subovatis,

flor. glomeratis. Hab. ad St.-Domingo. Subparvum. Caps. cal. duplo fere longior.

7. *ovale*, subviscoso-hirsutum, caul. basi ramosissimo, fol. caulinis ovalib. majoribus, flor. glomeratis. *C. vulgatum*. Smith. brit. l. c. et Lin. ? *C. glomeratum*. Thuill. Fl. paris. p. 225. Vaill. t. 30. f. 3. *C. viscosum*. Curt. Hab. in pratis, graminosis. β ? flor. subpaniculatis. \odot

8. *viscosum*, hirsuto-viscosum, caule ramoso (divaricato), flor. paniculatis demum reflexis, petal. apice bifidis cal. subaequantib. *C. viscosum*. Curt. et plur. auctorum. Hab. in apricis, pratis. Arenulis aut terra ob viscositatem inquinatum. Cal. marginis et bractea apice membrana alba cincta.

* *Alsinoides*, caul. diffuso subviscoso, fol. ovatis: summis subrotundis, pedunc. elongatis unifloris, petal. emarginatis, cal. aequantibus, Hab. circa Bordeaux. Loiseleur. (Herb. Clarion.) *Alsinema* refert, sed caps. omnino differt, quae cal. paulo major. An var. prioris ?

9. *semidecandrum*, parvulum cespitosum, caul. subviscoso, fol. erectis ovato-oblongis, flor. subglomeratis pentandris, cor. emarginata cal. aequante. Vaill. paris. t. 30. f. 2. Raj. syn. t. 15. f. 1. Hab. in apricis, graminosis. Vere. Caul. biuncialis pallens. Cal. apice purpurascens, margine albidonitens. Parum viscosum. Flos solitarius elongatus.

10. *anomalum*, erectum piloso-viscosum, fol. linearibus, petal. cal. longioribus, flor. trigynis. Willd. p. 812. Hab. in Hungaria, in pratis siccis. Petala bifida. Caps. sexdentata.

11. *pentandrum*, flor. pentandris, pet. integris acutis, cal. brevioribus. L. Hab. in Hispania. Planta minima, similis *C. semidecandro*. L. +

12. *arvense*, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus, cor. calyce duplo majoribus. L. Flor. dan. t. 26. Vaill. paris. 141. t. 30. f. 4. Hab. in versuris agrorum, ad sepes. Cor. magna. Fol. basi ciliata.

13. *lineare*, fol. lineari-lanceolatis acutis pubescentibus, pedunc. subunifloris tomentosis, petal. cal. majoribus acutis bifidis. Willd. p. 814. Allion. pedem. 2. app. p. 365. t. 88. f. 4. Hab. in rupibus subhumidis alpinum. Pedunc. apice lanati.

14. *dichotomum*, fol. lanceolatis, caule

dichotomo, caps. erectis cal. duplo longioribus. Willd. Desf. atl. 1. p. 306. *Alsine corniculata*. Cus. hist. 2. p. 184. Hab. inter segetes Hispaniae et Algeriae. Caps. longissima.

15. *longifolium*, fol. lineari-lanceolatis, caule dichotomo, pedunc. fructiferis horizontalibus, caps. longitudine calycis. Willd. Hab. in Armenia. Caul. piloso-viscosus. Cal. hirtus. Caps. calycis longitudine. W.

16. *alpinum*, fol. ovato-lanceolatis, panic. dichotoma pauciflora, caps. oblongis recurvis. Smith. brit. 2. p. 500. Flor. dan. t. 6. Engl. bot. t. 472. *C. latifol.* Lighth. t. 10. Raj. syn. 3. p. 349. t. 15. f. 2. β . glabrum. Flor. dan. t. 979. Hab. in alpinis. β . in humidis ?

17. *latifolium*, fol. ellipticis scabris, pedunc. terminalib. simplicibus subsolitariis, caps. ovata (turgida). Smith. brit. 2. p. 501. Engl. bot. t. 473. Jacq. Coll. 1. p. 256. t. 20. Hab. in alpib. et montib. aliis. Caespitosa. Fol. subovata, pilis brevib. rigidis, articulatis scabra. S.

18. *lanatum*, fol. ovato-subrotundis dense incano-lanatis, caps. rectis angulatis, caulic. brevissimis subbifloris. Lam. enc. 1. p. 680. Lapeyr. Flor. d. Pyrén. p. 18. Hall. helv. n.º. 88. Hab. in alpinis. Pusillum, albicans. Fol. subrotunda, minuta, duriuscula. Lap.

19. *suffruticosum*, caul. cespitosis nodosis perennantibus, fol. lineari-subulatis rigidis, cal. striato glabro, caps. oblongis subcurvis. Lam. enc. 1. p. 681. Hab. in Galloprovincia, in monte Ste.-Vicioire. β . *camphorataefolia*. Tournef. Cor. 18. Circa Smyrnam. Facie *Ar. juniperinae*. Fol. subfasciculata. Lam. An h. l. *C. laricifolium*. Vill. Delph. 3. p. 644 ?

** Capsulis subrotundis.

20. *repens*, fol. lanceolatis, peduncul. ramosis, caps. subrotundis. L. *C. caule perenni procumbente*, fol. lanceolatis tomentosis. Roy. lugdb. 450 ? Lam. ill. t. 392. f. 2. Col. phytob. 115. t. 31. Hab. in Gallia, Italia, Carniola. Fol. glabra. T.

21. *strictum*, fol. linearib. acuminatis glabris, pedunc. bifloris, calycibusque tomentosis, caps. globosis. L. Jacq. Coll. 2. p. 65. Scop. carn. t. 19. f. 1. Hab. in alpib. Pedunc. unif.-biflorus, in medio bracteis duabus lanceolatis.

Obs. In *C. stricto* Allioni, caul. simpli

citer dichotomus, 2-3-florus, caps. cylindrica, pedunc. apice pilis brunneis tomentosi: an diversum?

22. *maximum*, fol. lanceolatis scabris, petal. crenatis, capsul. globosis. Gmel. sib. 4. p. 150. n°. 51. t. 62. f. 2. Hab. in Sibiria.

23. *dioicum*, hirtum viscidum, fol. lanceolatis, flor. dioicis, petal. calyce triplo longioribus. Ait. Kew. 2. p. 120. Hab. in Hispania. ☞

24. *tomentosum*, fol. oblongis tomentosis, pedunc. ramosis, caps. globosis. L. Willd. p. 817. Hab. in Granada. Lin. +

Obs. Secundum cl. Larnark Enc. 1. p. 680. caps. cylindrica est, an forte diversa species? quae etiam in Italia et in alpinis provenit. Sed. caps. immatura in puribus globosae.

25. *manticum*, glabrum, caule elongato stricto, fol. lanceolatis, pedunc. longissimis, caps. globosis. L. Plant. long. p. 60. t. 96. Hab. in Hungaria, Veronae, et in Helvetia. Facie differt Stellariae.

1148. SPERGULA. Cal. 5-phyllus. Petala 5, integra. Caps. ovata, 1-locularis, 5-valvis. (Stam. etiam 5.)

* *Fol. verticillatis, caule stipulaceo.*

1. *arvensis*, diffusa, fol. verticillatis, flor. decandris. L. Lam. ill. t. 392. f. 1. Flor. dan. t. 1033. Hab. in Europae agris. Var. stam. numero. Sem. reniformia, nec alata.

2. *pentandra*, fol. verticillatis, flor. subpentandris, seminib. margine albo-membraceis. Lam. ill. l. c. f. 2. Hab. in sylvaticis. Vere. Var. stam. 5, 7 et 10.

3. *geniculata*, glabra, caul. elongato, ramis folisque ad nodos verticillatis. Singularis haec species prope Montpellier observata est a cl. Thiebaud. Caul. ultra pedalis, geniculatus, ad nodos quasi viviparus. Pedunc. dichotomi, multiflori: flor. parvuli. An forte prioris var. luxurians? h?

4. *grandis*, fol. verticillatis internodiis longioribus, pedunc. dichotomis, flor. secundis. Hab. in Monte-Video (Herb. Juss.). Caul. pedalis, crassus.

5. *villosa*, caul. folisque villosopubescentibus. Hab. cum prior.

** *Foliis oppositis. Caul. exstipulaceus.* (Sagine?)

6. *nodosa* (palustris), fol. oppositis subulatis laevibus: infimis late vaginantibus, caulib. simplicibus. Flor. dan. t. 16. Hab. in paludosis et in campis lumentibus.

β. *brevifolia*, caul. simplicissimo: nodis plus approximatis, fol. caulinis brevissimis. In campis subaridis. Flor. maj. culi. γ. *maritima*, fol. carnosulis incurvo-patulis. Ad maris littora.

7. *laricina*, decumb. fol. oppositis subulatis fasciculatis. L. Smith. ic. ined. 1. p. 18. t. 18. Lam. ill. t. 392. f. 3. Gmel. sib. 4. p. 155. n°. 61. Hab. in Sibiria. Flor. magni.

8. *saginoides*, fol. oppositis linearibus laevibus, pedunc. solitariis longis, flor. pentandris, caul. repente. Sw. in Act. nov. holm. 1789. p. 83. t. 1. f. 2. Willd. p. 820. S. laricina. Wulf. ? S. subulata. Smith. brit. 2. p. 504? Hab. in alpinis. Fol. ad genicula fasciculata. (Var. Saginae procumb.?)

9. *subulata*, fol. oppositis subsecundis linearibus subulatis carinatis ciliatis, flor. decandris. Swartz. l. c. 1789. p. 39. t. 1. f. 3. Sperg. saginoides. Curt. lond. Hab. in pascuis subalpinis.

β. *glabra*, fol. oppositis fasciculatis filiformibus, glabris, flor. decandris, petal. cal. majoribus. Willd. p. 821. Sperg. saginoides. Allion. pedem. n°. 1735. t. 64. f. 1. Hab. in in pascuis umbrosis alpinum Valdensium. ☞

DECAGYNIA.

1149. NEURADA. Cal. 5-partitis. Petala 5. Caps. infera, orbicularis, 10-locularis, 10-sperma, aculeata. Sem. solitaria.

1. *procumbens*. L. Lam. ill. t. 393. Hab. in Aegypto, Arabia et Barbaria. Alicians. Fol. alterna, sinuata, tomentosa. Flor. axillares. ☉

Obs. Semen germinans capsul. perforat, annuli ad instar in collo radicis, etiam in planta adulta, persistit.

1150. PHYTOLACCA. Cal. 6. Petala 5, calycina. Bacca supera, 10-locularis, 10-sperma. (Flor. 5-7-8-10-gyni et 7-8-20-andri.)

1. *octandra*, flor. octandris octogynis. L. Dill. elth. 218. t. 239. 308. Lam. ill. t. 393.

2. *Kaempferi*, amoen. t. 829. Hab. in Mexico. Cor. alba, plana. $\overline{\text{T}}$

2. *stricta*, flor. octandris heptagynis, fol. lanceolatis mucronatis. Hoffm. Comment. goett. 12. p. 27. t. 3. P. heptandra, flor. heptandris hexagynis, fol. lanceolatis. Retz. Obs. 6. p. 29. Hab. in America. $\overline{\text{T}}$

3. *abyssinica*, flor. decandris pentagyn. Hoffm. l. c. p. 28. t. 2. P. decandra. l'Herit. stirp. 1. 143. t. 69. Hab. in Abyssinia. $\overline{\text{H}}$

4. *decandra*, flor. decandris decagynis.

l. Jam. ill. t. 393. f. 1. Dill. elth. 318. t. 339. f. 300. Hab. in Virginia, Barbaria, et in Helvetia.

5. *icosandra*, flor. icosandris decagynis. L. Mill. ic. 138. t. 207. Hab. in India orientali. Caul. tripedalis, herbaceus, subdivisus. Fol. strictiora. Flor. albi. $\overline{\text{T}}$

6. *dioica*, frutescens, flor. dioicis. L. l'Herit. stirp. 1. p. 145. t. 70. Hab. in America australi. Fol. Populi nigrae, longius petiolata. Flor. dioici polyandri. L.

M O N O G Y N I A.

Asclepiadeae quaedam et Gerania plura. Conocarpus racemosa. Mangifera axillaris. Rhexiae et Osbeckiae quaedam. Gnidia daphnacfolia. Cupheae plures species. Grislen tomentosa. Portulaca pilosa et oleracea. Gomphia jabotapita. Sideroxylon decandrum. Icica decandra. Frithalis fruticosa. Combretum purpureum, alternifolium, decandrum. Bocconia frutescens. Stelleria chamaejasme. Laurus Borbonia. Viburnum? scandens. Chlora perfoliata, Var. β . Litsea chinensis.

T R I G Y N I A.

Tamarix Germanica. Polygonum Bistorta. Brunichia cirrhosa. Cerastium anomalum.

T E T R A G Y N I A.

Silene aegyptiaca et (Lychnis. L.) quadridentata. Lychnis alpina. Reseda undata.

P E N T A G Y N I A.

Adoxa moscatellina. Gerania quaedam. Drosera lusitanica. Portulaca oleracea. Rhodiola rosea. Cotiaria myrsifolia. Phytolacca abyssinica.



Sequentes plantæ LINNÆANÆ, omissæ addantur.

Pag. 6. *BLITUM chenopodioides*, capitellis verticillatis exsuccis. Lin. Mant. p. 170. Hab. in Tartaria. ☉

Pag. 124. *ASTERULA calabrica* (*fœtida*), fol. oppositis lineari-lanceolatis, caul. fruticoso. Lin. suppl. p. 120. Willd. Sp. I. p. 577. L'Her. Stirp. 1. p. 65. t. 32. Scherardia foetida. Lam. ill. gen. p. 267. Cyrill. charact. 1. 3. f. 7. Hab. in Calabria, Atlantæ et in Syriæ montibus. Cor. rubella. Suffrutescens.

Obs. Hæc species, de cuius loco auctores ambigunt, non male proprium genus tum ab stigmata, tum ab fructum constituere posset secundum characteres sequentes:

PUTORIA. *Cal.* 4-dentatus, persistens, demum baccans. *Cor.* tubuloso-infundibuliformis: limbo 4-fido. *Stylus* bifidus neutus. *Bacca* subcompressa. *Semina* 2, oblonga.

Pag. 265. **ALLAMANDA.** Contorta.

Caps. lentiformis, echinata, 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *cathartica*. Lin. Willd. Sp. I. p. 1231. Sert. Hannov. Fasc. 4. p. 8. t. 24. *Orelia* grandiflora. Aubl. guj. 1. p. 271. t. 106. Hab. juxta fluvios in Guiana et Surinamo. Fol. 4-na, ovato-oblonga subrepanda. Cor. magna, flava. h

Pag. 414. **BURSERA.** *Cal.* 3-4-fidus. *Petala* 4, ovata. *Caps* subcarnosa, 3-locularis, 3-valvis. *Semina* solitaria.

1. *gummifera*, fol. pinnatis ovatis acuminatis, flor. racemosis polygamis. B. gummifera. Lin. syst. veg. Swartz. obs. bot. p. 139. Hab. in Amer. occident. campis. Flor. hermaphroditi 6-andri; masculi stamina 5-8-10. Sw.

2. *balsamifera*, fol. ovatis oblongis acuminatis, flor. paniculatis, pedicellis breviusculis oppositis. *Hedwigia* balsamifera. Swartz. Flor., cfr. huj. libri p. 414. Flor. conformes cum prioræ.

CORRIGENDA ET ADDENDA.

- Pag. 12. *Veronica latifolia*. Ait. n^o. 47. eadem est ac *V. Teucrium*. Roth. N. Bot. Beytr. p. 69. seu *V. Pseudochamedrys*. Jacq. Econtrario *V. urticaefolia*. Ait. est vera *V. latifolia*. Lin. Syst. pl. ed Reich. p. 34.
157. in columna I. lin. 23. loc. *longo* leg. *longa*, in colum. 2. lin. 15, dele Hab
28. *Salvia foetida* Desf. eadem ac *tingitana*, n^o. 86.
34. lin. 29. loc. *scirpae* l. *scirpae* s. *scirpoideae*.
39. post *Rubria* petioliflora add., Willd. Sp. I. p. 186.
61. *Cyper. pygmaeus*. Cav. est *Scirp. michelianus*?
90. n^o. 28. *Poa sudetica* var. β . non diversa a *P. trinervata*.
94. in col. 2da lin. ultima, leg. *divaricata*.
96. n^o. 23. loc. *retusa* leg. *retusus*.
107. lin. 28. in col. 1. leg. *Collodea* (Cav.)
110. colum. 1. lin. 18. loc. *speculare* l. *peculiare*.
129. Ad *Vallantian cordatam* add. Lam. ill. gen. t. 843. f. 3. et ad *V. cucullatam*. Lam. l. c. f. 2.
139. *Plantago microcephala*. Poir. vix diversa a *Pl. villosa* Roth. n^o. 13.
143. col. 1. lin. ultima loc. 28. leg. 30.
145. *Ludwigia Jussiaeoides* Mich. potius est *Jussiaeae* spec.; *J. brachysperma*. Lam. enc. 3. p. 331?
150. in col. 1. lin. 15. post *Stam.* add. 1 s. *unicum*.
153. *Sagina cerastoides* nunc *Cerast. tetrandrum*. Smith. brit. 2. p. 498.
161. ad *Symphytum* var. γ dele (α et β) post *Habit.* collocandum.
179. *C. Jalapa* (*Ipomaea*!) eadem ac *Ipomaea Macroriza* Mich.
180. n^o. 90. ad *Conv. evoluloides* Desf. add. *C. undulatus*. Cav. ic. 3. p. 39. t. 277. f. 2.
200. in col. 1. in lin. 12 et 35. post *stigma* pone *punctum* s. leg. *stigmat.*
— in col. 2. lin. 21. leg. *Nyctanthi*.
208. *Coffea* leg. *cal. crescens*.
225. n^o. 70. dele synonym. *Lamarckii*, quod ad n^o. 62. pertinet.
232. *Lycium barbatum* n^o 16. nunc *Serissa capensis*. Thunb. Prod. suppl.
234. *Genera Beckea* et *Imbricaria* (quae tamen pentandra est secundum Gaertnerum) ad classem octavam amandanda.
238. lin. *RHAMNIS* leg. *RHAMNII*.
244. loc. 1. lin. 23. leg. *saccata*, *fornicata*.
258. *Achyr. halimifolia*. Lam. non diversa ab *Illecebro frutescente* L'Her., quod idem ac *J. alsinefolium* Scop.?
267. col. 2. lin. 15. l. *capitatum* leg. *capitulum*.
281. col. 2. lin. 6. loc. *aalto* leg. *alato*.
285. col. 2. var. β ? et γ sub n^o. 30. ponendae.
290. col. 1. leg. *Linconia alopecuroidea*.

Pag.

310. *Atham. sibirica* n°. 2. crescit quoque in Hungaria, vid. Pl. rar. Hong.
p. 60. t. 60.
311. *Cochr. microcarpos*, n°. 5. eadem videtur ac *C. taurica*.
320. *Anthriscus* n°. 2 et 3. leg. *nodosus* et *trichospermus*.
327. *Cassine laevigata* Lam. est *Celastrus lucidus* L'Herit.
330. *Alsine viscosa* forte numero staminum ab *Arenaria viscosa* tantum
diversa.
366. *Scilla præcox* n°. 13. est var. *S. bifolia*.
368. *Phalangium Adenantha* Forst. non differre dicitur a *Dianella nemorosa*.
417. col. 2. l. *Apolifolium* l. *Opalifolium*.
442. in col. 2. lin. 3. ab inferiore dele ** *Caps. ovatis* et pone ante *Paullinism curassavicum*.
453. in col. prima. lin. 3. loco *nervillo* leg. *vexillo*.
467. in col. 1. lin. 15. leg. 5-partitus, loc. 6-partitus.
503. n°. 21. *Arenaria dianthoides*, post *scalbris* add. *flor. capitatis*. — Spec. 23.
delenda.

Obs. Vitia typographica, ob litteras minutas correctu difficillima, præcipua hic
sunt adnotata, ea quæ minoris momenti sunt, quisque facile corrigeat.

I N D E X

*Generum, subgenerum, nominum Familiæ plantarum et
synonymorum generum præcipuorum.*

A.	Pag.		Pag.
Abronia.	<u>126</u>	Aidia.	<u>214</u>
Acæna.	<u>141</u>	Aira.	76
Acer.	<u>417</u>	<i>Ajovea</i> vid. <i>Laurus</i> .	
Achras.	<u>235</u>	Albuca.	<u>361</u>
Achyranthes.	258	Alchemilla.	<u>149</u>
Acisanthera.	<u>477</u>	Aldea.	<u>168</u>
Acorus.	382	Aldrovanda.	<u>336</u>
<i>Acronychia</i> vid. <i>Lau-</i>		Alettris.	<u>377</u>
sonia.		Alisma.	<u>400</u>
Actinophyllum.	<u>404</u>	Allamanda. vid. add.	524
Adenantha.	<u>461</u>	Allionia.	<u>122</u>
Adenostemum.	<u>467</u>	Allium.	<u>355</u>
Adoxa.	<u>446</u>	<i>Allophylus</i> vid. <i>Orni-</i>	
Aechmea.	<u>345</u>	trophe.	
Aegiceras.	<u>249</u>	Aloe	<u>378</u>
Aegilops.	107	Alopecurus.	<u>79</u>
Aegiphila.	<u>132</u>	Alpinia.	<u>3</u>
Aegopodium.	<u>324</u>	Alsine.	330
Aesculus.	<u>403</u>	Alstroemeria.	380
Acthusa.	318	<i>Alternanthera</i> v. <i>Achy-</i>	
Afzelia.	<u>455</u>	ranth.	
Agave.	<u>379</u>	Amaryllis.	<u>352</u>
<i>Aglæa</i>	<u>46</u>	Amethystea.	24
Agrostenima.	<u>519</u>	Ammannia	<u>146</u>
Agrostis.	<u>74</u>	Ammi.	307

	Pag.		Pag.
Amomum.	<u>2</u>	Aralia.	<u>331</u>
Amyris.	<u>414</u>	Arbutus.	
Amzonia.	<u>269</u>	Arctopus.	<u>301</u>
Anabasis.	<u>297</u>	Ardisia.	<u>232</u>
Anacardium.	<u>450</u>	<i>Arduina</i> vid. <i>Carissa</i>	
Anagallis.	<u>173</u>	Arenaria.	<u>502</u>
Anagyris.	<u>454</u>	Aretia.	<u>168</u>
Anassera.	<u>265</u>	<i>Argolasia</i> vid. <i>Lanaria</i> .	
<i>Anavinga</i> vid. <i>Casearia</i> .		Argophyllum.	<u>175</u>
Anchusa.	<u>159</u>	Ariona.	<u>212</u>
Ancistrum.	<u>30</u>	Aristea.	<u>41</u>
Andromeda.	<u>480</u>	Aristida.	<u>98</u>
Andropogon.	<u>103</u>	Artedia.	<u>308</u>
Androsace.	<u>169</u>	Aruna.	<u>30</u>
Anethum.	<u>323</u>	Arundo.	<u>102</u>
Angelica.	<u>315</u>	<i>Arundinaria</i> vid. <i>Miegia</i> .	
<i>Anguillaria</i> vid. <i>Ardisia</i> .		Asclepias.	<u>275</u>
Anredera.	<u>297</u>	Asparagus.	<u>370</u>
Anthericum.	<u>369</u>	<i>Asperifoliae</i>	<u>155</u>
Anthistiria.	<u>106</u>	Asperugo.	<u>162</u>
Antholyza.	<u>42</u>	Asperula.	<u>124</u>
Anthoxanthum.	<u>30</u>	Asphodelus.	<u>367</u>
Anthriscus.	<u>320</u>	Astrantia.	<u>304</u>
Antichorus.	<u>418</u>	Astranthus.	<u>403</u>
<i>Antirhea</i> vid. <i>Melanea</i> .		Athamanta.	<u>310</u>
Anychia.	<u>261</u>	Atraphaxis.	<u>394</u>
<i>Apalatoa</i> vid. <i>Crudia</i>		Atriplex.	<u>292</u>
Aphanes.	<u>150</u>	<i>Atriplicina</i>	<u>292</u>
Aphyllantes.	<u>386</u>	Atropa.	<u>218</u>
Apium.	<u>324</u>	Avena.	<u>99</u>
Apluda.	<u>105</u>	Averrhoa.	<u>509</u>
<i>Apocyneæ</i>	<u>264</u>	Ayenia.	<u>263</u>
Apocynum.	<u>274</u>	Azalea.	<u>212</u>
Aponogeton.	<u>400</u>	Azima.	<u>145</u>
Aquartia.	<u>133</u>	Azorella.	<u>303</u>
Aquilaria.	<u>485</u>		
<i>Aquilicia</i> vid. <i>Leca</i> .		B.	
		Bacopa.	<u>173</u>
			Beckea.

	Pag.		Pag.
Bæa.	<u>15</u>	Brunia.	<u>246</u>
Beckea.	234	Brunichia.	<u>442</u>
Bæobotrys.	175	Bubon.	317
Bambos.	393	<i>Buena</i> vid. Gonzalea.	
Banisteria.	<u>506</u>	Buginvillæa.	418
Banksia.	113	Bucida.	
Barreria.	250	Buddleia.	<u>135</u>
Bartonia.	<u>141</u>	Buffonia.	<u>150</u>
Basella.	<u>331</u>	<i>Buglossum</i>	159
<i>Bassia</i> vid. Salsola.		<i>Bulliarda</i> vid. Tillæa.	
Bassovia.	173	Bumalda.	<u>290</u>
Batschia.	<u>158</u>	Buttneria.	<u>262</u>
Bauhinia.	<u>454</u>	Bulbocodium.	<u>355</u>
Bellonia.	210	Bumelia.	<u>237</u>
Bergera.	<u>466</u>	Bunium.	<u>308</u>
<i>Belemcanda</i>	<u>48</u>	Bupleurum.	304
Berberis.	<u>387</u>	Burmanna.	346
Bergia.	<u>513</u>	Bursaria.	<u>248</u>
Bertiera.	203	Bursera vid. addenda.	
Beta.	195	Butomus.	451
<i>Billardiera</i>	249		
Blackburnia.	<u>145</u>	C.	
Bladhia.	233	<i>Caballeria</i> vid. Manglilla.	
Blæria.	<u>135</u>	Cachrys.	<u>311</u>
Blitum.	6	Cacucia.	<u>470</u>
Boerhaavia.	<u>36</u>	Cadia.	<u>461</u>
Borago.	162	Cæsalpinia.	<u>460</u>
<i>Boragineæ</i>	<u>145</u>	<i>Calamagrostis</i> vid.	
Bororia.	<u>419</u>	Agrostis.	
Boscia.	<u>151</u>	Calamus.	<u>383</u>
Bosea.	297	Calanchœe.	<u>445</u>
Bowlesia.	<u>303</u>	<i>Calboa</i> vid. Macrostema.	
Brahejum.	<u>117</u>	Calceolaria.	<u>15</u>
Briza.	92	Callicarpa.	<u>133</u>
Bromelia.	343	<i>Callicocca</i> vid. Cephælis.	
Bromus.	06	Callisia.	<u>56</u>
Brossæa.	<u>175</u>	Callitriche.	<u>5</u>

	Pag.		Pag.
Callixene.	<u>373</u>	Cedrela.	<u>248</u>
Callodendrum.	<u>248</u>	Cedrota.	<u>415</u>
Calymenia	<u>36</u>	Celastrus.	<u>241</u>
<i>Calyxhymenia</i> vid. Calymenia.		Celosia.	<u>256</u>
Camax	<u>249</u>	Celtis.	<u>291</u>
Cameraria.	<u>268</u>	Cenchrus.	<u>71</u>
<i>Campanulaceæ</i>	<u>187</u>	<i>Centaurella</i> vid. Centaur.	
Camphorosma.	<u>149</u>	Centaurium.	<u>137</u>
Canarina.	<u>392</u>	Centunculus.	<u>141</u>
Canephora.	<u>202</u>	Cephæelis.	<u>202</u>
Canna.	<u>1</u>	Cephalanthus.	<u>119</u>
Canthium.	<u>200</u>	Cerdana.	<u>168</u>
Cansiera.	<u>148</u>	<i>Ceranthus</i> v. Chionauth.	
Cantua.	<u>187</u>	Cerastium.	<u>520</u>
<i>Caprifoliæ</i>	<u>213</u>	<i>Ceratia</i>	<u>287</u>
<i>Caprifolium</i>	<u>210</u>	Ceratostema.	<u>480</u>
Capsicum.	<u>229</u>	Ceratocephalus.	<u>341</u>
Capura.	<u>388</u>	Ceratopetalum.	<u>471</u>
Cardiospermum.	<u>444</u>	Cerbera.	<u>266</u>
Carissa.	<u>266</u>	Cercis.	<u>454</u>
Carmonea.	<u>290</u>	Cerinthe.	<u>161</u>
Carapa.	<u>416</u>	Ceropegia.	<u>277</u>
<i>Caroxylon</i> vid. Salsola.		<i>Cerophyllum</i>	<u>320</u>
Carpalea.	<u>125</u>	Cervantesia.	<u>235</u>
Carpodetus.	<u>246</u>	Cestrum.	<u>230</u>
Carum.	<u>323</u>	Chærophyllum.	<u>320</u>
<i>Caryophilleæ</i>	<u>491</u>	<i>Chalcas</i> vid. Murraya.	
Casearia.	<u>484</u>	Chamærops.	<u>599</u>
Cassia.	<u>456</u>	Chenopodium.	<u>294</u>
Cassine.	<u>327</u>	<i>Chenolea</i> vid. Salsola.	
Cassyta.	<u>450</u>	Cherleria.	<u>505</u>
Catesbæa.	<u>130</u>	Chimarrhis.	<u>210</u>
<i>Catha</i> vid. Celastrus.		Chiococca.	<u>209</u>
Caucalis.	<u>306</u>	Chionanthus.	<u>9</u>
Caulophyllum.	<u>387</u>	Chironia.	<u>282</u>
Ceanothus.	<u>244</u>	Chlora.	<u>418</u>
		Chloranthus.	<u>148</u>

	Pag.		Pag.
Chloris.	87	<i>Conchium</i> vid. <i>Hakea</i> .	
Chomelia.	131	Condalia.	241
Chrysitrix.	71	<i>Condalia</i> vid. <i>Coccocyps</i> .	
Chrysophyllum.	236	Conium.	308
Chrysosplenium.	487	Conocarpus.	211
Chrysurus.	80	Conospermum.	116
Chunchoa.	486	Convallaria.	372
Cicuta.	318	Convolvulus.	177
Cinna.	6	<i>Convolvulacei</i>	176
Cinchona.	196	Copaifera.	462
<i>Cipura</i> vid. <i>Marica</i> .	487	Coprosma.	298
Circæa.	10	Cordia.	166
Cissus.	142	Cordyline.	372
Claytonia.	253	Coriandrum.	319
Cleome.	390	Coris.	171
Clethra.	483	Corispermum.	5
Cneorum.	39	Cornidia.	445
Cnestis.	510	Cornucopiæ.	71
Cobæa.	185	Cornus.	143
Coccoloba.	442	Correa.	419
Coccocypsilum.	132	Corrigiola.	330
Codia.	438	Cortesia.	249
Codon.	465	Cortusa.	170
Codonum.	136	Corynocarpus.	233
Coffea.	208	Corypha.	382
Colchicum.	398	Cosmibuena.	197
Coldenia.	153	Cossinia.	388
Colladea.	107	Costus.	2
Colletia.	244	Cotyledon.	510
Collinsonia.	29	Contarea.	392
Columellia.	13	Coutoubea.	137
Combretum.	413	Crassula.	357
Cometes.	147	Cressa.	288
Commelina.	55	Crinum.	352
Commersonia.	340	Crithmum.	311
Comocladia.	39	Crocus.	41
Conanthera.	370	Crowea.	465

	Pag.		Pag.
Crudia.	<u>462</u>	Dentella.	205
Cruzita.	150	Detarium.	<u>462</u>
Cryptandra.	250	Deutzia.	505
Cryptospermum.	<u>122</u>	Dialium.	9
Cryptostomum.	232	Dianella.	<u>312</u>
<i>Cubæa</i> vid. <i>Tachia</i> .		<i>Dianthera</i> vid. <i>Insticia</i> .	
Cucubalus.	495	Dianthus.	493
Cucullaria.	4	Diapensia.	<u>185</u>
<i>Cupia</i>	200	Dichondra.	<u>288</u>
<i>Cunninghamia</i> vid. <i>Me-</i>		Dichromena.	57
lanea.		Dictamnus.	<u>464</u>
Curculigo.	362	Diervilla.	<u>214</u>
Cuminum.	318	Digitaria.	<u>84</u>
Cunonia.	<u>486</u>	Dilattris.	<u>54</u>
Cupania.	<u>413</u>	<i>Dilepyram</i> vid. <i>Muh-</i>	
Curcuma.	4	lenbergia.	
Cuscuta.	239	<i>Dimocarpus</i> vid. <i>Eu-</i>	
Cussonia.	<u>298</u>	phoria.	
Cyanella.	<u>366</u>	Diodia.	<u>124</u>
Cyclamen.	<u>171</u>	Dionæa.	<u>469</u>
Cynanchum.	<u>272</u>	Diosma.	<u>246</u>
Cynodon.	<u>85</u>	Diphylleia.	387
Cynoglossum.	159	Diplasia.	70
Cynometra.	<u>456</u>	Dipsacus.	<u>119</u>
Cynosurus.	<u>86</u>	Dirca.	<u>435</u>
Cyperus.	<u>60</u>	Disandra.	<u>402</u>
Cyrilla.	175	Disodea.	210
Cyrthanthus.	352	Dodecatheon.	<u>170</u>
		Dodonæa.	<u>415</u>
D.		Donatia.	<u>111</u>
Dactylis.	<u>88</u>	Doræna.	<u>173</u>
Dais.	<u>471</u>	Dracæna.	371
Danais.	198	Drapetes.	148
Daphne.	434	Drimia.	<u>374</u>
Datura.	216	Drosera.	336
Daucus.	306	Drypis.	<u>331</u>
Davisia.	<u>454</u>	Dulichium.	<u>65</u>

	Pag.		Pag.
<i>Duroia</i> vid. <i>Genipa</i> .		<i>Ernodea</i>	<u>131</u>
<i>Duhamelia</i>	203	<i>Erycibe</i>	<u>250</u>
E.		<i>Eryngium</i>	299
<i>Echinophora</i>	301	<i>Erythræa</i>	283
<i>Echites</i>	<u>270</u>	<i>Erythronium</i>	<u>360</u>
<i>Echium</i>	163	<i>Erythroxyton</i>	<u>508</u>
<i>Echiochilon</i>	<u>164</u>	<i>Escallonia</i>	<u>234</u>
<i>Ehretia</i>	<u>166</u>	<i>Eucomis</i>	<u>359</u>
<i>Ehrharta</i>	393	<i>Euparea</i>	<u>249</u>
<i>Ekebergia</i> vid. <i>Trichilia</i> .		<i>Euphoria</i>	<u>413</u>
<i>Elæagnus</i>	<u>148</u>	<i>Euridicea</i>	<u>48</u>
<i>Elæodendrum</i>	241	<i>Eustephia</i>	352
<i>Elatine</i>	<u>446</u>	<i>Evea</i>	<u>122</u>
<i>Elaphrium</i> vid. <i>Fagara</i> .		<i>Evodia</i> vid. <i>Fagara</i>	
<i>Eleusine</i>	87	<i>Evolvulus</i>	<u>288</u>
<i>Ellisia</i>	<u>168</u>	<i>Evonymus</i>	243
<i>Elymus</i>	<u>107</u>	<i>Exacum</i>	<u>136</u>
<i>Elytraria</i>	23	<i>Exoacantha</i>	<u>301</u>
<i>Embothrium</i>	<u>117</u>	<i>Exostema</i>	<u>196</u>
<i>Empleurum</i>	149	F.	
<i>Endrachium</i>	<u>176</u>	<i>Fabiana</i>	<u>176</u>
<i>Epacris</i>	173	<i>Fagara</i>	<u>144</u>
<i>Eperua</i>	<u>462</u>	<i>Fagonia</i>	<u>463</u>
<i>Ephielis</i>	<u>413</u>	<i>Fagræa</i>	<u>212</u>
<i>Epigaea</i>	482	<i>Falkia</i>	<u>287</u>
<i>Epilobium</i>	<u>410</u>	<i>Fedia</i>	<u>38</u>
<i>Epimedium</i>	143	<i>Fernelia</i> vid. <i>Coccocyps</i> .	
<i>Eranthemum</i>	10	<i>Feronia</i>	466
<i>Erianthus</i>	103	<i>Ferraria</i>	50
<i>Erica</i>	420	<i>Ferula</i>	311
<i>Eriocaulon</i>	110	<i>Festuca</i>	92
<i>Eriogonum</i>	<u>450</u>	<i>Fissilia</i>	<u>41</u>
<i>Eriophorum</i>	70	<i>Flagellaria</i>	396
<i>Eriospermum</i>	<u>363</u>	<i>Flerkeæa</i>	393
<i>Eriostemon</i>	<u>468</u>	<i>Floscopa</i>	374
<i>Erithalis</i>	<u>200</u>	<i>Fontanesia</i>	<u>10</u>

	Pag.		Pag.
Forgesia.	<u>194</u>	<i>Ginannia</i> vid. Palovea.	
<i>Foveolaria</i> v. <i>Tremanth</i>		Gisekia.	337
Fragrosa.	<u>303</u>	Gladiolus.	<u>44</u>
Francoa.	<u>445</u>	Glaux.	<u>262</u>
Frankenia.	392	Globba.	3
Frasera.	<u>137</u>	Globularia.	<u>118</u>
Fritillaria.	<u>358</u>	Globifera.	<u>14</u>
Froelichia.	<u>130</u>	Gloriosa.	360
Fuchsia.	<u>410</u>	Glossoma.	<u>144</u>
Fuirena.	70	Glossopetalum.	332
<i>Furcraea</i>	<u>380</u>	Gluta.	263
Fusanus.	<u>144</u>	Gnidia.	<u>436</u>
		Godovia.	<u>467</u>
G.		<i>Gomortega</i> vid. <i>Adenos-</i>	
Gærtnera.	467	temum.	
Gahnia.	393	<i>Gomozia</i> vid. <i>Nerteria</i> .	
Galanthus.	<u>349</u>	Gomphia.	<u>465</u>
Galax.	250	Gomphrena	<u>257</u>
Galaxia.	<u>41</u>	<i>Gonolobium</i>	<u>274</u>
Galenia.	<u>438</u>	Gonzalea.	132
Galium.	126	Goodenia.	195
Galipea.	8	Gouania.	<u>248</u>
Galopina.	<u>150</u>	<i>Goupia</i> vid. <i>Glossope-</i>	
<i>Galphimia</i>	<u>506</u>	talum.	
Galvesia.	393	Gratiola.	<u>14</u>
Gardenia.	<u>198</u>	Grielum.	<u>513</u>
Garidella.	<u>505</u>	Gronovia.	<u>257</u>
Gaura.	<u>409</u>	<i>Grossularia</i>	232
Gelsemium.	<u>267</u>	Grubbia.	<u>434</u>
Genipa.	<u>198</u>	Guajacum.	462
Gentiana.	<u>284</u>	Gaultheria.	<u>482</u>
<i>Gentianeæ</i>	<u>280</u>	Guarea.	<u>416</u>
Gethyllis.	362	Guiera.	470
Getonia.	<u>477</u>	Guettarda.	200
<i>Githago</i>	519	Guevina.	<u>118</u>
Gilibertia.	<u>424</u>	Guilandina.	<u>461</u>
Gillia.	<u>187</u>	Gumillea.	<u>290</u>

	Pag.		Pag.
Gunnera.	30	Herreria.	374
Guzmannia.	<u>344</u>	Heucheria.	290
Gymnocarpon.	<u>262</u>	<i>Heteranthera</i>	56
Gynopogon.	<u>266</u>	Higginsia.	133
Gypsophila.	492	Hillia.	391
Gyrocarpus.	<u>145</u>	Hippocratea.	40
H.		Hippotis.	210
Hamanthus.	<u>348</u>	Hippuris.	5
Hamatoxylon.	<u>462</u>	Hiraa.	507
Hagea.	<u>262</u>	Hirtella.	250
Hagenia.	<u>416</u>	Hoffmannia.	131
Hakea.	117	Hoffmanseggia.	460
<i>Hamellia</i>	203	Hoitzia.	187
Hænkea.	<u>241</u>	Holcus.	78
Haloragis.	<u>446</u>	Holosteum.	111
Hamamelis.	<u>150</u>	Honckenia.	416
Hartogia.	<u>145</u>	Hordeum.	108
Hasselquistia.	<u>313</u>	Hornstedtia.	2
<i>Hebea</i>	<u>44</u>	Hortensia.	505
Hedera.	232	<i>Hostea</i> vid. <i>Matelia</i> .	
Hedwigia.	<u>414</u>	Hottonia.	171
Hedychium.	2	Houstonia.	125
<i>Hedycia</i> vid. <i>Licania</i> .		Hovenia.	244
Hedyotis.	<u>122</u>	Huanaca.	317
Heisteria.	<u>466</u>	Huerteia.	248
<i>Helianthera</i> vid. <i>Helicia</i> .		Humboldtia.	248
Helicia.	<u>214</u>	Hyacinthus.	374
Heliconia.	263	Hydrangea.	486
Heliotropium.	<u>155</u>	Hydrogeton.	400
Hellenia.	1	Hydrocotyle.	301
Helonias.	398	Hydrolea.	289
Hemerocallis.	382	Hydrophyllum.	168
Heracleum.	314	Hydrophylax.	125
<i>Heritiera</i> vid. <i>Dilatriis</i> .		Hymenæa.	455
Hermaş.	<u>305</u>	Hyoscyamus.	217
Herniaria.	<u>292</u>	Hypecoum.	150
		Hypolytrum.	70

	Pag.		Pag.
<i>Hyperanthera</i> vid. <i>Moringa</i> .		<i>Justicia</i> .	19
<i>Hypoxis</i> .	362	<i>Ixia</i> .	46
I. J.		<i>Ixora</i> .	130
<i>Jaborosa</i> .	218	K.	
<i>Jacquinia</i> .	234	<i>Kæmpheria</i> .	4
<i>Jambolifera</i> .	416	<i>Kalmia</i> .	477
<i>Jarava</i> .	6	<i>Kochia</i> .	297
<i>Jasminum</i> .	7	<i>Koelreuteria</i> .	413
<i>Jeffersonia</i> .	418	<i>Koeleria</i> .	97
<i>Icica</i> .	414	<i>Koenigia</i> .	111
<i>Ignatia</i> .	264	<i>Knautia</i> .	121
<i>Ilex</i> .	151	<i>Knoxia</i> .	125
<i>Illecebrum</i> .	160	<i>Kookia</i> .	466
<i>Imbricaria</i> .	234	<i>Krameria</i> .	141
<i>Impatiens</i> .	256	<i>Kuhnia</i> .	257
<i>Imperatoria</i> .	321	<i>Kyllinga</i> .	57
<i>Imperata</i> .	103	L.	
<i>Ionesia</i> .	406	<i>Labatia</i> .	134
<i>Ionia</i> .	256	<i>Lachenalia</i> .	375
<i>Ionidium</i> .	256	<i>Lachnæa</i> .	538
<i>Jovellana</i> .	15	<i>Lacistema</i> .	5
<i>Joncquetia</i> vid. <i>Tapiria</i> .		<i>Lagetta</i> .	434
<i>Inocarpus</i> .	584	<i>Lagœcia</i> .	253
<i>Ipomæa</i> .	182	<i>Lagurus</i> .	98
<i>Iria</i> .	65	<i>Lamarkea</i> .	218
<i>Irideæ</i> .	41	<i>Lambertia</i> .	116
<i>Iridrogalvia</i> v. <i>Tofieldia</i> .		<i>Lanaria</i> .	377
<i>Iris</i> .	50	<i>Lapageria</i> .	373
<i>Ischæmum</i> .	105	<i>Lappago</i> .	85
<i>Isertia</i> .	392	<i>Lappula</i> .	157
<i>Isnardia</i> .	146	<i>Larochea</i> .	337
<i>Itea</i> .	175	<i>Larrea</i> .	464
<i>Juncus</i> .	383	<i>Laserpitium</i> .	312
<i>Jussieua</i> .	469	<i>Lasiopetalum</i> .	250

	Pag.		Pag.
Lasiostoma	134	Lithospermum	156
<i>Laugeria</i>	201	Lœflingia	40
Laurus	448	<i>Logania</i> vid. Ruyschia.	
Lausonia	415	Lolium	110
Lechea	112	Lonicera	213
Ledum	477	Loranthus	388
Leea	233	Lopezia	4
Leersia	73	Lubinia	172
<i>Legousia</i>	192	<i>Lucuma</i> vid. Achras.	
<i>Lciophyllum</i>	477	Ludwigia	145
<i>Lemonia</i>	44	Lusuriaca	373
Leontice	386	Lychnis	520
Lepironia	70	Lycium	231
Leptanthus	76	Eycopsis	162
Leucojum	349	Lycopus	24
<i>Licania</i>	248	Lygeum	71
Licuala	382	Lysimachia	172
Ligtfootia	193	<i>Lysimachia</i>	186
Ligusticum	314		
Ligustrum	8		
<i>Lilac</i> vid. Syringa.		M.	
<i>Lilium</i>	358	Macrocnenum	204
<i>Lilœum</i>	403	Macrolobium	39
Limnetis	72	Macrostema	185
Limonia	466	<i>Majanthemum</i>	185
<i>Limonium</i>	352	Magallana	405
Linconia	290	Malpighia	505
<i>Lindera</i>	388	<i>Malpighiaceæ</i>	505
Linkia	219	<i>Manabea</i> vid. Aegiphila.	
Linnæa	136	Manettia	134
<i>Linociera</i> vid. Chionan-		Mapania	57
thus.		Mangifera	249
Linum	334	Manglilla	237
Lisianthus	281	Manisuris	106
<i>iLta</i> vid. Vohiria.		Maranta	3
<i>Litschi</i> vid. Euphoria.		Margyrocarpus	30
Lithophila	30	Marica	54

	Pag.		Pag.
Massonia.	<u>348</u>	Milla.	<u>355</u>
<i>Mataiba</i> vid. Ephielis.		Mimusops.	<u>416</u>
Matelea.	<u>267</u>	<i>Mindium</i> vid. Michauxia.	
Mathiola.		Minuartia.	112
Matrella.	73	Mirabilis.	112
Mattuschkæa.	<u>130</u>	Mirabilis.	<u>176</u>
<i>Mayaca</i> vid. Syena.		Mitchella.	232
<i>Maytenus</i> vid. Celastrus.		Mitella.	<u>491</u>
Medcola.	398	Mnasiaum.	6
Melanea.	<u>131</u>	Mœringia.	438
Melanthium.	397	Mœnchia.	<u>153</u>
Melastoma.	<u>471</u>	<i>Mogorium</i> v. Jasminum.	
<i>Melastomeæ</i>	<u>471</u>	Mollugo.	112
Melia.	469	Monarda.	<u>24</u>
<i>Meliaceæ</i>	<u>467</u>	Monotropa.	469
Melica.	76	<i>Moutabea</i> vid. Crypto-	
Melicocca.	<u>413</u>	stomum.	
Melicope.	416	Montia.	111
Melodinus.	<u>265</u>	Moræa.	<u>49</u>
Memecylon.	<u>411</u>	Morina.	<u>30</u>
Menais.	<u>167</u>	Morinda.	<u>201</u>
Menyanthes.	<u>171</u>	<i>Mouriria</i> vid. Petaloma.	
Menziezia.	<u>419</u>	Muhlenbergia.	73
Merendera.	398	Mulinum.	309
Meriania.	<u>477</u>	Murraya.	<u>466</u>
<i>Mertensia</i>	<u>161</u>	Musa.	343
Messerschmidia.	<u>164</u>	<i>Muscari</i>	345
Meum.	319	Mussænda.	<u>199</u>
Michauxia.	418	Myginda.	151
Miconia.	<u>476</u>	Myonima.	131
<i>Micranthemum</i> vid. Glo-		Myosotis.	<u>156</u>
bifera.		Myoschilos.	<u>235</u>
<i>Micranthus</i>	<u>465</u>	Myosurus.	<u>341</u>
Micropetalon.	<u>509</u>	Myrmecia.	<u>134</u>
Microtea.	<u>298</u>	Myrosma.	3
Miegea.	<u>101</u>	Myrospermum.	<u>472</u>
Milium.	73	Myroxylon.	<u>432</u>

	Pag.		Pag.
Myrrhis.	319	Oenoplia.	<u>240</u>
Myrsine.	233	Oenothera.	407
		Olax.	39
N.		Oldenlandia.	<u>146</u>
<i>Nacibea</i> vid. <i>Manettia</i> .		Olea.	<u>8</u>
Neea.	<u>418</u>	Oliveria.	319
Nama.	<u>289</u>	<i>Onagræ</i>	407
Nandina.	<u>388</u>	Oncus.	374
Narcissus.	<u>349</u>	Onosma.	<u>161</u>
Narthecium.	370	Onosmodium.	<u>162</u>
Nardus.	72	Opelia.	<u>241</u>
<i>Nastus</i> vid. <i>Bambos</i> .		Opercularia.	<u>122</u>
Nauclea.	201	Ophira.	434
Navarretia.	<u>187</u>	Ophiorhiza.	<u>281</u>
Nectris.	394	Ophioxylon.	<u>268</u>
Nerium.	239	<i>Oribasia</i> vid. <i>Nonatelia</i> .	
Nerteria.	<u>150</u>	<i>Orixa</i> vid. <i>Othera</i> .	
Neurada.	<u>522</u>	Ornithogalum.	<u>363</u>
Nierenbergia.	<u>176</u>	Ornithrophe.	<u>412</u>
Nicandra.	<u>219</u>	Ornus.	<u>9</u>
Nicotiana.	217	Orontium.	382
<i>Nigrina</i> vid. <i>Chloranthus</i> .		Ortegaia.	40
Niota.	<u>416</u>	Oryza.	<u>314</u>
Nitraria.		Oryzopsis.	73
Nolana.	<u>168</u>	Osbeckia.	<u>406</u>
Nolinea.	<u>399</u>	Othera.	<u>145</u>
Nonatelia.	204	Ottelia.	<u>400</u>
Nuxia.	132	Outea.	<u>39</u>
Nyctanthes.	<u>7</u>	Oxalis.	<u>514</u>
		<i>Oxybaphus</i> vid. <i>Caly-</i>	
		menia.	
		Oxycoccus.	<u>415</u>
O.			
<i>Ochrosia</i> vid. <i>Ophyoxylon</i> .		P.	
Oenanthe.	318	<i>Pæderia</i>	210
		<i>Pædorata</i>	<u>13</u>

	Pag.		Pag.
Pagamea.	<u>150</u>	Petiveria.	401
<i>Paliurus</i>	<u>241</u>	Petiveria.	402
Palovea.	<u>450</u>	Petrocarya.	403
Panax.	<u>298</u>	Petunia.	218
Pancratium.	<u>351</u>	Peucedanum.	310
Panicum.	<u>80</u>	<i>Petromarula</i>	194
<i>Panke</i> vid. Gunnera.		<i>Peyrousia</i>	46
<i>Panzeria</i> vid. Eperua.		Phacelia.	168
Paris.	<u>446</u>	Phalangium.	367
Parkinsonia.	<u>459</u>	Phalaris.	79
Parnassia.	<u>331</u>	Pharnaceum.	330
Paspalum.	<u>85</u>	Phellandrium.	318
Passerina.	<u>436</u>	Philesia.	374
<i>Palicuria</i>	<u>208</u>	Phillyrea.	8
<i>Paronychias</i> vid. Illecebr.		Phlegoriza.	450
Pappophorum.	<u>98</u>	Phleum.	79
Paspalum.	<u>85</u>	Phlox.	186
Pastinaca.	322	Phrynium.	4
Pancovia.	403	Phormium.	375
Patagonula.	<u>166</u>	Phylica.	245
<i>Paulletia</i> vid. Bauhinia.		Phylidrum.	4
Paullinia.	<u>442</u>	Phyllis.	298
Pavetta.	131	Phyllactis.	39
<i>Pavia</i>	403	Physalis.	219
<i>Paypayrola</i> . v. Wibelia.		Phyteuma.	193
<i>Payrola</i> vid. Wibelia.		Phytolacca.	522
Penea.	134	<i>Picrium</i> vid. Vohiria.	
Pennisetum.	<u>72</u>	Pilocarpus.	243
Penthorum.		Pimelea.	10
Peplis.	393	Pimpinella.	323
<i>Perama</i> vid. Mathuskea.		Pinguicula.	17
Pergularia.	<u>271</u>	Pinknea.	197
<i>Peperomia</i>	<u>34</u>	Piper.	31
Perotis.	103	Pisonia.	402
Persoonia.	<u>118</u>	Pitcarnia.	344
Petaloma.	470	Pittospermum.	248
Petitia.	<u>131</u>	Placoma.	210

	Pag.		Pag.
Plæa.	451	Pothos.	147
Planera.	291	Potima.	209
Plantago.	137	Poupartia.	509
Plectronia.	246	Pourretia vid. Pitcarnia.	
Plumbago.	175	Primula.	169
Plumeria.	267	Prinos.	387
Poa.	88	Prismatocarpus v. Cam-	
Podalyria.	453	panula.	
Pogonia.	232	Proserpinaca.	111
Poinciana v. Cæsalpinia.		Prosopis	461
Poiretia.	173	Protea.	113
Polemonideæ.	185	Psathura.	392
Polemonium.	185	Psychotria.	205
Pollia.	347	Psyllium.	140
Pollichia.	4	Ptelea.	145
Polyanthes.	374	Pteranthus.	149
Polycardia.	243	Ptilium.	359
Polycarpon.	111	Pulmonaria.	453
Polycarpia vid. Hagea.		Pultenæa.	453
Polycnemum.	40	Putoria vid. add. . . .	524
Polypogon.	30	Pyrola.	483
Polygonatum.	373	Pyrostria.	131
Polygonææ.	438	Pyxidanthera.	175
Polygonum.	439		
Polypremum.	134	Q.	
Pomaria.	460	Qualea.	4
Pommereulla.	106	Quadria vid. Guevina.	
Pontederia.	347	Queria.	112
Pongatium vid. Spheno-		Quirivela.	275
clea.		Quassia.	465
Porana.	176	Queria.	112
Porliera.	445	Quinchamalium. . . .	212
Portesia vid. Trichilia.		Quisqualis	470
Portlandia.	197	Quivisia.	467
Portulacaria.	331		
Potamogetou.	152	R.	
Potalia.	466	Radiola.	153


	Pag.		Pag.
Randia.	<u>199</u>	Roussea.	<u>130</u>
Ramonda.	<u>216</u>	Royena.	<u>486</u>
<i>Rapatea</i> vid. <i>Mnasium</i> .		Roxburgia.	412
Rauwolfia.	265	Rubia.	130
<i>Ravenala</i> vid. <i>Urania</i> .		<i>Rubiaceæ</i>	195
Reichelia.	329	Rumex.	394
Remirea.	<u>57</u>	Rumphia.	39
Renealmia.	<u>2</u>	Rupala.	<u>117</u>
Retzia.	<u>176</u>	Ruppia.	152
Rheum.	<u>451</u>	<i>Russelia</i> vid. <i>Vahlia</i> .	
<i>Rhamnei</i>	238	Ruta.	<u>464</u>
Rhamnus.	238	<i>Rutaceæ</i>	462
Rhexia.	406	Ruyschia.	249
<i>Rhodoraceæ</i>	<u>477</u>		S.
Rhodora.	<u>477</u>	Sabal.	<u>399</u>
Rhododendrum.	<u>478</u>	Sabicea.	<u>203</u>
Rhus.	324	Saccharum.	102
Ribes.	251	Sagina.	<u>153</u>
Richardia.	392	Salicornia.	<u>5</u>
Rinorea.		Salmasia.	349
Ripogonum.	374	Salsola.	295
Riqueria.	152	Salvadora.	<u>129</u>
Rivina.	<u>149</u>	Salvia.	<u>24</u>
Robergia.	<u>518</u>	Samara.	<u>144</u>
Rochefortia.	290	Sambucus.	328
Roella.	193	Samolus.	172
<i>Rohria</i> vid. <i>Tapura</i> .		Samyda.	<u>484</u>
<i>Romulea</i>	<u>46</u>	Sanchezia.	<u>24</u>
<i>Ronabea</i> vid. <i>Psychotr</i> .		Sandoricum.	<u>469</u>
Rondeletia.	203	Sanguisorba.	<u>141</u>
Roridula.	253	Sanicula.	<u>303</u>
Rosmarinus.	<u>24</u>	Sansevieria.	372
<i>Rouhamon</i> vid. <i>Lasio-</i>		Santalum.	<u>148</u>
stoma.		Sapindus.	<u>444</u>
<i>Rourea</i> vid. <i>Robergia</i> .		<i>Sapindi</i>	<u>412</u>
Rotala.	<u>40</u>	Saponaria.	492
Rotthœllia.	<u>106</u>		

	Pag.		Pag.
<i>Saracha</i>	<u>219</u>	<i>Senacia</i>	<u>241</u>
<i>Sarothra</i>	<u>331</u>	<i>Septas</i>	403
<i>Sarmienta</i>	13	<i>Serissa</i>	<u>444</u>
<i>Sauvagesia</i>	<u>253</u>	<i>Seseli</i>	321
<i>Saururus</i>	403	<i>Sesleria</i>	72
<i>Saxifraga</i>	<u>487</u>	<i>Sherardia</i>	<u>124</u>
<i>Saxifrageæ</i>	<u>491</u>	<i>Sessea</i>	231
<i>Scabiosa</i>	<u>119</u>	<i>Sibbaldia</i>	<u>540</u>
<i>Scabrita</i> vid. <i>Nyctanth</i> .		<i>Sickingia</i>	234
<i>Scævola</i>	195	<i>Sideroxylon</i>	236
<i>Scandix</i>	319	<i>Siderodendrum</i>	131
<i>Scolosantus</i>	130	<i>Silene</i>	<u>496</u>
<i>Schefflera</i>	<u>341</u>	<i>Simaba</i>	<u>465</u>
<i>Scheuchzeria</i>	396	<i>Sipanea</i>	<u>205</u>
<i>Schmidelia</i> vid. <i>Orni-</i>		<i>Siphonanthus</i>	130
trophe.		<i>Sirium</i> vid. <i>Santalum</i> .	
<i>Schefffieldia</i> vid. <i>Samolus</i> .		<i>Sison</i>	317
<i>Schrebera</i>	7	<i>Sisyrinchium</i>	<u>49</u>
<i>Scollera</i> vid. <i>Oxycoccus</i> .	<u>462</u>	<i>Sium</i>	316
<i>Scotia</i>	<u>462</u>	<i>Skimmia</i>	<u>145</u>
<i>Schradera</i>	<u>201</u>	<i>Smyrnium</i>	322
<i>Schœnus</i>	<u>58</u>	<i>Solanaceæ</i>	<u>214</u>
<i>Schwenkfeld</i> . v. <i>Sabicea</i> .		<i>Solandra</i>	<u>218</u>
<i>Scilla</i>	<u>365</u>	<i>Solanum</i>	<u>220</u>
<i>Scirpoidei</i>	<u>56</u>	<i>Saldanella</i>	<u>170</u>
<i>Scirpus</i>	<u>65</u>	<i>Sophora</i>	<u>452</u>
<i>Sciuris</i>	30	<i>Sorghum</i>	<u>101</u>
<i>Scleranthus</i>	<u>491</u>	<i>Souroubea</i> vid. <i>Ruyschia</i> .	
<i>Scopolia</i> vid. <i>Toddalia</i> .		<i>Sowerbea</i>	<u>355</u>
<i>Scoparia</i>	<u>141</u>	<i>Spananthe</i>	<u>303</u>
<i>Scotia</i>	<u>462</u>	<i>Spartina</i> vid. <i>Limnetis</i> .	
<i>Secalc</i>	<u>108</u>	<i>Spathelia</i>	328
<i>Sedum</i>	<u>511</u>	<i>Spermacoce</i>	123
<i>Sægetella</i>	<u>330</u>	<i>Spergula</i>	<u>522</u>
<i>Selinum</i>	308	<i>Spergularia</i>	<u>504</u>
<i>Sellieria</i> vid. <i>Goodenia</i> .		<i>Sphenoclea</i>	173
<i>Semecarpus</i>	324	<i>Spielmannia</i>	<u>141</u>

	Pag.		Pag.
Toddalia	<u>249</u>	Tulipa	360
Tofielda.	399	Turnera.	329
Toluifera.	<u>462</u>	Turræa.	<u>468</u>
Tonsella.	<u>41</u>		
Tontanea.	134	U.	
Tordylium.	<u>314</u>	Ucriana.	<u>205</u>
<i>Touchiroa</i> vid. <i>Crudia</i> .		Ulloa.	<u>218</u>
Tournefortia.	<u>165</u>	Ulmus.	<u>290</u>
Tovaria.	<u>402</u>	Uniola.	92
<i>Tozettia</i> vid. <i>Alopecurus</i> .		Urania.	343
Trachelium.	194	<i>Umbellatæ</i>	<u>298</u>
Trachys.	<u>85</u>	Urceola.	<u>269</u>
<i>Trachinotia</i> vid. <i>Lim-</i>		<i>Urceolaria</i> v. <i>Sarmienta</i> .	
netis.		Utricularia.	<u>18</u>
Tradescantia.	<u>346</u>	Uvularia.	360
Trapa.	<u>147</u>		
Tremanthus.	<u>467</u>	V.	
Trianthema.	<u>486</u>	Vaccinium.	<u>478</u>
Tribulus.	<u>464</u>	Vaginata.	70
Trichilia.	<u>468</u>	Vahlia.	<u>290</u>
Trichophorum.	<u>69</u>	Valantia.	<u>129</u>
Trichodium.	73	Valentinia.	<u>415</u>
Trichoon.	<u>102</u>	Valeriana.	37
Tricycla.	<u>210</u>	Vallesia.	<u>265</u>
Trientalis.	<u>402</u>	Vangnira.	<u>205</u>
Triglochin.	396	Varronia.	<u>167</u>
Trigonia.	<u>467</u>	Velezia	<u>290</u>
Triguera	<u>218</u>	Veltheimia.	377
Trillium.	398	<i>Ventenatia</i> v. <i>Stephelia</i> .	
Triopteris.	<u>508</u>	Ventilago.	<u>250</u>
Triosteum.	<u>214</u>	Veratrum.	397
Tripterella.	39	Verbascum.	<u>214</u>
Trisetum.	<u>97</u>	Veronica.	<u>10</u>
Tristemma.	<u>476</u>	Viburnum.	326
Triticum.	<u>109</u>	Vinca.	<u>267</u>
Tropæolum.	<u>405</u>	<i>Vincetoxicum</i>	<u>274</u>
Tulbachia.	349	Viola.	<u>253</u>

	Pag.		Pag.
<i>Vereia</i> vid. <i>Callinchœ</i> .		<i>Wulfenia</i> .	14
<i>Virecta</i> .	232	<i>Wurmbea</i> .	396
<i>Virgilia</i> .	<u>403</u>		X.
<i>Visnaga</i> .	307	<i>Xanthorea</i> .	<u>370</u>
<i>Visnaga</i> vid. <i>Ammi</i> .		<i>Xerophyllum</i> .	399
<i>Vitis</i> .	252	<i>Xerophyta</i> .	<u>346</u>
<i>Vitmannia</i> .	<u>412</u>	<i>Ximenia</i> .	<u>415</u>
<i>Vogelia</i> .	<u>210</u>	<i>Xiphium</i> .	<u>54</u>
<i>Vohiria</i> .	283	<i>Xuaresia</i> .	<u>176</u>
<i>Votomita</i> vid. <i>Glossoma</i> .		<i>Xylocarpus</i> .	<u>416</u>
		<i>Xylosteon</i> .	213
		<i>Xyris</i> .	<u>56</u>
			Y.
		<i>Yucca</i> .	378
			Z.
<i>Wachendorphia</i> .	<u>54</u>	<i>Zanonia</i> .	347
<i>Walkera</i> .	250	<i>Zanthoriza</i> .	<u>341</u>
<i>Wallenia</i> .	<u>133</u>	<i>Zigadenus</i> .	398
<i>Watsonia</i> .	<u>70</u>	<i>Zoydia</i> .	<u>73</u>
<i>Webera</i> vid. <i>Canthium</i> .		<i>Zizyphus</i> .	240
<i>Weigelia</i> .	<u>176</u>	<i>Zuccagnia</i> .	<u>461</u>
<i>Wendlandia</i> .	400	<i>Zygophyllum</i> .	463
<i>Weinmannia</i> .	<u>438</u>		
<i>Wibelia</i> .	<u>210</u>		
<i>Willichia</i> .	40		
<i>Witheringia</i> .	<u>133</u>		
<i>Witsena</i> .	42		

Finit Partis primæ.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201

